



JOANNIS KEPLERI

ASTRONOMI

OPERA OMNIA

EDIDIT

DR. CH. FRISCH.

VOLUMEN VI. 1.



FRANCOFURTI A. M. ET ERLANGAE.

HEYDER & ZIMMER.

MDCCCLXV




JOANNIS KEPLERI

• ASTRONOMI

OPERA OMNIA.

VOLUMEN SEXTUM.





JOANNIS KEPLERI
ASTRONOMI
OPERA OMNIA.

EDIDIT
D^r CH. FRISCH.

VOLUMEN VI.



FRANCOFURTI A. M. ET ERLANGAE.

HEYDER & ZIMMER.

MDCCCLXVI.

Druck von Jul. Kleeblatt in Stuttgart,

OPERUM KEPLERI

QUAE HOC VOLUMEN CONTINET DISPOSITIO.

	Folio
1. Epitome Astronomiae Copernicanae	113
Notae editoris	531
2. Tabulae Rudolphinae	613
3. Consideratio Observationum Regiomontani et Waltheri	726

CONSPECTUS EPISTOLARUM KEPLERI

QUAE INSUNT VOLUMINI VI.

	Folio
Ad Berneggerum, dat. Lincol 7. Febr. 1617.	19
" " dat. Lincol s. d.	20
" " dat. Lincol 1. Oct. 1617	20
" " dat. Lincol 29. Aug. 1620	21
" " dat. Ratisbonae 15. Febr. 1621	21
" " dat. Lincol 11. Aug. 1621	21
" " dat. Lincol 20. Maji 1624	617
" " dat. Tubingae 30. Junii 1625	617
" " dat. Ulmae 8. Febr. 1627	619
" " dat. Ulmae 6. Aprilis 1627	620
" " dat. Francofurti 2. Oct. 1627	621
" " dat. Ulmae 19. Nov. 1627	622
" " dat. Pragae 4. Mart. 1628	623
" " dat. Pragae 15. Apr. 1628	624

	Folio
Ad Berneggerum dat. Sagoni Martio 1629	625
» » dat. Sagoni 29. Aprilis 1629	626
» Commissarios Caesaris. Ulmae s. d.	644
» Crügerum dat. Lincii Cal. Martii 1615	23
» » dat. Lincii 17. Junii 1616	24
» » dat. Lincii 11. Martii 1619	26
» » dat. Lincii 17. Julii 1623	28
» » dat. Lincii 18. Febr. 1624	29
» » dat. Lincii 28. Febr. 1624	32
» » dat. Lincii 9. Sept. 1624	37
» » dat. Lincii 1. Maji 1626	49
» Esslingensem senatum d. Ulmae 2. Nov. 1627	646
» Ferdinandum Imperatorem (fragm.)	87
» Hofmannum dat. Lincii 26. Apr. 1615	19. 71
» Maestlinum dat. Lincii 5. Maji 1616	13
» » dat. Lincii 5. Sept. 1616	15
» » dat. Lincii 22. Dec. 1616	16
» Mollerum s. l. et d.	74
» Principis quendam familiarem, s. l. et d. (excerpta)	304
» Procures Austriae superioris dat. Lincii 9. Maji 1616	639
» Remum dat. Pragae 18. Martii 1612	58
» » dat. Lincii 1. Dec. 1618	56
» » dat. Lincii 4. Aug. 1619	58 (31, 334)
» » dat. Lincii 31. Aug. 1619	61
» » dat. Lincii — Oct. 1619	62
» » dat. Sagoni 2. Mart. 1629	63
» Schickardum dat. Lincii 25. Apr. 1626	626
» » dat. Ulmae 23. Jan. 1627	627
» » dat. Ulmae 10. Febr. 1627	629
» » dat. Ulmae 20. Mart. 1627	630
» » dat. Ulmae 19. Apr. 1627	633
» » dat. Ulmae 5. Maji 1627	634
» » dat. Ulmae 7. Junii 1627	634
» » dat. Ulmae 19. Nov. 1627	635
» » dat. Pragae 1. Mart. 1628	636
» Ulmensium magistratum dat. Ulmae s. d. (1627)	648
» Wallenstenium dat. Sagoni 24. Febr. 1629	70

EPITOME ASTRONOMIAE COPERNICANAE.



PROOEMIUM.

Kepleri studia astrouomica, anno 1596. primum incepta et astronomis publicis literis tradita, per annos sequentes 22 non intermissa serie invicem se subsecuta sunt. Quod Keplerus in Mysterio Cosmographico tentavit, ut motus planetarum eorumque distantias a Sole ad normam principiaque geometriae conjungeret et sic fundamenta jaceret restauratae astronomiae, quamquam non plane ad votum successit, per totam tamen vitam quasi unicum studiorum suorum finem habuit propositum. Extremam manum imposuit his conatibus condens „Harmoniam Mundi,“ quam anno 1619. typis mandavit. Dum res ad universam astronomiam spectantes mente agitabat, singula erant respicienda, observandi siderum motus, eclipses Solis Lunaeque non negligendae, optica disciplina in melius vertenda, ut ratio reddi posset refractionis astronomicae, aliaeque multa, quae ad mandatum munus astronomi (vel astrologi) Caesaris pertinebant, agitanda. Plurimum facesserunt negotii motus Lunae inaequales, et immanem impendit operam Keplerus, ut Torrae comitis orbitam legibus a se inventis adaptaret. Quod quum successisset illiusque theoriam ceterorum planetarum theoriis aecommodatam pntasset, ea, quae evigilavisset, libro completi statuit, quem Ptolemaei Almagesto comparans *Hipparchum* inseripsit. Hunc librum vero non absolutum relinquit, iterum iterumque a Lunae inaequalibus motibus, quo minus progredereetur, impeditus; quae continet illud opus in ordinem redacta inordinataque ea ex manuscriptis Pulkoviensibus desumpta retulimus in volumen tertium nostrae editionis. Keplerus quum desperaret rem ad calcem perduei posse, mutato consilio partem eorum, quae Hipparchus continebat, ad „Tabulas Rudolphinas“ reservandam statuit, partem alii libro inserendam, quo populari sermone universam astronomiam complecteretur. Typis exprimendum curavit hunc librum, quem inscripsit *Epitome Astronomiae Copernicanae*, annis 1618, 1620 et 1621. Libri tres priores exhibent „Doctrinam sphaericam,“ libri quatuor posteriores „Doctrinam theoricam.“ Maestlini secutus exemplum conscripsit hoc opus forma quaestionum et responsionum, quae forma et in aliis libris, quibus artes altae sciendi eupidis tradebantur, tum temporis usitata erat, eoque collegit, quae ipse in astronomicis invenerat quaeque alii eum priores tum aequales in promovenda astronomia praestiterant. Innixus Copernici de mundo hypothesi et Tychoonis observationibus rite illa conjunxit iis, quae in Optica, in libro de Martis mo-

tibus et in Harmonia nova astronomis tradita erant, et quae ope tubi optici Galilaeus et Jo. Fabricius in caelo memoria digna ad promovendam artem invenerant. Insunt igitur huic operi „leges“ a Keplero inventae, Tychonis observationum historia, placita Tychonis de motu et orbibus planetarum eorumque distantis a Sole et Terra, et Lunae theoria ejusdem, historia eorum, quae Galilaeus et Simon Marius in Lunae superficie, in Veneris et Mercurii illuminatione, in Jove et Saturno detexerant, nec non Kepleri ipsius sententia de motu Solis circa axem suum, quam fuleiebat maculis, quas Jo. Fabricius primus in Sole conspexerat, per Solis superficiem se promoventibus. Novam denique condidit Keplerus in hoc opere theoriā motuum Lunae deliquorumque Solarium et Lunarum, emendans et locupletans ea, quae Tycho in „Pro-gymnasmatibus“ edixerat.

Ut eadem ratione qua in praemissis voluminibus procedamus, singula, quae insunt sequenti operi, ordine recenserebimus.

Liber I. quinque partibus principia tradit „astronomiae in genere doctrinaeque sphaericae in specie.“ Praemissis definitionibus adit Keplerus *parte prima* astronomiam ipsam, figuram Terrae rotundam demonstrat, ejusdem magnitudinem dimetiendam docet, paucis enarrans veterum de figura Terrae opiniones et conatus illam dimetiendi. *Parte secunda* transit ad stellas fixas, de earum dispositione circa Terram, earum magnitudine, distantia, numero certi quidem pro re nata nihil pronuncians, probabilia tantum proponens. Haec consideratio adducit Keplerum ad quaestionem de finito et infinito, de natura corporum, planis et sphaericis superficiebus comprehensorum, qua speculatione Keplerus revocatur ad mathematicam et opticeam demonstrationem, Solem, Lunam et planetas esse globos solidos. *Pars tertia:* De natura et altitudinis aëris. Keplerus distinguit inter aërem, „qui vix excedit supra montium iuga“ et aetherem, per totum universum fustum (cfr. Opticam vol. II. passim); aërem dicit colore caeruleo tinetum, aetheri quandoque immisceri aliquid impurum, alias hunc esse purissimum, tenuissimum et plane pellucidum. Hic locum invenit disputandi de ortu et natura cometarum, negat cum Tychone sphaeras veterum solidas, et hinc transit ad refractionem astronomicam, ad Opticam suam respiciens; tradit modum computandi ex refractionibus altitudinem aëris, et quantitatem crepusculorum, item rationem nubium altitudinem dimetiendi. Finem facit proposita causa crepusculorum, scintillationis fixarum, diversae magnitudinis Solis etc. in horizonte et in vertice positi. *Pars quarta.* De loco Terrae in mundo. Ad explicationem „primi motus“ (diurni visibilis circa Terram) sufficit, ut Terra colloquetur in centro hujus motus, etsi non sit in centro totius universi; semidiameter Terrae prae ingenti fixarum a Terra distantia pro nihilo est. Recensitis variis rationibus astronomicis, quibus evincatur, Terram non esse in medio mundi, alia argumenta ex physica repetuntur, ut hoc probetur, de natura gravium et levium desumpta. *Pars quinta.* De motu Terrae diurno. Visus fallitur circa motum primum, non sidera vix ascendunt supra montes, sed hi cum toto Telluris globo circa axem illius convertuntur a plaga occasus ad plagam orientis; hoc motu omnes apparentiae motus primi exactissime explicantur. Probatur hic motus Terrae septem argumentis: 1) natura semper, quod potest per facillora, non agit per ambages difficiles; quare verisimilis est, Terram rotare, quam totam mundi machinam volvi; 2) celeritas motus totius mundi incredibiliter major esset, quam motus globi Telluris, qui non multo major est, quam celeritas motuum, qui in superficie Terrae observantur; 3) motus diurnus per anulum spatium non

semper aequalis manet, ejusque Inaequalitatis causa facilo redditur ex mutatione intervalli Terrae a Sole, quum nulla conungi posset, si totus mundus volveretur. 4) Omnis materia ad quietem est inclinata, quaro motus, quem observamus, deducendus est ab aliqua facultate motrice: haec facultas Terrae potius globo tribuenda est, quam coelo amplissimo et per immensa spatia extenso; 5) figura Terrae rotunda volutioni aptissima est; 6) motus diurnus efficit, ut omnes Terrae partes successive calore Solis potiantur, ne, si motus hic non esset, alterum Terrae hemisphaerium uratur, alterum perpetuo gelu rigeat: quare perabsurdum esset, immensam molem coeli propter exiguam pilulae figuram immensum iter peragere, cujus nullibi in toto mundo usus esset, nisi in Terra; 7) motus aquarum oceanii, ubi non impeditur terris oppositis, ab ortu in occasum ab omnibus nautis observatus est; causa quidem hujus motus eadem est, quae fluxus et refluxus marium, Luna, sed aliae huius accedentes circumstantiae videntur adungere Lunae etiam inertiam naturalem aquarum ad motum, resistantium in occidente, eum Terra se subducit in orientem.* His argumentis immiscet Keplerus declarationem, qualis sit hic Terrae motus, comparans eum motui turbine pnerorum; axem motus in una qualibet revolutione diurna immobilem manere, sed post permultas revolutiones nonnihil inclinari. Querenti causam, cur Terra volutionem suam semper invariata retinet, exemplo ponit itidem turbine, qui semel impetu concepto plurimas faciat gyrationes materiali inertia adjunctus et languescente paulatim motu, inaequali tabulae planitie et occurso aeris impeditus, tandem cecidat: Terrae vero gyrationem non impediri ulli asperitate et densitate aetherae, ullo pondere vel gravitate interna. Species hujus motus, Terrae a Deo creatore implantata, acrius in Terrae sese corpus insinnavit, non jam hospes amplius in Terra, sed inquilina plane seu materiae suae victrix et domitrix existens. Hinc species in „fibras“ Terrae rectilineas, xli paralelas eumque circulariter circumstantes transit, illaeque agunt in corpus suum nequo ac fibrae magneticae in ferrum, illud trahentes vel repellentes. Hic etiam locum invenit Keplerus sententiae suae de „anima Telluris,“ quam definit et defendit rationibus iisdem, quae passim in prioribus oporibus occurrunt. Denique refellit ea, quae Terram voluturi negant, ut: visum testari, montes versus stellas ascendere; gravia, sursum projecta, non recidere posse concessa motu Terrae in pristinum locum; argumentum Tychoonis n globis bombardicis desumptum (cfr. lib. 458); nubium et avium motus Terrae motui non contrarios; quietem incredibilem in superficie Terrae motae; corpora gravia non desiliencia n Terra; auctoritates omnium seculorum, quae Terram voluturi negent.

Liber secundus. De sphaera et circulis ejus. Omnis hic liber versatur in definitionibus. Primum agit de sphaera materiali ejusque circulis: horizonte, meridiano, nequatore, zodiaco, celiptica, tropicis, polaribus et eoluris. Explicatur cujnavis circuli usus in coelo, et unde nomen suum acceperit, sic circulorum poli et rectae in illis ductae in peculiarem usum etc. Deinde differentiae horum circulorum enumerantur quoad subiectum, i. e. num eorum usus sit in Terra an in coelo, quoad ortum, quantitatem (pneucia hic dicit Keplerus triangula sphaerica et lineas trigonometricas), situm ad primum motum, tandem quoad motum. Tertio tradit Keplerus divisionem circulorum geometricae, eandemque astronomicam zodiaci in 12 signa, et astrologicam in triangula etc. Quarto agit Keplerus in hoc libro de ventorum plagis, enarrans nomina ventorum cum veteribus usitata tum a recentioribus usurpata, in

quem finem nomina ventorum tabula comparat, in qua denominantur lingua Germanica, Italica, Latina (vctusta et moderna) et Graeca. Quinto traduntur nomina et usus aliorum circulorum, quam sunt illi numero I. definiti, ut: paralleli, circuli declinationum, verticales, circuli positionum (astrol.). Concludit hunc librum explicans circulos, quibus utuntur „gnomonici“.

Liber tertius. De doctrina primi motus, quam dicunt, sphaerica. Causae, earum primus (diurnus) motus praemittatur motibus secundis (planetarum propriis), hae enumerantur: ille motus sensui hominum obuius est et vitae rationibus magis respondens, hi vero sunt occultiores, tardiores et a sensu remotiores; deinde primus motus sphaera tantummodo materiali indiget possetque vel in ipso coelo monstrari sine instrumento, secundi motus tabula plura indigent, et ea, quae in hac plana tabula demonstrantur, difficulter applicantur coelo ipsi, nisi prius perceptus sit primus motus. His praemissis enumerantur partes, in quas dividitur liber tertius, eaeque sunt quinque. *Pars I.* De ortu et occasu siderum. Hi differunt secundum positum horizontis, quare distinguuntur sphaera recta, obliqua et parallela, et in singulis his ortus occasusque siderum demonstrantur earumque varietates proponuntur, voces altitudo poli, aequatoris et stellae meridiana explicantur. Hic iterum locus datur demonstrationi quarundam operationum in gnomonicis numerisque explicatur. Altitudinem poli affirmat Keplerus semper eandem manere, contra aliorum opinionem, deinde docet, quomodo metienda sit altitudo stellae seu distantia ejus a vertice, quibus mediis iuveniat linea meridiana, declinatio stellae, angulus ad polum, h. e. angulus inter meridianum et circulum declinationis stellae, angulus inter verticalem et circulum declinationis, amplitudo ortiva, demonstratione semper numeris explicata. *Pars II.* De ascensionibus et descensionibus punctorum eclipticae. Data maxima declinatione eclipticae ab aequatore (quae est mensura anguli, quo se secant aequator et ecliptica) investigari potest declinatio cuiusque puncti eclipticae (calculus). Maxima declinatio variis temporibus variat (a $23^{\circ} 30\frac{1}{4}'$ ad $23^{\circ} 35'$); causa altera hujus variationis est variatio inclinationis axis Terrae, altera refractio. Definitio ascensionum et descensionum; rectae ascensiones quidem eveniunt in sphaera recta, obliquae in obliqua; sed ille arcus eclipticae dicitur recto oriri, cum quo ascendit arcus aequatoris major se ipso, ille oblique, cum quo minor. Modus computandi ascensionem rectam arcus eclipticae, datis angulo inter aequatorem et circulum declinationis (= R), maxima declinatione et arcu eclipticae proposito. Comparatio asc. rectarum cum descensionibus etc. Definitio differentiae ascensionalis; de asc. obliquis; de angulo, quo secant ecliptica horizontem. Tabulae. *Pars tertia.* De anno. Quo differant annus politicus, astronomicus sidereus et tropicus; de diebus naturalibus: dies naturalis paulo longior est integra revolutio Terrae, differentia haec denominatur „additamentum“, qui est arcus aequatoris, quem Sol in uno die naturali conficit in ecliptica. Haec additamenta sunt inaequalia duabus de causis, altera, quod motus Solis in ecliptica inaequalis est, altera, quod ascensiones rectae aequalium arcuum in ecliptica in diversis locis sunt inaequales. De aequatione temporis. Dierum et noctium artificialium varietas per varios sphaerae situs. Initia dierum apud varias gentes. De crepusculis et climatibus. *Pars quarta.* De temporibus anni et de zonis. Differentia umbrarum; causa numeri et latitudinis zonarum. *Pars quinta.* De apparitione et occultatione siderum per diversas anni partes. Motus acquinoctiorum. De anno sidereo in specie: quodnam sit ejus initium? Haec inquisitio ducit Keplerum ad Aegyptiorum annos calculares,

ab ortu Canis majoris ex Solis radiis incipientes, et ad denominationes imaginum (constellationum stellarum) a veteribus usurpatarum. Deinde pluribus exemplis docet inquirere longitudes et latitudes, asc. rectas et declinationes stellarum, et quid sit hic cavendum ob refractionem et parallaxin. De ortu „poëtico,“ i. e. cosmico, acronycho, heliaco; quo ordine ortus occasusque stellarum se invicem sequantur; exempla per calculum illustrata. Comparatio temporum hodiernorum cum veteribus. De antoecis, perioecis, antipodibus. De longitudinibus et distantis locorum in Terra.

Liber quartus, theoricæ doctrinæ primus: de systemate mundano. *Paræ prima*. Partes mundi præcipuæ sunt: Sol, planctæ, stellæ fixæ. Ratione lucis, caloris, loci, causa motuum planetarum Sol primas obtinet omnium mundi corporum. Argumenta pro loco Solis in centro desumuntur a dignitate corporis et Solis officio in mundo vivificandi et illuminandi; Aristotelis sententia diluitur, Copernici vero partim defenditur, partim emendatur. Comparatio ratiocinationis Copernici et veterum de ordine planetarum. Numerum planetarum putat Keplerus a primo mundi eoditu ordinatum et fixum esse per quinque corpora regularia, repetens ea, quæ prius in „Prodromo“ suo edixerat et in „Harmonia“ proportionibus harmonice stabilita censet. Eadem proportionibus et rationibus harmonice effectum esse opinatur, ut diameter Solis apparens, si Sol quam longissime a Terra recesserit, dimidium gradus, h. e. 720^{as} partem circuli occupet, cum hic numerus minimus sit ad constituendum systema diapason duplex, h. e. mollis et duri, ad quod systema demonstrasse se putat in Harmonia metus harmonicos planetarum excreeri. His præmissis addit Keplerus dimensionem corporum eorumque distantiarum. Assumpta Solis semidiametro visibili $15'$, prodit distantia Terræ a Sole =

$\frac{1}{\frac{1}{2} 15'} = 229,18$ Solis semidiametrorum. Deinde præsupponens proportionem: corpora Terræ et Solis esso ad invicem ut semidiametrum Terræ ad distantiam corporum, iterum rationibus suis ianixus harmoniarum et posita semidiametro Solis = 1, eandem Terræ = r , et cum sint corpora globorum ut cubi semidiametrorum, prodit ex proportionem $1 : r^3 = 229,18 : r$, $r =$

$\sqrt[3]{\frac{1}{229,18}} = 0,06606$, quare Solis semidiameter continebit Terrenam „quindicies paulo plus,“ et corpus Solis corpus Terræ 3469 vicies circiter. Veteres distantie Solis tribuerunt 1200 semid. Terræ, quare Sol debuit facere parallaxin $3'$, unde Braheus ratiocinatus est, Martis parallaxin debere observari multo maiorem tribus minutis. Ipse vero Keplerus observavit, parallaxin Martis non esse sensibilem (cfr. vol. III. p. 219), quare veterum de distantia Solis opinionem falsam pronunciat. Deinde ex analogia concluditur, corpus Terræ continere corpus Lunæ toties, quoties semid. Terræ contineatur in distantia Lunæ a Terra. Posita Lunæ semid. = 1, intervallo inter Solem et Terram = 229,18, erit $1 : r^3 = r : 229,18$; $r = \sqrt[3]{229,18} = 3,8908$; $229,18 : 3,8908 = 59$, et $3,8908^3 : 1 = 58,8$. Vel sic: $\sqrt[3]{3469 \frac{1}{3}} = 58,898$ ex „concluso“ priori. Hinc prodit proportio corporum Solis et Lunæ = 200000 : 1.

De planetis ceteris censet Keplerus, corpora planetarum ita se habere ut illorum sphaeras, dubius vero est, utrum dimensiones corporum secundum diametros, an secundum superficies, an secundum corpulentiam in illa ratione valeant. Ipse prius superficies probaverat, admonitionibus vero Remi motus,

pro quo stent observationes, assumit corpulentias. Rationes vero „archetypales“ has producit proportiones: assumpto corpore Telluris = 1, erit $\bar{h} = 10 -$, $\bar{t} = 5 +$, $\sigma = 1\frac{1}{2}$, $\varphi = \frac{3}{4} -$, $\varphi = \frac{1}{3} +$. De corporibus planetarum haec „consentanea“ statuit: ut quodque corpus Soli vicinius sit, ita et densius esso; raritatem vero et densitatem non proportionaliter admettendam esse magnitudini corporum, sed proportionem copiae materialis esse statuendam praecise dimidiam proportionis motuum. His innixus principiis computat densitates planetarum, densitate Terrae posita = 10, has: $\bar{h} = 3,24$, $\bar{t} = 4,38$, $\sigma = 8,5$, $\varphi = 11,75$, $\varphi = 16,05$, $\odot = 18$. De ratione, quae intercedat inter distantias Solis, planetarum et fixarum, censet, diametrum „regionis mobilium“ esse medium proportionale inter semidiametrum corporis Solis et sphaeram fixarum; posita Solis semidiametro = 1, erit regionis mobilium (seu Saturni, extimi) 2000, fixarum sphaerae = 4000000. Finem facit Keplerus partis bujus primae proponendo tabulam distantiarum planetarum aenudum Ptolemaeum per Copernici correctionem, comparandoque corpora Solis, aetheris et fixarum.

Para secunda. De motu corporum mundanorum. Statim initio proponitur „Regula“ Kepleri: quadrata temporum periodicorum cubice radicata (quam rationem dicit asquialteram) esso ut semidiametros orbium planetarum. Deinde disputat Keplerus de sententia Ptolemaei et Aristotelis de motibus planetarum, illaque refutata stabilit Copernici et suam ipsius sententiam de illis motibus, hoc theorema ex physica arcessens: „naturalis inertia corporis coelestis sicut omnis materiae, ad quietem inclinans, vi quadam extrinsecae allata vincitur, ut moveatur.“ Haec vis ex Sole emanat, quod confirmatur eo, quod planetarum motus ad normam distantiarum a Sole crescit et decrescit. Praecipue vero confirmari hanc positionem censet Keplerus rotatione Solis circa axem (immobilem); hanc vim motricem, a prima creatione Soli inditam, propagari ad planetas „praesidio animae motricis“ in Sole, quae comparatur vi magneticae. Hanc vim, non plane magneticam, sed ol simillimam, propter attractionem et repulsionem, inesse putat etiam corporibus planetarum, et Solem trahendo et repellendo retinere illorum corpora retinendoque circumducere, dum se ipsum convertat. Pugnare vero inter eo potentiam Solis vectoriam et inertiam materialem planetarum: illam planetam seds sua emovere, hanc corpus suum nonnihil eripero e vinculis illis, quibus a Sole cset prehensum. Vis illa; seu anima seu species ex Solo delapsa (omnibus his utitur Keplerus vocibus, ut sensa sua explicet), semper eadem est, quare tempora periodica singulorum planetarum manent invariata; in diversis distantis augetur vel minuitur eadem ratione, qua lux augetur vel minuitur mntatis distantis rerum, in quas lux incidit; transit haec vis amplissimum aetherem, item sicut lux Solis ad nos delabitur; non impeditur corporibus interpositis, sed transit per illa, sicut vis magnetica penetrat per corpora interposita ad alia, quae prensat. Vis autem illa non soli Soli inest, eadem e Terra diffunditur in Lunam, circumducens illam circa Terram, eadem e Luna in Terram delapsa movet maria.

His propositis reddit Keplerus ad rationem, qua partis bujus secundae initium fecerat, temporum periodicorum ad orbis planetarum, causam bujus rationis demonstrans. Hinc ad motum Terrae annum transiens probat: Solem in centro mundi haerere, orbis planetarum Solem circumiro, Solis centrum commune esse nodum seu centrum systematum omnium planetarum primariorum, ibique locum invenit, comparandi inter se varias variorum de mundo

hypotheses. Revolutionem Terrae diurnam circa suum axem astruens, verisimile esse censet, reliquos quoque planetas converti circa suos axes. Terrae „gyrationis“ causa partim in ipsa Telluro quaerenda est, partim in Sole. Terra, vi motrice interna impulsam, annuo spatio solas 360 revolutiones faceret, qui numerus archetypalis est et rationibus harmonicis conjunctus, reliquae $5\frac{1}{4}$ revolutiones accedunt propter adjumentum ex Sole. Hoc incitamentum a Sole veniens verisimile est fieri mediante Solis luminie, quod Telluri infunditur, per illuminationem hemisphaerii ejus: physica aequatio temporis postulat inaequales Terrae revolutiones diurnas; illuminatio vero Terrae fortis vel debilis est in intervallorum proportionem, quare copia luminis semper varians apta est ad dispensandam per annum hanc accelerationem, quae inter dies singulos distributa exhibet illam aequationem temporis. Revolutiones omnium planetarum primariorum sicut per „speciem“ corporis sui circumvolet! egressam, aequae ac Sol ipse, planetas secundarios (Lunas) efficiuntque, ut secundarii in eandem plagam sequantur. Ad hanc vero vim motoriam planetarum primariorum accedit vis e Sole veniens, illam in movendis secundariis adjuvans; id probatur per observationem Tychonis, quod Luna in copulis semper celerior fiat, tardior in quadris, quam fert ratio eccentrici, siue respectu distantiarum Lunae a Terra. (*variatio Tychonis*). Qua ratione et quibus de causis haec motuum Lunae inaequalitas dispenseetur explicaturus, sic exorditur Keplerus: *nulla pars physicae coelestis hac ipsa difficiatior fuit explicatu*. Quae demonstratio cum paucis nequeat proponi, lectorem ablegamus ad folia partis hujus secundae postrema, quibus demonstratio illa absolvitur.

Pars tertia. De inaequalitate motuum planetarum. Inaequalitates hae sunt partim verae, partim proveniunt ex visus fallacia; addita est veterum sententia de his inaequalitatibus et ipsius Kepleri. Terrae Gilbertus in „philosophia magnetica“ tribuit naturam magneticam: *quod igitur est unus ex primariis, Tellus nempe, id esse unumquemque primariorum, absurdum nequaquam est nec incredibile*. Comparatis planetarum corporibus cum magnetibus, quibus tribuuntur *fibrae*, quae in planetarum corporibus similiter ac in magnete distributae assumuntur, motus planetarum sic explicantur: quando fibrarum magneticarum utraque extrema aequaliter a Sole distant, tunc Sol nec expellit planetam nec allicit, promovet vero illum rotatione sui corporis et speciei emissae; hoc pacto promoti planeta, fibrarum extrema illa, quae Soli amica sunt, paulatim obvertuntur Soli: tunc globus incipit a Sole trahi et introrsum versus Solem recipitur, velut in angustiores ambitum et virtutem prensantem fortiolem; fortissima est haec virtus, si amica planetas pars tota ad Solem conversa est, id est si fibrae magneticae recta diriguntur in ipsum Solem. Hinc pergit crescere velocitas globi, quippe decrescente intervallo inter Solem et planetam; interim vero per progressum planetae mutatur situs fibrarum, quae sibi ipsas semper parallelas manent per totum circuli ambitum: amicae fibrarum partes magis magisque e Solis conspectu veniunt, inimicae illi obvertuntur, donec, dimidia circuitus parte peracta, idem situs fibrarum existit, qui initio motus. Tunc cessat iterum omnis fibrarum attractus et planeta est Soli vicinissimus, quare celerissimus, quippe virtuti motrici Solis proximus. Statim autem globus praetervectus hunc locum, fibrarum partes discordes versus Solem dirigi incipiunt, quare planeta a Sole recedere incipit et eam ob causam, lentius incedere incipit, donec in medio secundi semicirculi in media consistit distantia a Sole, dum totum globi hemisphaerium inimicum versus Solem dirigitur, et mediocri celeritate progreditur. Jam vero, ultra

profecto plaueta, iterum incipiunt partes inimicae recedere, amicae annuere ad Solem, quare remittit illa expulsio, donec penitus evanescat, quando plaueta ad eundem locum pervenerit, in quo initio fuerat. — Tempora, quae consumit planeta in utroque semicirculo orbitae suae, aequalia sunt; fibrae perfecte restituuntur post reditus integros peractos. — Planum, quod describunt planetae, ad planum eclipticae inclinatum est inclinatione constanti et invariabili; linea, qua se secant mutuo haec plana, per centrum Solis transit et unicuique planetae est propria, sic etiam inclinatio planetae cujuscunque ad eclipticam est cuique propria. — Motus Lunae similis est motibus planetarum; cum autem motus Lunae derivetur a rotatione diurna Terrae et a rotatione Solis, deprehenditur duplex Lunae intentio et remissio motus medii in contrariis periodi momentis. *Fibrae* Lunae magneticae in duobus oppositis periodi temporibus non recta diriguntur versus Terram; sufficit, ut his momentis saltem inclinatae sint alternis plagis versus Terram et eorum status toto circuitu maneat parallelus: quamvis Luna semper eandem faciem ad Terram convertere videatur, tamen fieri potest, ut mutatio aliqua in Lunae corpore eveniat, quam visus nostri inbecillitate non deprehendimus, qua in marginibus globi Lunaris particulae aliquae se conspiciendas exhibeant, quae alio tempore non videantur. Deinde non plane rejicienda est suspicio de globo intra Lunae globum, qui conversas alternis plagas ad Terram tendit, quo idem vel simile quid efficeretur, quod in reliquis planetis. Ceterum in motibus Lunae multa adhuc sunt dubia et difficillima explicatu, ita ut is, qui causas harum rerum tales attulerit, ut ex his sequatur quantitas et proportio motuum apsidum et limitum Lunae, currum circa metam agat.

Liber quintus. De circulis planetarum eccentricis, seu theoriis plauetarum. Ex principiis physice motuum, demonstratis libro IV. rationibus et experimentis, formantur in hoc libro V. figurae orbitarum planetarum. *Paras prima.* Figura eccentrici. Permixtione facultatum corporis planetae et virtutis motricis Solis fit, ut planeta describat orbitam ad eclipticam obliquam, non perfecte circularem, sed ellipticam, in cuius altero foco Sol resideat. — Modulum virium ad librandum planetam (causa accessus et recessus planetae a Sole) metitur: 1) distantia arcus a Sole, 2) quantitas huius arcus, 3) tempus, quod planeta consumit, dum versatur in illo arcu: Ad mensuram portionis, quam de modulo Solarium virium admittit in se planeta in quovis situ suo ad Solem, attendendus est angulus, quem Solis radii faciunt cum fibris globi planetarum magneticis; huius anguli sinus complementi metitur hanc virium proportionem admissam (librationem a Keplero dictam). Comparatis his cum legibus librae, pergit Keplerus: sicut se habet semidiameter orbitae ad eccentricitatem, sic se habet sinus versus cuiusque arcus ab apside incipiens ad partem librationis, quae conficitur, dum planeta percurrit arcum illum; orbitam planetae, quae ex his librationibus nascatur, ellipticam esse debere, geometricè demonstrat. Cum sint morae planetarum in arcibus aequalibus sicut distantiae arcuum a fonte motus, hac vero sicut triangula, quorum bases sunt illi arcus, latera vero lineae a foco in extrema arcuum ductae, quare morae se habent sicut areae horum triangulorum. In computatione temporis facilius redditur calculus usurpatione plani circularis loco elliptici. Partem primam his concludit Keplerus: *Haec scripta sunt geometris acri ingenio praeditis, qui nihil in calculum recipere dignantur, quod non sit demonstratione accuratissima munitum exque ipsis principiis motuum naturalibus deductum.*

Pars altera. De terminis astronomicis et calculo, ex orbita eccentrica orientibus. Retinetur vox „eccentricus“ pro ellipsi, linea apsidum pro longiori diametro ellipsis; differentia inter distantiam (longitudinem) mediam et quaecunque aliam (a centro Solis) dicitur libratio planetae. Arcus elliptici quantitas defuitur quantitate arcus circuli circumscripti, intercepti inter aphelium et perpendicularem in lineam apsidum (sivus arcuum circuli sive „ordinatim applicatae“ ad axem ellipsis). Definitio „anomaliae“ mediae, eccentrici, coaequatae: anomalia media est spatium temporis, quod planeta consumit in quolibet arcu suae orbitae, ab apside incepto, redactum in gradus et minuta; anomalia (sc. motus) eccentrici est arcus circuli eccentrici inter lineam apsidum et perpendicularem illi per corpus planetae; anomalia coaequata est arcus circuli magni in latitudine zodiaci, per continuationem plani orbitae planetariae designati, ab apside ad locum planetae, vel angulus, quem lineae ab his punctis ad Solem ductae formant; his additur ratio, qua hic angulus computatur. Locus eccentricus est punctum in zodiaco, in quod incidit recta ex Sole per planetam ducta. Aequatio vel prosthaphaeresis est differentia anomaliae mediae et coaequatae, in gradibus et minutis proposita; aequationis sunt partes duae, altera ab inaequalitate, quae vere planetae motui accidit, ob causas physicas — physica —, altera ab inaequalitate apparente, propter diversam distantiam a Sole — optica. — Finem libri quinti facit Keplerus, explicans inclinationem orbitae planetariae ad eclipticam, et motum apsidum et nodorum.

Liber sextus. De apparentibus motibus planetarum. *Pars prima:* De motu Solis. Hunc motum apparentem inaequalem esse, testantur observationes; causa hujus inaequalitatis est inaequalis Terrae a Sole distantia, quod ad oculum potest ostendi, cum Solis diametrum aestate appareat minor, quam hieme: linea ergo perpendicularis per centrum Solis ad lineam apsidum dividit orbitam Terrae in partes inaequales, et Terra in majori parte diutius versatur, quam in minore; cum ob id ipsum, quia major est, tum quia Terra remotior est a Sole, forte motus. Terra movetur circa Solem in eandem plagam, in quam et ceteri planetae, quae orientis plaga dicitur, diebus 365 h. 6. 9' 26" 43 1/4 sub fixis (secundum Tychonem). Eccentricitas Telluris e Tycho nis computo ponitur = 1795 (1800; cfr. Progn. I. 821), qualium media distantia Terrae a Sole = 100000. Ex rationibus harmonicis eccentricitas

Keplero paulo major prodit: $\frac{5}{8} : \frac{243}{256} = \frac{1250}{1944} : \frac{3}{5} : \frac{1250}{1944} = \frac{2916}{3125}$; $\sqrt{\frac{2916}{3125}}$ = $\frac{54}{56}$; medium arithmeticum inter 54 et 56 est 55, quare eccentricitas pro-
dit proportionem 55 : 1 = 1 : 0,01818. Tycho hanc eccentricitatem compu-
tavit ex Solis observationibus et differentia longitudinum aestatis et hiemis;
subtilior est ratio per Solis diametrum, hieme majorem quam aestate, certis-
sima vero ex ternis observationibus cujuslibet planetae (cfr. Vol. III. p. 276 ff.).
Eccentricitatem Terrae constantem esse valde probabile est, contra aphelium
in consequentia signorum aequabilissime transfertur. His praemissis ea, quae
libro V. de aequationibus et anomalis planetarum dicta sunt, ad Solem ap-
plicantur et numeris certis demonstrantur.

Pars secunda. De planetis superioribus. Ad demonstrandos motus ho-
rum planetarum (sicut etiam inferiorum) una tantum „theoria“ opus est, quia
illorum motus sunt simillimi, et visus fallaciae, quae in eorum unequalibet
contingunt, ex Terrae orbita omnibus communi oriuntur. Motus horum pla-

netarum eccentrici, libro V. descripti, concordant cum observationibus tantummodo in punctis verarum oppositionum cuiusque cum Sole, in locis aliis ab illis discrepant et inaequales sunt, ita ut alio tempore veloces, alio tardi, alio retrogradi, alio denique stationarii cernantur. Causis harum irregularitatum per figuram explicatis additae sunt tabulae periodicorum motuum et proportionum orbium, loca apbelliorum in ecliptica eorumque motus. Jam adit Keplerus parallaxes orbium, latitudines planetarum, distinguens inter latitudinem et „inclinationem“ et finit hanc partem demonstrans, qua ratione invenitur latitudo, et quanta sint latitudines planetarum superiorum maximae.

Pars tertia. De planetis inferioribus. Causae enumerantur, eae hi a superioribus separati considerentur, dein motus apparentes recensentur et qua ratione a motibus apparentibus ad motus veros deveniant. Argumentum, quo probatur, planetas hos circa Solem in gyrum ire, e phasibus Veneris desumitur. De locis apbelliorum eorumque motu. Keplerus recensens distantias a Sole secundum Copernicum causas addit, quibus ille motus unico planetarum orbi alios superaddiderit. Causae stationum et retrogradationum planetarum inferiorum eadem ratione et figura, qua in superioribus traduntur, loca nodorum, quantitates latitudinum finem faciunt partis tertiae.

Pars quarta. De Luna. Lunae motus inaequales quidem sunt, ut motus planetarum primariorum, causae vero harum inaequalitatum in Luna non plane eadem sunt quae in planetis, cum illae, quae per motum Terrae planetis accedunt, in Luna, quae eundem cum Terra motum habet, evanescent; quare motus Lunae semper est directus, nec unquam videtur stationarius. Causae inaequalitatum Lunae sunt: eccentricitas orbis Lunariorum, virtus Terrae Lunam diversimode moveus, vis e Sole prodiens (Lumen Solare dicit Keplerus); his accedunt temporis aequatio et parallaxis diurna. His Lunae inaequalitatibus haec dantur nomina: inaequalitas soluta, suam propriam observationis periodum (periodica), et mensura, ad mensium phases seu ad configurationes Solis, Terrae et Lunae alligata (synodica); mensurae inaequalitates iterum subdividuntur in temporaneas et perpetuas (variatio a Tyohone dicta est inaequalitas perpetua). Has inaequalitates singulas Keplerus pluribus inquiri, hinc transit ad latitudinem Lunae mensuram et ultimo loco suas hypotheses de Luna cum Brabeanis comparat; porum quidem utramque differre contendit in calculo longitudinalis et latitudinis Lunae, nec multo plus in intervallis Lunae, plurimum vero in forma motuum.

Pars quinta. De communibus affectionibus planetarum. Praemissa est tabella synoptica passionum planetarum. Hanc secutus tabellam ordine suo considerat varias planetarum affectiones seu passionem. 1) Omnibus communiter accidit, ut sint tardi vel veloces; aucti vel minuti numero. 2) Cum Sole comparati sunt omnes planetae vel orientales vel occidentales, pro diversitate situm ad Solem diversum praebent aspectum, diversos ortus et occasus sortiuntur. (Hic de illuminatione Lunae, de ejus lumine, de regula Pithagorae, horam noctis e facie Lunae constituendi). 3) Planetarum inter se comparati locum praebent speculationibus astrologicis et theoriae harmoniarum. Recensentur varii aspectus planetarum, praemissa definitione aspectuum, et patet significationes illorum astrologica ratione traduntur. 4) Cum motus Lunae ejusque phasae facillime observentur et cognoscantur, Luna a plurimis gentibus ad temporum constitutionem adhibetur; hinc anni Linares politici orti sunt, qui sunt soluti duodenum perpetuo mensum, et ligati, sc. ad Solarem

anum, qui mensibus utuntur intercalariis. His accedunt quaedam ad Calendarium usum pertinentia, ut aureus numerus et cyclus Lunae. 5) De conjunctionibus planetarum Martis, Jovis et Saturni, quae dicuntur *mognae*. 6) Theoria eclipsium Lunae et Solis. (Pars libri, quem inscripsit Keplerus „Hipparchum.“ Cfr. Vol. III. p. 520 ss.) Pauca adduntur de iucursu Veneris et Mercurii sub Solem. 7) De motibus planetarum harmonicis; summa libri: Harmonia Mnudi.

Liber septimus. De motu nonae et octavae sphaerae vel fixarum. Terrae insunt tres motus: centri circa Solem, axis inclinatio secularis et motus diurnus, quorum secundus argumentum est hujus libri. Haec inclinatio deduci potest vel a facilitate animali, quae globum Terrae circa suum axem torquet, vel a concursu causarum physicarum cum extranearum (v. c. Sol movens), tum internarum (v. c. dispositio fibrarum corporis Terrae):

Si axem, circa quem turbinatur corpus Solis, continuaveris ad fixas, signantur duo poli, circa quos ellipticae poli moventur in duobus circellis; hoc motu efficitur libratio axis Telluris, variata fixarum latitudo et praecessio aequinoctiorum (cfr. Vol. III. p. 426 ff.). Haec pluribus explicans, observationes et hypotheses veterum cum recentioribus comparans numerisque demonstrare conatus, his tamen finem facit hujus disputationis et libri sui: *haec nequaquam sufficiunt ad universalem astronomiam condendam, haec latent in pandectis aevi sequentis, non antea discenda, quam librum hunc Deus recluserit hominibus.*

Ille, quibus qua potuimus diligentia et simul brevitate summam libri sequentis proposuimus, eodem qua prius ratione addimus ea, quae de tempore, quo conscripsit Keplerus hunc librum, et de studiis, quae praecesserunt librum conscriptum, innotuerunt, nec non ea, quae cum amicis per litteras egit, dum in mente agitata Epitomen Keplerus, vel perfectum opus amicis tradidit.

De tempore, quo incepit Keplerus hoc opus, neque in epistolis neque in manuscriptis certi quidquam deprehendimus. Maestlinus, quem Keplerus, nova vel insolita conscripturus, semper literis adteret, consilia et adjumenta a praceptoris petens, ab anno 1614 ad 1616 nihil plane Keplero petenti severipit, quare non mirum, illum sequiorem fuisse in scribendis epistolis ad vtrum nimis taciturnum; literarum commercium cum Herwarto et Davide Fabricio illo tempore intermissum est; epistolae denique Kepleri ad alios, quos in locum eorum, quos diximus, suffecit, maxima ex parte perierunt. Primam mentionem facit Keplerus operis huius ad Maestlinum datis:

S. P. D.

Clarissime viri Diu jam intermisso luter nos scribendi officio, sese offert lator praesentium, M. Johannes Straus Dantiscanus, qui aliquamdiu collegam hic egit in schola provinciali, mathematicum amans et calculi peritus; etsi quamdiu hic fuit, parum me juvare potuit. El rogo consilio atque ope adsis ad studia mathematica continuanda. Consilium cepit laudabile, siquidem expedita res sit, abundi Indias ibique observandi eclipses et fixas meridianales. De meis studiis scribam nonnulla. Superiori anno Stereometriam egi, ut materia populari typographum, qui tum huc venerat, juvarem, ne ex aula Caesarea resisteretur ejus arti hic instituendae Scripseram ante sesquiannum ad 6 paginas cum typum incepti, verum adeo mihi non satisfacerunt illa, ut novem, pro dolo, integros menses consumserim, augendis, germanice vortendis, emendando typo, delineandis rudibus licet schematicis.

Anno 1614, per aestatem successit in Veneris theoria, anno 1615, hieme in Mercurio; nihil habent prae β , γ , δ peculiare; omnia efficio orbe magno

Telluris et simplici eccentrico, qualem habeo in Marte. Adorno nunc Epitomes Astronomiae Copernicanae editionem, sed dum ad Lunam venio, plus invenio laborum quam unquam, cum tamen potissima a Tycho Brahe sint absoluta. Illa levia sunt, quod diametri luminis et umbrae apud ipsum non correspondent, major est cura aequationis temporis et illius inaequalitatis, quam variationem dixit. Nam quo plures ejus examino observationes, hoc minus Tychonica variatio respondet observatis, adeo ut ad 12, 13, 14, 15 minuta dissideat. In his adhuc haereo. In ceteris sic se res habet: Luna est quasi duplex corpus habetque duplicem theoriam physicam. Nam in quantum Luna est globus integer, habet sua filamenta magnetica, quibus efficitur ejus motus eccentricus a Terra, aequatio hinc est copularum graduum 5; latitudo graduum itidem 5. In quantum vero Luna ex dimidio est illuminata, ut et Terra, nanciscitur virtutem aliam temporaneam et impraegnatur illuminatio ab apogaeo aut perigaeo, boreo vel austrino limite prius dicto, ut et a motu ejus medio, sic ut crescentis semicirculus apogaeitatem ei conciliet vel borealitatem, si apogaeum vel boreus limes est in crescente semicirculo; perigaeitatem vel meridionalitatem, si perigaeum vel meridionalis limes et vicissim. Verbi causa, Luna lege simplicis copularum theoriae in nodo versans tamen est borealis, si boreus limes est in eodem cum illa semicirculo crescente vel decrecente; et in apogaeo versans, tamen habet aequationem, si apogaeum ejus est in eodem semicirculo. Itaque semper hujus secundae theoriae apogaeum et nodus conjuncta sunt cum Sole vel ejus opposito, nec transeunt a Sole ad oppositum, sed extinguuntur in uno per transitum primi apogaei in quadras, incendantur in opposito per accessum illius a quadris ad copulas. Haec exactissime conciliantur cum tabulis Tychois Lunaribus, sine solutione trianguli, per tabulam expeditam et facilem; reliqua quae sequuntur, adhuc in ipso etiam Tychoe sunt incerta, ut dixi. Nam in genere quidem haec est analogia, quod sicut primum apogaeum pro tempore exigit et augeat aut minuit et exstinguit apogaeum secundum, boreus limes primus borealitatem secundam seu menstruam, sic etiam motus medius Lunae, cum est in directum viae Telluris circa Solem, prorsum vel retrorsum, sc. cum circuli illuminationum congruunt paralleliter et uterque globus alteri vel plenus apparet vel vacuus, foeneratur aliquid adjumenti quasi ex Sole, aut ex illuminatione vel sui vel Telluris vel utriusque; cum vero est in transversum itineris Telluris, sc. circa quadras, tunc motus Lunae medius sentit impedimentum: et haec est illa Tychoi dicta variatio, quae tamen, ut supra dictum, nondum satis scrupulose cum observationibus est conciliata; variatio quidem Tychonica exacte exprimitur per ista principia, et est haec cum prioribus analogia, quod etiam hic, quamdiu Luna est in semicirculo (non crescente sed) superiori, in quo est oppositio, quia tunc pergit viam Telluris, facit etiam adjumentum hoc promovere Lunam secundum viam Telluris; cum vero Luna per inferiorem semicirculum copulare transit, etiam tunc movetur viam Telluri contrariam, facit tamen etiam adjumentum hoc promovere viam Telluri contrariam.

Haec in praesens scribere volui. Tu quo loco sint chronologica tua scribe. Mitto men, remitte illa, quando legeris, Strassius occasiones indicabit. Vale. 5. Maji 1616. Lucii. Cl. D. T.

Observantissimus

J. Kepler.

Merstellius ad haec more consueto non respondit, quare Keplerus post 4 menses haec prioribus addit:

Clarissime Vir, Praeceptor colende.

Straussium ad vos pervenisse gaudeo; qui quia aberat Tubinga, quo tempore tabellarius iste apud vos transit, nondum igitur certior sum factus, an tibi reddita sint meae schedae chronographicae. Reddes igitur vel nunc me securum, et si placet remittes. Sin autem Straussius noster laborem non fugit et si ad manus diutius illas retinere cupis, copiam illi facio describendi pro te unum exemplum. Adorno Epitomen Astronomiae Copernicanae; plurimum negotii mihi exhibuit Luna, cujus omnes varietates ad causas physicas traduxi; ut igitur certus essem de consensu cum Tychone in effectis, scribenda fuit Ephemeris, sed illa, Hercules, sine sufficientibus tabulis, sine deductione seu expansione. O duram provinciam! Absolvi Lunam, restant quinqué planctae. Martis quidem motus intra 8 horas, si annitar, possum conficere, Saturnus et Jupiter parvum eccentrici arcum nno anno conficiunt, in Venere et Mercurio potissimum erit labor, nondum enim sunt absolutae tabulae, agendum per triangula. Et in motu commutationis Veneris etiamnum super aliquot scrupulis dubito. Rogo majorem in modum, certiore me facias, si Tubingae reperiatur aliquis calculi peritus, qui ad me concedere velit per aliquod tempus vel pro communicatione attis vel pro stipendio.

Tabellarium ad D. D. Besoldum et Straussium ablega, et quia tarde revertitur tabellarius Tubingam, rogo apud D. Besoldum instes, ut literas meas cum suis (in causa forensi) per celeres ad me, vel qua via brevissima potest, transmittat. Nescio etiam an Tappacius Frankofurti anni exitu impressurus sit Ephemerida; quæro ex te, si in eum eventum vester typographus operam collocare et sumtus facere velit.

Vale, cum tuis Deo commendatus. Lincii 5. Sept. 1616.

Excell. Tuae

Officiosissimus

J. Kepler.

J. Straussius, quem dicit Keplerus „latorem“ epistolae, Dantisci praepetore unus est Crügero (cfr. vol. II. p. 400). Lincium transit anno 1615. Quo statim res Stronae posthac sderint, ex his Crügeri verbis elucet: Intermittere non possum, quin quæram, an ignota tibi sit Straussii, qui olim meique domesticis condito? Vivit is Regiomonti, professor mathematicum publicus. Nihilne ab eo tempore (jamque biennium id munus gessit) tibi literarum ab homine? Ita sane conjicio, cum dicas, me solum in Bornata ex amica superesse. Sane ego ipsi vicinior sum, sed literas ad me dat via antiqua. Tunc jungit Avau pidi ihm die Xctbr. Uxorem n. fluxit mense Julio anni 1622, neque dum suscepit sobolem. (Ex literis d. 26. Sept. 1623.) Postea (15. Jul. 1624) Keplerus, qui Strausio salutem miserat per Crügerum, haec Crügerus de illo nunciat: Straussium tuo nomine salutavi. Sperabam ab eo responsum vel ad me vel ad te, sed nihil rescripsit. Hunc morem a suscepta professione academica suscepit, ad literas complures vix unis respondere. Magna spe, quam primum de homine mathematicis ab te erudito jamque in vicinia mihi locato concepi, me deiecit, colloquia mathematica toties oblata quasi avertens, ac rei mercatoriae, ut fertur, et braxatoriae unice intentus. Haec Crügerus; Arnoldus (Historie der Königsbergischen Universität) refert, Straussium edidisse librum de architectonica, et dissertationes de refractionibus astronomica et de eclipsibus Solaribus, mortuum esse anno 1630. Insuper in Haenschii epistolarum collectione duae epistolae Straussii ad Keplerum Tubinga datae, nulla vero Kepleri ad Straussium superest.

Quam dicit Keplerus in posterioribus literis „causam forensam“, ille est, quae de matre agebatur, accusata criminis veneficii, quamque in vita Kepleri pluribus diceamus.

Maestlinus ad praemissas Kepleri epistolas haec respondit: Chronologica te accepi et avidum cum voluntate legi. Sunt tamen in eis nonnulli, de quibus monere te volui. Ea vero a me quidem in schedas conjecta sunt majori parte, nondum autem descripta nec jam descripti potuerunt. Sed proxima data occasione omnia simul mittam.

Epitomen astronomiae Copernicanae te adornare mihi placet; verum cauto agendum puto, praesertim propter eos, qui pro hypothesebus usitatissimis defendendis nimiam laborant. Sed eis haud difficile occurri potest. — De Luna quae scribis, te omnes ejus varietates ad causas physicas traduisse, hoc non plane intelligo. Existimo autem hic a causis physicis abstinendum esse et astronomica astronomice per causas et hypotheses astronomicas, non physicas, esse tractanda. Calculus enim fundamenta astronomica ex geometria et arithmetica, suis videlicet aliis, postulat, non conjecturas physicas, quae lectorem magis perturbant, quam informant. Sed non dubito, quin pro tua prudentia etiam huic dubitationi occurrere valeas.

Studiosum quendam, qui tibi adesse possit in opere calculi, quaeris; utinam tibi satisfaceri per nostros posset, verum extraneorum (h. s. extra illustri stipendio) pauci sunt atque num aliquis eorum in calculo promptus sit, nescio. Qui in illustri stipendio degunt, plures huic studio nonnisi coacti operam dant, ad gradum magisterii tantum aspirant, ut conditiones assequantur. (Straussius in epistolarum priorum, quas supra diximus, haec de studiis mathematicis Tubingae Keplero refert: studia mathematica hic plane tenebris obruta jacent, quod non putassem. Studiosi fere omnes ad pulpita ecclesiastica properant. D. M. Maestlinus legit arithmeticae praetium et primum Euclidis librum. Quodsi tua Astronomia fuerit prolo descripta, quaeso Tua Excellentia mihi unum exemplar mittat assignato pretio.) Da ipso hoc Straussio Maestlinus haec praemisit addit: Dominus Straussius apud nos nuper gradum magisterii cum laude consecutus est. Tertius erat inter 12 candidatos; meritis quidam fuerit alterutrum ex prioribus locis, sed parcendum ipsi fuit, partim propter majores sanctus (quos duo primi, ut nosti, deponere debent), partim propter plures alios labores, qui iisdem duobus primis, tanquam reliquorum quasi ministris, in invitandis hospitibus, in colligendis et exponendis sumptibus omnibus et observandis aliis ceremoniis etc. incumbunt, quae omnia ipsi, tanquam peregrino et qui nuperrime adventit, ignota fuissent. Sed illud compensatum fuit in loco tertio, qui habetur alloqui locus eruditioris.

Eclipsin proximam Lunae spero te quoque observasse (cfr. Vol. III. p. 724). Caelum apud nos fuit purissimum. Quomodo observaverim, scheda haec indicabit (cfr. Haensch. p. 48). Postremo hoc etiam indicandum puto: D. D. Köstlinus nuper oblit etc. (cfr. Vol. I. p. 498). Vale optima et feliciter. Tubingae festinae calamo dis S. Matthaei 21. Sept. et. v. 1616.

Kepleri responsum ex parte exhibuimus Vol. II. p. 31 ss., quae ex illa huc pertinent, haec sunt:

Venio ad *Epitomen Astronomiae Copernicanae*: in ea ultra tertiam paginam typi non processerunt, deest nobis sculptor lignarius. Itaque rogo vehementer, vel commodos vel vendas mihi typos ligneos Epitomes tuae, utrumque dicto pretio, habet enim in mandatis tabellarius, eos Ulmam portandi, unde facile secundo Danubio ad me deferentur. Interim circumspicio etiam sculptorem. Nota in margine: Quia non multo tabellarium, rogo, si consentia in mutuo dandos ligneos typos, ut illos opera alicujus (puto idoneos pharmacopaeos aut typographos esse) Ulmam ad Neuproneros mittas, qui ad me curabunt deferri.

De causis physicis salva res est, quicquid de his disputo, id inter principia refertur, ut eum tu de loco Telluris et similibus. Interim quae ego ex physica usurpo, possunt ab alio haberi pro hypothesis ficta, utrique crit astronomica hypothesis, quia praebet se calculo et docet computare loca planetarum non minus, quam circuli. Verbi causa, verum iter Martis circa Solem certissimis demonstrationibus evicimus, tam ego, quam Fabricius (cfr. Vol. III. p. 95), esse viam ovalem et ingredi Martem in longitudinibus mediis versus Solem quantitate sinus versi aequationis eccentricae opticae, sinus, inquam, versi ejus arcus, cujus est eccentricitas sinus reetus. Hic Fabricius ad deluxum planetae ex aphelio luxat centrum eccentrici, faciens illud librari versus longitudinem mediam secundam, et dum Mars a long. media prima per perihelium it in long. mediam secundam, ipse facit centrum reverti per eadem librationis vestigia versus long. mediam primam. Nec id facit siue lucro. Nam ejiciens rectam ex Sole per centrum libratile, designat aphelium ipsum quoque

libratile vagum, in antecedentia longiori tempore repedans, quàm in consequentia, tardum, cum est planeta in long. medin, velox, cum in apsidum linea, a quo computat motum Martis in eccentrico aequalem. Hoc pacto salvat circulum veterum aequantem. Est hypothesis astronomica, fateor, at non est physica multis nominibus, quia nec vera est, nec ipse auctor veram credit. Ego vero, si minus veram, saltem mea opinione veram trado causam, quae multo minus habet absurditatis in computando compendii vel plus vel minus tantundem. Dico enim, librari planetam in linea recta versus Solem appetentia magnetica, quae in diversis librarum inclinationibus sit diversae fortitudinis; metior hanc fortitudinem per sinus, effectum per versus anomaliae eccentrici; pro ratione vero distantiarum ad Solem facio tardum vel velocem re vera. Hypothesis est physica, quia habet exempla physica magnetis, est physica, hoc est naturalis, quia vera et educta ex ipsa natura internorum corporum planetarum et Solis, est physica, quia modos omnes tenet motionum naturalium; est tamen etiam astronomica, quia compendiosissime potest computari aequantio et distantia planetarum. Posita enim anomalia eccentrici, datur mihi sinus ejus complementi vel excessus. Et ut sinus totus ad hunc, sic libratio dimidia seu eccentricitas tota ad partem librationis illie addendam, hic auferendam a semidiametro orbitae planetarum. Ecce facilem modum computandi distantiam Solis et planetarum, et tamen demonstratum est solidissime, bis librationis simplicissimae legibus effigiari orbitam ellipticam, ut non sit opus fixatione totius sphaerae Martis. Sequitur aequatio, cujus sunt duae partes, optica et physica; optica est ex eccentricitate, physica ex naturali tarditate ob distantiam a Sole auctiorem. Rursum hanc computo facillime. Nam ut est sinus anomaliae eccentrici ad totum, sic est area (sen potius valor) trianguli aequatorii ad aream (valorum) illius trianguli, quod in anomalia media stat, existens omnium maximum. Quantum autem valeat, inter initia statim computo, comparatione ejus ad aream circuli, quae si valet temporis revolutorii partes 360 omnes, facile constituitur, quot minuta et secunda valeat trianguli maximi area. Vides operationem unicam pro una parte aequationis, quae exprimit, quantum temporis sit absumtum in arcu anomaliae eccentrici (ab hoc n. incipio, non a tempore, facili cautione). Restat reliqua pars aequationis optica. Rursum hic utor sinu complementi vel excessus anomaliae eccentrici, cui addo vel detraho eccentricitatem, et ut distantia planetarum a Sole ad hanc factam, sic sinus totus ad sinum complementi vel excessus anomaliae coaequatse. (Nota in marg.: Anomalia media: tempus; anomalia eccentrici: arcus; anomalia coaequata: angulus.) Ita ex anomalia eccentrici computo mediam sursum, coaequantam deorsum, ut sciam, cui mediae quae coaequata respondeat; tribus operationibus duas res necessarias, distantiam, ob proportionem orbium, et longitudinem eccentrici sub zodineo coaequantam, ob commutationis anomaliam. Vides nihil interesse astronomiae, physica sit hypothesis, an ficta, dummodo computemus inde. Quodsi fatigandum est cerebrum perceptione fictae hypotheseos de sphaera luxatili, apogaeo vago, quin potius fatigetur perceptione hypotheseos physicae, qua ostendo, quomodo planetarum moveantur lege statae, vectis aut librae, librentur ad Solem et a Sole iage magnetis.

Eclipsis nuperae observatio mihi fuit gratissima, accipe vicissim et meam, et ἀπολαύχου; loco demonstrationum et calculi boni consule, Nondum calculum subduxi.

D. D. Röslingo, quando ita Deo visum, gratulemur aetatem exactam, quietem partam. Fundamentum ipsum tenuisse non dubito. Deus misereatur vi-

tiorum mentis etiam nostrae, qui condonat poenitentibus voluntatis pravitates; misereatur vero non tantum singularitatis, sed etiam popularitatis et fiduciae in rabbinis terrestribus.

His subiungit Keplerus quaedam de rebus ad fidem suam pertinentibus, quae ipse tantum temporis Lincii agitabant, ad vitam Kepleri referenda, et his finem facit:

Vale Clarissime Praeceptor meque amare perge. Scripsi dudum, conclusi 1^o Decembris anni 1616. Lincii.

Excell. Tuae

officiosissimus

J. Kepler.

Ad calcem epistolae Maestlini haec adscripsit Keplerus, respiciens verba Maestlini de hypothesebus astronomicis et physicis:

Astronomica hypothesis est, quicquid se praebet ad computanda loca planetarum. — Est mera fallacia in vocabulo physica. Duabus ego de causis appello hypotheses meas physicas. Prima est, haec, quod quidam asserunt, omnes omnino hypotheses astronomorum esse fictitias, nec enim ullos esse in coelo eccentricos aut epicyclos, quos posuit Ptolemaeus, nec Terram moveri, quod posuit Copernicus, sed accidere mira quadam ratione, ut talibus suppositis, licet falsis, astronomi vera inde computent loca planetarum. Ego vero affirmo, omnes astronomos aliquid veri ponere, unum plus alio; et quo plura ponantur vera, quae natura coeli pro suis agnoscit, hoc rectius procedere calculum. Itaque studeo talia solum ponere, quae ipse non dubitem esse vera realia et sic physica; intellige de natura non elementorum, sed coeli. Et cum repudio eccentricos perfectos et epicyclos, ideo repudio, quia sunt merae positiones geometricae, quorum simile aliquod corpus in coelo non est. Altera causa, cur physicas dicam hypotheses meas, est haec: astronomi statuerunt, motus orbium coelestium (qui nulli sunt) esse aequabiles simpliciter, et haec ipsa quoque suppositio est ipsorum opinio physica, pertinens vel maxime ad naturam coeli, ut illi contendunt. Nec interim perpescunt, se ipsos etiam orbes nonnullos, diversis principiis in unum compositis, movere inaequaliter. Cum ergo inaequalis motus ex coelo non penitus auferatur per suppositionem orbium, et cum sine orbium suppositione possit tradi astronomia computarique motus planetarum, si motum illorum admittamus inaequalem, regulari tamen circuitu, ego probo, hanc inaequalitatem motus esse consentaneam naturae globorum et sic physicam; probo insuper, exempla nobis in natura sublunari inque motibus mechanicis suppetere huius inaequalitatis regularis motuum coelestium et sic rursus physicam esse hanc inaequalitatem regularem. Hinc facile respondeo Maestlino. Jubet a causis physicis abstinere. Scio, quod non velit prohibere, ut ea, quae supponimus, argumentis adstruamus, hoc enim fit in omnibus libellis astronomicis, nec vult, ut nihil veri ponamus, nihil consentaneum naturae coeli, argueret enim Ptolemaeum et se ipsum; sed metuit, ut perturbem lectorem conjecturis physicis nec informem ad calculum: ideo jubet astronomica tractare astronomicc. Id facio, doceo enim computare ex hypothesebus motus.

Maestlinus ad Kepleri litteras non respondisse videtur, certe nullae supersunt utraeque epistolae usque ad annum 1620, et passim deprebedimus interiecto tempore Keplerum querentem Maestlini diuturnum silentium et amicos Tubingenses appellantes, et filium ad responsionem impellerent. Maestlinus certe petitionem Kepleri neglexit, ut sibi intus daret vel venderet typos ligneos Epitomes, quam edidit Maestlinus. Comparantes utrumque opus deprebedimus quidem multas Kepleri figuras similes Maestlinianis easque ad normam illarum sculptas, nullam vero ex eadem scriptura desumptas. Figuras vero ad planetarum theorias pertinentes figurasque libri septimi plane novas esse et plurimum discrepantes a Maestli-

nians, nullum dubium, cum Maestlinus Terram immobilem esse demonstrat, veterum innixus hypothesebus, Copernici vix verbo mentionem faciat, et ne in editione quidem anni 1610, quam dicit „denuo diligenter recognitam“ et locupletiores prioribus editionibus, ad Kepleri inventa respiciat.

Keplerum de eadem Epitome anno 1616 scripsisse ad Florianum Crusium, qui tum temporis Argentorati degebat, ex his Crusii verbis apparet, quae ex literis illius desumimus, datis V. Non. Oct. 1616: Epitomen tuam Astronomicam vellem bis die, quod diebus emissam fuisse; et certe, si eam aliquando mitteres mihi, gratus aliquid non possem. At desunt fortassis adiutores et ministri editionis, qui ad corrigendum subsidio esse possint. Etsi ego jam ad vos proficisci nec possum nec debeam, studiosum tamen mathematicae, Gallum natione, paucis abhinc septimanis habebis, qui operam suam lubentissime et in Tabellis Rudolphis conficiendis tibi afferet; est enim homo satis eruditus et ingeniosus et celebritate nominis tui inductus tuam amicitiam summe expetit.

Bejnegerus academiae Argentoratensis professor item commendasse videtur eundem, quem dicit Crusius, Janum Gringalletum, cum Keplerus haec responderet:

S. P. D.

Quas ad me 1^{ae} Dec. Argentina scripsisti literas, attulit Ammonius (cfr. vol. IV. p. 125), tanto gratior adventu, quanto ego jam diu tui meique causa fui sollicitus.

Gringalleti ingenium ex transmissa disputatione agnovi amoque hominem novum visum. Qui si patientium secum afferet laboris tacidiosissimi computandarum Ephemericarum ex meis praescriptis; hoc illi praestabo de meo, ut desiderio nullo teneatur instituendi pueros. Statum hujus scholae describes ipsi ex propria tua scientia, ne vana spe ductus aut extra mea studia alia circumspiciam, sero so deceptum queratur. Compinguntur in domum provincialem discipuli, onerantur lectionibus, occupantur horae, ut nemini liceat ad me vel alium foras exire discendae geometriae linguae causa. Praeterea cum sit Genevensis cumque ad me sit concessurus, qui theologis hujus loci, coloniae Wirtembergicae, sum sudes in oculis, haud facile fieri poterit, ut cunquam Austriaci liberis praeficiatur, religionis Calvinianae obstante metu. Forti igitur animo capessendum illi erit studium astronomicum; mensam habebit eandem quam ego, philosophicam. Pecuniae tantum addam (pro re nata et prout utilem mihi collocare poterit operam), quantum ipsi non solum ad vestem necessariam fuerit opus, sed etiam ad viaticum. Cetera iucundiora mitto, etsi habet Witteberga (A. Rhodum), habet Altorfiam (Odontium), habet et Frankordia ad Oderam (Ursinum) matheseos professores, qui me aliquando juvarunt in studiis. Studia mea liberaliter communicabo nec ulla erit exceptio, nisi ut ad eadem mihi reciproce obligetur, ad quae sum ego Brabancis baeredibus obligatus.

Conclusio harum litterarum, quas dedit Keplerus Lindi d. 7. Febr. 1617, legitur vol. I. p. 660. Verba „theologia sum sudes in oculis“ his illustranda sunt: L. M. Fischlinus in „Memoria theologorum Wirtembergensium resuscitata“ (Ulmae 1710) vitam describens Danielis Hiltzeri, qui anno 1610. Lincium ad supremum pastorem vocatus est, refert Keplerum „compraesentiam carnis Christi“ negasse eamque ob causam ab Hiltzerio ad S. Coenam non Admissum fuisse. Idem punctat Keplerus Petro Hoffmanno Wittebergensi, qui a Keplero petit, ut se ad munus aliquod mathematicum promoveat, scribens:

Voluntas tui promovendi mihi nunquam deficit; at postquam a te Lincium veni, turbae mee procaces, ut vocem novo sensu usurpem, exceperunt, quarum occasione in lites etiam incidi theologicas excludorque hic a communione. Hinc intellige, quanta mihi facultas vel fuerit vel esse possit tui promovendi in loco, ubi idem et templi primarius minister et scholae inspector notam mihi publicam inussit haereseos, propterea quod in omnibus partibus ea probo, quae verbo Dei conscientia deprehendo, ea fugio vel saltem contra protestor, quae in omnibus tribus seculis vel novitatem sapiunt vel an-

tiquam haeresin. (Ex literis d. 26. Apr. 1615.) Keplerus contra Haleri decretum pro vocavit ad Consistorium Württembergicum, Hizerum accusans, illi vero profecit teste respon- sione Consistorii, quam idem ille liber Fischlini exhibet. Ceterum postea in gratiam Hizeri rediisse videtur Keplerus, cum non tantum Crusius (qui Keplero Berneggeri loco respondit. Cfr. Hausb. p. 620 ss.) aliquæ saepius Keplerum petierint, ut salutem diceret Halero, sed ipse etiam Keplerus in literarum quas modo praemisimus ad Berneggerum datarum post- scripto scribat: Salutem Crusio jussit adscribere D. Dan. Hizer, praeclarissime pollicitus operam, si qua in re possit illi prodesse, praedicator ejus donorum et diligentiae.

Gringalletum Kepleri conditiones accepisse his nunciat Crusius Keplero: D. Grin- galletus salutem et officia sua promissima tibi per me vundari petiit, sequæ ea conditione, quam ipsi obtulisti, maxime esse contentum dicit et ad nostrum pascha Deo volente Lin- cium se conferet. Habebis hominem, ut spero, diligentem et doctum negotioque tuo, in quo versaris, non inutilem. (Ex literis d. III. Non. Martii 1617.) Calendis Maji scribit Crusius: Tuum responsum ad mens quotidie exspecto. D. Gringalletum jam tibi mittimus, quo viro et docto et honesto in negotiis tuis astropomicis ex voto uti poteris, et gratulor astronomis de Tabulis Rudolphæis, quas jam tua cura, hujus nostri Gringalleti auxilio di- ligenti, propediem lucem visuras putat. Ipse Keplerus adventum Gringalleti his vundet Berneggero:

S. P. D. Gratias ago tibi, amice Berneggere, qui me liberasti onere scribendi ad te integras epistolas, transmissio ad me, qui schedulae meae ope- rimentum faciat. Pragam ivi 8. Martii, evocatus a Caesare, redii 26. Maji, octiduo post Gringalletus advenit, lacto ut reor angurio. Quis credat, Atgen- tina mihi subeidia consiliorum snppeditari ad absolvenda mea studia? Initia spei plenissima sunt; faxit Deus, ut eventus respondeat novaeque averruncet impedimenta.

Litterae tuae priores Lincio mihi Pragam sunt missae et remissae a me ad Guraldum (cfr. IV. p. 127 et Haush. p. 622), sed finitis nundinis, re cu- rata. Itaque Guraldus offensulunculae ejusdam signa dedit in rescripto. Opti- nor tamen, tonsoris rationem non esse habitam, nec Guraldus in rescripto facit ejus mentionem. Itaque tuas per Gringalletum missas transmissi ad Am- monium in Styriam una cum D. Cruelli literis, cui nunc per te salutem, alia vice scribam. Vale. (Dies deest.)

Gringalletum negotium sibi mandatum ad votum perfecisse, ex epistolis ejus ad Kep- lerum et Kepleri ad Berneggerum datæ apparet. Keplerus quo tempore Gringalletus Lin- cium venit. Pragae a Caesare Matthias vocatus est et Gringalleto curam Calendiariorum et Ephemeridum, nec non rerum domesticarum tradidit, cum Octobri mense, ut matri suae praesto sit in causa ad forum delata, in Württembergiam profectus fuit. (Comp. I. 661.) Priusquam Lincio abire dedit Berneggero:

S. P. D. Clarissime vir. Ephemerida in annum 1618 novis typis edidi paginarum 4; sumtuosum opusculum. Itaque si sunt, qui habere cupiant, his indices, die 23. Sept. absolutam et hoc die 1. Oct. Noribergae esse posse apud Abrahamum Wagenmannum et per cum paulo post Frankofurti apud G. Tampach dictum.

Introductio debuit addi cum Ephemeride hujus anni 1617, sed spes ex- eudendi certa nondum apparèt. Cogito annualim scribere singulas, nam spm- tibus non sufficio. Gringalletus egregiam praestat operam. Epitomes meae pars aphaerica, misere habita a typographo, sculptoribus, correctore, me Pragae absente, nunc tandem prodit, nisi Crügerus bibliopola, qui sumtus fecit, etiam nunc more suo occasiones negligat exhibendi Frankofurti. Vale Clarissime Vir meque ama. D. 1. Oct. 1617. Lincii.

Avaritiæ publicæ tenitas et res publicae mirum in modum turbatas illis temporibus Kepleri quoque otium literarium plurimum turbabant, ita ut vix haberet, quo familiam aler- et, neque quae Gringalleto promiserat praestare posset. Martii 1619 scribit Biancho: „cum ei non satisfacere possim, desertus a Caesaranis, de diuturna ejus praesentia certus



nequaquam sum, et Remo d. 31. Aug. ejusdem anni: „si de meo amico salario tantum mihi numeretur, unde Gringalletum meum jam dudum dimissum sententare possim.“ Gringalletus adjunxisse se videtur legationi in Hungariam transmissae, et per annos 1619—20 „cum Generoso suo“ per Hungariam et Moraviam migravit, semper rei Kepleri grato animo prospiciens. Sic scribit „Bruna Moravorum“ 4. Febr. 1620: ne otiosus essem in hac peregrinatione, mecum assumam exemplar tabulae logarithmorum ad rotundos, ex qua jam ab- solvi tabulam proindicum $\frac{1}{2}$ et incepi trlum superiorum planetarum proindicum eadem methode supputare. Delinde 16. Febr.: Generosus meus, post lectas tuas literas, respondit Silesitas quidem pollicitos esse Caesari debita persolvere, inter quas si hoc tuum repertum fuerit, certo tibi solutum iri. Velle se auctorem tibi esse de suscipiendo itinere Vratislaviam, ut posses tui Regiae Majestati tui Ordinis Silesiae tuas res commendare. — Aestate anni 1620 rediit Gringalletus ad Keplerum, sed paulo post relicto Lincio per Württemberg Argentoratum profectus est. Augustus Vind. prospexit pro charta, ad Imprimenda Kepleri opera apta, Ulmae Hebenstreitum, Tubingae Maestlinum visitavit, et Argentorati Berneggero tradidit effugiem Kepleri, quem Keplerus illi dono dedit. Argentorato rediit Gringalletus in patriam neque ulterius occurrat illius nomen in literis Kepleri.

Keplerus in posteritis ad literas, quas supra exhibuimus, haec ad Crusii literas respondit: Ad literas D. Fl. Crusii cur minus in praesens respondeam, in causa est vires negotiorum; scribendum eam in Württembergiam in causa forensi matris meae, quam mecum habeo. Salutem illi nuncia et quod de Copernicana quaerit Epitoma, in ea lente typographum progredi nec me posse ad nundinas de ejus industria liquido quicquam polliceri. Motum quidem Terrae dignum omnibus copiis instrui, et sperare me de ipso, qui philosophus est, triumphum liquidum.

In Fl. Crusii literis, d. Cal. Maji 1617, haec legimus: proximarum nundinarum catalogus tuam Epitome nec inter editos nec inter edendos libros continebat; non tamen eam praevalere, ab editione existimo, praesertim cum jam solum *καρπώταρον* in hac re habeas. — Typographum Crügerum dicit in praefatione Keplerus summas promississe ad edendam Epitomen, neque vero consensisse excedendo Lincii libro, quo factum sit, ut prima pars inciperetur $1\frac{1}{2}$ annos a pactione et incepta ultra annum alterum traheretur, adeoque, nisi partem summam ipse Keplerus suppeditasset, imperfecta diutius mansisset edito. Illud concludendum, absolutam fuisse partem sphaericam initio anni 1615, inceptumque typum libri IV. Lincii e. medium anni 1616, cum praefatio illa scripta sit mense Augusto anni 1617).

Qua ratione ulterius progressus sit typus certiores facit Keplerus Berneggerum, scribens: Nunc sum in excudenda doctrina theoricā, 4 libris comprehensa, quorum primus, post sphaericam ordine quartus, est physica coelestis. Unus auctor plus in scribendo laboris sustineo omnibus lectoribus in unum collatis operis, unus etiam plus gaudii exhauro ceteris omnibus, qui legent. (Lincii 29. Aug. 1620.) Proximo anno scribit: Gringalletus, ni fallor, libellum tibi *ἀκίμαλον* dedit physicae coelestis. Tubinga igitur a professore Hebraeo (Schickardo) aut jam submissa est aut propediem submitteatur integratio, titulus ac. cum praecambulo. Hic en tibi lusum extractum ex opere majori, si tamen non etiam hunc dudum habes. Vale. Dabam Ratisponae d. 15. Febr. 1621.

Hic d. 11. Aug. haec Keplerus addit: Clarissime vir, amice colendissime. Annus circumagitur, necdum negotia mea finem habent. Exemplaria libri IV. Epitomes omnino 17 mecum attuli Lincio, quae distracta sunt. Nunc filia mea Ratispona Lincium descendit, ut proferat et suppellectilibus meis exemplaria omnia. Omnino persuasus sum, Gringalletum duo accepisse, ut eorum unum (sive tamen titulo, qui Tubingae impressus) tibi relinqueret. Liber V. VI. VII. Francofurti est apud Tampachium; spero proditurum nundinis.

Sicut in Harmonia ita etiam in Epitome operam navabat Tubingensis professor Linguae hebraicae etc. W. Schickardus (cfr. vol. V. p. 7. 46 ss.), cum in conducendis operis ad typum, tum excuspendis agitis. Haec prospiciens hic certiores facit Keplerum de typographis Tubingensibus: Excellentissime Vir, Domine Factor plurimum honorande. Res tuas curavi quam potui citissime et diligentissime, sed cunctator ille Werflinns in causa est,

quod puerum non statim remisit. Is rem diu multumque pensitans post 3 horas hoc responsi dedit: se lubenter quidem tibi morem gesturum, sed non habere tam minutus typos, qui Lincolnsis tuis ad amissum responderent; minimos suos esse, quales videas in transmissio exemplo. Quodsi tibi arrideant, se Stuttgartiam ad te proficisci non gravaturum et eorum de arquo tolerabilibus pretio impressionis tractaturum. Nec jam adeo occupatum esse, quin hanc talem statim posuit ordiri. Sed vereri se, ne 20 illi quæstiones in 25 vel plures hoc modo excrescant. Quod quia et ipse veritus sum, accessi proprio motu, citra indignationem ut spero tuam, etiam Wildium, novitum nostrum typographum, apud quem reperi exoptatos typos, prout ex ista madida adhuc et semiperfecta pagina videbis. Is jam peragere abest, procul dubio cras reversurus, sed typotheta ejus, a cujus nutu et arbitrio Wildius totus pendet, promte et libenter respondit, sibi jam et vacare et lubere quoque, libros tuos imprimere, modo consentias et cum hero suo de mercede tibi conveniat. Mihi quoque ulterius sciscitanti induravit, non ultra 3 oboles pro quatuordecim postulaturum, sed omnino spero, longe vilius tibi venditurum, si ipsemet cum eo contrahas. At quia hic nobiscum conspici non vis, significo autem certum diem, quo te Stuttgartiam offendant. Exspatiarer ego, tum in hac causa tua, tum ut te iuvarem et eorum de pluribus agerem, ipsemet, si post gravem meum morbum satis convalescens. Typos liqneos quod attinet, jubeo te esse secutum: pingam illos ex arbitrio tuo et studio cuidam, matriculi meo (quem in hunc finem, ut ego nonnihil subleverem, in hunc artificis institui) exculpandos tradam.

Librum quantum videre valde gestio; mitte si potes, non diu detinebo. . . . Porro, quod advenit tui causam, attinet, equidem eam ignoro nec scire cupio; hisi forte illa est, cujus sub discessum tuum Nirtingae meministi, quando quidem deplorandam nominas. Utut sit, condico ex omnibus visceribus et solarer te, nisi animi tui constantia jam dudum esset notissima. Saramus oportet patienter, quæ mutare non licet. Sed aliud de te nobis fama retulit, parare te discessum Lincii et Londinam ad regem Angliæ migraturum, qui te non obscuris gratias signis invitavit. Quod si ita est, gratulor ex animo et adversam illam sortem hac melioris spe superare jubeo. . . .

Vale Vir undiqueque clarissime et bene vale meque porro tuum esse patere. Tubingas d. 23. Oct. hora 3 p. m. 1620. Tuas Excell. offic. W. Schickard. (Inscriptio: Cl. Viro D. J. Keplero, nunc Stuttgartiæ divertenti.)

Keplerus paulo post Tubingam venit, ut de typo cum typographo ageret, subnixisse vero se videtur amicorum conversationi pudore fractus ob matris causam fortensem, quod ex prioribus et his quæ sequuntur Schickardi literis apparet. Hic enim iniec dedit Keplero „nunc Gütingiæ agent“; Officiosa salutem et omnia famula! Literas tuas, Clarissime Vir, Domine fautor honorande, una cum exemplis libri IV. Astronomiæ Copernicane et libello chronologico accepi affatimque serios tuos meos risi. Restituam illum priorem alia occasione causi gratularum actione, quando perlegero totum. Nunc inter hospitium, quos mundinae mihi adixerant, strepitus tribus tantum verbis te saluto, ne isthaec exoptata occasio transeat, et significo, quod Wildius ob discessum et defectum omnium ministrorum praeterquam unius saltem typothetae libros tuos jam quidem excludere non possit; alias de pretio satis invidem conveniret. Nescio, quo transverso lepore viso prout repente ex officina retraxerit. Praetendit, nullas fore vernas undinas Frankofurti, proinde nolle se cum damno excludere libros non vendibiles, destitutum etiam ab impressione novellarum et interim de alio lucrandi genere cogitaturum. Figuras autem, quas misisti, nihilominus exculpam et proximo quoque tempore ad te mittam.

Proximo cum hic eras, tam subito non urbe excedere et a puerpera incitiguloa per noctem abesse lenit; exivi tamen sequente summo mansi Austriam, sed ante dimidiam horam vel citius etiam te inde profectum fuisse dictabant; itaque subtritis domum revertenda. Nunc cesso. Ignosce quæstio tumultuaris scriptio, pudet enim me ipsum, tibi legendum obtuleris, quod mihi relegere jam non valet. Vale Vir celeberrime, fautor colende et in tua tuorumque causa meas quoque preces apud Deum non irritas fore spera. Tubingae t3. Nov. 1620. Exo. Vestrae uff. Wilh. Schickard. Has literas proximo supervenerunt has (Inscriptio: Clariss. et Excell. Viro, D. J. Keplero, Math. celeberrimo, amico et fautori meo plurimum honorando trad. Jerund zu Gütingen zu erfragen); S. et Off. Clarissime Vir, Domine et fautor honorande. Wildius, ut proximo scripsi, elapsus est, interim vero Cellius illapsus, cui praefationem tuam in librum IV. jam tradidi, ejusque initium factum est, prout mox videbis. (Berneggero misit Cal. Mart. 1621 Schickardus, binâ hinc Kepleri in IV. lib. Astr. Cop. praefationis exempla, nobiscum modo excusa, Argentiam nautae jussit unum pro T. Excell. alterum pro Gringallete. Keplerum addit ultra ocellum nuper fuisse suum hospitem; hactenus vero discessisse Ratisbonam ad conjugem puerperam). Is petit praeter papyrum 3½ scotos pro singulis paginis in 650 multiplicandis. Nihil quicquam ad hoc postulatum respondi, priusquam tuam mentem penitus explorarem.

Fac igitur me certiores, an tibi erident haec conditio necne. Interim etiam figurae, quas in pyro delineatas matruelli meo cōcedidi, exaspentur. — Ad eclipsin hodiernam diligenter attendemus, si serenitas ut spero perseverabit. Utinam ipse praesens esse vel posses vel velles. Sed quid de Tua (matre) agitur? Nondumne mittis tractamina? Condoleo vobis tota die et meliora in animo precor. Interim Vale Vir aequiore sorte dignissime, et in hoc privato tuo luctu publicae matheseos causas, cujus tu solus es patronus, non oblitiscere. Salve quoque a D. D. Lando et Besoldo, qui tibi amice succenseant, quod proxime, cum hic esses, tu publico potius hospitali quam ipsis, perspectae fidei amicis concedere malueris. Denno Vale. Kaptim Tübingae prid. Andr. 1620. Ex. T. Off. W. Schickard.

Die 11. Apr. 1623 nunciat Schickardus Kepleri: Postremos Astr. Cop. libros usper emi. Reperireot plures nobiscum lectores, nisi tam cari essent. Nam constant 2½ florenis, quod hoc pagellarum numero inauditum.

In epistola dedicatoria ad libros V—VII. (d. Cal. Jul. 1621) ipse Keplerus refert causas dilatae editiois, bellum, lituera in Württembergiam ob matris causam forensis suscepta, concinnationem editionemque Ephemeridum et Harmoniae; his accessisse calculos varios in planetarum motibus et praecipue in Lunae theoria, quibus effectum sit, ut ea, „quae a septem annis haerebant in scrinulis „operas expertantia curatoris et chalcographi“ interfecto tempore plane mutarentur, ut de „primo exemplari ne vestigium quidem expresset in eo, quod exhibitum est chalcographo.“ Mense Aprili anno 1620 Lunae theoria ad votum successit, ita fit liber IV. absolvi potest, „qui est de principiis doctrinae theoriae.“ Editus est hic liber „media inter arma Bavarica crebrosque morbos et mortes militum et civium“; post editum librum quartum Keplerus quod reliquum erat operis inter turbas forenses et lituera confect, Tübingae exeunte anno 1620 Maestlino dijudicandas proposuit quaesiones de Luna, Ratisbonae eas revidit et describendas curavit, partem ultimam libri VI. abiecit Monachi. Tübingam et Stuttgartiam reversus Mojo et Justo anni 1621, librum VII. „occasione conversationis cum Maestlino et per lectionem librorum, quos in Austria nausici non potuerat“ revidit et locupletavit. Hinc Frankofurtum profectus (mense Janio) curam typis dedit, et mensem ibi perlicendo typo transiegit, quo transacto absolutum opus „tres libros posteriores“ proceribus archiducatus Austriae Supr.—Anisanae subijuncta epistola dedicatoria transmissit.

Jam quod epistolas reversi, quas Keplerus de libro suo amicis dedit, initium faciamus a Petro Crügero Dautiscano, quem passim in voluminibus prioribus diximus loquentemque introduximus. Crügerus anno 1610 primum aditis Keplerum „de facie incognitum,“ petens observationem „eclipseos et verum meridianum Pragensem. Keplerus ad has Crügeri literas respondit anno demum 1616; excusans silentium diciturum recenset fata sua ab anno 1610 huc usque (cfr. vol. II. p. 400). Quae sequuntur, quamvis non pertineant ad summam Epitomeae, hic tamen inserenda censuimus, cum referri possint ad librum operis tertium.

Quod argumentum literarum, scribit Keplerus, attinet, id geographicum est, nec ego hacenus illam disciplinam ultra limites astronomiae attigi. Mihi haec una cura, ut sciam, locus quisque, in quo vel ego observo vel alius quicumque fide dignus mathematicus, quantum distet a meridiano Hnennensi. Cumque res versetur in minimis, neque facile sit negotium per Lunam (rarisimae namque contingunt observationes in nonagesimo diversis locis; quod illae diversae habeant poli altitudines, utcumque eidem meridiano subsint, jam et differentes habebunt nonagesimos. Loca enim, quae eodem temporis momento eundem habent nonagesimum, disposita sunt in tractu Terrae, qui subjacet eidem circulo latitudinis per Lunam ducto: adeoque plus peccari possit observando vel propter hanc incertitudinem nonagesimi, vel propter instrumentorum requisitam subtilitatem, quam loca inter se longitudinis differunt), duo igitur sunt residua, quorum alterum in Optica tentavi, per eclipses Solis et tractationem parallaxium (vol. II. p. 358, 372 a.), alterum ago potius animo, ut sc. peregrinationem suscipiam vel ego vel studiosorum astronomiae quispian in extremum usque promontorium Siciliae, ex quo Africa cerni potest et portus Carthaginiensis; ibi diligenter observata linea meridiana descriptoque circulo azimuthali notarem montes Africae, notos nautis et piratis Siculis, montes etiam Calabriae; nec valde incerta est longitudo trajectus in Africam nec

longitudo trajectus in Italiam. A Carthagine vero Alexandriam Ptolemaeo credenda erit differentia longitudinis, etsi etiam Plinium et Strabonem consului. Sic de differentia inter Alexandriam et Araccam credam Albateguius, inter illam et Babylonem utrique, erant enim periti illarum regionum. A Siella vero per transversum Italiae usque Anconam aut Venetias indeque usque Viliacum, Linum, Pragam et omnino Ilucnam non difficile esse puto, eis et ultra rigidas Alpes ex summitatibus montium extremorum perpetuum ducere meridianum. Ipsas vero angustias Alpium, quarum vertices inscendi non possunt, magnetica pyxide perambularem, ut regiones eis Alpes cum transalpinis connecterem. Atque huius rei serviet mihi chorographia Austriae, Styriae, Carinthiae jam demandata, si quidem vixero. Tu si quid simile praestare potes, aut si patronos habes ad vota nostra promovenda promtos, praesta tale aliquid, metatus meridianum Dantisco per Poloniam, vel si infesta sunt loca, saltem circulum magnum Dantisco Regiomonium et indidem Vratislaviam, addita comparatione itinerariorum intervallorum, non tantum in milliariis, sed etiam in boris, quas expeditus pedes consumit, cum notatione, ubi arduus, ubi plana itinera. Tale quid si mihi communicaveris, habebis me vicissim promptum in consimilibus. In praesentia plura non habeo. Vale et rem mathematicam age strenue.

Lucii Cal. Martii. 1615. Cl. Excell. Tuae officiosus

J. Kepler,

Imp. C. Matthiae Ordinumque sup. Austriae
Mathematicus.

Ex Crügeri responsonibus (d. Nons Sept. 1615 et prid. Cal. April. 1616) haec excerptimus: De observationibus Lunae in nonagimo scripti, non ut inde latitudinem, sed ut longitudinem differentiam adipiscerem iuxta praescriptum Tychois (Epistolae p. 72), tutum in Optics per parallaxes negotium vereor, ut aequo (an) si non majori difficultate laboret. Restat modus tuus novus in Sicilia tentandus. In quidem Idoneus (si modo inde Africae ora cerni possit, ad quod Strabone Plinio fortassis opus fuerit) inquirendae differentiae longitudinum locorum Africanorum et Italicorum at inde vicinorum Germanicorum, propter eminus perpetuo apparentes montes; hisce autem in locis, quas montibus tam excelsis et frequentibus destituuntur, iste modus parum procedet. — Jam Crügerus proponit alium modum, differentiam longitudinum locorum invenendi per scatherica aolaria et horologia automata, Kepleri iudicium sibi expetens, et sic pergit: De Lunae theoria non possum quin aliquid addam. Eandem semper nobis obverti Lunae faciem, a macula ad eandem plagam vergentibus manifestum est. Id qui fieri possit, admissis epicyclis aut etiam abris tunc physiologiae rotantibus, non video. Mihi, si epicycli deusandj sint, corpus Lunae quadam libratione circumagi necessarium videtur. Cuperem hic erudiri. — In altera literis Crügerus verba facit de Stereometria Kepleri (cfr. vol. V. p. 627), de assue Kepleri, qui literas promissas ipsi non tradiderit, solum illi esse natum narrat, quem ipse baptismo susceperit, pollicitum illum esse, se proxima occasione „pellein“ missum etc., et sic concludit: In prioribus literis quaesivi aliquid de Luna, quomodo illa in epicyclo eandem nobis faciem exhibere posset. Legi interea responsonem Fernii Ambianensis, et Conimbricensem; sed iuxta responso nec mihi sufficit nec hypothesibus eorum consentit.

Opto maturari tabulas, quas toties promittis, Rudolphaeas, ut tandem, quid de astronomia futurum sit, experiamur.

Ad haec Keplerus respondit: S. P. D. Binas abs te, Clarissime Vir, accepi literas eodem die, diversis temporibus scriptas. Additae fuerunt 5 epistolae ad Straussium, qui ex constituto a nobis abiit Tubingam; eo mittam illas.

Differentia meridianorum meo iudicio tutissime elicitur ex tabula magna Germaniae Mercatoriae, quae Bornssiam et Daniam et Galliae confinia includit. Nec tantus esse potest error, quantus in observationibus Lunae, in quibus facile 5 minutis, quae faciunt 20" temporis, aberramus; ut taceam, rarissime fieri, ut duo simul observent. Neque tutum est, conferre observationem Dan-

tiscanam cum calculo Huennensi: nam ut ceteras calculi partes taceam, temporis aequatio adhuc miram habet inaequalitatem, de qua vix suspiceris. Et illa Tychoni dicta variatio ab observatis rursum prorsumque usque ad 6 et 10 minuta dissentit.

Scribis de observationibus Lunae in nonagesimo, ac si nescirem, te eas pro longitudine eligere. Imo scio et miror, si feci latitudinis mentionem, nisi factum sit ob compendium meum parallaxon, quod est evidentissimum in latitudine. Si de hoc scripsi, factum id est non propter ipsam latitudinem, sed propter longitudinem. Sed non memini meorum verborum. Parallaxeon negotium nolum pro incerto habere. Ecce, ex una eclipsi Lunae, quae fuit observata anno 1605. Londini, Antverpiae, Ostelae in Ostfria et Pragae (cfr. vol. III. 735), mediantibus parallaxibus ego talem invenitrium priorum observationum consensum, ut ex his meam quartam Pragensis erroris arguerim; potuit enim mihi ab hortulano situs instrumenti perturbari per meam absentiam.

Proponis modum, distantias locorum observandi per scilatherica et automata; putabam praesupponi cognitam distantiam itinerariam: tunc esset modus Appiani in Cosmographia. Sed colligo me, video non requiri notitiam itinerariae distantiae. Bonus est, sed requirit praxin exquisitissimam et fidem eorum, qui horologia custodiunt. Imo sit unicuique horologium idque transportetur, lineae vero meridanae utrinque designentur, ad quas applicari possit allatum horologium. Sola dubitatio restat, plusne possit errare automaton inaequabilis tensionis, motusque cum aëre variabilis, an aestimatio distantiae itinerariae. Nam si hinc fidimus, facile per diversas poli altitudines eliciemus differentiam meridianorum. Quid verbis opus est super tali scilatherico, cum in eo insint omnia, quae ex altitudinibus et azimuthis cum labore solennis computare. Mihi aequinoctiale placeret, si transportabile esse debet. Nam per lineas declinationum Solis facile erigitur ad justam poli altitudinem. De radiis Solis differentia est parva, si per foramen immittitur Solis radius, quantum occupat una radiosa ellipsis vel circulus, tanti spatii motus efficitur 2^o temporis; hinc facile est a margine radii orientali vel occidentali ratiocinari ad centrum ellipsaeos vel circuli radiosi.

Objicis aliquid de Lunae facie. Jam tetigi hanc objectionem in Commentariis Martis. Vera objicis, si ad ungum facies esset eadem; at quid si diversis temporibus diversimode a circulo visionis secetur Luna circa partes boreales et australes, quod observatu difficile sit? Tum autem globus in globo esse potest, quam suspicionem etiam attigi in Commentariis. Haec tamen objectio jugulum petit epicyclorum. Nam simul etiam libratio tua evertitur diversa magnitudine apparentis diametri.

Scripsisti, testari affinem meum suis literis, quam is tibi curae fuerit; nullas tamen inclinasti nec illas accepi. Gratias tamen ago et pensare cupio ipsumque saluto. Nam quantum ex secundis tuis literis perspicio, tu compari ipsius es meo beneficio factus: itaque te crebro adhibet. — Affinis ut video cunctator est; literas valde optat uxor mea, frater alter aliquid pecuniolae debitas; si pellicea mittet eo nomine, ego permutabo nummis. Mea causa non opus est, ut labores aequae affligat.

De Tabulis Rudolphi

Quaerit aquas in aquis et poma fugacia cooptat

Tantalus; hoc illi garrula lingua dedit.

Promisi non ut statim ederem; jam promissas omnes exigunt, quidam

etiam imperiose: dum igitur proporo, me implico. Solus sum, calculus longe me vexat acrius, quam speculationes. Spero tamen sequentis anni Epimerida et typum astronomiae totius in sequenti Epitome Astronomiae Copernicanae. Vale, properat tabellarius. Dabam Lincol 17. Jun. 1616. II. Tuac officiosissimus

J. Kepler.

P. S. Salutamus ego et uxor fratrem et affinem nostrum teque.

Crügerus respondit, ob adversam valetudinem mathematica tractare se non posse („slo morbus pervaserat cerebrum, ut dubitare coeperim, an quater sex essent 24.“), quare se pro tempore ad Kepleri epistolam propius adire nequire. Ad tabulas, inquit, et astronomiae typum sequenti anno publicandum Deus O. M. tibi vegetas vires et Spiritum suum largiatur. (Ex epistola d. d. 23. Aug. 1616.)

Proxima Kepleri epistola, quae superest, data est d. 11. Martii 1619, eaque haec habet: Clarissime Vir. Qui bus fert, admonuit uxorem meam, si quid ad fratrem velit perscribere; ego ad te malo. Dicas igitur ipsi salutem a me, et amissa filia utraque, Margaretha anno 1617. Septembri et Catharina anno 1618. Februario, trimula illa, hac annicula, auctum me vicissim filio Sebaldio 18. Jan. hujus 1619; valere matrem, filium fratremque ipsius cum liberis, tenui licet fortuna.

De Cometis scripsi tractatum, sed absum ab idoneis typographis. Demonstro per motum Terrae, quam altus ille in aethere et quomodo trajectionem fecerit aequabilissimam in linea recta. — Schedam accepi Argentina, in qua rogas meam sententiam super dubitatione in argumentandi forma per refractiones. Invenies; quod quaeris, in Astronomiae parte Optica. Refractiones in 20° altitudinis desinunt esse sensibiles subito quasi. Oportet igitur subitam similiter fieri mutationem inclinationis radiorum super superficiem refringentem. At quo altior a Terra superficies, hoc minus et in ea variabilis inclinatio ejus radii, qui per eam usque ad Terram ducitur. (In A tangatur Terra, minus igitur differt C a recto quam B. Non est autem refractio tantum ab inclinatione, alias esset illi proportionalis, sed etiam ab incremento secantis inclinationis.) Hujus argumenti haec vis est, ut non possim defendere refractiones a Tycbone proditas, nisi aëris superficiem refringentem humiliorē uno milliari Germanico sumam.

Quid praeterea agam, ex adjectis schedis superfluis habeo; quartus liber (Harmoniae) hodie absolvetur, at nondum sunt excusi primus et secundus. Appendix cum Mysterio Cosmographico accedet Francofurti. Mitte quaeso unam paginam ad D. D. Papium, cui puto placebit liber IV. ob metaphysicas et physicas seu psychologicas contemplationes.

Vale. Raptim Lincol 11. Martii, quo die fama percubuit de Caesare mortuo, sed adhuc incerta.

Quae in superioribus Keplerus de refractionibus scribit, spectant questionem, quam Crügerus Straussio proposuerat, petens ut Kepleri iudicium de hac re sibi communicet, argumenta scilicet, quibus se vera probari possit; refractionem, quam fieri videamus, ab unica tantum mediocrum diversitate fieri. — Adjecta a Keplero figura tres: exhibet circulos concentricos; intimus, representans Terram, tangitur in A linea ABC, quae medium in B, extremum in C secat.

Quam modo praemisistis dicit Keplerus Papium (medicum), quemque paucis memoravimus vol. II. p. 36, hoc locum loquentem introducimus, cum non prioribus tantum annis, sed eo tempore, quo Keplerus de conscribenda Epitome cum eo agebat, scilicet Keplerum adiret, hortans ut lucubrations suas astronomicas et physicas typis mandaret. Anno 1611 (23. Sept.) coudoleus respondit Keplero, qui ipsi mortem uxoris et liberorum nunciaverat: Facile credo, in summo etiam dolore jucundum tibi fuisse, doloris signa in siquum quasi meum prolixis literis effundere. Libenter legi omnia symptomata morbi, quo extincta est charissima tu uxore p. m. Utinam vero tibi per amicitiam nostram remedium, doloris tui magnitudini conveniens, mittere jam possem. Doleo equidem, de stibio aliquid fuisse obla-

tum (de cujus ego vi hic in publica disputatione expresse dixerim omnesque tales medici nomine indignos iudico, qui id proluant, etiam studiosissime paratim, aegroti et aegro lethaliter decumbenti, collapsi jam viribus) rennente altero medico, viro bono; sed quod factum est, infectum fieri nequit. Mortis hora adfuit, cujus minister fuit tibi propinator Non est quod excruciet te memoria litigiorum, quae inter conjuges esse solent, etiam pios et optime moratos. Ea fert occasio; satanas subministrat etiam multa per improbos Nosti, meam uxorem cum tua bene merito comparandam esse, sed, ita me Deus amet, et nostrum conjugium immune penitus non est ab huiusmodi liticulis, uero puto, ultius esse mariti et uxoris. . . . Theologiam illam jam tuam, cui te juvenis totum tradideras, aut potius animi fortitudinem vere theologiam in medium profer, te virum ostende in doloribus magnis etc. Serva te liberis tuis, qui jam magis tuo consilio et paterna *παιδείᾳ* indigent, quam unquam antehac in loco peregrino, in his mundi turbis. Memoriam ex animo tuo ejice et dulcedinem et molestiarum praeteritarum. Deo supplica et confide, ipse praestabit tibi ea tuis. — Lincii te esse optarim: novi ibidem multos bonos viros, quorum consuetudine plurimum posset recreari liberisque tuos rectius fortasse educare, quam Pragaë.

Ex libris tuis habeo Paralipomena ad Vitellionem, scriptum ad Galilaëum, Resp. ad Rosellii objectiones, Cometam. Si paradoxa tua physica sunt edita et quidquid hujus generis habes de rebus physicis, mecum quaeso, communica, ut eo accuratius meam physicam, a te adjuncta, concinnare possim, et catalogum describi cura libraria a te editorum; compensabo ego liberalitatem hanc tuam elaborato succino, ut tuus Ludoviculus et filiola habeant, de quo tibi gratulentur.

Vale in Christo cum tuis charissimis liberis, amice charissime plurimumque colende. Regiomonti etc.

Anno 1615 (17. Aug.) Papius, querens de Kepleri diuturno silentio prioribus addit: Optarem ego mihi, si alius in mundo hominis, tui, ita me Deus amet, cepiam, quocumque de rebus gravissimis conferre, seria cum joelis tractare liceret. — Cum uiper D. Crügerus hic esset tuique honorificam mentionem faceret, simul conquerens de iniquiore sua fortuna, quod occupationes mathematicae interrumpereot, imo omne propemodum otium sibi eriperet a professione rhetorices: subrisi, inquisivi, eandem tibi fortunam Graecii contigisse, cum mathematicis ethicis deceres. Ita juvenoti consulunt et literatis hominibus scholarchae, qui mihi Graecii de principio disputationes ex Cicrone et Homero Imperabant; unicum defuit sentum consilium, quod non simul ex Euclide declamationes efflagitarent.

Si me amas, scribe de tuis rebus hac occasione, responde D. Crügero, ne se a te contemptum putet, cujus humanitatem mirifice praedicavi. Fac ut sciam, quomodo valeat Florianus meus Crisius, quem tibi commendavi, quo in te animo sit D. Membartus, vir vere *εὐρύς*. De protectione Jo. Straussii Bornsi si quid addideris, pergratum id erit. Bene vale etc.

Keplerum rescripsisse ex his Papii literis patet: Cum hosterno die tuis acciperem, praegaudio propemodum exilii propter constantiam amici summi in me amando. Utinam vero ego tibi tantum jucunditatis reponere possem! Una tecum mihi permolestum est, divitum tuum ingenium non in speculationibus gravissimis, quae ceterorum fere hominum omnium ingenia excedunt, esse occupatum; sed distincti calculationibus, quae industria atque in tuis istis studiis medio-criter exercitatio homini potius committenda essent. (Cfr. vol. IV. p. 519.) Chorographia, quam Ill. Proceres postulant, etiam plus molestiarum habet in peregrinando et delineando, sicut ante multos annos perspexi et cognovi ex beato Apiano, cum is Bavariam ederet, quae ab omnibus geographis, quotquot ego hac de re audiri judicare, mirifice collaudata fuit. Paxit Deus, ut ejus *ἀντίγραφον* superes.

Gratiam tibi habeo, quod aperuisti viam, qua paradoxa tua physica possim accedere. In physica me a te atque Tychoe plurimum fuisse adjunctum, ignosce, praesertim meteorologica quod attinet. Si te audiendi per otidium ductat copia mihi daretur, bone Deus, quam id mihi gratum commodumque foret in maximis difficultatibus, e quibus nescio an unquam sine tua ope possim emergere. Fortassis ex meo Florianus quoque intellexisti, quantopere mihi plurima sordiant in physicis, quibus onerantur et falluntur egregia ingenia in academiis. Pro filio habui Florianum, qui triennii spatii domi meae id est consequutus, quod fortassis in omni vita sua absque institutione mea non cognovisset. Improbo quidem ejus consilium, quod non aliquid dedit tempori et non diutius commoratus fuit Lincii; sed uosti, magna ingenia ad magna nescio quo impetu ferri.

Deus comprimis tibi ad Epitomen tuam Copernicanam et Tychoenicam otium, vires corporis atque animi largiatur, et ad perfectam Opticam atque Catoptricam. Lectu inenundistina mihi fuerunt, quae ex nova reformata tua physica addidisti etc.

Vale in Christo cum tuis optime. Neodomi in arce 31. Jul. 1616. His Interpositis

redimus ad Crügerum, qui ad commercium epistolarum per 4 annos intermissum rediit, haec scribens: Jam elapsus est quadriennium integrum (scripsit haec Crügerus die 23. Apr. 1623), quo neque ad Te quicquam scripsi, neque a Te quippiam accepi. Gavius autem ex animo sum, postquam ex affine tuo intellexi, pristinae te professioni et loco restitutum. Deus Excell. Tuam servet ad enarranda opera Domini. Ante paucos dies affinis tuus exemplar mihi communicavit explanationis eclipsium anni 1620: et 1621. Spero te non male laturnum, si quidem D. Papius, cui mitti debebat, jam ante aliquot annos (1622) vita excessit. Cum primum audirem, affinem de eclipsibus illis commentarium habere, sperabam, totum fore de eclipsibus jam praeteritis avideque gesticbam cognoscere, quanta fuerit Solaris anni 1621. At fecellit me spes. Vidro tamen ex Astronomiae tuae libro VI, eam in loco tuae observationis fuisse 10 digitorum; nobis hic prodidit dig. $10\frac{1}{2}$, etc., cum tamen calculus a Supplem. Ephem. Magini obtulerit $11\frac{1}{2}$ dig., adeo ut Nagelius, novus ille cabalista, hinc occasionem arripuerit, astronomiam Tychonicam singillandi. Cui tamen sufficienter respondi. Vidit procul dubio Exc. Tua Astronomiam Danicam Severini a. 1621 editam. De isto opere quid Exc. T. sentiat, ignoro.

Keplerus respondit: S. P. D. Quo magis nos omnibus deliciis literariis spoliat bellum Germaniae funestissimum, hoc mihi gratiores fuerit tuae, Vir clarissime, literae, memoriam deliciarum, veluti quondam Epicuro gravissimis cerebri doloribus afflictato, sic mihi fatum patriae gementi doloresque et metus impendentes perhorrescenti, ex longinquo refricantes. Gratiam hujus tuae humanitatis augeat, quod extincto, ut dudum comperi, D. Papio, solus tu superes in illo litore, quo cum amicitiam literariam colore consuevi. Blande me equidem demulcet tuarum literarum lectio, dignus omnino es, cui vicissim benigne et delicate faciam, orsus ab eadem tecum mentione. Nam quod gaudere te diels ex animo, faciam equidem, ut gaudeas amplius, imo potius dolori, quem aliquamdiu te fovisse intelligo, ut supervacuo irascaris. Nunquam enim nec loco nec conditione sum motus, solus pene hoc sum consecutus, ut de calamitatibus patriae vix ad me pertingeret; ceteri volupstatem ex incolunitate corrumpit dolor ex dedecore, veluti dulcissima patria meum solius commercium aspernante, quaecumque penitus occumbere bonus quisque optaverit. Sed pensavit felicitatem propriam calamitas alia, longe a bello publico distincta, communis mihi cum fratribus meis, quam privatus nobis hostis atrocissimus intulit, cuius ego conatibus ut socias fraternasque manus opponerem, petita absentiae venia Lincio sum profectus in Wirtembergiam (dicit matris suae causam forensis), jussa uxore cum familia me Ratisponam usque sequi, ut ea et extra periculum incommodorum belli et mihi propior esset: praevideram enim annum fore meam absentiam. Eo in itinere scripsi de eclipsibus; comparaveram etiam me Stuccardiae jussu Principis ad observationem eclipsidis, sed nubes sub ipsam auroram ejus diei subortae nostram elusero cupiditatem et diligentiam. Quod vero aliter paulo expressi schema hujus eclipsidis in Epitome Astr. Cop., id inde est, quia numerus digitorum in exemplari eclipsium Germanico vitiose expressus fuit, quippe in transitu ex carta et calculo antiquiore. Habeo sane, quod desiderare te significo, librum, in quo eclipses omnes ab anno 1572 observatae, cum observationibus meis, Tychonis aliorumque et cum calculo restitutionis meae ultimae (cfr. vol. III. p. 350 st.). Non ulla tamen mihi suppetit occasio imprimendi, priusquam conquiescant hi motus Germaniae. Quodsi miseris totam et hujus eclipsidis anni 1621 et ceterarum etiam observationem, augebis ea re mihi et voluptatem et laborem; semper haec duo permixta percipio.

Nageli nonnulla legi, at non ea, quae contra Tychonem. Carco et illius et Severini (Longomontani) et tuis scriptis, praeter aliquam disputationem de motu magneticis. Si autem annos plures edidisti disputationem de cometis, eam me vidisse puto; nam sub tuo nomine in chartis meis de hac materia

editum invenio nihil, adeo ut ambigam, num quae sunt ab Hunuichio (rectore gymnasii Stettinensis; scripsit de situ, quiete etc. Terrae), ea tibi per hallucinationem attribuerim eaque hallucinatio mihi sit in memoria.

Reliqua quae de cometa anni 1472 seorsim concepta in adjecta charta includo, ut faciam scripturae compendium. Vale meque amare perge.

Lincii propriis conjunctionis magnae, cujus in descriptionem popularem, anno 1623.

T. Exc. off. coleus

J. Kepler.

Quam dicit Keplerus chartam adjectam paucis diximus vol. II. p. 828, reliqua reservantes ad libros Kepleri de Cometis.

Ex Crügeri responsione (d. d. 25. Sept. 1623) haec desumimus: Quid vivis, excellentissime Vir, quod vales, quod omnia tibi sarta, tecta et felicia, tam gavisus sum, visis tandem literis tuae manu exaratis, quam toto hoc quinquennio vicem tuam falsis ut jam video coloribus mihi depectam anxie dolui. Deus porro te rei astronomicae servet et Alphonsum aliquem tibi largiatur.


Gratias habeo pro communicato tuo discursu de ζ , η , θ . Video te illo ipso tangere vates numerales, quorum praecipuus, quos quidem vidi, Nagellus est (cf. vol. IV. p. 173). Cujus quidem contra dyptemata et instrumenta Tyehonica nugae (id. nominis omnino merentur) cum nondum videris, mitto tibi „Fundamentum ejus Astronomicum“ in me conscriptum et vero etiam rescriptum mense, quin et exemplum epistolae meae, qua motus fundamentum illud suum conscripsit. Mitterem et Uranodromum meum cometicum et alia, sed veror, ne portorium superet scriptorum dignitatem. Quam vidisti disputationem de cometa, anno 1605 me respondente praeside Keckermanno habitam, eandem in Uranodromo ipse examino ac publice sententiam meam, eo tempore juvenilem et male fundatam, rejicio. Quod Astronomiam Danicam nondum habes, invitus abdo; per Borussiae unus noster bibliopola jam supra 30 exemplaria intra annum divendit, constat 2 thaleris.

Hic addit Crügerus descriptionem eclipsiae, quam Keplerus petierat (plures Solares nec Lunares se non habere dicit Crügerus), et judicium expetit de cometa „Regiomontano“, de Straussio aliaque aliis locis inserendis, et sic concludit: Vale Vir eminentissima et hunc tabellarium, si potes, nunquam hac literis vacuum dimitte. Vive, vale et flore in emolumentum rei astronomicae. Cum tabellarius scriptum meum de cometa nupero non invitus secum portandum recipiat, ex id adjungo.

Kepleri responsio ad literas Crügeri anni 1623 priores data est d. 18. Febr. 1624 et hic incipit: Salutem et felicitatem novi anni auspicia precor, Clarissime Vir, amice honorande. Tabellarii bujus consueti conspectus me admonet, ut te paucis alloquar.

Proximis me literis monuisti de Christiani Longomontani Astronomia. Dedi igitur operam, ut eam Frankofurto haberem. Dici non potest, quam ejus lectio me exhilaraverit, cum multas alias ob causas, tum praecipue propter ista, quod si quam habebit invidiam redargutio observationum Ptolemaei, eam mem ille prior in se suscepit, quod meditationes suas de partibus astronomiae, quas Tycho Braheus non ex professo est adortus, in luce posuit prior, quod epochas creationis mundi nititur in locis zodiaci conspicuis collocare: ubi non potest me non delectare consensus noster tacitus. Nam quid ego moliar simile, vides ex Epitomes libro VII. et ex Mysterio Cosmographico recuso ejusque notis ad caput ultimum (vol. I. p. 186). Quae si non anno 1621. Frankofurto essent impressa, poteram videri faicem in alienam messem mittere, dum post Longomontanum eadem tento. His de rebus ego nunc tanto libentius scribo, quia hic praecipuus meus hoc tempore labor isque immensus est, dum ex altera parte cum erroribus observationum antiquarum confictor, ex altera ad epochas creationis enitor. Hunc unum scito pugnae nodumque moramque, quo minus Tabulae Rudolphinae prodcant. Ecce summam eorum, quae hactenus iudagavi: mira ratio, omnes quidque circa partes 8 signorum cardinalium situs deprehendo motibus suis mediis, et aphelium η in \cap , aphelium

Fig. 1.



M in \odot , aphelium \odot in M . Sola luminaria exactissime obtinuerunt ipsa puncta, \odot 0° M , idem \odot 0° \odot motu medio; at \odot 0° \odot motu vero, aphelium \odot 0° M , \odot 0° \odot . (Eclipsis in Africa totalis in meridie seriae 1, quae fuit matutina in India; credo, haec eclipsis Aethiops nigros fecit.) Aphelium \odot intermedio loco inter γ et \odot , aphelium \odot intermedio inter \odot et M . Vides crucis omnia quatuor brachia esse insignita, \odot \odot altissimum humillimo in una diametro, in altera M \odot , \odot \odot , \odot \odot , in

intermedia quatuor intermedios, sicut M \odot in M intermisso medio \odot , sic \odot \odot in \odot intermisso media \odot . Imo ut altissimus \odot est \odot humillimo \odot , sic pene altissimus M est \odot pene humillimo \odot , et tertius a summo \odot tertio ab imo \odot . Illud miror valde, quid causae sit, quod luminaria 8° anticipant ceteros. Tento identidem vim asserre et omnes 5 redigere ad mera signorum initia. At hoc si fecero, in M ultra 2° anticipo Ptolemaicas observationes ¹⁾.

Hos igitur ludos nobis fecit creatrix sapientia, in quibus ego nunc pene oculos ipsos computando perdo. Quicquid agam, observationes Dionysianas in \odot et M , partim etiam in \odot non assequor, calculo ab epochis Tychonicis per epochas Ptolemaicarum observationum sursum directo: Aut igitur observationes Ptolemaei insigniter aherrant, aut dies Dionysii anni non omnino omnes competunt in dies anni Aegyptii assignatos a Ptolemaeo. Nam observatio \odot Dionysiano quatrinduo aut minimum triduo maturior fuisse videtur. Scilicet mire se torsit circa hunc annum, ut appellat, coelestem. Ex Gemino saepe facile colligas, difficillimum fuisse Hipparcho, dies illos mensium coelestium citra errorem connectere cum diebus Aegyptii anni. Sed et in Ptolemaeo tria puncta cardinalia, duas \odot et unam \odot observationem, opines in dies antecedentes competere existimo. Nisi essent observationes Lunae, quae non patiuntur saliere diem, crediderim, pcrasque etiam antecedentium in dies priores reponendas, propterea quod Censorinus annotavit, anno 1. Antonini diem 1. Toth non in 20. sed in 21: Julii fuisse, unde colligas, luxationem anni Romani esse factam ob superstitionem aut adulationem, ut aliquando prius etiam est factum teste Dione, restitutione facta anno sequenti. Igitur si haec luxatio post observationem ultimam \odot in Aegyptum nuntiata ibique recepta in usum fuit, cum jam esset abolutus usus anni Aegyptiaci, potuit Ptolemaeus decipi.

Has ego difficultates tibi, clarissime Crügere, propterea refero, ut jam cum hoda tua venia petitionem aliquam subiungam. Cum enim desertus sum a sociis omnibus, cum Maestlinus consenuerit nec ullis machinis vel ad uni-

eam epistolam scribendam adigi possit, vehementer abs te peto, uti me aliqua oneris parte subleves observationesque 3 planetarum Ptolemaicas tam ex ipsius tabulis, quam ex Prutenicis computatas occasione proxima ad me mittas, ut videam, num ipse omnes suo calculo exprimat, sicut eas assumit. Assumit aliquas contra manifestum tenorem verborum observatoris, quae ipse recitat; in ☿ est inter Dionysianas vitiose positus 30. Phamenot sequente 1, pro 30. Meebir sequente 1. Phamenot; in ♀ etiam est alicubi 14. Antonii perparum, pro 4. Antonii. Si quid hujus jam dudum in parato haberes, posses Vra-tislaviam mittere ad mercatores nostros, Lincianas nundinas frequentaturos.

Conclusionis loco impertiar te conspectu calculi. Sit locus longitudinis ☿ eccentricus a 0° γ collectus usitata via

$$2^{\circ} 22' 46'' 23''$$

$$\text{Aphelii } 5. 12. 44. 40$$

$$\text{erit anomaliae compl. } - 79. 58. 17.$$

Sed ex tab. aequat. ☿ anom. media 79. 41. 31 dat conseq. $74^{\circ} 19' 18''$. Ex eadem tabula dist. ☿ 525320.

$$\text{Residuum } 16. 46$$

$$127500$$

$$2180$$

$$129680 \dots \dots \text{dat } 16. 25.$$

$$\text{Ergo conequata absoluta } 74. 85. 43.$$

$$\text{Aphelium } 162. 44. 40.$$

$$\text{Ergo locus ☿ eccentricus } 88. 8. 57.$$

$$= 28^{\circ} 8' 57'' \text{ II.}$$

$$\text{Verus locus } \odot \dots \dots 7. 20. 22 \text{ III.}$$

$$\text{Angulus commut. } 69. 11. 25$$

$$\log. 525320 \dots = 165884$$

$$\log. \text{dist. } \odot \text{ ex tab. } \dots 130$$

$$166014 \text{ dat arcum } \dots \dots 10. 57$$

$$\text{Residuum } 58. 14. 25$$

$$\log. 58^{\circ} 14' 25'' = 16210$$

$$182224 \text{ dat arcum } \dots \dots 9. 18$$

$$(\text{aufer a } 69^{\circ} 11' 25'')$$

$$\log. 59^{\circ} 53' 25'' = 14485 (\text{adde ad } 166014) \dots 59. 53. 25$$

$$180499 \text{ dat arcum } \dots \dots 9. 28$$

$$(\text{aufer a } 69^{\circ} 11' 25'')$$

$$\text{Residuum } 59. 43. 25$$

$$\log. 59^{\circ} 43' 25'' = 14654 (\text{adde ad } 166014).$$

$$180668 \text{ dat arcum } 9^{\circ} 27', \text{ proxime aequalem priori.}$$

Ergo prosthaphaeresis orbis est $9^{\circ} 26' 30''$, addita ad locum ☿ eccentricum $28^{\circ} 9' \text{ II}$, constituit $7^{\circ} 35' 30'' \odot$, locum visum.

Ita vides, mihi non opus esse tabula prosthaphaeresium orbis; nam proportio laterum ☿ ☿, ☿ ☿ levissima opera formata, quae est 166014, indicat statim in canone logarithmorem, quanta sit maxima hujus loci prosthaphaeresis orbis, sc. $10^{\circ} 57'$, tunc scilicet, si angulus commutationis esset 90° et $10^{\circ} 57'$ ($100^{\circ} 57'$). Qui ergo perpendit, $69^{\circ} 11'$ multo minorem esse quam $100^{\circ} 57'$, statim is ab initio minus aliquid subtrahit, sciens, prosthaphaeresin orbis non esse maximam; ita non erit ipsi opus quadruplici additione et divisione. Et tamen etiam via haec est multo expeditior

quam venatura partis proportionalis per eruciformem multiplicationem logisticam. Nulla plane opus est multiplicatioe, neque simplici neque logistica, nulla etiam proflixa tabula, praeter consuetum canonem logarithmorum, qui propter usum multiplicem omnibus debet esse notus.

Sed desino, nam et tabellarius desinit convivari jamque parat abitum. Et quia tempore excludor ad affinum meum scribere, tabellarius vero affirmat, te cum affino meo quandoque coaversari familiariter, rogo mihi siq ad ipsum internuncius salutis ipsi a me suisque omnibus dictae. Simul adde; ex relatu tabellarii nos habere, ipsum esse in re lantissima, ut qui in annos singulos 800 florenos expendat nomine solo locationis aedium, praetereaue aedes jam emerit pro 15000 florenorum. Haec, inquam, nos interim credimus tabellario, ipsi vero, si vera sunt, gratulamur. Vale et rescribe.

Cl. Dominationis Tuae officiosus

J. Keplerus.

Has literas scripsit Keplerus antequam accepit literas Crügeri, quas bis praemisimus. Ad illas sic respondit d. 28. Febr. 1624:

S. P. D. Clarissime Vir et amice. Vix triduum est, cum distessit a me tabellarius Olomucensis cum meis ad te literis, cum ecce alium tabellarium Viennensem cum tuis, 25. Sept. superioris anni scriptis et cum munusculis et cum Imperio, ne vacuum a meis literis dimittam. O nullum gravius probrosiusque mihi unquam impendeat servitium. Pareo ecce perquam iubens epistolamque tuam a calce retexo et a capite; gratiae namque utrumque obsident aditum. Gratam inquam famam de Straussio nostro, sed quaero vicissim qui fiat, cum is apud te transiverit, quod de fortuna mea nihil tibi? Atqui Tubinga et Stuccardia nos junctos dedit anno 1621, et noverat is optime, quibus ego furis, in familiam meam saevientibus, in Wirtembergiam essem accitus. An et hoc silentium ex amico pectore, ne, si vera reperirentur crimina intentata, dedecus ille forte meum ex domesticis propalaret? Sed et fratrem meum germanum vidisti, non consilium solum omnium, sed praecipuum dolorum meorum partem, ut qui impatientia juvenili, forsitan et credulitate, proxime impietatem venit. Sed diluit et illius suspiciones et meas offensiones clarissima lux veritatis, crimina conficta in caput hostium, quanquam non exiguo meo labore sumtuque regesta, liberata domus nostra periculo, nos infamia et ignominia. (Circa finem epistolae haec addit Keplerus: Straussium nostrum per opportunum nuncium meo nomine saluta et siquidem adhuc haeret in opinione probati criminis, quod meis intentatum novit, secundiarii nuncio exilara ex hujus epistolae vestibulo. Crügerus his adscripsit: Straussius id jam a fratre Kepleri rescivit.)

Cum Nagelianum genium intus et in cute noverim ex pauculis ejus charitis dudum lectis, epistolam tuam ad illum cum aliqua ira, „fundamentum“ ipsius ingenti cum animi fastidio legi, nec sine vocali expostulatione tecum absente accessi ad lectionem rescripti tui: adeo te negligentem esso famae decorisque tui, qui cum palinam hoc tempore obtineas acuminis mathematici, non reserves existimationem tuam censurae potius mearum et Severini nostri lueubrationum, sed in certamen hoc lululentissimum te demiseris, ubi sententiae vanissimi disputatoris non pauciori numero volitent nec melius cohaereant, quam atomi Democriti. In vas plumis refertum insulisse videris, ut cum his pugnes, cumque ne guttam quidem sanguinis profuderis, oculi tamen et nares et fauces ipsae turpissima congerie obruantur. Hac igitur te partem indignationis meae justissimae impertiri volui, ne solus doluerim; sed tamen et recreatus nonnihil fui, progressus in lectione rescripti tui, quippe in quo multa

Crügero digna (Nageli libelli, contra quos Keplerus invehitur, prodierunt anno 1619—22: 1) Prognosticon astrologo-harmonicum super tres vel plures etiam annos copperscriptum. Ausführliches Prognosticum etc. darinnen erwiesen wird, in was für harmonia die revolutiones erfunden werden etc. 2) Complémentum Astrologiee und ausführliche Erklärung des fünf-jährigen prognostici etc. 3) Deutsche Astrologische practica. 4) Astronomia Nagelliana. 5) Trigonus aureus, was derselbe hervorgebracht in vergangenen Zeiten etc., beschrieben durch Paulum Sonnenschain. Crügeri responsiones prodierunt annis 1621 et 1622 Inscriptae: P. Crügeri Send-Brief an den achtbahren und wohlgeliebten Herrn M. Paul Nagellum, weltberühmten Theologastronomum Cabalopocalypticum in Melpsen, et: P. Crügeri Rescription auf M. P. Nagels Buch, dessen Titel: Astronomia Nagelliana).

Imprimis gratias ago pro eclipsis Solaris observatione. Jam enim per cam ad reformationem tabulae Europae propius aspiro, nec plus quam una talis observatio ex Lusitania mihi deest. Nam Byzantio aut ex Peloponneso talis quid sperare Imperiti est. Si tamen ex certo relatu Polonorum vel Rensorum etiamque Moscorum et Lithuanorum aliquas contuleris notitias intervallorum itinerariorum, et quibus infractibus ad quamque urbem perveniat, et gratum habebō et nomen tuum inter auctores meos referam (in Tab. Rodolphinae). Sed id posterius, nunc enim non obuiam nec hac mentione ebliteratum eo petitiqum, prioribus literis comprehensam, de observationibus Ptolemaei ex ipsius calculo computandis. Sed provolat eni animus, acerbitate incitatus, ad vindictam de te mendum.

Quae his verbis spectat Keplerus, referenda sunt ad disputationem inter Crügerum et Keplerum ortam de cometa "Regiomontani", quem libellus de Cometis reservandum supra diximus. Deinde pergit Keplerus: Sed missis erraticis hisce sideribus, quae dudum disparuerunt, ad aeterna nostra revertamur. Pro tua enim eclipsae observatione gratias tibi referre cogito transmissio meo calculo, qui sic habet:

Pro loco Solis: currente 1621. 17. Jun. h. 10. 5' 30" ☉ in 6° 5' 26" ♊.

Dies eclipsis 10. Maj. h. 20. 35

Intervallum dies 37. h. 15. 30 — 35. 48. 17. (☉ diurnus 57' 26")

☉ in 0. 17. 9 II.

Pro loco Lunae:

ante finem a 1620 dies 14. 13. 29' 56" — Apog. 10. 21. 57. 30. Nodus 5. 15. 46. 45

Dies de 1621 — 129. 20. 35

144. 9. 53. 56.

Revoluciones V. 137. 18. 32. 55

0. 15. 20. 59. — 0. 7. 17. 44

Tempus anom. 6. 15. 25. 1

2. 22. 19. 41. — 19. 4

Horarias fictas 32. 37

13. 36. — 2. 3

subt.

Locus ☽ 1. 29. 51. 46. Nodus 8. 8. 7. 54

Reductio 2. 7. ☽ 1. 29. 51. 46

(Verns horarius est 33' 24", excedit ergo fictum 47"; quare hinc portio 18", compentens intervallo 29' 16", augeat id intervallum, ut sit ☽ vere in 29° 53' 55" ☽ eclipticae.)

Locus ☽ eclipticus 29. 53. 53 ☽; ☽ a ☉ 8. 16. 6; lat. 45' 46" sept.

☉ 0. 17. 9 II.

Intervallum 23. 15 (16).

Pro parallaxibus in horizonte Dantiscano, qui habere dicitur alt. poli 54° 23', distare vero in ortum Uraniburgi 26' 30" antus horas:

Tempus medium Uranib. h. 20. 35 — tempus anomaliae 6. 15 1/2, dat

Aequatio temp. mea 16. 41" parallaxis ☽ 80. 40

Tempus apparens 20. 51. 41 ☉ 0. 59

Diff. merid. 26. 30 Diameter ☽ 15. 36

Tempus app. Dantisci h. 21. 18. 11 ☉ 15. 4

Summa 30. 40

*) Hora Ula hic fuit accurate meridiana Uraniburgi, qua hora datus competere conjunctionis contraham in loco alio.

Kepleri Opera VI.

Asc. R. Solis 58 ^a 6'			
Tempus in gradus convers. 319. 33.			
Asc. recta med. coeli	17. 39.	Latus aequat. 72° 21',	log. 4892.
Asc. obliqua horoscopi	107. 39.	Altit. aequat. 35. 37,	log. 54067, antilog. 20711
Altitudinis puncti aequin.			log. 58889, antilog. 18403
			2308
Angulus veri. cum aequatore	77. 44		
Aufero obliq. eclipticae	23. 31		
Angulus cum ecliptica	54. 13	log. 19685	
Altitudinis nonagesimi		antilog. 31450	log. 38088
Latus eclipticae	49. 28	log. 27439	
Complementum	40. 32		
Nonagesimus	10. 32		
) in	29. 53. 35		
) a nonagesimo	19. 21. 35	log. 110400	
Parallaxos) a ☉		log. 405400'	405400
Parallaxis longitudinis	14. 24	547250	443488, parall. lat. 40' 45"
Visa longit.)	0. 7. 59 II	Vera lat. 45. 40"	
At ☉ in	0. 17. 9	Visa lat. 4. 56 sept.	
Intervallum	9. 10, ergo sequitur ☉ centralis.		

Alius fortasse libentius cum asc. obl. horoscopi transibit ad tabulas asc. obli-
quarum angulique eclipticae cum horizonte, quas iunctim do in Rudolphinis ad omnes
gradus alt. poli integros. Mibi ipsa tabularum multitudo est onerosa, praesertim cum
recurrendum sit cum alt. nonag. deprehensa ad logarithmos et cum scrupulosus com-
putator plerumque se cruciet inutiliter cum partibus tabularum proportionalibus. Ob-
servabis autem, in tota operatione nullum apicem esse praeter add. et subtr., qui non
sit transcriptus ex tabulis sine molesta excussione partis proportionalis.

Habes omnia *deductura*; computa igitur, si vis, ad h. 20. 30 $\frac{1}{2}$ ' apparentem, additis
ntrisque latera antilogarithmis et summa quaesita in canone. Invenies distantiam
centrorum aequalem summae semidiametrorum, quaesita basi trianguli, cujus unum
latus est differentia longitudinis ☉ et ♄, alterum latitudo ♄ visa, quae tunc erit
5' 16" sept. Sic, ad h. 23. 2 $\frac{1}{2}$ ' invenies finem latitudinis 5' 38" sept. visa, et ad
h. 21. 44' invenies ☉ centrorum in longitudine, latitudine visa 5' 30". Itaque scrup.
def. 25' 42" (log. 84780), duplum diametri 62' 24" (log. 3940), ergo digit. 9. 53
(log. 88720 = 84780 + 3940). Tuo durationem tuam exactissime, deficio a quanti-
tate tua minus semisse digiti, sed Danisco videtur addendus 1° longitudinis. Obser-
vavit hic M. D. Hilderus (hujus loci minister ecclesiae primarius, sed ab officio jam
suspensus imperii magistratum pontificiorum ob societatem criminis rebellionis ante
tres fere annos in ipsem etiam congestum, nec tamen probatum), observavit, inquam,
initium nec ultra potuit ob nubes et pluviam, sed nec merum initium vidit, sed fortivo
aspectu digitus abesse visus in alt. ☉ 36°. Hoc quoque tuo egregie, sane meridiano
nostro h. 0. 10' plus in ortum, quam Uraniburgico. Putzbachii, Landgraviorum Hassiae
oppido inter Francofurtum et Giessam, visus est solis finis et paulo post alt. ☉ 51° 4'
quadrante sescubitali aeneo, h. 9. 56'. At Stuccardiae, ubi tunc eram, et Tubingae
et, quantum fando accepi, per totam Germaniam post disturbatam serenitatem illo ipso
matutino nubes ortae et pluviae, qui naturae sublunaris stimulus etiam vobis ventum
illum vestrum et pluviam finita eclipsi dedit, quando nobis in Wirtembergia serenitas
restituta fuit. Erat illo meridie mihi talis coeli facies: h 5° 12' ☉, ♄ 2° 49' II,
♂ 9° 8' III, ☉ 0° 25' II, ♀ 15° 15' ♀, ☉ 20° 6' ♀, ♄ 1° 46' II. Nullus igitur
aspectus praeterquam Lunae defluxus a ♀ ☉ die priori ad ☉ ☉, ☉ 24; quid si
igitur statio ☉ hic fuerit? Nam d. 26. 27. 28. nulla notabilis fuit commotio, tantum-
modo nebula; an sufficere dicemus ☉ in vicinia ♄? Fuit d. 31, et terrae motus in
Burgundia superiori.

Vides optime Crügero, non statim tibi confugiendum esse ad fallacias opticas, quae Lunae orbem in septentrione minuant plus quam in austro, quod per se absurdum; cogita. Nullus major naevus in Longimontani Danica Astronomiâ. Atqui causarum, ad quas confugero posses, magnus est numerus. Inspice librum meum VI. Epitomes; iuvenies angulum latitudinis in copulis non $4^{\circ} 58\frac{1}{4}'$, sed $5^{\circ} 18'$; quippe perdurat hic angulus, quoad Luna a copulis excurrerit in quadraturas. Sic addendum loco nodi hodie $25'$. Temporis etiam aequatio mutat parallaxes celeriter estque adhuc dubia, sed hac vice, ut et 1612. et 1614. egregio respondit observatis. Quin etiam in reductione peccari potest facile. Atque ego non recte fecissem, si maximam obscuratiorem in ipso articulo conjunctionis centrorum secundum longitudinem statuissem, nisi accideret ob parallaxes, ut latitudo visâ totâ durationis tempore maneat eadem. Alia vero vico angulus visâ itineris Lunae, et eclipticae est oppido magnus et, ni fallor, anno 1598. 16^o, tunc discrepat punctum obscurationis maximae a puncto conjunctionis visibilis secundum longitudinem. Plures sunt causae, sed haec sufficiant. Vides, Longimontanum paulo morosioresse, esse, qui non vult ferre novationes in hypothesebus orbium et motuum Lunae a se constitutis apud Tychohem. Nam, si nescis, me petant factio meo quidem nomine probra illa, quae ipse coniecit in eos, qui aliquid in Lunam tentant post ipsum. Actum hac de re inter vos per epistolas ante multos annos; acerbe mecum expostulavit (cfr. vol. III. p. 32. 704); sed nihil moveor, scio enim, ubi viderit recusas a me hypotheses Lunae in Epitome numerosquo tabularum Rudolphi tentaverit, ipsum tandem mihi manus daturum. Certe quidem est, cur summopere admiretur, potuisse omnia, quae hactenus credebantur esse menstrua, a me fieri annua, et hoc salvis quantitatibus arcuum Tychoheis intra 4 vel 5 minuta, quod hanc quidem dispositionem attinet. Maestlinus etiam ridero solitus est meos labores, dum omnia, etiam in Luna, ad causas physicas traheo. At hercle, haec sunt meae delleiae, laborum solatia et gloriatio praecipua, quod successerit mihi. Quid non dicent in me, qui, proportioni orbium antiquae Solis et Lunae assueti, viderint a me triplicatum esse intervallum Solis et Terrae, ubi parallaxis Solis non sit major uno minuto. Nam in nullo censu habeo Nagelium cum suis 42 hebdomadibus, Lunae transscriptis, quae mihi utique sunt $59\frac{1}{4}$. Licetbit illi per me, alium etiam modum applicationis, aliud in Luna subjectum per 42 mensurabile, quam distantiam Lunae et Terrae, et si Diis placeat, alium etiam orbem Terrae maiorem nostro comminisci, cuius diameter contineatur 42^{ies}. Non perpendunt, Ptolemaeum eum Hipparcho nihil aliud praese se ferre, quam quod intervalla illa antiqua ex eclipsibus extruxerint, quannquam ridicule Ptolemaeus ex praesupposita latitudine Lunae et aestimatione digitorum fallaci (ob multas causas) extruxit diametrum Lunae visibilem, qua deinde reliqua est dimensus. Mihi sufficit hoc, quod haec omnia intervalla, utcumque enormia visa et a priori (ut Nageliana) deducta, salvent eclipses ut quod maxime. Quantum igitur, Deus bone, laborum huius, quoties hypotheses Lunae immutavi, ut eclipses fuerent? Naqno tamen unquam successit feliciter, quam postquam hypotheses litas a priori constitui. Sed nolo transcribere librum IV. Epitomes integrum, lege, quaeso, et pondera aut cum Nagolio mensura et numera. Qui etiam auctor esto Longimontano, ut no lectionem ejus rospuat. Nam si alias aliquis praeter mo hoc ipsi suggerat, iudicium ejus instanter requirens vultumque mei studium praese se ferens; facilius permovebitur. Illud etiam oscitatione commisit, quod polum eclipticae in circello quidem circumducit, cum aequinoctiorum protha-

phaeresin exstruit, at cum latitudinem fixarum computat, polus eclipticae manet ipsi in circuli diametro, rursus prorsumque libratus. Sed hoc *veniam* meretur, cum res sit incertissima de mutatione obliquitatis eclipticae; quae res effectit, ut ego ipse quoque praeter librationem simplicem quinque alios modos solutionis poli eclipticae in circumferentia circuli, quorum unus est in Epitomes libro VII, congresserim in Rudolphinas, necdum tamen constitui, an omnes in tabulis juncim publicandi. Ptolemaeus quidem simulat, se observando idem deprehendisse, quod Hipparchus. Quid si extremitates umbrarum consecutus est, mensus sc. a supremo margine Solis aestivi vel puncto proximo ad imum marginem Solis hiberni, ut quantitatem eliceret, qua certo non sit major distantia tropicorum, et ne cogeretur, Hipparchum deserere propter dissensum observationum suarum, quae per se subtiles esse solent et lubricae? Jam Hipparchus proprias non allegat observationes, sed allegat Eratosthenis, ut fide dignissimas. Quid vero Eratosthenes? Intervallum umbrarum aestivae et hibernae comprehendit circino et cum hoc intervallo perambulavit totum circulum undecies atque, se cum octuagesima quarta repetitione reversum esse ad initium, ut sic 83 intervalla aequentur 11 circulis. Nunquam mihi successit cum semidiametro, ut, 6 earum per circumferentiam emensus, cum pede circini uno in primum punctum reverterer, cum tamen haec commensuratio nitatur demonstratione certissima. Sed esto, praecelluerit Eratosthenis manuum dexteritas; quis nobis sponsor existet, non deceptum esse Eratosthenem in numerando? An non praesagit tibi animus, illum numerasse a puncto distantias umbrarum posteriori, reversum vero esse ad punctum ejus prius, nec adaumerasse distantiam umbrarum ipsam per oscitantiam, tanquam id, quod 11 circulos mensuraret, non sit et ipsum pars mensuranda, aut quod non vidit, se primam unitatem jam fecisse, priusquam cum primo pede circini excederet e vestigio umbrae alterutrius, sed primam illam unitatem reputavit, quae ab umbrarum intervallo tenderetur, porro ultimam, quae ad idem umbrarum intervallum pertingeret in ejus termino priore? Valde confirmat hanc suspicionem, quod pars 84 de 11 circulis seu 3960 gradibus est $47\frac{1}{7}^{\circ}$, et sic obliquitas eclipticae $23\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{14}$, h. e. paulo plus quam $23^{\circ} 34'$. Jam non opus tibi esse puto hac admonitione, quod testimonium a latitudine fixarum sit testimonium nullum. Nam prius observando pervenimus ad declinationes fixarum interque eas ipsius Solis in solstitio. Si ergo limes iste zodiaci in aliquo globo attollatur ultra modum, resultabunt fixarum latitudines, ad zodiacum expensae, vitiosae. Quare hoc solum testantur latitudines fixarum Ptolemaicae, in globo quidem Ptolemaei zodiacum altiores seu obliquiores fuisse; de ipso mundo non validius est testimonium ab omnium fixarum latitudinibus Ptolemaicis, quam ab unus Solis altitudine meridiana utraque. Sed haec eadem, si bene memin, Longimontanus quoque in Danica sua disputavit abunde. Satis igitur de hoc.

Jam et spicilegium aliquod sequamur ex literis tuis. Falsos illos colores, quibus mea hujus quinquennii fortuna tibi depicta fuit, rogo mihi describas mihi hanc voluptatem ne invidcas.

Quae haec sequuntur partim pertinent ad libros de Cometis, partim agunt de Naeleto (IV. p. 173), et de Calendaris (I. 659 ss.).

Crügerus respondit d. 15. Julii 1624, cumque in hac responsione multas insint quaestiones de diversis rebus astronomicis, ad quas singulas Keplerus longiori epistola respondit (in codice Pulkoviensi 12 folia integra continet haec epistola, Kepleri manu scripta), quaestionibus Crügeri interponenda esse judicavimus Kepleri responsa eadem ratione, qua prioribus voluminibus talia sumus.

Crügerus: S. P. Beasti me, Clarissime et Praestantissime Vir, delictis tuarum litterarum, 28. Febr. datarum, quibus (4. Julii demum acceptis) ego reddere parus; ut maxime velim, non possum, tenuitatis meae mathematicae sat mihi conscia. Quod possum facio, saltem ut videas animum erga te gratum, cui tua communicasse te non poenitet.

Primo omnium ad mathematicas. Reprehendisti me, quod et alii fecerunt, ob refutatum Nagellum, sed et exiisti tuo exemplo. Non potui ferre vel vulgi vel etiam litteratorum quorundam vellicationes, Nagelium nisi principis quasi divitiis, astrologiam usitatum, imo astronomiam Tychonicam nullius esse valeris. His itaque semel discussis hominem, etsi adhuc hodie multa crepitantem, valere jussit, et nunc, quod exigit, acumen (si tibi placet, quod tibi loqui libet) mathematicum examinandis tuis et Severini scriptis appellerem, si datum esset. Egone, qui destitutor observationibus, otio, ingenio, tantae molis pari, summorum hoc tempore astronomorum censum labores, quos longe sequor et vestigia semper adoro? Felicem me praedico, quod alter amicitia mea non dignum aestimet; alterius etiam (nondum enim nulla mihi vel per litteras cum Longomontano notitia) amicitiam me insinuare vellem, si modo scirem, non iulque latorum dubia quaedam eaque non pauca, ex ipsa Astronomia Danica hanc inde mihi collecta, qualia si in tuis, Vir humanissime, deprehenderem, jam pro compta inter vos clucra amicitia in sinum tuum effundere non formidarem. Et satis jam audacter tua benevolentia otor, et audaciorum ea me facit in dies, itaque et haec literis quasdam libera praefari non erubescio, spe veniae, quam tuis abunde mihi spondeas.

Eclipsium Solis quod ex hypotesi tua quam proxime conformem observationi meae supputare potueris, eisdem initio valde mirabar, siquidem ego e Supplemento Ephemericarum Magini, quo et bisectio Solis eccentricitas Tychonica et semidiametrorum tabella ad meum tuam conferta continenter, eandem longe majorem supputaveram. Sed jam calculum conferenti prodidit se statim latitudo Lunae, tam vera quam visa, major mea. Excessum deinde latitudinis verae vidi oriri partim e promotione nodi, partim e mutata eccentricit Lunaria obliquitate, quae tibi in copulis maxima, Tychoni minimis. Habes et alia in lunariis a Tychone diversa. Proinde facile cedo, tu modo vide, ut postmodum hypotheses tuae respondeant observationibus eclipsium, non harum modo, sed quot aut fuerint (a Tychone, Ptolemaeo observatae) aut posthac alibi erunt in annis. Equidem ingenue fateor, cum primum praefationem tuam in Ephemericarum anni 1617. legerem, non placuisse, quod pleraque in hypothesis lominarum Tychonicis immutaveris. Quo tandem, inquam, nos veritatem? Quoad vel quis tuis emendationum et limitationum? In Astronomica etiam Epitome, quam aride legendam arripui, vidi longe plura hactenus imoluta meque turbantia, quia intellectui meo difficilia: quare librum seposui, donec tabulae Rudolpinae, tot annos jam promissas, quarum etiam desiderio jam contabesco, forte lucem illis sint allaturae.

Keplerus respondit (9. Sept. 1624): Quas scripsisti ad me 15. Julii, Vir Clarissime juxtaeque amicissime, 7. Sept. accepi, ad quas tanto libentius respondeo, quanto tu majorem his literis accessidum fecisti ad spem meam, fore ut haec nostra per litteras conversatio non sine fructu republicae literariae continueretur. Nec pluribus ambagibus usus ad res ipsas accedo, quarum prima est de calculo eclipsium. Quod igitur mones, ut hypotheses istae meae (nam in minutis bisce meae sunt, in rei summa Tychonis) observationibus eclipsium respondeant, confirmo ego tibi, nihil hac cura me prius, nihil antiquius habuisse. Jam enim anno 1622. Novembri exhibui Caesarianis consiliariis libellum, in quo eclipses Lunares 50, partim a me, partim a Tychone inde ab anno 1572. observatas, gemino calculo examinavi. Tychonico et hoc; si placet, meo, adjunxique comparationes membrorum calculi utriusque, in singulis eclipsibus summam rationis ingredientium (cfr. vol. III. p. 550 ss.). In rei summa propius ad scopum venit meus calculus exhibetque locis opportunis evidentia argumenta, recte a me susceptas esse mutationes. Quoad singulas vero eclipses, adhuc passim dissentiant articuli temporum, interdum usque ad horae quadrantem, quantitate vero partialium eclipsium interdum adhuc ulterius vellent extensas esse mutationes meas, ita ut suspirari cogar, opticus rationibus fieri, ut umbra Terrae propter interpositionem alienius diaphani inter Solem et Terram non plane diametraliter in illis enor-

mbus eclipsibus exeat a Sole; nisi tamen observationes in culpa sint, quarum quidem circumstantias examino diligenter adeoque et taediose. Illud etiam protritum jam est, ob easdem causas opticas, sed generis alterius, scilicet ob variam dispositionem astris, qui fusus est circa Terram, durationem morae in tenebris non respondere calculo. Jam habes bujus rei gustum libro VI. Epitomes. Denique hoc ego 4 vel 5 eclipsibus reddidi demonstrationissimum, umbram Terrae aliquot scrupulis aliter a fixis distare, quam Tycho-nicus Solis calculus fert, idque nunc in banc plagam, nunc in illam, perinde ac si motus Telluris per spatium aethericum vacillet (germanice: schwäwlet) ob causas aliquas physicas. Quo minus autem hoc in motu annuo Telluris vel Solis mirer, facit contemplatio ceterorum planetarum, praesertim Saturni. Nam si ad Ptolemaei tempora constituentur epochae ex observationibus Saturni Ptolemaicis ad nostra ex observationibus Braheii, emerget motus medius, qui observationes Regiomontani et Waltheri nequaquam repraesentat. Neque hoc fit respectu apogaei: nam observationes Waltheri, seorsim tractatae, dant apogaeum (aphelium) non valde dissentiens ab analogia temporum praecedentium et consecutorum, nec multo aliam eccentricitatem; at in motu medio mutant c. 40' per totum circuitum Saturni in plagam eandem. Quae res me consideratorem reddit circa censuram observationum Ptolemaei in aequinoctiis, ut, quamvis ingenti cum applausu legerim in Astronomia Danica, observationes Ptolemaei suspectas haberi circa diem aequinoctii, quamvis etiam Epitomes libro VII. occasiones quacsiverim, quibus decipi Ptolemaeus potuerit, quas occasiones etiam una lectio Censorii confirmat mirifice, tamen, ex quo Saturni epochas ad diversa secula contemplor, cautior fiam et in arguendis observationibus Ptolemaicis timidior. Non eo quidem usque procedendum puto, ut motui Solis sub fixis ad Ptolemaei tempora censeam adiciendum unum gradum extra ordinem. Satis bene concordat motus Solis medius et verus in planetis ceteris ad illa tempora, at axem Telluris, qui motu suo praecessionem aequinoctiorum causatur, jurare nolim interdum veluti saltuatim torqueri, etsi praeter hoc Ptolemaei seculum nullum est, ex cujus memoria possint bujus rei argumenta derivari, ut innui libro VII. Epitomes.

. Hactenus igitur de Lunaribus eclipsibus. De Solaribus ausim fere plura et constantiora polliceri, ut vides ex descriptione eclipsium Solis ab annis 80, cujus exemplar habes: nisi me una eclipsi anni 1614 sollicitum teneret, quae videtur paulo enormius anticipasse tempus calculi. Nullas omnino observationes omitto, quas habere potui ex quibuscunque locis. Qui sunt aliquae in 5 aut 6 locis observatae, quas omnes observationes examino. Hunc libellum statui partem facere Hipparchi, ante 20 annos promissi etc. (sequentia leguntur vol. III. p. 518). De futuris eclipsibus polliceri nihil possum; non est tamen, cur suspecta tibi sit fides hypothesis praesentis ex eo, quod eam nondum habes publicam. Tantum enim jam habes in exemplo, ut hypothesis, quae nunc est in chartis, si quando prodierit, ex eo agnosci possit.

Ais, te contabescere desiderio Rudolphinarum. Scias igitur, jam a duobus mensibus me per libellum supplicem id agere, ut, quia sunt eo usque absolutae, ut edi possint me praesente, Caesar igitur vel de suo vel de meo debito sumtus suppeditet, vel, quae tertia conditio consiliiaria in aures dicitur, dimittat me ad aliquem principem Germaniae, aut ad aliquam urbem imperialem, ad edendas et tabulas et observationes Braheanas et Ephemerides. Quod vero Ephoraeu seposuisti, usque dum tabulas habebas, id necesse non erat; Epitomes enim praeccepta manent pleraque possuntque exerceri siue


cognitione certissimarum epocharum. Quod ais, in Epitome multa occurrere intellectu difficilia captumque turbantia, id hinc Epitome primum non est partimque per accidens est, quia minus forte turbarent intellectum nunquam imbutum hypothesis antiquis.

Crügerus: Interim tamen non possum quin unum atque alterum te rogem. Cur prosthaphaereses computare doces ex areis triangulorum numeris adeo prolixis, cum possint per sufficientia dedomena et lateribus et angulis compendiosius? Fateor, me hoc non assequi et ignoti mihi nulla cupido.

Keplerus: Quaeris, cur prosthaphaereses computare doceam ex areis triangulorum? Respexisti procul dubio ad fol. 686 Epitomes (vet. editionis). Respondeo, quia institutum meum est, computationem deducere ex hypothesi causarum naturalium, sicut veteres deducunt eam ex hypothesi circulorum perfectorum motumque in his aequibulum vel quasi. Jam vero causa verae tarditatis et velocitatis planetae per auram aetheream est distantia planetae a Sole, fonte motus, major vel minor, area vero continet distantias omnes et area trianguli continet excessum distantiarum supra mediocres vel defectum. Illud demonstravi libro IV, hoc parte prima libri V.

Ais, prosthaphaereses posse computari compendiosius per sufficientia dedomena ex lateribus et angulis. Ego negavi hoc fol. 671 (lib. V parte I. N. 5) et adhuc nego. Proba ipse, recteque me dices negare. Ut si sit eccentricitas ut in Marte 9265. Primum in forma Ptolemaica sit eccentricitas aequantis 18530 et via planetae perfectus circulus, ut in Ptolemaeo: Datur igitur BE 100000, BC 9265, BA, itidem 9265, praetereaque DCE

Fig. 2.




ex tempore. In triangulo igitur BCE datur ECB et latera CB, BE (A Sol, B centrum eccentrici, C centrum aequantis, E planeta, ED perpendicularis in AC continuatam, AF perpendicularis in EB continuatam, si opus est). Ut igitur BE ad C, sic BC ad BEC (intelligo angulorum sinus). Haec est una multiplicatio, BC in sinum C. Jam BEC, ECB jungendi, summa subrahenda a 2 rectis, restat EBC.

Hinc EBA; et dantur EB, BA. Sive ergo jam opereris per ED, sive per BF, FA, inhoris aliquid nascetur, ut inveniatu totus CEA et EA distantia. In priori forma additur BEC ad CED et per BED exerpitur ex sinibus ED et DB, cui additur BA. Ut igitur ED ad DA, sic totus ad tangentem anguli DEA, unde subtractus DEC, restat CEA. Haec est secunda operatio; divisio scilicet. Tercio anguli DEA exscribitur secans; et ut totus ad hunc secantem, sic ED ad EA. Haec est tertia operatio, multiplicatio scilicet. Nec brevior, sed longior est via per triangulum ABF: in eo datur ABF, AB et F rectus; hinc duabus multiplicationibus habentur AF, FB, cui adde BE. Ut ergo EF ad FA, sic totus ad tangentem FEA, cui additus FEC, facit AEC prosthaphaeresin. Et ut totus ad secantem FEA, sic FE ad EA distantiam.

Secundo in forma Copernicana. Erit (Fig. 3) BC 13897 $\frac{1}{4}$ et CE 4632 $\frac{1}{2}$, daturque FBA ex tempore ejusque complementum CBA: ergo in ABC, ut plurimum obliquangulo, datur angulus B et circa enim latera CB, BA. Rursum igitur ducta perpendiculari AF in CB continuatam, per angulum B excerpuntur AF et FB, quae juncta ipsi BC facit CF. Ut igitur AF ad FC, sic totus ad tangentem anguli CAF, unde ablatu BAF relinquit CAB. Ut vero totus ad secantem anguli CAF, sic AF ad AC. Et quia cum CAF habetur et ACF

Fig. 3.



et complementum ACD, additus DCE facit ACE daturque CE et inventa est CA. Rursum igitur ducto perpendiculari AG in EC continuatam, et per ACG excerptis sinibus C et A, erit ut totus ad hos sinus, sic AC ad AG, GC, cui addita CE fit GE. Ut igitur AG ad GE, sic totus ad tangentem EAG; hinc aufer CAG, manet EAC, qui cum CAB facit EAB prostaphaeresin. Ut vero totus ad secantem EAG, sic AG ad AE distantiam.

Hic aut tu me doco breviorē viam vel in Copernico vel in Ptolemaeo, aut fateri, meam fol. 686 esse multo breviorē utraq̃ue. Esto tamen ut sit longior, at gennuas dat quantitates prostaphaeresis et distantiae, illae vero hypotheses vitiant utramq̃ue. Planeta enim apud Ptolemaeum non recedit a circulo versus centrum, in Copernico etiam exit ultra circulum, quod in Marte intolerabile aliquid efficit. Probavi hoc in Comment. Martis per observationes. Denique tabulis scriptis nihil interest, longa sit an brevis via, per quam sunt scriptae.

At numeri sunt prolixi? Decurta igitur illos. Area quidem circuli scribitur figuris 11, ut quadratum radii; at 1'' valet c. 24240, proinde una unitas de radio valet 4'' fere. Ita 5 possunt resecari figurae, aut certo 4. Et fol. 686 potest valor areae ADB in secunda reductus omitti et pro eo usurpari eccentricitas multiplicariq̃ue in dimidium AF, quippe cum eadem etiam sit multiplicanda in FB; factum postea reducitur per tabellam in gradus, minuta et secunda.

Crügerus: Deinde in lunaribus improbas eccentricitatem 5800, a Severino ratione dupla sectam in duos epicyclorum radios, et dicis, formam motuum physicam imperare simpliciter bisectionem, lectorem ablegans ad Comment. Martis. Atqui tamen Copernicus, ejus astronomiam nunc tuas, eodem modo epicyclos ordinavit et bisectionem eccentricitatis, qua planeta moveatur aequaliter super alieno centro, geometriae non esse conformem ait. Adeo, ut si omnino aequus etiam in Sole admittendus sit, ego praetulerim geminum epicyclum diagrammati Maginiano pag. 256, Suppl. Eph., nisi malim AB eccentricitatem juxta Terram et CB radium simplicis epicycli. Quaeso, si haec erronea, rationem erroris aperis.

Keplerus: De bisectione eccentricitatis Lunaribus disputas seorsim, cum ego hanc generaliter tuear, in Lunam potissimum propter analogiam cum ceteris introduceam, etsi postea et diametri Lunae variatio bene cum hac bisectione convenire deprehensa sit. Ex physica pugno pro bisectione; tu mihi objicis auctoritatem Copernici putasque, eam me necessariam mihi fecisse, quod astronomiae Copernicanae profitear Epitomen. Ad hoc jam dudum respondi fol. 674, ubi juxta causas physicas, de quibus hic, habes necessitatem astronomicae, simplicem in singulis, in Sole vero quintuplicem, *οτι δε δὲ ἐνχομερο*. Astronomia docet rem praeter propter, sic tamen, ut etiam Ptolemaeus duplicem fecerit eccentricitatem aequantis; physica vero bisectionem accuratissimam requirit. Copernicus non usus est ratione dupla in conformandis semidiametris epicyclorum, alias non esset aequipollentia inter ipsum et aequantes Ptolemaeos. Sed coactus est ratione tripla uti, ut planeta subtrahens addensque ternario unitatem constitueret 2 vel 4, rationem duplam Ptolemaicarum

eccentricitatum. Habes igitur, quod petisti, rationem erroris apertam. Si Severinus majori epicyclo dedisset 6525, minori 2175, tunc propius expressisset bissectionem, quam, a me in Sole adhibitam, ipse in Luna affectabat. Nam planeta, centro majoris epicycli proximus, abfuisset 4350, remotissimus 8700: qua ratione conformatur Lunae eccentricitas causis physicis. Crede mihi, te facturum operae pretium, si rem ab ipsis fundamentis ex libro IV. fol. 527, 580 repetas. Illae quidem causae physicae, quando libro V. fol. 665 usque 674 inducuntur in geometriam per demonstrationes legitimas, habent aliquid difficultatis, quam ipse ante omnes sum expertus, dom, ut demonstrationes perfectae sint, minimum decies refluji omnia; at, qui non vult fatigari, ei sufficient lectae quaestiones et primae responsionum lineae et schema fol. 662 et haec explicatio semel pro semper, quod planeta propter causas physicas invehatur quidem per P, H, E, R, sic ut positus in H angulum anomaliae coaequantae faciat PAH, nequaquam vero PAG, sed tamen et anomalia media numeretur in area PGA (quae alit vice ipsius PHA, propter faciliorem computationem) et distantia planetae a Sole AH sit aequalis ipsi GC. Hac unica instructione suffultus aliquis facile videt processum brevem, simplicem et planum. Dato enim arcu PG, v. e. 60° , facile videt, et aream PGB valere eundem 60° , et sinus GF, FB excerptit, comque similia sicut triangula GBF, ABC, unica igitur multiplicatione FB in BA, praesectis a facto 5 ultimis, constituit BC et GC, sive HA, distantiam planetae a Sole; altera multiplicatione GF in valorem areae BDA constituit valorem areae BGA, qui est pars aequationis, scilicet excessus hoc loco anomaliae mediae supra arcum PG 60° , ut sic in composita area PGA habeatur tempus seu anomalia media, respondens arci PH ejusque vicario PG. His accedit operatio tertia, divisio sc. ipsius FA per GC, i. e. HA, ut emergat sinus ipsius AHF, cujus compl. est HAF, ipsa anomalia coaequantae, respondens mediae prius inventae. Imaginatio est nova et insolens, operatio facillima. In solo hoc, quod est fol. 695, est aliqua incommoditas, sed ea non nocet computanti tabulas aequationum, nec computatas sequitur aliqua difficultas in usu. Et quid multis? Omnino necessarius est hic calculus, sive facilis sit, sive difficilis, praesertim in Marte, idque non potissimum ob differentiam PAH coaequantae verae et PAG Ptolemaicae, cum GAH sit paucissimorum minutorum, puta summum 6 vel 8, sed multo magis propter prosthaphaereses orbis annui, quae non ferunt distantias Ptolemaicas AG, AD, sed requirunt AH, AE, ex ellipsi. Crede mihi, non est in hac hypothesis insolentia studium ullum novationis, sed amor veritatis.

Crügerus: Ulterius te quaeso. Parallaxim Martialis disquisitione et eandem exhibitae deprehensa permotis, etiam Solis parallaxin vix $1'$ statuis et Solem immani a Terra intervallo abesse. Quae si consistunt, non consistit motus Solis medius Tychonicus, quem tamen retinui nam. I. praef. in Ephem. anni 1617. Metus ille Solis medius quibus fundetur principis nostri, nimirum observatis a Tychoe aequinoctia. Haec observata sunt per altitudines Solis meridianas, refractionibus et parallaxibus liberatas. Parallaxis Solis in altitudine 84° (quanta circiter est aequatoris Uraniburgica) Tychonica est $2' 29''$, tua vix $49''$, differentia $1' 40''$, quae certe, si tua sit hypothesis, vera Solis altitudo itemque declinatio horae minor aut australis major fuisset Tychonica; consequenter vera aequinoctiorum tempora differrent a Tychonicis hora 1; adeo in eccentricitatis et apogaei pervestigatione neque aestatis neque hiemis spatium, neque quod aequinoctium et medietas interjacet etc., recte a Tychoe constitutum esset. Ut consistet igitur motus Tychonicus medius?

Keplerus: Trepidas etiam super motu Solis medio, id est super epocha ejus ad nostra tempora, si parallaxin Solis minnam: sed frustra. Verum quidem est, differentia parallaxium Tychonis et meae, Sole in aequatore existente inque meridie, est $1' 40''$ eoque mihi aetas fit paulo brevior, quia, quando

Sol in aequinoctiali Autumnali apparet, remota parallaxi nondum est in aequinoctiali, remota igitur majori Tychenila, longius adhuc abest. At quia idem fit etiam in Υ , apogaeum vero est in medio, scilicet in \odot , ubi Sol caret aequalione, manet igitur idem motus medius, minuitur vero eccentricitas et aequalio maxima. At res circa adeo minuta versatur, ut observandi ratio ad tantam subtilitatem non descendat eoque non sum veritus, pro 3592 uti rotunda eccentricitate 3600 etiam majore, praesertim cum per diversas operationes diversa exeat variisque in minimis. Cogita, per armillas observari Solcm in aequinoctium incidentem, aut per quadrantem altitudines tantum meridianas, non majores quam 34° , cum Tycho Solem non citra refractionis suspicionem reliquerit usque ad 45° . Quodsi nulla esset in 34° refractionis, ubi Tycho ponit aliquam, pensaretur igitur hoc errorculo contrario ille alter majusculae parallaxos. His de causis complexus sum ego rotundam eccentricitatem 3600, vel meo physico modo 1800, ut tacite veluti protestarer, me minima hic nolle asseverare.

Crügerus: Praeterea, si parallaxis horizontalis tantum esset $1'$, uno etiam integro minuto minor esset obliquitas eclipticae adeoque tota declinationum et asc. rectarum tabula Tychonica vacillaret. Denique cum obliquitate eclipticae mediante restituta sint longitudo et latitudines fixarum, etiam illas non est rite constituisse sequatur; et quid tandem certi in toto Tyrbone haberemus? Ecce quam arcte sint omnia colligata, quae si discindere valis, vide, ut factum adversus veteres et novos artifices defendere possis.

Keplerus: Nec illud tanti est, ut tantopere dolcas, quod obliquitas eclipticae prodit per meam parallaxin $1'$ minor, quod professus jam sum Epitomes libro II. vel III, ubi sic scripsi: „itemque alio modo $23^\circ 36\frac{1}{2}'$ “. Et sequitur sane, latitudines fixarum in \odot , \oslash uno etiam scrupulo variandas. At quid hoc? Nonne Astr. Danica omnibus fixarum longitudinibus admittit etiam $1'$? De ascensionibus vero rectis ridicule laboras, utpote quae in 45° vix quarta parte minuti sunt majores, ut periode sit, sive relinquam ista omnia, ut eunt apud Tychonem, sive minimo labore emendata ponam. Illic sustinebo calumniam indiligentiae et contradictionis, hic novationis vel obtruncationis.

Crügerus: Ego ab exilitate parallaxium Martialium colligere, eccentricum Martis non secare eccentricum Solis, sed longe superiorem esse. Sed haec te colligere non sunt praecoeptum Copernicæ mundi systema. Quid istis erratibus? Ego nunc, da causam aliam. Viden' huc Iostam meam superiorem de astronomia quærimoniam et animi dolorem, quæ si me liberare dignaris, ostende modum, quo omnia subsisteret et observationibus respondere possint.

Keplerus: Si Martem supra orbitam Solis circumducas, non meam tantum opinionem convellis, qui Copernico defero, sed etiam Tychonis, redisque ad Ptolemaicum, dans Marti epicyclum majorem orbita Solis.

Crügerus: Communica mihi, amabo, diagramma hypothesos tuæ Lunaris unaque radices aequalium motuum utriusque luminaris. Magna, petis Phaeton, inquires, nec ignoro, tale quid jam dudum ab te petisse Maginum, neo tamen, quantum conjicio, impetrasse; quo ipso, si nihil impetravero, me consolabor. (Diagrammata quidem habes in Epitoma, sed quia ellipses abhorreo, omnia mihi sunt obscura. Non intelligo etiam hypothesin, qua angulus in copulis $5^\circ 18'$ constet toto fere mense etc., quæ habes in præf. Ep. 1817. Nro. 23). Forte etiam respondebis, radices Solis me facile deprehendere posse et Comment. Martis: etsi vallem, tamen haerere velut mus in pice in verbis tuis pag. 263 (III. 382), quibus apogaeum Solis integro gradu mutari per observata Braheana ficere, nihil tamen te deffuisse dicis.

Keplerus: Diagramma hypothesos Lunaris miror te desiderare, cum id habes fol. 786, 792, 801 et passim. Quodsi te movet intricatio, separa ergo inaequalitatem primam a mensura.

Sit AB 4362. Dato igitur arcu DL, aequivalet ei sector DBL daturque ejus sinus LZ, in cujus aliquo puncto est Lunae centrum; datur et sinus complementi BZ, eoque in BA multiplicato, abactis 5, prodit B β et LZ, cui est. aequalis AL, distantia Lunae a Terra. In LAZ igitur ex Z recto et LA, AZ datis invenitur LAD coaequata. Jam multiplicata AB tota in dimidium LZ (non LZ), abactis 5, prodit area LZA in mensura, qualium DAF est dimidium de 314159, valens 180°. Reducta igitur in gradus et addita ad IAB, constituit mediam, respondentem ipsi LAD.

Hic manente DAL ut prius et GAI. in gaeum Lunae, datur angulus DAI, DBP, et BZ, cui aequalis est CA. Menstrua igitur aequatio habet unam tantum partem physicam, si comparetur cum priori aequatione solutae anomaliae. Haec igitur menstrua aequatio est in area CLA. Sed ut haec area legitime computetur, eo quod minor est in semicirculo, menstruum habente perigaeum solutae, quam in contrario, oportet igitur computare aream trianguli LBZ, cujus altitudo LT (ut LT sit sinus perfectus, parum enim ab eo differt), et ab hac area auferre hac vice areolam trianguli CBA, tunc habetur area LCA. Sic igitur, cum aequatio duas partes habeat, physicam et opticam, physica hic est area BLA.

(Fig. 4), optica angulus BLA, si computaretur ipsa et non potius pro ipsa coaequata LAD, ad analogiam ceterorum planetarum.

Nota igitur usum huius aequationis physicae menstruae. Proposito arcu eccentrici DL, siquidem tunc linea per \odot et \oslash HG secant lineam apsidum DF ad rectos, ut in primo schemate, aequatio menstrua nulla est, sin autem ad obliquos, ut in schemate altero, tunc Luna tardius in L incidit quantitate temporis, quam mensurat CLA area, quia DL hac vice distat longius a circulo illuminationis Terrae, qui incidit secundum AZ, sic ut ejus eccentricitas menstrua ab hac illuminationis circulo sit CA, aequalis ipsi BZ. Hoc alterum schema servit a fol. 793 usque in 810.

Tertia inaequalitas, variatio dicta, tertiam figuram requirit servitque ab 811 in fol. 817, in quibus follis inest aliqua obscuritas ex eo, quod peculiare schema non est factum quodque usus sum in antiquo schemate puncto C: itaque lector possit existimare, id punctum sic esso sumendum, sicut id a positione centri eccentrici repraesentatur per AG perpendiculararem. Hoc vero falsum esset. Itaque maneat HAL ut prius in secundo (Fig. 5) schemate, et linea prope veri loci Lunae AL aget circellum eccentricitatis (posset esse quisque alius) in R, ducanturque ex R ipsi HA parallela RX et perpendicularis Rx, quae hac vice cadet infra C, punctum secundi schematis. Si igitur ex

Fig. 4.






Fig. 5.



A etiam perpendicularis exeat AX, formatum erit parallelogrammum, atque hoc initio quidem, cum est Luna in copulis, attenuatum est in lineam AE,

Fig. 6.



et Luna in quadras veniente, rursum attenuatur in lineam AY. Maximum est ibi, ubi est figura quadratum, sc. in dist. 45° a ☉. Posito igitur valore rectanguli maximi $40' 30''$, ut vult Tycho, vel $51' 0''$ secundum causam physicam (fol. 565 dubie affirmatam), reliqua rectangola quadrantis sunt mensurae particularum adjiciendarum seu variationum. Ubi nota, etsi coloravi rectangulum, sicut triangula in prioribus schematibus aequatoria, alium tamen esse hujus usum, quam illorum. Illa in primo semicirculo addebantur tempori, in secundo auferebantur, hoc in primo et tertio quadrante additur, non tempori; sed loco Lunae prope

vero, in secundo et quarto aufertur; illa quantitate sua seu proportionem ad aream totius circuli eccentrici Lunae censebantur, hoc mihi, cum possit esse tam magni quam parvi circuli rectangulum, sed tantum proportionem mutua inter se rectangulorum censetur. Hoc non mirabitur, qui fontes utriusque areae inter causas physicas adiecit.

Observabis et hoc, quod cum in Ephemeridum praefatione indulissem speculationi, quam retuli in fol. 565 Epitomes (ubi quaestionem fol. 564: Si appendix..., refer ad eum locum, sc. ad fol. 562), cumque bac ratione et quantitas variationis maximae venisset in dubium, quia pro $40\frac{1}{2}'$ speculatio mihi suppeditavit $51'$, et causas etiam physicas nondum possem accommodare geometricae, ut oportuit, ut ita aliter etiam distribuere hanc variationem, quam Tycho fecit: postmodum tamen, ut primum iustum modum erui, physicam hanc causam geometricae computandi, qui modus penitus cum modo Tychonis in effectu coincidit, quod inquam tunc non distributionem tantum Tychoicam variationis resumserim abjecta mea erronea, sed etiam quantitatem Tychoni suam restituerim. Ex ea re aestima, num novitatis studio fecerit et obiectandi; an veritatis?

Petis radices aequalem motum utriusque luminaris. Etsi non accipis, nullum tamen existimes, id ab invidia proficisci. Nam descriptorem non habeo et jam a 2 mensibus exspecto responsum a Caesare de edendis tabulis, quas si habiturus es integras, causa nulla supererit, cur mus picem caveatur; unum enim, nisi omnes mittam, semper haerebis. At si Caesar differat, circumspiciam de scriba, tibi vendam exemplar scriptum pro opera, quam abs te som requisivimus. Haberes epochas in calculo eclipsis, si agnosceres.

In margine dica, te ab ellipsebus abhorreere eoque tibi obscura esse diagrammata Lunae. At nihil admodum nocetur capui ab elliptica forma, etiam praestet te ei assuescere, aut nunquam in Marte computabis iustum, utcumque transformata. In Luna tamen uteris, si libet, circulo Ptolemaico, parvula erit calculorum differentia, cum Luna prosthaphaeresis annuas non faciat eum sua distantia a Terra. Sit sane supra (fig. 4.) punctum idem L et λ , sit angulus idem $A\lambda B$ et ALB ; sit denique motus medius DQI et tota prosthaphaeresis solntae QLA . Haec utcumque concessero, manet tamen secundum schema et prosthaphaeresis menstrua suo loco.

Hypothesiu latitudinis quereris te non intelligere. Tanti est, praeveniri ab alia hypothesi. Certe, si unquam esses imaginatus librationem semim�struam plani eccentrici in Tychone, non tantum (minus etiam) difficultatis obijceret libratio semestralis mea. Quid vis amplius, cum effectus idem sit circa quadras? in copulis ecclipticis necessario alius, eclipsibus id exigentibus, in quo argumento primum ego fixi vestigium ad hanc mutationem. Nosti, nodum repedare tardissime, Solem progredi, per illum igitur anni quadrantem, quo Sol a limite digressus ad nodum venit, lucipit libratio crescitque ad modulum sinuum distantiae Solis a limite, ut fiat maxima 18', Sole in nodo versante, ut sic tunc latitudo limitis maxima sit 5° 18'. Haec mihi videntur facillima. Propterea tabula latitudinis Lunae in eclipsibus in fundamentis habet angulum inclinationis 5° 18', quantam etiam latitudinem acquirit Luna octiduo post eclipsin. Et vicissim cum Sol est in limite Lunae et Luna in quadra, latitudinis ejus tabula deberet habere angulum incl. 5° 0', ut sic Luna octiduo post quadram, id est in copula, acquireret lat. 5° 0'. Ego certe puto, Tyconicam rationem initio tibi plus creasse molestiae, aut forsam non laborasti, ut illam caperes, contentus tabulis et praeceptis, quae sublevamenta suppeditabit etiam opus Tabularum Rudolphi.

Quod locum Martialis pag. 263 attinet, accidit praeterea, ut computarem loca Martis accuratius, aliqua et Maginus in Supplemento emendatius forte prodidit et res circa minima versatur, quae non sunt cura digna. Itaque non attenta promissione illa facta, retinui apogaeum Tyconis ad annum 1586 etc., dimisso Marte, in cujus solius gratiam hanc mutationem eram facturus. Nam majores mihi curas iniecerunt observationes Walberl, ut supra dictum, prae quibus haec minutula facile obliviscor.

Crũgerus: De reliquis planetis uolo te nunc interpellare. Martis theoriae tunc tabulicque ex ea Maginiana acquiescere malim, quam Severini, in qua semidiameter orbis, multis anfractibus e numeris pag. 225 vitiosis (omnia enim Martis exempla sub calculum Astron. Danicae revocavi, nullem ab auctore rite subductum invenio) conquassata, tamen tandem non satisfacit, adeo ut Severinus cogator, semidiameterum 631000 mutari e tuis Commentariis. (Neque Martis, neque Veneris aut Mercurii exempla sat exacte sunt supputata.)

Keplerus: Astronomiam Danicam cursim perlegi, ad calculos ut vocem deest otium. Gratam tu hac in re ponis operam.

Crũgerus: Sed obsecro, quo calculo quave observatione utitur illa praecessio aequinoctiorum, quae habetur pag. 221 Astr. Danicae, aut in tabula pag. 55 (III. 211) finium Martis Commentariorum? Neque enim e Tyconicis, neque e Proteonicis, neque e Danicis tantam eruere possum. (Taceo innumera numerorum tabulariorum vitia typographica, imo et alia.)

Keplerus: Pracessionem aequinoctiorum pag. 55. Comm. Martis (vol. III. 211.) ego cum tota illa tabula sic transcripsi, ut accepi a Tychone, nec usu venit hactenus, ut ea uter. Vide ergo, num quid ad tuam dubitationem conferam fol. 918 Epitomes.

Jam Keplerus Crũgero quaerenti explicat „numerum mysticum“ Magini, quam explanationem exhibuimus vol. III. p. 451. Quae addidit Keplerus, haec sunt: Hanc ego partem tabularum Rudolphi feceram ante annos 13, sed non mysticae, verum ipsos quotientes in margine tabulae posueram. Postquam prodierunt Logarithmi Neperi, abjeci hanc partem et in margine posui horum quotientum logarithmos. At nunc etiam hanc tabulam abjeci penitus et tertium introduxi, in cujus margine sit simpliciter ipsius ☉ ♀ proportio ad ☉ ♂, sic tamen, ut etiam hac tabula possimus carere, si volumus uti regula falsi parabilissima, in qua ponitur ☉ ♂ ♀ minus scilicet dimidio ipsius complementi ♂ ☉ ♀,

et per proportionem $\odot \ominus$ ad $\odot \oplus$ limatur sine omni negotio, ut secunda vel tertia correctione positionis exeat iustum, sine venatione partis proportionalis.

Crügerus: Calendarium tuum apparituri mense Febr. Mercurii eludere hic vians est ipse Mercurius, qui mihi et aliis conspiciendum se praebuit sat elevatus diebus 20. 21. 22. Febr. st. n. ab oeransu Solis ad h. 6. 30' e. A 22. Febr. nullam habuimus vesperam serenam ad nitidam usque Lunarem quadraturam. Tum vero Mercurius nusquam apparuit.

Keplerus: Apparitionem \ominus tardius ponere, quam is apparere potest, nihil est apud me novi et sit certitudinis causa. Nam si minus esse potest, multo magis erit majus.

Crügerus: Longitudini Dantiscanae censes addendum integrum gradum, sive 4' horae. Equidem eclipses Lunares tanta accurate nonnunquam observari (praeterita in Aprili non erat hic observabilis), ut differentiam ab Uraniburgico calculo constanter eandem praebuerint, quia aliquot minutis hoc illuc nutaverint; sed tamen, cum hoc iter maritimum hoc illuc navigetur quotidie, chartaeque nauticae constanter teneantur chartas geographicas Jansoni, non ausim hanc urbem integro gradu in orientem promovere.

Keplerus: Etsi de longitudine Dantiscana nollim ex unica eclipsi concludere, nihil tamen impeditur navigationibus crebris, quo minus iis vel integra 15 obtrudam milliaria, si sit opus, nedum ut in hoc parallelo octo. Totum id excusabitur per longa et brevia milliaria. Nam a Tychone habeo, numerari milliaria 100; at 100 brevicula et 92 longiuscula stant juxta invicem. Solebat illo hoc problema proponere: „Dic, quibus in terris το μυζήματα sit. longum 25 horas? Resp.: in navi, quae secundo vento Dantisco in fretum Sonticum advolat intra diem et noctem.“ Alias ego plus fido Solarium eclipsium observationibus mathematicis pro differentia longitudinis locorum observationis, quam Lunarium, quia in his valde variant oculi diversorum.


Crügerus: De Poloniae, Russiae, Lithuaniae etc. Intervallis itinerariis quas petis, exquirere quidem per occasionem potero, sed intervalla tantum; non enim isti positionem respectu plagarum mundi sic observant, ut inde vera loci longitudo ac latitudo possit erui. Quatenus illa sint, quas prioribus literis per Olomucensem tabellarium ad me datis te petiisse significas e Ptolemaeo supputanda, non intelligo, siquidem illas literas aut tabellarium non vidi. Viennensis hic sit, ibi spargi, hominem aut oculum aut submersum. Igitur quid velis denuo scribere et opera mea, si qua in-ervire possim, audacter utere. Tempore hiberno studiis astronomiae bene varare possum, aestivo non item: num enim ab amplissimo Senatu stipendium habeo principaliter ob astronomiam, sed ob alia negotia practica et mensurationes, quibus potissima pars aestiva absumitur.

Keplerus: Grata est tua promissio in suscipiendo calculo. Peto igitur denuo, ut, quidquid est observationum in Ptolemaeo, id computes ex tabulis Ptolemaei praeceptisquo ejus, sed et ex Prutenicis, sicut facit Buntinus in quibusdam. Ille auctor saepe fucum facit, commendans consensum observationis cum calculo, etsi tantus non invenitur. In epistola, quam Olomucensi tradidi, multa scripseram de observatis Ptolemaei et aliis, de quibus tuum cupivissem audire iudicium; si sunt amissae, dolco. Tabellarius certe in animo non habuit perire.

Crügerus: Videtis Dielides Cosmometricas Nathanacis Torporlaei Augh? Quid videtur? Si apudam videris selto, auctorem magna polliceri in libri frontispicio. In secundo libro, inquit, agitur primo de nova arte prosthapheretica planetarum, quae sine auxilio subditiorum verpulatorum proportionalium adeo generaliter perficitur, ut omnibus omnium astronomorum hypothesebus cyclicis et phaenomenis; utcumque tempore mutabilibus, per hasce tabulas satisfieri possit. In secunda parte postremo agitur de absoluta et facillima doctrina triangulorum sphaericorum, universo nimirum artificio ad 6 verba redacto et in ordine tractabili per mitrae figuram (hinc vocat mitrosphaericam) disposito, unde totius prognosticae facultas comparatur et sine perplexa praeceptionum inculcatione conservatur, sive quis auctoris

tabulis sive canone triangulorum uti maluerit. Londini liber excusus est anno 1602. Quodsi
policitationi respondere veritas (quod nondum probavi, vix enim heri librum accepi), folia
in quarto 36 praestant id, quod to foliis magnis 540 praestari posse olim significasti Ma-
gino, ut est pag. 292 Suppl. Eph. Magini (cfr. vol. III. p. 45 et 451). Jam igitur, ut
mihi indicaveris fundamenta „numeri mystici“ Maginiani, restabit, ut exeamus, utrum in
prosthaphaeresibus planetarum alteri praestet.

Keplerus: Torporlaeum uou vidi, non audivi. Venatura partis proportionalis per scrupula proportionalia sublata est inter $\kappa\alpha\upsilon\chi\eta\mu\alpha\tau\iota$ mearum tabularum. Doctrinae triangulorum compendia vidi affectata a Romano, Nepero, Uraino, Pitisco; omnes scripserunt post 1602, non meminerunt hujus auctoris. Sunt in compendiis sua dispendia. In Ursini et Romani contraeionibus palpito; quavis talpa caecior, pius quam tu in meis ellipsis. Pitisco (cfr. vol. III, pag. 725) aliquid tribuo in consummatione et $\mu\epsilon\tau\alpha\theta\epsilon\omega\iota\varsigma$ arcuum in angulos et viciissim ab ipso lubens recipio, quod videtur consummare numerum casuum. Axioma hoc memoriae causa mihi valde est acceptum, in sinibus quidem sic procedenti: Ut AE ad ED sic AC ad CB; ex A, B, AC — latus BC. Ut AC ad CB sic AE ad ED; ex B, AC, CB — angulus A. Ut DE ad EA sic BC ad CA; ex B, A, BC — latus AC. Sed iatius est axioma contrapositionis: Ut B ad AC sic A ad BC et C ad AB. Ut A ad BC et ut C ad AB, sic B ad AC. Ut AC ad B sic AB ad C et BC ad A. In tangentibus vero et sinibus secundum coelo axioma: Ut $\sin. AD$ ad $\tan. DE$ sic $\sin. AB$ ad $\tan. BC$; ex BA et AB — latus BC. Ut $\sin. AB$ ad $\tan. BC$ sic $\sin. DA$ ad $\tan. DE$; ex B, AB, BC — ang. A. Ut $\tan. DE$ ad $\sin. DA$ sic $\tan. BC$ ad $\sin. BA$; ex B, A, BC — latus AB. In secantibus tertium axioma: quod ut in planis quadrata AB et BC faciunt quadratum AC, sic hic secantes faciunt secantem AC.



Reliquos casus solve per hos et metathesis, cujus una forma est fol. 259
Epitomes, ex quo emergit problema¹ jueundum trigonometris: dato quovis
reetaugulo formare obliquantium, cujus latera mensurent angulos oppositos
aut obtusi complementum ad semicirculum; sed piciaria solutio ex Pitisco et
Lansbergio, quo nunc careo. Obliquantula partim perpendicularibus ductis,
partim et cum fructu quidem per positionem quaesiti solve beneficio logarith-
morum. Nihil autem supra Neperianam rationem esse puto, etsi quidem
Scotus quidam literis ad Tychonem a. 1594 scriptis jam spem fecit Canonis
illius misisse. Vide, ne Torporiaeus aliquid horum tradat. Exemplum posi-
tionis in obliquantulo datorum trium laterum infra habes.

In postscripto haec addit Kepierus: En exemplum positionis in obliquangulo datorum trium laterum. Nam ducta perpendiculari ex angulo quocunque et per positionem eruta, invenio primum duos angulos ad basin, in quam continuatam si opus) perpendicularis ducitur; ultimo etiam partes anguli tertii ex partibus basis aut etiam per novam perpendiculararem. Sint latera PV $41^{\circ} 44'$, PS $80^{\circ} 3'$ et VS 75° . Ex fine lateris $60^{\circ} 3'$ (S) duco perpendiculararem (SR) in $41^{\circ} 44'$; pono eum esse 75° , quantus est SV. Si SR 75° , SP $80^{\circ} 3'$ et R rectus, ergo basior PR haberet antilogarithmum 4046, qui dat arcum $48^{\circ} 7'$. Video, hinc PR esse majorem quam PV; $41^{\circ} 44'$: ex eo pronuncio, obtusum esse angulum V, qui opponitur lateri PS, pono ergo basin continuatam PR esse $48^{\circ} 7'$, erit VR continuatio $6^{\circ} 23'$. Si tanta, continuatio, erit in triangulo exteriori rectangulo RVS, cujus recto opponitur

VS, 75° , erit inquam perpendicularis SR minor quam 75° , primo assumtus, et basis igitur prolongabitur longius tanto, ut antilogarithmum nanciscatur 41027. Erit scilicet $48^{\circ} 28'$: erit igitur correctio continuatio RV $6^{\circ} 42'$, correctio antilog. 685, correctio antilog. basis 41090, correctio basis $48^{\circ} 28'$, correctio RV $6^{\circ} 44'$, correctio ejus antilog. 692, correctio antilog. 41097, qui dat iterum $48^{\circ} 28'$ ut prius et cessat correctio. *)

Nosti autem, haecenus viam directam fuisse nullam, ex tribus lateribus sine intermediente angulo perveniendi ad perpendicularem. Ex hoc autem arcu SR cum SP comparato subtractione logarithmorum invenitur SPR vel VPS $78^{\circ} 34\frac{1}{2}'$. Neperi praeceptum videtur mihi difficilis ob fatigationem mentis. Apposui tamen id ad marginem.

In rectangulis per solos sinus salvantur omnes 16 casus, si passim prius quaeratur aliquid ante id, quod imperatur. Tunc sunt operationes duae et in solis duobus casibus prius quaeruntur duo ante imperatum et sunt tres operationes. —

Scriptorem, quem supra dicit Crügerus, Torporlaeum, notamus, explicatis vulgaribus constellationum in caelo denominationibus, signas trigonometricas, ut facilius memoriae inhaerant, similibus denominationibus insignire insano irritoque conato laborasse. Imaginatur in triangulis sphaericis „mitram, forcem, corvum, hastam“ aliaque ridicula (cfr. Delambre hist. de l'Astr. modernae vol. II, p. 86 ss.). Liber Adriani Romani, quem dicit Keplerus, prodit anno 1609, inscriptus: Canon Triangulorum sphaericorum brevissimus simul ac facilissimus etc.

Crügerus in epistola sua pergens adit „comatica“, quae sicut Kepleri responsio alio loco reservanda sunt, item et ea, quae insunt his epistolis de fati Kepleri, partim vol. I. p. 661 praemissa, partim ad vitam Kepleri referenda. Crügerus hunc finem facit litterarum suarum: Spero tabellarium hunc ad nos remeaturum ante hiemem; si non, toas ad me mittet. Tu modo strenuum te praesta congrerentem, praesertim de iis, quae sub manibus sunt. Vale. Lincol 9. Sept. 1624.

Praest. D. Tuae observantissimus

P. Crüger.

Keplerus: De Philippo Müllero litterarumstrarum nostrarum sequestro constituendo recte mones. El ego addo alterum Viennae residentem Saxonis Electoris agentem Jo. Zeidlerum, dictum Hofman, ut Lipsia Viennam tuae mittantur. Cogito enim Viennam ire, aut si non cam, iste Vienna ad me mittet. Tu modo strenuum te praesta congrerentem, praesertim de iis, quae sub manibus sunt. Vale. Lincol 9. Sept. 1624.

Cl. D. Tuae officiosus

J. Keplerus.

*) Ecce quam multa verba hic in textu, quam vicissim parum operis ibi in margine, ut perpendicularis SR habeatur per RV, VS, vel per PR, PS, utque positio prima, quod SR sit aequalis SV, se ipsam per prodeuntem PR sine omni fatigatione mentis emendet.

$80^{\circ} 3'$	antilog. 175566 log. 1515
75.	135163
48. 7	40406
41. 44	
6. 23	622
48. 26	41027
6. 42	665
48. 28	41090
6. 44	692
	41097
$74^{\circ} 53' 36''$	134471 log. 3517
VPS $78^{\circ} 34' 20''$	log. 2902.

Neperi a me ordinatum melius:	
$41^{\circ} 44'$	log. 40697
80. 3	1515
38. 19	Summa 42212
75. 6	
36. 41, $18^{\circ} 20\frac{1}{2}'$	115619
113. 19, 66. $39\frac{1}{2}'$	17984
	Summa 133603
	Differentia summarum 91391
$78^{\circ} 34' 26''$	
39. 17. 13	log. 45696

Postscripta: Viennam tandem veni Octobri mense, literas has mecum attuli haecenusque expectavi tabellarium tuum revertentem; nam Hofmannus tergiversatur in hoc officio praestando, quod te acire vult. Literas dedi Henecelianis stationariis, uti eas Vratislaviam commendarent. In procieta sum, ut Lincium revertar, inde ascensurus Noribergam et ad alias urbes imperiales, a quibus Caesar petit, ut sumtus faciant in solvendis meis reliquis Rudolphinis, quibus anfulus tabulas et observationes Tychonis edam. Vale. 9. Dec. Viennae.

Ad haec respondisse Crügerum ex his Kepleri literis, datis Lincii d. t. Maji 1626, apparet: S. P. D. Clarissime Vir. Quas scripsisti ad me literas 3. Aprilis anni 1625. domum reversus ex Suevia mense Augusto accepi, a mea familia asservatas. Eram profectus eodem quo tu scripsisti mense, postquam uxoris partum periculosum (cum et ipsa quadam gangrenae specie in carpo manns et foetus a multo tempore variis accidentibus infestarentur) exitu felici terminatum spectassem filioque nato et a parochialibus pontificis baptisato nomen Hildeberto dedissem, quem auctorem, egregie de ceremonia Eucharistiae sarta tecta conservanda scribentem, tunc in memoria habebam. Itineris mei causam et successum, cum ad te matheseos professorem pertinere censeam, tibi communicabo. Literas ad Campodunenses, Memmingenses et Noribergenses habebam, quibus Caesar mihi reliqua mea Rudolphina repraesentari petebat, ut his sumtibus adjutus tabulas et observationes edere possem. Suevicæ urbes, quae promissa Caesari nondum solverant, solverunt mihi. Noribergenses, a quibus motuum petebatur, quod de contributionibus circuli Franciei proxime futuris refunderent, recusarunt. Varis tamen in utroque itinere remoris aestas ablit. Usus sum et acidulis Goeppingensibus et mensem Tübingae transagi, creber cum Maestlino, Schickardi hospes. Verum ille jam aetate fessus, loto promptus, acer, sed laboriosissima professione distentus, nihil admodum in praesens ad artem contulerunt. Miratus solum est Maestlinus nova paradoxa, et cum observatis obloqui non posset, concedendum arbitratus est discedendumque etiam in posterum aliquid ex illo magno coelestium cursuum volumine. Erant absurda ista: 1) obliquitatem eclipticae olim majorem, observatis Ptolemaicis et Timocharis etc. copularum Lunae cum fixis et planetis, ad calculum Tychonis examinatis, convelli. 2) In planetarum motibus mediis non omnimodam aequalitatem inesse nec transigi posse citra aequationem secularem in motibus, praesertim Saturni. 3) Epocham repertam, in qua plerique motus in puncta cardinalia incidant exactissime, ceteri non multis gradibus ea superent. Ea est anno ante nostram aera 3993. 24. Julii, Uraniburgi h. o. 33'. 26". (cfr. annot. 1.) 4) Nullam dierum aequationem eclipsibus hujus temporis, quarum in Luna inde ab anno 1572. 46 observatas a variis computavi, satisfacere, quin potius videri emergere novam menstruam secundum transitus non Solis, sed ipsius Lunae per zodiacum, cum pieraque eclipsium tam Solis quam Lunae in π , γ tardius, in η , ω maturius incidant.

Interim recudi tabulam aequationis luminis ex hypothesi physica Epitomes (p. 317, Tab. Rud. p. 64), in qua immanem laborem hausi propter varietatem insidiosissimam. Decies ad minimum ea intra decennium reformatam semper aliquid occultavit, ob quod duplicanda tandem fuit vicissimque secundum aliam dimensionem dimidianda fuit. Cum autem omnibus modis forma hypotheseos a Tychonica differat, effectus tamen est quam proxime idem, qui in prolixissima illa tabula Magini in Suppi. Ephemeridum.

Sed aniam cum pagina historiam litteris mei. Ex quo sum reversus, nullum non moveo lapidem, ut ad editionem tabularum veniam. Nam triente recepto assignatorum sumtum eoque Campidni collocato, jam de bonis et redditibus in hac provincia sumtus expedit. Sed difficillimam hoc tempore rem tento; quippe reformationis acerbitate summa imis vertuntur. Et audivisti forsam (divulgant enim Ephemeridum scriptores) circumscriptam et mihi bibliothecam, quamvis mihi antica functione subnixo immunitas esset promissa. Verum illam molestiam levatam existimo; nunc de pecunia agitur, quam debent procures, eaque non incertissima fretus, papyrum et operas conduxi. Paginas excudam unmericas, usus typis meis propriis, quibus excudi 4 annorum Ephemeridas. Sed tenet me sollicitum typographi fortuna, qui etsi et ipse obtento mei operis licentiam habet commemorandi, premitur tamen militum alimentis et importunitatibus, onere civico, ob domum, quam possidet. Quodsi procedant operae, est quo de gratias agamus numini, sin impediuntur diutius, tu in acurnas hujus provinciae totiusque adeo Germaniae intentis oculis veniam mihi dabis. Jam nunc excurrere cogito ad fusorem Passavium, a quo alloquendo in descensu prohibitus sum, ob pestis suspicionem urbe exclusus cum comitibus omnibus.

Nunc ad tua. Quod ad computandas observationes Ptolemaicas iusto te comparas apparatu, facis rem tua et professione et existimatione dignam; atque utilem, speroque librum publici juris futurum; sed nolim eo tantisper accere, saltem exitum calculi mihi descriptum transmitti.

De observationibus quidem Tychois edendis hoc tempore desperavi, quia bessem assignatorum sumtum non recipio. Si tamen apes edendi in produm esset, posset tuis iste vetustarum observationum calculus adjungi. Si commodo tuo fieri potest, ode folio medioeri, sic ut ad Mechanicam Tychois quadret; cogito enim eadem forma observationes edere, si quando tuam Uraniam respiciat Jupiter.

De Hipparchi aequinoctiis sic habet ordinatas a me esse epochas Solis sic, ut, eccentricitate hodierna manente (nam quis credat, olim fuisse majorem, cum tota haec diversitas minori observatarum altitudinum quantitate nitatur, quam quae a Ptolemaeo ipso fuit in incerto posita), ut inquam tanto posterius computem Hipparchi verum, quanto maturius computo autumnale. Ut id obtinerem, non potui verum Solis locum in epocha creationis in 0° ☉ ponere, sed contentus fui medio. Frustra circa refractiones hic scrupulosi sumus, majora ambiguntur. Quod ex Opticorum meorum fol. 146 (II. 219.) adducta, sicuti tu hactenus conciliare identidem sum aggressus, ut Hipparchus, minutissimis particulis diffusus, mane, vespere, meridiem, medinoctium allegare contentus fuerit, mane illi sit, quicquid sit ab orta vespere meridiem, cum, quae illi est hora 5, sit nobis 11. antemeridiana.

Loci ex Censorino admonuit me Jos. Scalger agnosceatque pro sphalmate, ut tu; ego, si potero excusate Ptolemaeum, ne cogar cum insinulare fraudis; mihi gratulabor. Sip illa sphalmatis in Censorino verisimilitudo colligabit mihi hoc fulcrum butyraceum, confugiam ad aequationes secularum, ad experimenta in omnibus planetis similia, in ipse Sole; qui per eclipses Lunae deprehenditur in minutis arcibus inaequaliter ad fixas accedere, quod 4 vel 5 eclipsibus Lunae comprobo.

De fato tuo domestico tibi et condoleo et gratulor Veneremque Uraniae vestrae propitiam precor, ut non prius tu ex illa pater esse velis, quam Ptolemaicum calculum absolvas.

Differentias meridianorum proximorum Daniae, Sueciae, Germaniae, Poloniae, Russiae a meridiano Dantiscano, quas habes exploratas, vel saltem bonum et fidum itinerarium Dantiscanum abs te prima occasione desidero, si tamen non serus erit tabellarii adventus. Sed rejici fortasse poterit catalogus locorum in calcem tabularum.*)

Eclipsium Solis diversis locis observatarum magna est opportunitas; mediantibus enim parallaxibus satis fide elicitur differentia meridianorum, nec tantum prosunt Lunares, ob tot varietates ex causis physicis et opticis.

Sed tabellarius ad horam conductam adest; diutius immorari non possum. Vale. Lincii etc.

Cl. D. Tuae

Amicus J. Kepler.

His addita sunt patina de cometis et calculus loci Lunae secundum praecepta Tabularum Rudolphinarum, ut eum tu (Crügerus) ex Tychone deducas, uescio enim an recte sim operatus ex Rudolphinis, qui ad praefationem, his tabulis praemissam pertinet.

Crügerus adscripsit ad marginem literarum Kepleri: Kepleri ad hoc ultimam, reditae demum 9. Sept. 1626 per tabellarium Vienneensem Chr. Mayer. Responsum 6. Apr. 1627, sed ad paucissima.

Ea, quae Keplerus a Crügero toties petit, ut Ptolemaicas observationes computet, non praestitisse videtur Crügerus, cum neque in codicibus Pulcravensibus neque in libris, quos postea edidit Crügerus, tale quid deprehenderat. Praeter ea, quae aliis locis diximus scripta Crügeri, haec insuper Schellbellum secuti notamus: Logistica sexagenaria methodice conformata. Dantisci 1616. Praxis trigonometriae logarithmicae cum logarithmorum tabulae; ib. 1634 (cfr. Kaestner, Geom. Abhandlungen, t. Sammlung). Doctrina astronomica sphaerica, praeceptis methodicis et perspicuis per globum, tabulas, trigonometriam tam veterem quam logarithmicam explicata et demonstrata. Ib. 1635. (Addita est tabula, ab Hevelio, tum anno 24. agosto, aeri incisa). Descriptio Cometae a Regiomontano observatae. Ib. 1623.

Epistolae, quas praemisimus, Kepleri ad Crügerum datae maxima ex parte binis exemplaribus in codice Pulcov. conservantur, alterum scriptum Kepleri manu, alterum descriptum; illud Crügero transmissum fuisse apparet ex notis, quas ipse Crügerus adscripsit. Cum Crügerus anno 1639, ergo decennio fere post Keplerum mortuum sit, rejicienda est opinio, quas Keplero remissae fuerint suae ad Crügerum datae epistolae; contra illi perpendas, Hevelium Crügero suum fuisse praecceptore, vix dubium est, quin illas Hevelius a praecceptore suo vel ab illius haeredibus acceperit adjuveritque manuscriptis Kepleri, quas Hevelium magni thesauri loco conservasse diximus vol. 1. p. 58.

Inter eos, qui conversatione sua verbo et per litteras effecerunt, ut susciperet Keplerus conscribendum opus suum, nominandus est Joannes Remus, cognominis Quistianus, medicus et astronomus prius Maximiliani Archiducis Austriae, post Imperatoris Mathiae et Leopoldi Archiducis, qui, ut multa egit cum Keplero per litteras astronomicae (cfr. praemissa volumina passim), ita auctor fuit Kepleri dubiis suis, ut astronomiam Copernicanam iterum iterumque examinaret et ea, quae hoc examinis deprehenderat, sequalibus traderet.

Primum adit Remus Keplerum anno 1611 scribens: Miraberis forsan, Nobiliss atque Clarissime Vir, quod ego facie tibi ignotus hasce ex longinquo insequam litteras. Verum cum amor et aequalitas studii ubique terrarum simplices sibi conciliare studeant consortes, facile mihi ignosce, quod hasce qualescunque ad te dem litteras.

Vidit opus tuum ingeniosissimum de Stella Martis apud Illustr. Ducem Sforzam et te in eadem opinione cum Copernico esse, Terram sc. moveri (sicut aliquibus mutatis) consuepi. Sane et ego iordicus hanc sententiam cum sententiam, verum in hoc unico adhuc mihi movetur

*) Sic ego soleo: Praga alt. Poli 50° 6' . . . antilog. 44402 . . .

Vienne alt. 45. 32 . . . 40693 . . .

1. 44 . . . 86295 . . .

Milliaris 36 . . . 2. 24 . . .

0. 40; 0. 30 . . . log. 514684 . . .

4. 8; 2. 4 . . . 332251 . . .

846935 . . .

761940 . . .

2. 33; t. 16 1/2 . . . 380820; min. 10.

scrupulus, quomodo ac. apparentes et perpetuo sibi similes distantiae stellarum locum habere possint? Ponamus n. cum Copernice, immensum esse spatium a Sole usque ad stellas fixas, tamen 1500 illae diametri terrae semper differentiam aliquam ingerent, imo quod Saturnus ratione suae parallaxes necessario, vel ipsa retione exigentes mechanicae, medio spatio inter Solem et stellas fixas constituendus veniat, et distantia firmamenti a Sole alias non major provenit, quam 1500 semid. Terrae, nisi forsitan quia refractionem in hoc loco substituire velit, quae tamen suae habet per se rationes. Deinde decuplum diametri suae ad minus Terrae complere deberet in motu suo diurno, diameter enim est 8 et motus diurnus 59', ut aesti, magnus igitur raptus et vis propulsiva necessaria esset. Et in hypothesis Lunari maxima differentia uritur, licet non desint hic Romae, qui librationem illam Lunarem motui alicui Terrae recto, in suo tamen centro, adscribant.

Ego credo, planetas gyrari, prout in Marte mentionem fecisti, hac modo (addit Remus figuram similem figurae 47 Vol. III.). Sed cur Sol non gyrum epicyclicum efficeret? Adde et hoc, quod per perspicillum illud (Galilaeo alias adscriptum, in quo Luna maxima et clarissima apparet, et per idem 4 planetae juxta Jovem eb eodem conspecti sint; sed refutatus est a Sisto Florentino) inveniam maculas certas Lunares in forma 9 satyri in Luna nove sive panthulum corniculari, et quadrata et plena etiam, fere semper in eodem loco manentes, h. e. juxta meum situm versus dextram sive occasum; ideoque Luna non retebatur, sive instar motus terreni circumvolvitur, quod tamen necessario quasi omni hora fieri deberet.

Ego in peregrinatione mea per Italiam, Siciliam et Maltam aliquas habui observationes pro rimandis longitudinibus et latitudinibus locorum, prout et hic Romae observationes aliquas Solis meridianas venatus sum, nua cum declinatione magnetis; quae omnia, si tibi neni esse poterunt, humiliter offero. Jam agitur quartus annus, que sum in Italia et semper eclipses diligenter annotavi. Vellem mihi eccentricitates et parallaxes planetarum communices, prout Tycho eos adinvenit, meae fidei illas commendatas esse certe tibi persuades. Neam etiam dirigendi in astrologicis adinventi methodum, experientiae mirifice correspondentem. Ubi nota et hoc, quomodo Venus infra Terram in Copernico consistere poterit, quae spatio multo majori, nimirum 583 dierum, circumvolvitur?

Jam quibque sub manibus habeo discensum quendam super Calendarium. Vidi enim anno 1590 mi fallor et 1609 pascha nimis tarde celebratum fuisse respectu verorum et apparentium hoc nostro seculo motuum Solis et Lunae. Copernicus enim jam in aequinoctio vernali aberrat 18 horis fere. Audio, et te ipsum aliquando huc nagotto incubuisse et Imperatoris Majestati opusculum quoddam de hac re tradidisse; sed nondum vidi (scr. Vol. IV, p. 9 ss.). Ego valde suspicor (de ipso enim ante dubitamus, an hodie 1611 an 1612 pectus sit scribendum), ne error aliquis sit in conversione dierum Aegyptiorum in nostros Julianos et aequinoctium Ideo autumnale Ptolemaicum anno 152. sive 153. 24. Sept. h. 2. p. m. accidisse, non 25. Sept., et sic annus tropicus cum nostro consentiret, prout et video diligenti examini, eundem annum tropicum suo tempore fuisse qualis nunc est, modo tempore et principia dierum bene advertantur. Nam Ptolemaeus dicit, quod a meridie illa diem suum numeret, jam Hipparchus a media nocte incipit: aequinoctium igitur illi fuit anno 178. die tertia intercalarium currente et 12 horis exactis (post quam quarta dies insequatur, in ipsa sc. media nocte incipiens); tempore Ptolemaei vero 463. anno, 8. die h. 19. proxima, h. e. die 9. currente, differentia ergo d. 69 h. 7, quae subtracta a d. 71 h. 6 reliquant ex diff. 1 d. 23 h. annum tropicum 365 d. 5 h. 50 c. Altera comprobatio est in ipso Ptolemaeo: ☉ enim erat in 0° ♌ a. 455. 7. Athyr h. 2. p. m. c. Alterum aequinoctium a. 463. d. 8. Athyr h. 19 proxima, annus tropicus plane ut supra 365 d. 5 h. 50', qui et hodie accurate reperitur d. 365 h. 5. 48' 50" c. Vides igitur, Ptolemaeum nimis pertinaciter Hipparcho adhaesisse. Vereor etiam, ne eadem eccentricitas inierit et obliquitas zodiaci, qualis hodie est. Dicit enim Eratosthenes et Hipparchus, quod 11 partium proxima talium, quallum meridianus erat 83, fuerit tropicorum intersitium. Quid si pro particula illa proxima 1/6 defuit? Adde, quod lubrica observandi ratio ea fuit et in lignea tabella, et impossibile, quod Ptolemaeus inter Timocharem et Albategnium, qui propius accessit, non invenisset differentiam, sed nimis auctoritatibus ac tuitus est Ptolemaeus. Motum quoque octavae sphaerae procul dubie velociorem experieris 1 1/2' c. obliquo a Tychois ratioculiis, quod magnis illis instrumentis ejusdem bene observari possit.

Verum cum hodie tanta bellorum et pestiferarum infectionum periculosa sint tempora (prout et cum magno dolore audivi nob. et magnif. viri D. Teognelli adversam fortunam — cfr. vol. II, p. 811), non mirum est, quod artes et Musae siliant.

Hicce quam optime vale et, si per otium licet, quem primum rescribere et familiaritatem nostram edange.

Romae 17. Dec. 1611.

Tuae Dominationis amantissimus

Joannes Remus, alias Quietanus.

His Keplerus respondit:

S. P. D.

Literas tuas, Nobilis et doctissime Vir, 17. Decembris Romae scriptas accepi 5. Martii a ministro postae Pragensis, nullam igitur mihi morae culpam imputato. His literis doctissimas nonnullas moves quaestiones. Primum obiectis motui Telluris invariabiles fixarum inter se distantias. Equidem in hoc scrupulo ante annos 14 laboravi. (Cfr. Vol. I. p. 67.) Stellam enim polarem circa 26. Septembris observavi in media nocte humillimam, postea circa 25. Decembris vespere et mane tam humillimam, quam altissimam, si forte differentiam invenirem ab observatione mensis Septembris indeque orbis magni Telluris ad orbem fixarum sentiri posset proportio. Sed frustra ful, ligneum erat instrumentum, pinnacidia non accurata, inepta omnia ad scrupulosam observationem. Hoc tamen notavi, perpendicularum Decembri residisse eodem, quo reciderat Septembri. Postea copiam nactus inspicendi observationes Tychoonis Brabae, vidi altitudinem eandem utroque mense intra unum quidem scrupulum, nec major accuratio fuit in illis altitudinibus. Itaque semidiameter orbis magni se habet ad semidiameterum fixarum, ut minus aliquid sinu unius scrupuli ad sinum totum. Proportio est ad ter millies eoque amplius. Itaque haec immensitas etiam Tychonem Brabae perculit, quo minus Copernico credere vellet aut ante illum Aristarcho, qui Archimede teste proportionem eam dixit orbis motus Terrae ad orbem fixarum, quae sit centri ad superficiem. Ego vero libro de Stella Nova Serpentarii probabilem statui proportionem hanc, ut sicut corpus Solis ad regionem mobilium, sic haec ad ambitum fixarum. (IL 674.) Corpus enim Solis est motor, sphaera fixarum est locus et mera in ea quies. Sicut igitur motor ad mobile, sic hoc ad quiescentem. Cum itaque Sol sit ad Terram, ut 6 fere ad 1, et Saturnus abest 11500 semidiametros Terrae, aberit igitur 2000 fere semidiametros Solis. Fixae igitur abeant 2000 semidiametros Saturniae sphaerae, 20000 orbis magni, et semidiameter orbis magni subtenderet sextam partem unius minuti seu 10". Quodsi qua inest pulchritudo in hac proportionem, quid opus est nos trepidare super potentia Creatoris? Ille quod pulchrum est facile invenit faelliusque efficit. Miraberis forsitan, cui bono tanta vastitas? Mirabar ego, cui bono reliqua hujus generis. Ecce tu ipse, ratione ductus mechanica uescio qua, Saturnum collocas in medio inter Solem et fixas, medium intelligentem aequalitatis seu arithmeticum. Sphaera igitur Saturni octava pars erit sphaerae fixarum solidae cogitatae. Cui igitur bono septem partes vacuae, nisi quia tibi pulchrum videtur, Saturnum in medio esse? Et mihi igitur pulchrum videtur, Saturnum esse in medio geometrico proportionali, ulterius non quaero de vastitate illius spatii. Et quid si dixerò, totum illud spatium esse vacuum, ut obtineam etiam hic, nihil factum esse frustra: vacuum enim nihil est. Equidem valde tenuem oportet esse materiam, quae Saturni lumen non hebetat per 13000 semidiametrorum Terrae trajectory. Fixae igitur ipso Saturno clariiores quid aliud arguant quam hoc, nihil esse in intermedio inter Saturnum et fixas. Haec de prima quaestione.

Continuo filo orationis devenis ad quaestionem aliam; non enim video, qui cohaereat obiecto cum prioribus. Nimirum incredibile putas ea, quae de vi motrice disputavi, sic se habere; cum si vera essent, Terram 10 diametris progredi necesse esset quolibet die. Nihil hoc turbat. Nam Venus certo progreditur uno die pluribus semidiametris suis. In Mercurio omnia sunt in proportionem majorem. Omnino tibi quodammodo invito videtur aliquid

absolute magnum aut celere, quod latens imaginationis error est. Et quid tam, si etiam Solem credas moveri? Nonne et hoc mirum, tantum corpus dictum promoveri duabus suis semidiametris, decem Terrae?

In hypothesi Lunari, quae tertia tua est obiectio contra meas speculationes, difficultates ais te videre maximas; ego vero nulla in Luna opus habeo libratione, qualem Braheus computandi causa statuit. Sufficit mihi in Luna duplicem vim magneticam statnere, alteram perennem in ipso corpore, alteram variabilem ex illuminatione. Sed haec est materia Hipparchi mei, quem spero me elaboraturum, ubi me ad quietem composuero, Deo vitam largiente.

Si viam planetarum ex helicibus componis, doce et modum, quo per illas vias ineitentur sine solidis orbibus. Ego ex observationibus ovalem Martis viam docui, ex physica et geometria causas ostendi, quibus haec figura motu planetarum describeretur.

Lunam eandem nobis toto mense totaque nocte faciem ostendere rea est certa. At quid hoc ad Terram? Num opus tibi esse videtur, ut omnes planetarum eodem motu moveantur? Atqui verisimile est, Venerem rapidissime rotari circa suum axem, adeo ut ea rotatio ad sensum notari possit indeque sit ejus scintillatio. Et Jupiter procul dubio rotatur circa axem, ut hac rotatione secum circumire faciat quatuor suos satellites, quos certissimo intuitu videmus etiam in Germania ridemusque Sittium vestrum nostrumque Horkyum, manifesta negantes. (Comp. vol. II. 453 p. 6.) Denique, si ideo Terra non rotatur, quia Luna non rotatur, oportebit neque Solem rotari. Atqui maenlao Solaris circumirent in disco Solis absolvuntque periodum citius uno mense.

Observationes eclipsium, altitudinum Solis et declinationum magneticis videre cupio; quae si usui futurae sunt, cedent tibi honori.

Eccentricitatibus, quas Tycho Brahe constituit, ego noli non soleo, eoque fit, ut delitescant inter meas chartas nec facile jam inveniri possint. Limavit autem veteres Copernici (ut dicere est solitus) secundum aequum et bonum, aestimatione usus non adeo exacta.

Parallaxes planetarum insensibiles esse suspicor. Nam Martis *exorptione* animadvertere non potui, Veneris vero, etsi sunt majores in perigaeo epicycli, at illa tunc non est conspicua. Si, quod Tycho in quibusdam epistolis est professus, Martis parallaxes majores essent Solaribus, ut essent quidem, si conspicerentur: magno praesidio niteremur contra obloquutiones Ptolemaei discipulorum.

Cupio etiam tuam dirigendi methodum videre, ut cum mea itidem nova comparem. Non equidem quod experientiae respondeat (sufficere enim puto, si praemium respondeat labori dirigendi loca geneseos), sed ut videam, cui rationi initaria. Mea quippe ratio naturalis est.

De Venere erras, periodus ejus est $224\frac{2}{3}$ dierum, tui vero 583 sunt nisi fallor commutationis periodus tempusque inter duas conjunctiones Solis et Terrae.

De Calendario miror etiam socios mihi esse vani et irriti laboris. Est mihi ad manus manuscriptum colloquium de Calendario linguae Teutonicae, quod Caesari nunquam tradidi. Cum varia moveam, probo tamen popularem correctionem aurei numeri, nec probo, nostras rationes esse subtiliores Nicenis. Itaque et tuam scrupulositatem circa annum 1598 intempestivam puto.

De Christianorum aera dubitas, rectene 1612 jam numeremus, tibi enim 1613 numerandum videtur. Atqui o bone! libellus a me exstat, in quo non 1612 vel 1613, sed 1617 numerandum contendo. Nihil tamen hoc ad Calendarium. (Chr. vol. IV. p. 198.)

Interdum in dictionibus et sensu

De connexione diei Aegyptii cum Romano Lunae motus nobis illud dubium, quod tu moves, penitus eximunt. Si error in Ptolemaicis annotationibus aequinoctiorum: oportet aliquam habere causam, sic ut Ptolemaeus non ignorantia rationis temporum aequinoctium uno die postposuerit (si postposuit), sed videns volensque. Nam eadem ex ejus Calendario Aegyptio sequuntur, quae ex nostro Romano, si id applicemus. Neque tantum sequuntur illa, sed et scit illa Ptolemaeus et incipiat; nimirum inter Hipparchum et Ptolemaeum annum esse longum, quia in 300 annis dedit dies, cum contra inter Ptolemaeum et Albategnium sit annus brevis, at inter Albategnium et nos medioeris fuit. Et tu omnino recte ratiocinaris, si ab Hipparcho ad nos statuas annum acquabilem, Ptolemaica aequinoctia uno die antea ponenda esse, quam a Ptolemaeo sunt annotata. At quis tantae est audaciae, qui dicat, Ptolemaeum studio falsum annotasse idque toties repetitis vicibus? Quantum hoc in philosopho dedecus? Ignorans enim nihil fecit, qui Lunae motus citra errorem unius diei computare potuit. Et si tuis me suspicionibus eo redigis, ut, quamvis saepissime tentaverim comminisci speciosam occasionem errandi Ptolemaeo semperque frustra fuerim, tamen eandem rem porro quoque tentare statum.

De eccentricitate sane minor est difficultas, major erroris excusatio Ptolemaeo. Nam in Opticis (II. 220.) demonstravi, vel solam refractionem in causa esse posse, cur inter Ptolemaicam et Hipparchianam eccentricitatem discernere Tycho non potuerit. Alteram etiam causam errandi tu dicis proportionem inter 11 et 83. Sic quidem jam olim ego sum ratiocinatus, ipsam hanc divisionem circuli in 83 crassum quippiam redolere. Quomodo enim illam putas esse natam? nisi sic, quod Eratosthenes circino comprehendit intercapedinem tropicorum eaque circulum toties peragravit, donec tandem pes circuli in pristinum punctum rursus incideret, quod factum post 11 pererrationes circuli, in quibus intercapedo tropicorum inventa est 83. At post 11 circuli lationes consentaneum est, mensorem fessum esse gratoque animo amplecti qualemcunque propinquitatem puncti octogesimi quarti ad primum, ut ea pro illadem accipiat. Ut non dicam, quid peccari in 83 punctationibus potuerit. (Cfr. p. 36.)

De octava sphaera non facile tibi in tantilla differentia adescentior, nihil tamen habeo ex meis observationibus, quod contradicam. Nam ex quo D. Tenggagius adversis factis animum ad politica transtulit, instrumenta Brabei pereunt, egoque solus supersum, qui speculando artem qua possum promoveo. Oculis imbecillibus utor, nec valetudo ad nocturna frigora toleranda sufficit, praesertim solitario. Quid vero Linciana conditio, ad quam jamjam transire constitui Rege probante, profutura sit observationibus, tempus dabit. Vale et boni consule. Literas si scripseris, suadeo ad anam Regiam dirigas, inde Lincium facile transferentur, siquidem jam fuero profectus. Dedi Pragae 18. Martii anno 1612.

N^{us}. Dis. Tuae studiosissimus

J. Keplerus,

Sac. Cae. M^{is}. et Ill. Austriae supra Anasim Procerum
Mathematicus.

Quae hic responderit Remus, non copiat; epistolarum series in codice manuscripto hic interrupta est, de novo incipiens anno demum 1618. Ceterum per interjectos 5 annos non cessit consuetudo litteras dandi et accipiendi, quod ut multis aliis indicia ita ex hoc apparet, quod ne verbo quidem significetur intermissa illa consuetudo et quis sequentes

epistolae sermonem exhibent familiariorē et magis amicum, quā modo praemissae. In his Remae iterum pluries redit ad Epitomen, dubia eua Keplero proponens et Kepleri sententiam refutare vel emendare studens, ut non dubium sit, similiter in epistola deperditā illum provocasse Keplerum ad defendendum suum de Copernico iudicium, sicut in praemissa factum est. In proxima, quae extat, epistola (d. Viennae d. 30. Oct. 1618), nunciat Remae Keplero mortuum Archiducem Maximilianum (2. Oct.), „acceptum ee esse a Caesareis pro medico et mathematico Caesareo, cum stipendio 600 florenorum.“ Dein petit a Keplero, ut sibi communicet locum Mercurii (12. Oct. 1598. h. 9. 53' pro „thematē Serenissimi nostri“); refert, Martium scribere, stellam novam a. 1572 „adhuc haerere in eoa loco“; Terrentium (s. Soc. Jesu, celeberr. itinere in Siam suscepto, ubi per duodecim annos in pervulgenda fide Christiana nec non in praxi medica et studiis mathematicis bene meruit; mortuus est anno 1630; Keplero auctor fuit, ut iudicium suum divulgaret de emendatione Calendarii Siveusii) observasse Venerem conjunctam Lunae („super Luna equitare videbatur“) d. 6. Junii 1617; locum Lunae fuisse, refert Remus, $22^{\circ} 18' \frac{1}{4}$ \odot , long. loci 89° .⁶ Hic addit: latitudinem Lunae Tuo Excell. nimis auget; probet eam in eclipsi Solis 1612. mensis Maji et videbit enormem defectum cum observatione. Adsumt aliquas dubitationes in novis illis theoricis astronomicis (dicit Epitomen, in posteriori epistola errorem faasus), scilicet quomodo Sol posset perungere linea sua usque ad stellas fixas et an detur orbis stellarum? Certe Galileus multa habet jam edita, quae opponet. Edidit D. Sirturus telescopii abolutionem et jam Viennae moratur. — Suelius edidit observationes Hassiacas; utinam etiam Tychonicae eaderent, ut fieri posset comparatio: sed vereor, ne quisque enim sit acturus, scilicet de novo observaturus et forsā minori dispendio, quam ipse Tycho, cum adeo felix sit hoc hodiernum seculum et donatum novis et facilioribus instrumentis. — In motu Lunae Tuae Excell. Ephemerides 1616. et Originis quandoque ad 20' et amplius differunt etc. Interim me commendo et cordialiter T. Exc. saluto.

D. V. Excell: off. servus

Giovanni Bemo Quietano.

Ad haec respondit Keplerus:

S. P. D.

Clarissime Excellentissimeque D. Doctor, amice omnibus officiis percolende. Brevis epistola multa et magna tangis. Dolorem ex obitu Serenissimi D. D. Archiducis Maximiliani, patrui quondam tui, temperasti gaudio, quod te adscitum narras in aulam Imperialem, quod ad me pertinere puto, quia his artibus es instructus, quibus praeter valetudinem Imperatoris etiam astronomia juvari potest, quam ad curam te appulisse animum serio demonstras illa re, quod hanc etiam legem ministerii tui aulici tibi adscribi curasti. Itaque non tam tibi, quam astronomiae gratulor, imprimis vero mihi, qui et labore sublevabor et promotore in aula salarii mei suffultus sum. Nam hac tenus aut soli mihi laborandum fuit, aut, si calculatorem adscivi, quandoque impensae fuerunt faciendae de meo, cum nihil ex aula solveretur.

Locum \odot accipe ex meis tabulis, quam certo is ex unico triente totius circulus (in quem omnes moderna observationes coincidunt) in reliquos duos trientes derivari potest. Anno 1558. XII. Octobr. h. 10. minus 7'.

\odot $28^{\circ} 48' 5'' \triangle$	99257				
\odot 29. 40. 39. \triangle	42866			Inclin. $6^{\circ} 42' 51''$	213940
90. 52. 34.	39717	L. 92341			92031
45. 26. 17.	L. 12	Mes. 1529		Latit. 2. 41. 7 Mer.	305971
21. 57. 48.	L. 92043	Mes. 90612			
Elongatio 23. 28. 29.	92031				
\odot in 22. 26. 34. m.					

Calculi formam ex parte orbis annui non addidi frustra: primum enim caput eorum, quae tecum coram deliberare gestio, de hac ipsa erit materia, postquam ante 4 annos primum edita, nuper vero compendiosius proposita a foederato meo Beniamine Ursino, fuit felix illa calamitas tabularum mearum Rudolphinarum, logarithm. Videntur enim tabulae reficiendae et ad loga-

rithmos accommodandae aut penitus omittendae, substituto eodem canone logarithmorum, sed qui prius exactius sit computandus. Alterum caput erit de observationibus Brabeaus computandis edendisque et de impedimentis editionis amolendis.

Quae Marius de Nova anni 1572, non sunt dissimilia veri. Cometam ego hujus anni 1618 mense Sept. jam minorem omnibus fixis circumstantibus vidi per tubum salis magnam habere quantitatem; obscuritas igitur parvitas speciem praebet. Terrentio felicitatem expeditionis vere astronomicae precor, utinam Ephemerida anni 1619 haberet. Illa observatio $\odot \oslash \odot$ non est sane nobis negligenda, non tamen ei fidere possumus usque ad 4° aut 5° in longitudinibus locorum differentiam, eum et temporis observatio sit crassiuscula et calculus Tychonicus in Luna triduana non praestet omnimodam certitudinem ob variationis anomaliam nondum satis exploratam temporisque aequationem adhuc vel mancans vel suspectam.

De latitudine Lunae deque differentia ab Origano tunc disseremus, ubi prius tu prolegomena Ephemeridum anni 1617 diligenter legeris. Nam eclipsis anni 1612 mihi inter fundamentales est. Quae dicas nova illa tirocinia astronomiae non capio, num editam a me doctrinam sphaericam, an paginam, illam primam doctrinae theoricæ, quam coram vidisti? Ubi convenerimus, audiam Galilaei objectiones, cujus epistolas ad Velsærum Italicas habeo; puto vero nullam inter nos esse dissensionem, nisi forte in conjecturis, ultra sensibilia sese altius, qua redargui non amplius possunt, efferentibus. Demonstro ego ex necessariis, cavum esse spatium, in quo planetae, fixas exterius convectorum invicem; quousque illae spargantur, non disputo, ex acnibus solam analogiam vexo, sed dulcem et multiplicem; infinitum rationibus metaphysicis impugno. Veniamus igitur ad conflictum rationum. Opusculum D. Sirturi (si recte lego) videre pervelim. Cometæ duos simul apparentes vidi, charta descriptos ad D. supremum camerarium misi, rogans, ut medicis Imperatoris communicaret; ibi igitur requies. Vale Lincii Calend. Decembris 1618.

Cl. Ex. T. Officiosus

J. Kepler.

Remus in responsione sua (d. Insuperghi 13. Mart. 1619) narrat, literas Kepleri per 3 menses latuisse et traditas esse Brisachii 1. Martii. Licentiam se petisse ab Imperatore, ut ad Leopoldum transeat, „amatores verum chymiae et matheseos; his melius posset juvare nostros conatus.“ Interim ego, pergit, bonum consilium tanquam amicus dabo, sed in silentio, pro tua provisione extorquenda. Mihi olim, cum essem Viennae, D. Rechperger saepius dixit: ei D. Keplerus mecum bonam correspondentiam (ut sic loquar) teneret et dignaretur mihi scribere, ego ipsi faciliter suam provisionem persolvere curarem bel den obrieten Zahlmeister et alios, ipse enim medetur tales et unico verbo opus est, et set in magna estimatione.

Mihi placebat tunc calculus Mercurii et ex parte eum intelligo, sed non in toto. Non enim vidi neque tuam, neque Benjaminii (logarithmorum) editionem; si eam mittere mihi velles, prout etiam prolegomena Ephemeridum, quae nondum vidi neque habere potui, sicut etiam Harmonica, rem mihi gratissimam facies. Serenissimus mihi sumtus suppeditat præ talibus operibus mathematicis et libenter omnia persolvam.

Pro tirocinio illis debobam scribere: Theoricam Epitomen habeo. Mihi haerebant in animo „Tirocinia Balth. Caprae astronomicae“, et de his plura commodiore tempore. D. Sirturi „Telescopium“ impressum est Francofurti. Cometæ duos simul apparentes non vidi; forte fuit ille Decembris, qui tandem neque oriebatur neque occidebat. Galilaeus mecum concertabat de cometa, prout scripsit; sed male habet bonus vir, fere ad mortem. . . .

Bene vale et me amare non desine, Germaniae nostrae mathematicum decus, et mea opera, si placet, utere; P. Zieglerus mihi promisit, si aliqua sint excussa mathematica, quod Moguntiae procuraret et ipse correctioni interesse velit.

Id quod proponisti pro enucleanda distantia Solis a Terra in Ephemeride 1619, observabo hoc mense; nam 22. Mart. debet esse Linei ultima quadratura visibilis h. 7. 20' p. m., si distat Sol a Terra 3000 semidiametris, prout dudum parallaxes Meritis edocuerunt. Sed habenda etiam erit ratio assignatis parallaxeos. Ego et Scheinerus diversis locis observabimus. Eclipses ☽ hujus anni excedet tuum calculum per $\frac{1}{2}$ horam; durabit enim h. 1. 1' etc., sed per perspicilla optica, observandum erit; videbis in principio umbram annubilitam etc. — Cuperem habere locum Veneris et Mercurii ad d. 22. Sept. 1588. h. 9. p. m., Sol est in $29^{\circ} 44'$ ♍, tempore mense natalitatis mihi ut puto Mercurius in $15^{\circ} 4'$ ♍ et Venus in $20\frac{1}{2}^{\circ}$ ♌.

Has Remi litteras successerunt aliae, d. Viennae 23. Jul. 1619, in quibus monet Keplerum, ut responderet. Refert, Gallaeum edidisse sub nomine Guiducci dissertationem de Cometis, desiderare illum "librum Kepleri Copernicanum", quia prohibitus sit Florentiae, et non haberi possit; unde, pergit, petit a Serenissimo nostro eundem librum, se enim facile habitum licentiam, asserit. Ille (Gallaeus) exagitat Apellem (cfr. vol. II. p. 776), improbat Aristotelicos et impugnat eos longe aliis argumentis militatis; asserit, motum non producere nec frigus nec calorem, sed attritionem, Tychonem accusat, quod inutiliter ephemeridas et tabulas cometicas construxerit. Dicit esse fallacissimum, velle judicare altitudinem cometarum ex parallaxi; dicit enim, in rebus inanis veris et immobilibus subiectis valere parallaxin, sed in apparentiis, reflexionibus luminosis, imaginibus et simulacris vagantibus nullam posse parallaxin esse validam vel certam, et cometam in elementari regione ubique sub eodem loco coeli conspici posse affirmat, ut bulones, parelia et irides, radii Solis ex nubibus instar gladii decurrentes ubique fidem videntur. Dicit etiam falsum et debinm esse argumentum, a multiplicatione tubi in stellis sumtum, nec verum esse absolute, vicina multum, remota parum multiplicari. Vixit Romanum mathematicum, quod cometam posuerit circa Solem, Venerem et Mercurium, cum tamen ultra 90° devenerit: sed annon Mars, Jupiter et Saturnus etiam in Tychone agnoscunt Solem per centro? Tandem dicit, cometam ascendisse in recta linea et aequalia conficisse spatia linearia, refutante Tychonem in cometa 1577 propter candam ad Venerem directam; curvilem candae ex refractionibus deducit. Praeterea nihil novi habet.

Eclipse hujus anni non vidi, fui Bruggii in Styria, coelum per totam noctem nubilosum. Secundum meum calculum duratio h. 1. 1': commisi in Alantia cuidam, ut observaret eandem, sed adhuc non habui litteras. — Legi tuum Ephemerida 1617 et valde placevit. Certe in conjunctione Mercurii crede mihi, quod haereamus adhuc forte per 2° , ex observationibus meteorologicis. Quaesio aperiis mihi tuum iudicium de novitate illa parallaxia Gallaei; ego capere non possum. — Bene valeat et saepius ad me scribat.

Kepleri respondit: S. P. D. Redditae mihi sunt litterae tuae, Excellentissime Vir, et quas Martio vel Aprili, et quas 23. Julii scripsisti. Causas, cur non responderim, facile tibi est conficere. Cum priores meae ad te quartum in mengem errassent, verebar, ne nunc multo magis idem meis eveniret, cum ex diurnis actis intelligerem, Ser. Leopoldum nusquam consistere, sed circumcursitare exercitusque traducere. Lincii ego etiamnum haereo, necessitate magis quam voluntate per has turbas. Spero me tutum fore studiorum Inopentum honestissima specie et, si qui casus ingruat, tua pro amico Uranico vigilantia. Plura possem, sed tempus alienum videtur.

Primum ex tuis literis accipio famam, librum meum Romae et Florentiae esse prohibitum, nec satis capio, quem tu librum Copernicanum dicas; omnes enim mei sunt Copernicani, etiam Ephemeridum prolegomena. Harmonica quidem nondum sunt edita, nisi forte titulum ad te missorum libri V. unus Roman perlatum censuram subierit. Suspicio igitur, de Epitoma Astr. Cop. tibi sermonem esse. Ejus igitur unum exemplum, 30 cruciferis a librario emtum (Argentorati pro 80 cruciferis venit), magistro cursorum tradam, siquidem ipse sarcinam non detrectaverit. — (Sequentia de prohibito Romae libro leguntur vol. I. p. 195.) Deinde pergit:

Quod Tychoni vitio datur ephemeris motus comefici, non magnum crimen est, abundavit ille ad hoc otio, demonstravit ipso facto, cometas exleges non esse. Fallacissima saepe res est, ex observationibus arguere parallaxin parvulam, puta unius minuti aut duorum; at ex parallaxi ut vera posita ar-

guere altitudinem corporis, id ne Guiducius quidem fallax esse contendit. Hoc solum cauatur, si te bene percipio: cometam non esse corpus amplitudine seu angustia luminis, sed esse reflexionem luminis. Tunc sane verum esset, ex parallaxi de ejus altitudine nihil concluderetur; imo si corpus, radios Solis repercutions, esset aequabiliter planum, plane nulla esset parallaxis, omnes enim in toto Terrarum orbe cometam in eadem a Sole remotione eodem momento cernerent (qui quidem cernerent), quia Terrae quantitas ad Solis distantiam non est sensibilis. Sic iridem quilibet suam videt, distantem a Sole per 135° , non quidem quia aliqua plana superficies est, sed quia aer seu vapor in rotundas sphaerulas coactus est, quarum singularum refractiones singuli vident oculi. At ut cometam *imago* visoriam efficiatis, tu vel ille, hoc opus, hic labor est. Docul quidem ante annos 15 in Paralipomenis ad Vitellionem (vol. II. p. 297), cometam in pariete repraesentare, at requiruntur globus vitreus aqua plenus et paries, res per se visibiles et a Sole illustrabiles, quae quid praeter vel juxta cometas nihil videtur in coelo. Et cui bono pro corpore cometae parvulo substituitur vobis superficies repercutions immanissimae magnitudinis, si ad cometae apparentiam conferatur? Anne ut obtineamus, cometas in coelo non esse? Hoc vero ausum impervium est; nam aut supra Solem erit materia reperentiens et sic in coelo, aut infra Solem inque aëre et sic pars corporis, quae nihil cometicam facit emphasis repercussione radii Solis, eadem alii loco teget Solem ipsum. Et quia cometa toto orbe pene liadem in locis apparuit, oporteret superficiem planam aequabilemque fuisse, quae radios Solis repercussit. At quae causa, quis architectus tam exactaefigurationis? Nonne vides, ut miraculi magnitudinem extenuemus, multo nos incredibiliora et plura introducere miracula. Rursum, quia cometa visus est oriri et occidere, oportet corpus repercutions, si eo uti volumus, una ortum vel delapsum esse et sic in coelo collocari, non in aëre.

De tubo quid alter pro cometae magnitudine, alter contra arguat, id non capio, non enim vidi librum Romani mathematici. Quae vero dicit Guiducius de ascensu cometae aequabilis et rectilineo, illa contraria sunt superiori sententiae, quod cometa existat ex repercussu radiorum; nihil vero placeat unice.

Jam interposita quibusdam de opere suo cometico, quae leguntur vol. II. p. 578 et de Harmonia (scr. vol. V. p. 55), sic pergit Keplerus:

Tycho non rigide contendit, caudam cometae 1577 a Venere fuisse formatam, sed id demonstravit, deflexisse illam ab opposito Solis ad oppositum Veneris, suspicatusque est aliquid de Venere ut causa, sed id sane fuit per accidens; forte enim contingit, ut ibi Venus esset, unde egrediebatur cauda, ut pleraeq; a Solis opposito solent deflectere parum.

Eclipsin sic observavi: ante h. $12\frac{1}{2}$ urbis videre Lunam per nubes non potui, inde si quando transivit per raras et altas nubes, de rotunditate nihil videbatur deesse; sin autem eniteretur in sudum, videbatur quasi rasa vel dedolata superius, vix agnoscebatur, illum defectum deflectere ad sinistram, quasi versus Lyram. Post quadrantem rursum prodians praecise auresum vertebat defectum eratque propter dimissionem splendoris luminis in sudo notabilior quam prius et satis latus a cornu orientali usque in occidentale; at defectus quantus esset, aestimandi ratio iniri nulla potuit. Secutae nubes pluviae. Erat, ut apparet, paulo ante medium, quia Sol in 4° ☉ et hora post mediam noctem $0.45'$, itaque in ipsissimo medio debulset jam ad dextram parumper annuere defectus. Pone lineam inter cornua acquasse par-

tem tertiam diametri Lunae, ut fere dicat memoria, defectus erit unius minuti, quantum dat meus calculus, si augeam diametrum Lunae uno minuto, ut cogitare me passim in Ephemeridum praefationibus dixi. Pone lineam illam inter cornua aequasse plane semidiametrum Lunae, erit in defectu digitus unus cum $\frac{1}{12}$, nec potuit in medio sensibilibus fieri major, quia proxime medium observavi.

Ephemeris imprimitur, nondum plus una pagina confectum est, quam ad-
junxi ob praefationem.

Vale et rescribe celeriter; literas posses mandare curialibus, ut eas involverent fasciculo, qui ad legatum regium Teuffium mittetur. Nam tuas heri demum accepi ex incuria magistri cursorum.

Lucii 4. Augusti 1619.

Excellentiae Tuae Officiosissimus

J. Kepler.

Remus respondit: Clarissime et excellentissime Vir, amice Uranice colendissime. Tuas 11. Aug. accepi literas cum Epitome Astronomiae Copernicanae et prima pagina Ephemeridis 1620, et omnia diligenter refundam, modo aliquem habeam, cui tradam pecunias tuo nomine; et avide exspecto Harmonicorum editionem. Epitoma recta cum literis Serenissimi ad Galilaeum quam primum perferetur, nec alio modo, ut credo, prohibitus erit iste liber, quam quod contra diploma S. Officii, ante biennium affuam, loquatur. (In causa erat quidam religiosus Neapolitanus (Foscarini), qui Italice spargebat in vulgus hanc opinionem publico scripto, unde periculosas consequentiae et opiniones nascebantur; tum Galilaeus stiam omnis rigore ranciam suam pertractabat eodem tempore Romae.) Eodem modo et Copernicus correctus est saltem in principio primo libri per aliquot lines. Possunt tamen iidem, et hic quoque liber (uti puto), Epitome scilicet, legi cum licentia a doctis et peritis in hac arte Romae et per totam Italiam. Unde non est quod tibi timeas nec in Italia nec in Austria; modo intra tuos limites te continere et affectibus propriis impetres. Nescio enim, quae visa sunt de Cometa in Germanico idiomate (si modo tua erit), quae aliquibus magnis Domitis non admodum placerunt. Astra jam Harmoniam instituerunt more Syrenum, avertenda ea est, non promovenda, succedet enim lethalis somnus (cfr. vol. I. p. 195 et 658).

Putas, nos nusquam constitisse, sed semper circumcuratasse: scias, quod majori ex parte in Alsatia baserimus et inde recta Viennam pervenerimus, ubi nunc omnes inviti manemus et ego maxime, cui eodem die, quo sponsalia mea in Alsatia contrahabebatur, ea ipso praedio discedendum erat; gratias ago Turriano. Hoc anno non plus quam 625 milia Germ. coufecit, sed tandem post remum quies erit, licet vix intra biennium. Milites enim vocati sunt ad coenam magnam, varec quod non discedet ante epulas et donec inebriati fuerint.

Hinc transit Remus ad observationes cometae anni 1619, ad libros Kepleri de Cometis referendas, affert quasdam de balonibus et Iridibus, quae vol. II. p. 574 praemisimus, et bis transit ad eclipsas:

Quod eclipsin attinet, procul dubio exactam habebimus Romanam observationem, nam aestate Romae fere semper coelum serenum. Grisebergerus procul dubio observavit. Imo te non capio: die 26. Junii in Lunae cum Sole configuratione ponis conj. Solis et Lunae, b. 12. 27', eandem et ego h. 12. 28 $\frac{1}{2}$ ' ex Tycho; atque in principio et calculo eclipsium Lunae ponis h. 12. 38' vel 38' aequae Uraniburgi. Ego puto, Lucii esse legendum, secundum meum calculum fute Lucii debebat esse b. 12. 39', tempus emersionis h. 0. 23', incidentiae b. 0. 38' (ego miror, quod semper parvas haec duo tempora aequalis) et scrupula deincidentiae $\frac{1}{20}$ diametri (vel $\frac{1}{12}$, si bene recorder), $\frac{1}{2}$ paulo plus circiter. Jam te observasti 14' ante finem, ergo si 23' hodie dant 90', quid 14' habebis 55' vel 1' proxime in defectu hora observationis 12. 45', plane prout observasti, nec opus est, ut augeas diametrum Lunae. Tuam istitudinem Lunae in conjunctione et oppositione, quam credo maximam assumis 5° 18', non bene capio; legi quidem obiter prolegomena (in Ephemerides).

Quaeso exstimas eclipsin Solis 1612. mense Majo; es non saltem inveniebatur Romae excedere finem, verum etiam longe anticipare principium et magnitudinem aequare 5 fere digitos; fuerit 4 $\frac{1}{2}$. Finit erat in eclythericis magnis collegii Romani per tubum h. 12. 24', mihi stiam praecis h. 12. 24', in via Julia h. 12. 28' per astrolabium et mathematicum Belgam; sic Ingolstadtii: lega Schelnerum in „maeculis Solaribus.“ Mihi principium per observationem quasi h. 10. a. m., duratio h. 2. 24', Ingolstadtii 2. 45'. Quodsi tuas

consenserit et satisfecerit calculus, eris mihi magnus Apollo, prout et reliquis duabus centralibus Solaribus eclipsibus Clavisula. — Has nostras inter has turbas erant deliciae et refectiones, carissime Keplere; utinam te juvare possem, me semper promississimum haberes.

Nunc ad tuam Ephemerin. Optimo et maturo consilio sententiam mutasti, nam non omnes callent cantales additionis et subtractionis in logarithmis; imo me ipsum saepe fefellerunt et excipitem reddiderunt. Sane ante omnia deberet extrahi novus canon, ut et secunda haberetur cum differentia et p. p. ut in Pitisci stilihus. Ego cum differentias colligerem in principio, inveni aliqua errata typographica, sc. in primis minuta.

Tempus est ad aulam et praeterea nihil occurrit. Bene vale, mi carissime Domine Keplere et quamprimum mihi rescribe et indica, per quas vias tibi inservire queam; me habebis semper promptum et paratum. Dignus sane es, ut pro coryphaeo et patre nostro jam ab omnibus mathematicis habearis. Bene vale. Viennae raptim 18. Aug. 1619.

Tuae Excell. studiosiss.

Jo. Remus, Quietanus,

Si Leopoldi medicus a cubiculis et mathematicis.

Kepleri responsionem maxime ex parte addendam consulimus „prolegomena“ Ephemeridum, ubi etiam deprehendens calculum eclipses anni 1612, quem petit Remus. Reliquae epistolae pars haec habet:

Optas, me juvare posses. Potes et arte et intercessionibus; sed ab arte nihil peto, piatrinum hoc tuos lacertos non debet fatigare, extensas ad nobilissimas curas, nec enim aliter posses, nisi aliena, hoc est mea principia sequens, quod est ignobile, praesertim erronea. At intercessione potes, si de meo aulico salario, seu jam debito, seu adhuc corrente (nemo enim renunciat) tantum mihi numeretur, unde Gringalletum meum, jam dudum dimissum ob difficultatem temporum et nullum salarium, postliminio revocatum sustentare, unde Epitomes partem theoricam typis excudere possim, quia etiam Crügerus meus ut vetulus equus in lacunam procubuit. (Cfr. p. 26.)

Jam Keplerus ad Harmoniam (vol. V. p. 56) et ad logarithmos transiens haec scribit:

De Canone logarithmorum instaurando recte mones. Jam est in promptu methodus mirae facilitatis, adeo ut industrius aliquis scriptor, qui tantum sciat arithmetice addere, correctissimos sit adiecturus omnibus numeris simplicibus ab 10000000 per 9990000 usque ad 10000, ab 1000000 per 999000 usque ad 1000 et ab 100000 per 99900 usque ad 100, et ab 10000 per 9990 usque ad 10, et ab 1000 per 999, 998 . . . 1. Erunt 1000 logarithmi in una facie papyri majoris. Valebit in minori simplici accuratior, ut inter 100000.00 et 99900.00, inter 200.00 et 100.00, valebit, inquam, proportionalitas. Hic igitur ordo maximorum simplicium a 100000.00 usque ad 100.00 praecipuus est, in reliquis quatuor unica additione habetur logarithmus numeri similis.*)

Haec erit utilis tabula etiam usitatae arithmeticae; ipsorum vero sinuum logarithmis ad secunda non valde opus est usque ad parvitatem 7^a. Ab eo usque ad 0° 10' habeo ad dena logarithmos, iude ad 0° 0' 0'' ad singula. Praeterea antilogarithmia opus est accuratis a 0° 0' 0'' usque ad 1° 32' 0'' circiter. Il vero habentur ex Pitiseo inter excessus sinuum usque ad 1° 0' ad dena secunda, initio ad singula; restat ut etiam usque ad residua 32' ultra 1° sic exarentur; tantulo enim Pitiseus nimis cito abbreviavit scrupulositatem suam.

Sed nimio satis in turbis mundanilibus. Obsecro, quid mihi accidit, quod mihi descriptum pueri mei, non meam manum! Soleo ab illo descripta exigere

*) De 1000 secundi ordinis jam 100 sunt in primo et sic consequenter. Quodsi numerus quicunque 7 figurarum terminetur cyphra 8, aut 8 figurarum cyphris 2, aut 5 figurarum cyphra 1; habetur et ejus logarithmus non proportionaliter, sed per unam additionem,

sui exercitii causa; attonitus in meum chirographum incidit. Quaesio, num etiam correcte scripta? Num etiam a me revisa? Accipe tres reliquas paginas Ephemeridis et Vale. Si quid librorum petis, solve ei, qui has tradet, Lindelauff mercatori; per eum enim poteris habere quam primum. Exemplar Harmonicorum, etsi nondum est completum, mitto tamen, ut interim legas, tradendum denique Leopoldo Archiduci. Si D. Abbas a Cremsmünster posset impelli, ut me urgeret in editione Eptomes Astronomiae, suntus ipse locaret ad 200 flor., interim dum distractis aut mercatori permissis exemplaribus summa ipsi restituatur, id recte et ex commodo meo fieret. Mitto hic etiam Ephemeridum partem pro D. Tengnaglio, cui salutem et officia nuncio. Unam etiam Ephemerida offero bibliothecas et hactenus eam dabis alteri Tengnaglio. Vale. 31. Augusti.

Remus respondit d. 4. Oct. 1619 (Vienna), praecipue de eclipsibus disputans. Ad ea, quae Keplerus de modo, quo se sublevarum enperet, scripsit, haec respondit Remus: Juvare jam te vix licet, propter belli sumtus innumeros; vix aliquid ex mea provisione habui, ex Caesarea plane nihil; hinc reliqua cogita. Loquar tamen cum D. de Merkau tuo nomine, locutus etiam sum cum D. Moschinger, qui promissit quidem omnem operam; jam aegrotat, necio qua de causa. Si placet (sed in Alsatia apud meos, nam jam Alsata sum; meliorem enim terram non vidi nec quietiorem aut simpliciozem, ut sic loquar, et magis cordatam gentem), juhe et impero pro opera tua, gratum mihi erit. Edam suo tempore aliqua, quae tibi et tabulis Rudolphinis non erunt ingrata; tu Copernicus eris, ego infelix Reinholdus; si non ego, certe in Italia invenies, qui tua compendia deducunt, ut Maginus fecit, et extendent ac expandent et tuos labores et sumtus suppriment; ergo videas, quid faciendum. Addere licet aliqua in stellis fixis et eclipsibus; si tibi placebit, communicabimus ad invicem et si placeverit adjungas; lucrum tibi omne relinquo, saltem mea inventa nomine tui relinquendo. D. Tengnagel male habet, quod omnia immutet Tychonica et miscenas tua cum Tychonicis; latius ab ipso percipies. Rem gratissimam juventuti facies in logarithmismis majoribus.

Certe descriptum filii tui non satis intellexi, sensus enim mansit in aliquibus locis obscurus. — D. Abbas de Cremsmünster pollicitus est omnem operam, uti petisti, scribe saltem ipsi, ipse dabit occasionem et omnia requisita et modum. Paulo post (11. Oct.) addit his Remus: Dominus Abbas promissit omnem operam et bonam voluntatem, cui etiam te pro doctrina et meritis tuis insigniter commendavi.

Ad haec respondit Keplerus: Gratam facis mentionem operae mihi navatae, sed ejus me tamen miseret; scio te Aethiopem lavare, nec peto hoc rerum statu, ut cernens illis, imo ut tibi ipse molestus porro sis. D. Comiti a Meggau locutus sum hic in transitu; ut loquaris ipsi de studiis meis deque tua et de Italicae cumprimis expectatione non repugno, nam otiosae professiones, qualis haec mea videtur, periclitantur de gratia regum in his bellorum necessitatibus. At ut importune apud ipsum instes de pecuniis, id vereor ut offenculo sit. ejus in me, uti spero, ceteroqui promtae gratiae. Quae offers, differunt me cupiditate, quin tu potius ipsam etiam promissionem in Alsatiam distulisti?

D. Tengnaglio, quaeso, auctor sis, si scripturus est ad me, ne me incendat generalibus querelis vel imperiis, sed ut ad speciem adque capita seu numeros ipsos, qui sane quam multi sunt in prolegomenis Ephemeridum, descendat. Non equidem fieri potest aliter, quin mea inventa Tychonicis jungam in opere, in quo tam multa restabant; non tamen misceo, quin potius praescripsi legem in Prognostico anni 1617 (ubi cum Fabricio ago), ut quicquid Tycho de Luna edidit, id secretam a meis partem occupet tabularum. Jam optio Tengnaglio datur, velitne sequi Progymnasmata, an Magini iterationes. Nam meas transformationes anno 1602 perfectas et Herwartio inscriptas (vol. II. p. 697 ss.) dignas quae inserantur, quia nihil de principis Tychonicis mutant, solummodo aequationes hinc inde parentis scri-

pulis variant necessitate hypothesium, in quas Tyronicam sumsi transformandam.

D. Abbas huc veniet ad 4. Novembris; interim scribe, quaeso, num patiaris, a te peti sermonis exordium et num illi sis locutus tanquam a me subornatus, an tanquam proprio motu. Gratum mihi, si quicquam aliud, hoc certe fecisti. —

Ab anno 1620 in 1628 nulla superest epistola neque Romi neque Kepleri. Primum denno adit Renuus Keplerum sine anni 1628, quereus, quod nullum a Keplero responsum acceperit, quamvis ipse aliquoties scripserit. Hae litterae responsoque Kepleri (ultimae utriusque quae supersunt) quamvis aliquot annis post editam Epitomen concepitae sint, hio tamen inserendae sunt, cum multa habeant ad Epitomen atque posteriora Kepleri opera pertinentia. Quia vero longiores eunt et diversissima exhibent, censuimus eadem quae in prioribus voluminibus ratione Romi verbis immiscere Kepleri responso.

Renuus: Ta de novo appellandum dual propter communia studia, maxime cum operibus meis antea sublevatus sim, et retento nihilominus titulo medici Serenissimi et Episcopatus Argentiniensis, possessione quoque aliqua annua gratuita in dies respirum et vel claudendo hoc jucundissimum studium insequar, non aliter ac pedo suo lunia anno.

Keplerus: S. P. D. Clarissime Excellentissimeque D. Doctor. Quas scripsisti Rubecaqui, 17. Dec. accepi 23. Febr. anni labentis. Quicquid vero a 4 vel 5 annis scripsisti, id totum perit. Ego enim ab anno 1620 ad finem anni 1621 Lincio abfui; per 22. 23. 24. puto, me abs te accepiisse aliquas, meministi enim, me Epitomen Astr. Cop. misisse. Anni vero 1624 Octobri Viennam ivi, anno 1625. Januario Lincium, Aprili in Sueviam, Septembri reversus sum Lincium turbulentis temporibus ob reformationem, quam anno 1626. seditio rustica fuit insecuta et obsessio Lincii, qua vix soluta Novembri auri ejus discessi inde et relicta Ratisbonae familia veni Ulmam ibique per 1627 iacobui typo Tabularum. Reliqua petes ex adjecta epistola. (Cfr. Epist. Kepleri et Berneggeri mutuas. p. 127.) Ut autem respondeam aliquid ad ea, quae petis, sequar tuum ordinem.

Renuus: Eclipsis Lunae d. 20. Dec. 1619 Lalsbónae, Ingolstadt, Oeniponti et a to Lincii observata est. Hinc et ex aliis, exordiendo ab Hesperidibus, non a Canaribus vulgaribus, sed ab insula S. Jacobi apud Cap Viride, quae ora est Canaria Ptolisae, insequenter collige longitudines; (Qui sequitur catalogus locorum quaeratur apud Henrichum p. 539.)

Keplerus: Gratias ago pro communicatione longitudinum locorum. Scire velim, num me sis secutus in meridiano Uraniburgico per Romam duccendo, an id dudum ita statueris et ex quibus eclipsis?

Renuus: Ambitum Terrae invento 196840 stadiorum vel 19684 mill. Ital. magnorum, ubi 10 stadia (ex Strabone) faciunt miliare unum; stadium habet 600 pedes (23rdidub) vel 100 orgyas (Rafiter, Wrensbänge, Wrensböhe), 54 1/2 miliaria autem faciunt 1° et 544 stadia pro 1° coelesti.

Keplerus: De dimensione Terrae methodum tuam scire velim. Et ego unam tentavi, cujus in Opticis mentio in Epitome. Sed eam mihi Snelhus suspectam facit per refractiones: vide quae in Eratosthene Belgico de navigatione maris Ligustici mira referat.

Renuus: Vide columnam auream inter Pragam et Romam. Vel ambitus Terrae est 24480 stad., ubi 1 miliaria habet 6 stadia et tunc 68 miliaria Italica pro 1° veniunt, vel 56 2/3. Arabica etiam pro 1°, 17. communia Germanica pro 1°, vix iuxta Rugsburg una Rugsburg; item in Hispania iam in 1 1/2 Etunde tunc Weil, 12 2/3. mill. Germ. vel 13 potius a 2 horae, vix in Thüringen x; Nec quaevis provinciae habent sua propria miliaria. Petrus Romanus re vera est 41° 53' ex Sole et fixis, Patavinus 45° 22', quem mutuavit a me Maginus in sua tabula magna Italiae (communicavi Ipse Bononiae), Venetus 45° 30', semel etiam 29°, Oenipontanus 47° 18' ex observationibus.

Keplerus: Jubes videre columnam auream inter Pragam et Romam: aenigma non intelligo. Parvi enim facio aestimationem popularem, cujus uni-

tas incomperta; flexus per Alpes et Apenninum suspecti. — Etiam pro poli altitudine gratias. De Romano idem me fere docuit Pierronius Florentinus ex Tagliacenzio.

Remus: Hoc fundamento facto transeo ad refractiones. Ibi dedum vidi excessum Solarium nimiam quantitatem parallaxis Solis 3' arguere. Nam idem est angulus utrobique incidentiae (in Sole et fixis), ergo et idem refractionis, licet suspicer refractiones diversas et Uranoburgi observatas, uti Ingolstadtii eclipsis a 5' ad 8' ordinarie, teste Scheutero, forte etiam Tycho a 30' ad 45' excurrit. Quaeso in suis observationibus super hoc diligenter inquiras et mihi communices. Non levi enim suspicionem mihi movet refraction Cap. Algol in alt. $5\frac{1}{2}^\circ$, sc. $9\frac{1}{4}'$, cum tamen ex inclinatione maxime aëris $88^\circ 45'$ et refractione simpliciter $40''$ omnia reliqua fere consentiant; sc. in alt. $1^\circ 30' - 30''$, in $2^\circ 15' - 45''$, in $17^\circ 45'$, sc. Persol, $1' 45''$, sed in alt. dicta $5\frac{1}{2}^\circ$ scitem $8\frac{3}{4}'$ ex calculis proveniunt, non $9\frac{1}{4}'$. Summam altitudinem montium statuo cum Plutarcho et Xenagore 1270 pass. geom. et tantam ordinariam aëris, licet refractionem maximam excurrere posse neque ad $7\frac{1}{2}''$, non negam, ut apud Nigrilas ex Cademosto et Diodoro Siculo apud Sebas colligere licet. Vide meam praefationem Prognostici 1628 (ibi error: debet esse 12 *Strasburger Thürm* bñt, nicht gwey).

Keplerus: De refractionibus magnae est operae, quod petis, differendum in recognitionem ipsam observationum inter imprimendum. Portentosis refractionibus adde, si libet, ex Plinio altitudinem montis Casii in Syria ejusque illuminationem. Prognosticum in 1628. non vidi.

Remus: Utinam 24 libri observationum Tychois prodirent, quod plane spero, cum Tebulae Rudolphinae jam editae sint. Tum facile remedium huic morbo applicarem. Quaeso mihi tempus editionis futurae indices.

Keplerus: Ego quidem editionis observationum causa Saganum concessi et haberem jam praeium, si sine his turbis reformationum motuque externo fuisset. Nam hoc statu nemo typographorum huc se conferet.

Remus: Praesumo tamen non majorem refractionem in aequinoctiis Tychoicis (ad summum) $45''$, uti et meus calculus demonstrativus innuit. Quomodo autem Tycho invenit $1' 30''$ in alt. 30° , adhibita etiam parallaxeos differentia (Epist. Astr. p. 106), non capio, cum parallaxis altitudinis ipsa tunc longe major sit, sc. $2' 36''$, quam tamen semper ipse addere solitus est. Quaeso me edoceas in hoc puncto ex autographis Tychois. Hisce enim constitutis ad pulcherrimum ordinem et symmetriam corporum coelestium devenis.

Keplerus: De pragmatia Tychoonica in refr. 30° praeter ea, quae sunt in Progymnasmatibus, haud facile quicquam cuiquam constat; non supersunt enim ejus adversaria.

Remus: Anno 1626. 4. Junii Martis diameter a Cysato observabatur N. S. ocellis aut septias in apertura tubi sui contineri; tubus autem 7' capiebat, sc. $\frac{1}{6}$ diametri Lunarum, et addit: „videbatur mihi. plane Jovis discum aequare vel paululum excedere.“ Ergo diameter Martis $1' 0''$, fuit autem Mars in $12^\circ 58\frac{1}{3}'$ ♄ et distantia ejus a Terra 93960, qualium semid. eccentrici Solis 100000. Quodsi statuamus, diametrum Martis $1\frac{1}{2}$ Terrae continere, ut vult analogia et commensuratio orbium, et ut subtendat $59\frac{1}{2}''$, distare debuit 11657 semid. Terrae et Sol a Terra consequenter 12300 semid. Parallaxis igitur Solis saltem $17''$ erit et diametri omnium planetarum subtendent aequales angulos in longitudinibus mediis, sc. $34''$ vel $36''$, quod mirum et Harmonicis apprime consentaneum. Sed Jupiter perigaeus et acronychus $46\frac{1}{2}''$ vel $48''$ etiam. Ego nimis Romae habui $50''$ aseptus et tu quoque in Epitome tua. Puto enim, constanter radios vibrantes et lucidum orbem Jovialium circumfusum Jovem valde amplius aestimare (Merius de die observavit 17). Hinc ex superioribus Mars perigaeus et conjunctus Solis, quod tamen raro fit, et Terra etiam in perihelio existente, $2\frac{1}{2}''$ fere appareret. Sane ego aliquoties Meritem non totititer perigaeum observavi decies, duodecies in toto quodam, qui capit exacte $24'$. Continua tu etiam tuam censuram et observata adde. Veneris minima diameter conjunctae Soli in apogaeo $10''$ vel $11''$, maxima vero $1' 30''$, quod cum Galilaeo consentit contra Apellem. Cysato 1620. 11. et 12. Oct. invenit Venerem et Meritem ut 2 ad 3, quod cum hac mea proportionem ad unguem consentit, sic et Mercurius et Jupiter ex observatione Cysati. Modo de Jove certo constat, illum re vere in longitudine media non majorem esse $36''$. Oportet Galilaeum appellare per litteras. Res enim est subtilissima et visus meus etiam debilis.

Saturnus in longitudinis diametro aequalis est Jovi, in latitudinis dimidius. Esset igitur Saturnus fere decuplus, Jupiter quintuplus ad diametrum Terrae, plane prout distantiae. Et Jupiter et Saturnus caelestes expansi et simul cumti praecise milles hoc modo sunt majores Terrae, quod mirum. Sed et aliud mysterium hic revelatur: scilicet diameter Solis (quam ego in apogaeo $31' 30''$ cum Ptolemaeo proxime per decursum tubi nuper determinavi) plane aequat diametrum totius curriculae Lunaris, sc. 57 diametros, et nos ex Terra sub eodem angulo spectamus Solem, Lunam et mandum Jovialem, quas omnia harmonica sunt pulcherrima, et parallaxes Martis tam exiles testimonium etiam praebent. Sic Sol spatio novise mensis in se revolvitur; hinc et Lunae motus consurgit mensuratus. Distantias planetarum omnium per proportionem sesquialteram, uti tu exemplo vere aureo in Marte praefixisti, in Chiliad. Supplemento sic invenio per accuratos logarithmos Neperianos (nam per Ursinos nondum tentavi, qui sunt accuratiores): Saturni 952154,23; Jovis 520100,15; Martis 152366,00, Terrae 100000,00, Veneris 72349,00 fere, Mercurii 55710,00 fere. Luna, ut exlex, non ingreditur hanc proportionem.

Keplerus: De diametris planetarum allegas Cysatum, ni fallor folium N. 5 (nisi enim sit nota solis, non intelligo quid sit), velim itaque scire, quid libri. Ego quoque anno 1625. \odot in ∞ \odot , cum tantum elevaretur super ortum, quantum \odot super occasum, visus mihi sum differentiam diametrorum \odot et \odot pene nullam deprehendere. Itaque etiam antea in Hyperaspista coepi dubitare de hoc, quod diametri verae successive minuuntur. Nam diameter \odot , stante mea parallaxi \odot , etiamnum sit minor diametro \odot . Itaque invenies in libro dicto provocatum ad Galilaenm, sub cujus nomine tuto te et Cysatum intelligo. Profecto non valde puto inhaerendum analogiae diametrorum altitudinibus, cum in \odot gemina fuit et in proportione dupla. Id et tibi et mihi incommodat, tuas diametri aequalitati, meae analogiae cum intervallis. Lib. IV. Epit. fol. 480. unum. 2. nimis est rigida assertio, utinam pro *est* posuissem *videtur*. Parce itaque hic dogmatizandum. Quicquid statueris, examina ad id etiam causas, cur sit revolutionum proportio sesquialtera proportionis orbium, ut ego lib. IV. Epit. feci. De obliquitate eclipticae, aequinoctialis, eccentricitate Solis, omnia redacta studia nostra sunt intra terminos subtilitatis possibili observandi.

Remus: Jam data parallaxi et refractione, dabitur etiam declinatio Solis maxima non major $23^{\circ} 30'$ et poins Ursinburgicus correcte $35^{\circ} 55'$, idem Cassellie ex altitudine Solis in Cancro $62^{\circ} 11'$ (nam parallaxis et refrectio hic sibi praecise elidunt) et aequatoris altitudine $38^{\circ} 41'$ elicitur. Sed in bruma refrectio ibi sensibile emergit, sc. $4\frac{1}{2}'$, quandoque et $3\frac{1}{2}'$; nec mirum, uti Venus etiam testata est. Unum occurrit non contemnendum dubium, an scilicet uno et eodem die cum altitudine Solis majori non minoretur refrectio simplex qualitative per rarefactionem? Tentavi ego aliquando per calculum sinuum versorum et res non male successit; exspecto tamen tuam censuram.

Keplerus: Quaestionem moves de refractione, an ea intra novum diem varieitur per easdem stellarum altitudines ob ascensionem Solis? Interminabilis est haec quaestio. Doce tu me prius omnium altitudinum refractiones, manente medio, deducere ex nra. Tentavi in Opticis, in Epitomes libro I, at factus sum omnibus, qui mecum familiariter versantur, me adhucdum genuinas causas, quantitatem refractionum formantes, ignorare.

Remus: Minor quoque hinc necessariu elicitur eccentricitas Solis, sc. 1716 partium (dimidiata), licet ego, ut verum fatear, eccentricitatem Solis et Lunae realem majorem per tubum invenierim quam dimidiatam, sc. Solis 2400 e, et Lunae 6000, reliquum aequanti cedit (de hisce exactius suo loco). Hoc etiam verum est per tubum, quod Luna in quadratura non sit altior quam in conj. et oppositione. In Marte ex latitudinibus adhuc minorem eccentricitatem elicio quam dimidiatam, sc. saltem 8270. Peto magnam inaequalitatem in omnibus eccentricitatibus planetarum latere; nec per omnia dimidiatam, ut tu praesumis ex Marte, et superiores planetas tertiam mollem exquisita dequantare; imo Terra fere ad semilunarem integrum ascendit ex observatis: esset igitur composita aequatio Solis

1° 58', proxime scilicet, ut Albatagnus, Arzael et quidam anno 1512 (puto Prophanus Judaeus) inveniit, attestante hoc Rob. Hues „de giobis“ pag. 58, ec. 2° 2' 18", quallum semid. eccentriell 60. Hinc Alphonsinorum positio (quae scilicet est crassa dimidiatio inter Ptolamaeum et Albatagnum) in solidum in Sole corrui, ut qui vix 60 annis anteriores fuerunt. Ex Hipparcho, quo tamen modo, etiam plane eandem eccentricitatem erro et apogaeum in 25° Tauri. Eclipses Babylonicae manum porrigent in hoc casu (obiter etiam hoc moneo: eclipsis illa Lunae Arbellis conspecta intra 1½ horas, non consentit enim tuo novo calculo, tuda, meridiano Babylouico, Alexandrino emendato, emendabuntur etiam medii motus Solis et Lunae.

Keplerus: Si diametri luminarium tam propinque attestantur dimidiationi eccentricitatum, habes quod tibi gratuler. At huic subtilissimae observationi non in minutissimis fido. Cur enim hoc? cum ne Martis quidem observationibus creberrimis in Comment. Martis tantum fidere potuerim, contentus, illas emiens attestari. Praesumptio mea bisectionis exstet astitit demonstratione, ex speculatione vectis et librae deducta; in Epitome repetit illam summam. — Eclipsin Arbellis prius concilia cum eclipsibus, quas refert Ptolemaeus, nam illas satis propinque tueor. Male agetur, si meridiani constituantur per unam anomalae observationis, dimissis plurimis regulariter observatis.

Ramus: Alias de tua aequatione physica dierum naturalium composita plane non dubito et comprobavi per varias eclipses Lunae accuratas, eam esse absolutissimam nec aliam esse querendam. Ultima enim tua aequatio (pag. 111. Tab. Rod.) plane est superflua.

Keplerus: De aequatione dierum physica ego sponso esse nolim. Quinquaginta tracto eclipses rursus prorsus versus, nulla aequatio satisfacit, cum tamen minimum Tyconica discordat; sane physica anno 1628 Januario plane repudiata fuit, non minus quam monstrosa illa pagina 111. Rodolphinarum. 2)

Ramus: De apogaeis planetarum habeo etiam specialem speculationem, ut sit Saturni annuus ab aequinoctio 50° 25", Jovis 52° 15", Martis 1° 7", Terrae 1° 23' 48", Veneris 1° 44", Mercurii 3° 8". Sed prius enodare debere observationes Ptolemaicas et insidiari ipsi, quas per Lunam, quas per fixas habuit observationes. Nam et inde (hinc datis) harmonia motuum pulcherrima resultaret. Nam tua speculatio apogaeorum adhuc mihi non satisfacit uero principium mundi tam vicinum autumo. Et quae, quid mirabile contigit anno 1260, ubi Solis apogaeum erat in 0° Cancrī, vel quid peculiare contigit apogaeis circa nativitatem Domini? Utinam apud rabbinos invenire posses tractatum Rabbi Levi V. de sensuum Dei. 3)

Aequabilia et regularis mihi est annuus fixarum 49½" praecise, a Timocharida maxima, per vetustissimas etiam alias observationes, in Vaticano conquisitas. Nam Ptolemaeo acutum applicavi collyrium et aue ipsius gladio eum iungulo.

Keplerus: Speculationem tuam de apogaeis velim videre. Mea de carceribus motuum in apogaeis quidem (seu apheliis) ne mihi quidem satisfacit, eosque non quod speculatio dedit, sed quod observationes requirere visae, in epochis posui. Nihil igitur uisi admonitio est. Tu tamen rogata, quid miri anno 1260. contigerit, multum a sensu meo aberras, si hoc mihi tribuis, creatorem subibus periheliorum et apheliorum admonitum ad creandum esse progressum illa, quae admonitionem ponuntur suppeditare; an forte putas, me coelo aeternitatem tribuere, terrestribus creationis initium? aut quid causae fuerit, cur Deus alligetur ad observandos positus similes illi? quam volunt mihi aliam atque opera providentiae suae secundum illos disponenda?

Quod per tubum confirmas simplicem Lunae eccentricitatem etiam in quadraturis (v. s. p. 65.), valde gratularer mense hypothesi menstruae, si observationes tuae probabiles et fidae essent; at de hoc ego dubito. Nam si tubus tam magna repraesentat, ut propter magnitudinem subtilia ista discerni possint, tunc sane nullus tubus immoto oculo Lunam repraesentat integram; sin

Luna repraesentatur integra, minime magna erit, nisi forte non de visu sed de pictura loqueris per simplex convexum. Et bene admones. Ego cum anno 1603. et 1604. tentaverim hanc rem per tubum simplicem longissimum, immissum aestate in cellam profundam, ex quo dioptræ istae coppersunt parari, non amplius per illos tentavi; rursus tamen cohibeor diffidentia, ne tentem. Nam minime quantitas sit diameter \odot per simplicem lentem convexam in usitatis tubis. Longissimi difficillime parantur et vel minimam vitium convexitatis in tanta distantia tabellae jam sentitur, jam duplicat margines Solis. Quae igitur hinc speranda certitudo? Sin autem velles adhibere etiam concavum, jam certior est distantia, adeo ut anno 1612. eclipsin Solis sic observaverim, ubi Luna evidenter apparuit minor Sole; cum esset vere majoris apparentiae; nimirum quia circa centrum concavi ampliatio est parva, ob parvam deflexionem incidentium radiorum ab angulis rectis, in lateribus magna, ob angulos multo obliquiores. Si margo Lunae tangit centrum lucidi typi, minimum est damnum; si non tangit, contrahi videntur ejus cornua, quippe prolongata, terminia in recta ex centro promotis exteriora; hoc mihi tunc accidit, contrarium, si margo Lunae superat centrum. In universum nescio, quantum debeam tribuere comparationi diametrorum et distantiae Jovialium ob hanc causam. Nam tubus omnis ad lustrandum apertus admittit motum oculi, ut partes Lunae partesque distantiarum Jovialium successivè conspici et comparari possint; simul anim non possunt. Et vero eadem quantitas, jam in medio visa amplitudinis tubi, jam ad latera, ob dictam causam vel minuitur vel augetur. Itaque subtilitati tantae non puto locum esse posse.

Quid mihi tu de R. Levi Tr. V. Defensionum Dei? Hoccinè dicis, te habere et optare ut ego habeam, anne petis a me, ut tibi eum comparem? Si non habes, non ego inquirendi aliam viam inivi, quam per tuos vicinos Buxtorffium Basilae, Schickardum Tubingae aut per Judaeos Burgavii.

Quia te moveri video concentu speculationum harmonicarum, velim etiam atque etiam examines illa ex libro IV. Epitomes de dispositiōe, numero et motibus Jovialium, loco quidem non suo, ineliderunt in typo progredienti fol. 554; concinnitatem pluribus demonstro. In geometria capitale negotium est 5 corpora regularia, secundarium tria rhombica: rursus enim unum ex illis 5 fit hic unum ex tribus vel quinque. Sic in mundo capitalis structura est 6 planetarum, secundaria 4 Jovialium; etiam illi 4 ad normam 3 rhombicorum non amplectuntur Terram, num alium planetam? Non Terram debuerunt, quia Terra est inter dodecaëdrum et icosaëdrum. Ergo aut circa unum inferiorem aut circa unum superiorem. Verum inferiorum sunt tantum duo, et si octaëdrum est rhombis cognatus, Mercurius est intimus, nulla mediatio; melius circa unum superiorum, quia hi numero tres; habentes medium; circa Jovem igitur, ut medium et quia Jupiter est inter cubum et tetraëdrum; rhombis cognatiora. Sunt igitur hi 4 non per se circa Solem, quia non sunt rhombica suae propriae originis, excepto cubo, uno de quinque, sed sunt circa unum de sex, sicut cubus rhombicorum principium est, unus de quinque. Haec de número quaternario et locatiōe. De proportionibus vides fol. 554 propinquitatem ad opes rhombicorum geometricè adscriptos. De revolutiōnum periodis non potes non delectari, etiam in illis regnare proportionum (intervallorum et temporum) proportionem sesquialteram, quippe qui hanc sesquialteram in 6 planetis appellas mecum. Exemplum vere aeternum. Hanc speculationem si et ipse probas, attolle vocem in jublum, quod Rubeaque Sagauum, usque exauditam, per literas, scilicet. Non vero hoc tantum, sed

adde aliquid. Haec enim si sic sunt ob archetypos geometricos in mente creatoris aeternos, ergo et Luna circa Terram locata fuerit ex eodem archetypo? Tu ergo hanc archetypi particulam quaere, nam ego fathisco sub pondere, qui Lunam ex necessitate creaturae contemplatrix erudienda exstruxi in Prognostico 1617. et Epit. lib. IV. f. 480.

Ubi sunt illae tuae observationes in Vaticano conquisitae? Cur non prodeunt subsidio nostris speculationibus?

Remus: Declinationem Solis maximam hactenus immutabilem credidi, sed coactus sum ex tanto artificum consensu et observationibus et uostris, ut supra correctis, aliquam vel axis Telluris in colore tamen altum solstitiorum librationem concedere, ut et. aequaliter singulis $110\frac{1}{2}$ annis Julianis decrescat unico minuto et tandem, si mundus tam diu duraturus sit, uterque polus coludat et perpetuum aequinoctium efficiat. Et ecce, postquam recurri ad meas speculationes ante 20 annos Romae habitas, invenio, me tunc temporis eandem habuisse speculationem his verbis: „quid ei axis Terrae, quae non circuli annui polus, sed proprium respicit, paulatim quotannis ad polos circuli annui (ipsius Solis) vel invita detorqueretur libratione, vel crescente ibi mole et gravitate Terrae (ut in Hollandia, Zembla Nova videmus) deprimeretur, sc. 100 annis plus minus 1' regulariter, ita ut aliquando (si tam diu duraret machina mundi) poli sint coituri, manum ad hoc mihi porrigente Fracastorio in Homocentricis et in Syphilde, forsitan et tempus veniat etc. Res feliciter successit, uti apparet ex insequenti calculo ($110\frac{1}{2}$ anni pro 1'). Anno mundi 3200, sc. 750. ante Christum, temporibus Achaz et ubi primae observationes Babylonicae eclipsium incipiunt Romaque condita est et boreologium Achaz descriptum, ego statuo primam observationem factam, ut 11 ad 33, sc. $23^{\circ} 51' 20''$ (temporibus Atlantis, Josephi, Indorum, a. m. 2200, potuit esse 24° praecise). Anaximander, Anaximenes, Thales Milesius, 660 a. ante Chr., $23^{\circ} 49' 24''$, Timecharres, Aristarchus Samius noster, 275 annis a. Ch., $23^{\circ} 47'$. Hipparchus, 150 annis a. Ch., $23^{\circ} 45\frac{1}{2}'$. Ptolemaeus, 130 a. p. Ch., $23^{\circ} 45\frac{1}{2}'$. Alhategius, 380 p. Ch., $23^{\circ} 36' 25''$ (cor. per meam parallaxin et demonstrativam refractionem $23^{\circ} 35' 30''$), Arrazi, a. 1073, $23^{\circ} 34' 59''$ ($33''$). Almeus, a. 1143, $23^{\circ} 34'$. Prothafius Iudaeus, a. 1303, $23^{\circ} 32' 59''$ ($30''$). Regiomontanus, Frischbach, a. 1460, $23^{\circ} 31' 9''$ ($5''$). Waltherus, a. 1480, $23^{\circ} 30' 55''$. Tycho Brahe, a. 1580, $23^{\circ} 30'$. Nostro tempore, a. 1630, $23^{\circ} 29' 35''$.

Keplerus: De aequali praecessione aequinoctiorum gratulor nostro consensui; de obliquitate eclipticae videbis, quid agas. Probo ego peculiari libello (quem tamen cogito partem commentarii in Tabulas facere) ex omnibus veteribus observationibus planetarum et fixarum cum Luna congressarum, eandem olim fuisse.

Remus: In ellipsis planetarum tecum consensio, aequantes tamen majores et minores pro accessu ad Solem et recessu constituo.

Keplerus: Ellipses meae junctam habent minutulam variationem eccentricitatis aequantium, ut in Comment. Martis et in Epitome geometricis probavi demonstrationibus. Nam si fixo puncto aequantis uterque more Ptolemaico, vitia rem prosthaphaeresses eccentrici. Quod vero fixum retineo focum alterum ellipsis, id non est ad usum quasi circuli aequantis, quem ego misum facio, ut alienum a scopo meo, sed est ad formandum super hac basi triangulum aequatorium justum lege geometrica, quod mihi metiatur moras, ut veteribus suis aequans.

Remus: Hypothesin Terrae mobilis mathematicae assumo et demonstro, nam physice nec licet, nec opus est mihi. Satis superque tu tractasti super hac materia, nec tibi palma eripienda physica.

Keplerus: Dum negas, licere tibi Terram physice facere mobilem, risum elevisi, dum recorder pediculus tot, quot in radio unitates meministi, puta joci tui, in epistola anni 1620. *)

Remus: Quaesio adhuc 2 exemplaria Tab. Rudolphinarum ad D. Berneggerum mittas et mihi significes pretium per epistolam, item Astronomiam Danicam Longimontani, quam nullibi conquirere potui (exemplar unicum); solvam statim pecunias D. Berneggero.

Keplerus: Prognostici exemplar recepti unicum, Principi scriptum, quod eadem hora mihi Gustavoviae, additis, quae de eo scriptae sunt. Continuus in castris: est nec ante hiemem alteram adfuturus dicitur.

Eclipsis Solis 1560 Lovanii Corn. Gemma initium statuit post 11, finem h. 1. 23', digiti $7\frac{1}{2}$ fere. Viennae Paulo Fabricio et Tilsmanno Stellae initium h. 0. 52' (pro Paulo in impressis lege Parillo), finis h. 2. 15', in maxima obtenebrationis h. 1. 34', dig. $5\frac{1}{2}$. Conytabriae totalis. Eclipsis Solis 1567, referente Rutillio Stuccardiensi W. Rieger, medicus et mathematicus Wirzburgi h. 1. 0' 51" (cfr. III. 723): Gemma, puto Lovanii, princ. h. 10. 12', vigorem h. 11. 40', finem paulo post h. 12. 30', puncta fere 9. Tycho in averse folio, quod sequebantur observationes anni 1569, verbis brevissimis, cum nullas alias a. 1567 reliquerit observationes, scripsit, quod Mercator, prodiderit Dnisburgi initium h. 10. 25', finem h. 1. medium h. 11. 43', totam durationem h. 2. 35', et addit, Rostochli fuisse parum post h. 11, Tubingae vel Esslingae dig. 10, Romae centralis. In Opticis (II. 316) alias scetus sum schedas, quae continebant computationes ex calculo Tychonis, manu et calculo ejus studiosi Seiffarti medici. Göttingensis observatio pomposa est, si tantam habet certitudinem, omnino bona:

Initium h. 10. 55'.

Dig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 25'. 3. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Solis h. 11. 14'. 32'. 47'. 59'. 12. 8'. 15'. 20'. 23'. 25'. 27'. 30'. 35'. 42'. 51'. 1. 3'. 10'. 36'. 47'.

At fucata esse patet inde, quod aequales digiti tam exacte habeant aequalia tempora: si daos corrigas minores, scilicet pro 10. 53' scribendo 11. 3' et pro 1. 10' scribendo 1. 18'. In meis computationibus usus sum altitudine poli 51° 12'.

Respondi ad capita tuae epistolae; addo utrum ex me. Cum Ratisbona discederem, reliqui exemplar Tabularum bonae papyri pro Ser. Leopoldo, patrono tuo. Brevis mea mora in illa urbe non tulit, ut Oculipontem mitterem. Jam absens consilium sum inops. Si placet Excellentiae tuae, per eandem viam suppeditet mihi consilium praesentandi. Etiam Dillingae reliqui 2 exemplaria munda, petente Curtio, unum pro Episcopo Principe, alterum, ut aiebat, pro academia Jugoletadiensi; de his mihi non est satisfactum, cum dimidium debeam Brabeanis haeredibus. Forsitan adhuc sunt apud illum, ut non necessaria; aut juva ma per Jesuitas, ut mihi satisfaciatur, aut illa duo ex meo concessu ad tuos usus inde repete. Et ne erret ille P. Curtius: tertium longe antea per partes mihi ipse P. Curtius et dono dedi; quartum ibi idque pro Dillingana academia, pro hoc quarto P. Rector Sigersdorf mihi satisfecit solo.

Valde, clarissime Vir, meque et artem, quod facis, ama. Dabam Sagani d. 2. Martii 1629.

Fridericus Förster in vita Wallensteinii (II. p. 2. 3) epistolam d. Sagani d. 24. Febr. 1629. Kepleri ad Wallenstanium proponit, in qua haec ad Remi Prognosticum pertinentia deprehendimus: Durchlauchtiger, Hochgeborner Gnädigster Fürst vnd Herr! Demnach ich nun in die 4 oder 5 Tage mit Ausfertigung meines hiesel über-schickten vnd auf Euer Hochgeboren Gnaden schriftlichen, auch durch Herrn Bocatio ankündeten mündlichen Befehl ausgefertigten Discurs umgangen, auch dariu Ihrer Fürstl. Durchl. Erzherzogen Leopoldo mit Vielem Meldung ge-than, kommt mir anheute, gleich bei Ausfertigung des Pakets, vom hoch-ermeldten fürstl. Durchl. Mathematico, D. J. Remo, Med. D. zu Rusach, hiemit eingeschlossenes Prognosticum cum inscriptione ad Ill. Cels. Vestram, welches mir durch Strassburg, Nürnberg, Leipzig, Gürlitz zuebefördert worden. Es werden zwar 2 Exemplaria angemeldet, mir ist aber nur disa worden, so für E. fürstl. Gn. gehörig. Vud meldet der Autor Remus Quietanus (teutsch Rueterauff) als E. F. Gn. kurzverwichener Zeit in seinem Vaterland Thürin-gen in der Stadt Saltzung gewesen . . . sequuntur verba Remi ipsissima omis-sis illis, quae votum Remi de successione Wallensteinii exhibent . . . , welches E. F.

Gn. ich nicht unangemeldet lassen solien. Weil aber ich vermuthe, E. F. Gn. werden mein iudicium begehren über seine Enigmata, erkläre ich mich voran, dass ich ihn nit allerdings penetrirte in Anstellung seiner Comœdie vnd Austheilung der Persohnen. Er sagt wohl von 7 kriegenden Königen: die möchten seyn Spanien vnd Frankreich, Oestreich vnd Dänemark, Schweden vnd Polen vnd der siebente Eugeiland. Es will auch schier sein Saturnus sich auf Dänemark, Luna auf Schweden, Jupiter auf den Kaiser ziehen, Mars auf Frankreich, Sol auf Spanien. Aber doch lautet es hin vnd wieder, ob es nicht lauter Könige wären, sondern Sol vielleicht ecclesia Romana, Venus die Confessio Augustana (wiewohl der Autor zu Rom in der Inquisition katholisch worden vnd noch ist, E. F. Gn. seinem Vaterlande zum Herrn wünschet), Mercurius die Staaten oder Venedig oder Engelland. Mehreres darf ich nicht unterwinden, den er selbst lebt vnd suorum verborum interpres est. —

Sicut Crügerus, Beems et alii, in rebus astronomicis bene versati, iudicium Kepleri sibi expetierunt de astronomia Copernicana, sic alii quoque minorum gentium Keplerum adierunt, eadem ab ipso petentes, neque Keplerus, ut erat liberalis et paratus ad docendos instituentisque artis cupidos summos et infimos, doctos et indoctos, dummodo videtur verum et sincerum studium rerum causas cognoscendi, responsionem remisit. Unum pro feliciis diciamus Petrum Hofmannum (v. s. p. 19) Math. et Medicinæ studiosum Pragensem, qui a Keplero per literas (1615) petiit, ut „hypotheses planetarum ex invento Tychonis in schemate delineatas et simul, quomodo et ubi a Copernici discrepent, sibi monstraret.“ Keplerus in responsione sua aperte dicit, se pens oblitum esse nomen Hofmanni, nihilo minus his ad illius questionem respondit: Petis a me aliqua, quae hypotheses attineant Tychonicas. Ego vero sequor Copernicum in generalibus, ejus hypotheses ad Tychonicas accommodantur facillime. Mihi planeta quilibet habet unum solum circulum, a centro corporis Solaris eccentricum, inclinatum ad eclipticam inclinatione constanti super sectionis linea, quae per centrum Solis transit. Hic circulus in longitudinibus mediis est paulo compressior, imitans figuram ellipticam, sic ut ejusque planetae eccentricitas eccentrici HP (cfr. schema N. 29. Vol. III. p. 81) sit medio loco proportionalis inter diametrum circuli planetarii SO et latitudinem lunulae MO, ab hac elliptica figura itineris resectae in quolibet semicirculo. In hoc circulo seu ellipsi planeta incedit vere inaequaliter: diutius enim versatur in aliqua parte circa K, quam in aequali circa I. Proportio temporum est eadem, quo linearum HK, HI. Tu si vis, transpone ista in formam Tychonicam sic, ut maneat H Sol communis clavus omnium 5 orhium moveaturque motu fere tali, quem dat ei Tycho, nisi quod dimidiam saltem Tychonicae obtinet eccentricitatem eccentrici siqueque motus deferat secum centra (vel quasi) quinque orbium, et maneat KI linea in hac circumlatione sibi ipsi parallela maneantque motus planetarum ab I circa Solem H, quales secundum Copernicum produntur. Habes delineationem utriusque astronomiae, et quam tu vis et quae mihi Copernicano videtur verissima. Addam et numeros, ut sim liberalis omnino, nullum enim periculum est, ut me quis praeveniat.

☿	eccentricitas	5700	Aphelia	26°	☿	Inclinatio	2° 32'	Limes boreus	21°	☿
♂	"	4822	"	7°	☿	"	1. 20	"	7°	☿
♂	"	9264	"	30°	☿	"	1. 50	"	17°	☿
♂	"	1800	"	6°	☿	"	0. 0	"	"	☿
♂	"	700	"	2°	☿	"	3. 22	"	13°	♂
♀	"	21000	"	18°	☿	"	6. 54	"	12°	♀

Vale et haec boni consule. Lincii 26. Apr. 1615.

H. Tuac amicus J. Kepler.

Florianus Crusius, quem supra assepius diximus et loquentem introduximus, sententiam suam de hypothesi Copernicana theosophum agens (postea nunciat Kepler, „Fratres Rosae me appellare soleant Ursum de Vulpibus“) his Kepleri proposuit: Cum video, te in edenda Epitome tua laborare, non incommode te, antequam ea integra prodeat, moneri posse existime. Certum est, sententiam Copernicanam de loco et motu Terrae ita a te esse defensam, ut illi, qui stupidi sensuum iudicio et Aristotelici crebri ἄποδοςιν inibi acutissimis tuis contemplantibus obloqui ausi fuerint, plane responsione amplius indigui habeantur. Veritatem tamen huius rei altioribus innixae principis uiterius indagari et perscrutari per te (qui liberrime in omnibus philosopharis et omnes libere philosophantes amas) vel maxime licebit. Ut vero in hoc in negotio animosius agis, antiqui praesertim Aristarchi Samii astellitio stipatus, ita libentius ego longe antiquissimam Zoroastri Chaldaei et illius ter maximi Hermetis Aegyptii divinissimis et subtilissimis principis innixam incipiam quodammodo Aristarcho tuo obloqui. Solenne est omnibus philosophis, sed paucis admodum intellectum, hominem nuncupare *μικροκομῶν* (quod nec tu, Vir Clarissime, negas, et causam sola, cur negare non debeat): si vero *μεγακομῶν* est, totius universitatis scopus erit, in quem solum omnes potestates collineantes conveniant in ipso tanquam centro: unde et centrum occupabit et extra centrum hominem esse ἀνέχῃ naturae rerum maxime repugnans prohibebit. Semina enim et quintae quasi essentiae totius plenitudinis undique pari virtute in hominem tendunt et iaciuntur, omnes in homine scientias habitant. Dein ex sacris et ipsa natura constat, hominem totius visibilis creaturae dominum esse et in medium paradisi collocatum; paradisi autem is non certus erat hortus, sed tota visibilis universitas, unde in huius modum a Scriptura collocatus dicitur, et is locus debetur mortali Deo, cui omnia servire tenentur, non alius. Praeterea omnium entium centrum et origo et scopus est Deus, qui solus in toto entium ambitu ubique idem unus et mutus viget; ita visibilis mundus, archetypus in invisibilis imago, et in eo Deus visibilis, homo, intus sa invicem dispositi sunt, et quemadmodum Deus centrum universae plenitudinis, ita homo centrum visibilem, et per consequens in centro. Tum ex centro extenditur circumferentia, non vero ex circumferentia centrum constituitur. Jam, ut ex historia creationis constat, ex terra et inter inferiores atque superiores aquas extant sunt coeli ita, ut terram undique coelum comprehenderit, in quo coelo deus stellas et luminaria magna collocata sunt et orta, Pulcherrime cum Mose Hermes consentit; is enim ita in Poimandro: sex humidae naturae viscerae sincerus ac levis ignis protinus evolans alta petit, aer quoque levis spiritus parens mediam regionem inter ignem et aquam sortichater, terra vero et aqua sic invicem commixta jacebant, ut terrae facies aquis obruta nusquam paterat. Haec duo dein commota sunt a spirituali verbo, quod eis supererebatur etc. Totam etiam visibilis creaturae machinam quatuor corporum receptacula continere, antiquum est, terram scilicet, aquam, aërem et ignem. De igne, quod is supremam mundi occupaverit et ultimam sedem, nemo dubitabit, qui modo antiquissimam vocem aetheris, coelo attributam, aequa lance et animo excitatione perpendit et cum omnem ignem ad superna tendere omnemque desuper venire animadverterit, imo ignis ipsius rarissimam et maxime expansam corporis consistentiam intellexerit. Lecum vero maximum et amplissimum ignis consecutus est, ut infinitis corporibus, hominis causa ibidem collocanda, locum praehere possit.

Quodsi vero argas Terrae exilitatem et Solis magnitudinem: cum omne centrum ex illo esse debeat et tamen ejus vis per omnem circumferentiam sparsa sit, ut et in hoc negotio; quo salum meus homo, tam angustis antennis, domini tamen totius universi, non pertingit? Imo si ex magnitudine centrum esset judicandum, non Sol, sed Sirius, qui major est Sole, centrum erit, et si Sirius extra centrum est, que jure Sol illud occupabit? Et vis motrix illa in Sole adhuc admodum incertis et fragilibus nititur fundamentis. Scriptura S. tota est mensuram partium etc.

Postremo recurro ad auctoritates antiquissimarum, quae ex revelatione divina sua primaria dogmata habuisse testes sunt historiae, testes ipsa sacratissima et plane humanam rationem transcendens scripta: major ergo horum mihi auctoritas merito esse debet, quam reliquorum speciosa nec sat firma ratione aut experientia confirmata signa. Concludam ergo cum divino Zoroastre, totum mundum ex igne et aqua et terra et omnia lento aëre constare etc.

Sed ne justo molestior sim, desino et reliqua quae dici possunt plurima in aliud tempus reservabo. Tu interim, Vir Clarissime, voles at meae infirmitati ignosce. Salvere juba D. Gringalletum, Hixterum, Rauschardum etc. Dabam Argentinae 31. Jan. v. et. 1617.

Kepleri responso desideratur. Crusius Interim Argentorato abijt secedens in arcem Rastenbergam, „quae sita est inter Zvetiam et Crembsium, ad generosum D. Mich. Zellern“, Rudolphi quondam Imperatoris camararium“. Istine per literas (d. 13. Jan. 1619) petit a Kepleri, ut Astronomiae tam primae quam secundae partis (si jam impressa sit) exem-

plaria duo tibi mittat, unum quidem in meum usum (primam partem, quam dono a te acceperam, D. D. Klopffingus, medicus familiaris quondam tuus Lincolni, magnis precibus a me extorsit), alterum pro D. Phandiero nobili, qui dimidio milliari a nobis in Leechberg arce habitat, et simul pretium indicet, quod prima occasione tibi mittetur. Paulo post (23. Febr.) scribit Crusius Keplero respondens: Existimaveram, secundam partem Astronomiae tuae proximo mense vernalibus exituram in lucem, sed misera adhuc propter ignaviam parentum et tutorum suorum in gurgustio typographi delitescere cogitur. O infortunatos genitores, quorum supbia negligentia liberorum claritas et fortuna tam turpiter perditur! Equid typographus agit? Nonne pudet hominem, spatio 7 mensium 80 tantum paginas posse imprimere? An ita in re uxoria occupatus est, ut cibi etiam obliviscatur? In Harmoniis tuis aut vera aut falsa docebis; si vera: sagacissimus mihi naturae Hermes eris; si falsa: pulcherrima tamen speculationis hominum ingenuissimos animos saepe delectabis. At quoniam vallem, ut verissima sint omnia, quas scripturus es, praesertim ea demonstratio, quae ad obtinendam dispositionem illam vera harmonicam in motibus corporum coelestium, eccentricitates planetarum illas ipsas, quas quilibet pro se habet et non alias comitum debuerint. Et video mihi jam veritatem certam et firmam harmonicam tuam dispositione in motibus istis coelestibus videre, si modo palmaria tua hypothesis de loco Solis in centro universalis irrefutabiliter demonstrata esset. Et crede mihi, quantum in demonstratione dictae tuae hypotheses laboraveris, tantum splendoris et auctoritatis et fidei et veritatis ad Harmonicam tuam accedet, nec opus erit, ut lectorum tuum per 100 annos expectes, sed vivus etiam, quod nulli ex hominum memoria contigit, inter sidera refereris; ipse Orion et monstrorum domitor Harcoles tibi cedent, nec principem inter astra locum et lumen invidebunt.

Exemplaria primae partis Astronomiae tuae ego et D. Phandierus accepimus. In eo exemplari, quod mihi cecidit, defecit circa finem paginae litterae V et paginae litterae M excedit, quam remisit et D. Negligerum nomine meo officiosissime salutatum era, quaeque, ut recepta pagina M deficientem pag. V tibi, ut hoc nunculo eam mittas, tradere non gravetur.

Proxima Crusii epistola tota est de Harmonia et in praefatione ad hoc opus legitur. Quae hanc sequatur, data est Genavae $\frac{1}{2}$ Maji 1621. Crusius narrat, se in Galliam profecturum Linetum venisse ibique comparisse, Keplerum in Württembergiam profectum esse, vel in Angliam peregrinari. Genavae moratus est Crusius apud Gringalletum, inde Parisios concessurus, ubi aliquamdiu consistere in proposito habuit. Ad manus meas, refert, hic Campanellae liber de sensu rerum pervenit, in quo, quia auctor iste multa subtiliter de anima omnium rerum et sentiente et intelligente disputat, et in eo, quod tu animam Terrae sentientem ac suo modo intelligentem etiam in Harmoniis tuis demonstras, tacum conventum videtur, eo libentius scriptum illud perlegam.

Ultima eorum quae supersunt Crusii epistolarum data est Argentorati (15. Nov. 1621). Tumultus Galliae Crustum impulerunt, ut prius quam ipsi propositum fuerat in Germaniam rediret. Refert, in itinere Geneve Parisios facto observasse se deliquitum Solis, redit ad Propnoctium Kepleri in annos 1618 et 1619 (cfr. vol. I. p. 479 cc.), turbas in rebus politicis et ad fidem pertinentibus acre fert et hinc finem facit: «Uade ego cuperam, ut tu Harmonicam tuam Evangelicam aderes, aut si fieri posset, ut exemplar descriptum habere possem, libenter tibi pretio pro eo solveretur, et certe equum fuisset, te simul aut etiam prius hujus Harmoniae edendae curam habuisse, quam alterius istius, quae mundi hujus harmoniam explicet. Promissum exemplar quarti libri Astronomiae Dno dante ipse a te repetam eo festo tempore, quo minime credis; satius enim est, jam sedibus incertis oberrare, quam loco effixum certam periculis pati et quidem sine necessitate. Exemplar Harmonicorum tuorum Parisiis mihi acquisiri.»

Quae supra (p. 37 a.) exhibitus de lite inter Nagelium et Crügerum, de lisdem agit Philippus Müllerus Lipsienis (cfr. vol. II. p. 481 et V. p. 66 ss.) in litteris ad Keplerum datis, quibus etiam de Epitome Kepleri et Harmonie disserit. Refert, Seussium ipsi communicasse Kepleri iudicium de «pagulis suis Antinagelianis» honorificum. Fergit: Hujus tam iustae causae patrocinium non suscepissem, si fuisset obique P. Crügero, per auditio amico meo. Et me hoc modo purgatum oportuit de suspitione improvisa, et non apertas collisiones cum Nagelio, proditas tamen astronomiae et caeterorum propriorum viutorum. Suspicio haec illi orta est, quod hic apud nos imprimi passim eum chartas quasdam istratrices in astronomiam et Crügerum, quales illius Nagelii, hominis vere clavati et caeci, esse soleant. Pungit id Crügerum, ne differret responsum in annum proximum, sed anticiparet epistola quamdam typis excerpta, in qua commissa imprudentiae paene reus agor, immerito sane.

De Epitome Kepleri haec Müllerus dubius effert: pag. 484 inferi: si ponatur eadem ratio superficiei Saturni ad superficiem Terrae, quae est intervallorum, decupia nimirum, tam rationem corporum ad eam fore trigecupiam, h. e. aequaliteram, ut ais, diametrorum

autem triplam, id est eodem te interprete dimidiam decuplae. Hic ego nec illationem assequor, nec quomodo ratio trigecupla recte dicatur sesquialtera, aut tripla dicatur dimidia rationis decuplae intervallorum. An non enim trigecupla est tripla rationis decuplae, non, ut hic lego, sesquialtera tantum? et tripla est subtriplex decuplae, non dimidia? Aut quo tandem pacto haec capere debeo? An labor circa sensum aliquem verbi, an epheisma typographum subest, quorum haec editio ferax est? Aut quid rei tandem? Haerere me sentio, ubi haerere non sentio.

Ita questio secunda (pag. 648) mihi quidem est obscura valde et quodammodo contradictoria. Quo, inquit, altius invehitur planeta, hoc imbecillius et lentius promovetur, quo lentius fertur, hoc diutius moratur; quo mora longior, hoc in planeta sensus exrior virtutis provehens, quo hic major, eo et impulsus major et concitatus erit. Subsumo jam ego a primis ad ultima: ergo quo tardior motus, hoc idem velocior. Haec nonne se perimunt invicem: aliquid celeriter motum diu sentire vires et contra? Nam si diu sentit, diu expectat; et hoc, non celeriter ibit etc.

Lunaria quoque tua cum Tychonicis nullatenus conciliare possum aut circularum videre aequipollentiam; praesertim fatigor circa pag. 196. Sed de his alio fortasse tempore, Deo et tu valente.

Quae ad quaestiones Mülleri de stella nova et Harmonia Keplerus respondit, leguntur vol. V. p. 68; quae huc pertinent, haec sunt:

De proportionibus aequum postulas, ut tibi mathematica ego exercitator terminos explicem. Tu vicissim, ubi eos mea opera didiceris, mecum in contemplationem incumbes metaphysicam, cui geometrica ista famulatur. Nodus solutus est Harmonices libro V. in margine folii 218 (vol. V. p. 303). Nam inter quascunque duas quantitates est proportio, sive sensiles vel quasi, sive mentales; dico vel quasi, ut duas lineas, duas superficies, duo corpora, duos etiam numeros, quia in quantum il comparantur invicem, unitates ponuntur habere inter se aequales, ut lineas. Hic igitur, cum dico proportionem duplicam, triplam, sesquiplam, vox proportio habet sensum absolutum et fit jam etiam ipsa quantitas aliqua in infinitum dividua; sed haec quantitas est sola mente comprehensibilis, nunquam sensu, ne in materia quidem. Cum igitur etiam haec absoluta proportio sit aliqua quantitas, accipiens majus et minus, fit ut etiam duae tales proportiones inter se possint comparari. Hinc existit proportio proportionum et de hac loquor ego loco allegato. (Omnes binae quantitates ejusdem inter se generis inaequales continent aliquam inter se proportionem; at omnes binae proportiones simplices dissimiles seu inaequales sunt binae quantitates ejusdem inter se generis; ergo omnes binae proportionum simplices dissimiles seu inaequales continent aliquam inter se proportionem, reduplicatam a me dictam, quia est proportio proportionum.) Et quia omnis proportio simplex in mundo requirit duos terminos sensiles, fit ut proportionum proportio seu reduplicata proportio habeat 4 sensiles terminos. Atque id verum est in meis exemplis; ecce:

Intervallum inter \odot et $\delta = 1$; inter \odot et $\text{h} = 9 +$: proportio noncupla. { Proportio proportionum sesquialtera ut 2 : 3.
Periodicum tempus $\delta = 1$; period. tempus $\text{h} = 30$: proportio trigecupla.

Sicut 1 ad $9 +$, sic intervallum $\odot \delta$ ad intervallum $\odot \text{h}$: simplex haec est proportio, noncupla major. Sicut 1 ad 30, sic periodus δ ad periodum h : simplex haec est proportio trigecupla. Sicut est 2 ad 3, sic est proportio noncupla major ad proportionem trigecuplam. Reduplicata haec est proportio sesquialtera.

Proportio simplex agnoscitur divisione termini majoris per minorem vel multiplicatione minoris per denominatorem, ut constitutur major terminus. Ut si terminus minor sit 7 et proportio quintupla: $5 \cdot 7 = 35$; hic est major terminus. At quando denomino proportionem aliquam reduplicatam, dato uno ejus termino minore, seu proportionis simplicis, tunc oportet terminos

illius simplicis toties ponere et in se multiplicare, quot sunt in denominators reduplicatae unitates. Esto simplex inter 2 et 3, quaeritur hujus tripla: ergo tria 2 in se multiplico, sunt 8, sic tria 3 in se ducta faciunt 27; ergo quae inter 8 et 27 est tripla illius, quae inter 2 et 3. Hoc modo potest constitui et sesquialtera proportio proportionis, si prius minorem terminum, id est proportionem simplicem bisecem, quia minor terminus sesquialterae est 2, quaesitis radicibus quadratis ejus terminorum, deinde his radicibus ternis in se mutuo multiplicatis, quia major terminus sesquialterae est 3 et quia, quod est totius sesquialterum, id semissis est triplum. Haec est doctrina Ptolemaei de proportionum compositione et divisione; invenies eam procul dubio in classicis auctoribus et in Clavio; estque aliqua ejus pars in regula quinque et in fractionum multiplicatione et divisione; sed negotium non est plane idem et cavendum a confusione. Datur proportio simplex inter 4 et 9, quaeritur alia simplex, quae cum ista constituat reduplicatam, quae demolitur sesquialtera: quaero radices de 4 et 9, quae sunt 2 et 3; et jam $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$, $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$, est igitur altera simplex quaesita inter 8 et 27. Quodsi proportio proportionis datae debeat esse $\frac{100}{265}$, quaerendae essent radices terminorum centesimi ordinis et tunc singularum radicum 205 in se essent multiplicandae, quem laborem ut sumam Deus avertat; sublevent autem eum logarithmi Neperi facile in rudibus numeris. Diligenter igitur est attendendum, quando quantitas aliqua simplex vel sensilis dicatur alterius simplicis quantitatis sesquialtera, et quando proportio proportionale dicatur esse sesquialtera. Et haec consideratio omnino locum necessariam habet in mundo propter ipsam conditionem causarum moventium. Non potest enim simpliciter quaeri, quae sit proportio periodici temporis ad amplitudinem orbis, essent enim ista diversorum generum, ibi tempus, hic linea seu diameter; nec per omnes planetas potest esse eadem, quia non idem vigor virtutis moventis apud omnes. Cum quaero, quae sit proportio periodi ad orbem, inepta est quaestio, quia periodus est tempus, orbis est linea (hoc loco) seu iter. Cum vero quaero, quae sit proportio periodorum ad orbem, hic subintelligendum est aliquid, scilicet in hunc modum: quae sit proportio reduplicata proportionis simplicis periodorum ad proportionem simplicem orbium. Nam haec fortitudo seu remissio potius motricis causae proportionatur ipsa distantia planetarum mobilium a Sole, sive motus, legibus non archetypis, non consilio quaesitis, sed necessitate geometrica, quam ego ad materiae necessitatem referre soleo, ut sit etiam sua geometriae materia (tu hic et alibi me poteris egregie juvare suppeditando vocabula idonea, ex quibus philosophiae unitate periti mentem meam capere possint). Quodsi esset pondus idem circumvehendum in omnibus orbibus, non dubium est, quia proportio periodorum futura fuerit dupla ad proportionem intervallorum, lege rursus geometrica et necessitate materiali, quia tempus periodicum componitur ex utraque re: 1) ex dicta remissione vigoris moventis, ut quique planeta exterior, 2) ex prolixitate circuli; quarum duarum rerum utraque (quia intervallum est orbis semidiameter) proportionatur intervallis in proportionibus simplia; junctae igitur in proportionem dupla. Haec igitur proportio periodorum ad orbem est eadem per omnes bigas planetarum utcumque coaptatorum, estque non aequalitatis proportio, ut conieciunt visum est Aristoteli. Sed nec est dupla proportio, ut videri alicui possit, non omnia ejus principia expendenti, sed est proportio sesquialtera per omnes bigas planetarum. Utrum vero pondus idem in omnibus planetis esse debeat, an diversa, et in qua proportione

ad orbes, hoc jam reliquitur archetypicis legibus et consilio conformandum. Etsi hoc adhuc est compositum ex causis dissimilibus duabus: 1) amplitudine globorum, de qua fol. 484, et 2) densitate materiae, de qua fol. 486. Et jam clara futura puto, quae sunt fol. 484. ex his, quae de proportionem simplici deque reduplicata dixi. Sed age, sinus prolix, ut perspicuitatis finem consequamur. In exemplo Saturni tres casus sunt ob oculos positi. Primus habet hoc, proportionem intervallorum a Sole (quae sunt semidiametri orbium) accommodatam esse etiam semidiametri seu diametri globorum. Ille primo sunt proportionibus simplicibus intervalli $\odot \delta$ ad diametrum δ corporis et intervalli $\odot \eta$ ad diametrum η corporis. Inter has duas simplices proportionibus ponit iste casus proportionem reduplicatam eam, quae est aequalitatis; quae cum sit utilissima et usitatissima in omni regula proportionum, tamen pro proportionem aliqua non agnoscitur, eo ipso quia, cum aequalitate coeuset, nihil habet in se dissimilitudinis, nec opus est, ut eam numeris explicemus. Et tamen hoc possumus: nam esto intervallum $\odot \delta$ 8469, semidiameter δ 1; esto etiam intervallum η \odot 31965 c. et semid. corporis η $9\frac{1}{3}$. Ille etsi termini duarum proportionum, si numeros simplices spectes, sunt inaequalissimi (quantum enim distat 1 a 3469?), tamen dicere nihilominus possum in numeris, quod proportio 1 ad 8469 sit ad prop. $9\frac{1}{3}$ ad 31965, ut 1 ad 1, qui numeri sunt penitus aequales. Sed ad explicationem huius casus revertamur: quia enim tenemus in hoc casu prop. simplicem diametrorum in globis, quod sit eadem, quae diametrorum in orbibus, quam lucis causa expressi numeris rotundis et integris 1 et 10 (vere enim deberet esse 1 ad $9\frac{1}{3}$ c.), sequuntur nunc necessitate geometrica etiam superficierum, etiam corporum proportionibus simplices. Docemur enim in geometria, quod proportio (simplex) superficierum sit proportionis (simplicis) diametrorum dupla (sensu reduplicato), at quod proportio (simplex) corporum sit proportionis (simplicis) diametrorum tripla (sensu iterum reduplicato). Jam supra vero docui, duplicari proportionem, si termini bini, triplicari, si termini terni in se multiplicentur. Due igitur 1 in 1, 10 in 10, orietur simplex proportio superficierum 1 ad 100; due 1 in 1 et 1, sic 10 in 10 et 10, orietur simplex prop. corpulentiarum 1 ad 1000. Atque hic est primus casus.

Secundus casus habet hoc, proportionem intervallorum (1 ad 10) esse accommodatam superficierum globorum δ et η . Docemur vero in geometria, quod proportio (simplex) superficierum sit proportionis (simplicis) diametrorum dupla (sensu reduplicato). Quare, ut habeatur hic proportio simplex diametrorum, oportet bisecare prop. simplicem 1 ad 10. At supra docui, secari proportionem in aequalia duo, si pro terminis proportionis constituatur eorum radices quadratae. Est vero radix quadrata de 1 itidem 1, et de 10 radix quadrata 3 +. Haec igitur in secundo casu fiet proportio (simplex) diametrorum in globis. Et jam, quia corporum proportio est diametrorum proportionis (sensu simplici) tripla (sensu reduplicato), quare ducta in se binc 1, 1, inde vero 3 +, 3 +, 3 +, orietur termini proportionis (simplicis) corporum, sc. 1 et 27 +, id est c. 30. Et hoc in secundo casu.

Tertius igitur casus, quem rationibus archetypicis probasse persuasum habeo, dicit hoc: proportionem intervallorum 1 ad 10 accommodatam esse etiam ipsis corpulentis globorum, ut, sicut se habet semidiameter orbis δ ad semidiametrum orbis η , sic se habeat ipsum corpus δ , causa interni spatii, ad ipsum corpus η . Hoc posito, querendum est, quantae siet appariturae in Terris corporum diametri; quaerenda est igitur proportio ipsa vera dia-

metrorum. Docet vero geometria, proportionem (simplicem) corporum esse proportionis (simplicis) diametrorum in iis corporibus triplam (sensu reduplicato). In tria igitur aequalia dispescenda est proportio 1 ad 10. At supra dixi, tunc in 3 aequalia dividi proportionem simplicem, si pro ejus terminis ponantur eorum radices cubicae seu secundi ordinis. Est autem de 1 radix cubica 1, et de 10 radix cubica est 3 — vel 2 +: sequitur igitur, proportionem diametrorum simplicem esse 1 ad 3 — vel 1 ad 2 +, vel h diametrum veram esse paulo longiorem dupla diametro Telluris; unde jam astronomos computat, illam apparere quantitate $\frac{1}{2}$ c.

In quaestione pag. 648 cum tu tuis utaris verbis, ad sensum tuum egregie accommodatis, qui fieri possit, ut non intelligas rem ipsum? Omnino puto, te simulare, vel (nisi quod video, te nonnihil a meo sensu aberrare) ludere. Tu de proportionibus planetae circa Solem loqueris, ego vero, ibi quidem loci, de advectione planetae ad Solem vel repulsionem. Sed hoc nihil obstat, quo minus vel ex tui ipsius verbis intelligas, compensationem fieri: ut quanto imbecillius planeta attrahitur, tanto diutius (per alium effectum, de quo fol. 665) in illa imbecilla virtute maneat. Est magna rei perplexitas, fateor dicoque consolationis causa, me ipsum immeusum laborem hausisse textumque minimum decies mutasse, donec exprimerem id, quod in causa versabatur. Nam ibi loci fol. 648 anticipandum est, quod fol. 665 dicitur, cum tamen alterum ab altero pendeat. Summa comprehensionis perfectae in eo consistit, ut intelligas, principium non peti. Nam de contradictione res est facilis. Sed video, exscribenda mihi esse tua verba meisque parallelis adjuvanda. Ponam autem, te summarium fecisse utriusque locorum a me jam allegatorum; uti hoc ponam, plura essent in tuo textu corrigenda.

Quo altius invehitur planeta, hoc imbecillius et lentius promovetur.

Quo altius invehitur planeta, hoc imbecilliori virtute vehitur et trahitur vel pellitur; hoc igitur minor et lentior est quavis momento operatio tam provectionis quam librationis a Sole et ad Solem, ex parte quidem Solis.

Quo lentius fertur, hoc diutius moratur.

Quo lentius fertur utroque motu in punctis seu momentis singulis, hoc diutius moratur in certae quantitatis arcu, in quo insunt illa puncta.

Quo mora longior, hoc in planeta sensus acrior virtutis promoventis.)*

Quo mora in certo arcu longior quam in alio arcu aequalis longitudinis, hoc major quantitas virium Solis imbecillium, per longius tempus dispersarum, quam si eadem fortitudine vires per brevius tempus (quo is alium arcum percurrit) impendisset.

Quo hic major, eo et impulsus major et concitator cursus.

Quo major quantitas virium Solis virium, hoc major effectus (provectionis quidem circa Solem simpliciter, librationis vero non simpliciter, sed tantum ex parte Solis), quam si harum imbecillium virium minor quantitas effusa esset, admensa nimirum tempori breviori, quod planeta in alto arcu consumit.

Ergo quo tardior motus, hoc idem velocior.

*) Haec vox acrior hic plane est aliene et contraria vero. Sensus acrior dicitur vel ex parte sensilis vel ex parte sensorii. Jam sensilis hic vel quasi sensilis, virtus ac. provehens, non est jam acrior, sed segnior, sensorium vero suum habet propriae leges ex rectiori vel obliquiori objecta diametri magneticae, quae proprium est hoc loco sensorium.

Ergo quo minor et lentior est quovis momento operatio, hoc major est ejus effectus in toto tempore, quod planeta illo arcu consumit, in quo tempore inest momentum illud.

Haec nonne se perimunt invicem, aliquid celeriter motum diu sentire vires et contra? Nam si diu sentit, diu expectat; si hoc, non celeriter ibit.

Haec se mutuo non perimunt: aliquid diuturnas sentire vires imbecilles haeque diuturnitate promoveri longum, et tamen momentanea celeritatis specie lentius agitari in momenta illius diuturnitatis singula.

In aequipollentia Lunarum investiganda per schemata et circulos non est consultum neque tibi neque alii cuiquam praeter me, ut multum fatigeris; sufficit calculos consulere. Interim faciet ad genuinam coelestium motionum naturam, ut intelligas, quo pacto ex physicis principiis emergat ellipsis inaequalia per partes motus. Et pag. 796 puto obscuritatis hanc ipsam esse causam, quod usus sum terminis usitatae astronomiae hujus comparationis causa, sufficisset, ea quae dixi libro IV. ad numeros applicare.

Hic, quae egit Keplerus per litteras cum amicis, addenda sunt quaedam Kepleri studia et Mas. Pulkoviensibus desumpta. Quae supra (p. 68) paucis respondit Remo, de anni longitudine et eclipticae obliquitate disputanti, accuratius inquisiverat anno 1616 (adscriptis Keplerus: Martio 1616), id forte spectans, quod l. c. dicit, haec peculiari se probare libello. Inscriptis hanc disquisitionem:

De temporis aequatione plenaria et motu octavae sphaerae.

Annos metimur decursu dierum aequalium, id est revolutionum Terrae circa axem, ad eandem fixam revertente meridiano certi alicujus loci, continuato quidem illius plano usque ad fixas. Ita fit, ut ad partes eclipticae aequales revertatur, inaequalibus temporibus multoque magis ad Solem, cum etiam est inaequali motu partes eclipticae aequales perperiet.

Quodsi hae duae causae essent solae, principium aequationis temporis universale statuendum esset in illo temporis momento, quando apogaeum Solis in 0° ☊ incidit. Ex meis tabulis motus ☉ progreditur apogaeum ☉ in annis 1714. sub ecliptica per $29^{\circ} 59' 15''$ et fuit anno 1586 completo in $5^{\circ} 29' 15''$ ☊.

28. 30 dant $29^{\circ} 59' 15''$, quid $5^{\circ} 29' 15''$? Responsio: anni sunt $346\frac{1}{3}$ paulo minus; $1586 - 346 = 1240$, anno 1240 corrente in ipso solstitio aestivo ponenda est radix aequationis temporis, quoad has quidem causas.

Cum ergo ex illo tempore revertitur 0° ☊ in meridianum, apogaeum ☉ jam discessit et sunt anni tropici breves, quia arcus a 0° ☊ in apogaeum aequaliter decurrens habet ☉ diutius in se morantem, h. e. quia circa 0° ☊ prosthaphaeresis ☉ est adjectiva, quae maturat Solis ingressum in ☊. Et cum apogaeum ☉ est in 6° ☊, ut hodie, aequatio ☉ est $13'$ adjectiva, quod facit fere quadrantem unius diei.

28. 30 dant $29^{\circ} 59' 15''$, quid 6° ? Resp. $6^{\circ} 18' 48'' (47\frac{1}{10}^{\circ}) = 22727\frac{1}{10}$ anni, quibus revertitur apogaeum ip ☉ motu aequali.

Quadrans 5682

Anuus tropicus brevissimus	1240 Christi (aestas longissima in septentrione).
mediocris	4442 ante Chr. (aestas et hiems aequales).
longissimus	10124 ante Chr. (aestas brevissima).
mediocris	6922 post Chr.
longissimus	12604 post Chr. (aestas brevissima in sept.).

Ergo ab anno a. Ch. 4442 usque ad annum p. Ch. 6922 decurrunt tropici 11364, qui sunt per 4 dies et aliquot horas breviores totidem tropicis medii, et per 8 dies et quadrantem aut trientem breviores reliquis totidem tropicis longis. Differentia enim est tanta, quanta inter aetatem et hiemem anno Ch. 1240. Aequatio maxima 2. 3. 44; 178^d. 10^b. 28' hiems, 186^d. 19^b. 21' aestas anno 1240.

Quemadmodum igitur eadem est ratio differentiae annorum totius periodi, quae aetatis et hiemis in uno anno, sic etiam eadem est aequationis ratio propter tot annos, quae propter dies anni. Cum enim dies naturalis sit reditus meridiani loci ad Solem, posito igitur initio, cum anno 1240 Sol in 0° ☉ fuit, hoc tempore, quando Sol in 0° ☉ habet prostaphaeresin adiectivam, aequatio temporis annalis est, quicquid de aequatore transit meridianum cum aequationis Solis arcu, et tempus apparens posterius est aequali, quia partes zodiaci niteriores posterius in meridianum veniunt, Sol vero est ultra locum medium; et hic modulus aequationis radicalis in principio anni valet per totum annum, si modo epochae sunt accommodatae ad a. Ch. 1240. Et haec aequatio temporis hodie addenda est temporis apparenti, ut fiat aequale. Nisi enim hoc fiat, assumimus quidem tempus dominetenns, ac si jam posteriores partes starent in meridianum, computamus vero, ac si priores adhuc.

Anno 1600. compl. est apogaeum ☉ in 5° 43' 23" ☿; aequatio competens apparenti arci seu angulo. 5. 43. 23

In 4. 54. 41 est aequatio 10. 42

48. 42

In 5. 53. 37 est aequatio 12. 50

58. 56 dat. 2. 8 quid 48. 42?

Aequatio est 12' 35". Respondet autem 0° ☿ asc. recta 10' — 10' 55"

2. — 2. 11

35" — 0. 39

Arcus aequatoris . . . 13. 45

Hic arcus deductus in tempus non dat 1', posset autem aliquando dare 8'.

Tempore Hipparchi, quando Solis apogaeum fuit 24° 30' ante 0° ☉, aequatio in 0° ☉ fuit 0. 52 subtr.; cui respondet arcus aequatoris 56° 44", quae sunt fere 4' subtrahenda a tempore apparenti, ut fiat aequale. Tycho Brahe ponit radicem in 0° ♀ loco ☉ vero, quando ejus prostaphaeresis est adiectiva 2°, quod non est aptum ad comparisonem plurium saeculorum. Oportet igitur, epochas motuum Lunae positas esse super radicem additionis. Quando nempe Sol in aequinoctio tenet meridiem, jam 2° secundum aequalem motum debebant transire, ut ita h. 12. 7½' aequali sit h. 12 apparen. Id si factum est, bene, sin. omissum, non igitur mirum, quam ipsi haesiasse. Factum esse non credo; nam si censuerant negligendam hanc partem aequationis per annum, ubi magis varia est ejus ratio propter dissimilitudinem dierum anni: cur non multo magis in radice, quando constans et perpetua est 7½' hoc quidem saeculo? Ratio sane utrique est eadem.

Regiomontani modus valde est aptus ad unum saeculum, sic ut prius computetur ex aequationibus saeculorum et radicibus anni 1240, ubi hodie sit aequatio subtractionis maxima; quae quanta est, tantus motus subtrahitur radicibus, ut ita tempus apparens pro aequali sumentes diminutioni, diminutionem etiam habeamus motum; tunc postea totidem minuta aequationis per totum annum observantur. Nam omnes aliae subtractoriae subtrahuntur ab hac subtractoria maxima, additoriae adduntur, ut fiat utrinque additoria.

Haec aequationis ratio quatuor insuper modis variari posset. 1. Si Solis apogaeum progrediretur inaequaliter, ut apud Copernicum; sed hac causa nos liberat hypothesis nostra, quae Solis apogaei progressum praestat aequalem. 2. Si praecessio aequinoctiorum fuerit inaequalis alia insuper inaequalitate, quam quae ex aequali progressu apogaei proveniat. Nam quod in punctis cardinalibus successu seculorum aliae atque aliae inveniuntur aequationes, de ea temporis aequatione jam est dictum, quae cum sit tardissima, non potest ei adscribi phaenomenon hoc, quod Ptolemaei tempore sesquidie serius justo evenerant aequinoctia, et annus tropicus inde ab Hipparcho longus fuit, iude ad Albategnium iterum brevis.*) Cum autem hoc fuerit accidens motus Solis, qui sub sideribus nibilo tardior ante Ptolemaeum fuit, nibilo velocior post eum, parva admodum hinc nascitur mutatio aequationum etque particularis tantum in diebus anni et variatione ascensionum rectarum; cum enim usitata via superius explicata computemus Solem in cardinalibus, ubi aequatio nulla ex asc. rectis, observata Ptolemaei statuunt distantiam dierum $1\frac{1}{2}$, et cum $1\frac{1}{2}$ transeunt $1\frac{1}{12}$ minus aut plus in aequatore. Hinc igitur Ptolemaicae aequationes variabuntur dimidio minuto, non in seculo, sed in diebus anni. 3. Si eccentricitas Solis alia fuisset olim quam est hodie, tunc aequationes Solis, majores olim, parerent etiam temporis aequationes majores in diebus anni c. 2', si maxima eccentricitas esset 2. 30, quae hodie est 2. 3. At cum observata veterum nos non eogant extremum hoc amplecti (dixerunt nempe, quanta omnium maxima eccentricitas prodeat ex suis observatis, quae nou subtiliores fuerunt quadrantibus dierum), tutissime et consiliosissime facilius statuendo perpetuam eccentricitatem hodiernam, quantam et Albategnium invenit. 4. Si alia obliquitas eclipticae hodie quam olim, haec causa minutissimum aliquid mutat alteram partem aequationis, quae est ab ascensionibus rectis, ut videre est in Tabulis primi mobilis Reinholdi. Variatur haec causa penes nos, variata specie motus. Nam prioribus axis Telluris vel mundi mutavit inclinationem ad polum eclipticae, fixam sub fixis, itaque involvit haec consideratio fixas, sic ut nonnihil perturbentur leges culminationum cum partibus aequatoris, quolibet seculo ex lege stata convenientibus. At nobis axis Telluris inclinationem ad coecum et fixam viae regiae polum retinet constantem eoque nomine nihil mutatur in culminationibus stellarum; contra vero ecliptica sedes mutat Solisque culminationes turbat eo modo, quo apud priores fixarum culminationes turbantur, et una mutat progressum cardinalium punctorum aequabilem; sed nota, quod aequabilis ille progressus est incognitus, quia nos apparentem pro aequabili sequimur. Quodsi inter Hipparchum et Ptolemaeum seculisque antiquioribus in 300 annis dies anno Juliano perit, inter Ptolemaeum vero et nos in $133\frac{1}{2}$ annis dies perit, in 1450 igitur annis debebant periisse dies 5; periisse 11; sex ergo supra modulum perire. Per hos autem 6 gradus crevit latitudo borealium fixarum borea in borealibus signis per 20'. Cumque limes eclipticae boreus sit in γ . in Comment. Martis, polum eclipticae erit in π parvi circelli, descendetque versus Π illius parvi circelli, non tamen praecise in π , poterit enim etiam in Π vel ρ . Quo vero tempore finit constantior anni tropici prolixitas, non


*) Potest huius rei causa statui etiam physica, sic ut cardinalia quidem aequaliter fuerint progressa, ipsum vero primum mobile, i. e. rotatio Telluris circa axem retardata post Ptolemaeum, accelerata ante ipsum. Sed tunc Linnaeus motus, ut qui a rotatione Telluris incipitur, calcularetur recte ex tempore invariabili, planetarum non item; nam aequatio esset adhibenda $1\frac{1}{3}$ dierum.

tantum polus descendit, sed aut in γ , δ fuit nihil descendens, aut in Π , δ parum descendens. Et nota, quod omnino debet esse celerior in proportione sui circuli motus poli eclipticae circa polum Solis, quam poli Terrae circa illum, alias nulla fieret appropinquatio polorum. Cum autem polus Terrae aut celeriter moveatur sub fixis, poli orbitarum tardissime, non videtur consultum aut naturae consentaneum, incitare polum eclipticae sub fixis celerius, quam ipsum polum Terrae. Potest igitur aliter fieri, ut polo Terrae fugiente a polo eclipticae in γ (tunc augetur declinatio) in antecedentia et limite boreo in γ constituto, fiat transpositio celerior intersectionis eclipticae et aequatoris, quiescente intersectione eclipticae et regii circuli, aut aequaliter incedente. Sed tunc ex mutatione latitudinis fixarum $20'$ nihil colligi potest, quod faciat ad mensuram circuitus poli eclipticae, nisi quod motus peractus omnino maior est 20 minutis.

Comprehendantur ista certioribus axiomatibus: 1) mutata latitudo fixarum arguit polum eclipticae omnino sedes mutasse; 2) mutata obliquitas eclipticae potest indidem salvari et debet, quia quantitas eadem 20 minutorum; 3) non est igitur mutata latitudo fixarum ex appropinquatione poli Terrae ad polum eclipticae, aut certo effectus per mutationem poli eclipticae est duplo maior; 4) nam si crescere debet lat. bor. in Π , tunc aut limes boreus eclipticae est in γ , polus eclipticae in γ , et retrocedit nodus, ant. limes in γ , polus in γ , et nodus progreditur; 5) posito enim nodo in γ , quorsumcunque vergit limes boreus, in illam partem debet fieri motus poli eclipticae, ut ecliptica descendat in austrum, et vicissim, ut polus eclipticae appropinquet fixis in Π , γ , debet ex γ retrocedere, ex γ progredi versus γ . Ita omnino convincimur, statuendum esse motum poli eclipticae concitioorem in antecedentia, quam est motus poli Terrae.

Posito autem, quod BAC, BIC sit inter nos et Hipparchum 24° , et OAI 30° , et quilibet gradus causetur diem (potest autem et maior esse) et BI $23^\circ 51\frac{1}{2}'$, CO $23^\circ 31\frac{1}{2}'$, CI vero longior quam $23^\circ 51\frac{1}{2}'$, ideoque OI longior quam $20'$: quodsi OI esset 20 , dimidium 10 , et dimidium OAI 15° et AOI 75° , secans 386370 , fiet OA $38' 38''$, maior. Sit autem tempore Hipparchi AI in $0^\circ \gamma$ et versus illas fixas, quae fuerunt in $0^\circ \gamma$, tempore nostro OA in $24^\circ \Pi$, brevis quidem hinc nascitur annus, sed tamen non adeo inaequalis. Nam etiam ab Hipparcho ad Ptolemaeum esset tam brevis et relinqueretur quidem media tropici longitudo tanta, ut in 300 dies deficeret, sed illa non contingeret multis millibus annorum ($1714 \cdot 60 = 102840$), vix igitur post 25 millia annorum cessaret decrescere obliquitas eclipticae, inde post alia 25000 rursus cresceret.

Quin imo falsum est, aequinoctia propter appropinquationem polorum vel promoveri vel morari. Nam promovenitur vel morantur saltem propter circularem circuitionem poli ecliptici, siquidem IB, OC semper sunt coluri, et hi parum admodum differunt ab AB, AC. Est igitur summa retardatio vel acceleratio ABI angulus, quia, quo angulo se secant coluri, medius AB et versus IB, eodem angulo sese secant et coluri aequinoctiorum.



Cum autem ab Hipparcho ad Albategnium sint anni 1000, ab Albategnio ad nos 700, minuta ista 20 distributa proportionaliter dant Ptolemaeo $23^{\circ} 48\frac{1}{2}'$, Albategnio $23^{\circ} 39\frac{1}{2}'$.

Indi ante Christum. Obliq. eclipt. 24°

(Ita Albategnius et Thebit affirmant et Rabbi Abraham Chai et Macellama.)

Eratosthenes — 240 23. 51. 20

Hipparchus — 150 23. 51. 20

Ptolemaeus p. Cb. t30 23. 50

Almamom, rex Arabs 830 23. 35

(23. 52. 30)

(Auctor geographiae graecae. Hunc sequitur Rob. Hues.)

Albategni Muhamedes 880 23. 35

(Christmannus eis tribuit hanc notatam.

Alfragani Aramensis 950 23. 35

Allegat Almamonem et qui ipsum secuti sunt, qui faciunt 23. 35.)

Arzachel Hispanus 1070 23. 34

Thebitius 1100 23. 35

(dimidia et semisexta)

Almeon Almansoris 1140 23. 33. 30.

(Vertit Alfraganum)

Joannes Hispalensis 1142

Macellama 1222

Auctor Anglicanus 1264

Prophatius Judaeus 1300 23. 32. 0

(Actas magistri Joannis Londinensis.)

(Editio ejus libelli de quadrante adscripta anno 1290, translatio ex hebraeo anno 1291.)

Abrahamus Chai 1315

(Descriptum geographiae Abulfedae.)

Porbachius et Regiomontanus 1460 23. 28. 30.

(Abr. Zacuth, Judaeus, hujus discipulus Augustinus Ricus.)

Averroes recenset destructas columnas Herculis anno 1136, quas ipse antea viderat. Theoria planetarum communis, cui est adjunctus Thebit de motu octavae sphaerae, habet stellas fixas adscriptas anno 1246.

Macellama vixit ante annum Christi 1264, quia ejus opusculo de astrolabio adjecta est tabula fixarum eadem cum illa Magistri Jo. Londinensis. Et auctor Glosse (pinto Jo. Lond.) scripsit anno 1240. Apogaeum Solis ponit Macellama in $14\frac{1}{2}^{\circ}$ II, glossator in 27° II. Ponit ingressum ☉ in V t4. Mart. appellatione mensis Romana. Glossator paulo ante et meminit motus octavae sphaerae aucti. Vixit ergo tempore Almeonis. Imo meminit ejus sic: „in diebus Almeonis“. Vixit anno 1220.

Thebitius motum confinxit accessus et recessus fixarum, propter inaequalem progressum fixarum, et declinationem aliam hodie, quam olim. Arzaquel motum centri eccentrici ☉ in epicyclo, propter mutatam eccentricitatem. Copernicus utrique rei animum intendit, sed non una hypothesi. Nam ejus corolla intorta composita est ex duobus motibus, uno pro latitudine, altero pro longitudinis variatione duplo celeriore. Circellus praeterea in theoria Solis variat eccentricitatem et motum augis. At cum mutetur latitudo fixarum, facile est nobis, deserta longitudinis variatione, epicyclum in latum sub circulo latitudinis per augem Solis tractu ordinare; fuit nempe et est aug Solis ibi, ubi latitudo fixarum variatur. Sed hoc non erit physicum. Expendamus tamen leges. Quando eccentricitas est maxima vel minima, celerissimus est motus mutationis latitudinum, ideoque latitudo mediocrius competit ipsis articulis; quando vicissim latitudo fixarum est maxima vel minima et consistens, celerrima est variatio eccentricitatis. At hodie consistit tam eccentricitas parva quam latitudo seu obliquitas eclipticae, quia ab Almamone ad nos per annos 800 non ultra $3\frac{1}{2}'$ decrevit, ab eodem ad nos aequatio Solis non ultra 4 scr. crevit. Et certe observationes non sunt idoneae, ut de tantillo testentur; de mutatione eccentricitatis plane non, de obliquitatis mutatione majore concedamus aliquid.

Et cur negligimus traditionem Indorum apud Arabas, qui statuunt, pervenire obliquitatem ad 24° ? Ab Hipparcho igitur in Ptolemaeum in decremento fuit. Detur Hipparcho obliquitas $23^\circ 58'$, nobis $23^\circ 30'$ (nam parallaxis Solis est dubia et ipsi non addibuerunt parallaxin et in alt. $5^\circ 6'$ parallaxis ex modno $3'$ est $1' 41''$); annis igitur 1714 competunt $23'$, quid annis 280? Resp. 4'; quid annis 1030? resp. 14'. Ptolemaeo igitur veniant 49, Albategnio 39, et manet speculatio mea, prius demonstratione et calculo expedita. Quid quod non est sino varietate assertio de $23^\circ 35'$; sic scribit Macellama circa a. 1264, et secundum Albategni $23^\circ 36'$; sed in diebus Almeon invenerunt observatores $23^\circ 33'$. (Paulo post accipies $23^\circ 51'$ secundum Ptolemaeum.) Et sicut habemus ab Indis, pervenit haec declinatio ad 24° .

Alfraganus hae de re varie. In meo exemplari perantiquo sic lego: „et est secundum quod invenit Ptolemaeus $23^\circ 51'$, cum fuerit circulus 360° . Probatione autem certissima, quam probavit Almeon, qui interpretatur securus vel pacificus seu fidelis; et conveniunt in ea plures sapientes, quod est $23^\circ 33''$ “ et sic excusum est Noribergae anno 1537. cum nomine Almeon. At vero ex interpretatione Jacobi Hebraei apud Christmannum sic: „Sed juxta Almamonem et alios, qui eum secuti sunt, sapientes, continet $23^\circ 35'$ “ quinque expresso vocabulo; quantum etiam habet Albategnius impressus.

Thebit meus sic: „declinatio quoque circuli declivis a circulo aequinoctiali est foro $23^\circ 33'$ et infra. Erit ergo illa longitudo declinationis major declinationo sphaerae declivis, quao est immobilis, pervenitque jam hujus declinationis longitudo ad 24° , secundum quod ab Indis traditum fuit. Ptolemaeus quoque similiter invenit eam $23^\circ 51'$; alii autem inspectores post Ptolemaeum in tempore Maimonis eam $23^\circ 33'$ invenerunt.“

Correxit, ut vides, Thebitius vocabulum Maimon, sed retinet 33, Albategnius 35, Macellama 36 Albategnio tribuit.

Robertus Hues in sua Geographia nodum secat: Albategnius, inquit, 35 invenit, quanta autem eum Almamonis Regis Arabum. Post Arzachelem Almeonis filii Albumasaris fuit $33\frac{1}{2}$. Ergo Thebit perporam Maimonis pro Almeonis, aut certe 33 pro 35.

At secundum aequalem motum sic esset:	300	—	23. 55	
	200	—	„ 54	Eratoth. $51\frac{1}{2}$
	100	—	„ 53	
	0	—	„ 51	
	100	—	„ 50	Ptol. $51\frac{1}{2}$, 50, $52\frac{1}{2}$
	200	—	„ 49	
	300	—	„ 47	
	400	—	„ 46	
	500	—	„ 45	
	600	—	„ 43	
	700	—	„ 42	
	800	—	„ 41	
	900	—	„ 39	Albat. 36 vel 35
	1000	—	„ 38	Arzachel 34
	1100	—	„ 37	Almeon $33\frac{1}{2}$
	1200	—	„ 36	
	1300	—	„ 34	Prophatius 32
	1400	—	„ 33	
	1500	—	„ 31	
	1600	—	„ 30	

Sequitur igitur alia speculatio. Fuerit polus eclipticae tempore Hipparchi in P (Fig. 8), Regiomontani in N; nam Braheus vult, jam iterum cres-

ria Solis consimilis aequalitas et ponatur $\alpha\sigma$, $\alpha\tau$ $2^\circ 3' 44''$: Trianguli ergo datis lateribus quaeruntur anguli.

$$\begin{array}{rcl} \alpha\beta = 23^\circ 52' & \text{---} & 66^\circ 8' \\ \alpha\epsilon = 2. 3. 44 & \text{---} & 2. 3. 44 \\ 25. 55. 44 & \text{---} & 68. 11. 44 \\ 64. 4. 16 & \text{---} & 89. 83. 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} \beta\alpha = 24^\circ 17' 42'' \\ 65. 42. 18 \\ 92846 \\ 92846 \\ 1702 (: 1456) = 116900 \\ \beta\alpha\epsilon = 99^\circ 44' \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{dimid. } 1456 \\ \beta\alpha : \beta\alpha\epsilon = \beta\alpha : \beta\alpha\epsilon \\ \sin. \beta\alpha\epsilon = 40461 \times 98561 \\ 41143 \end{array} = 90927; \beta\alpha\epsilon = 75^\circ 45' 35''$$

$$\begin{array}{r} \beta\alpha : \beta\alpha\epsilon = \alpha\epsilon : \alpha\beta\epsilon \\ \sin. \alpha\beta\epsilon = 3600 \times 98561 \\ 41143 \end{array} = 8624; \alpha\beta\epsilon = 4^\circ 56' 51''$$

$$\begin{array}{rcl} \beta\epsilon = 23^\circ 31' & \text{---} & 66^\circ 29' \\ \alpha\epsilon = 2. 3. 44 & \text{---} & 2. 3. 44 \\ 25. 34. 44 & \text{---} & 68. 32. 44 \\ 64. 25. 16 & \text{---} & 93071 \\ & & 93071 \\ & & 2872 \\ & & \text{dimid. } 1436 \end{array} \quad \begin{array}{r} \beta\alpha \text{ ut supra; } \sin. \beta\alpha = 41143 \\ \sin. \alpha\epsilon = 3600 \\ 3600 \times 22840,1 = 8222,44 \\ \sin. \beta\epsilon = 39901,6 \\ 39901,6 \times 22840,1 = 91146,3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 93071 : 41143 = 22840,1 : 91144 \\ 93071 \\ 1927 : 1436 = 134192, \beta\alpha\epsilon = 109^\circ 58' 43'' \\ 70. 0. 11. \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \alpha\beta\epsilon = 4^\circ 43' 0'' & & \beta\alpha\epsilon = 65^\circ 42' 30'' \\ \alpha\beta\epsilon = 4. 56. 51. & & \beta\alpha\epsilon = 75. 45. 35. \\ \alpha\beta\epsilon = 0. 13. 51 \text{ pro aequatione temporis seculari.} & & \alpha\epsilon = 10. 3. 5 \end{array}$$

Pro motu nodorum.

Si ergo β qulevisset, $\alpha\tau$ vergeret in $24^\circ 17' 30'' \gamma$ Hipparchaci, sed quia retrocessit β per $22^\circ 20'$, ergo $\alpha\tau$ vergit in $1^\circ 55' 10'' \gamma$ Hipparchaci, quare in $24^\circ 17' 30'' \gamma$ Regiomontani, $22^\circ 20' - 10^\circ 3' = 12^\circ 17'$, retrocessus nodorum eclipticae sub fixis: Si $12^\circ 17'$ dat 1614, quid 360? Resp. 57815 ad polos Terrae.

In annis 57815 fit una periodus obliquitatis eclipticae, estque maxima obliquitatis $26^\circ 21' 26''$, media $24^\circ 17' 42''$, minima $22^\circ 13' 58''$.

Quodsi appropinquantio 10. 3. valet 1614, quid $24^\circ 17' 30''$, ex quo media fuit? 36 dat 5781, 12 dat 1927, 24 dat 3854; parum abest, quin

$$\begin{array}{r} 48 \\ 3902 \end{array}$$

in conditu mundi fuerit media potestque obtineri per minimam mutationem nos inter et Hipparchum.

Vide, quanto sit longior $\beta\chi$, quando $\chi\alpha\beta$ rectus. $\beta\alpha$ secans 109716, $\chi\alpha$ 109716

$$\begin{array}{r} \text{secans } 100065, \\ 66 \\ 55 \end{array} \quad 24^\circ 23' \text{ fere. Inter Hipparchum igitur et Regio-} \\ 109788$$

montanum retrocesserunt aequinoctia ultra mediocrem modulum $14'$, quae efficiunt horas fere 6. (In diluvio fuit media obliquitatis, quasi tum demum Terra fulset inclinata ad eclipticam, quando dixit Deus „cunctis diebus terrae sementis et messis, frigus et aestus et hiems, nox et dies non requiescent.)

Quia igitur ab omni memoria totius generis humani per hanc hypothesin manet aequabilis annus tropicus respectu medii motus Solis, struamus aequationem temporis nobis utilem, omissis causis incertae. Nam 1) apog. ☉ progreditur nobis aequaliter. 2) Praeccessio aequinoctiorum in nostra hypothesi ab Hipparcho ad nos mansit aequalis. 3) Eccentricitas Solis nobis manet eadem. 4) Parva est in effecta obliquitatis alia eclipticae, satisque disputatum his 8 faciebns de illa causa.

Construatio aequationis dierum ad a. completum 1620. Supra elievimus a. 1600.13' 45" aequatoris i. e. 1' fore addendum per totum annum respectu anni 1240.

Anno 1620. 17. Junii h. 3. 51' apparenti Huennae ☉ in 6° 4' 23" ☊; A R. 96° 32' 25"	
12' 50"	5. 58. 37. 4. 21
Pro 18. " 14 58	10. 46 (X 2' 8") 25
2. 8.	13. 13. 96. 37. 11.
Jan. 17. — 6. 4. 23 ☊ 96. 37. 11.	
57. 8 1. 2. 3.	0° ☊ 10 dat. 10. 55
" 18. 7. 1. 26 — 97. 39. 14	Sed haec aequatio valet 3. 16.
" 19. 7. 58. 29 — 98. 41. 18	in 6 ☊ see d. 17. Jun. h. 3. 51', 14.
" 20. 8. 55. 32 — 99. 43. 17.	app. Huennae 14. 25.

Debet aequatio componi ex partibus. Prius igitur extrahatur illa, quae ex ascensionibus. Habet vero illam Braheus et incipit in 0° ☊, ubi est 0, et deinceps incipit adiectiva. Post 6° 4' 23", quando haec prior est 2' 10 1/2" vel 2' 11" temporis, incipit altera pars subtractoria, quae potest investigari et per diff. diurnorum ☉ verorum et mediorum, vel per aequationes ad totos gradus oppositas. Tunc magis proprie quadrabit ad annum 1616, quando app. ☉ in 6. 0. 11 ☊, neglectis 11"; et secularis est 14' 15". Haec pars investigatur simpliciter ac si ☉ non incederet oblique. Ut in 8° 50' 26" est 19' 14", ergo in 9. 0. est 19' 37" aequatoris partium. Hoc se. in 15° ☊; hic est portio unius partis 2. 11 | 2' 10". Deinceps in 28° 30' 15" est 59. 48, ergo in 29°, h. e. in 12 ☊ est 1° 0' 42". Et erat prius in 9°, 19' 37" — diff. 41' 5", quae debetur partibus 20; est igitur partis unius portio 2' 3" | 2' 2". Sic in 39° 20' 32" est 1° 19' 15", ergo in 39° est 1° 18' 46", i. e. in 15° ☊; est igitur partis unius portio 1' 48" | 1' 47" et sic consequenter. Exstruuntur n. ex differentis aequationum. (Sequitur tabula aequationum temporis.)

In eodem Mss. volumine, quo praemissa deprehendimus, occurrit fragmentum alius Kepleri inquisitionis de aequinoctiorum praecessione, quam, ut gratum se ostenderet Imperatori pro soluto (aut solvendo) salario et ut rationem redderet studiorum suorum quoque libi commendaret, illius nominis illustravit. Quo tempore conscripserit hunc libellum, non constat; conscriptus certa est post editam Epitomen, forte anno 1622. Rem vero Keplerus non ad valem perduxisse videtur (nisi ponamus, eum rem de novo inceptam neque reservato exemplo Imperatori tradidisse), cum signatis accurate singulis foliis manu Kepleri (a 25 in 99), subito abrupta oratione folio 99 nova inscriptione pergit: „Argumenta contra mutationem obliquitatis“, quae usque in folium 107 continuo sermone connectit. Utramque scriptiorem hic subiungimus.

Contra inaequalem praecessionem aequinoctiorum.

Imperatori Caes. Ferdinando II. Victori.

Quemadmodum lux haec diel, tempestates anni multaque alia communia sunt bubuleis eum Regibus: sic Tibi orbis Monarchae me, somnium homullii, caecae fortunae caecus mehercule casus, ridicula praetentatione manuum, per huius anni decursum perlepidè copulavit. Dum Tu Germaniae, Ego Astro-

nominae morbis inveteratis medeas applicamus manus, dum Tu decus Imperii, dignitatem ipse scientiae per sectiones et sectiones expediturus: sit utrique mali contumacia non opinata, ut tempus nobis elabatur. Tibi quantum ex victoria gloriae, tantum accessit et doloris ex dolore publico populorum, et qui volentes tibi pareant et qui subiguntur, quorum illos diligis, utrosque salvos et incolumes velles: ut ut gratulari quidem Victori dolenti possim, ulsi eum doloris, cujus ad me quoque sensus perveit, officiosa significatione. Nec minus et mihi quantum successit in eruenda veritate detergendisque vetustarum observationum erroribus, tantum invidiae jam nunc oriri prospicio; dum astronomi, dejectum a me Ptolemaei possessione vetustissima existimationis praecipuae, occupatas et tantum non dirutas observationum praeclararum sedes, quibus constans certitudo motuum coelestium inniditur, denique labefactatam demonstrationum mathematicarum fidem, quarum substructionibus elati in coelum euebantur, et mussabant clam secum et expostulabant.

Ceterum Tu actionum tuarum rationes eui reddas, superiorem luter homines non habes; mihi hoc oneris incumbit, ut provideam huius astronomiae, quae mihi ab antecessoribus tuis, Rudolpho et Matthia tradita, a Te non ita dudum prorogata fuit, per hunc annum administratae rationes serenissimis tuis oculis exponam.

Igitur biems mihi traducta formando numerorum exercitu; legio illa Scythica, Chillas Logarithmica dicta, suppleta, legibus et institutis formata triginta theorematum geometricorum concinnatione, quae spero aetatem ferre posse. Haec aliam adjunxi legionem de novo conscriptorum, cui nomen e re feci, Heptacosias Logarithmorum Logistica. Jam cum desit operi Tabularum Rudolphi caput praecipuum, epochae temporum antiquorum, facile quidem negotium fuerit, fidem Ptolemaei aequi et constitutas epochas ab illo transsumere, videturque omnis calculi astronomici curator in illas quasi leges sacramento adactus esse; at mihi religio fuit, suspiciosas, quas idoneis de causis conceperam, dissimulare; placita Ptolemaei infida totius structurae damna inter fundamenta reepere vidi, neque regi molem hanc calculi astronomici, neque redigi in eorum ordinem motus coelestes posse, nisi libertate sumpta inquirendi in Ptolemaei fundamenta; ausus taudem sum, eripere Ptolemaeo unam diem, quam ab illo perperam insertam in aequivoctorum annotatione jam a multo tempore non obscuris conjecturis concluseram. Annus est, ex quo primum conjecturam meam de occasione, quae Ptolemaeum in hunc errorem induxerit, publico libello Epitome Aeronomiae Copernicanae proposui; ratio eluabar selicet, deceptum fuisse Ptolemaeum, Aegypti incolam, Calendario Romano licentiaque pontificum et violentia praesidium Aegypti, quorum illi intercalabant Romae vov ut coelum requirebat, sed prout superstitione aliqua gentili huc illic invitabantur, isti vero mensium Aegyptiacorum aequalissimos decursus penitus abrogaverant, Romanos fastos in usum forensem introduxerant. Itaque Calendaria aequalia non computabantur domi, sed submittebantur Roma, servitutis documento vov postremo. Conjecturae non ineptae solum testimonium desunt historicum, quo confirmaretur, anno post Christum 139. vel priori exemplum fuisse unum diem extra ordinem. Eee vero rem ipsam, nisi me omnis sana fugit ratio: anno enim post Christum 138, Antonino Pio II. Bruttio Praesente Consulibus, Censorius, temporum supputator diligentissimus et circumspicientissimus, primum Thoth mensis Aegyptiaci adscribit ad XII. Cal. Augusti seu 21. Julii, qui ordine servato, quem alibi Censorinus tenet, debuit ad

XIII. Cal. seu 20. Julii adscribi, uis dies exempta extra ordinem diesque anni Romani anticipati essent.

Quis dubitet quin Ptolemaeus, cum non attenderet id, quod Censorinus attendit, exemptionem esse factam extra ordinem, censuerit cum XII. Cal. Augusti, qui dies tunc Romae agebatur, adhuc cohaerere ut antea diem 2. Thoth, qui tamen erat demum 1. Thoth debebatque ex analogia annorum perpetua nuncupari XIII. Cal. seu 20. Julii. Hac vero ratione superflua dies sese insinuavit in ejus calculum, inter Hipparchum et suam aetatem, proditusque annus longior iusto et Solis motus tardus.

Ptolemaeus, ut testantur ejus observationes, supervixit usque ad annum Christi 140. Dubium igitur, um sit Ptolemaeus ille, de quo Tacitus ista: „Multos Poppaea mathematicos habuerat, e quibus Ptolemaeus, Othoni in Hispania comes, eidem sub Galba sceleris instigator, dum novos motus et clarum Othoni annum observatione siderum affirmat.“ Annum is erat Christi 69. Itaque si hac astrologiae scientia tricesimum saltem annum aetatis egit, oportet centenario major scripserit suam Megalen Syntaxin, siquidem idem ille fuit, qui sub Othone.

Confirmamur tamen etiam ejus more perpetuo, numerandi per annos Imperatorum Romanorum, quod procul dubio etiam Romanum Calendarium observaverit, siue Romae aliquando fuerit siue non. Et ut omnis dubitatio tollatur, perire hoc anno Ptolemaeus unam diem e numero, observa quod exinde nullam amplius Lunae commemoret observationem. Quas vero exinde refert observationes Veneris et Mercurii, eae ad dies anni Aegyptii sequentes propius quadrare deprehenduntur; ut videre erit in exegesi observationum antiquarum, per quas horum duorum planetarum epochas antiquas vel constitui vel examinavi.

Quod Sol tempore Ptolemaei non solus iter suum sit moratus, ut ante 150 annos abhinc retro fecit Saturnus, sic ut constituto jam zodiaci principio Sol tardius, ceteri legitimis incessibus ad illud venerint, sed quod duorum alterum necesse sit accidisse, ut aut planetae omnes una cum Sole sint itinera sua morati, idque non proportionali modulo suis periodis, sed plane eodem, aut Solis quidem et planetarum motus manserint regulares, in sectione vero aequatoris cum ecliptica acciderit aliquid extra ordinem, seu vere seu ex opinione saltem Ptolemaei, ob quod numeratio graduum et signorum zodiaci cepta fuerit a puncto posteriore: hoc, inquam, demonstratur evidentissimo documento motuum Martis acronychi. Nam si in motibus mediis statuatur diversitas unius gradus inter Solem et Martem, ea diversitas ad duos et tres gradus motus Martis apparentis in opposito Solis potest exerescere. Tantum vero Ptolemaeus observando non erravit. Et quadrant ea, quae ipse de stilibus Martis acronychis prodidit, ad regulam; unde apparet necessitas positi dilemmatis. Jam vero primum ejus membrum est absurdum et inopinabile; manet igitur, aut Ptolemaeum errasse in die anni Romani (diluitur enim suspicio erroris in observanda Solis utraque altitudine meridiana, tam vernali, quam autumnali), aut hanc anni tardationem esse ex tardata praecessione seu obviatione puncti aequinoctialis; quasi per saecula id repedaverit. Compara, quae de Sosigene Plinius deque meta in circo sub Domitiano non ita multis ante Ptolemaeum annis (ubi sequitur.)

Argumenta contra mutationem obliquitatis.

Primum subtrauntur fundamenta, quibus creditur firmissime inaedificata esse major olim obliquitas. Auctoritas Ptolemaei nulla est: transsumsit enim, ut fatetur, obliquitatem Hipparchicam; cisi vero simulat, se quoque observasse, si tamen illam Eratosthenis pro cynosura habuit, facile se ipsum decipere potuit coniectando extremitates umbrae aestivae et hibernae, non media puncta; scilicet ut more geometrarum mechanicorum quantitatem investiget, qua non est major obliquitas certo. Adde quod fidem decoxit in aliis observationibus, quoties inventis veterum vel suis favere deprehenditur.

Auctoritas Hipparchi nulla est; uti enim se ait obliquitate Eratosthenis, ut diligentis et ceterorum fide dignissimi. Auctoritas Eratosthenis dubia est: modus enim nuncupandi quantitatem obliquitatis 11 de 83 per se lubricus est et mechanicus propter punctorum 83 physicorum latitudinem et propter rotunditatem, quae videtur esse non ex re, sed ex taedio concisionum minutorum (vide supra p. 55). Deinde vero non ab simile est, factum esse crebritate repetitionum ejusdem circuli, ut post 83 intervalla tropicis aequalia, quae inveit mechanicus in 11 circulis, oblitus fuerit primi circuli, quod sc. erat ipsum tropicorum intervallum, si sc. ultimum et 83^{ma} vidit terminari in principium ejus, cum primum a fine ejus extendere coepisset, sic enim 11 de 84 dant obliquitatem 23° 34'. Auctoritas Indorum nulla est, nominant enim crassa Minerva 24°, propter rotunditatem partis circuli tricesimae. Auctoritas Albategnii se non extendit ad subtilissima; prodit enim 23° 35', quod parum abest a 23. 31 $\frac{1}{2}$ °. Auctoritas ceterorum omnium nulla est, omnes enim versantur inter 23. 28 et 23. 34.

Argumentum etiam a diversis hodie quam olim fixarum latitudinibus principium petit et nullum est. Latitudines enim fixarum eliciuntur ex observatione altitudinis meridianae et ex comparatione ejus altitudinis eclipticae punctorum, quam illa debent habere, si vera supposita sit obliquitas. Verbi causa, stellis in cauda γ Ptolemaeus adscribit latitudinem 2° austr., Tycho eam observavit 2° 16' austr. In altitudinibus igitur meridianis harum stellarum Tycho cum Ptolemaeo convenit, habita ratione diversitatis locorum. Minus tamen Ptolemaeus numerat, quia existimavit (non quia observavit, quod est impossibile), loca fixarum ecliptica et sic eclipticam ibi loci per $\frac{2}{3}$ unius gradus deflexisse longius ab aequatore aequo polo boreo et a vertice sui loci. Tycho plus numerat, quia terminum, unde numerat, altioris aequatorique et vertici suo vicinioris et sic obliquitatem eclipticae minorem statuit, praevius accuratis Solis per eclipticam euntis observationibus.

Ex theoria vero Martis affertur hoc argumentum in contrarium. Non est verisimile, orbem, in quo Mars incedit, alligatum esse ad orbem Telluris, cujus luxatione haec variatio obliquitatis eclipticae peragi deberet. Si hoc, ergo orbis Martis per hanc quidem Telluris orbitae luxationem non emotus est situ suo, sed retinuit eundem sub fixis. Cum igitur ad majorem olim obliquitatem sequatur, fixas in \odot et \oslash olim minores habuisse latitudines, orbis vero Martis etiam in \odot et \oslash sit inclinatus in septentriones, fulsisset igitur ejus inclinatio olim minor: quare et latitudo olim minor fuisset. At proditur ejus maxima latitudo septentrionalis in locis, quibus tunc maxima fieri potuit, 4° 20', in ipsissimo igitur limite major, cum hodie in ipsissimis limitibus non possit fieri major quam 4° 32'. Australis vero latitudo pro-

ditur 7° , etiam major quam hodie fieri potest. Nam fol. 318. Martialium (III. p. 421) non major esse potest, quam $6^{\circ} 52' 20''$.

Huic argumento accedit robur incredibile ex editioe nupera libelli Ptolemaei de hypothesisibus. (Cfr. vol. IV. p. 661.) In eo ponitur inclinatio $1^{\circ} 50'$, cum ego hodie inveniam $1. 50\frac{1}{4}$. Scripsit libellum Ptolemaeus post *Μεγάλην Στράτην* et fatetur, se ex posterioribus observationibus aliqua corrigere, adeoque videri possit, in opere magno unum V sen $50'$ exidisse. Nam per inclin. $1^{\circ} 0'$, quanta est in Opere Magno, nequit fieri $4^{\circ} 20'$, quantum Ptolemaeus prodit ex observatione. Forte Ptolemaeus ipse oscitavit, arripiens $1^{\circ} 0'$ pro $1^{\circ} 50'$, aut indulsit methodo computandi non sanae fortasse. Examinetur illa.

Obijciat mihi aliquis ex fol. 754 et 929. Epitomes, argumentum hoc a me ipso esse eversum. Nam ibi nixus sum latitudine maxima Ptolemaica $4^{\circ} 20'$ et excessu bodiernae, sc. $12'$, quasi hic sit ex recessu eclipticae à limite Martis. Respondeo, me indulsisse tunc probabilitati dogmatis de mutata obliquitate proptereaque hoc attulisse documentum ejus rei, non quod sufficeret, sed quod eminens alludere videretur, cum eliora documenta non suppeterent. Si vero accuratius examinetur, multis rationibus convelli potest.

1) Instrumenta Ptolemaei possunt peccare quinta parte gradus; est igitur incertus hic in maxima septentrionali latitudine defectus. 2) Si verissima esset in septentrione quantitas, in austro deberet similiter apparere defectus aliquis. Atqui e contrario excedit Ptolemaica bodiernam. Quo igitur jure ex septentrionali colligi posset diminutio obliquitatis pristinae, eodem jure ex australi Ptolemaica deberet colligi ejusdem augmentatio, quorum tamen utrumque fieri simul non potest. 3) Circumstantiae oppositionum Solis et Martis tempore observationum Ptolemaicarum arguunt, Ptolemaeum non vidisse Martem in ipsissimo limite boreo, sed in inclinatione eccentrici minore, ut probatur fol. 51. adversariorum Martialium recentiorum.^{a)} Ergo in ipsissimo limite potuit latitudo fieri major quam ea, quam fundamenti loco posuit Ptolemaeus. Itaque etsi accuratissime observasset $4. 20$, potuit ea tamen in ipso limite esse $4. 32$, quanta hodie. 4) Detur vero, in ipso limite spectatam esse $4^{\circ} 20'$ et sic $12'$ minorem quam hodie: haec $12'$ non essent a sola mutatione obliquitatis eclipticae, sed a parallaxi orbis, id quod in eccentrico est $4'$, hoc eccentrici Martis loco apparet esse $12'$. Ita parum admodum probaretur mutata obliquitas, nec ultra $23^{\circ} 35'$ fuisse. Vicissim, si totis $20'$ esset mutata, deberet olim apparentia latitudinis maximae Martis fuisse c. 1° minor, et sic c. $3. 30$, quantam latitudinem Ptolemaeus utique non esset mensus $4^{\circ} 20'$.

Alterum argumentum ex theoria Martis. Ptolemaeus reponit limitem boreum Martis in ultimis partes ☿, b. e. (per additionem nostram $1^{\circ} 30'$) in principia ♄, idque c. a. 133. Christi, quando facta fuit ☿ ☉ in 26°☿ c. Hodie vero limes est in $16^{\circ} 45' \text{☿}$: annis ergo 1467 motus est per $16^{\circ} 45'$. Jam asserit Ptolemaeus observationem habitam a Dionysio anno a. Chr. 272. d. 25. *Αἰωρος*, sive, quod ex ipsis interpretatione sequitur, 18. Januarii (ego 15. Jan. scribo; parum enim interest ad latitudinis rationes, de quibus hoc loco agimus), ergo visus est ☿ *παρὰ τὴν ὁρίαν*, appropinquare, τοὺς βορρᾶς μεταξὺ τοῦ σκοπίου (Almag. X. 9.). Si verba accipimus, uti sovant, rectissime concludimus, Martem huic stellae adeo propinquum esse factum, ut videretur illi adhaerere (=incumbere= vertit Georgius Trapezuntius). Nec ullum est in stella dubium, repudiandae sunt omnes anspeciones et effugia a me adhibita in fine Comment. Martis. (III. 441.) Creberrimum est in Ptolemaeo, stellas singulares

denominare a membris simulacrorum eorumve partibus. Nominatim vero haec ipsa stella saepius hoc ipso nomine et casu apud Ptolemaeum ejusque auctores recurrit. Haec igitur stella, cum bodie sit in $27^{\circ} 36' \text{ M}$. inventa, sc. a. 1600, motus vero fixarum in annis 1872 colligatur $26^{\circ} 31\frac{1}{2}'$, fuit igitur stella tempore observationis in $1^{\circ} 5' \text{ M}$. Colligatur locus \odot ad dictum tempus invenieturque is in eccentrico obtinere quam proxime 28° MP . Ab anno vero 133. Christi ad tempus observationis hujus sunt anni 405 retro, quibus de motu limitis borei Martis aequabili obveniunt $4^{\circ} 37'$, quare limes erat in $25^{\circ} 23' \odot$ et nodus descendens in $25^{\circ} 23' \text{ MP}$: praecedebat ergo locus \odot eccentricus \odot arcu $82^{\circ} 23'$, qua in remotione a nodo inclinatur bodie orbita \odot ab ecliptica $0^{\circ} 59' 12''$. Quare hoc Martis habitus ad Solem latitudo ejus conficitur $1^{\circ} 7'$, quantam etiam computavi in fine Commentariorum Martis. Jam vero stella haec hodie latitudinem obtinet $1^{\circ} 5'$, quae si etiam tunc fuit, sequetur ex calculo nostro, Martem stellae quasi contiguum esse factum, nec plus quam $2'$ septentrionaliore praeteriisse. Atque hoc vident verba observatoris. At si ecliptica olim circa M declinavit in anstrum plus quam bodie, circa MP in boream plus: locus igitur eccentricus Martis minus in septentrionem abfuisset eoque et latitudo Martis minor, quam hodie computo, fixa vicissim plus in septentrionem destitisset et proxime tantum, quantum prodit Ptolemaeus, sc. $1^{\circ} 20'$ bor. Sic itaque \odot sub hac fixa notabili intervallo australior transisset, quod verbis observatoris penitus repugnat.

Obijciat aliquis, locum limitis Ptolemaicum, qui adhibetur in hac rationatione, ex composito fuisse accommodatum ad observationem, et sic idem sibi ipsi testimonium praebere non posse. Minime vero gentium. Nam Ptolemaeus fixae latitudinem ponit $1^{\circ} 20'$, Martis latitudinem multo computat minorem et vix $0^{\circ} 50'$. Praeterea conditiones situs siderum Solis et Martis ad tempora Ptolemaei sic sunt comparatae, ut facile appareat, Ptolemaeum ex propriis observationibus extruxisse, ut quantitates latitudinum, sic etiam epochas motuum, limitum et nodorum.

Argumenta ex theoria Lunae contra mutationem obliquitatis eclipticae.

Verisimile est, orbem Lunae esse ailiatum ad eclipticam temporariam, quam describit Terra, ut motrix Lunae, motu suo annuo, quippe cum totus orbis Lunae cum Terra vebatur per zodiacum; eoque et hoc est verisimile, latitudinum Lunae rationes ad eclipticam temporariam relatas omnibus seculis esse easdem, quae sunt hodie. Hoc supposito videamus testimonia Lunae de latitudinibus fixarum ad tempora antiqua.

Desinente anno a. Ch. 295, incipiente hora 10. noctis, quae praecedebat 21. Dec. valde accurate apparuit Luna comprehendisse boreali suo margine borealem stellam frontis M . (Almag. VII. 3; ubi etiam apprehendes ea, quae citat Keplerus in seq.) Atqui computo h. 10. aequinoctiali completa Alexandriae, et sic $\omega\rho\alpha\varsigma$ $\iota\alpha$ $\alpha\rho\chi\omicron\nu\alpha\tau\varsigma$, non vero $\omega\rho\alpha\varsigma$ ι $\alpha\rho\chi\omicron\nu\alpha\tau\varsigma$ (quae ommissio alterius α ex duobus deinceps se insequentibus nihil aut parum attinet latitudinem) centrum \odot $0^{\circ} 42' \text{ M}$, limbi bor. lat. visam $1^{\circ} 9' \text{ bor.}$, cum esset stella in $0^{\circ} 48' \text{ M}$, babeatque bodie lat. bor. 1. 5. Luna igitur margine suo boreali parum in ortum flexo comprehendit id punctum latitudinis, quod stella

occupat hodie. Compara eum altero argumento ex theoria Martis, ubi de eadem fixa agebatur.

Anno sequente, qui erat 294. a. Ch., d. 9. Mart. h. 3. noctis incipiente, Luna media sua apside, quae est ad ortum aequinoctialem versa, tetigit Spicam; transiit autem Spica, auferens trientem diametri Lunae versus boream accurate. Atqui computo h. 2. aequale completa limbum orientalem Lunae in $21^{\circ} 28' 11''$, centrum \odot 1. 54. anstr. lat. et sic punctum diametri, quod trientem abscondit, in $1^{\circ} 59'$, cum esset stella in $21^{\circ} 26' 11''$, lat. hodierna $1^{\circ} 59'$. Ant si de primo ingressu \odot verba sunt exquisitè observanda, Spicae illo tempore latitudo tribnetur $1^{\circ} 54'$ austr.

Anno a. Ch. 283. 29. Jan. Alexandriae h. 3. noctis desinente pars Lunae austr. dimidia ingressa est in posteriorem vel semissem vel trientem Pleiadum accurate. Non est quidem haec observatio extra omnem dubitationis aleam posita, quod facile apparet expenditi singula verba. Probabilissimus tamen punctus inter stellas Pleiadis fuit in $27^{\circ} 55' \gamma$, cum lat. bor. $3^{\circ} 56'$, et computo ego hora non 3. sed 1. completa post Solis occasum centrum Lunae visibiliter in $27^{\circ} 59\frac{3}{4}' \gamma$, lat. limbi non australis, sed borealis $3^{\circ} 54'$ bor. De sphalmate *rotio*; pro *βορραιο* nihil est cur dubitem. Nam nonagesimo gradu valde alto existente, parvum est a parallaxi adjumentum angendae latitudini visibili intra 2 horas vel minus, quas ego antcipio. Nequaquam igitur intra tempus tam breve fieri poterit, ut limbus australis per $30'$ amplius in boream attollatur, ut sc. appareat ibi, ubi ad momentum assignatum inventas est limbus boreus.

Eodem anno 283. a. Ch., noctis quae sequitur 9. Nov. hora 10. ex dimidio transmissa, cum \odot ex horizonte emerisset, apparuit Spica tangere borealem ejus partem accurate. Atqui computo ego horis 9. 30' post \odot occasum Alexandriae centrum \odot in $21^{\circ} 41\frac{1}{2}' 11''$, cum esset Spica in $21^{\circ} 38' 11''$, latitudinem visam limbi bor. $1^{\circ} 53\frac{1}{4}'$ austr., cum Spica hodie lat. obtineat $1^{\circ} 59'$ austr. Itaque tecta fuisset fixa a Luna coepissetque emergere a parte Lunae inter boream et occidentalem. Aut si verba observatoris de ipsissimo puncto boreali maxime essent intelligenda, tunc haec observatio testaretur, Spicae latitudinem olim fuisse minorem quam hodie, cum tamen Brahenus, qui obliquitatis mutationem recipit, ex suis ratiociniis cogatur Spicae latitudinem relinquere invariabilem. Compara ergo hanc observationem cum secunda anni 294.

Anno Ch. 92. 29. Nov. h. noctis 3. incipiente Lunae cornu australe occultavit sequentem australem partem Pleiadis. Atqui computo horis 2 aequinoctialibus post occasum \odot in Bithynia completis centrum \odot ad visum in $2^{\circ} 51' \delta$, cum lat. limbi austr. $4^{\circ} 4'$ bor., cum locus inter fixas quoad longitudinem quidem ambigatur inter 2.41δ et 3.2δ et 3.37δ , sed latitudinem hodie habeat 4. 2 vel 4. $2\frac{1}{2}$ bor.

Anno Ch. 98. 10. Jan. seq. noctis h. 11. impleta refert Menelaus, Romae observasse Spicam a Luna occultatam, non enim visam esse Spicam, at h. 11. desinente spectatam esse praecedentem centrum Lunae minus diametro ipsius, aequaliter distantem a cornibus. Atqui computo post occasum Solis horis aequin. $11\frac{1}{2}$ limbum occ. Lunae in $26^{\circ} 56' 11''$, lat. centri 1. 58 austr., cum esset stella in $26^{\circ} 58\frac{1}{2}' 11''$, lat. hodie 1. 59' austr., quasi et hic hujus stellae latitudo, ut supra bis, fuerit 1. 58. austr., siquidem vero et exacto aequaliter a cornibus Spica abfuerit.

Eodem anno Jan. 13. post triduum (sc. prioris), desinente h. 11. noctis

cornu Lunae australe apparuit in linea recta, quae ex australi frontis per medium frontis ducitur. Centrum vero ☉ relinquebatur ab hac recta ad ortum; et tantum distabat a media, quantum media ab australi, censebatur autem texisse borealem frontis, illa enim nusquam comparuit. Stellae quidem, quae tecta esse dicitur, locus fuit $6^{\circ} 18\frac{1}{3}'$ M; lat. hodie $1^{\circ} 5'$ bor. At puncti, quod in linea per 3. et 2. frontis eodem intervallo a 2. remouetur in boream, locus erat in $5^{\circ} 15\frac{1}{3}'$ M cum lat. 1. 34 bor. Jam centrum ☉ dicitur ab hac linea fuisse orientatior, non plus tamen, quam ut ejus cornu austr. adhuc in hac ipsa linea esset: fuit igitur centrum in $5^{\circ} 20\frac{1}{4}'$ M, nec vere texit Luna borealem frontis, sed obscuravit debile lumen ejus splendore suo. Atqui computo boris ab occasu 10. 40' aequin. et sic h. 11. aequin. desinente centrum Lunae visibiliter in $5. 20\frac{1}{2}'$ M cum lat. 1. 27. bor., quod satis propinque accedit ad $1^{\circ} 34'$, crassa aestimatione aequalitatis intervalli mixam latitudinem. At si eclipticae obliquitas fuisset olim major, major etiam fuisset borealium stellarum frontis M latitudo. Tolerasset tamen etiam prima harum observationum latitudinem borealis frontis, olim 4' majorem, et hoc sic satis aequaliter in Spica australem minorem et boreali frontis. Suppeditat vero et Ptolemaeus nobis argumentum hujus rei ex suis observationibus. Anno enim (deest) Christi Ptolemaeus observavit Lunam culminantem in ☐ in II, ☉ occidente in ☿. Comparata vero altitudine Lunae observata cum supposita altitudine eclipticae puncti, inventa videbatur lat. sept. Lunae in limite boreo versantis 5° nihil ulterius. Atqui hodie Luna in limite boreo simul et in austrino versans latitudinem in utrumque latus habet $5^{\circ} 18'$. Si ergo concedimus, manere inclinationem orbis Lunae ad orbem Solis constantem et fuisse recte observatam latitudinem Lunae, oportet eclipticam in II fuisse tunc $18'$ humiliores, et sic minorem ejus declinationem ab aequatore. Vide Ep. Astr. Cop. f. 930 ex tomo I. Prog. f. 27.

Argumentum ex theoria Jovis.


Nodus ♃ a Ptolemaeo ponitur in 1° ☿, hodie est in $5\frac{1}{2}^{\circ}$ ☿; cum ergo progrediatur motu lentissimo, fuit igitur et 400 ante Ptolemaeum sub Dionysio in principio ☿ et 500 annis ante Ptolemaeum aut in principio ☿ aut in fine II. Jupiter igitur motu eccentrico sub Dionysio versans in $7^{\circ} 4'$ ☿ erit proxime eclipticam, scilicet, posito nodo propter sequentem observationem et propter alias causas in $3\frac{1}{2}^{\circ}$ ☿, erit ♃ non ultra $4\frac{1}{2}'$ septentrionalior ea. At scribitur, cum in $7^{\circ} 4'$ ☿ versaretur circiter, texisse stellam in Canero, cui nomen est Asello. (Almag. XL 3.) Is vero hodie habet lat. austr. $0. 4'$ ab ecliptica et sic fuit in propinquitate ♃ $8\frac{1}{2}'$, quod est dodrans de diametro Lunae: at secundum obliquitatem Ptolemaicam habuisset lat. $25'$ austr. et sic distisset $29\frac{1}{2}'$ a stella Jovis, fere quadruplo plus quam ibi; itaque nequaquam sic eam obscurasset, ut texisse videretur. Eodem modo sub Aristotele posito nodo in $3\frac{2}{3}^{\circ}$ ☿ ut prius et propter illam observationem, ♃ in $15\frac{1}{8}^{\circ}$ II versans motu eccentrico erit c. $25'$ in austrum inclinatius ab ecliptica. At ibi versans non longe potuit abesse a stella in ventre II. Scribitur enim ab Aristotele, bis texisse quandam stellam in II, nec potest alia esse stella, quam haec ipsa. Sed illa stella habet hodie lat. $14'$ austr., olim habuisset lat. $35'$ austr. Verius autem est illud, quam hoc. Et nota, quod ♃ easdem adhuc hodie habet latitudines maximas, quas prodidit Ptolemaeus, sc. c. ☿ ☉ 1° et c. ☿ ☉ 2° crasso modo, cum etiam hodie

ultra 1° 42' nulla ejus latitudo excurrat. De minutia vero 18, cum Ptolemaeus rotunditatis numerorum ut hic indulget, nihil est dicendum. Nam quartas partes graduum etiam ipse, cum maxime antillis est, propter instrumentorum ruditatem in dubio ponit.

Huic quidem argumento potest aliquid opponi. Nam etsi limitia in Libra inclinatio manet constans, uodo Jovis in Cancro versante, datur tamen locus mutationi ellipticae in Cancro.

Fig. 10.

Fig. 10.



C in $5\frac{1}{2}^\circ$ ☾. Cum igitur LRC et ORI sint *κατα κορυφην* et aequales, facile inquiritur alteruter ex suo complemento CRF, ubi CI quadrans et anguli C, I dati. Antilog. C est 26.300, I = 01.87, summa 28.17, antilog. quae-siti sub $1^\circ 22' 33''$. Ex hoc calculo apparet, non augeri sensibilibiter inclinationem maximam. Itaque per hanc responsionem instantia manet inconcussa.

Argumenta ex theoria Mercurii.

Anno 23. Dionysiano Aquarionis die 29. ☿ distare visus est a cleriori caudae ☿ versus arcum tres Lunae (Almag IX. 7.) Nodis vero ☿ per alias observationes bene constitutis, colligitur ad d. 12. Febr. anni 262 a. Ch. ☿ in $22^\circ 36'$ ☿, lat. $0.40'$ merid., cum fixae illae hodie habeant lat. $2^\circ 26'$ m., igitur colligitur ☿ distantia ab illis in boream $1^\circ 46'$, quod est paulo plius quam tres Lunae. At Ptolemaei traditio de obliquitate eclipticae olim majore et harum fixarum latitudine $2^\circ 0'$, tribus Lunis (i. e. $1^\circ 38'$) ab illis in boream extensis, obveniret Mercurio latitudo $0^\circ 22'$ et minor etiam, si 3 Lunae plus faciunt in observatoris oculis humidis. Calculus igitur Rudolphinus tertio ante Cb. seculo in hoc exemplo stabilit obliquitatem eclipticae fixarumque latitudinem hodiernam. Nam si ecliptica esset mutata, stante loco suo sub fixis orbita ☿, omnium locorum inclinationes essent mutatae. Mutari autem simul utramque orbitam non est credibile in planetis, at bene in Luna.

Anno 28. secundum Dionysium Geminionis 7. visus est ☿ in linea capitum ☿ non plane duplo distans ab inferiori ejus, quod illa a superiori, de-erat u. triens Lunae, i. e. $11'$. Distant vero capita in latum $3^\circ 24'$, hujus duplum $6^\circ 48'$. Ergo latitudinem inferioris ☿ et ☿ differentia fuit $6^\circ 37'$; at hodie inferior habet latitudinem $6^\circ 38'$ b., fuisset igitur ☿ secundum hodiernam eclipticam uno solo scrupulo in austro, at secundum obliquitatem maximam latitudo fuisset $0^\circ 25'$ australis. Et computatur quidem $27'$ austr., quod videtur stabilire obliquitatem veteris eclipticae; at plura sunt consideranda. Sepsita enim jam eclipticae obliquitatem, perpende, quod sit observatus ad caput ☿ et quod ego distantiam ejus a capite hoc computem $26'$ majorem, quam est observata. Nec in latitudine solum est dissensus, sed etiam in longitudine. Nam si verba sequaris observationis, examinata ad loca fixarum Tyconica, reponunt ☿ ante $27^\circ 28'$ ☿, et secundum loca et principia Ptolemaica ante $28^\circ 20'$ ☿. Ego vero computo $0^\circ 27'$ ☿, itaque multo propius ad hanc observationem venio, si biduo vel triduo maturius computem. Hoc autem faciens, etiam latitudinem a fixa observationi conformem efficio, itaque proxime eclipticam hodiernam stat ☿ in calculo; et sic dissolvitur instantia, quin imo calculus, hodiernae inclinationi orbium inluxit, valet etiam aetate Dionysii, est igitur eadem inclinatio utrobique.

Videtur tamen rursus ut in Joviali argumento nihil attingere eclipticam distantia latitudinaria planetae a fixis, nisi ut in ☿ parallaxis orbis accesserit. (Nihil sequitur.)

Eandem inquisitionem Keplerus iterum iterumque aggressus, conspectum sibi fecit eorum, quae ad rem pertinebant, hunc:

De anni quantitate, theoria sphaerae VIII, motu fixarum.

1. Fixae promoveuntur. 2. Aequinoctia repedant. 3. Nodi repedant.
4. Fixae et planetae mutant latitudines. 5. Variatur obliquitatem eclipticae.

6. Decrescit semicirculus aestivalis. 7. Eccentricitas Solis minuitur. 8. Annua quantitas decrescit. 9. Inaequalis est aequinoctiorum praecessio. 10. Promotio apogaei Solis. 11. Ea inaequalis.

Primum et secundum cohaerere certum est; tertium, quartum et quintum cohaerent auntque diversum ab illis, nam inter Ptolemaeum et Albategnium annus fuit minimus, at non obliquitas minima; sextum et septimum sunt: in dubio et cohaerent quidem, sed si vera, tunc octavum quoque adhaeret.

Repedant aequinoctia cum nodis hac lege, ut quia nodi per eclipticam median lucedunt, versus axis Terrae sit in circulo arctico spiris implexus, in quibus per 20'' aequinoctia distant. Sic 1, 2, 3, 4 cohaerent, at non 5, quod optabamus. Sed ratio coucina praecessionis aequinoctiorum hinc habetur. Si ponamus $\lambda\phi\phi\phi\phi$ maximam continue augeri, jam et 5. adjunximus. Alias nulla machinatione fieri potest, ut mutetur $\lambda\phi\phi\phi\phi$, si nodi et versus axis Terrae non ab invicem quomodocunque separentur. Ergo si 5—8 sic connecteremus (9. expuncto), ut spiras revolutionum Solis non eidem circulo magno subordinaremus, verisimile quid admitteretur.

Sed constituamus axiomata. I. Cum annus inter Ptolemaeum et Albategnium minor fuerit quam ante vel post, at obliquitas eclipticae non sic, certo ergo ex diversis principiis fluunt haec duo:

Obliquitas minor, variata latitudo stellarum, nodorum repeditio.

Variabilis annus, inaequalis praecessio aequinoctiorum. (Haec cohaerere satis probat Rheticus ex ore Copernici.) Fixae inaequaliter promoventur.

II. Si est aequabilis astricus, eccentricitas non variabitur nec semicirculus, quod quidem et observationibus tribuere possumus. Quodsi talem eccentricitatis variationem confingere possimus, quae simul et inaequalem praecessionem aequinoctiorum causetur, quod impossibile videtur, fieri potest, ut eccentricitas in ecliptica varietur, sub fixis non varietur?

Argumentum contra variationem eccentricitatis: 1) Refractio sola tantum potest. 2) Pars 3600. circuli, quam Ptolemaeus quasi valde subtilem allegat. 3) Ptolemaeus Hipparcho errorem quadrantis diei relinquit in ipsis etiam aequinoctiis. 4) Copernicus 323 iuvenit pro 360; diff. 37. Hoc illi accidit propter alias causas. Adde, sunt 397, alia 17 faciunt 414. Quare si Ptolemaeus tantum erravit, quantum Copernicus, non mutatur eccentricitas. 5) Inter Ptolemaeum et nos fere inventa tanta, quanta hodie.

Contra inaequalem progressum apogaei. 1) Superiora omnia. 2) Imprimis solstitii observatio difficillima. 3) Consideratio apogaei Arzakelis, qui 402 obs. cardinalium punctorum jactat, et Tychois.

In 17. 50 II a. 1076

35. 30 II — 1587

17. 40 : — 511 = 2' 4".

Ptolemaeus: 1587 — 140 = 1447 (· 2' 4") prodit 49° 50'. Subt. a. 95° 30', restat 45° 40', in 15° 40' ☉.

III. Axioma. Apogaeum Solis progreditur, aequinoctia retrocedunt. Non sunt ergo haec ab eadem causa.

Cum esset annus minimus, fixae fuere velocissimae. Ergo omnino haec causa inaequalis praecessionis.

Ad vitandam confusionem nota: 1) certum est, polum verum eclipticae moveri, sed dubium, an in circulo circa polum medium et an in praecedentia an sequentia. 2) Certum est, polum aequatoris moveri in antecedentia fere

circa polum verum, non tamen omnino, quia mutatur declinatio eclipticae; et inaequaliter ex observatione Ptolemaei. Sed dubium, an circa nllum punctum fixum in fixis.

Si hypothesis esset vera, futurum esset, ut eclipticae obliquitatis variaretur etiam ultra variationem latitudinis stellarum, quantum hodie deprehendimus.

Alia meditatio. Annus tropicus longus efficitur, cum fugit ipsum Solem terminus seu aequinoctium, brevis, cum obviam ei proeedit. Aequinoctium igitur tempore Ptolemaei ierit in sequentia. Alio initio, si latitudinis fixarum variatio est a progressu nodorum, illie igitur sunt nodi, ubi decrevit latitudo, ibi limites, ubi nihil decrevit. Sed aequinoctialium stellarum non est variata latitudo, variata est solstitialium. Igitur nodi sunt circa solstitia. Si nodi circa solstitia, ergo coincidit vera et media ibi ecliptica; ergo poli bini eclipticarum lineam extendunt versus aequinoctia.

Ex his omnibus uniformis existit mutatio anni a Ptolemaeo ad nos eaque omnino insensibilis. Hinc axioma IV: mutatio obliquitatis eclipticae et latitudinis stellarum, per promotionem nodorum instituta, nihil mutat in aequinoctiis, quare nec in longitudine anni. Aliter ergo, non per rationem retrocessionis nodorum, sed per circellum trepidationis. Sit polus in 0° ☉ medio circelli, circumeat polus verus in parte remotiore in consequentia, ut, cum est maxima obliquitatis, maxime promoveatur aequinoctium. Ita in una revolutione aequinoctia quater coincident media cum veris; sed perexigna fiet mutatio. Ergo non sufficit haec hypothesis quantitati variationis aequinoctiorum; sed neque proportionalis est, nam annus statim post Ptolemaeum fuit brevissimus, jam est medius. Sed neque ratio physica sufficit, nam ab Albategnio ad nos constans est eccentricitas. An miraculose centrum eccentrici tempore Ptolemaei fuit altum, paulo post humile?

Aliter: Deprehenditur inaequalitas non tantum in longitudine anni tropici, sed etiam in progressu fixarum: ergo terminus anni vere in causa est.

A morte Alexandri M. Timochari	30	Spica	21° 53'	ap	Regulus	28° 54' 56"
Hipparcho	196	"	23. 53	"	"	"
Ptolemaeo	463	"	26. 38	"	"	"
Albategnio	1202	"	8. 3	☉	"	14. 5 Q
Tychoni	1909	"	18. 3	☉	"	24. 5 Q

Sed nota, quibus mediis loca fixarum inquirantur. Primum alt. poli ex utroque solstitio, hinc aequinoctium, hinc motus Solis, hinc per cognitum motum Solis, intermediente Sole et Luna, locus stellae in longum et latum. Quodsi erratum in observatione aequinoctii, totus zodiacus a fixis falso luxatur et transponitur: ergo necessario ista cohaerent. Nota ergo axioma V: Fixarum promotio et aequinoctiorum praecessio est res una, nec debemus argumentari ab utriusque concursu pro confirmanda aliqua opinione.

Haec sequebantur alii constans, diversis temporibus conscripti, ut anni quantitas, progressio aequinoctiorum, eccentricitas Solis atque, quae cum his conjuncta sunt, elicerentur; multas est Keplerus in colligendis veterum testimoniis, quare libros scriptorum historiarum non minus, quam astronomorum mathematicorumque studiosè perscrutabatur et ea, quae ibi deprehendit, calculis probare stodebat. Inter haec notamus longam inquisitionem observationum Walcheri et Regiomontani, quam illi loco reservamus, reliquis vero disquisitionibus in sequentibus proponimus.

De anni quantitate methodus alia.

Timochares observavit conjunctionem Lunae cum stellis Scorpii annis 300. a. Ch., Tycho annis 1600 p. Ch. observavit eandem a fixis. Pone aut

cognitam rationem inaequalitatis; nam ☉ in 2° M. fuit, ☉ in 26° ♌. Vel sume ☉ cum Spica, ☉ in 22° ♍, ☉ in 16° ♋; hic ergo ☉ fuit in ☉ ☉: pone ergo sat cognitam inaequalitatem simplicem vel etiam octantum. Pone secundo certam observationem Timocharis horis 2 post occasum ☉. Pone tertio hanc exploratam rationem parallaxium. Hic in solo secundo difficultas est.

Jam inquire remotionem ☉ simplicem a stellis, reductione facta ad orbitam ☉; idem fac in observationibus Tychois, et divide revolutiones ☉ in dies habebisque motum ☉ simplicem ab aliqua fixarum his temporibus certissimum; qui si tempore Timocharis oh defectum observationis nonnihil deficit, ejus defectus quinta pars accedit illi temporibus Nabonassari. Collige jam motus ☉ medios ad aliquam eclipsin Nabonassari et constitue verum ☉ motum a fixis: dabitur verus ☉ motus a fixis. Hodie vero item habemus verum motum ☉ a fixis: ergo datur anni sideris quantitas; ita ut annis 2300 sideris plus deesse non possit, quam quantum Luna intra 1 horam conficit; largiemur enim observatis Timocharis et Nabonassari hanc latitudinem. Conficit autem Luna una hora $\frac{1}{2}$, qui est dimidius dies in motu Solis; si annis 2300 dimidius dies deest, ergo anno uni deerit non plus $\frac{1}{4000}$ pars diei.

Exiude eadem methodo potes explorare per eclipses interjectas, ut et per conjunctiones Lunae cum fixis interjectas, an vel motus simplex Lunae a fixis, vel sideris anni quantitas sit inaequalis in sese. Si autem aequales deprehendantur, expeditissima methodo ad anni tropici veram et mediam quantitatem accedemus.

Hujus methodi fundamentum physicum hoc est, quod puto, et Lunae et Terrae restitutionem, imprimis Terrae, nihil variari variatis eentrorum motus a Sole distantis; contra quam ex Tychois aequationum neglectu sequitur. Etsi sane et Lunae eccentricitas ut Terrae augeri, quare et periodica restitutio sub fixis crescere potest. Sed id lucertum est et facile probabitur. Prius tamen constituenda est exactissima aequationum tabula.

Cum autem $\frac{1}{1000}$ diei faciat 18" 47"', sciendum, quod Tycho non tantum differat a Copernico et Thebitio, sed tantum 13" 14". Itaque hic modus nihil aliud, quam prohibet Tychoicium sidereum.

Considerandum autem, utra methodus sit certior. Anni sideris dimensio instituitur accepta declinatione Spicae, ex qua mediante latitudine ejus scitur ejus remotio a puncto Arietis. Per hypothesin vero et observationem Solis scitur etiam Solis a punctis ♈ remotio, quare et a fixis. Hoc si duobus temporibus fiat, confectum est negotium. Nam inaequalitas Solis utriusque subtrahitur.

Sed Tycho aliter. Per ☉ observaverat Ptolemaeus remotionem ☉ a Corde ♌, idem Tycho praestitit per ♀, cum utraque sit diei noctique particeps. Hic ergo modus certior videtur, quia ☉ tantum semel addibitur. Potest tamen primus usurpari pro comprobatione aequalis sideris anni et mensis. (Nota tamen, quod Ptolemaeus per armillas fuerit operatus: forte nonnihil errare armillae potuere.) Tycho etiam longiores ambages habet, forte quia Ptolemaei observatio aliud non patitur. Processus hic: 1) observata fuit a Ptolemaeo distantia ☉ a ☉, 2) post occasum ☉ distantia ☉ a corde ♌, 3) hinc per correctionem oh motum ☉ horarium ad observatum temporis intervallum habetur distantia ☉ a corde ♌, quae fortasse in Ptolemaeo non exprimitur. Ergo 4) per hypothesin quaeritur locus ☉ ab

aequinoctio, 5) hinc hujus loci \odot a corde \odot et sic ipsius aequinoctii remotio a corde \odot . 6) Ex abaco Hipparchi distantia $1^{\circ} \gamma$ a corde \odot , 7) hinc distantia $1^{\circ} \gamma$ ab aequinoctio. 8) Observavit Ptolemaeus Solem in aequinoctio autumnali; 9) hinc verus \odot a $1^{\circ} \gamma$, addito motu fixarum ad 6 annos. 10) Ex hypothesi quaseritur ad hoc tempus simplex Solis, 11) hinc simplex \odot a $1^{\circ} \gamma$.

Haec 11 puncta repetantur ad tempora Tychonis sicque sunt 22, ergo vicesimo tertio disperiantur gradus in dies, habebiturque diurnus a fixis etc.

Hoc idem negotium commodius sic absolvi posse puto. Ptolemaeus lib. VII. 2: „cum esset Sol in occasu, capta fuit per astrolabium (Tycho armillas dicit) ejus a \odot distantia $92^{\circ} 7' 30''$; post mediam horam (ecce puritatem aëris Alexandrini) Sole occaso cum esset in M. C. $4^{\circ} \Pi$ et Luna (inquit Ptolemaeus) apparenter in eodem situ, visa fuit ejus in zodiaco distantia a corde \odot $57^{\circ} 10'.$ “ Addit $15'$ horarium \odot et $5'$ propter mutationem parallaxeos. Adde omnia: summa $149^{\circ} 37' 30''$ distantia cordis a Sole. Jam ego statim compararem distantiam Solis a corde ex observatione per \odot facta. Observavit ergo Ptolemaeus dist. \odot et \odot in ipsissimo occasu, alias post $\frac{1}{2}$ non potuisset videre Cor. Ergo suspicio magna refractionum est. Nam haec si fuit $30'$, promovit \odot nimis in consequentia, major itaque dist. \odot a \odot . Quamvis Ptolemaeus dicat, se plures tales habuisse observationes, si unam allegaret Sole oriente, jam vice versa correctio institui posset. Et fuit aër defaecatus, quia post $\frac{1}{2}$ horam vidit cor \odot . Deinde distantia excedens quadrantem non omnimodam certitudinem admittit. Tertio circa diametros \odot et \odot errare dioptris suis potuit. Quarto instrumentum parvum fuit, nam notat $\frac{1}{6}^{\circ}$ et $\frac{1}{8}^{\circ}$. Quinto paralaxi usus est quadraturarum. Luna enim in quadraturis erat; non igitur tanta fuit parallaxis. Sexto paralaxin Solis neglexit.

Fuit autem \odot , cum \odot observaretur, circa nonagesimum. Indo cum ad meridianum venisset, parallaxis edimit ejus motum ab occasu in ortum; sint $3'$, ergo visibilis motus $12'$. Parallaxin vero \odot $3'$ a refractione tollamus, restant e. 30; ejus posterior pars in longum abit; sint $23'$. Adde $23'$ refr. long. \odot , $12'$ visib. \odot , $92^{\circ} 7\frac{1}{2}'$ dist. \odot a \odot , $57^{\circ} 10'$, dist. \odot a Corde Leonis, aequatio \odot 2. 23, summa $152^{\circ} 15\frac{1}{2}'$. Tempus: 2. Antonini 9. Pharmuthi h. 6. p. m. Incidit antecessens 24. Phamenoth in 8. Febr.; adde: 15, habes 23. Febr. anni communis et quarti post bissextum anni sc. 139.

Tycho vero fol. 161 a. Prog. observavit a. 1588 26. Sept. circa $11^h 48'$ a. m. \odot in $9^{\circ} 13\frac{1}{2}' \Pi$, diff. asc. inter \odot et \odot , tum inter \odot et cor Leonis: A.R. cordis Leonis 146. 28. 55; adde cor. par. et refr. $6' 16'$: A.R. correcta 146. 35. 10. Respondet locus $24^{\circ} 6' 40''$ Leonis, \odot 9. 13. 20 Π : dist. \odot a corde 75. 6. 40, Ptolemaeus 149. 52. 30, summa 224. 59. 10. Sed a 23. Febr. 139 ad 23. Febr. 1587 sunt 1448 integri.

Anno 1587. 23. Febr. h. 6.

1588. 25. Oct. h. 23. 48'

1. 245	17. 48.
dema 1.	8
245	17. 48.

Diff. Merid.

17. 35

13. 23. Anni Jul. justii 1449. d. 245. h. 13. 23'. Sed periodi fixarum 1449. 224. 59' 10". In Ptolemaica \odot fuit in $3^{\circ} 3' \chi$, aequatio igitur maxima et adjectoria, quae jam est subtrahenda 2. 23 et addenda distantiae o. \odot . In Tychnica \odot in $9. 13\frac{1}{2}' \Pi$, aequatio 1. $42\frac{1}{2}'$ subtr., jam addatur, ergo \odot medio motu in $10^{\circ} 56' \Pi$ ($- 24^{\circ} 6' 40''$) = $76. 49\frac{1}{2}'$ post cor Leonis. Fiat reductio ad idem principium certitudinis causa. In Ptolemaeo superaverat \odot cor Leonis motu medio per 212°

30¹/₂°, in Tychone per 76° 49¹/₂°, supersunt ad Ptolemaicam elongationem a corde Leonis.
Respondent de Solis simpliciter dies 118. 16²/₃
135. 41

Its first inflected conversions 1450	17. $24\frac{1}{2}$
	16. $45\frac{1}{2}$
	39' — b. 15. 52'

Haec alio tempore repetenda, nam non consentiunt et nimium recedunt a vulgariter instituta dimensione.

Consideratio antiquarum Solis observationum.

Primum, obliquitatem æclipticæ olim fuisse majorem. Refert enim Ptolemæus, Eratosthenem, ejus magna in his rebus diligentia fuit, prodidisse proportionem ejus duplicatæ ad totum circulum, quæ est 11 ad 83 (vide supra p. 53.). Cujus divisionis occasio nobis vice argumenti, est. Accepta enim circulo intercapedine tropicorum, exploravit, quoties ea conlineretur in toto circulo. Si fuisset 45° , contenta fuisset octies. Jam octavum spatium transiit primum punctum, idque continue, donec undecies peragraretur circulus et octogesimum quartum punctum cum primo coincideret. At nisi major declinatio fuisset, quam est hodie, puncta citius coinciderent. Pone namque hodiernam declinationem et accumula eam aliquotiesque:

I.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105.	106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.	113.	114.	115.	116.	117.	118.	119.	120.	121.	122.	123.	124.	125.	126.	127.	128.	129.	130.	131.	132.	133.	134.	135.	136.	137.	138.	139.	140.	141.	142.	143.	144.	145.	146.	147.	148.	149.	150.	151.	152.	153.	154.	155.	156.	157.	158.	159.	160.	161.	162.	163.	164.	165.	166.	167.	168.	169.	170.	171.	172.	173.	174.	175.	176.	177.	178.	179.	180.	181.	182.	183.	184.	185.	186.	187.	188.	189.	190.	191.	192.	193.	194.	195.	196.	197.	198.	199.	200.	201.	202.	203.	204.	205.	206.	207.	208.	209.	210.	211.	212.	213.	214.	215.	216.	217.	218.	219.	220.	221.	222.	223.	224.	225.	226.	227.	228.	229.	230.	231.	232.	233.	234.	235.	236.	237.	238.	239.	240.	241.	242.	243.	244.	245.	246.	247.	248.	249.	250.	251.	252.	253.	254.	255.	256.	257.	258.	259.	260.	261.	262.	263.	264.	265.	266.	267.	268.	269.	270.	271.	272.	273.	274.	275.	276.	277.	278.	279.	280.	281.	282.	283.	284.	285.	286.	287.	288.	289.	290.	291.	292.	293.	294.	295.	296.	297.	298.	299.	300.	301.	302.	303.	304.	305.	306.	307.	308.	309.	310.	311.	312.	313.	314.	315.	316.	317.	318.	319.	320.	321.	322.	323.	324.	325.	326.	327.	328.	329.	330.	331.	332.	333.	334.	335.	336.	337.	338.	339.	340.	341.	342.	343.	344.	345.	346.	347.	348.	349.	350.	351.	352.	353.	354.	355.	356.	357.	358.	359.	360.	361.	362.	363.	364.	365.	366.	367.	368.	369.	370.	371.	372.	373.	374.	375.	376.	377.	378.	379.	380.	381.	382.	383.	384.	385.	386.	387.	388.	389.	390.	391.	392.	393.	394.	395.	396.	397.	398.	399.	400.	401.	402.	403.	404.	405.	406.	407.	408.	409.	410.	411.	412.	413.	414.	415.	416.	417.	418.	419.	420.	421.	422.	423.	424.	425.	426.	427.	428.	429.	430.	431.	432.	433.	434.	435.	436.	437.	438.	439.	440.	441.	442.	443.	444.	445.	446.	447.	448.	449.	450.	451.	452.	453.	454.	455.	456.	457.	458.	459.	460.	461.	462.	463.	464.	465.	466.	467.	468.	469.	470.	471.	472.	473.	474.	475.	476.	477.	478.	479.	480.	481.	482.	483.	484.	485.	486.	487.	488.	489.	490.	491.	492.	493.	494.	495.	496.	497.	498.	499.	500.	501.	502.	503.	504.	505.	506.	507.	508.	509.	510.	511.	512.	513.	514.	515.	516.	517.	518.	519.	520.	521.	522.	523.	524.	525.	526.	527.	528.	529.	530.	531.	532.	533.	534.	535.	536.	537.	538.	539.	540.	541.	542.	543.	544.	545.	546.	547.	548.	549.	550.	551.	552.	553.	554.	555.	556.	557.	558.	559.	560.	561.	562.	563.	564.	565.	566.	567.	568.	569.	570.	571.	572.	573.	574.	575.	576.	577.	578.	579.	580.	581.	582.	583.	584.	585.	586.	587.	588.	589.	590.	591.	592.	593.	594.	595.	596.	597.	598.	599.	600.	601.	602.	603.	604.	605.	606.	607.	608.	609.	610.	611.	612.	613.	614.	615.	616.	617.	618.	619.	620.	621.	622.	623.	624.	625.	626.	627.	628.	629.	630.	631.	632.	633.	634.	635.	636.	637.	638.	639.	640.	641.	642.	643.	644.	645.	646.	647.	648.	649.	650.	651.	652.	653.	654.	655.	656.	657.	658.	659.	660.	661.	662.	663.	664.	665.	666.	667.	668.	669.	670.	671.	672.	673.	674.	675.	676.	677.	678.	679.	680.	681.	682.	683.	684.	685.	686.	687.	688.	689.	690.	691.	692.	693.	694.	695.	696.	697.	698.	699.	700.	701.	702.	703.	704.	705.	706.	707.	708.	709.	710.	711.	712.	713.	714.	715.	716.	717.	718.	719.	720.	721.	722.	723.	724.	725.	726.	727.	728.	729.	730.	731.	732.	733.	734.	735.	736.	737.	738.	739.	740.	741.	742.	743.	744.	745.	746.	747.	748.	749.	750.	751.	752.	753.	754.	755.	756.	757.	758.	759.	760.	761.	762.	763.	764.	765.	766.	767.	768.	769.	770.	771.	772.	773.	774.	775.	776.	777.	778.	779.	780.	781.	782.	783.	784.	785.	786.	787.	788.	789.	790.	791.	792.	793.	794.	795.	796.	797.	798.	799.	800.	801.	802.	803.	804.	805.	806.	807.	808.	809.	810.	811.	812.	813.	814.	815.	816.	817.	818.	819.	820.	821.	822.	823.	824.	825.	826.	827.	828.	829.	830.	831.	832.	833.	834.	835.	836.	837.	838.	839.	840.	841.	842.	843.	844.	845.	846.	847.	848.	849.	850.	851.	852.	853.	854.	855.	856.	857.	858.	859.	860.	861.	862.	863.	864.	865.	866.	867.	868.	869.	870.	871.	872.	873.	874.	875.	876.	877.	878.	879.	880.	881.	882.	883.	884.	885.	886.	887.	888.	889.	890.	891.	892.	893.	894.	895.	896.	897.	898.	899.	900.	901.	902.	903.	904.	905.	906.	907.	908.	909.	910.	911.	912.	913.	914.	915.	916.	917.	918.	919.	920.	921.	922.	923.	924.	925.	926.	927.	928.	929.	930.	931.	932.	933.	934.	935.	936.	937.	938.	939.	940.	941.	942.	943.	944.	945.	946.	947.	948.	949.	950.	951.	952.	953.	954.	955.	956.	957.	958.	959.	960.	961.	962.	963.	964.	965.	966.	967.	968.	969.	970.	971.	972.	973.	974.	975.	976.	977.	978.	979.	980.	981.	982.	983.	984.	985.	986.	987.	988.	989.	990.	991.	992.	993.	994.	995.	996.	997.	998.	999.	1000.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

$$\text{Probab: } 11,360 = 3960 (: 84) = 47 \frac{19}{84} \quad \text{At Eratosthenis } \frac{11,300}{83} = 47 \frac{59}{83}.$$

Forte igitur Eratosthenes distantiam tropicorum ad circulum dixit esse
 nt 11 ad 84? Ex his manifestum est, majorem fuisse distantiam tropicorum
 quam 47° 3'. Nam si haec fuisset, potuisset Eratosthenes quiescere in se-
 cunda pervagatione circuli; nam proportio est proxime quae 3 ad 23,
 $\frac{360, 3}{23} = 47 \text{ minus } \frac{1}{23}$, nam hujus arcus dimidium est 23° 30' minus $\frac{1}{46}$
 gradus, sive 14° 20", se. 23° 28' 40" c. Aut potius prodidisset proportio-
 nem 8 ad 61, $\frac{360, 8}{61} = 47 \frac{13}{61}$, (: 2) = 23° 36' 22". Certum itaque est,
 Eratosthenem non numerorum necessitate, sed voluntate supra 23° 36' 22"
 erectum. Denique si hanc ipsum numerum 11 arripiamus, potuisset ei
 84 adjungere: nt $\frac{360 \cdot 11}{84} = 47 \frac{1}{7} = 47^{\circ} 8', 23^{\circ} 34'$. Atque hoc unum argu-
 mentum est, cui hoc alterum accedit, quod Ptolemaeus diversa observationis
 via invenit medium inter 47° 40' et 47° 45'. Adde, quod differentia, quae
 intercedit inter declinationes utriusque aevi, de partibus 3600 circuli 3 occupat
 eoque amplius.

Vlde, an nou mensi sint a septentrionall ☉ aestivi ora in australem ☉

hiberni? Confirmat mutationem eclipticae aut falsitatem declinationis antiquae, utrum velis: 1) alia hodie latitudo stellarum fixarum. 2) Latitudo ☉ in ☐ septentrionalis in ☉, hodie 29' major. 3) Latitudo ☿ septentrionalis maxima, hodie per 14' major, quam Ptolemaeus prodidit. Est autem is limes inter fixas ☉ et ☿, ergo recte est, quod non est diff. 19'. Adde, quod diligenter observant solstitia, ut Hipparchus affirmet, se ultra $\frac{1}{4}$ diei non aberrasse. Qui potuisset igitur fieri, ut non animadvertissent vitium declinationis? Si nimbros mensi sunt aestivas et hibernas, tunc sane mensi sunt summae Solis orae altitudines, ita aequator evasit justo major, tempus hibernum justo longius, contra quam optamus. Sed non cadit in Ptolemaeum haec suspicio.

Consideratio aequinoctiorum Hipparchi.

Primum nota, quod Hipparchi observationes sint armillares, quare obnoxiae refractionibus, quod confirmat et hoc, quod pleraque ejus aequinoctia mane vel vespere prodantur. Suspicio magna est, armillas repraesentasse Solem altiores. In periodo Calippi anno 32. Hipparchus ait fuisse aequinoctium 3. intercalarium die in media nocte. Rursum 32. anno Calippi vernale aequinoctium ait Hipparchus „exactissime observatum 27. Mechir in mane.“ (Almag. III. 2.), quod Arabs interpretatur in principio dici et h. 5, unde Ptolemaeus colligit, 5-horarum discrimen esse bujus observationis; et Arabs sic loquitur, quasi per 5 horas observatio durasset, aut quasi intra tantum spatium diacerni nequisset, essetne aequinoctium necne. Vide ergo, an non Hipparchus totum id, quod est inter ortum et meridiem, appellet mane?

Adde superioribus tertio, quod Hipparchus plerumque tantum quartas diei notat; quarto, quod suas et Aristarchi observationes circa quartam diei incertitas facit in solstitio; quinto, quod Ptolemaeus etiam aequinoctiis tantam deviationem imputat propter eum errorem, qui in instrumenti situ vel divisione $\frac{1}{3600}$ esse poterit. Sexto, armillas arguit, quod bis eodem die fuerint illuminatae. Suspensus sum, refractionem in causa esse; sed Ptolemaeus addit „maxime majores et vetustiores“ (Almag. III. 2.), vero igitur instrumentum in ea. Septimo, Ptolemaeus observationibus diffidit, etiam cum sunt diligentissimae. (Lib. III. 2. 3. 8.) Octavo, ibidem se potius excusat, quod anni quantitatem certam non prodant, quam ut eam certam esse contendat. Et nota nono, exactam anni quantitatem aliis relinquit quaerendam, de prodita a se cessurus libenter. Decimo. De Metonis Euctemonisque solstitiis ipse et Hipparchus dubitant, non exquisita esse: in universum difficilia captu ait. Nota ergo, quid tribuendum sit superstructae ab ipsis theoriae Solis.

Cum Hipparchus in autumnalibus aequinoctiis adeo variet, estne credibile, nihil plane invenisse Ptolemaeum, quod ab Hipparchicis numeris differret? An Hipparchus fortuna duce coecus scopum attigit? An magis credamus, Ptolemaeum fidei observationibus Hipparcho blanditum? Scilicet aliquid Pythagoricae philosophiae latet in mysticis illis numeris 94° 30', 92° 30', 178° 15'. (Ad eundem denominatorem relatae hae quantitates prodant 378, 870 et 713.) Adde, quod neque tam praecise annus hanc horarum numerum implet.

Haec quidem contra eccentricitatem Solis dici possunt. Cum enim refractione plus justo attolant sidera, apparent illa citius ad medium circumulum ascendere. Ita hiems minuitur, quod postea peculiariter in ipsis Ptolemaei et

Hipparochi observationibus considerabitur. At ista omnia non valent, ut anni quantitatem non veram eo tempore deprehensam dicamus. Nam da, ut observant Solem in meridie et altitudo instrumenti non responderit mundo: certe nihil variabitur autumnalis aequinoctii ab autumnali distantia, utrinque enim aequaliter tardius Sol eo veniet. Solum vernalis ab autumnali alia fit distantia. Annus igitur alius ab autumno, alius a vere.

At forsitan instrumentum ab ortu aliud, ab occasu humilius fuit? Valeret quidem haec suspicio, si autumnalia aequinoctia tantum in occasu, vernalia in ortu fuissent observata. At utraque utrinque et in meridie nec semel observata sunt.

A solstitio in autumnum	92. 30'	Aestas ex observatis Ptolemaei	187.
A vere in solstitium	94. 30	" " "	Tychonis 186. 18. 30.
Hiems ex observatis Ptolemaei	178. 15	Differentia	h. 5. 30.
365. 15. Respondet motus diurnus 14' circiter; dim. 7', cujus arcus declinatio 2' 48'.			

Si ergo concedi potest, declinationes Solis observatas a Ptolemaeo tantulo arcu vitiosas (ut si armillae propenderint in meridiem, ita ut Sol citius ab illas venerit, quam ad aequatorem), credi potest, eandem fuisse tunc longitudinem aestatis et hiemis. Aut si altitudo aequatoris fuit assumpta: enque vitiosa, ut si major justo altitudo poli, minorem justo fecit altitudinem aequatoris.

Alt. aeq. 59.	82. 51. 20	
23. 51 1/3	82. 51. 40	35. 8. 40
82. 51 1/3 parall. 21"	85. 11. 7	2. 27
35. 8 2/3 parall. 2. 27.	47. 40. 33	35. 11. 7
Verior declin.	23. 50. 16	23. 50. 16
	59. 1. 23.	

Hoc pacto quidem alt. poli per $12\frac{2}{3}$ evadit minor et aequatoris major, ita tardius ab infra veniret ad verum Sol, quam ad putativum. Bene.

His ita positis, cum alterum Ptolemaei aequinoctium sit observatum mane, fit sane declinatio tum, cum videbatur nulla, major et septentrionalis ob parallaxin; at refractio rem multo evidentius ducit in contrarium. Nam observatio est post Solis ortum, itaque locus altior justo; jam tum igitur Sol erat in septentrione. Aequinoctium verum praecessit horis aliquot. Altera observatio post meridiem facta minus habet erroris. Patetur enim Sol p. m. habuisse altitudinem 59° et habuerit re vera $1' 30''$ majorem, propter tantam hujus altitudinis parallaxin: dico, incidisse in verum aequatorem proxime, quia is itidem per l. 23. altior est opinione Ptolemaei. Cum ergo autumnalis observatio sit prior, harum horarum anticipatio accedit summae, ita hiems fit longior, aestas igitur brevior. Haec evidentissima demonstratione evincitur, etiamsi armillae fuerint exquisitissime locatae et aptae ad solstitialem poli altitudinem, necessarium nihilominus accidisse errorem aliquot horarum. Mutatur nihilominus hiemis quantitas propter apogaei progressum debetque minor esse hodie (eccentricitate manente), quia apogaeum solstitio proxime est; at quando in aequinoctio fuit, aequabit hiems aestati. Hinc data eccentricitate et longitudine hiemis, facile reperitur apogaeum. Data nempe eccentricitate, datur tabula aequationum. Nota, quod circa illa tempora semper utrumque aequinoctium aut infra Terram, aut post ortum et meridiem. Nam annis 6 per unam horam discedit, annis 11 per 2 horas, annis 17 demum per 3 horas, ita ut vernale h. 3. p. m., autumnale h. 3 ante (secun-

dum Ptolemaeum) vere in ipso ortu, ubi nihilominus propter refractionem jam transiisse videbitur. Imo ponamus aequinoctium h. 4. p. m. vere. Ortum priore ☉ per 26' abfuit sub γ , decl. 11' merid. Eo ortu propter refractionem declinatio tantundem potuit imminui et sic mane et p. m. eodem die bis aequinoctium apparere, quod testatur Ptolemaeus idque tribuit vitio instrumentorum.

Sit eccentricitas 3600, apogaeum in 5° 30' II, supersunt ad aequinoctium 3° 24' 30', prosth. 1° 52' 30"; ad alterum 9° 24' 30'; prosth. 1° 51' 45", utraque 5. 44. 15. Respondent dies 5. h. 19. 4', dimidius annus d. 189 h. 14. 54';

1784 19h 50'	Debita.	182. 14. 54
178. 6	Ptol.	178. 6
13. 50.		4. 8. 54

Dimid. 2. 4. 27, tanta est apud Ptol. in an. 62.

Utere Ptolemaicis aequinoctiis iis, quae in meridie sunt observata, nam effugiant refractionem, parallaxis se mutuo tollit. Restat vitium instrumenti, quod magnum esse non potuit, alias plurimum variasset ingressus.

Observationes aequinoctiorum et solstitiorum.

Ex antiqua traditione tempore Hipparchi et Eudoxi, quod solstitia et aequinoctia conficiebantur in octavis partibus signorum, suspicio est de Hereule, Olympiadum institutore, quod aequinoctium observavit et de quadrante seiverit. Nam eo tempore, annis 1260 a. Ch., primus Thot habuit solstitium, si Prutenicas consulas. Id ergo initium annorum aequilibrium Aegyptiacorum. Meton et Euetemon prodidere solstitia, a quibus ad Hipparchum et Ptolemaeum quadranti defuit $\frac{1}{200}$ diei. Arobimedes solstitia observavit, colligitur ejus observatio ex Hipparcho per 145 annos retro computando. Hipparchus primus est, qui diligenter aequinoctia et solstitia notaret. Ceterum ea non conveniunt invicem, nisi 5. 30. annum statuas, quod est impossibile. Ptolemaeus eardines omnes diligenter observavit anno p. Ch. 140. Annus 5. 55. Albategnius $\frac{1}{1200}$. Elzuphi $\frac{1}{120}$, Arzakel $\frac{1}{120}$, Alphonsini $\frac{1}{120}$, suspectae observationes; Petrus de Aliaco (vacat), Regiomontanus, Waltherus, Copernicus, Tycho Brahe $\frac{1}{120}$.

Certe per hos 600 annos propemodum aequabiliter fuit annus e. $\frac{1}{120}$. An igitur haec periodus est multo tardior, ut e. 6000 annorum? Ut Caesari longissimus, anno Ch. 1300 mediocris, ergo et ante Hereulem mediocris? Minime. Nam ubi maneret Albategnius?

Nota. Petrus de Aliaco notat a. 1290. 13. Mart. h. 0. 30' p. m. aequinoctium; Persa s. 1079. 14. Mart. h. 2. 9' p. m., vel in Aliaci horizonte h. e. 0. 30'. (anno 1078.) Erant anni Jul. 212, aequinoctium hora c. 7. a. m. His ergo 212 annis horae tantum 18 interciderunt, et annis 283. c. dies. Iterum tardissimus annus. Ergo a Christo ad a. 1200 confecta integra periodus annorum 1200.

Confirmat, quod e. 1000. Elzuphi et Arzakel invenerunt defectum $\frac{1}{120}$, Persae eodem tempore $\frac{1}{120}$ fere. Hodie vero iterum $\frac{1}{120}$ a Tycho et Regiomontano. Item statim post Ptolemaeum fuit annus brevissimus. Item sub anno a. Ch. 1200 ad 400 a. Ch., sc. ad Eudoxum, per annos 800 c. 7 dies interciderunt.

Aequinoctium Norib. 1488. 16. Mart. h. 15. 40'

1288. 12. Mart. h. 12. 40

200. 1. d. h. 21. (15 : 200 = 1 : — 14 fere.)

Ergo in 107 annis dies unus: haec nonnihil discrepant. Pone Persarum anno 1076. 13. Mart. h. 7. p. m.

1488. 10. " " 15. 40'

412. 2. " " 15. 20. Creiter annis 160. dies.

Sosigenes seu J. Caesar accommodavit haec puncta his diebus: vernale 24. 25. Mart., solstitium 24—26. Jun., autumnale 24—26. Sept., brumale 24. Dec. Sex primi menses anni communes habent d. 181, bissexiti 182; residui sex — 181. Sed a 24. Dec. in 24. Jun. sunt 182 et 183, ad 25. Jun. 183, 181, in 26. sunt 184, 185. Jun. in Nov. menses semicirculi descendenti habent d. 183, reliqui 182 et 183. Haec fortasse causa est anni sic dispositi. Martius in Majum habent 92, Jun. — Aug. 92, Sept. — Nov. 91, Dec. — Febr. 90 et 91. Haec omnia conspirant cum aequinoctiis. A. 24. Dec. in 24. Mart. biss. vel 25. communis sunt 91. At si hoc aliquid valerit, oporteret inter Sept. et Dec. esse locum bissexiti, quia 24. Dec. certus est, h. a. annicus.

Plinius et Columella aiunt, solstitia confici in octavis partibus signorum, Hipparchum vero emendare veteres et affirmare, quod conficiantur in primis partibus signorum; se vero sequi Endoxum et veteres, nam agricolas assuetos vetustae rationi. Alibi Columella sic: 16. Cal. Jan. ☉ in ♊ transitum facit, brumale solstitium, ut Hipparcho placet. Paulo post: 9. Cal. Jan. hrmale solstitium, sicut Chaldaei observarunt.

Haec ego concilians hunc sensum accipio. Graecis et Italis, quancunque fastorum anomalia sint usi, existimo notam fuisse anni periodum, quod sc. anni 4 habeant dies 1461, fortasse ex vetustissima Chaldaeorum observatione anni cynici. Puto enim, non potuisse institui rustici operas, nisi agricolae alium quam veterem Romanum annum haberint. Confirmat me, quod apud Diog. Laërt. de vita philos. invenio solstitiorum observationem antiquissimam, modulum anni d. 365, antiquissimum etiam inter Graecos. Hauerint agricolae Eudoxi fastos, qui assignaverit, quo die in certa aliqua anni forma ad multos annos futuros conficiatur periodus. Deduxerit Eudoxus hanc rationem non a suis observatis, sed a vetustissimis Chaldaeis aut ab initio Olympiadum; quod quidem a Chaldaeis Iphitus aut Meton aut alius aliquis acceptum in Graeciam traduxerit. Porro claruit Eudoxus Ol. 100, annis 400 post initium Nabonassari, quod nondum sufficit nostro negotio. Ergo 500 annis antea, a. Ch. 1260, a. mundi 2708 Bantingus notat solstitium incidere in 1. Thoth, ex oriente. Canicula. Eato ergo haec Eudoxi vetustissima traditio, cujus procul dubio et Albategnius meminit; de vetustissimis Chaldaeis loquens. Floruere tunc regna Graeciae Sicyoniorum, Argivorum, Mycenarum, Atheniensium et Troianorum, quorum historiae ad posteriores Graecos et Eudoxum derivatae sunt; cumque pax esset, ut ante bellum Troianum, credi potest, commercia vixisse inter Graecos et Phoenices, Chaldaeorum rationum peritos, ipsa navigandi necessitate. Regnavit etiam eo tempore Argis Hercules, primus Olympiadum institutor. Demus ergo Herculi cognitum diem solstitii, si minus de aequinoctiis concedimus. Omnino sub exitum Troiae, quod 80 annis secutum est, aut nota fuere solstitia, aut splendide fabulantur auctores, diem mensis Graeci nominantes et solstitia determinantes. Ab eo tempore ad Endoxum minuerentur anni Juliani plenii seu Olympiades et concipiatur dies, quo die semper sit solstitium. Dies ille hoc nomen habeat, quia eo die antiquitus celebratum fuerit solstitium. Non sit autem verum solstitium, sed hoc praecesserit per dies 7. Tempus est annorum c. 900. Ergo scripserit Eudoxus solstitium, aequinoctium, die antiquo, addiderit vero, Solem eo die, qui denominatur solstitium, jam esse in octava parte signi. Hipparchi vero sit haec emendatio, quod cupierit tollere catachresin nominis solstitium docueritque loqui correcte, solstitium verum non in octava signi parte confici, sed ante dies 8, in prima parte signi. Non pouterunt vero capere Hipparchum agricolae, quia assueverant antiquae tradi-

tioni, ut hodie festis immobilibus antiqui Calendarii. His sic positis, omnia verba Columellae et Plinii consentiunt.

Reinholdus imaginatur nescio quid de fixis stellis, quod non aequae Graecis convenit ac Aegyptiis. Graeci non ex antiquissima traditione docti fuerunt, ut Chaldaei, sed ingenii solertia et suis observationibus. At solstitia in sensus incurrunt Sole ascendente, minime vero slo exortus stellarum.

Jam quia primus Julianus bissextus fuit, sit aequinoctium a Sosigenes statutum in 24. Martii, aliis annis in 25. Martii. Fuit a. 45. a. Ch., Hipparchus vero a. 146. a. Ch. observavit idem 24. Martii matutino tempore; fuit communis. A 24. Mart. anni 146. ad 24. Mart. 145. sunt dies 366; postea 100 Juliani anni, itaque 101. Jul. et dies. Hipparchus in mane observavit, Sosigenes, cum contulerit in 24. 25. Martii, citius id non potuit, quam etiam in mane, ut primo post bissextum esset in meridie, altero in occasu, tertio in media nocte post 24. et quarto iterum in mane diei 24, imo hoc pacto consequeretur diem 24; statuerit ergo in meridie. At sic habebit ab aequinoctio ad aequinoctium integros Julianos 101, diem 1 et quadrantem, abundans die integro. Aequinoctium Hipparchi fuit die 27. Mechir; adde annos 101, h. e. dies intercalares $25\frac{1}{4}$, erunt $22\frac{1}{4}$ residui, qui computantur pro die 22. Phaenoth in meridie, quia Hipparchi fuit mane. Is sane tangit 23. Martii. (Secundum Buntingi de primo Juliano aequinoctia etiam in 22.)

Ita si dicamus, annum ab Hipparcho ad Sosigenem 6 horas praecise etiam implese, tamen non ultra meridiem 23. Martii pertingimus. Superest ut credamus, Sosigenem observasse aequinoctium illo die, sequitur ergo, annum ab Hipparcho ad Sosigenem fuisse $365\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{100}$, quae quantitas ipsam etiam sidereum excedit. (Notat tamen quidam Almagesti Braheani (etc) scholiastes, Censorinum referre novilunium in 1. Jan. Julianum, quod per calculum reperitur in 2. Jan., si retro cogitemus Julianos a nobis. Fnisset ergo is ex mente Julii simplex annus, qui nobis ratione ordinis computatur duplex. Itaque Sosigenes videtur peccasse, aut annus confusus contra ipsius mentem. Nam si, quem putamus 2. Jan., is fuisset Julii primus, certe quem putamus 24. Martii, is fuisset J. Caesari 23. et qui Caesari 24, calculi nostri ratione esset 25. At cum aequinoctium in 24. tolerare non possimus, qui in 25. feremus, si, quem Censorinus 24. diceret, is hac ratione 25. esset?). Nam is $\frac{1}{150}$ addit. An ergo Sosigenes tam imperitus fuit? an potius tanta fuit inaequalitas anni? Ptolemaeus observavit vernale a. 140. p. Ch. (Nabonassar 887) 22. Mart. bissextilis in meridie. Fuit jam aequinoctium Sosigenis etiam bissextilis Martii d. 24. in meridie a. 45. a. Ch. Summa 184 anni dies 2. Ille ergo demeretur de quadrante $\frac{1}{92}$ diei vel $2\frac{1}{92}$ horae, vel $\frac{13}{48}$ vel $\frac{1}{10}$ fere, anni ergo quantitas h. 5. 45'. Vide an omnia ista conciliari possint?

Anni quantitas ex antiquissimis obs.: Ab Hercule ad Hipparchum dies 7.

Ab Hipparcho ad Ptolemaeum " 1.

A Ptolemaeo ad nos " 12.

20.

Anni p. Ch. 1600

ante Ch. 1260

2860 : 20 = 143; tot annis dies unus. In Gregoriano $133\frac{1}{3}$ annis $\left(\frac{2860 \cdot 3}{400}\right)$ dies nuns. Annus ergo Gregorianus est $365\frac{97}{100}$ (5. 49. 12).

Chaldaei 1261 a. Ch.

Hipparchus 146

Anni 1115 dant 86400 secunda horae, quib 77 R. 9. 5; annus a Chaldaeis ad Hipparchum 5. 50. 57, a Ptol. ad Albatagium 365. 5. 46 $\frac{1}{2}$.

Coneilium Nicenum a. 326. statuit aequinoctium 21. Martii. Non puto, tam imperitos fuisse observandi, qui id ex Alexandriano episcopo didicerint. Ergo a Sosigene per annos fere 400 dies 3 interciderunt.

Keplerus citatis antiquis scriptoribus (Beda, qui prodit suam aequinoctiorum ignorantiam. Austolico, Proterio), sic pergit:

Conversio aetatis anni. 1601.	2. Nov. 20.	4. 27 m
1602. 30. Jan. 20. 43.	8	==
	38. 41	1. 0. 40.
	37. 55	
	46	

d. 88. h. 8. 42 quadrans minimus

91. 7. 32

91. 7. 32

270. 23. 46

365. 5. 49

94. 6. 3 longissimus.

Quocunque ergo transit apogaeum, ibi longissimus est quadrans. Ergo anomalia aequinoctiorum et solstitiorum potest esse annis 10000 quatruidi. Si initio mundi fuit aequinoctium 23. Apr., debuit aequali motu hodie esse 12. Martii, sed accessit integra Solis aequatio, est ergo 10. Martii. Ea si tunc aequinoctium 22. Oct., quando nulla aequatio, debuit hodie esse 10. Sept.; sed quia accessit integra ☉ aequatio subtractoria, debuit hodie esse 12. Sept., itaque quatruidi ab invicem discesserunt. Differentia quadrantum longissimorum est integrae fere diet. Nam vernalis initio Olympiadum vel ante fuit d. 94. h. 6. At e. Ch. annum 1200 aequabatur aestivo eratque dierum 93. h. 9⁷/₁₀. Hodie rursum incipit crescere longissimus, sed jam tenet aestatem. Quadrantis longissimi a brevissimo distantia est d. 6.


Restat igitur, ut vel Ptolemaeus fraudem commiserit confectis observationibus, aut meticulositate seu superstitione quadam antiquitatis illos confirmare maluerit, quam refellere, quorum neutrum est verisimile in Ptolemaeo philosopho, eandem, veritatis assertore, quod multis gnomis testatur, praesertim cum nullam inde vel utilitatem vel gloriam sperare poterit, at majorem ex correctis antiquis. At quod uce obsequiosus antiquitati fuerit, multis modis testatum reliquit, Hipparchum refutans, ubi opus fuit. Ergo vere annus fuit longior.

Posito, quod et aestas fuerit longior, et major obliquitas, et annus tropicus longior quam hodie: et omnia haec, e. Christi tempora in suo statu, hodie iterum, ante 100 se. annos in suo statu; nam hoc testantur 300 annorum proximorum observationes.

Sit A centrum mundi, AD aequator, jam immobilis, quamvis non sit. AF Ptolemaica eclipctica, AE hodierna; C centrum Solis Ptolemaicum, B hodiernum. AC 4160, AB 3600, BAC 19': quaeritur BC, nam ex hoc faciemus diametrum circelli, qui variet aequinoctia. Ponamus autem initio, Solis apogaeum esse utrobique in 0° ☉. In CAE dantur AC, angulus H et HAC.

Computo HBC = 2° 21' 10'', BC 56.

Fig. 11.



Media inter AB et AC est 3880, si haec sit 100000, quid 28? R. 5928; $3^{\circ} 23' 32''$ variatio aequinoctiorum, sed haec potius est variatio apogaei ☉ in annis 1500. Et quae causa esset huius inclinationis circelli, nisi statuimus aequalem ☉ restitutionem ad apogaeum inaequale. Ergo differentia esset d. $3\frac{1}{2}$ in annis 1500; anni fierent c. 3000. Sint 3200: annis igitur 800 ex crescerent d. $3\frac{1}{2}$, anni 800 ab Albategnio ad nos essent breviores $3\frac{1}{2}$ diebus quam 800 medii, et anni 800 a Chr. ad Albategniam essent tanto longiores. Ergo anni 1600 a Ch. ad nos divisi per hunc numerum darent quantitatem anni mediam respectu harum causarum. (Proportio anni longissimi ad brevissimum $288003\frac{1}{2} : 287996\frac{1}{2} ; 288003\frac{1}{2} : 365\frac{1}{4} = 7 : \frac{5}{576}$ diei; $576 : 24 = 5 : \frac{120}{576}$ horae, $576 : 60 = 120 : 12'$. At Ptolemaeo annus fuit 56, nobis 49, diff. 7. Ergo dimensio etiamnum est minima; sit minor, assumpta Ptolemaica eccentricitate minore. Sed videndae etiam observationes Albategnii et Ptolemaei.)

Alia Hypothesis.

Concessa variatione eccentricitatis, anni quantitas necessario augeatur. Nam si ve a singulis eccentrici gradibus radios ad ☉ demittas, summa 360 horum radiorum longior erit, si ve per singulas gradus anomaliae coequatae ducas radios, summa quidem radiorum exiguo brevior erit, sed arcus eccentrici, respondentes anomaliae coequatae gradul, sunt majores. Hoc itaque verissimum est, saltem dimensio est aliquanto difficilior. Assumendus autem est 100000 distantiae utrinque ejusdem valoris. Camque per 3600 anomalia simplex c. 4' aut 5' minor iusto facta fuerit, quid 560 efficit? Resp. $\frac{22}{36}$ hor., non integrum scrupulum. Sane Sol 12' horae conficit 30" non plus. Nota tamen, quod ipse etiam annus sidercus taeto fere spatio decreseat per hanc hypothesin.

Jam modo videadum, quomodo eccentricitas cum obliquitate rationabiliter connectatur. Si usurpemus hypothesin superiorem dicamusque, Solem sub fixis restitit nullo habito respecta apogaei, circellus ille vel pars erit plani ellipticae et sic aulla erit variatio obliquitatis, vel rectus ad planum ellipticae, sic at diameter sectionem vel Solem spectet, et sic aulla erit variatio motus apogaei, vel sit ad ventilem e Sole in se mediam perpendicularis, tunc aulla erit variatio eccentricitatis. Itaque sit modus secundus. Et quavis variatio eccentricitatis accommodanda sit ad quantitatem anni, ut certiorum, vide tamen, quomodo variatio obliquitatis cum ea concordet; ubi statim initio apparet, non fore maximam variationem obliquitatis, nisi in annis intermediis. Horam itaque modorum nullus est.

Nota de auctoribus. Azophi meminit Carolus V. la privilegio Apiano concessa, quod est impressum ad Horoscopium. Dicit, quod Apianus edere pollicetur librum Azophi, astrologi vetustissimi. (Maestlinus ex mss. Apiani probat, exemplar illi perisse incendio; habet paucas ex eo fixarum imagines.)

Arzabel est, referente Judaeo Poloano. Elsarquel. Hunc videtur Alpetragius appellare Avonsbae Alzarcala. Coudidit tabulas Toletanas. Exstat apud Hoffmannum. Rabbi Levi scripsit de modo observandi diligenter; vide aa et alia. Meminit Commandinus. Theon, mathematicus sub Theodosio, introducit ab Alpetragio, admirans, jam suo aevu non correspondere fixas calculo Ptolemaei, quare accessum et recessum per 8° conflavit et insuper conformem progressum anni 100 uno gradu. Etiam Proclus Diodochus in editione Basilien. G. Vallae interpretis meminit hujus motus idemque et animadvertit aequinoctii anticipationem. Adde et Rabbinum Abr. Chaja, qui ait,

haec opinionem a Ptolemaeo visam, neque tamen tactam. Tribuit eam Media et Babylonis. J. Scaliger meminit Roberti Lincolnensis, de aequinoctio scribentis; item Johannis de Saxonia. Calocalonymos testatur, Alpetragium vixisse post Averroem. Matth. Guarimbertos Parmensis obliquitatem eclipticae numerat $23^{\circ} 33' 30''$. Vixit post Italiam, Albulasarem, Alcabitium, Messalliam, Jo. Hispanensem, Haly, Ptolemaei interpretem, quos legit et allegat.

Ex scbeda, quam Schickardus vertit ex Avenara (an Aven Jaak Israel?), qui dicit, se minus mille annis post Ptolemaeum vixisse, obliquitas est $23^{\circ} 30'$ et semisexta, i. e. $5'$. Vixit ergo ante 1140 Christi.

P. Apianus in introductione Geographiae a. 33. edita, fol. G. 3. facie b. et C. 4. f. a, primum suspectas facit latitudines fixarum, dicens „sequentes adhuc vestigia Ptolemaei“, deinde constanter affirmat, die aequinoctii Alfonsini adhuc arctatam esse lineam.

Wernerus a. 1514	decl. polaris $85^{\circ} 50'$, dist. $4^{\circ} 10'$.	0.
1548 Levant		3. 8.
1573 Augustae		8. 0. 15.
1589 Huesnae		2. 54. 50.

Hic Wernerus exorbitat, vix enim $3^{\circ} 30'$ potuit esse distantia. Ac ne Peurbachius quidem tantam invenire potuit. Stoefflerus et Pighius scripsere de Calendarii Romani correctione, P. Middelburgiensis in Paulinis (?) ejusdem argumenti. Clavius f. 30. putat, universales tabulas non posse strui. Campanus scripsit de Computo, Clavius ait, veteres probabilis conjectura ductos annum inaequalem suspicari coepisse, quod Sol inaequaliter incedat.

Nota ea, quae Proclus Diadochus Lyncus quaestione 8. de punctis tropicis habet et per apogonem Solis excusat et meminit motus (motus, loquam, non nomen), Thebitian, quem Alpetragius Theoni tribuit. Queritur aetas Procli. Thebitii enarratio motuum planetariorum et VIII. sphaerae exstat in uno quodlibeto. Garlandi tabulae in libro Bacchanali. Quidam docet struere Arrahelis tabulas, ibidem habet quasdam observationes. Scaliger fol. 200. haec ex Ignatii Patriarchae Antiocheni literis: „Mustera erant in fine Ahan mensis, cum is Jezdegird accessit ad imperium, ut scripsit mihi Ignatius, Patriarcha Antiochenus, vir linguae Persicae peritissimus. Ipse transtulit ipsa in 23. Martii, ut Adar incidere in 18. Martii, in quo die conficiebatur illo tempore aequinoctii sidus, et tunc inciperet magna periodus Neuraz Jezdegirdici.“ Jezdegird caesus anno 2. imperii, anno Ch. 632. Haec ideo facta translatio hoc potissimum tempore, quia tunc (1. Thei) Nabonassar 1380 incidit in 18. Martii. Ergo nota: nec a caede nec a principio Jezdegird, sed quia sub Jezdegird coeptum consilium restituendae epochae.

Finem facientes praefationi nostrae istis, quas in praemissis collegimus aequalium de Kepleri opere et studiis astronomicis sententias, subjungimus iudicium posterioris, qui breviter post Kepleri obitum illustranda defendendaque susceperat illius inventa. Jeremiam dicimus Horroccetum, quem alio loco (vol. III. p. 518 ss.) laudavimus. In Horroccii libro, quem edidit posthumum Joannes Wallisius, inscriptum: „Astronomia Kepleriana defensa et promota“ inter alia memoratu digna haec deprehendimus.

Copernicus speculationi suae non perfectum viditque nitorem conciliavit, dum centrum orbium mobilium statuit non in ipso Solis corpore, sed in puncto quodam prope Solem. Particulam hanc hypotheseum Copernici feliciter corrigens Keplerus, splendori suo restituit astronomiam, centrum orbium mobilium in ipsum Solis corpus transferens. Ipsum hoc pluribus rationibus firmat tum in Commentariis de motu Martis, tum etiam in Epitome Astronomiae Copernicanae. Rationes Kepleri hae sunt: fons motus (quem ille centro et Soli

competere probat) ineptè assignari in puncto aliquo mathematico, proxime corpus nobilissimum, sed potius in ipso corpore nobilissimo, quod vis motrix non potest residere in puncto mathematico (quod re vera nihil est), sed requirit corpus, vimirum cor mundi, Solem. Deinde consentaneum naturae videtur, cuiusque planetae motum per se simplicem esse nec ab alterius motu quovis modo pendere. Jam vero, si motus reliquorum planetarum non ad ipsum Solem, sed ad centrum orbis Telluris assignaverimus, ut facit Copernicus, pendebunt eorum motus a motu Terrae. Mutatio apogaei Solis (aut potius aphelii Terrae) ut et mutatio eccentricitatis ejus (si modo ea ulla esset) mutaret centrum reliquorum planetarum. Quid illis cum Terra? Nonne hoc est motus eorum ad Terrae motus eoque consensum alligare, ut vetus astronomia pari errore facit ad Solem? Ego certe aequè absurdum judico. Tertium argumentum Kepleri hoc est: si corpus Solis non statuatur centrum commune orbium mobilium, sed centrum orbis Terrae, fiet ut communem illum planetarum nodum sola Tellus pro norma sui motus exacte observet, reliqui hinc illinc ab eo fient eccentrici. At quae hujus diversitatis causa? Absurdum videtur, ut Telluris eccentricitas ad Solem referatur, omnes reliqui ad alium communem nodum respiciant. Longe melius Keplerus, qui omnium eccentricitates ab uno puncto, Solis corpore, deduxit. Quae hypothesis eo praestantior est, quod parallaxes orbis dupliciter inaequales reddit: nimirum ex diversa distantia a Sole tum planetae tum Terrae.

In disputatione VI. „De motu siderum“ haec asserit Horroccius: Magni apud astronomos fere omnes est vulgare illud axioma, motus coelestes esse circulares vel ex pluribus circularibus compositos, et ob id perpetuos et aequales. Supra hanc philosophiam, excepto unico Keplero, progressus est nemo. Verior Kepleri sententia est, quae docet, tales circulos in coelo nec re vera esse, neque eorum confictione opus esse omnino. Causa motuum stellarum vera est physica: Sol nempe conversione sui corporis reliquos planetas legibus magneticis secum rapit in gyrum, non aliter quam Terra Lunam, nubes et reliqua in altum projecta magnetica hac virtute secum circumvehit, ut doctissime probat Keplerus. Causam autem eccentricitatis male (ut mihi videtur) tradit. Illam ego fibris magneticis, quas ille in corporibus planetarum fugit, tribuendam non censeo, sed inertiae eorum corporali, qua locum suum tueri conantur adversus fortiozem Solis virtutem. . . . Motus stellarum verus non solum nobis inaequalis apparet, sed et ita re vera est. In eo differimus, quatenus hujus inaequalitatis sit causa. Nos Kepleriani, exemplis aliis multis confirmati, naturae ipsi opus hoc delegamus et Solis virtutem magneticam, tam multis experimentis comprobata, inaequalitati buio praesidem constitimus: illi (Copernicani) in fictis et commentitiis circularum ambagibus causam frustra quaerentes inutili molestia sese torquent, nec unquam sese extricare valent, confuso circularum labyrintho penitus oppressi.

Hae sunt ea, lector candide, quae mihi erant adversus circularum perfectionem disserenda, quae si diligenter attenderis, minime dubito; quò jam mecum videas, quantis in tenebris il versantur, qui neglecta naturali causarum disquisitione nihil supra has nugas student. Admonendi igitur sunt studiosi, qui veritatem, non antiquitatem, quaerunt, ut a vanissimis hisce circularum speculationibus animas suas revocarent et ad philosophiam magis naturalem assuescerent. Legant eruditissimum nostrum Gilbertum in Physiologia sua de magnete, legant Kepleri Astronomiam Physicam in Commentariis de motu Martis et Epitomen ejus Astronomiae Copernicanae, et non

dubito quia excludit jucundissimum solidae philosophiae thesaurum captaturi sicut, non illum quidem vanis subtilitatibus et ut ita dicam literatis deliriis refertum, ut apud vulgares philosophos, sed divinissima verae sapientiae varietate florentem, uentat et ambrosiam suavissime spirantem. Disces excludit admirabilem motuum magneticorum naturam et quomodo illi in motibus siderum apertissime sentiantur. Disces exinde, quibus legibus Sol, ille astrorum pater, planetas tanquam carissimos liberos in sinu suo circumgestiat. Disces Creatoris tui inexhaustam sapientiam doctioribus labris degustare et eorum uicibus despicere et misereri, qui in circulis et lineis consensescunt.

Disput. VII. „in qua respondetur Martii Hortensii cavillis contra Tycho-nem,“ (in praefatione ad Comment. Lansbergii) sic praefatur Horroccius: Fellicius esset astronomia, si tantum essent, qui eam negligerent, nec ipsos iuterim haberet, quod ab eam coleutibus pateretur. Sed ea semper fuit bonarum artium miseria, ut non solum rudioris ignorantiae pedibus proculcatae jaceant, sed et ab illotis imperitorum manibus profanatae miserrime nugantibus dive-xeantur. Tantum immortalitati qualieunque inhiant Herostrati, ut eam vel templi Ephesini incendio mereri velint.

Diu fuit, quod sideralis scientia, ruinosis veterum astronomorum columulis dudum vacillantibus, Atlantem aliquem desideravit, ejus fortiores humeri jam mole sua corruentem sustinerent. Favit tandem illius votis Deus O.M. tan-demque peperit Urania Tycho-nem, virum, cujus diligentissimae observationes et divina plane inventa longe plus astronomiae contulerunt, quam vel vidit prior aetas aut sperabit futura. Ille enim non solum stellarum fixarum loca fere omnia labore penitus Herculeo exactissime restituit, quo siue fundamento frustra instabili veterum arena deluderemur, sed et in Sole et Luna reliquis-que planetis tam continuis observationibus, quam indefesso studio quam plu-rima naturae mysteria in lucem primus protraxit.

Successit huic divinissimum Kepleri ingenium, viri ad abdita naturae enucleanda nati, qui ex Tycheonis observationibus astronomiam novam condere aggressus est eamque, praeclaris pluribusque aliis scriptis prius praecelsum, feliciter tandem absolvit editis Tabulis Rudolphinis, quibus nunquam pares Sol adhuc vidit. Et quidem in omnibus adeo erudite astronomica tractavit, ut sem-per nihil persuasum fuerit, *eum omnia habere, qui habet Keplerum.*

EPITOME

ASTRONOMIAE COPERNICANAE

*Unitata forma quaestionum et responsionum conscripta, inque VII libros
digesta, quorum tres hi priores sunt de*

Doctrina Sphaerica.

Habes, amice lector, hac prima parte, praeter physicam accuratam explicationem motus
Terrae diurni ortusque ex eo circulorum Sphaerae, totam doctrinam Sphaericam nova
et concinniori methodo, auctiorem additis exemplis omnis generis computationum
Astronomicarum et Geographicarum, quae integrarum praeceptionum vim sunt
complexa.

AUCTORE

Joanne Kepplero

Imp. Caes. Matthiae Ordinumque Ill^{um} Archiducatus Austriae
supra Onasum Mathematico.



Cum Privilegio Caesareo ad Annos XV.

LENTIS AD DANUBIUM,
excudebat Johannes Plancus.
Anno MDCXVIII.

Admodum Reverendis, Illustribus Generosis, Nobilissimis Strenuis,
Nobilibus Prudentibus etc. Dominis, Archiducatus Austriae supra
Onasum Ordinibus etc. Dominis meis Gratosissimis.

Quod jamdudum post edita mea de motibus stellae Martis commentaria, suadentibus amicis astronomiae peritis, faciliare coepi, ut novam illam astronomiae sub Rudolpho Caesare restauratae formam compendio complecterer et minoribus quasi subsellis accommodarem, ut, quia non felicius discitur haec scientia, quam si, qui fructum ejus adulti percipere cupiunt, in ea sementem pueri faciant, simul illi et facilitate comprehensionis et pretii diminutione copiaeque justa exemplarium javerentur, id tunc vel maxime perficiendum mihi censi, postquam concessione S^{ae} C^{ae} M^{ae} et liberalitate vestra, Proceres, Lincolnum translatus, fores mihi patefactum iri speravi, Nobilissimam vestram juventutem oretenus in hac scientia instituendi. Quanquam ne hoc quidem transitu meo morae studiorum meorum publicandorum omnes fuere sublatae. Cum enim laboriosae non minus quam sumtuosae sint editiones hujusmodi, ex una parte solitudo, ex altera tennis res mea difficillima mihi fecerunt principia; pepigique necessitate compulsus cum bibliopola Augustano, ut exemplum Epitomes hujus ederet suis sumtibus, quod et se facturum recepit et Epitomen hanc nundinarum Francofurtensium catalogo ante duos amplius annos inseruit. Commodum autem supervenit nobis typographus, quo praesente mihi correctione typi et multiplici relectione speravi me perfectiora et emendatiora omnia exhibiturum. Atqui contra bibliopola meus gravari, quod Lincolni sumtus essent faciendi et majores et importuno loco, neque tamen mihi remittere pactionem, neque juri suo de libello excutendo renunciare, factumque cunctationibus variis, ut haec solius doctrinae sphaericae editio nec inciperetur ante sesquiannum a pactione vestra et incepta ultra annum alterum traheretur, adeoque nisi partem sumtuum ipse suppeditasset operasque quam potui commodissimas (etsi meliores optavi) conduxissem, imperfecta etiamnum exstaret editio.

Non debet autem inutilis vel otiosa videri repetitio ista doctrinae sphaericae, quasi post veterum Euclidis, Arati, Cleomedis, Gemini, Procli, Theonis conceptiones, aut post recentiorum, Sabroscii nimirum et Insulatorum ejus commentatorum interque eos doctissimi et copiosissimi Christophori Clavii, Hartmanni etiam et Virdungi, Wurtslii et Peuceri, Schreckenfylli et Piccolomini, Brucelii, Wilsbemi, Maestlini et novissimi omnium Metii repetitiones, post Peurbachii, Reinholdi et Simi Theoricas, causa nulla restet, cur haec doctrina compendiarie denuo tradatur. Nam primo, etsi nihil accessisset novi

ad doctrinam veterum, tamen illam ipsam expedit a variis auctoribus tradi, cum sint ingenia discentium varia, nec eidem omnes inagistro apti discipuli, nec ilem omnibus discentibus stilus, nec eadem methodus commoda, nec ullus scriptor adeo deviat a communi more, qui non inveniat suum lectorem, iisdem secum rebus, eodem stilo gaudentem. Quoniam ego consilio non tantum tritas et necessarias definitiones, sed etiam speculationes quasdam altiores, ut methodus suadebat, commiscui, utrumque vero genus forma quaestionum et responsionum exhibui, ut neque incipientibus deesset, quod captus illorum fert, neque adulti et maturi iudicio taedium tritarum et vulgariarum definitionum nulla recreatione temperare possent, et ut speculationum difficultas interlocutionum opportunitate discenteretur. Deinde hoc etiam iudicatuus puto artifices, methodum, quam sumo secutus, passim factam esse commodiorem; quin etiam omnia nonnulla parerga huius necessaria vicissimque addita, quae ceteri nondum tradiderant, praecepta etiam calculationum astronomicarum ex novissimis Tychonis Brahe, Witichii, Birgii et Pitisci abbreviationibus, per exempla singula sic proposui, ut ad primum pene nihil aliud desit, quam circumspecta et fida imitatio typi, mutatis numeris.

Sed plures et urgentiores mihi causas refingendae doctrinae sphaericae suppeditavit philosophiae genus, quod sector; quod unico Terrae motu diurno temperato, plurimos alios motus, genuinis et propriis planetarum motibus in eodem subjecto contrarios eosque ineffabiles et insanas celeritatis e mundo tollit, unico ejusdem Terrae motu annuo omnes veterum epicyclos, coeca ratione ad Solis motum alligatos, omnes praeterea illorum eccentricos eccentricorum, omnes inclinationum, deviationum reflexionumque circulos defieit, ut in doctrina theoria dicam amplius. Indeque adeo evenit, ut quanto absurdius prima fronte quantoque creditu difficilius existit hoc de Terrae motu axioma, tanto facilius comprehensum tractatuque fiat universa astronomia, primum atque quia Terrae motum admisit.

Tantae igitur praestantiae hypothesis digna omnino est astronomorum omnium hodiernorum praepjudicio, quae et percolatur et omnibus suis membris fiat perceptu facillior. Habeat illam quisque quo vult loco, ego certe hoc illi officii me debere intelligo, ut quam intus in animo pro vera comprobavi ejusque pulchritudinem intuens incredibili voluptate perfruo, eandem etiam foras ad lectores omnibus ingenii viribus defendam. Cum autem sint, qui metuant, ne doctrina sphaerica per suppositionem motus Terrae diurni vel tradi non possit, vel omnino convellatur, eo, quod non sphaeram, sed Terram moveri asseramus, quorsum igitur opus esse sphaera aut quem ejus usum? cumque multa praeterea obijci possint in speciem, quorum non exstant passim ordinariae solutiones: illa omnia hae Epitome (quod antehac factum est nunquam) expedita dare ad me pertinere censui.

Si quia hinc me novationis cupidum arguere voluerit, id equidem in philosophia crimen sciat nullum esse; tota quippe philosophia novatio est in vetusta ignorantia. Solum id interest, gloriae an veritatis studio quid innovet. Atqui si gloriam quaerem, fortasse mihi non defuerit ingenium, comminacendi singulare quippiam, eum in hoc philosophiae genere pleraque, quae sequor, alii aliorum; non serviliter quidem descripta, sed iudicio concinnata ex diversis, ut quique veritatem in parte tueri visus est. Eum vero mihi cum multis sentire volupe est, quoties non errat multitudo; eoque id operando, ut, quod in re inest, quamplurimis persuadeam; eaque ratione cum magna multitudine sentiens jucunditate perfruar magna. Interim quod solet bonus

princeps, ante omnia pacem optare, siu autem ea potiri nequit, victoriam, idem et me recreat inter molestias a dissentiente vulgo profectas, quod plerumque post diuturna vulgarium opinionum nubila tandem solum veritatis jubar enititur, meaque, quoties a veritatis partibus pugno, tandem est victoria, quae victoria non esset, si non pugnatum esset diu admodum cum magno sudore et periculo. Permovit eadem veritas vicitque antesignanum illum astronomiae pristinae professorem, quem e media nostra Germania mutata est Roma, Christophorum Clavius, ut jam morti vicinus, cum astra, quae Galilaus detexit, errantia circa Jovem, cum Venerem in cornua tabescentem allaque nova cornet, juberet jam tandem *videre astronomos, quo pacto constituendi sint orbes coelestes, ut haec phaenomena salvari possint*, actum innuens de veteribus hypothesibus.

Denique cum S^{ae} C^{ae} M^{lis} Vestraque Procere liberalitate constitutum me veluti sacerdotem Dei Conditoris ex parte libri naturae intelligam, hunc igitur hymnum sacrum Deo Conditori (quo titulo et Galenus suos de usu partium libros condecoravit) novo carminis genere, sed ad vetustissimam et veluti primaevam Samiae philosophiae lyram attemperato pepigi, eumque V^{ris} R^{dis} et Ill^{bris} G^{bis} optimis rationibus inscriptum et additione tabellarum nonnullarum primi motus, huic provinciae peculiariter accommodatum, inter homines vulgo: quippe hoc postulavit liberalitas Vestra et mea gratitudo; huc invitarunt me crebra per hanc provinciam devota Deo collega et praeclarissimae indolis juvenus vestra, quam opto totam admiratione divinorum operum implere et amore Dei auctoris inflammare posse; huc vocarunt et exempla auctorum librorumque, dum jucunda cogitatione pensito, Peurbachium Theoricarum scriptorem hujus provinciae civem fuisse; Winshemium, sphaericarum quaestionum auctorem, libellum suum Illustribus L. Baronibus de Polheim et Wartemberga dedicasse; GG. DD. Hohelfelderos fratres, Peurbachii oppidi hodie Dominos, Tubingae sub Maestlino Praeceptore sphaericam praecipue doctrinam publicis exercitiis excoluisse, me audire et, ut verum dicam, occulto vemulatore. ⁶⁾ Et quid multis? vel hujus ipsius libelli partes non contemnendae ad auctores suos e vestra, Procere, corona viros praecipuos, ob suppeditata salubria consilia, per hanc dedicationem jure merito remittuntur. Accipite igitur, R^{di} Ill^{ae} et Gⁱ Procere, munusculum hoc, quale a me proficisci consentaneum est, quanta fieri potuit cura elaboratum, serenis frontibus et me meaque studia secundum S. Caes. Maj., quod facitis dudum, porro quoque protegit et defendite. Llneli Id. Augusti Anno Occidentalium Christianorum MDCXVII.

R. et Ill. DD. VV.

Devotus Mathematicus

Joannes Keplerus.

Comparatio Ptolemaei et Kepleri.

Quod, Ptolemaee, moves coelum flagrantisque astra,
Judice me magni nil, Ptolemaee, facis.
Res levis est coelum, levia astra, levissimas ignis
Et quicquid simili mobilitate viget.
Keplerides merito te multo major habetur,
Telluris grave qui pondus inersque movet,
Et solo hoc motu plus praestat et efficit unus.
Quam cum millenis tu, Ptolemaee, cyclis.
A pueris plumae, stipulae bullaeque rotantur,
At maria et montes qui rotat, ille vir est.

A l i u d:

Keplerides Terram volvit, Ptolemaeus Olympum,
Rem rotat iste levem, rem rotat ille gravem.
Dic uter illorum majore est dignus honore,
Germanusne gravis, Graeculus anne levis?
In dubio lis est. Tamen unica regula Juris
Kepleriden ponit nobiliore loco.
Regula quae? Numquam fieri per plura debent,
Constitui possunt quae breviori manu.

F.

Saxirupius Virginianus.

EPITOMES

Astronomiae Copernicanae

LIBER PRIMUS.

De principiis astronomiae in genere doctrinaeque sphaericae in specie.

Quid est Astronomia? Est scientia, causas tradeus eorum, quae nobis in Terra versantibus de coelo et stellis apparent temporumque vicissitudines pariunt: quibus perceptis, coeli faciem, hoc est apparentias coelestes in futurum praedicere, praeteritarumque certa tempora assignare possimus.

Unde dicta est Astronomia? Ab astrorum, id est motuum, quibus astra moventur, lege seu regimine, ut Oeconomia a regenda re domestica, Paedonomus a regendis pueris.

Quae est cognatio hujus scientiae cum ceteris? 1) Est pars physices, quia inquirat causas rerum et eventuum naturalium et quia inter ejus subjecta sunt motus corporum coelestium, et quia unus suis ejus est, conformationem aedificii mundani partiumque ejus indagare.

2) Geographiae et hydrographiae seu rei nauticae anima est astronomia. Quae enim diversis terrarum oceanique locis et plagis diversa coelitus eveniunt, ex sola astronomia dijudicantur.

3) Subordinatam habet chronologiam, quia motus coelestes disponunt tempora annosque politicos et signant historias.

4) Subordinatam habet meteorologiam. Astra enim movent et incitant naturam sublunarem et homines ipsos quodammodo.

5) Comploctitur magnam partem optices, quia commune cum ipsa subjectum habet, lucem corporum coelestium, et quia multas visus deceptiones circa mundi motuumque formas detegit.

6) Subest tamen generi mathematicarum disciplinarum, et geometria atque arithmetica pro duabus aliis utitur, quantitates et figuras considerans corporum motuumque mundanorum, et tempora dinumerans, perque haec demonstrationes suas expediens et totam speculationem ad usum seu praxin deducens.

Quotuplex est igitur astronomi cura munusque? Partes muneris astronomici potissimum quinque sunt: historica de observationibus, optica de hypothesebus, physica de causis hypothesium, arithmetica de tabulis et calculo, mechanica de instrumentis.

Quomodo inter se differunt? Etsi nulla earum potest carere demonstrationibus geometricis, quae ad theoriam faciunt, numerisque, qui ad praxin.

cum sint quidam quasi sermo geometrarum, tres tamen priores magis ad theoriam pertinent, duae ultimae magis ad praxin.

De Observationibus.

Describe mihi primam earum historicam. Historica conscribit initio, quales nobis apparent mundi facies, quidque in ea diutius mutetur, quid annuatim aut per longiores temporum elapsus, quae diversis terrae marisque locis appareant diversa, quae eadem. Et rariores quidem sen notabiliores eventus, ut sunt eclipses Solis et Lunae conjunctionesque insignes, depromit ex monumentis historicis, subtiliores vero stellarum singularum observationes ex libris artificum fide dignorum, ex Hipparcho, Ptolemaeo, Albategnio, Arzachel et aliis, quos bi allegant, depromtas in unum colligit, addens etiam illa, quae praesens aetas observavit, quo in munere prae omnibus aliis incredibili diligentia versatus est Tycho Brahe, relictis 38 annorum propriis observationibus copiosissimis, pene continuis, fide digulissimis.

Observationes igitur huiusmodi debent artificiose inter se comparari, inque certas classes, per certos temporum circumactus disponi, ut similes similibus coaptentur, eo fere modo, quo Aristoteles, naturam explicaturus animalium, primo condidit historiam animalium artificiosissimam, summam recensens de omnibus speciebus, sub eodem genere constitutis, quae illis erant communia.

De Hypothesibus.

Describe etiam secundam partem astronomici muneris. Secunda pars optica, consideratis his observationum varietatibus, et diversarum convenientia in quibusdam, ad causas penetrare nititur, quibus efficiatur, ut oculis hominum species longe diversissimae a vero oboriantur, quas species astronomi appellant apparentias, Graece *φαντασμα*. Ubi ut quisque pollet ingenio, ita plurimas apparentiarum diversitates salvat et efficit per nam aliquam sibi perperuo similem motuum formam aut figuram corporum, demonstrationis suae methodum omnem accommodans legibus et theorematibus quae geometrieis quae opticeis, quae geometriae subordinata est, fitque ut ad ipsam rerum naturam, excogitandis huiusmodi formis motuum, alius alio propius perveniat. Itaque cum in hac diffeili et caeca causarum captatione contingat naturae consultis, aberrare a vero in nonnullis opinionum suarum membris, nec eo minus tamen per illas salvent apparentias coelestes, usus obtinuit, ut opinionem cuiusque ex celebrioribus artificibus, quae causas explicat apparentiarum coelestium, hypotheses appellemus, quia dicere solet astronomus, hoc vel illa posito vel supposito (*ὑποκείμενον*), quod ipse de mundo affirmat, sequi necessitate demonstrationum geometricarum, ut apparuerint illa tam multa, quae insunt in consignatione historica praedicta, quodque suo tempore.

Ita hodie tres feruntur hypothesium formae, Ptolemaei, Copernici et Tychoonis Brahe.

Pertinet autem communiter ad has duas priores partes etiam contemplatio naturae et proprietatum lucis, seu praxis doctrinae de refractionibus.

De causis hypothesium.

Quaenam est tertia pars astronomici muneris? Tertia pars physica vulgo non censetur necessaria astronomo, cum tamen vel maxime pertineat

ad finem hujus partis philosophiae, nec uisi ab astronomo possit absolvi. Non enim mera debet esse licentia astronomis, fingendi quidlibet sine ratione, quin oportet ut etiam causas reddere possis probabiles hypotheseum tuarum, quas pro veris apparentiarum causis venditas, et sic astronomiae tuae principia primum in altiori scientis, puta physica vel metaphysica, stabilias, non interclusus tamen nec ab iis argumentis geometricis, physicis vel metaphysicis, quae tibi suppeditantur ab ipsa diexodo disciplinae propriae saper rebus, ad altiores illas disciplinas pertinentibus, dammodo nullam principii petitionem admisceas. Hoc enim pacto fit, ut astronomus (compos factus hactenus propositi sui, ut causas motuum excogitaverit rationi consentaneas et aptas ad efficienda omnia, quae habet observationum historia) jam in unum aspectum adducat, quae particulatim antea statuerat, et dissimulato fine hactenus proposito (qui erat demonstratio phaenomenon et inde redundans in vitam communem utilitas) altiorem ipse finem summa cum gratulatione philosophantium affectet, ad illum finem omnia sua placita, rursam qua geometricis, qua physicis argumentis referat, scilicet ut genuinam formam et dispositionem seu exornationem totius mundi ponat ob oculos. Adeoque hic est ipsissimus liber naturae, in quo Deus conditor suam essentiam suamque voluntatem erga hominem ex parte, et ἀλλοῶν quodam scriptiois genere propalavit atque depinxit.

De tabulis.

Quid quarto loco agit astronomus? Quarta et quinta partes ad inferiorem illum finem referuntur, nempe ad utilitatem in vita communi. Quarta enim, quam arithmetica appellavi, causas motuum inventas numeris applicat, docens methodum, qua ad quodlibet tempus seu praeteritum seu futurum apparens coeli facies et configuratio siderum computetur. Hae nascuntur Tabulae Astronomicae, quibus methodus jam dicta facilius et brevior efficitur; quare Graeci eas appellant *Κατοχὰς προχρημάτων*, cujusmodi sunt Tabulae Ptolemaei, quas emendarunt ante 400 annos Tabulae Alphonsi, et ante 80 tabulae Copernici, quas Reinholdus exactiores copiosioresque factas appellavit Prutenicas. Omnibus vero antecessorum tabulis, cum erroneae sint, colophonem imponere pollicentur Tabulae Rudolphinae, sic iadigetatae a Tycho et Braheo affectaeque, quae nunc lucem expectant.

Haec igitur pars suppeditat chronologiam, astrologiam, meteoroscopiam, medicinam, nauticam, agricolam, principia ad artem cuique suam necessaria.

De instrumentis, sphaera materiali et theoriis.

Enarra etiam quintam muneris astronomici partem. Quinta pars mechanica idem tibi praestat instrumentis, quod quarta numeris, estque multiplex. Nam primo famulatur parti historicae, quia ut observationes, quae sunt astronomiae fundamenta, sint exquisitae subtilitatisque sufficientis, oculi sunt instrumentis adiuvandi, quibus et certius collineant, et sine hallucinatione minutiusque numerent; in hoc itaque genere extat liber Tycho Brahe, Astronomiae restauratae Mechanica dictus, magnam copiam exhibens exquisitissimorum instrumentorum, quorum apparatus fidem summam conciliat observationibus per illa habitis et a Braheo conscriptis.

Jam vero quod attinet partes subsequentes, aut exempla faciendi sunt ex materia lignea, metallica, chartacea et similibus, quibus hypotheseos astrono-

micas exprimamus et ob oculos ponamus, ad docendos imperitos et tirones, aut ad sublevandum computationis laborem, quo in censu sunt sphaera materialis et theoriae: aut oblectamenta paramus pro magnatibus aut locupletibus, quorum conducunt automata coelestia, coelum ipsum quadamtenus imitautia motu artificioso sibi iudito, quibus interdum praeter uadam delectationem sua etiam constat utilitas, coelo praesertim iubilo; aut rursus observatoria condimus instrumenta, primo dictis cognata, sed usus communis et popularis causa. Huc infinita varietas instrumentorum est orta, certantibus mechanicis manuum sollertia cum geometrarum demonstrationibus ingenuissimis. Praecipua tamen in hoc conveniunt, quod cum motus et apparatus coelestes sint sphaericae, curvilineae, nobis vero terrarum incollis substrata sit facies horizontis plana, parietesque sint ad ejus perpendiculum erecti, corpora denique, quae manibus tractamus, aut planitiebus terminentur meris, aut mixtis saltem ex recto et curvo, instrumenta igitur nobis illa tractatu faciliora sunt, in quibus curvum in rectum est immutatum, cujusmodi sunt e primariis regulae circuli divisionibus exculptae, quadrata geometrica dictae, astrolabia, et propter aedificiorum planos parietes, scisterica, instrumentum usum obtinens latissime terra marique patentem, quo vix carere amplius humana vita potest.

Haec utilitas praecipue famulatur geographiae et rei nauticae, quia chartae geographicae habent circulos coelestes in planum projectos.

Ad quam partem potissimum refertur libellus iste? Nulla est harum quinque partium, quam non delibet ista Epitome. Nam summaria ratione percurrit varietatem apparentiarum coelestium, et ut earum causae reddi possint, explicat hypotheses, potissimum Copernici, sed et Tychonis Brahe, per figuras et instrumenta idonea, sphaeram et theorias; disputationes physicas et metaphysicas de earum veritate interscit, mundi universi ideam interiorum ob oculos ponit, terminos artis, circulos, arcus, lineas, angulos, quibus utendum est in astronomia, describit definitque; doctrinam de eclipsibus Solis et Lunae deque configurationibus planetarum inter se et cum luminariis (in quibus efficacia consistit planetarum in haec inferiora) proponit; formam docet calculi, quo cum tabulae Rudolphinae, tum ipsi planetarum situs sine tabulis, leges denique construendorum instrumentorum computatae sunt aut computari possunt.

Quia igitur initium faciendum est ab apparentiis, explica qualis videatur esse mundus. Mundus vulgo putatur, oculis praecedentibus, esse aedificium ingens, dusbus potissimis constans partibus, Coelo et Terra.

De Terrae figura quid sentiunt homines? Videtur Terra latissima planitie circulariter excurrere in omnes plagas circa spectatorem, unde Homero *κύκλον οὐρανὸν ἵκεν* dicitur. Et ab hac planitie in circulum laxissimum exporrecta defluxit appellatio Orbis Terrarum, usurpata tam in Sacris literis quam apud nationes ceteras.

Quodnam putant esse orbis Terrae medietatem? Quaelibet natio, si non fuerit imbuta orbis notitia, naturae visusque instinctu putat, suam patriam esse in centro seu medio huius plani circuli. Credunt id adhuc hodie vulgus Iudaeorum, Ierosolymas, gentis suae pristinae patriam, sitam esse in medio mundi.

De aquis vero quid videtur hominibus? Quia hominibus quam possunt longissime Terra progredientibus tandem occurrit oceanus, ideo quidam putant, Terram instar disci innatare aquis, aquas vero contineri parte inferiore coeli

ceu vase, unde poetae oceanum faciunt patrem rerum. Alii contra extra oceanum terris circumfusus alium concipiant terrae limbum, qui contineat oceanum ne effluat, iidemque et substernunt ei terram eadem de causa, diceutes, aquas sustineri a terris. Praeter hos sunt et tertii, quibus cum oceanus videatur altior esse terris, si quis inspiciat illum ex litoribus, ideo illis existimatur terra quasi demissa inter aquas fundari et custodiri a Dei omnipotentia supernaturaliter, ne imminentes ex alto aquae revértantur operire eam. 7)

Quid vero putant vulgo subterni utrique rei, Terrae sc. et Aquae? Cogitantibus hominibus de fundamento, cui tanta terrarum moles innitatur, adeo ut tot jam saeculis firma et immobilis stet nec deorsum labascatur, multa offunditur caligo, sicutque et inter priscos philosophos Heraclitus, et inter ecclesiasticos scriptores Lactantius, qui dicereut, illam insuflitis radicibus deorsum extendi.

Quid tandem de altera mundi parte, sc. de coelo ejusque magnitudine? Coelum existimant homines non multo majus esse terrarum orbe, quippe circulo extremo terris et oceano connexum, ita ut terminet terras, progredientibusque eo usque, si fieri posset, esse occurrentia extrema coeli, impediencia progressum ulteriorem. Ad quam hominum imaginationem se accommodat etiam scriptura: *Si fueritis dispersi usque ad extrema coeli, inde vos recoligam. Ab extremitate egressio ejus, et occurrentia ejus usque ad extremitatem ejus.* (Ps. 19.)

Itaque poetae Atlautem montem, in extremo Africae litore altissimum, dixerunt humeris portare coelum, et Homerus Aethiopas collocat ad extremitates ortus et occasus, existimans, Solem ob hanc coeli et Terrae contiguitatem adeo propinquum ipsis fieri, ut eorum cutem adurat.

Quam putant esse coelo figuram? Oculi adscribunt coelo figuram tentorii, super nostra capita superque Solem, Lunam et stellas expansi, seu potius figuram forniciis, terrenae planitiei inuiteutis, arcu leniter arduo: sic ut pars coeli supra verticem sit multo propior spectatori, quam partes montibus contiguae.

Quid super motu concipiunt homines? Coelum moveaturne an quiescat, visu non discernitur, quippe ejus substantiae tenuitas effugit oculos, nisi quod, quae nullam oculis varietatem obijciunt, quiescere videntur. Solis, Lunae stellarumque alii atque alii situs ad extremitates Terrarum aspectabiles incurrunt in oculos. Etenim videtur Sol nisu quodam inter coelum et montes oceanumve immobiles emergere et quasi e thalamo exire, eodemque modo coeli forniceum emensus in opposita plaga sese rursum condere, sic etiam Luna, planetae totusque reliquis stellarum exercitus, quasi procederent instructa et bene custodita acie, prior haec, illa posterior discedens, quaelibet suo ordine.

Itaque cum post ultimas terras occurrat oceanus, vulgus hominum putat, Solem in oceanum immergi extinguique et quotidie in opposita parte ex oceano exire novum. Hoc igitur imitantur poetae suis fictionibus. Quin et philosophi quidam prodiderunt, in ultimis Lusitaniae litoribus exaudiri stridorem oceani, flammam Solis exstinguentis, ut Strabo commemorat.

De magnitudine astrorum quid statuit vulgus? Non eadem semper putatur esse eorum magnitudo. Sol enim, cum oritur aut cum occidit, ingens apparet, itaque in egressione et principio cursus comparatur Giganti (Ps. 19). Sic Luna, cum pleno vultu oritur, magni vasie orbem seu fundum aequare videtur. Proplus verticem ubi fuerint Sol et Luna, humani fere vultus latitudinem prae se ferunt, inter se aequales et disci plani circularis figura. Sic

et constellationum seu asterismorum amplitudo immanis videtur juxta montes, adeo ut vix agnoscantur, postquam in altum emererint, prae contentibili angustia.

De Orione Virgilius *quam magnus Orion,*

Cum pedes incedit mediis per maxima Nerei

Stagna viam scindens, humero supereminet undas.

Stellarum vero singularum corpuscula punctorum iustar habentur. Differunt tamen claritate et amplitudine diffusi luminis inter se et in mutationibus aurae a se ipsis singulae; quaedam et celerissime trajicere inque terram cadere videntur.

Qui vero diligentius quam vulgus hominum ista observant, quid praeterea oculis deprehendunt in sideribus notabile? Primum facile est discernere inter stellas adulterinas et veras. Illae enim sunt momentaneae nec videntur illo in loco unde ruunt, antequam incipiant trajicere, nec postquam trajectio desit, illo loco videntur amplius, ad quem pervenerunt, eum e contra verae stellae sint percunctae. Est etiam motus ille trajectionis celerissimus, eoque dissimilis motuum ceterorum, qui non ita in oculos incurrunt. Ex qua motus celeritate recte colligimus, illas non inter veras stellas in aethere, sed in infima mundi regione incendi exstinguique; itaque nomen illis damus stellae trajicientes aut stollae cadentes, exclusasque ab astronomia, ut quae legem motus nullam habent, ad physicam transmittimus.

Deinde inter illas etiam, quae ad sensum durabiles sunt, deprehensum est hoc discrimen, quod earum potissima pars eundem perpetuo ordinem inter se mutuo tuentur eoque sic servato oriuntur et occidunt quotidie isdem in locis intra unius seculi spatium, paucae vero aliae, hoc est quinque et sexta Luna ipseque Sol septimus, et si ipsae cum prioribus quotidie oriuntur et occidunt, comparatione tamen plurium dierum deprehenduntur non tueri situm eandem neque inter se, neque ad priores illas, nec isdem semper in locis horis orientur et occidunt. Itaque illae fixae dicuntur, hae erraticae sive planetae.

In utroque genere se rursum admiscet adulteriuo nonnullae, inter planetas stellae crinitae, vulgo cometae, inter fixas stellae adeo similes ceteris, ut vix a peritissimis astronomis internoscantur. Discernuntur tamen eo, quod tandem et ipsae disparent et, ne videantur condi revertit ut ceterae, nullam habent apparitionis suae regulam, nullum ordinem, et rarissime post multorum annorum adeoque seculorum intervalla conspiciuntur. Hae quia regularitatem aliquam motus prae se ferunt et regionibus non distinguuntur a veris stellis, et tamen intereunt oriunturque, ut trajectiones, aequo jure ad physicam et ad astronomiam pertinent.

Tertio ad hoc discrimen stellarum in motu consequitur etiam discrimen in luminis claritate. Sol enim diem, Luna noctem lumine suo temperant umbrasque causantur. Ceteri errantes etiam clarum et fulgidum et plenum habent lumen ut plurimum, et evidens, quodque etiam in clara aurora apparet, fixis tunc latentibus. Cometae vero sua barba, crine seu cauda, fixae novae nonnullae inter initia luminis insolenti claritate a peregrinis internoscuntur.

Quarto et magnitudine superant planetae fixas plerumque.

Quinto nec ita scintillant planetae ut fixae, sed vel plane nihil, vel parum, vel alio et differenti modo, qui facile discerni possit.

Sexto nec custodiunt planetae eandem semper visibilem magnitudinem ut fixae. Solis quidem et Lunae diametri deprehenduntur per subtilia instrumenta

augescere et minui: Luna Venusque etiam vultum mutant, ceteri quinque in Sois opposito amplissimum circumfundunt lumen et maximi apparent, aliis temporibus minores.

Velim clarius explices discrimen hoc motus fixarum a motu planetarum, ut id incurrit in oculos. Cum fixa quaelibet intra unius hominis aetatem quotidie eodem tractu Terrae faciem transeat, planetas contra inter-dum humili et brevi arcu transeunt, mox prolixo et vertici propinquo, puncta ortuum et occasuum notabiliter permutantes.

Haec vicissitudo primum in Sole est valde conspicua, quem Venus et Mercurius perpetuo comitantur. Nam Sol aestate vultum ad meridiem vertentibus a sinistris et a tergo oritur, pervadit altissime et c. sublimi terras ferit aeternumque excitat et diem producit, ad dexteram vero rursum post tergum conditur; hieme omnia sunt contraria, et potest immota facie tam ortus quam occasus ejus conspici. Hanc vicissitudinem Luna patitur mense suo spatio, Mars biennio, Jupiter duodecim annis, Saturnus triginta.

Quot sunt igitur genera motuum astronomo considerata? Duo. Primus et secundus.

Quid appellantur motum primum? Motum quotidianum, Graece *πυρρὸς πορ*, qui nobis facit sidera fixa, planetas, Lunam et Solem, adeoque et si quid aliud in coelo est, oriri ab una plaga horizontis et in opposita occidere: qui motus nobis in hac parte mundi, vultum ad orientem convertentibus, est ab ortu ad dexteram. Per hunc motum solitarium, si non intercurrat motus secundus, stella quaelibet diebus singulis uno et eodem horizontis puncto oriri et ad eandem semper altitudinem supra planitiem horizontis aspectabilem eniti potest, rursumque uno et eodem puncto horizontis decumbit.

Quos appellantur motus secundos? Motus illos singulorum planetarum proprios et tardiores, qui efficiunt, ut planetae non singulis diebus ab eodem horizontis puncto oriantur et occidant ut fixae, nec semper, ad medium coeli pervenientes, eandem assequantur altitudinem, nec situm eundem vel inter se vel ad fixas retineant.

Atque hi motus nobis in hac mundi parte, vultum ad occidentem vertentibus, sunt ab occasu versus sinistras. Fiunt, inquam, etsi non ita sint obvii oculis ut primus, qui solus se insinuat experientiae hominum rudi et contemplationem secundorum turbat, abripiens secunda mobilia secum. Intelliguntur autem secundi sic fieri, si mente abstrahas primum et plurium dierum observationes vespertinas inter se compares.

Quot sunt ergo partes astronomiae? Duae. Doctrina sphaerica et doctrina theorica.

Unde denominantur? Sphaerica dicitur ab istrumento, sphaera scilicet armillari, quo utitur ad explicandum motum primum. Theorica vero a theoriis: sic dicuntur istrumenta plana, quibus utimur ad explicandos motus secundos.

Quot libris tota Epitome constat? Septem. Tribus de doctrina sphaerica, tribus aliis de doctrina theorica, et uno de utraque conjunctim, seu de motu octavae sphaerae.

Recense argumenta librorum de doctrina sphaerica. Primus hic post generalia hactenus explicata deinceps habet principia, quibus doctrina sphaerica a Copernico fuit tradita, eorumque comprobationes et contrariorum argumentorum dissolutiones. Secundus explicat originem causasque et divisiones circulorum partiumque aliarum sphaerae, quo istrumento doctrina sphaerica doceri debet. Tertius ipsam doctrinam sphaericam per partes tradit.

Dic argumenta sequentium ad theoricam doctrinam pertinentium. Doctrinae theoricæ ad methodum doctrinae sphaericæ sunt itidem tres libri facti; quartus, quintus et sextus.

Quartus enim habet principia, quibus Copernicus doctrinam theoricam tradidit, totius mundi dispositionem et partes internas partiumque motus recensens et comprobans objectionesque diluens. Quintus originem causasque circulatorum eccentricorum in theoriis proponit, quod his figuris opus habeamus ad expediendam doctrinam theoricam, ubi veri planetarum motus forma generaliter explicatur. Sextus ipsam doctrinam theoricam de motibus planetarum apparentibus primum singulorum seorsim, deinde et inter se comparatorum, expedit.

Quæ sunt partes hujus libri primi residui, de principiis doctrinae sphaericæ? Quatuor. Prima est de figura et magnitudine terræ et oceani deque ratione ejus dimetlendi. Secunda de fixarum extrema sphaera ejusque et stellarum figuris. Tertia de natura et altitudine aëris, terris et oceano circumfusi, et aurne per totum aetherem diffusæ, deque utriusque differentia. Quarta de loco Telluris in interiore complexu sphaeræ fixarum. Quinta de *δυναμις*, turbinatione seu convolutione globi Telluris, æquabili circa axem immobilem.

PRINCIPIORUM DOCTRINAE SPHAERICAЕ.

PARS PRIMA.

DE FIGURA TERRAE EJUSQUE MAGNITUDE ET DIMETIENDI RATIONE.

Quomodo vero ordo coeli nosci et rationes ejus in Terra pandi possunt? Si prius vera figura Telluris adeoque totius mundi investigetur.

An igitur Terra non est plana, aut infinita radice deorsum extensa, ut vulgo videtur? Imo corpus ex terris et aquis junctim constans undique a coelo abruptum inque se ipsum conversum est, denique rotundum undique, forma pilae, globi, seu sphaerae regularis; quod tam ex partibus singulis, quam ex ipsius totius constitutione probari potest.

Proba de partibus superficiei aquae, quod gibbam figuram prae se ferant. De partibus aquae superficiei, hoc est de maribus, quod curventur in arcum, docemur experimentis nauticis. Cum enim in alto pelago versantibus nihil appareat, nisi coelum et undae, circulo perfecte plano circumfusae, continentium vero et insularum non admodum remotarum montana etiam altissima lateant, quasi demersa sub undas complanatas: fit ut progressis navigando montes illi ex undis emergere subitoque sese attollere videantur in evidentem altitudinem.

Sit mons D, locus primus A, ejus visus seu horizon BC, linea recta tangens undas in A. Haec linea, continuata versus C, transiit supra D, sic ut D ex A videri non possit. Fiat jam progressio ex A in E, ut loci E visus seu horizon sit ED recta, tangens aquas in E, quae continuata incidit in montem D, sic ut quicquid hujus eminent supra FD, id omne videri possit ex E.

At si superficies aquae vere esset in meram extensa planitiem, nullus mons super illam sese attollens visum in ea constitutum penitus lateret, nisi immenso intervallo recedentibus figura montis ipsa cum magnitudine parlatim evanesceret; vicissim accedentibus nequaquam subito et post breve interval- lum apparerent montes, antea non visi; sed opus esset ad hoc immensis itineribus.

Fig. 12.



Ut si superficies aquae esset extensa per lineam rectam DF in immensum superque eam emineret mons D, quia eadem linea DF esset etiam linea visus, semper in montem D incidens, sive in E esset oculus sive in F sive in quocunque alio hujus lineae puncto remotissimo.

Deinde naves aut montes primum videntur ab apice mali, quando ab ejus pede videri nondum possunt, etiam cum nullis omnino fluctibus asperantur undae; solo tumoris eorum objectu.

Proba de tota aquae superficie. De tota experientia hodierna idem docuit, caso nimirum consummatum, id est undique in se conversum globum. Ferdinandus Magellinus ex Hispania solvens versus oceanum navigavit, inventoque freto penetravit ex Atlantico oceano in Eoium adque Moleceas apulit; unde solvens una navis continuo et directo (nequaquam vero converso) eursu, semper versus occasum, per oceanum Indicum et Atlanticum, velut ex oriente reversa est domum, unde exierat.

Apparet ergo, superficiem aquae et terrae in se ipsam redire circulo circumductam, neque coelo connatam adhaerere.

De aqua quidem ista, sed an et in continentes eadem sequuntur? Cum oceanus sit terris interfusus ab oriente in occidentem rursusque in orientem, ejusque duo ingentia aequora duobus fretis confluant, altero nobis ad occidentem, quod fretum Magellanicum appellatur, altero ad orientem, inter novam Guineam et Moleceas: Terra igitur dividitur ab oceano in partem septentrionalem cognitam, et australem ignotam, quam similiter Magellanicam dicimus.

Rursum oceanus terram septentrionalem post Tartariam interfluit, dividens eam in duas continentes, antiquam et novam, quam Americam dicimus; oceanus igitur tres Terrae continentes, veluti tres ingentes insulas circumfnit.

Tertio continentes istae etiam sunt amplissimae, tamen oceanus se his per partes insinuat, ut quasi in peninsulas dividantur, vix angustissimis isthmis cohaerentes. Hoc modo America in partem australem et septentrionalem (quarum illa Peruana dicta est, haec nova Hispania) quasi direuta est; antiquitus vero nota continens in Europam, Africam et Asiam, maribus Mediterranco, Ionio, ponto Euxino et Rubro, quae sunt quasi sinus unius et ejusdem oceanus. Ergo nuppiam Terrarum valde procul abest unius et continui oceanus sinus.

Hisce sic habentibus perpende, maria, qua inter se proxime coeunt, isthmis intercedentibus, experientia teste eandem obtinere propemodum altitudinem et sic omnia litora cirenmeire. Deinde perpende, origines fluminum, quae in haec maria se exonerant, plerumque in altissimis esse intimarum continentium montibus. Plerumque etiam plurium fluviorum, in diversissimas plagas defluentium, fontes inter se proximi sunt, modico montis jugo intercedente. Itaque nulla Terrae pars multo est altior summis fluminum fontibus. Si ergo fontes non multo sunt altiores litoribus, vertices quoque montium altissimorum non multo superabunt eandem litorum ipsiusque adeo maris undique circumfusi altitudinem.

Quomodo probas, fontes fluminum non esse multo altiores litoribus maris? Primum notant hydragogi, non sine periculo navigari fluvium; cujus libramentum in ducentis passibus uno passu deprimatur. Jam vero pleraque maxima totius orbis flumina navigabilia sunt; nullum igitur eorum est, quod per ducenta milliaria sui cursus uno milliari subsidat. Deinde perpendatur, fluvios totius orbis maximos et qui plurimum Terrarum emetuntur, potiori

cursum parte stagnare lentissimosque incedere, et fere tantum protrudi a subeunte aquarum agmine; sic Ganges, sic Nilus per totam Aegyptum, sic Danubius per Ungariam et Thraciam fere totam usque in pontum Euxinum. Litorum vero, intra quae stagnant flumina, uniformis nec deversa est altitudo. Quod sicubi pernici lapsu provolvuntur, id non longius durat, quam quoad angusta et aspera rupibusque utrinque stipata loca fuerint egressi.

Hinc consequitur, haud facile reperiri fluvium, cujus fontes uno militari Germanico eleventur super maris superficiem, etsi ille tractum vel mille miliarium emetiatur.

Demonstratum est, superficiem aquae gibbam esse, nec superficiem Terrarum multo aliam affectare figuram, quam aquas; quomodo vero probatur, figuram hanc omnino rotundam esse, cum gibbae figurae multae sint: ovalis, cylindrica, torosa, strumosa et similes? Conceditur sane de superficie Terrae, quod non sit perfectissime rotunda, sed extuberet in montes passim; de aquis vero oceani, cum tranquillae sunt, probatur omnimoda rotunditas, argumentis tam a natura, quam a sensu deductis.

Dic argumentum a natura. Videmus corpori terrae et aquae inesse vim corpoream, unendi sibi corpora quaecunque attrahendique, quam vim vulgo gravitatem dicunt. Cum ergo totus hic globus Telluris undique circumfluatur aquis, materia fluida seque ipsam ad latera non terminante, nec sit improbabile, Terram etiam interius tubis ingentibus esse commeneabilem undique, adeoque Terra forte sit instar ollae pertusae, constans continentibus seu testis, intus aqua refertis: profecto partes omnes aquae circumcirca nequibunt aliam totius constituere figuram, quam rotundam, quia vis unendi in aquis, non impedita neque a se neque a terra, figuram efficit maxime unam, ejusmodi rotunda est, nihil habens extra se, unde fit, ut nulla aquarum eminentia supra rotunditatem, nullus oceani fluctus diu suspensus permaneat in cumulo: diffunditur enim ad omnimodam aequabilitatem constituentem ceduntque ad latus undae defluentique locum dant, expulsae quippe a majori poudere defluentium.

Num non eadem etiam de natura Terrae dici possent? Equidem Terra, cum primum fuit a Deo creata, aut et ipsa fluida quaedam et mollis massa fuit posteriusque induruit, et tunc eadem vera sunt etiam de terra, quae de aquis sunt dicta; aut creata est in sua soliditate et duritie primaeva, et tunc ne sic quidem verisimile est, aliam illi figuram inditam, quam acceptura fuit a se ipsa, si mollis initio fuisset. Nam etsi dura est, corpus tamen sive materia est ut aqua, et humore macerata aut igne liquata fluida per partes effici potest, ut aqua. Par igitur est, ut etiam fluidae materiae propriam acceperit figuram, hoc est rotundam.

Cur ergo Terra non perfecte rotunda est ut oceanus? Sapientissimus conditor inter naturam materiae interque usum animantium, cujus causa etiam dura Terra facta fuit, figuram ejus consultiissima proportione distribuit, ut montes nonnihil quidem eleventur, perpetuis aquis fundendis, deprimerenturque valles recipiendis, ad sensum vero, quando tota sphaera cum suis eminentiis simul in conspectum venit, nihil perfectae rotunditati decedere videretur.

Dic argumentum a sensu, pro perfecta rotunditate oceani. Quando visu seu capite ad superficiem undarum admoto signum aliquod conspicitur emicans, primum e mari velut emergeus, ut vexillum navis alterius aut pila turris, ubicunque id accidat in tota oceani superficie, jam statim scitur, tan-

quam ex regula universali per omnia loca maris valente, proportio distantiae rei conspectae ad ejus altitudinem.

Verbi causa in mari tranquillo signum

In altitudine		videtur a milliari	
pedum	vel passuum	Italice	Germanico.
1		1	
3		2	
6	1	3	
11	2	4	1
18	4	5	
26	5	6	
36	7	7	
47	9	8	2
59	12	9	
73	15	10	
	21	12	3
	37	16	4
	59	20	5
	84	24	6
	114	28	7
	131	30	
	149	32	8
	189	36	9
	233	40	10
	364	60	
	524	60	15
	932	80	20
	2097	120	30
	3729	160	40
	4721	180	45

Et vicissim, si visus hanc obtineat altitudinem, videre poterit signum natans in superficie maris, tantae distantiae, si modo id etiam satis fuerit magnum.

Quodsi tam nostras navis speculator, quam signum in navi adversa hisdem altitudinibus fuerint elevati, puta uterque passibus 15, videri poterit res a duplo intervallo, sc. a 20 Italicis seu 5 Germanicis milliaribus. Et si mons alienjus insulae surrexit in altum nongentesima parte semidiametri Terrae: quocunque in oceano fuerit, spectari inelipet a quadragesimo milliari Germanico ex maris superficie, ab octogesimo ex alio monte ejusdem altitudinis.

Haec igitur sensu deprehensa per omnem maris ambitum aequalitas oceani rotunditatem omnimodam non valde imperfecte arguit.

Quae habes a sensu argumenta pro rotunditate Terrae totiusque adeo globi ex terris et aqua constantis? Primum si ponat astronomus; Terram esse rotundam, nec diversis, pro diversitate montium et convallium, sed eadem ubique diametro Terrae utatur in computationibus geometricis: exire solet illi operatio in tales summas, quae sunt consentaneae experientiae astronomicae, hoc est, sequuntur phaenomena coelestia. Non sequerentur autem, si hoc ille quidem faceret, Terra vero diversas et ad sensum differentes haberet diametros, hoc est si rotunda non esset.

Deinde quoties progredimur seu terra seu mari, aequalibus spatii itinerariis, recta ad septentriones, toties aequalia in astronomia deprehendimus incrementa vel decrementa altitudinum Solis et stellarum in meridie; quoties iterum sub uno et eodem parallelo (de quibus libro III.) provehinur aequalibus intervallis itinerariis in ortum vel occasum, toties numeramus aequaliter plures vel pauciores horas et minuta in principiis vel finibus eclipsium Lu-

narum. At nisi Terra rotunda esset, aequalis ista proportio locum non haberet. Terra ergo rotunda est tam in septentrionem et meridiem, quam in ortum et occasum.

Denique patet ad oculum citra longam ratiocinationem, terminos umbrae terrestris in corpore Lunae deficientis, tam qui sunt ad septentriones, quam qui ad austrum, tam ad orientem, quam ad occidentem, esse arcus perfecti circuli. Corpus autem, cujus in rotundo Sole positi umbra circulo circumscribitur, circulare sit necesse est illo tractu, unde descendit umbra, ut docet optica. Cum igitur successu temporis multisque Lunaribus eclipsibus contingebat omnes corporis Terrae limites tales projiciant umbras, undiqueque igitur Terra rotunda est ad sensum.

Quid si Terra ingentes aliquas habeat eminentias, quas, licet umbra et astronomia non facile delegat, ipse tamen sensus, si Terram totam uno intuitu liceret lustrare, facile detecturus fuerit? Negat hoc tam natura aquae, quam experientia. Nam primo, si corpus Terrae notabiles haberet angulos seu eminentias per totam corporis longitudinem vel latitudinem ductas, oceanus non circumfunderetur circuli forma, sed interruptus nudas destitueret illas eminentias, et sic non oceanus continuus terras, sed terra continua cingeret maria; non potuisset igitur Terrae globus ab ortu in occasum aut vicissim circumnavigari, quod factum legimus hoc seculo non semel.

Deinde si quis conscendat altissimos montes omnium continentium exque his circumspiciat, adeoque et instrumento metiatur omne libramentum horizontis terreni circumcirca: siquidem mons talis omnium vicinorum altissimus, deprehendet observator ex eo depressionem quidem aliquam totius horizontis infra libramentum aquae seu basin perpendiculi, tanto majorem quavis parte finitoris, quanto remotiores ibi spectati fuerint montes ceteri, nusquam vero depressionem animadvertet majorem duobus gradibus; tanta enim est, cum prospectus est in mare ex altitudine dimidii milliaris magni, quod paucissimis locis et nescio an ullibi, nisi forte in Chilensi regione, totius Peruviae occidentalisima, contingere potest. Montana enim tantae altitudinis plerumque sunt recondita in continentes medias, unde in litora et oceanum prospectus non est.

Patet igitur, circulos extremos terrae aspectabilis, ubique locorum ex editis montibus visul circumjectos, apparere quam proxime planos.

At si Terra haberet alicubi notabiles eminentias, easque non unius tantum aut alterius montis; sed totius vicinae continentis, oporteret ex edito jingo illius eminentiae horizontem aliqua sui parte notabiliter debiscere seu subsidere. Denique nulloque locorum institueretur dimensio globi Terrae sine ope coeli, de qua mox, dummodo distantia binorum locorum ad opus requisitorum in eadem semper dimensione sit nota, semper prodit eadem proxime semidiametros globi Telluris; quod est argumento, nullam Telluris partem prae reliquis insigni aliqua quantitate in altum erigi.

Semper tu hoc usurpas, aquas esse profundiores litoribus, at vulgo videntur altiores his. Non sunt altiores, sed fallitur hic aestimatio sensitiva, ut docent optici. At si stans in litore metiaris instrumento libramentum undarum, etiam aquas omnium extremas visus assequitur, nequaquam in his elevationem, sed semper exignam aliquam declivitatem deprehendes, apparebitque non liminare terris nudas, sed infra illas subsidere.

Explica causas hujus erroris in aestimando. Visus partes maris extremas inspicit oculis elevatioribus, quam vicinas; quodsi partes illae extremae

in his altioribus radiis visibis fierent viciniores, redderentur omnino et altiores. At putamus illas esse vicinas, putamus igitur esse et altiores partibus vicinis. Vicinas autem putamus, quia oblique illas inapicimus, eoque seriem materiae interjectae tam longam, ex qua sola extremorum distantia colligi debet, non recte comprehendimus, existimantes, nos angulis radiorum altiorum tantumdem de superficie aquae comprehendere, quantum comprehendimus aequalibus angulis radiorum humilliorum.

Fig. 13.




esse aequales ipsi BC propinqua, propterea quod anguli ad oculum sunt aequales, putat se in eodem radio AD pro D videre F, in eodem radio AE pro E videre G, ut BC, CF, FG fiant aequales; quo pacto superficies BCDE plana videtur sursum curvari et esse BCFG.

Negasti, Terrae eminentias esse sensu notabiles, si cum toto Terrae globo comparentur; interim concecisti, pleraque loca mediterranea umbilicos habere; dimidii miliaris Germanici altitudine super oceani superficiem exstantes. An vero haec non est satis notabilis altitudo? Unum vel dimidum milliare ad 800 vel 900 non habet proportionem sensibilem. Tanta vero reperitur globi Telluris semidiametros.

Quomodo investigari potest quantitas hujus semidiametri? Cum Terra sit rotunda, oportet ut perpendicularia varii in locis appensa inter se annuant, turres ad perpendicularum erectae verticibus ab se invicem abnuant, id est ut superius distent longius. Quod cum ita sit, facile est duobus ex montibus, quorum ex altero alter conspicuus sit, perpendicularia ad communem lineam visivam examinare, unde innotescit angulus, quem faciunt binae binorum perpendicularorum lineae, continuatae per imaginationem usque in centrum Terrae. Cum igitur distantia binorum illorum locorum sit pars ambitus

Fig. 14.



totius globi, sicut angulus ad centrum est pars quatuor rectorum, facile ex nota longitudine partis illius investigatur longitudo totius ambitus in eadem mensura: vel ex nota distantia binorum locorum, tanquam ex basi trianguli, et ex cognitis angulis, per geometrica praecepta computatur longitudo duorum crurum seu linearum a perpendicularia ad centrum Terrae coëffinitum, quae est quantitas semidiametri Terrae.

Docce me processum exemplo. Distent duo loca B, C miliaribus 5 Germanicis communibus, B mons, C arx. Inventus sit autem angulus ad B in monte $89^{\circ} 46'$, alter in arce C $89^{\circ} 55'$. Erit igitur angulus BAC $0^{\circ} 19'$, cum sint in quatuor rectis angulis 360° seu minuta 21600. Quodsi pars ambitus Terrae inter montem et arcem, quae est $19'$,

valet miliaria 5 illius loci, ergo totius ambitus $21600'$ valebunt miliaria hujusmodi 5684.

Vel multiplica sinum anguli ABC	9999917.
in mensuram notam ipsius BC	5
Factum	499995. 85.
divide per sinum anguli BAC	55268.
	497412.

Quotiens 904 cum 37313 partibus de uno diviso in 55268 est longitudo lineae AC, oppositae angulo ABC. Ergo semidiameter Terrae a centro usque ad arcem esset 904 talium miliarum Germanicorum.

Pariter multiplica sinum anguli ACB	99999. 89
in eandem mensuram notam BC	5
Factum	499999. 45
divide per sinum anguli BAC	55268
	497412

Quotiens 904 cum 37673 partibus nunc est longitudo lineae AB, oppositae angulo BCA, estque semidiameter Terrae, ab eius centro usque in verticem montis. Et sic mons iste attolleretur 360 partibus unius altius quam arx, quae est altitudo pedum 130 geometricorum in perpendiculari.

Estne alia via metiendae semidiametri Terrae? Nulla parabilior est ista, quam nunc tradidi, ut in qua nihil asumitur, quod non semper et ubique sit obvium. Proxime tamen accedit ad illam methodus Clavii, quae ipsa etiam gemina est; una ejus forma sic habet.


Sit in litore maris promontorium, altitudinis super maris superficiem cognitae, in ejus vertice stet mensor, dirigens latus unum quadrantis in extremas undas, qua coelo videntur contiguas, noietque, quantum angulum faciant perpendiculari et linea visiva in extremas undas porrecta. Quo pacto formatur triangulum, recto angulo apud extremas undas, ejus cathetus est linea visiva, basis, linea a centro Terrae in extremas undas, hypotenusa vero linea a centro Terrae in verticem promontorii inque visum. Cum ergo in cauae sinum appositae sit ad unumquemque quadrantis angulum proportio hypotenusae seu secantis ad basin seu radium, excessusque illius super hunc, cui respondet altitudo stationis super superficiem maris: facile est, data hac altitudine in miliaribus Germanicis, radii quoque seu semidiametri numerum miliarum constituere.

Da exemplum. Sit altitudo promontorii CO miliare Italicum, seu quadrans Germanici, sitque G extremitas maris ex altitudine C visi, et inventus sit angulus GCO 88° 37'. Cum ergo CGA sit rectus, quippe CG tangit superficiem globi GO in G, GA vero ducitur ex contactu G in centrum A, erit itaque GAC 1° 23'. Hujus vero anguli hypotenusa seu secans AC est 100029. Si ergo excessus CO super radium OA vel GA, qui excessus est 29, valet unum quadrantem miliaris Germanici: tota GA vel OA valebit 862 miliaria.

Explica etiam alteram Clavianae dimensionis formam. Haec forma non opus habet ascensu in montem, sed requirit pro eo cognitionem tam altitudinis montis CO, quam distantiae navis G a monte C. Nam hujus GC quadratum divisum per OC prodest totam diametrum globi aequi per OC auctam.

Ut si GC sit 21 miliaria et CO quadrans unus. Quadratum de 21 est 441, quod divisum in CO, quadrantem unius mil-

Fig. 15.



liaris, facit quotientem 1764; ergo diameter tota globi aqnei esset 1763 milliaria cum dodrante.

Qua vero methodo astronomi solent uti ad metiendum Terrae globum? Astronomi coelum adhibent, hoc est altitudinem poli in duobus locis eidem meridiano subjectis, et per eam prius metiuntur Terrae ambitum, ex ambitu deinde eliciunt et diametrum ejus. Sed requiritur prius cognitio doctrinae sphaericae, quae in sequentibus demum tradetur.

Ostende tamen rem exemplo. Pragae est altitudo poli $50^{\circ} 6'$
Lincii sub eodem meridiano $48. 16.$

Differentia t. 50.

Jam Lincio Pragam communiter numerantur milliaria 26. Si ergo $1^{\circ} 50'$ valet milliaria 26, totus ambitus, graduum 360, valebit milliaria 5106. Sed ambitus est ad diametrum ut 22 ad 7. Si ergo ambitus 22 valet milliaria 5106, diameter 7 valebit milliaria 1615 et semidiameter milliaria 807. *)

Quanta igitur censetur hodie semidiametros Terrae? Communiter hodie 15 milliaria Germanica mediocria numerantur in gradus singulos, ut ita veniant toti circumferentiae 5400, semidiametro 860 fere.

Computamus autem in unum milliare Germanicum Italica 4 seu 4 millia passuum geometricorum, quorum quilibet babeat pedes 5, pes 4 palmos. Stadia vero in milliari Italico insunt 8, in Germanico 32, quodlibet 125 passuum. Ita unus gradus occupat secundum hodiernos stadia 480 et tota circumferentia stadia 172800.

Quid de hoc veteres prodiderunt? Veteres inter initia nascentis astronomiae minus accurati fuere. Nam Eratosthenes, qui vixit ante Christum, stadia 250000 prodit.

Ejus ratiocinatio talis. In Syene Sol in aestivo solstitio hora meridiana illuminat fundos puteorum, fit igitur praecise ibi verticalia. At Alexandriae tum absistit a vertice una quinquagesima parte circuli, hoc est $7^{\circ} 12'$. At intervallum itinerarium inter locum utrumque censetur 5000 stadiis, quae sumta quinquages efficiunt 250000.

Posidonius circa Christi tempora demisit partem vicesimam quintam, ut sint stadia 240000. Ejus ratio fere similis est priori. Cauopus stella in insula Rhodo ejus aetate stringebat horizontem nec altius emergebat. Alexandriae vero ad quartam unius signi partem se attollebat, id est $7^{\circ} 30'$, quae est pars 48. totius circumferentiae. At intervallum itinerarium, seu spatium maris inter locum utrumque censetur 5000 stadiis, quae sumta 48^{ies} efficiunt 240000.

Ptolemaeus vero, qui vixit post Christum, ad nos propius accedit; tribuit enim uni gradui stadia 500, quae sumta 360^{ies} efficiunt 180000.

Alphragano auctore tempore Almeonis Arabes collatis sententiis statuerunt uni gradui circuli maximi in Terra competere palmos 1360000, quorum 6 faciunt cubitum. Eorum autem 4 censentur a nobis pro pede, 20 pro passu geometrico; ita venient 68 millia passuum in gradus singulos, hoc est milliaria Germanica 17, stadia 544, ut sit totus ambitus stadiorum 195840.

Alhategnius sen Mahometes Aracensis gradum dimidium aestimat diurno itinere hominis expediti, seu milliariibus Arabicis sul secnli 42.

Cur hic inseritur dimensio Terrae, res geographica, cum in astronomia versemur? Etsi geographiae est, metiri Terrarum ambitum, distantias locorum, aream convexam superficiei Terrenae, et ipsam globi totius corpulentiam, non potest tamen astronomia carere hac cognitione.

Nam 1. pro numero graduum longitudinis et latitudinis Terrae variantur phaenomena coelestia in diversis Terrarum locis. Ex distantia vero itineraria numerus graduum longitudinis et latitudinis colligi potest, si cognitam habeamus in ea mensura totam Terreni circuli maximi circumferentiam.

2. Cum Terra nostrum sit domicilium, utimur semidiametro Terrae prodecempeda ad dimetienda corpora coelestia eorumque distantiam a Terra. Mensuram igitur nostram par est nobis esse cognitam, id est expensam ad magnitudinem staturae, orgyae, cubiti, pedis, spithamae, palmi, pollicis, digiti in cornuculis nostris.

3. Hoc ipso vero loco inseri hanc metiendi rationem postulavit ipsa demonstrationis methodus, quia per eam examinata et comprobata fuit perfecta Terrae rotunditas.

1. <i>...</i>	...
2. <i>...</i>	...
3. <i>...</i>	...
4. <i>...</i>	...
5. <i>...</i>	...
6. <i>...</i>	...
7. <i>...</i>	...
8. <i>...</i>	...
9. <i>...</i>	...
10. <i>...</i>	...

[illegible][illegible]

It was not until 1964 that the first of these studies was published, and it was not until 1968 that the first of these studies was published.

PRINCIPIORUM DOCTRINAE SPHAERICAЕ

PARS SECUNDA.

DE FIGURA COELI.

Quid igitur de coeli figura tenendum? Cum materiam aerae aetherae nequeamus oculis notare, nihil impedit, quin interim credamus, illam fusam per omnem mundi amplitudinem, sphaeram etiam elementarem undique circumire. Stellarum vero agmen undique Tellurem circumstare et sic quasi quendam curvum efficere fornitem, integrae sphaericae figurae, ex eo patet, quod cum Terra rotunda sit, quorsumcunque perveniant homines, stellas in eum modum supra sua capita cernunt, ut nos. Adeoque et uno loco versantibus paucorum dierum spatio totus stellarum exercitus conspicuus efficitur, ut a quibus inceperamus, iis illae, quas ultimo videmus, cohaerere et succedere videantur. Siderum igitur ordo in se redit, circulo circa Terram circumductus.

Censes igitur stellarum centra in eadem superficie sphaerica disponi?

Hoc quidem incertum est. Cum enim aliae parvae sint, aliae magnae, non est ab simile vero, parvas ideo videri, quia procul in altum aetherem recesserunt, magnas ideo, quia nobis propiores. Neque tamen absurdum, duas fixas inaequali apparenti magnitudine aequali a nobis intervallo abesse.

Fig. 16.



in finita fixarum congerie mundus hic noxter cum Sole suo erit unus, nulla re diversus a locis aliis circa fixas singulares, ut in subjecta figura littera M.

At de planetis certum est, illos non esse cum fixis in eadem superficie sphaerica, sed inferiores esse fixis; tegunt enim interdum illas, nec vicissim alias a fixis teguntur.


Si de fixis certius nihil constat, videtur illa regio infinita esse; nec Sol hic noster aliud erit, quam una ex fixis, nobis major et clarius visa, quia propior quam fixae; atque ita circa quamlibet fixam poterit esse talis mundus, qualis circa nos est; vel quod eodem redit, inter innumerabiles locos in illa

Sole suo erit unus, nulla re diversus a locis aliis circa fixas singulares, ut in subjecta figura littera M.

Ita quidem Brunus et veterum aliqui. At non sequitur, si centra fixarum non sunt in eadem superficie sphaerica, propterea regionem, per quam sunt dispersae fixae, esse undiquaque sibi similem.

Habet enim illa omnino vacuum aliquem sive cavumque ingens, a fixarum agmine, confertim circumfuso, cu[m] a muro vel fornice quodam conclusum et circumscriptum, et in hujus cavi ingentis complexu Tellus nostra cum Sole et stellis mobilibus comprehensa est. Vide subjectam figuram.

Fig. 17.



Quod habes hujus rei argumentum?

Si regio fixarum undique similiter esset consita stellis, etiam in vicinia nostri mundi mobilis, sic ut situs mundi Solisque nostri nullam haberet peculiarem circumscriptionem prae situ fixae alienius, tunc apparerent nobis paucae aliquae fixae ingentes, nec ultra duodecim (quot angulos habet icosaedron) possent esse omnes ejusdem a nobis distantiae et magnitudinis; succedentes his haud multo plures haberent jam distantiam duplicatam proximarum, aliae superiores triplicatam et sic consequenter semper multipliciorem.⁹⁾

Ac cum oculum maximae tam appareant parvae, ut vix instrumentis possint notari aut mensurari: quae igitur duplo aut triplo etc. distarent longius, duplo et triplo apparerent minores, positae aequalibus ipsis veris magnitudinibus, citoque veniretur ad eas, quae penitus fierent insensibiles: ita paucissimae viderentur stellae, eaeque in maxima differentia.

At vero contrarium apparet. Videmus enim fixas magnitudinis ejusdem apparentis valde confertas invicem, adeo ut astronomi Graeci ex insignioribus numerent mille, Hebraei undecim millia; nec ita magna est differentia inter apparentes fixarum magnitudines. Tot igitur numero stellas aequali visu oportet non valde inaequalibus intervallis a nobis abesse.

Quare cum nobis fixarum facies apparent undique propemodum eadem, quod magnitudinem et multitudinem stellarum attinet, undique igitur propemodum aequalibus intervallis supra nos erit sublata. Est igitur ingens cavum in medio regionis fixarum concameratioque fixarum evidens circum et nos in ejus complexu.

In balneo Orionis sunt tres magnae stellae, quae ab invicem distant intervallo 83'; pone semidiametrum unius apparere unius minuti tantum, appareret ergo visui in altera constituto 83'; hoc est tres fere Soles huiusmodi, octies in superficie major ipso Sole. Non est igitur talis prospectus ex una qualibet fixa in ceteras, qualis ex nostro hoc mundo in fixas est, longinquam absumus a fixis singulis, quam fixae vicinae a se ipsis.

Cur hic iteris icosaedri figura? Quia quantum in ea abest angulus ab angulo, tantum aut non multo minus absunt anguli omnes a centro; apta est

itaque figura ad hanc dispersionem fixarum undique propemodum aequalem exprimendam, sic ut centrum, aequè atque anguli, repraesentet unum locum inter fixas.

At si consideremus figuram plurimum angularum, ut est dodecaëdron, habens angulos 20, ii jam propiores sunt sibi mutuo quam centro communi, quare stellae 20, sic dispositae circa aliquem locum vel stellam, jam repraesentarent aliquam concamerationem et circumscriptionem insignis cavi, quod ipsum est, quod argumento nostro nitimur confirmare.

In schemate praemisso N. 16. pro icosaëdro, figura solida, expressa est sexangula, aequipollens illi hoc loco in plano. In schemate posteriore, N. 17, pro dodecaëdro expressa est aequipollens in plano decangula.

Videtur enervari vis argumenti hujus, si quis statuat, quo altiores a Terris sint stellae, hoc fere esse majores? Nam si stellarum tam multarum, quae videntur angulis pene aequalibus, aliquae statuuntur parva habere corpora, aliquae ingentia, sequitur illos propinquos esse, istas remotissimas; ac proinde, quae nobis jam videntur inter se propinquissimae, possent hoc pacto ob invicem esse remotissimae. Tunc, si non vacitate, saltem parvitate stellarum nostro mundo mobili vicinarum insignitus erit locus iste, et sic ipsa stellarum exilitas vacui speciem praebebit, ipsa vero anbinde crescens stellarum magnitudo versus exteriora concamerationis insignis vicem praestabit; et in universum minus erit materiae stellaris in ista cavitate, in quam collocatus est mundus mobilis, plus materiae in circumferentia, quae illam includit et definit: ita sequetur nihilominus, singularem esse notabilemque locum hunc prae reliquis partibus regionis fixarum.

Probabilius tamen est, quae sunt ejusdem fere magnitudinis ad sensum, aequalibus fere intervallis a nobis abesse, eaque tam multarum stellarum constitutione speciem fornari sphaerae caevae.

Habes aliud argumentum, quo probes, locum hunc, in cujus complexu Terra est cum planetis, prae reliquis locis in regione fixarum peculiariter insignitum esse? Via, Graecis lactea, nostris scivita S. Jacobi, diffusa est per medium fixarum orbem (uti quidem orbis is nobis apparet), dividens illum in duo apparentia hemisphaeria; estque circulus ejus inaequalis quidem latitudinis, sed tamen circumcirca non valde sui ipsius dissimilis. Ergo via lactea notabiliter signat locum Terrae et mundi mobilis pro locis omnibus aliis in regione fixarum.

Pone namque Terram stare ad latus una semidiametro viae lacteae, tunc haec via lactea apparebit illi circulus parvus vel ellipsis parva, tota declinans ad latus alterum, eritque simul nro intuitu conspicua, quae nunc non potest nisi dimidia conspici quovis momento. Rursum pone Terram esse in plano quidem viae lacteae, sed vicinam altrinsecus ipsi circumferentiae illius; tunc illa pars viae lacteae ingens apparebit, contraria pars angusta.

Itaque fixarum sphaera non tantum orbe stellarum, sed etiam circulo lactis versus nos deorsum est terminata.

Num igitur regio fixarum rursus est infinita? Hic astronomia nihil pronunciat, in tanta enim altitudine sensu destituitur oculorum. Hoc solum docet astronomia, quousque stellae vel minimae cernuntur, finitum esse spatium.

An non posset aliqua ex stellis visibilibus distare a nobis intervallo actu infinito? Non: nam quod cernitur, extremitatibus suis cernitur. Stella igitur visibilis terminos habet circumcirca. Quodsi stella recessisset in spatium actu infinitum, etiam termini illi spatii infiniti a se mutuo distarent;

omnes enim illi sishuf, hoc est totum stellae corpus, infinitae hujus altitudinis essent participes; itaque manente visionis angulo eodem, diameter stellae, quae est linea inter ejus terminos, proportionaliter aucta esset cum sua distantia, ut, sicut duplo remotioris diameter sit duplo longior diametro propioris, ita etiam in spatio distantis diameter finita, quando corpus infinites multiplicatam ponitur accipere distantiam, ipsa quoque se ipsa infinites fiat major.

Atqui pugnant invicem, infinitum esse et terminari, pugnant, infinitum esse et ad aliud infinitum habere certam, hoc est finitam proportionem. Nullum igitur visibile distat a nobis infinito intervallo.

Quid si vero sint aliquae stellae corporibus finitae, spatiis sursum infinitis dispersae, quas ob tantam distantiam a nobis non cernantur? Primum, si non cernuntur, nihil igitur ad astronomiam pertineat. Deinde, si regio fixarum altrinsecus est terminata, deorsum sc. versus nostrum mundum immobilem, eum sursum careat termino? Tertio, etsi negari non potest, posse esse multas stellas, quae sive ob exilitatem, sive ob maximam distantiam non cernantur, non tamen per has obtineri potest spatium infinitum. Nam si sunt singulae finitae magnitudine, oportet omnes simul esse finitas numero. Alias si numero infinitae, quantumlibet exiguae, modo quantae sint, possent constituere unam aliquam infinitam essetque corpus, dimensionibus trinis patens, nihilominus infinitum, quod contradictionem implicat; infinitum enim dicitur, quod fine et termino eoque et dimensione caret. Sic omnis rerum numerus actu finitus est eo ipso, quia numerus, ergo finitus numerus corporum finitorum non ponit spatium infinitum, quasi multiplicatione spatiorum multitudine finitorum coacervatum.

Non tamen negabis, saltem spatium esse sursum actu infinitum? Si de vaeuo agitur spatio, id est de re nihili, quae nec creata est, nec est, nec alii ut ibi sit resistere potest, mutabitur status quaestiois, nec erit actu, quod est plane nihili. Sin spatium est ob corpora locata, jam demonstratum est, neque corpus ullum locabile esse actu infinitum, neque corpora finita magnitudine posse esse infinita numero. Spatium igitur ob corpora locata infinitum esse nihil est necesse. At nec potest esse vel inter bina solum corpora linea actu infinita. Rursum enim pugnant actu infinitum esse et terminari singulis utrobique corporibus finitis ceu punctis, quae sunt lineae termini.

Quid de infinito in potentia tenebo, et an saltem cogitari potest infinitum spatium vel numerus? Duplicem habet sensum, enim infinitum in potentia nominatur. Nam vel sic accipitur, sicut divisio quantitatis infinita dicitur potestate, scilicet ut infinitae sint sectiones, quarum quaelibet fieri posset in hac quantitate; quaecunque tamen illarum fieret, ipsa per se esset finita, partes constituens finitas. Vel accipitur infinitum in potentia sic, ut potentia ista referatur ad ipsam totius infiniti amplitudinem. Illo modo verum est, nullum unquam spatium, nullum numerum ne cogitatum quidem esse neque cogitatum iri unquam, quo non possit cogitari major, semper tamen infiniti supererunt numeri, nondum ne cogitati quidem, quorum tamen quilibet posterius cogitari posset. Hoc posteriori vero modo infinitum potestate nullum est, ut scilicet infinitum spatium aut infiniti numeri simul et semel actu cogitentur, id est infinitum cogitando exhauriatur; quicquid enim cogitatur, eo ipso, quod cogitatur, finitum est; nec aliter mente comprehendimus id quod vox infiniti nobis insinuat, nisi ut rem, cujus pars solum aliqua in mente reluceat, reliquum excedat mentis cogitatum; quo modo ad primum sensum refertur et conceptus solum nominalis est.

Si finitus est mundus, qua igitur figura praeditus est exterius? Quamculum uisi sphaerica?

Quae habes hujus rei argumenta? Astronomica pene nulla; duo vero potissimum metaphysica; primum ab ipso mundo ducitur, alterum ab ejus archetypo.

Dic primum. Disputamus de figura, quae mundum claudit exterius. Omnia igitur intra illam figuram sunt, nihil extra. Si omnia capit actu, perquam verisimile est, etiam forma capacissimam esse. Capacior vero est figura cum est rotunda, quam si eadem superficiei quantitate in aliam quaecunque speciem, quae rotunda non est, casset expressa, ut docent geometrae et Pappus libro quinto Mathematicarum Collectionum. Credibile igitur est, mundum rotunda superfice finiri.

Dic alterum. Mundi archetypus Deus ipse est, cujus nulla figura similior est (si qua similitudo locum habet), quam sphaerica superficies. Nam uti Deus est ens entium, antecedens omnia, ingentum, simplicissimum, perfectissimum, immobile, sibi ipsi creaturisque omnibus sufficientissimum, creans et sustentans omnia, unus essentia, in personis trinus, sic sphaericum etiam eadem rudi quodam modo proprietates habet inter figuras ceteras.

Si tam pulchra est analogia inter sphaericum et res divinas, operae pretium est, naturam sphaerici pluribus explicari. Dic igitur, cur facias primam figurarum? atqui putabam ego, lineas esse priores superficiebus, quia simpliciores sunt et una sola dimensione longitudinis constant; sphaericum, ut superficies, in longum et latum porrigitur. Primum lineae non sunt ipsae figurae, sed figurarum termini. Deinde sunt quidem lineae priores superficiebus planis; at id non est propter simplicitatem illam per se, non enim componitur superficies ex lineis, sed propter generationis modos, quia linea gignit superficiem planam. Superficie vero sphaerica priores nequaquam sunt lineae, quia neque componunt neque gignunt illam, sed potius ex illa oriuntur materialiter vel formaliter. Denique simplicitas linearum alligata non est de essentia figurati, sed ejus potius imperfectio; eum non omnimodamfigurationem admittant lineae, sed saltem unum ejus elementum in longum. Talis vero simplicitas, quae in participatione consistit, non infert prioritatem participantis praeter participato.

Explica discrimen figurarum planarum et parallelepipedarum causa ortus, ut dicta melius intelligantur. Figurae genitae in hac metaphysica consideratione sunt in triplici discrimine. Nam vel sunt primigeniae, vel minus aliquid ipsis primigeniis, vel plus ipsis; hoc est vel sectione ortae ex primigeniis, ut partes, vel compositione ex primigeniarum absectis partibus.

Quomodo gignuntur primigeniae? Primigeniae gignuntur fluxu seu motu directo, primum puncti, quod intelligitur situm obtinere certum in figura alia praesistente; et ex hoc fluxu nascuntur lineae rectae. Deinde fuit linea recta ad latus seu in plagam, quae est extra suum longitudinis tractum, et nascuntur ex hoc superficies. Si omnia lineae puncta fluxerunt in directum ad aequales distantias, qui fluxus est aequabilis, quod tunc nascitur, parallelogrammum dicitur, quod est vel rhomboides, si angulus fluxus et fluentis fuit obliquus, vel est rectangulum. Tertio, si etiam superficies sic extra se aequabiliter fluat, nascitur corpus, et quidem parallelepipedum; angulo vero fluxus recto, etiam columnare.

Si fluxus longitudo aequalis est lineae fluenti, nascuntur utrinque rhombica angulo obliquo: si etiam angulus fluxus et fluentis rectus est, in planis

pro rhombo sit quadratum, in solidis, fluente quadrato, eubus, geuitarum perfectissima.

Explica etiam ortum ex sectione. Ducta linea, quae diagonos dicitur, per oppositos parallelogrammi angulos, figura abit in duo triangula aequalia, rhomboides in scalena omnis generis, rhombicum in aequicrura vel aequilatera. In solidis vero parallelepipedis ducta superficie plana per diagonos oppositarum superficierum parallelarum, solvitur parallelepipedum in bina prismata. Deinde in prismatico, ducta superficie plana per trinos solidos angulos, unum aliquem prismatis angulum circumstantes, resecantur tetraëdra omnis generis, restantque pyramides quadrilaterae, plano altero per diagonem basis et verticem ducto in bina alia tetraëdra, corporibus aequalia, solubiles; ut sic omne parallelepipedon abeat in sex tetraëdra, aequalia corporibus.

Quomodo tertium genus per compositionem oritur? Omnes reliquae planae figurae constant triangulis, quae sunt parallelogrammorum partes, dommodo binorum triangulorum singula latera babeant eandem longitudinem. Sic omnia corpora multilatera componuntur ex supradictis prismatibus vel tetraëdris, primigeniarum partibus, dommodo binorum tetraëdrorum singula plana congruant. Suntque ex compositis simplicissima pyramides quadrangulae modo dictae, quia constant tetraëdris tantum binis singula; prismata vero tribus, cetera pluribus constant.

Intelligo ortum ceterarum figurarum; videtur igitur sphaericum esse inter primigenias, nascitur enim fluxu semicircularis lineae circa polos et axem immobiles; itaque linea circularis erit illa prior. Modus iste creandi sphaerici tantummodo geometricus est sen potius mechanicus, geometris usitatus ad iuvandum captum tironum, naturae vero sphaerici, seu considerationi ejus metaphysicae nequaquam est conveniens. Circumduncto namque semicirculo, puncta quaedam, ut dictum, quiescunt; proxima tarde, media velocissime moventur, cum ipsum sphaericum sit undique sui ipsius simile; cum etiam in ortu primigeniarum, quae villiores sunt, aequabilissimus omnium punctorum fluxus fuerit. Cumque ceterae primigeniae lineamenta babeant, quibus sic genitae fuisse intelligantur, in sphaerico contra nullum hujus geuitarum vestigium est; nihil enim in ea, quod prae reliquis punctis poli rationem habeat. Non est igitur haec genuina et metaphysica ratio geuitarum sphaerici. Denique linea semicircularis, quippe gignens, prior esset sphaerico, quippe genito, quod est absurdum et impossibile, cum posterior non sit tantum sphaerico, sed ipsis etiam planis figuris.

Proba hanc posterioritatem lineae semicircularis. Duobus modis intelligitur oriri circularis linea: primus vulgaris et mechanicus est iste, ut circini uno brachio stante circumeat reliquum, quoad in sua fuerit reversum vestigia; quanquam hic modus a natura circuli est alienus, incipit enim a certo puncto, cum nihil sit in circulo, quod initii rationem habeat. Nequit igitur sic existere circularis linea sine plana superficie, cui illa insit, nequit creari superficies sine recta, recta sine puncto, nequit esse punctum sine situ in loco, locus sine figura, quae contineat locum, ejusmodi figura, locum circumscribens, est sphaericum; a sphaerico igitur initium puncti, lineae, superficiei planae et circularis lineae.

Alter modus metaphysicus et naturae quantitatum accommodatus, quo gignitur circularis linea, est per sectionem sphaerici, factam a plano; rursum igitur tam planum quam sphaericum, ut subjecta et instrumenta gignendi, oportet praexistere lineae circulari. Sphaericum igitur prius est etiam circulo.

Num igitur plane est ingenua figura sphaericum? Ingenua dicitur respectu figurarum ceterarum, quia uulgo illorum modorum gignitur, sed potius puncta et locum praestat gignendis ceteris; per se vero habet quandam generationis modum longe diversissimum, non ab alio, sed a suo intimo puncto, de quo infra.

Proba sphaericum etiam figurari simplicissimam et perfectissimam esse. Omnis in multiplicitate imperfectio est, in simplicitate pulchritudo. Ceterae figurae, quae perfectae dicuntur, clauduntur planis, suo quaeque numero, in quae et resolvuntur seu dividuntur; quae plana, cum sint inter se unius omnia similia, perfectionis nomen pariunt. Sphaericum continetur unica superficie, undiqueque sibi simillima, inque se ipsam redeunte seque ipsam terminante; nec ullum usquam est vestigium, quod ad divisionem figurae praebeat. Quod autem in partes est dividuum, id ei accidit, ut quantitas est, non ut figura.

Deinde ceterae figurae non sunt perfectae, nisi trinis constant dimensionibus intusque sint plenae et quasi materiae, unde et corpora dicuntur. Sphaericum immateriati rationem habet, quia intelligitur sine soliditate interna. Differunt namque globus et sphaericum. Illud enim globus est, quod de solido corpore sphaericum intus exhaurit et intra se condit.

At immobile non dices sphaericum, cum ad motum nulla figura sit aptior? Motus in geometricis non recte tribuitur figuris, quippe nulla figura pure geometricae mobilior est altera. Physice vero si consideres, verum est secundum quid. Nam si corpus rotundum ponatur in plano accedatque motor extraneus: duabus his conditionibus positis mobilis figura est. Sic etiam figurae angulosae secundum quid sunt stabiles, si ulimur collocentur in planitie super planorum suorum uno. Sin autem talem figuram colloces super eum angulum iuxta sphaericum, quod totum angulus est, sphaericum quidem quiescet, angulosa vero se ipsa movebitur inque unam suarum planitiarum procumbet. Itaque eo ipso immobile etiam sphaericum dicitur, quia uulla in parte causam ullam intra se habet ad motum, cum sit undiqueque simile sui. Sed nec extra se in alia aliqua quantitate causam motricem, aut geometricis proprietatibus ad motum physicum dispositam invenit, eum probatum sit, esse primam figurarum omnium.

Qui probabis, sphaericum sibi ipsi aliisque sufficere? Figurae ceterae, ut dixi, planis, plana lineis, lineae punctis describuntur et comprehenduntur et terminantur, puncta vero situm requirunt in spatio, at spatium vult determinari aliquo ambiente. Sphaericum se ipso inclusum nihil requirit extra se, quod non ipsum sit; se ipso enim terminatur eoque ipso locum intra se concludit; in quo puncta, lineae, superficies, corpora constitui principio dato possunt.

An vero et creatricem constituit figuram hanc ceterarum et sustentatricem? Id quidem uolunt geometricae, omnem similitudinis in ceteris figuris, omnem rationis, omnem perfectionis pulchritudinem e sphaerico derivatam ipsis inesse. Nam plana uulgo corporis omnia debent quadrare in circulum eundem, circulus vero ex sphaerico est, ut dictum. Tum autem alicuius figurae perfectae anguli solidi omnes debent aequaliter a centro figurae abesse, hoc est in eodem sphaerico stare. Est igitur sphaericum ceteris figuris causa perfectionis et norma, quod habet rationem formae.

Comparatio vero laterum figurae et ad ceteras corporis dimetientes et plarium corporum inter se fit non aliter quam exposito sphaerico, in quo omnia insunt corpora, ejusque sphaerici diametro certis rationibus divisa. Est

igitur sphaericum ceteris figuris causa et norma definitiouis seu descriptiouis scientifiacae, seu proportionum. Sed et ipsae proportionum harum pulchritudines non aliter, nisi beneficio circuli constituuntur et intelliguntur, divinamque eam proportionem dicunt ipsi geometrae.

Ostende, inesse in sphaerico adorandae Trinitatis imaginem. In sphaerico tria sunt: centrum, superficies et aequalitas intervalli, quorum uno negato cetera corrumpuntur suntque distincta inter se, ut unum non sit alterum.

Centrum est quasi origo sphaerici, nam superficies intelligitur a centro non egredi, sed egressa esse lineis rectis numero infinitis per intermedium in omnes plagas, nullo sui vestigio relicto in intermedio, puncto se in hanc amplitudinem communicante ad aequalitatem usque intervalloꝝ omnium; quae longe alia ratio geniturae est, quam illa, quam geometrae captus causa tradunt, supra fol. 141. Et nota, quod creatio lineae rectae unius, prius tradita, est finita imago hujus geniturae infinitae, superficiei sphaericae ex centro. Centrum se ipso est invisibile et impervestigabile, monstratur vero undique flexu aequabilissimo superficiei, mediante aequabilitate intervalli. Itaque superficiales est character et imago centri et quasi fulgor ab eo et via ad id; et qui superficiem videt, is eo ipso et centrum, non aliter.

Intervallum resultat ex comparatione centri cum superficie, et sic procedit ab utroque mensuratque et scrutatur profundum hujus figurae. Quodsi qua figura solida vel plana describitur intra sphaericum, illa superficiei innititur non alio nisi quibusdam terminis ultimis, hoc est punctis, tota vero amplitudine seu corporis seu planitiei extenditur per intervallum et in illo sustentatur. Itaque a centro per intervallum in superficiem innixa sunt omnia reliqua corpora regularia.

Nullum tibi superest argumentum rotunditatis mundi, praeter explicata duo principalia? Adde hoc etiam ex astronomia, consentaneum esse, ut non ignobiliori figura terminetur totum quam partes. At partes mundi praecipuae sunt globosae; id jam probatum est de Terra, sic circuli figura cernitur Sol semper, Luna perumque, idem affirmant de planetis ceteris, qui perspicillis illos artificiosis contemplantur attentius. Quare consentaneum est, ut totus etiam mundus exterius sit globosus.

Sol, Luna et Planetae apparent forma circularis disci; non sunt ergo solidi globi. Non sequitur, illos propterea vere planos discos esse. Nam optici demonstrant, etiam globos solidos, si a longinquo aspiciantur, aspici ut discos circulares.

Unde vero conicias, illos esse potius globos solidos, quam discos planos circulares? Primum ex comparatione cum Terra, ne corpora coelestia circularitate participant imperfectius, quam Terra. Deinde ex virtute corporum. Sol enim tantum lucis et caloris fundere de se non posset, si corpore careret, si mera superficies plana esset. Tertio probabitur in altera parte astronomiae, Solem convolvi circa suum axem et credibile est idem etiam de quinque planetis. Demonstrant igitur optici, si corpus convolutum semper retinet speciem disci circularis, id esse globosum. Quarto, lumen Lunae, Veneris et ceterorum planetarum est adventitium ex Sole. Si ergo Luna vel Venus discus esset, simul illuminaretur in una superficie, at hoc non apparet: nam pars illuminata prius est cava, deinde nanciscitur speciem disci bisecti, postea gibbus enascitur, denique perfecte impletur circulus. Haec autem contingunt circa globum ex dimidia parte illuminatum, si minus inspicitur, ut docemur in opticiis.

Atqui figura coeli apparet longe alia, scilicet, ut initio dixisti, veluti lintei supra nos expansi et in medio leniter sufflati; quippe quod in medio sit spectatori propinquum, circum distet longius. Est visus deceptio, qui primum caret admiuiculo arguendi distantias stellarum, re non per se visibili, deinde etsi coelum nubibus aequalis altitudinis subductum sit, sequitur tamen imaginatio fornicae, in medio alti, ex hisdem optices principijs, adeo ut ventis perflantibus omnes nubes ad unum ejus punctum tendere videantur.

Omnis figura est in materia, quae est igitur materia illa, qua vestitur exterius mundus? Ex visu nihil depromi potest in illam partem; recte igitur sequimur auctoritatem, qua docemur, stellas quidem omnes esse in expanso, quod Hebraice dicitur raquia, et tecta esse aquis superiora ejus, hoc est supra auram aetheream in extremo gradu attenuatam stellasque in ea orbem esse ex aqua factum, quam aquam si quis gelu coueretam et crystallinam esse contendit propter longissimam Solis absentiam, id ei per astronomiam Copernicanam licet, ut quae ipsarum stellarum aspectu contenta, orbe illo, quisquis est, non utitur.

Quaecunque enim mundi figura posita et utcunque dispositae essent stellae inaequalissimis intervallis, semper oculus spectatoris in Terra imaginabitur sibi, stellas illas omnes sese veluti centrum in modum superfiei sphaericae perfectae circumstare.

PRINCIPIORUM DOCTRINAE SPHAERICAE

PARS TERTIA.

DE NATURA ET ALTITUDINE AËRIS, TERRIS ET OCEANO CIRCUMFUSI, EJUSQUE DISTINCTIONE AB AURA, TOTO COELO DIFFUSA.

Cum globus Terrae longissimo intervallo distet a supremo coelo, quaero, quid expleat illud intervallum? Terras quidem et interfusa Terris maria proxime includit et ambit aër, cujus summa altitudo vix excedit suprema montium juga; supra aërem vero proxime succedit aura aetherea, per totum universum fusa, sic ut per eam ferantur planetae et cometae et disseminata sint reliqua corpora coelestia fixa, suis quaeque regionibus circumscripta.

Quo discrimine sunt inter se aether et aër? Uterque fluidus est, uterque pellucidus, uterque pro diversitate locorum et temporum puritatis variabilis; differunt tamen manifestis et sensibilibus gradibus pelluciditatis.

Explica hoc pelluciditatis discrimen per causas suas. Optica scientia tres causas pelluciditatis tradit: 1) internam unitatem, 2) tenuitatem et 3) puritatem ab inquinamento colorum.

In prima igitur causa pene pares sunt gradu aër et aether; nam fluiditas utrique communis causatur internam unitatem, si nihil heterogeneum admisceatur. Aëri tamen crebrius et copiosius admisceantur exhalationes siccæ et fumus, dividentes internam unitatem aëris humidus; aether amplissimis spatiis diffusus, rarius et paucioribus suis partibus, quibus globos proxime attingit, ab heterogeneis materiis inquinatur.

In secunda causa sunt gradus continua serie, ut aquarum densitas sit major, aëris medioeris, aetheris nulla, sed tenuitas inaeestimabilis et mera.

In tertia causa discrimen hoc est, quod aër ratione suae propriae materiae pro densitatis modulo colorem etiam obtinet caeruleum, aether non plus coloris obtinet, cum in sua propria materia consideratur, quam densitatis.

Unde scis, aetheris tantam esse et tenuitatem et puritatem? 1) Quae pellucida densitatis aliquid obtinent, illa lumen Solis imbibunt et splendent; at regio aetherea, cum excepto angustissimo spatio, quod est in umbra Terrae, semper sit in radiis Solis tota, adeo non splendet, ut de nocte, quando aëris splendor extinctus est, plane sentiri non possit: est igitur tenuissimus. 2) Intervallum nos inter et fixas est inaeestimabile, et tamen aura aetherea interfusa, tantae profunditatis transmittit ad nos usque luculas minutissimarum

stellarum illibatas cum discrimine colorum. Id non posset fieri, si aether vel minimum densitatis aut coloris haberet. Num radii Solis, cum per liquorem rubrum translucunt, colorem colligunt rubeum in transitu.

Itaque si per physicam liceret, astronomus totum aetheris spatium plane vacuum posset supponere, nec immerito dubitavit Tycho Braheus, an aetherem agnosceret materiam.

Coeli color videtur esse caeruleus oculorum indicio, quod linguae sequuntur, caeruleum a coelo derivantes, quod Germani dicunt Himmelblau.

Color ille, qui sudo coelo matutinis horis oculos nostros incurrit, non est color aetheris, sed aëris, a Solis radiis transversim illuminati.

Unde hoc probas? Quia, si in coelo esset, etiam de nocte cerneretur; coelum enim, quippe longe altius umbra Terrae, est etiam de nocte in Solis radiis.

Habes aliud argumentum, quo probes, aërem potius esse caeruleum, quam coelum? Quia montana remotiora, per aërem etiam purissimum translucentia, pingunt se super papyro colore caeruleo, tanto magis saturo et obscuro, quanto longius est intervallum.

Veteres in regione elementari supremum locum dederunt sphaerae ignis, aetheream regionem subdiviserunt in multas sphaeras solidas invicem contiguas et se mutuo ambientes. Num tu habes argumenta contraria? 1) Observavit Tycho Brahe, cometarum aliquos trajicere per illa loca huc illuc, in quibus locis credebantur orbes esse solidi.

2) Si praeter unicam superficiem aëris superius occurrerent superficies aliae orbium se mutuo contingentium, variae existerent resplendentiae, ut in speculis contru se mutuo positis. Id vero non apparet.

3) Sphaera ignis esset tenuior quam sphaera aëris, sphaerae coelestes rursum tenuiores sphaera ignis, alia magis, alia minus, coelum quippe est tenuissimum elementis. Si ergo transitus esset radiis stellarum per tota media deusitate differentiu, ex obliquo objecta (ut fieri necesse esset in orbibus eccentricis et epicyclis), saepius refringerentur illi priusquam ad superficiem aëris pervenirent; stellae ergo per radios refractos inspectae multis de causis apparerent extra loca sua vera. At quadrant stellarum loca ad regulam, nulla plane refractione radiorum concessa, usque ad superficiem aëris; nulli ergo sunt orbes, densitatis gradibus inter se distincti, usque ad aethera aëris.

Quibus argumentis probas, etiam aurae coelesti, quae tantam in se ipsa puritatem obtinet, quandoque admisceri aliquid heterogeneousum impurum?

1) A causa. Ex globo Telluris excernuntur exhalationes fumosae et a rebus combustis ascendant etiam fumi, qui postquam superarunt aëris superficiem, errant in amplitudine aetheris incertis sedibus; et verisimile est, id fieri etiam circa globos ceteros, praesertim circa globum Solis, qui nunquam caret atris punctis, qui videntur esse veluti nubes atrae aut fuligines, ex intus globi visceribus exhalantes. Sed et cometarum materia videtur per Solis radios, corpora cometarum permeantes, manifeste dissipari et per aetherem dispergi in speciem caudae, quae a cometa in Solis oppositum defluit, qua ratione aether inquinatur. Possunt et aliae causae accedere.

2) Ab effectu, qui praecipue circa corpus Solis apparet. Nam haec impuritas aetheri commixta diei noctem infert, nocti diem.

Interdum enim obsidet Solem materia fuliginosa, obtundens Solis radios, ut anno caedis Caesaris pene toto, sic anno Chr. 1547, cum quadriduo toto sanguineus Solis vultus apparuit non in uno solum loco, sed per totam Euro-

pam (cfr. II. 292.). Si haec materia fuisset humilis et in aëre ceu velum obtentum Soli, non impedivisset radios Solis tam late; nec uisi in uno aliquo loco; si dixeris, humilem fuisse, sed latissime Terris superinductam, ut hic tegeret Solem una sui parte, alibi alia, tunc debuisset etiam tegere stellas, longe a Sole distantes: at hoc non est factum, legimus enim, stellas de die emicuisse. Ergo materia fuit proxime circa Solem adeoque illi adhaerens, ut durare per annum potuerit haec obtinebratio, sic ut Solem undique circumdaret, ut is ex ulla coeli plaga, quam occupabat Terra quovis anni tempore, posset sine impedimento adspici.

Rursum haec materia radios Solis combibit et per eos adeo redditur splendida, ut in eclipsibus Solis totalibus, quando Sol totus post Lunam latet coque mera nox esse debebat, haec materia fungatur vice Solis, illuminans Terras, ut uou sequantur merae tenebrae, ut alias, quando haec materia abest.

Haec materia ceu limbus circa Solem aut coma lucida ferit oculos, priusquam in Solem dirigantur, vicinos esse monens ipsius Solis radios.

Haec materia speciem Solis ampliat, per forameu minutissimum immissi circumdatus eam fusco limbo.

Haec materia denique oritur ante Solem occiditque post, ut quae Solem circumdat; qua ratione claritatis diurnae aut Solis ortum et post ejus occasum non postremam causam praebet.

3) A consequenti. Nam credibile est, ex hac materia, velut emuncta, deteresa et pelluciditati suae reddita aura aetherea, tandem conrescere cometas, ut qui plerumque, cum primum videri incipiunt, ex Solis radiis emergunt, quasi ex vicinia Solis, hujus materiae patria, proficiscerentur. Ex materia porro residua post dissipationem cometarum fieri potest, ut tandem cogantur globi novi inter ipsas fixas.

Quid putas esse cometas? Cometae sunt trajectiiones aetherae rectilineae, constantes ex materia lucida condensabili et dissipabili, quod clarissime patet ex candis eorum, quae sunt effluxus quidam ex corpore in plagam Soli contrariam, per radios Solis, corpora permeantes, elicti, similes motu conusationibus illis, quae hic lu aëris nostri vicinia speciem exhibent coeli ardentis et ebasmatum.

Satis de aura aetherea; quaero jam de aëre, qua figura superficies ejus terminetur? Terminiuntur multo perfectius quam oceanus superficie sphaerica, lisdem de causis; quia scilicet ut lu densitate sic etiam in gravitate post aquas proximo est loco, nec aliter uisi in comparatione ad aquam levis dici meretur; alias si absolute levis esset, tendens suapte natura sursum a centro Terrae, Terram plane desereret. Fit igitur, ut in undis, aequilibrio partium, ut perfectissime rotundus evadat. Intelligendum est autem hoc de aëre tranquillo.

Quibus argumentis probas, aërem esse densiorem aethere? Duobus potissimum. 1) Quia quod supra aërem in aethere fieri negat experientia astronomica, id in ipsa curva aëris superficie omnino fieri testatur: ut scilicet radii

Fig. 18.




Solis, qui sunt alias lineae rectae, cum oblique incidunt in superficiem aëris, omnino refringantur deorsum et introrsum, quod in medio densiori fieri docet optica.

2) Quia aër Solis radiis illustratus tantis aë circumdat splendoribus, ut diem habeamus, Sole nondum orto, stellasque videre nequeamus; orto vero Sole nulla tam obscura camera est, dummodo vel minimo foramine aërem admittat, quae non colluceat intus luce aëris, licet Solis radiis aequumque pateat. Haec autem mutatio resplendescencia docentibus opticis est argumentum densitatis et colorum faeculentiae.

Recense aliquot occasiones, ex quibus intellectum est, stellarum Solisque radios in superficie aëris refringi et ad oculum refractos pervenire. 1) In eclipsibus quibusdam Lunae, quando centrum Terrae et centra luminaria sunt in una recta linea, fit ut simul utrumque luminare supra horizontem videatur, perinde ac si aon essent opposita, sed utramque simul in superiore hemisphaerio.

Fig. 19.



Hic A, H, C sunt centra Solis, Terrae et Lunae in una recta, ideoque Luna in umbra Terrae, O est oculus in superficie Terrae, BD est aër circa Terram. Radius AB frangitur in B deorsum et fit BO, sic ex CD fit DO. Ergo oculus, videns per refractos OB, OD, nec sciens illos in B, D fractos esse, per imaginationem continuat illos in directum sine fractione et existimat A esse in E, C vero in F, utrumque supra horizontem. Atqui si EO, FO vel linea mera essent, nondum illa ne sic quidem utrumque luminare A et C simul attingeret, quia O est extra lineam AC, sed vel neutrum luminare tangeret vel solum alterum.

tioem continuat illos in directum sine fractione et existimat A esse in E, C vero in F, utrumque supra horizontem. Atqui si EO, FO vel linea mera essent, nondum illa ne sic quidem utrumque luminare A et C simul attingeret, quia O est extra lineam AC, sed vel neutrum luminare tangeret vel solum alterum.

2) In iisdem eclipsibus Lunae apparet clarissime, quod umbra, quam projicit sphaera Terrae et aëris junctorum, diluatur in marginibus luce aliqua rubicunda inaequaliter, sic ut Luna, praesertim quando latera umbræ radit, licet tota sit in umbra, saepe tamen adeo rubeat, ut aliqua corporis sui parte adhuc lucero inque Solis lumine posita esse videntur, donec incipiente ea egredi, facus iste detegatur superventu puri luminis Solaris.

Haec vero lux, sic inaequaliter diffusa, non potest esse aliunde, quam a radiis, geminam refractionem passis, in ingressu sc. aëris itaque ejusdem egressu.

Nam si BOD fuerit una recta pluresque aëne supra O in aëre transruentes, tunc iisdem viis, quibus lux Solis et Lunae deferitur in oculum O, sc. per ABO, CDO, deferatur etiam lux Solis in Lunam, sc. per ABDC, ipsamque nonnihil illuminans, etsi in umbra totius globi versetur.

3) Hollandi, post Tartariam hibernantes, post noctem tres menses longam coeperunt videre Solem temporibus meridians, cum illa anni parte Sol horizontem noadam posset assequi, spatio graduum aliquot. Sequitur igitur, ut radii Solis, adhuc sub Terra versantis, cum in aërem incidissent, transiret longe supra capita Hollandorum, refracti declinaverint deorsum, ut in Hollandorum oculos incidereat. (Cfr. II. 44. 214.)

4) Cum Sol satis est elevatus, corpus ejus rotundum est, et dimetientes ejus omnes inter se aequales, ut facile est instrumentis aptis explorare. At eam Sol primum oritur, diameter ejus erecta per instrumenta subtilia brevior apparet diametro transversa speciesque Solis accurate contemplanti videtur.

compressa, formam ovi quodammodo imitans. Hoc igitur causatur refractione
radiorum. Nam docet optica, refractiones in magna Solis altitudine non esse
sensibiles, sed tum demum sensibiles evadere, cum Sol horizonti vicinus est.
Itaque quo humilior est quodque punctum, hoc magis refringitur ejus radius,
hoc etiam elevatius justo illud apparet. Cum igitur superior Solis margo
parum elevatior justo appareat, imus multum elevatior justo, imus igitur per
refractionem appropinquare superiori videbitur, itaque distantia superioris ab
inferiori, hoc est diameter erecta videtur contracta, transversa non itidem,
quia transversae extrema elevantur aequaliter.


5) Tycho Brahe modum aperuit, refractiones observandi quotidie, in stellis praecipue fixis. Verbi causa, cauda Leonis et Spica Virginis semper distant inter se arcu eodem circuli magni, qui est $35^{\circ} 2'$. Hoc instrumentis deprehendimus, quoties culminant, quoties et occidunt, quia fere simul occidunt. At cum in orientali parte coeli cauda Leonis acquirit altitudinem $34\frac{1}{2}^{\circ}$, Spica Virginis jam videri incipit in eodem fere perpendiculari, quasi oriretur, cum tamen re vera sit adhuc infra, quia plus quam $34^{\circ} 30'$, nimirum $35^{\circ} 2'$ a cauda Leonis distat. Causa rerum est haec, quia radius caudae Leonis pene nihil refringitur, propter altitudinem stellae satis magnam ab horizonte, Spicae vero radius multum refringitur, quia oriens in sphacrae aëris radiat obliquissime, multum igitur videtur elevari supra locum iustum et sic videtur appropinquare caudae supra se stanti.

Sit A visus in Terra, AEC linea horizontalis, cauda Leonis videntur per radium AH, refractus quidem in aëris puncto I, sed parum, et putetur esse in II. G Spica, quae per AG radium videri debuit, at non videtur, cum aërium sit orta super AC horizontem, itaque AG impeditur tumore Terrae AN. Nihilominus videtur per AE et putatur in C esse, quia GE refringitur in E, et refractus EA pervenit ad oculum A, qui oculus putat AE, EG esse unam rectam AEC. Itaque per angulo HAG deprehenditur angulus HAC minor.

Unde primum innouit astro-
nomis altitudo aeris? Ex comparatione quantitatis refractionum et cum oritur
sidus et cum in aliquam tollitur altitudinem.

Quae sunt ex opticis praescienda, ut methodus ista tradi possit? Primo, quo magis inclinatur radius Solis vel stellae super superficiem aëris, ut mediū densioris, hoc magis refringitur; itaque radius, qui sphaeram aëris tangit, plurimum in contactu refringitur. Radii tamen in puncto refractionis omnes se mutuo secant et superiorum in raro refracti in denso sunt inferiores. Secundo, proportio binorum refractionis angulorum componitur ex duabus proportionibus aliis, quarum una est inter angulos inclinationum, quarum sunt refractiones, constitutos intra medium densum, altera inter eorum angulorum secantes. Itaque data refractione unius inclinationis certa, dantur etiam refractiones ceterarum inclinationum. Tertio, cum aëris sphaera circumdet globum Terrae, unus igitur et idem radius in aëre aliter super Terram inclinatur, aliter super aëris cavam superficiem, et qui tangit Terram, radius nempe sideris orientis, is secat aëris superficiem. Quarto, eam observamus refractiones radiorum.

Fig. 28.



tunc eorum inclinationes capimus non super aërem, quippe ejus superficiës nec videtur et longe supra nos est, seu super Terram, in qua stamus; igitur indaganda est postea refracti inclinatio super cavam aëris superficiem.

Doce modum computandi altitudinem aëris ex data ejusdem radii inclinatione tam super Terram, quam super cavam aëris superficiem, et vicissim ex altitudine inclinationem. Formatur triangulum ex semidiametro Terrae nota, semidiametro sphaerae aëris, et radio; in quo triangulo noti sunt anguli ad extrema radii, seu inclinationes radii. Quare sicut se habet sinus inclinationis super aëris cavam superficiem ad semidiametrum Terrae, sic se habet sinus inclinationis super Terram ad semidiametrum sphaerae, compositae ex Terra et aëre, igitur excessus super semidiametrum Terrae est altitudo aëris quaesita.

Exemplum.	Sit inclinatio super Terram angulus DAO	90°
	sinus	100000
	AO semidiam. milliaria	860
		86000000
Sit ADO inclinatio ejusdem super cavam superficiem aëris \angle 8° 1', sinus	99940	
	799320	8
	604800	
	599640	6
	51800	0,5

Prodit DM excessus aëris super superficiem Terrae, paulo major dimidio milliari.

Quodsi fuerit data altitudo aëris et quaesita inclinatio super aëris cavum, vicissim factus ex semidiametro Terrae et sinu inclinationis super Terram dividetur per semidiametrum sphaerae aëris, quotiens erit sinus inclinationis super cavum aëris.

Quomodo ex refractione, quae fit in una certa radii inclinatione super aëris cavum, computari possunt inclinationum ceterarum refractiones, et vicissim refractionum ceterarum inclinationes? Utendum est regula quinque seu proportionum; multiplicata utraque inclinatione in suum secantem.

Exemplum. Sit inclinatio radii in rare super densi superficiem 89° 20', ejus secans est 8594561. Hujus inclinationis refractio sit 40'. Nam nunquam major est refractio complemento inclinationis super densum, semper fere minor. Queritur jam refractio ad inclinationem aliam 60° radii AI, ejus secans est 200000.

Ergo ipsius AE inclinatio 89° 20' dat 40, quid 60° inclinatio ipsius AI?

Secans 8594561	200000
773510490	Factus 12000000
5729708.	Refractio E 40
Factus 767780782	480000000
	767780782

Quotiens ostendit 48 particulas 77^{as} unius minuti, quae sunt 37 secunda, paulo plus. Tanta scilicet refractio sequitur in inclinationem 60° in I. 7)

Quodsi ex secunda refractione queritur inclinatio secunda, multiplicabitur secunda refractio in faetum ex prima inclinatione ejusque secante, factus dividetur in primam refractionem, prodibit faetus ex quaesita inclinatione ejusque secante.

Doce jam computare inclinationem refractorum super cavam superficiem aëris incognitae altitudinis. Ad hoc opus est ad minimum tribus refractionibus, quae observantur in tribus inclinationibus radii super Terram. Verbi causa, Tycho Brahe refractiones fixarum in altitudine 20°, hoc est inclinatione super Terram 70°, negat amplius esse sensibiles, itaque hujus inclinationis

refractio non debet multo major esse 1'; in inclinatione super Terram 89° facit refractionem 21', in horizonte vero seu in inclinatione plenaria super Terram 90° prodit Braheus quantitaletm refractionis 30'. Deinde per positionum regulam assumenda est refractio radii tangentis sphaeram aëris, quae non potest esse minor quam 30', quantam habet stella cum oriri videtur; potest vero esse major. Si ponitur 30', hoc est si plane refractus orientis stellae foris tangit aërem in refractionis puncto, jam simul cum hujus refractionis quantitate sumta est etiam inclinatio super cavum aëris, sc. 89° 30'.

Posita igitur hac inclinatione, ponitur simul (seu computatur conditioe hujus positionis) ipsa quaesita altitudo aëris methodo jam tradita exque data aëris altitudine accommodatur unicuique inclinationi super Terram sua inclinatio super aërem, ex inclinatione super aërem sua etiam refractio, ex altera methodo tradita.

Peractis omnibus operationibus, refractiones, quae prodent, comparantur cum his, quas observavit Tycho Brahe; si valde multum dissident, positio falsa fuit, estque ponenda refractio radii tangentis sphaeram aëris major maxima observatarum a Braheo.

Exemplum. Ponatur FDP refractio tangentis PD aequalis refractioni Tychonis horizontali 30'. Ergo radius tangens Terram (quippe in horizonte, super quem videtur oriri sidus) inclinari ponitur super aëris superficiem angulo ADO 89° 30'. Hinc IA vel DM altitudo aëris, intercedente computatione, ponitur esse particularum 38 de 100000 semidiametri Terrae MO vel AO, quae cum habeat 860 milliaria, quodlibet 32 stadiorum, facit igitur hae 38 particulae paulo admodum plus uno stadio.

Cum ergo sit posita altitudo aëris DM, quaeritur jam, radius KA inclinatus 89° super Terram, quantam inclinatur super aërem hunc. Ut si KAO est 91, quantus erit AKO?

Sinus 91° vel 89°	99981,7695		
Semidr. Terrae hac vice	1000000		
Factus	99981769500		
Semidr. sphaerae aëris KO	1000038	9	Sinus anguli AKO
	9000342		88° 53' inclinatio-
	9981349		nis super aërem.
	9000342	9	
	9810075		
	9000342	9	
	8097330	8097	

Sic ergo posita secundi radii inclinatione super aërem 88° 53', computetur ejus refractio ex refractione primi.

Primi inclinatio 89° 30' dat 30',	quid secundi inclinatio 88° 53',	
cujus secans 11459301	cujus secans 5131290	
1031337090	461818100	90°
5729650	5131290	1°
ex utroque 1025607440	456884810	
	513129	6'
	456171681	
	85521	1'
Factus ex utroque	456086160	
Refractio posita	30	
	13682584800	
	Quotiens 1025607440	

Prodit refractio in K 13' 41" circiter ad inclinationem super Terram 89°. Atqui Tycho hic majorem prodidit, scilicet 21½'.

Intelligimus ergo, positionem nostram falsam esse; falsam altitudinem aëris et

falsas inclinationes super aërem, quas ex illa fuerunt elicitaë. Cum autem minui non possit positio nostra, ut dictum, augentur igitur.

Quodsi, qui tangit aërem, ponitur majorem pati refractionem quam est Tychonis horizontalis, tunc jam longiori via primum est quaerendum, quatenam ex inclinationibus super aërem secundum positionem nostram exhibeat horizontalem Tychonis 30'.

Exemplum. Ponitur PD tangētis refractionis 1°. Ergo cum radius PD in raro tangit sphaeram aëris in D, refringetur gradu uno et refractus DQ non tanget Terram et inclinabitur intus super cavam aëris superficiem D gradibus 89 residuis, angulo sc. QDO, qui arcus ductus in suum secantem 5729869 facit 509958341, et hoc ductum in FDL refractionem datam radiorum LD, DA. sc. in 30', facit 15298750230, quod divide per refractionem positam 60', quotiens 254979170 est factus ex arcu inclinationis super aërem quæsitæ ejusque secante.

Multiplientis igitur aliquot angulis in suas secantes, nullus invenitur præter 88° 1', qui cum suo secante 2889400 faciat hunc quotientem.

Posita ergo refractione maxima tangētis PD 1°, ponitur radii DA, quem Sol oriens ad Terram mittit, inclinatio in aëre ADO 88° 1'. Posita hac inclinatione in aëre tangētis Terram DA, ponitur DM altitudo aëris ut supra dimidii milliari, seu in numeris aptioribus 60 de 100000. Posita hac altitudine aëris, invenitur secundum doctrinam superiorem radii KA, qui super Terram inclinatur 89° (diviso sinu arcus 89°, sc. 9998477, per 100060 semidiametrum aëris), inclinatio super aërem AKO 87° 46' 40''

cujus secans	2566340
	2566340
	28229740
	11°
	225837920
	88°
	518268
	12'
	42772
	1'
	14257
	30''
	570297

Fractus ex utroque	225267623
ducatur in refractionem	60

Et hic factus dividatur per factum	13516057380
refractionis 60', quotiens exhibebit 26 1/2' in K. 12)	509958341

Eodem modo radii, qui inclinatur super Terram 70°, refractione per hanc positionem refractionis maximæ invenitur 1 1/4'.

Atqui Tycho Brahe observavit illuc pro 26 1/2', 21 1/2', hic pro 1' 10'' sensibile nihil. Rursum igitur positio falsa est, quare inclinationes super aërem falsæ et altitudo aëris falsa. Cum autem assumeretur refractione maxima tangētis 30', prodierunt nobis refractiones reliquæ justo minores, hic cum assumeremus maximam 60, prodierunt justo majores. Veritas igitur est in medio et propior secundæ positioni quam primæ. Et sic tandem discimus, pro refractionibus, quas Tycho ndescripsit fixis, requiri altitudinem aëris paulo humiliorum 16 stadis seu dimidio milliari.

Num aliis etiam documentis hæc aëris humilitas confirmatur? 1) Pleraque montium juga, quæ perpetuis teguntur nivibus aut glacie, potiori anni parte super aëris superficiem eminere consentaneum est. Aër enim est vapor exhalatus; in omni vero exhalatione calor est saltem aliquis, at ubi nives et glacies, ibi frigus, ut radii Solis illas liquare non possunt. Ubi vero frigus, ibi nulla aut non constans exhalatio vel aër. Cogitur enim frigore in pruina et nives decidunt pondere tractus et nudat juga montium.

2) In Olympo monte Asiae, referente Aristotele, vita continuari nequit, nisi per spongas humectas anima trahatur. In America, Hispanis transeuntibus ex Nicaragua in Peruanam, in summis montium interjectorum jugis exspirant subito bene multi cum ipsis equis. (In indice »Erratorum« hæc legi-

mas: pro Nicaragua puto Castilia d'Oro aut Dariene legendum; auctore jam careo.) Causam scriptor confert in qualitatem aëris venenatum et penetrativam, addit vero, tam equos quam insessores obriguasse galu, mansisse autem statuarum instar usque ad ceterorum reditum, qui evaserant. Recte igitur colligi videtur, inter causas fuisse defectum aëris. Sic placeat, ad hauriendas undas creati, expirant foris extra undas detenti.

3) In eodem Olympo adeo nullos esse ventos confirmat Aristoteles, ut ne characteres quidem inscripti pulveribus a multis annis turbati fuerint. At ubi motus deest aëris, rei mobilissimae, souseque verisimile est aërem ipsum non continuari.

4) Nubes nullae, ultra quadrantem unius milliariae elevatæ, pleraeque multo humiliores deprensae sunt a mensuris in oris maritimis humillimis: quare nec aër multo altius continuabitur. Nubes enim sunt exhalationes seu nebulæ recentes, coque adhuc calent et calore subvehuntur longius, quam refrigerata materia.

Quomodo metimur nubis alicujus altitudinem? Non multo aliter, quam solent alias mensurari distantiae rerum inaccessarum, ex duabus veluti stationibus intervalli cogniti; ut si duo mensores simul uno momento diversis locis ejusdem nubis declinationem a vertice quadrantibus caperent. Cum autem raro contingat, duos nno tempore sic dispositos, instrumentis instructos et in eandem nubem intentos esse, mensuror unicus vicem duorum supplebit et duas veluti stationes eodem tempore obibat hoc artificio. Sole lucente nubem eliget, quæ recta vel contra Solem vel in plagam a Sole aversam vergat, notabitque locum, in quem nubis umbra cadat, tunc quadranto capiet declinationem a vertice primo nubis, deinde et Solis. Nam si alter mensuror staret in loco umbræ, nubes illi et Sol eandem hanc habituri essent inclinationem. Cetera per scalam altimetram expediuntur.

In schemate praesenti CE est perpendicularum ex nube, B. umbræ locus, A statio mensoris in eadem planitie, qui debet primo dirigere pinnacidia quadrantis in lineam AC et notare arcum, quem rescindit perpendicularum; is enim metitur angulum ACE; deinde dirigenda sunt pinnacidia in lineam AD, ut Sol per foramina transluceat; et arcus, quem rescindit perpendicularum, metietur angulum BCE. Tertio debet spatium AB metiri pedibus vel passibus. Tunc tangens anguli ACE auferendus est a tangente anguli BCE (si nubes C est contra Solem), differentia dividens numerum passuum inventorum, multiplicatam prius in sinum totum, prodit quotientem altitudinis CE.

Ut si nubes declinasset $21^{\circ} 48'$ tang. 40000

Sol vero $45^{\circ} 0'$ tang. 100000.

Differ. 60000.

Umbra vero abfuisset a mensore passus mille. Duc 1000 in sinum rectum 100000, factum 100000000 divide per 60000, prodit quotientem 1666 passus. Tanta esset altitudo nubis.¹³⁾

Si vero nubes esset e regions Solis, tunc tangentes essent addendi.

Estne constans aëris altitudo? Non est constans, sed crescit cum ipso calore per loca et tempora.

Non erit ergo constans quantitas refractionum? Non sane, sed id hoc cum discrimine. In locis maritimis constantior ut plurimum et pene semper

Fig. 21.



aequalis est refractione, quia superficies aëris est illis altior; itaque parum illud, quod diversis temporibus huic altitudini accedit, tanto minus sentitur locis illis. In locis vero montanis altissimis interdum refractione pene nulla est, praesertim hieme, quando aër humilis et minus vapidus; interdum est refractione insolens et pene prodigiosa, quod contingit etiam maritimis quandoque, sed per acciden- ob situm; quando scilicet magna vis vaporis ebullit ex montanis, qua iter est radiationibus in locum illum maritimum.


Brabus prodit etiam Solares refractiones aliquot scrupulis majores refractionibus stellarum, et quod consequens est, per aliquamultos gradus aëris sensibiles; ex qua re confirmari videtur, quod etiam aliunde sit verisimile, aërem matutinum accessu lucis diurnae augeri attollique, per noctem vero minui et deprimi.¹⁴⁾

Quid sunt crepuscula? Auctores Latini usurpant pro luce crepera, hoc est dubia, cum dilucescit. Astronomis est omne id tempus, quod intercedit primum sensu notabilem aëris claritudinem et ipsum Solis ortum; vel vicissim quod est inter Solis occasum et ultimum diurnae lucis in aëre vestigium.

Quae est causa hujus claritudinis absente Sole? Causae multae sunt, partim coelestes, partim elementares. Prima quidem efficiens causa, quae ceteras omnes ciet, est Sol ipse, non obstante quod sub Terra versetur nec feriat oculos nostros radio sive directo sive refracto. Altera causa coelestis est aura aetherea; Soli proxime circumfusa ad amplitudinem aliquot graduum, splendens ob Solis viciniam alias magis minus, quae tempus aliquod occupat oriendo, donec Sol ipse tandem oritur.

Tertia causa sunt fumi et exhalationes siccæ, calore Solis per diem aut radiationibus siderum harmonicis excitæ et super aëris superficie protractæ calore et tenuitate sua, quæ cum sint nobis altiores, citius a Sole et a splendente illo Solis amicta illuminantur, quam loca profunda, sicque super horizontem nostrum elevatæ, velut accensæ lampades, lucem a Sole acceptam nobis impertiuntur.

Quarta causa est aër ipse, modus causæ geminus. Nam aër vel clarescit directis Solis radiis, ut jam de fumis dictum, eosque revibrat, quippe cum sit densior aethere, ut supra dictum; vel praestat aër radiis Solis vicem speculi cavi eosque repercutit. Nam radii Solis cum primum ingrediuntur sphaeram aëris, refringuntur initio; deinde sic refracti percurrunt per aëris profundum, priores impingunt in Terram, quæ est a nobis versus Solem, posteriores praetervebuntur, tendentes versus nostrum locum, et occurrunt rursus cavæ aëris superficie; quæ etsi foras emittit secundo refractos, tamen et



repercutit tenuem eorum partem introrsum, cum sit laevis et specularis. Quos igitur repercutit introrsum, il rursus aequalem sphaeræ aëris arcum abscissuri impingunt secundo in superficiem aëris ulteriorem et sic successive, donec adeo debilitentur tot attenuationibus, ut non amplius valeant illuminare aërem sensibilibiter.

Ut hic FO refringitur in O et fit OK; occurrens autem su-

perficiat in K, representatur tenuiter in I, rursumque in H adhuc tenuius, quia pars ipsius OK exit per K, pars ipsius KI exit per I. Radius vero GM, refractus in M, fit ML et impingit in Terram in L. Posito ergo loco in superficie Telluris B, etsi Sol ei non est ortus, nec radius Solis GM illa ratione in B pervenit, quippe qui in L impingit, radius tamen ejus superior FO per OK, KI, IH venit ad aërem H, eum illuminans tenuiter, qui ideo potest crepusculi lucem in B censari, cum H sit loco B super horizontem, quem repræsentat linea BI.

Quomodo veteres demonstrarunt altitudinem ejus materiae, quae incendit crepuscula? Cum statulassent, materiam illam illuminari tantum a Sole, radiis tantum directis, ergo eo momento, quando primum in ipso horizonte ortivo fuit animadversa vel tenuissima claritas aëris, ex stellarum situ indagarunt numerum graduum, quibus Sol esset sub horizontem adhuc demersus; eum invenerunt 16, 18 vel 19 graduum; cum igitur totidem interessent gradus usque ad illum Terrarum locum, quo Sol oriebatur, stringens horizontem, statuerunt igitur, materiam, quae primum facit ludicium crepusculi, iuminere loco Terrae intermedio. Quare excessus secantis aëris dimidii super solum totum comparatus cum sinu toto arguebat altitudinem illius materiae super Terram.

Sit C locus noster, CD horizon et in illo, non supra illam, D aër albescent, quando Sol 16, 18 vel 19° sub horizonte. Ergo CB est 16, 18 vel 19°, et B est locus, cui hac vice Sol oritur, stringens eum radio BD et illuminans hoc radio materiam in D. Ergo cum tangent horizontem ambae lineae, tam CD, quam BD, connexis E, A, erunt aequales CE, EB arcus et quilibet 8, 9 vel 9½ graduum. Ergo setans AD 100983 vel 101247 vel 101391. Quoniam igitur AE 100000, talium DE altitudo materiae est 983 vel 1247 vel 1391, hoc est 8½ milliaria, vel 10, vel 11½.

Haec vero demonstratio omittit causas praeter Solem alias omnes, puta refractionem, repercussionem et lucidam materiam circa Solem, quibus positis aër fit multo humilior, quare non infert haec demonstratio necessitatem tantae altitudinis aëris.

Quo argumento probas, ad crepusculorum lumen formandum concurrere materiam lucidam circa Solem? Quia plerumque, maxime frigidioribus diluendis, aurora manifesta circulari figura (ut eam pingunt pictores) enititur, surgens in claritatem in medio alta, versus horizontem utrinque curvata, proportionem altitudinis ad partem horizontis interceptam non magna.

Proba, speciem hanc arcuatam non posse repræsentari ab aëre illuminato. Illuminatio aëria a Sole facta desinit in circulum mægnum, cujus dimetiens habet milliaria 1740, posita altitudine aëris milliaria 10. Cum igitur horizon tangere incipit hunc circulum, initium erit crepusculi abieritque circuli hujus contactus a vobis 9°, elevatus super superficiem Terrae particula 1247, qualem semidiameter est 100000, quia secans 9° est 101247. Ab eo momento transeant paucissima minuta temporis, intra quae Sol fiat uno gradu altior, ergo circulus illuminationis aëris jam a vobis abierit 8°, quorum secans 100983, itaque de aëris illuminati altitudine particulae 264 super horizontem eminebunt. Segmentum vero circuli, cujus semidiameter 101247, occupans particulas 264 altitudine sua, occupat in sectionis longitudine 14416, quod est altitudinis 55^{plum}. Ecce auroram intra 6 prima minuta a primo ejus initio 55^{plum} latiore quam altiore futuram, si solus aër (10 etiam milliaria altus) in causa esset crepusculorum, et hae 2 lineae, altitudo sc. et latitudo segmenti ex intervallo particularum 14054, quantus est tangens 8°, apparerent angulis 5° 1' et 131° 6', latitudo sc. 26^{plum} eoque amplius diffusior in horizonte, quam altitudo supra horizontem. Quanto absurdiora sequentur, si justam sumserimus aëris altitudinem, dimidii sc. milliaria? Non

potest igitur sola aëris illuminatio nobis hoc phaenomenon aurorae arcuatae saluare.

Fortassis igitur demonstrari poterit haec altitudo surgentis aurorae ex solo repercussu radiorum Solarium in aëris cavo? Minime; nam si tantummodo repercussibus iteratis ad oculum venirent radii ex Sole nondum orto, species repraesentaretur lineae rectae lucidae, versus Solem directae, non latior quam apparet ipse Sol, sicut fit in superficie fluminis crispati contra Solem.

Utinur ergo repercussibus non ad derivandos radios Solis in oculum, sed ad illustrandum totum corpus aëris nobis vicinius, ut incandescens porro se ipso luceat luce secunda.

Cum autem res sit certa de substantia lucida circa Solem, quid opus est adducere aërem in considerationem crepusculorum? Multa sunt hic aëris munia, quae nequit exsequi causa coelestis se ipsa.

1) Si ex una sola orientis plaga secundaria lux allaberetur, sic ut aër non undique collucret in plagas omnes, nunquam illucesceret in cubiculis ante Solis ortum et tabulae orienti obversae latus ocelluum esset in meris tenebris. 2) Substantia illa circa Solem lucida interdum deficit, crepuscula nunquam. 3) Substantia illa occupat regionem Soli vicinam, crepusculi lux paulo ante Solis ortum, praesertim aestate, coelo toto diffusa spectatur; totus igitur aër illuminatur, etiamsi nondum tangatur undique Solis radiis. 4) Manifesta cernitur distinctio peno semicircularis e regione Solis inter partem aëris superiorem illuminatam et inferiorem, vel mane nondum illuminatam, vel vespere jam desertam a radiis Solis, quod emphatice tribus verbis expressit Virgilius: *ruiit oceano nox*. Hanc autem speciem non valet exprimere substantia lucida circa Solem. 5) Crepuscula variant diuturnitate, etiam cum causa coelestis non variatur. Nam in quibusdam terris, ut de Chilensi testatur Josephus a Costa, crepuscula sunt brevissima, sic ut intra quadrantem unum horae ex profunda nocte fiat dies clarissima, Solem ipsum enixa. Oportet igitur praeter ascensiones rectiores, de quibus libro III, etiam aërem inter causas admittere, qui locis illis purior, pellucidior minusque illuminabilis fit, quam penes nos. 6) Praebent huic rei testimonium etiam diversae partes anni. Diebus enim hibernis crepuscula sunt brevia, quia defectu caloris aër est humilis, aestivis contra sunt longa et pernoctia, quia caloris excessu aër est altior. Nam substantia circa Solem lucida, etiam variabilis est, non observat tamen circuitum caloris et frigoris elementaris, ipsa coelestis existens; nec sufficiunt solae causae astronomicae, libro III. explicandae, ad efficiendam hanc varietatem. 7) Quin etiam eodem in loco, iisdem temporibus anni pro mutationibus aëris variantur crepuscula. Tempore enim hiberno post gelu, quando ad stimulum aspectuum subitanea resolutio frigoris ingruit, maturius discedit. Vapor enim ebulliens ex terra, qui frigus solvit, qui parietes incrustat prius humectatque, qui ventos et pluvias gignit, idem etiam in majorem evehitur altitudinem vi caloris sub terra adscendi, ut et maturius et fortius a Sole illuminetur vicissimque illuminet. Causa vero coelestis, seu materia circa Solem lucida non tam facile et celeriter mutatur, ut postularet hic effectus, nec sentit stimulum illum aspectum, quia aspectus formatur tantum in Terra, non eodem tempore etiam apud Solem.

At repercussus radiorum in cava superficie aëris non videtur admiscendus? Imo ex septem munis aëris jam explicatis secundum sic est comparatum, ut sine hoc repercussu nequeat praestari. Aër enim, cum certo sit tam humilis, deficiente substantia circa Solem lucida, non posset illuminari in

tanta Solis profunditate 18°, si non lux Solis quasi per multas manus, ordine se mutuo consequentes, id est per multa repercussiones puncta ad nos usque derivaretur.

Ut tamen, si libet, pro repercussionibus specularibus revibratione, seu illuminatione remotiorum aëris particularum a vicinioribus Soli; sicut cum Sol illuminat nubem, nubes tectorum in platea, tectorum tabulata domus interiora, tabulata faciem scribentis, facies papyrum, rursum prorsumque. Illud solum tene ex optice, utcumque vibratio lucis mutuatitiae differat a repercussu, certe ex hoc tamen illam derivari.

Quid sentiendum de stellis discurrentibus inque Terram cadere visis, quarum initio facta est mentio? Discurrentes stellae sunt nihil aliud, quam flamma depascens materiam aridam, ex terra excretam et in longum extensam, ut solent quaedam nebulae vel nubeculae; quam materiam incendit circumstantia frigoris superni. Stellae cadentes sunt materia viscida inflammata. Earum aliquae inter cadendum absumuntur, aliquae vore in Terram cadunt, pondere suo tractae. Nec est dissimile vero, quasdam conglobatas esse ex materia focculenta, in ipsam antram aetheream immixta, exque aetheris regione tractu rectilineo per aërem trajicere, cum minutos cometas, occultata causa motus utrorumque.

Cum autem haec omnia sint momentanea, nec revolutionem primi motus, qui est omnium celerrimus, morentur, quare ad physicos et meteorologiam spectant, ex astronomia vero et doctrina sphaerica sunt eliminanda, quippe in qua nihil momentaneum, sed tantum illa, quae oriuntur et occidunt cum revolutione diei, consideratione digna censentur.

Qua ratione fit, ut interdum stellae fixae communiter omnes appareant usque adeo magnae, scintillationibusque adeo flagrent? Ne hoc quidem stelliis ob motum aliquem astronomicum accidit, sed tantum ratione aëris. Cum enim ingruunt pluviae, primum in Terrae visceribus oritur vapor multo densior, quam aer communis, tangitque et veluti inundat ocnios: non amplius igitur est consueta differentia inter pellucas tunicas oculi et inter pellucidum medium aëris; mutata vero proportionem mediorum, per quae transeunt radii, mutantur refractiones linearum, quibus fit visio; mutatis his refractionibus, coni punctorum visibilia, quos penicillos dicere solemus, obtusiores fiunt, quae tangunt et pingunt retiformem tunicam oculi, atque ita non puncta in oculo singula a punctis singulis visibilia, sed superficulae in oculo a punctis pluribus visibiles rei vicinis imbuuntur, superante pictura lucidorum, oblitterata vero obscuriorum. Sic itaque latiori parte sensorii instrumenti non ampliores tantum stellae repraesentantur, quam sunt, sed etiam scintillationes earum reales fortius movent visum; quae omnia in optice inque modo visionis vero et genuino demonstrationibus innixa sunt clarissimis et jucundissimis.

Cur autem in horizonte potissimum et quotidie Sol, Luna et constellationes tam magnae videntur; atqui prius contrarium efficiebant refractiones, scilicet res in ortu vel occasu se ipsis minores apparentes? Diversissima sunt in optice dimensio angulorum visivorum per instrumenta et aestimatio. Sol, Luna et constellationes, si magnitudines earum apparentes, id est angulos visorios instrumentis dimetiamur, nequaquam inveniuntur in horizonte majores, quam in medio coeli, sed potius secundum erectas diametros nonnihil minores, ut hactenus ostensum recte fuit. Aestimantur autem majores secundum omnes diametros, cum oriuntur et occidunt. Aestimatio enim colligit magnitudinem visibilis rei ex distantia, distantiam ex comparatione ad

alia corpora. Jam vero cum constellationes versantur in coeli medio, corpus aëris nec profundum est respectu aspectabilis latitudinis terrarum, nec, si profundum esset, conspici potest; igitur ex absentia corporum interjectorum ratio- cinatur sensus communis per errorem, sidera, cum sunt in coeli medio, nobis esse propinquiora, quam cum oriuntur et occidunt; tunc enim censentur re- motiora, quia valles et montes inter nos et orientia sidera longissimo tractu interjecti patent oculis. Sequitur igitur error alter, ut Sol, qui manet ejus- dem magnitudinis, aestimetur culminare parvus admodum, oriri vero ingens, ut gigas. Eorum enim, quae videntur eodem angulo visionis, illa sunt ma- jora, quae remotiora, ut docemur in optica.

PRINCIPIORUM DOCTRINAE SPHAERICAЕ

PARS QUARTA.

DE LOCO TELLURIS IN MUNDO EJUSQUE PROPORTIONE AD MUNDUM.

Si totus mundus clauditur superficie rotunda, quem igitur in locum mundi refers globum ex terra et aqua coagmentatum et aëre amictum? Supra ex visione probatum est, Terram cum toto mundo mobili esse intra complexum cavi concamerati a firmamento seu a stellis fixis. Cum autem spatium hoc cavi a stellis fixis vacuum sit amplissimum adeoque inaestimabile, nondum scitur ex haecenus dictis, quo loco hujus cavi spatii Terra collocetur, sitne in ipsissimo centro mundi, an in aliquo alio loco hujus cavi, paululum extra centrum. Probabitur autem libro potissimum quarto: 1) Solem esse in ipso centro mundi, quare Terram extra centrum esse oportere. 2) Terram annuo motu ire de loco in locum circulariter, itaque Terram in centro mundi esse non posse. 3) Quod planetas attinet, Terram esse abditam intra circulationes Saturni, Jovis et Martis, circa vero circulos Veneris et Mercurii corpusque Solis, quod intimum in his circulis occupat locum, circumire; vicissim autem a Luna, comite suo, flexuoso motu circumiri.


Sed haec nihil ad motum primum faciunt, cum hic versemur in principiis, ad illius solummodo primi motus explicationem necessariis. Itaque sufficit ad explicationem motus primi, ut Terram collocemus in centro illius motus, etsi non sit in centro totius universi. Nam posset esse Terra centrum primi motus, etiam si non esset intra cavum illum fornacem fixarum inclusa, sed plane inter ipsas fixas consisteret.

Unde acis, tantum esse spatium intra cavam fixarum sphaeram? Quia cum semidiameter Telluris contineat millaria Germanica paulo minus nongenta, tota tamen ista longitudo prae ingenti fixarum a Terra distantia pro nihilo est nec in sensu incurrit, adeo ut non tantum centrum corporis Terrae, sed etiam quilibet oculus in superficie Terrae, nongentis fere milliaribus a centro distans, possit haberi pro centro primi motus, ipsaque adeo tota Terra, tantae corporis amplitudinis, pro mero puncto.

Proba, semidiameter Terrae in primo motu evanescere. 1) Transversa diameter corporis Solis, quod multo propius est Terris, quam ulla fixa, nihilo


major deprehenditur instrumentis in medio coeli, quam cum Sol eernitur oriri; cum tamen oculus, in superfice Telluris constitutus, totius semidiametri intervallo propior sit culminanti quam orienti. Idem tene de angulo distantiae binarum fixarum simul orientium. At quanto culminantes appropinquant nobis magis quam cum oriuntur, tanto et apparet earum distantia major culminantium quam orientium. Cum igitur ad sensum non augeatur distantia inter se binarum culminantium, neque igitur ad sensum augebitur appropinquantio, et sic vera appropinquantio per 900 millaria non erit sensibilis, comparata ad ingens intervallum inter illas et Terram.

Fig. 23.



Atqui stellarum sub aequatore dies, ut ita dicam, aequales ad sensum deprehenduntur noctibus, ad sensum igitur aequalis est distantia stellae, tam fulgentis in coeli medio, quam sub horizontem demersae, ac proinde ad distantiam stellae a Terra comparata ejusdem culminantis major quam orientis appropinquantio, quae est unius semidiametri Terrae, non est sensibilis.

Fig. 24.



residens, per quem latet stella.

3) Denique quocunque loco superficiei binae stellae diametraliter eernuntur oppositae, sic ut oriente una occidat altera et vicissim, illae sic apparent oppositae in omnibus aliis locis superficiei Terrae. Etiamque in eodem loco pone, oculum inveniri in recta, quae duas e diametro positas fixas connectit, ut sic utraque simul cerui possit in contrariis horizontis partibus; postquam illud hemisphaerium sese potiori parte condiderit apparueritque hemisphaerium reliquum, et stella, quae fuit in occasu, venerit in ortum: quae prius in ortu

Si sint AD, vel AC, BC, et DO, DP aequales, CO, CP sunt una semidiametro DC breviores. Si ergo AB et OP est constellatio eadem, erunt anguli BCA et ODP aequales, ac proinde OCP major, quippe aequalis duabus CDP et CPD.

2) Quodsi motus primus est aequabilis et circularis, ut sequenti parte docebitur, et si centrum primi motus et corpora Telluris idem est, quod jam sequimur, oportet stellam aliquam, in medio primi motus circulo moveri visam, tanto latere diutius tantoque videri brevius, quanto, cum videtur in coeli medio, propior est, quam cum non videtur supra horizontem.

Moveatur Terra seu oculus in ejus superficie circa centrum A sitque F stella propinqua et quiescat: videbitur igitur F oriri, cum oculus est in B, culminare, cum ei propinquat oculus in C, occidere, cum oculus in D, ut B, D sint puncta, in quibus rectae ex F tangunt Terram. Patet igitur, quod F videatur, oculo moto per arcum BCD brevior, lateat per arcum residuum multo longior, idque ideo, quia F stella tam propinqua est.

Moveatur e contra fixa circa centrum A et quiescat Terra seu in ea oculus in puncto C, cujus horizon sit ECG: videbitur igitur oriri stella in G, culminare in F, occidere in E, eritque rursus brevior arcus stellae GFE, per quem apparet, longior arcus

nerat, rursus simul eodem momento spectabitur in occasu. Oportet ergo totam Terram esse minore stellis ipsis fixis.

Si autem corpus Terra ipsa majus tam apparet parvum, oportet longissimo intervallo seu innumerabilibus Terrae diametris remotum esse.

Sit AC Terra, BAD horizon loci A, ECF horizon loci C oppositi: si ergo uterque incidit in stellas B et D, sic ut possit utraque videri tam ex A, quam ex C, oportet BE vel DF esse maiora corpora ipsa AC.

Fig. 25.



An non quantitas haec apparitionis constellationum constans docet nos, quod Terra sit in ipso etiam constellationum omnium adeoque et totius mundi medio, ut vulgo argumentantur? Non simpliciter valet argumentum de ipsissimo mundi medio, sed sic: 1) Quia omnibus unius noctis horis eadem quantitas cujusque constellationis instrumentis deprehenditur, hinc sequitur duorum alterum, ut Terra vel in centro sit uniuscujusque circulorum, per quos moventur constellationes motu diurno, vel si ipsa quiescentibus fixis motum hunc apparentem praestet, ut tunc maneat distantia ejus a sideribus invariabilis, non atteato, ubi sita sit, in centro universi, an extra.

2) Quia omnibus anni partibus durat haec apparitionis quantitas, illud insuper demonstratur, Terram toto illo tempore nihil, quod in comparatione cum distantia sensu notari possit, recedere a fixarum ulla, nihil ad eam accedere. An vero Terra recedat aliquo intervallo, quod per se satis quidem magnum, at respectu ingentis fixarum distantiae insensibile sit, per hoc argumentum non patet. Sicut e contrario, quia planetae non semper nec omnibus anni partibus apparent ejusdem quantitatis, inde patet, intervallum hos inter et Terram certo variari. An vero Terra ad planetas, an hi ad Terram, an vero utrique ad alteros accedant recedantque, per hanc argumentationem manet indiscussum examinandumque relinquitur doctrinae theoricæ. Nihil enim interest doctrinae sphaericae, utcumque hoc comparatum sit, cum ista mutatio magnitudinis apparentis non fiat intra unam diem, qui modalis temporis motui primo, doctrinae sphaericae subjecto, praescriptus est.

Circuli sphaerae maximi dividuntur ab horizonte terreno bifariam, semper enim media pars cujusque conspici potest, et de aequatore semper media pars oritur 12 horis, ut apparet in aequinoctiis, quando Sol in aequatore est. Hocne sufficit ad asserendum Terrae centrum mundi? Hoc quidem evincitur, Terram esse centrum circulorum maximorum sphaerae, quam oculus sibi imaginatur quovis tempore. Interim per hoc argumentum potest visus ille esse extra centrum totius universi. Nam circuli sphaerae imaginatione visus existerent etiam tunc, si Terra longissime a suo loco exularet, aut si visus in Luna vel Jove aliove planeta esset, ut audiemus.

Circuli coeli et Terrae proportionalia eveniunt tam in longum, quam in latum. Nam ubicumque 15 miliaria Germanica in Terra efficiunt unum gradum in coelo, ubique hora in Terra efficit 15 gradus in coelo; oportet igitur idem eorum centrum esse, centrum scilicet Terrae, ut rectae ex illo eductae abscondant arcus proportionales. Collectio conceditur, quia sonat non de centro machinae mundanae, sed tantum de circulis sphaerae, quam oculus sibi circumjectam esse imaginatur, eoque ipso se ipsum in illius centro collocat faceretque idem, quemcumque in locum mundi transponeretur. Etsi praepostera est forma collectionis, non enim ideo Terra in circulorum omnium

centro est, quia circulis Terrae et coeli eveniunt proportionalia, sed ex adverso ideo eveniunt circulis Terrae et coeli proportionalia, quia visus et ratiocinatio circulos coelestes ex centro Terrae describunt.

Si Terra non esset in medio, videntur non futura aequinoctia, Sole in medium circulum veniente. Sane ex aequinoctiis probatur, Terram esse in sectione communi zodiaci cum aequatore, et sic in utrinque plano inque centro aequatoris, ut patebit ex doctrina sphaerica. At non est necesse, ut Terra sit ideo in centro totius universi. Nam etiam sic erit in plano zodiaci, si ipsa motu suo circa Solem (et sic extra mundi centrum) describat zodiacum cum sub fixis per imaginationem; etiam sic erit in plano aequatoris, si motu sui corporis diurno circa axem suum describat circulos per imaginationem sub fixis parallelis eorumque medium aequatorem, quocumque in loco mundi sic rotetur. Nam si Terra in alia aliqua regione mundi et rotaretur circa axem et ferretur circa Solem, per alias etiam fixas hi circuli imaginando transirentur.


Si Terra non esset in medio mundi totius centro, nunquam conspiceretur media praecise zodiaci vel mundi pars supra horizontem, sed vel plus vel minus, nisi tantum eo momento, quando zodiaci vel mundi centrum oritur. Ut si sint NM vel CE horizontis lineae, secabunt mundum in inaequalia, sin IA, tunc in aequalia, quia A centrum incidit in IA horizontem. Verum est, quod obicitur, at nihil habet absurdi, nihil contrarium experientiae manifestae. Quis enim mensus est unquam id, quod de mundo simul uno intuitu comprehendit? Quantaenque tamen mundi portio quovis tempore cernatur, ea imaginatione sphaerae, circa visum descriptae et horizonte circulo bisectae, censetur esse perfectum hemisphaerium.

Pone Terram O esse medio loco inter I extremitatem veri zodiaci seu fixarum et inter A centrum: itaque COE, quae est ipsi AI ad rectos, resecabit CIE tertiam partem, eritque CNE arcus duplus ipsius CIE. At nihilominus visus in O constitutus haberet arcum CIE pro semicirculo, non minus quam arcum CNE. Fixas enim omnes in ICN transferret per rectas ex Oeductas in circulum minorem ex O descriptum.

Signa bina, in quorum uno cernitur Luna deficiens, in altero Sol, non viderentur ex Terra invicem opposita, si Terra non esset in medio. Equidem si Terra non iuter Solem et Lunam intercederet, non videret luminaria in locis oppositis. At cum Luna deficit, Terra interlocatur iuter luminaria, quia ipsa Terra est, quae umbra sui corporis Lunam involvit. Ergo vicesse est, Lunam deficientem in opposito Solis spectari, quocumque Terram eclipsantem cum Luna eclipsata reposueris.

Semper oriente Luna eclipsata Sol occidit oriturque occidente illa eclipsata, et hoc per totum Terrae ambitum, ubicumque eclipsis in horizontem incidit. An non hinc probatur, Terram esse in medio mundi? Non sequitur hoc, sed solum illud, Terram cum luminariis in eadem linea recta esse, quando Luna deficit. Posset autem idem fieri, si Terra cum orbe Lunae proxime ipsas fixas collocaretur. Apparetque idem necessario etiam in globo

Fig. 28.



Jovis, posito quod in eo sint observatores siderum, cum eclipsantur ab illo quatuor Lunulae Joviales, non obstante, quod Jupiter longissimo extra medium mundi circumit.

Terra nec est in plano aequatoris extra axem mundi, nec in axe mundi extra planum aequatoris, nec extra utrumque simul, ut colligitur ex multis signis seu effectibus apparentibusque: ergo erit in utroque simul et sic in medio mundi seu in centro. Bene habet enumeratio partium, at plus inducitur, quam praemissa postulant. Vere quidem Terra est tam in axe quam in plano aequatoris et sic in centro sphaerae, imaginatione circa visum circumjectae, at nihil bine sequitur ad ipsum mundi medium, cum alia possit esse figura mundi, alia figura sphaerae imaginata, utraque quidem rotunda utique, sed numero differentes et situ. In specie vero si Terram Copernicus extra mundi medium ponit eoque et motum ei geminum attribuit, de quo in parte sequente: jam non opus est, ut situm Terrae in medio sphaerae signis, effectibus vel apparentibus confirmemus, quin potius a priori et ex causis illam habemus. Ideo namque Terra est in axe mundi, quia axis mundi nihil est aliud quam axis corporis Terrae, circa quem illa diurno motu circumagitur turbis instar, continuatus per imaginationem utrinque usque ad fixas. Ideo Terra est in plano adeoque et in centro aequatoris, quia aequator nihil est aliud quam circulus Terrae maximus, inter polos medius, plano per imaginationem usque inter fixas continuato.

Forsitan ergo physicis argumentis evinci poterit, Terram obtinere medium mundi locum. Graviorum enim haec est natura, ut ferantur ad centrum mundi, si sint extra id. Si ergo Terra esset extra centrum, cum sit corpus grave, citissime in centrum recideret, aut gravia ab illa soluta ex altera parte Telluris, quae vergit in centrum mundi, ferrentur a Terra ad centrum, quod experientiae repugnat; undique enim gravia versus Terram cadunt, quae cum sit rotunda, centrum igitur mundi necesse est intra corpus Terrae esse. Negatur anteedens. Non est enim haec natura gravium, ut ferantur ad centrum mundi, quatenus centrum, sed haec, ut ferantur quodlibet ad centrum sui corporis, sive in mundi centro illud sit, sive alibi, et hoc tunc, si grave propositum vicinum sit illi corpori et minus illo. Sin autem gravium corporum aliquid poneretur seorsim, extra virtutes tractorias corporis sui, ut si globorum mundanorum aliquis quocunque mundi loco reponatur, sic ut a fortiori per virtutem magneticam nequeat attrahi, in hoc casu gravia cessant esse gravia, carent enim motu in plagam quancunque, adeoque a natura instructa sunt ad resistendum quadamtenus motui, ab extra sibi illato.

Quomodo probas, gravia non ferri ad centrum mundi? Ratione et experientia.

Proba ratione. Si verum esset, gravia ferri ad centrum mundi, causa hujus motus vel esset extra gravia vel intra illa. Quodsi extra, tunc vel naturalis esset, residens vel in ipso mundi centro vel in extremitatibus, vel esset violenta, propter mundi motum. Rursum si causa motus esset interna, vel esset appetitio centri, vel fuga ab extremitatibus mundi. At cum nihil horum esse possit, relinquatur igitur, motum gravium non esse ad centrum mundi.

Quare centrum mundi non possit attrahere, aut extremitas repellere gravia? Quia centrum nihil est, nisi punctum mathematicum, et vero in non corpore nulla vis inest ad motum inferendum. Ac cum quantitas nulla sit efficacia, multo minus erit aliqua efficacia puncti, quod ne quantitas quidem est, sed terminus saltem lineae, quantitatum exilissimae. Eodem modo

nihil est extremitas mundi nisi sphaerica superficies, quae, in quantum est figurae mundanae extremitas, omni caret efficacia.

Proba, neque violentia motus mundani excuti gravia in medium. In motu circulari violento si qua petunt medium totius rei mobilis, illa oportet esse leviora re ipsa mota, ut in vorticibus ligna et paleae sunt leviora, quam est aqua ipsa rotata in gyrum; ibi namque major a rotatione sit impressio in corpus aquae, quod gravius est, ut impetu ruat et rectitudinem affectans extrema circuli petat centrumque veluti exhauriat, quo facto leviora lunantia, cum propter minorum impressionem motus in ipsa tardioresque motum destituantur et ab aquis velocioribus introrsum repelluntur, tum etiam propter declivitatem centri in medium naturaliter influunt. At si ponimus mundum rotari, in quo est aura aetherea et corpora per illum errantia. Terra utique non erit levior aura aetherea. Nihil igitur juris erit motui mundi violento in Terram et gravia, ut in centrum illa detrudat.

Ex adverso solet motus violentus, horizonti parallelus, cum gravia corripuit, incitare illa, si soluta a rota fuerint, et in lineam rectam a circumferentia circuli excurrere. Quare, si violentia motus mundani redundaret in Terram et gravia, potius illa a medio eiceret versus extrema; Terra enim grave corpus esse ponitur. Adde, quod si motus diurnus inesset toti mundo, is violentus dici non posset, cum propter perpetuitatem, tum etiam propter simplicitatem, cum quibus violentus motus nequit consistere. Motus enim ideo violentus est, quia repugnat alii motui, qui naturalis est rei mobili: corpora enim, imposita vortici vel rotae, gravitatem habent, qua vergunt extra illa sua loca et extra lineam motus violenti, versus centrum Terrae: locus est igitur pugnae inter motus ad diversa loca, alterius in circulum, alterius deorsum, unde existit quassatio, Schwingung. At non sic se res habet cum Terra, cujus motus est vel ad centrum mundi ipsum, ut vult objectio, itaque non opus erit illi violenta excussione in illud, vel nullam plagam appetit se ipsa, itaque raptus ille violentus non erit, quia nulli motui Terrae naturali contrarius.

Est etiam insufficiens causa. Nam ut dem, compelli gravia in medium circuli, nondum acquiritur, Terram in medio totius mundi esse, sed bene in axe, in quo sunt ordinata omnium parallelorum centra. Denique ponuntur inconcessa, scilicet diurnum motum inesse ipsi mundo, quod aequanti parte negabitur.

Dicamus igitur, causam huius motus gravium ad centrum mundi esse internam et gravia ipsa centrum petere, aut ab extremitatibus fugere? Dicendum itaque juxta fuerit, et quomodo centrum mundi petant aut ab extremis fugiant, et quare? Centrum enim est punctum mathematicum, quod describitur aequali distantia ab extremis rotundi corporis. Cum igitur gravia sint corporeum quid, centrum et extrema solo capiuntur intellectu, quo carent gravia, quatenus gravia: non igitur quaerere poterunt motu suo centrum, ut centrum, vel ut intimum mundi punctum, nec fugere a superficie, ut ab extremo sphaerae, et si possent, tamen causa non erit, cur potius hoc fugiant, illud petant, quam contrarium.

Modus, quo tenderent gravia ad centrum aut eo expellerentur, posset esse iste: si corpus in extremitate mundi locatum virtutem emitteret usque ad gravia, quae vel pelleret gravia vel fugeretur ab eis? At rationabile non est, vim corpoream extremam sphaerae tam longe sese porrigere tamque exquisitam esse in minimis, ut ad unguem aequalibus undique diametris expellere possit in medium adeoque primum atque grave latum pedem a centro mundi

recesserit, statim extrema portinnacula sphaerae stellatae, quo vergit grave, vim sibi factam et onus ingruens persentiscant seque ad id repellendum accingant cumque ceteris sphaerae portionibus viribus contendat in onere expellendo et rursum prorsumque trudendo. Multo absurdius tanta subtilitas tribuatur gravibus ipsis, internoscendi hanc virtutem ejusque radios, unde quilibet descenderit et quinam ex iis longior, in tanta omnium longitudine. Nam virtutes magneticae habent suos orbes proportionatos secundum densitatem corporum a quibus defluunt, ut non in infinitum extendantur.

Est etiam fuga corporum per se contraria naturae, si non sit propter aliud; appetitio vero mutua corporum seu initio, conservationis rudimentum, naturae potius est consentanea. Rectius igitur philosophatur, qui motum gravium definit per vim unionis corporum inter se similitum, quam qui fuga contrariorum.

Quodsi res ad virtutes e corporibus emissas revolvitur, tunc suppetente hac causa motus gravium in corpore propinquo Telluris, non opus est accersere aliam a corpore coelesti remotissimo. Et concessa tali virtute in corpore Terrae, attrahendi gravia, defenditur motus gravium ad centrum Terrae, etiamsi Terra non in centro mundi fuerit, sed alio quocunque mundi loco.

At fugient gravia ab extremis, ut a loco nobiliori, transibuntque ad intima, ut ad locum ignobiliorem naturae ingenio? Haec quoque ratio in superioribus est refutata, nam aut in corporibus consistit haec nobilitas et sic in emissis virtute, aut in figura. Non in corporibus et eorum virtute, ut jam probatum; non in figura, quia figurae nulla est efficacia sine corporis respectu et quia gravia, ut talia, carent intellectu, quo figuram percipiant.

Gravia igitur ad centrum mundi feruntur per accidens, quia naturalis mutua attractione feruntur ad Terram, quae est in centro? Manifeste principium petitur. Locus Terrae probandus fuit a motu gravium, jam motus gravium ex loco Terrae, veluti evicto, deducitur. Sane ad Terram feruntur gravia naturali attractoria virtute eaque mutua, id autem fit nullo loci respectu, posset enim fieri, si Terra esset in mundi centro, potestque, dum est Terra extra centrum.

Probat Aristoteles, motum gravium ad mundi centrum tendere, ex eo, quod motus levium fit ad superficiem mundi, cum gravium et levium motus tendant ad plagas contrarias. Gravia et levia tantum per comparisonem dicuntur, non absolute. Si ignis, si fumus absolute levia essent corpora, evolarent a Terra sursum usque in extremum coelum. Atqui fumorum nubes, ubi superaverint densum hunc aërem, cernuntur quiescere pendinae, quod argumento est, non ipsos per se sua natura vel extrema petere mundi, vel a centro etiam Terrae fugere, sed urgeri a gravioribusisque cedere, ut librae lances, utraque gravis, altera tamen superiora petit, quippe tracta a graviore. Ergo falsum est, gravia se ipsis petere superiora, falsum, petere ipsam extremam mundi superficiem.

Etsi vero verum est, ex altera parte motum levium esse quasi versus superficiem mundi extremam, id tamen est per accidens, fitque, etiam Terra non in centro constituta, ubi a parte contraria motus levium plane versus mundi centrum tendit, si id ponatur supra verticem, idque etiam per accidens, propter situm Telluris et plagas. Neque tamen ideo levia ex illa plaga descendunt in coelum, neque gravia ascendunt versus inferiora Terrae, seu centrum, sed illa ascendunt versus suas plagas, quia ascendere est a centro Terrae (non a centro mundi) fugere, descendere est centrum Terrae (non centrum loci

mundi) petere. Quare sicut non sequitur: levia ex una parte feruntur versus mundi centrum, ergo gravia ferantur ab ejus centro, ita nec contrarium sequitur: levia ex altera parte feruntur a centro mundi ad superficiem, ergo gravia ad centrum mundi.

Proba jam etiam per experientiam, gravia quaedam non ferri ad centrum mundi, cum ferantur tamen ad sui corporis centrum. Patet id ad oculum in globo Lunae, qui cum sit ejusdem naturae cum Terra in hoc, quod in extrema sua superficie habet montes et valles, continentes et maria, neque tamen sit Luna in centro mundi, quod recipiunt omnes, gravia tamen, ut sunt aquae Lanares, neque in Terram neque in medium mundi decidunt, sed insinuant se ad loca proxima centro globi Lunaris.

Unde scire possumus, in Luna esse loca alta et depressa, inque depressis aquae? Primum docet optica, telescopii Belgici adminiculo et demonstratione plae necessaria, partes Lunae luminosas elevatas et exstantes esse a centro globi sui valdeque asperas; partes vero maculosas et subnigras esse etiam depressas et planas, ut est continua planities. Nam partes clarae cernuntur illuminari et citius, quam maculae, et inter se valde inaequaliter seu sparsim. Oriuntur enim in mediis partibus umbrosis quaedam veluti puncta luminosa, quorum lumen augetur tam diu, donec tandem omnes interjectae umbrae eliminantur continuatione lucidarum partium. E contra maculosae partes illuminantur tardius et transit per illas terminus lacis et umbrae (cum Luna bifida est) aequali recta linea, nulla varietate vel mixtura lucis et umbrae. Haec igitur certissima sunt ex opticis, nigram materiam acquabili superficie esse in partibus Lunae depressioribus seu lacanis.

Jam deinceps haec sic optice demonstrata assumens physica et cum illis, quae penes nos in Tellure sunt similia, comparans, ex altitudinibus, asperitate et claritate partium globi Lunae siccam seu aridam, coallescentes scilicet et moates a Sole illuminatos, ex maculis seu nigredine et aequilibrate humilium seu aquas, ex depressione demum gravitatem seu inclinamentum versus centrum globi ratiocinantur.

Terrae, ignobilissimo totius mundi corpori, competit locus etiam ignobilis. Erit igitur in centro mundi? Multis vitiis laborat argumentum. Primum non est necesse, loca respondere corporibus nobilitate, si usus aliud postalat. Deinde Terra non est corpus ignobilissimum, sed ad minimum aequat corpus Lunae, si non vincit, quippe Lunae corpus multo est asperius corpore Terrae. Et quid si multi alii sunt hujusmodi globi ex planetis et fixis? Jovis certe corpus umbram jactat ut Terra et Luna, Veneris corpus parte a Sole averea lumine caret, ut Terra et Luna.

Tertio plane falsum est, centri locum ignobilem esse, cum in adumbratione SS. Trinitatis ipsam primam personam Dei Patris, fontem Divinitatis repraesentant. Igitur etsi loca omnino respondere deberent corporibus, Terrae, quae pro ignobili habetur et quae ad minus ignobilior est globo Solis, centri locus non deberetur. Sed de hac argumentatione plura infra in doctrina theorica.

At cum centrum in convolutione globi loco suo maneat, Terrae utique, quippe corpori gravi et ad motum inertis, saltem propter rationes motus locus centri debebitur? Rursum vitiosa est argumensatio non uno nomine. Primum assumitur incoactum, diurnum motum inesse toti machinae mundi, quiescente sola Terra; quod sequenti parte invertetur. Detracto vero motu totius globi mundani, centri privilegium illud cadit. Deinde non est gravis

Terra tota, quatenus tota, quia nihil est extra Terram, quod illam attrahat, a qua tractione dicatur gravis. Tertio iners quidem est Terra ad motum eidemque aliunde illato quadamtenus resistit, at talia sunt omnia corpora, quatenus corpora; non meretur igitur Terra prae aliis corporibus locum centri hac inertia. Denique in doctrina theorica probabitur, Terram de loco in locum transferri; quo posito, invertitur argumentum, ut Terra ob id ipsum, quia locum mutat, in centro esse non possit. Saltem in praesens hoc motu manente in dubio, necessitas etiam argumenti dissolvitur ab ejus quiete ad locum in centro procedentis.

PRINCIPIORUM DOCTRINAE SPHAERICAE

PARS QUINTA.

DE MOTU TERRAE DIURNO.

Teneo figuras coeli et Terrae aërisque Terrae circumfusi et locum Terrae in mundo, quantum sufficit ad cognitionem motus primi; superest ut quaeram, quid nobis faciat sidera quotidie ex una parte horizontis emergere, inque ejus opposita parte post aliquot horarum intervallum rursum condi, coeline motus an Terrae? Astronomia Copernicana docet, visum falli circa motum primum: non enim sidera vere ascendere supra montes attollive versus nostrum verticem, sed e contrario montes, qui sunt nobis circumjecti, stantes in superficie globi Telluris, partes quippe cum toto globo circa axem illius converti a plaga occasus in plagam orientis, eaque conversione stellas orientis immobiles alias post alias nobis detegi, stellas occidentis tegi; itaque non stellas per verticem transire, sed punctum verticale transire per stellas immobiles, quantum ad motum primum.

Ain'tu, posse omnes apparentias motus primi per hanc mirabilem positionem sufficienter excusari totamque doctrinam sphaericam tradi? Plane exactissime, adeoque hic scopus est unicus hujus libelli, ut, quod jam verbis est promissum, id re ipsa comprobetur.

Cum vero in principio libelli, quando de hypothesis quaestio fuit, legem hanc praescripseris astronomo, ut non quidvis pro libitu ponat, sed positiones suas etiam comprobet naturae consultis, quaero igitur, num speres, te hanc absurdam positionem probare posse et quibus argumentis? Motum primum contingere convolutione jugi Telluris circa suum axem, quiescentibus corporibus coelestibus (quantum ad primum motum), id probari potest argumentorum generibus potissimum septem, quorum I. est a subjecto motus, II. a celeritate motus, III. ab aequabilitate motus, IV. a causa motus seu facultate motrice, V. ab organis motoris, hoc est ab axe et polis, VI. a fine motus primi, VII. a signis seu effectis.

I. Proba a subjecto motus. Natura semper quod potest per faciliora, non agit per ambages difficiles. At per rotationem Telluris, angustissimi corpusculi, circa suum axem in plagam orientis plane idem potuit efficere natura, quod per volutionem mundi amplissimi circa eundem axem (prorogatum ad utramque mundi extremitatem) in plagam occidentis. Quemadmodum igitur

credibilis est, caput hominis converti in auditorio, quam auditorium volvi circa caput hominis immobile, sic credibilis est etiam, Terram rotari ab occasu in ortum, quam universam reliquam mundi machinam ab ortu in occasum, eum eadem utrinque sequantur.

Si primus motus inest coelestibus orbibus, tunc eidem subjecto duo in-
sunt motus, unus communis sphaeris omnibus, alter proprius ejusque sphaerae;
at multo verisimilior est, motum primum et motus secundos distinctos esse
subjectis, ut secundi, qui plures sunt, insint suae quisque sphaerae, primus
vero, qui unicus est, insit etiam univo corpori Telluris, et quidem ipse solus,
respectu quidem suae formae, quae definitur axe et poli velut immobilibus;
non obstante, quod infra in doctrina theórica accedat ipsi etiam alius, respectu
longe alio, ut quo nna cum corpore etiam axis, poli et centrum movebuntur.

Argumentum colligit tantum verisimilitudinem, demonstra necessitatem.
Motum aliquem contingere, oculi sine errore testantur. Is si contingit
quiescente Terra, tota igitur reliqua mundi machina volveretur; tertium non
datur estque hoc extra controversiam. Atqui non potest moveri tota mundi
machina motu diurno, quiescente sola Terra, ergo necesse est, Terram moveri
motu diurno.

Quare non potest moveri tota mundi machina? Mundus aut est infinitus,
aut finitus. Esto primum illud, secundum Gulielmi Gilberti opinionem, qui
putat, Dei omnipotentiam in hoc illustrari, si mundum extrorsum infinitum
statuat, ut ex infinitae quantitatis creatura potentia creatoris infinita cognos-
catur. Et si vero refutatus est supra metaphysica argumentum, ex astronomia
tamen, cui ob sensum evidentiam plus fidunt homines, quam ratiocinationibus
a sensu remotissimis, nihil ad coarguendum illum deponi potuit. Posito
vero mundo extrorsum infinito, demonstravit Aristoteles, moveri illum non
posse motu convolutionis totum, quatenus totus.

Esto jam finitus mundus: extra mundum igitur nihil est, quod mundo
praestet locum, ipsum vero quiescat. Ubi vero nihil est quod quiescat, ibi
motus nullus est. Nam 1) motus est separatio mobilis, quatenus mobile, de
loco suo et, translatio in locum alium. 2) In specie motus machinae circa
axem et polos quiescentes non potest intelligi, ubi nihil est, cujus respectu poli
quiescere intelligantur. Nam in conversione quidem sphaerae poli ejus haer-
rent in meridiano immobili, meridianus innixus est horizonti et pedi, pes
mensae, monsa Terrae; at extra mundi machinam nihil est, quod meridiani
quiescentis rationem habeat. Quod igitur in intellectu locum non habet, id
ne fieri quidem potest in his rebus geometria participantibus. 3) Non in-
juria et illud quaerit Maestlinus, quomodo fieri possit, ut toto mundi syste-
mate circummagitato, nullo ejus orbe, non ignis sphaera (si qua sit), non aëris
regione superiore exceptis, hic unius globulus, cujus diameter minor vicies
millesima parte diametri mundi, non una circumrapiatur? ¹⁵⁾ Cujus objec-
tionis vis tunc maxime elucescit, cum una etiam de mediis seu adminiculis
quaeritur, quibus globulus iste locum suum in centro mundi tueatur, quod
consequitur Telluris quietem, de qua re actum parte quarta.

*Aristoteles putat, sufficere quietem exilissimi corpusculi in centro, re-
spectu cujus quiescentis et intelligatur et fiat motus circumjectae machinae,
et cui ille motus innitatur.* Non sufficit quies Telluris in centro. Primum
enim, etsi separatio tunc animadvertitur siderum a subjectis sibi Telluris par-
tibus, at cujus motu fiat hoc, coeli an Terrae, nondum potest intelligi, si
non una eum Tellure quiescat etiam aliquod corpus extra coelum, continens

coelum eique locum praestans, cujusmodi corpus non est, certe ignoratur, et si esset, coelum in eo sic volveretur, sicut jam Copernicus dicit volvi Terram in coelo, non opus habens ad hoc corpore exteriori.

Deinde ut vastissimae machinae mundanae motus vel comparctur ad aliquod quiescens, vel innitatur alicui quiescenti, oportet esse proportionem aptam inter mobile et quiescens. Terra vero respectu coeli contentissimae exilitatis et puncti instar est.

II. Dic argumentum a motus celeritate. Verisimilius est, naturam in parva Tellure motum exprimere proportionatum et parvum, quam in vastissimo coelo motum incredibiliter celerem et qui celeritate vastitatem immensa ratione superet. Nam cum motus sit res geometrica, non minus quam magnitudo, magnis igitur tarditas, parvis celeritas respondet, non vielsim, ut discimus in Harmonicis. Jam si machina mundi circa Tellurem volveretur, tanta moles tot siderum, Terra multiis partibus majorum, tot orbium vastissimorum volveretur in uno horae minuto per quinquaginta millia, seu in una hora per tricies centena millia miliarium Germanicorum, sideribus omnibus tam vastis de loco in locum continue translatis. Et hoc intelligendum de conformatione mundi Tychonica, quae multum habet affinitatis cum Copernicana; in antiqua vero Ptolemaica ut mundus major, sic celeritas haec est multo adhuc incredibilior.

At si Tellus volvitur, tunc neque locum suum (causa quidem primi motus, in quo nunc versamur) deserit, sed intra illum se continet, sustineus particulas sui corporis circumcuntes et partes ejus quo viciniore axi hoc sunt quieti propiores; denique partes extimae, illae quidem, quae rotantur in circulo omnium maximo inter polos medio, in uno horae minuto moventur per spatium non tredecies aut vices millesimum spatii prioris, per quod extimum coelum transire debuisset; nimirum 3 in uno minuto millaria transvolant cum dodrante, 225 in una hora.

Est tamen hic etiam motus valde rapidus. Imo 1) ubi celerrimus, duplo tardior est motu Lunae, ut quae orbem 60^{to} majorem 30^{to} saltem tempore peragrat. Et sic in proportionem pulchre respondet coelestibus. 2) Non multum superat rapida ista celeritas exempla motuum obvia, si circumstantias penses circumstantiis. Maestlius volatum nubium producit, aequalem celeritate. Landgravius et Brabeus mensi sunt tempus, quod interea labitur, dum globus magnus bombardicus vi ignium extrusus transvolat per aërem, priusquam in terram impingat; id deprehenderunt dum minutorum, spatium trajectory milliare magnum Germanicorum.¹⁶⁾ Locus igitur aliquis sub aequatore ratione motus primi non est nisi septuplo vel octuplo celerior globo bombardico; imo vix celerior est principio motus violenti, cum globus recens e fistula fuit ejectus; nam is, quo propior casui, hoc fit tardior. Atqui aura aetherea, per quam feruntur juga montium altissima, non tantum octuplo, sed infinitis propemodum vicibus est tenuior aëre, per quem globus plumbeus fertur. Igitur plurimis vicibus tranquillior est transvolatus jugorum per aethera, quam globi ferri per aërem. Deinde globus de loco in locum transfertur totus, atterens aërem circumcirca undique et quasi terebrans exhaustiensque post se, protrudens ante se; loca superficiei Terrae radicibus haerent, partes totae, nec ullam vim inferunt superfusae antrae aetherae, ut quam loco suo non expellunt, praesertim loca profundiora, nec undique, sed tantummodo sursum eam atterunt. Tercio. Quod caput est rei, globus plumbeus vi gravitatis trahitur interim extra lineam motus sui violenti deorsum versus centrum Terrae; partes

superficie Telluris, et si potentia graves sunt, actu tamen non trahuntur extra flexum motus diurni circularem, cum sustineantur ab illo, quod trahere posset. Ipsa vero tota Terra gravis ut tota diei amplius non potest, cum nihil sit extra illam, quod illam attrahat.

III. Quod habes argumentum a motus aequabilitate? Id per anticipationem peti potest ex doctrina theórica de motibus Lunae. Manifestis enim experimentis convincimur, ut primum motum, quamvis in una qualibet revolutione deprehendatur aequabilissimus, parumper tamen et in partibus insensibiliter concedamus inaequalem, tardiores quidem, cum Sol est in apogaeo, velociorem, cum in perigaeo. Quod si excepta sola Terra tota reliqua mundi machina motum hunc sustineret, causa nulla confingi posset, cur leges hujus inaequalitatis ad unius solius sphaerae Solaris motum attemperatae reducerent in totam machinam. At si quiescente mundi machina Terra rotatur, causa hujus inaequalitatis facile redditur ex mutatione intervalli inter Solem et Terram in proportionem eadem, cum Sol sit motus omnis administer et optulator.

IV. Dic argumentum accusa motus primi. Cum non Terra tantum, sed etiam coelum ex materia sit, Mose nos contra Aristotelem obfirmante, neutrum corpus se ipso aptum est ad motum. Omne enim materiatum, quatenus tale, aptum est ibi quiescere, ubi solitarius ponitur, de quo plura in doctrina theórica. Oportet igitur motum primum adscribere vel alicui facultati animali, subjectum motus informanti aut eidem assistenti, vel alicui potentiae naturalis motrici intrinsecae. Atqui talis facultas motrix seu animalis seu naturalis facilius in Terra ponitur, quam in coelo; Terra enim globosa est et igitur plena et angusta speciemque quandam cordis habet, coelum amplissimum et excavatum, per quod haec facultatem diffundi oporteret circulariter; cum e contrario possit anima aliqua in Terrae centro poni radicata, secundum naturam suae essentiae spiritualis indivisibilis, indeque velut o corde humano per speciem sui continuata excurrere in omnes globi sui partes; vel si facultas motui praeficitur, ea potest in axem Terrae (solidam quippe existentis) aut in lineas axi parallelas aut circa axem circumductas exporrigi suumque corpusculum comminus urgeus movere sine debilitatione ex longissima virium diffusionem.

V. Argumentare tandem ab organis motus. Terram invitare videtur ad volutionem figura ejus rotunda, volutioni aptissima. Motus diurnus fit circa axem, qui respectu hujus primi motus fit immobilis; hoc per se verum est, utrum velis moveri dicas, coelum an Terram. Jam vero axis iste ambulatorius est in partibus sphaerae fixarum extimae, sic ut non omnibus seculis eadem fixae, sed aliae post alias in hunc axem veniant, contra transit axis iste per partes Terrae semper easdem, ergo proprius est axis iste globi Telluris, coeli vero adventitius. Ac proinde, cum axis dicatur a motu, ipse etiam motus primus, cujus est hic axis, in corpore Telluris ierit, non in immensa coeli mole. Idem eodem modo demonstratur etiam de circulo motus hujus medio. Consimile argumentum ab organis et a fine junctim consideratis, vide infra suo loco.

Multam habent haec tria argumenta haesitationem: ergo ad eorum dilucidationem dic clarius, qualis sit ille motus, quem tribuis Telluri, ut eo salves apparentias primi motus. Non est fortuitus, non vagus aut tremens trepidansve, non promiscue quaquaversum, qualis est inordinatus motus globi argillacei, quem figulus luter duas manuum palmas versat, massam undique

in rotunditatem comprimens et rotæ præparans, sed est perennis, continuus, in una qualibet revolutione æquabilis per partes et constans; adeo ut diversarum revolutionum inæqualitas vix et ne vix quidem animadverti possit.

Respectu globi totius et partium forma ejus est in orbicularibus instrumentis, quæ decurrunt in tornis metallariorum in eandem continue plagam, nec valde absimilis est motus in turbinibus, quos pueri funiculis excussos rotant, cum cuspidè in planities certum punctum impacti, eidem immorantur inter rotandum velut immobiles. Sunt enim globo Telluris duo puncta ex oppositis ejus partibus, quæ mathematicè sumta non moventur, sed per totam Terræ volutionem sub duobus coeli punctis oppositis quiescunt, ut et linea connectens ista Terræ puncta inter se. Partes superficiei vicinæ punctis hisce voluntur in circulos parvos et sic tarde, partes remotiores in circulos majores et sic celerius, partes loco præciue intermedio in circulum maximum et sic celerrime.

Quæ causæ te cogunt, turbinationem istam Telluris æquabilem et circulaarem ponere? Experientia observationum coelestium. Brabeus utebatur armillis, hoc est circulis perfectis sic erectis, ut axis eorum ad unguem super plana ipsorum staret erectus, per centra illorum trajiceretur inque polium mundi dirigeretur. Linea visiva, incidens in aliquam certam stellam, procedebat ex uno aliquo puncto gnomonis, attingens extremum armillæ marginem. Igitur attendens ad transitum stellæ per partem magnam sui circuitus, numerare solitus est partes armillæ, ultra signum immobile volutas cum stella transeunte, et adscribere horæ minutum etiamque minuti partes ex automatis clepydriis quæ præsentibus. Semper igitur minuta temporis respondebant proportionè certa quantitati volutorum arcuum, semper stella in eodem armillæ margine circumire visa est, nunquam ab illo discedere extrorsum, nunquam post illum abscondi. Æquabilis igitur et circularis motus est unica hujus apparentiæ causa.

Suffragatur et ratio. Cum enim figura Terræ sit sphaerica, motus revolutionis alius quam circularis circa axem ei non pulchre competet. Et cum ipsa sit undique solida, sui plena, nec quicquam exterius occurrat, ad quod offendant, facultas etiam sive animalis sive naturalis, turbinatæ hujus auctor, propter perennitatem non possit alia verisimiliter statui, quam constans et certæ proportionis suarum virium ad materiæ inertiam seu renitentiam: ratio itaque nulla occurrit, cur motus ipse non sit ad typum causæ suæ æquabilissimus, demto unico concursu causarum motricum, de quo in doctrina theórica. Nam hic sane concursus ad modulum suæ proportionis levissimam aliquam causatur inæqualitatem veluti per accidens.

Radii Solis per foramen immisi tremere cernuntur in pavimento: numquid id argumentum est trepidantis motus Terræ? Non, sunt enim tremoris hujus causæ aliæ: primum radius ex alto demittitur, at omnia in altum surrecta nutant et tremunt, impulsæ concussione soli, flatibus ventorum, sive etiam et quæ alia diurno tempore sunt. Deinde radius per aërem prius transit, aër vero miscetur continue et momentaneè diversi generis exhalationibus, præsertim calore Solis diurno excitis: per illas igitur radii refringuntur, momentaneis etiam undulationibus.

In omni motu locali necesse est, præter id quod locum præstat insuper etiam aliud aliquid habere rationem quiescentis, cui motus innitur, ut in torno cuspides, in turbine planities, in volatu aër, in natatu undæ, in incessu Terra: quaero, quid in hac turbinatione Terræ rationem quies-

centis habet? Idem fere, quod in turbine puerorum, anlequam is plantiæm attingit. Primum enim totus Terræ globus, quantum ad primum motum attinet, suo loco manet, partes vero aliae in aliarum praecedentium loca succedunt. Delude, ut magis ad speciem descendamus, idem globus secundum tractum rectilineum, axi parallelum, in quo etiam tractu agnoscuntur axis et poli, perstat immobilis, quoad motum buue primum, rursusque idem totus globus, secundum tractum circuli medii inter polos, est subjectum motus bujus, et innititur hic motus illi quieti, non aliter, quam si iutor binas torni cuspides immobiles globus decurreret affixus. Quae omnia plane sic dicuntur de Terra, sicut necesse est dici de turbine, cum is volans in aëre interimque et rotatur.

Si axis hic esset aliquid reale, protractum ab una extremitate coeli in aliam et trajectum per globum Terrae, ut globus in torno suspensus est realiter, tunc sane credibilis esset haec forma motus corporis globosi circa axem immobilem. Non est necesse, ut re ipsa continuetur hic axis usque in coelum sitque corporale et durum aliquid, potest enim nihilominus talis existere motus. Id patet exemplo turbinis jam dicto, dum is adhuc volat in aëre; ueque enim evertitur ejus axis, sed cuspis in ejaculatu deorsum versa semper manet infra, donec plantiæm contingat, rotato interim corpore.

In specie verò recepta est haec forma motus ab astronomis etiam aliis, licet axem corporalem in mundo non possint demonstrare. Dicunt enim, machinam mundi totius sic volvi circa axem imaginatum, nulli rei quam Terris innexam, uullo nexu, nullo firmamento polos exterius sustentante, Terrisve iuterius connectente. Atqui hoc uultu est absurdus quam illud, cum tamen necesse sit, verum esse horum alterutrum.

Videris contraria statuere, axem hunc manere immobilem et tamen non semper tendere in eandem partes sphaerae fixarum, quae locum praebet motibus omnibus. Inclinetur igitur a fixa una ad aliam et sic movebitur. In una qualibet revolutione diurna manet axis iste ad omnem sensus subtilitatem immobilis, at post revolutiones quam plurimas deprehenditur nonnihil inclinatus esse: quare inclinatio ejus, quae fit in singulis revolutionibus, est quantitatis plane insensibilis.

Unde acis, axem Telluris productum usque in coelum incidere per totum tempus revolutionis diurnae in idem semper coeli stellati punctum, quippe cum tractus ille, quem axem dicis, sit intra Terrae corpus abditus? Si hoc praestat stilus in superficie Terrae erectus, aut linea visoria ulla, quae ex oculo in coelum educitur inclinatione ad superficiem immobili, faciet idem etiam axis. Stilus enim sic adhaerens Terrae circumvolvitur motu diurno circa Telluris axem; qui si non dirigitur in alias et alias coeli plagas, sed semper in idem punctum, laeestimabili distans intervallo, manet igitur in circumvolutione sibi ipsi parallelus; et per consequens axis etiam circumvolutionis illius eidem parallelus erit et sic et ipse in idem semper coeli punctum dirigitur.

Atqui praestant hoc, ut jam praedictum fuit, axes armillarum, sic etiam sciaticorum stili seu gnomones silique et dioptris directae secundum illa lineae visoriae, quorum decenter erigendorum ratio tradetur in doctrina sphaerica. Praestant autem id hoc argumento: vel enim visibile est id coeli punctum, habens unam ex stellis fixis, tunc nocte hiberna illuni, 16 boras longa, quoties quis per dioptram suspiceret, semper eandem visurus esset stellam, id adeo et toto anno; vel nulla uotabilis stella est in illo puncto, ut hoc aevo sit, et tunc fiat collatio stellarum, quae sunt vicinae puncto, quod monstrat stilus, nam si earum una semper aequali intervallo distet a puncto, in quod

dirigitur stilus, jam superior illa, jam ad latas, tum inferior, tunc stilus certo dirigetur in unum aliquod punctorum circuli, qui per id intervallum circa stellam describitur. Observetur igitur etiam secunda stella, si etiam illa semper aequali intervallo circa punctum stili videtur circumire, tunc non possunt esse plura quam duo coeli puncta, in quae stilus dirigi potest, nam hinc circuli non secant se in pluribus quam duobus punctis. Si tertia stella accesserit, non sita in eadem recta cum duabus prioribus, idem faciens quod illae, jam omni dubio sublato, stilus et axis Terrae in unicum certum coeli punctum reductus erit. Terni enim circuli, quorum centra non in eadem recta, non coeunt in pluribus quam in uno puncto.

Nam igitur parti coeli vis inest magnetica, Terrae axem in se dirigendi, aut Terrae ipsi, dirigendi se in hoc coeli punctum? Non: nam non dirigitur axis hodie in aliquam stellam et vix unquam in stellas ipsas, ut plurimum in loca coeli vacua, quae non possunt esse subjectum aut fons virtutis magneticae, ob extremam coeli tenuitatem. Sed nec omnibus saeculis axis eodem dirigitur, sed paulatim in succedentia loca, ut in quinto argumento jam est dictum. Cum igitur in coelo non sit corpus aut pars corporis certa, quod activam vim magneticam suscipiat, nec igitur in Terra corporea talis vis inest, id in coelo quaerendi, quod corporale nihil est.

Quae igitur causa praestare potest, ut turbinatio Telluris non evertat axem, adeo ut ejus directio in una tota revolutione Telluris maneat invariabilis? Causae tres esse possunt. 1) Vel volutionis ipsius forma, globo conciliata, quae cum directa sit in certam plagam, non in omnes promiscue, sequitur necessitate geometrica, ut axis volutionis hujus dirigitur in laterales plagas, tam diu constans, quam diu circulus volutionis medius a sua plaga non aberrat. 2) Vel privativa causa motus, scilicet naturalis inertia materiae globi, secundum tractum axis, qui ut evertatur e suo situ, vi opus esset; cum autem in illum nulla fiat impressio motus, quiescit igitur in suo situ. 3) Vel interua et positiva facultas naturalis in fibris rectilineis, axi parallelis, tenendi sese in suo situ primaevo. Nam volutionis facultas nidulatur in his ipsis totius globi filamentis, circa axem circulariter aequali undique pondere circumjectis, quibus innixa corpus torquet. Sic igitur vicissim naturalis constantia axis in sua directione dirigit ipsius etiam volutionis plagam, ut eo inclinato etiam circulum motus inclinari necesse sit.

Si axis naturali facultate situm tueretur, nunquam inclinaretur. Imo ob id ipsum, quia naturalis est causa directionis, ideo etiam successu saeculorum vinci potest a causa fortiori extranea, de qua plura dicere non est hujus loci, ubi agimus tantum de motu diurno, respectu cujus axis non inclinatur.

Fortassis habes hujus facultatis naturalis documenta etiam alia? Equidem inest globo Telluris secundum tractum axis et fibrarum axi parallelarum facultas, in se dirigendi magnetes et magnetica omnia, magnetibus vero mutua inest facultas, hanc plagam Telluris quaerendi. Cum igitur manifestum sit, globum Telluris informatum esse forma corporea rectilinea secundum tractum axis primi motus, non absurde eidem formae tribuitur etiam haec constantia directionis axis in plagam semper eandem.

Unum corpus non potest habere duos motus. Terra habet motum rectilineum deorsum, ergo non habet motum circularem. 1. Terra tota, quatenus tota et respectu suae materiae, motum plane vultum habet naturaliter; materiae enim, quae plurima Terra constat, propria est inertia, repugnans

motui, eaque tanto fortior, quanto major est copia materiae in angustum coacta spatium.

2. Partes Terrae etsi motu rectilineo deorsum moventur, id tamen non fit nequo propter speciem motus rectilineam, neque propter plagam ipsam per se, nequo propter motus essentialiam. Non primum: nam cum partes se ipsis sint inertes, aeque atque ipsa tota Terra, non magis se ipsis ad rectitudinem motus inclinant, quam ad circularitatem, sed ut quilibet motus ex causis suis impressionem in illas facit, sic earum inertiam vincit. Non secundum: quia plaga neque absolute dicitur, nequo respectu totius machinae mundanae, sed respectu solius Terrae, ubique illa fuerit. Partes enim Terrae non moventur aliorum, quam versus Terram ipsam, atque id solum deorsum est. Non tertium: nam non moventur partes Terrae motu rectilineo, ut moveantur, sed ut quiescant, ut scilicet uniantur suo toti.

3. Etal nequit unum corpus habere duos motus contrarios uno et eodem respectu et suapte inclinatione, nihil tamou impedit, habere plures motus disparatos, aut contrarios quidem, sed diversis respectibus, a disparatis ejusdem corporis formis dependentes, aut non propria inclinatione, sed ob causas vel extraneas vel assistentes. Nam lingua magnetica forrea tres habet motus: unum gravitatis deorsum, alterum directionis ad polos, tertium declinationis ad magnas confluents aut magnetica vicina, ubi miscentur effectus in proportiono principiorum motoriorum. Ita signiferi brachijum quatuor eodem tempore motibus movetur: primus est gravitatis, ratione materiae, quo fit, ut brachium surrectum defluat; alter est, qui medicis naturalis dicitur, nutritionis ex comestatu succorum, didentis se in spatium amplius; tertius est vitalis, dum pulsant arteriae; quartus est animalis, dum animae vi surrigitur brachium in altum, tenens et ventilians vexillum. Omnes quatuor possunt dici naturales, eo quod causas suas vel in anima vel in corpore, duabus partibus essentialibus, habeant. Ita turbo uno et eodem tempore simul deedit per aërem naturaliter, evolutus o fuculo, simul rotatur circa axem motu extraneo, per quassationis vim concepto. Quanto magis poterit inesso in ipsa Terra tota, quatenus tota, motus convolutiois circa suum axem ab interna et perenni causa dependens? cum turbo actu gravis sit et decidat, Terra tota, quatenus tota, nullo gravitatis momento in ullam plagam rapiatur, partes Terrae graves quidem sint potentia respectu totius, at actu non moveantur ad Terram, quippo quae finem motus gravitatis, quo est unio partium cum toto, jam obtineant.

Si Terra materiae ratione renititur motui circulari, violentus igitur erit motus ejus diurnus et sic perpetuus esse non poterit. Equidem haud negaverim, inertiam hanc materialem corporis Telluris ad motum et densitatem ejusdem esse sedem, in quam imprimitur impetus rotationis eodem modo, quo id fit in turbino violenter circumacto, ejus quo pouderosior est materia, hoc felicius in illam inumbit vis externa, hoc diutius durat ab illa impressus motus; plinae vero et similia corpora, quo nullam habent resistentialiam, motum non facilo concipiunt, nec scorpionibus aut fudis sunt apta. At cum violentum proprie dicamus illum motum, cum aliquod corpus movetur adventitio motu contra naturam suam: motum, quem infert forma materiae, facultas vel anima suo corpori, non solemus contra naturam reputare, cum nihil sit magis naturale materiae quam sua forma, corpori, quam sua facultas vel anima. Magis natura materiae tendit deorsum, at natura corporea formae specialis ascendit ad magnetem alium; nec tamen id fit violentus.

Sic cursus animalium, impetu corporum sua librationum in aëre, saltusque felium aut inculpationes serpentum pro violentis non habentur.

Dic tandem, quid sit illud, quod Terrae circulares infert motum circa axem immobilem, extrinseca causa an intrinseca, num potentia naturalis, an anima? Dico, non tantum unumquodque horum per se suas habere verisimilitudines, sed etiam omnia trin concurrere posse et proci dubio concurrere.

Proba primum de causa movente extranea. Si pueri possunt rotare turbinem in plagam alterutram certam, tanto aequabiliori et constantiori motu, quanto exquisitior est facta impressio, sic ut turbo, semel in motu constitutus; impetu concepto, pinimas faciat gyrationes, quoad inaequali tabulae planitie et aëris occurso offensus suoque pondere victus languente paulatim motu coincidunt, cur non possit Deus impressionem in Tellurem ab initio talem fecisse, velut ab extra, ex qua subsequentes omnes rotationes etiamnum hodie vigore continuato perennent, adeo ut carum sint jam numero vicies centena millia, enim ista rotatio non offenditur ulla foris occurrente asperitate vel densitate aëris aethereae, non uilo pondere vel gravitate interna; quantum vero materiale inertiam attinet, subjecti loco sit ad concipiendum impetum continuandamque rotationem.

Confirmat etiam hanc causam haec circumstantia: quod sicut turbo rotatur in plagam illam constanter, in quam fuit initio contortus, sic idem etiam Terrae accidit, ut causam nulla dñi possit, cur potius in hanc plagam rotetur Terra, quam in contrariam, nisi haec, quod a Creatore statim initio coepta sit in hanc plagam rotari.

Proba de facultate corporea. 1) Verisimile est, hanc ipsam primae rotationis continuam speciem in Terra transformatam esse seu conluisse in talem facultatem corpoream, et sic in fibras Terrae, dispositas secundum ductum motus ipsius, inolevisse, sic ut fibre omnes intelligantur rectilineae, ut prius dictum, et axi parallelae, sed circulariter axem circumstantes, veluti subtemina recta staminibus circularibus intexta. Nam si species motus ab extrin illati potest abstrahi a causa movente imprimique in corpus turbinis mobile per quassationis seu sileus vim (durch den Schwingung) et in eo durare aliquamdiu, non obstante quod in eo tantum est hospes, sic ut corporis partes in motu constitutae alia aliam ineit, veluti motrix existeret ipsa, donec continuis offensionibus turbinis haec species motus victa temporisque diuturnitate debilitata paulatim emoriatur: nihil igitur impedit, quin etiam hujus species motus, quo Deus Creator globum Telluris primum incitavit, arctius et durabilius in Terrae sese corpus insinuaverit inque fibrarum circularitatem et veluti in formam corpoream specialem concesserit, non jam hospes amplius in Terra, ut illa in turbine, sed inquilina plane seu materiae suae victrix et domitrix existens.

2) Argumentum hujus id etiam esse potest, quod vigor hujus rotationis non remittit, sed ejusdem adhuc hodie celeritatis esse deprehenditur, cujus et olim erat, consimili scilicet anni tempore. Hoc vero magis intrinsecae causae quam extraneae competit.

3) Quod si prius causam directionis axis sentis probabiliter contulimus in formam corpoream, secundum fibras rectas, axi parallelas, jam multo probabilior fiet etiam altera globi informatio secundum fibras circulares, indeque dependens facultas motoria; enim etiam hoc praedictum sit, globum eundem

secundum illarum tractum habere rationem quiescentis, secundum harum circumductum rationem mobilis.

Exemplum hujus fibrarum implexionis non geminae tantum, ut hic, sed plane triplicis, habent mediet in substantia ventriculi, qui consimiliter inter tres illos fibrarum ordines, implexos mutuo, tres ventriculi facultates distribuunt, attractricem, retentricem, expultricem.

4) Imprimis apte poterit huius formae corporeae tribui et plagarum motus distinctio, cum suppetant nobis exempla, ubi forma corporis fit causa motionis in certam plagam. Nam sicut magne una parte ferrum ad se trahit, contraria parte a se repellit, sic etiam propter hanc circularem globi informationem, ab impresso primitus motu ortam, globus jam in illam plagam rotatur, in quam fibrae circulares promptae sunt.

Atqui videtur impossibile, ut materiatum aliquid se ipsum primo moveat. Etiamsi haec forma corporea fibrarum solitaria motus causa statueretur, non esset tamen idem et quod movetur et quod movet. Ut enim est in lapide, cum deorsum cadit, sic etiam hic in globi fibris circularibus aliud essent hae ipsae fibrae circulares, ratione dispositionis earum in circulum, aliud forma secundum hanc corporis circularitatem ejusque facultas motrix; et ut omnia haec distincta fasciculo colligam: globus idem ratione fibrarum rectarum quiescet et motui substat, ratione fibrarum circularium movebitur earumque materiall ad motum inertia concipiet impetum; denique ratione formae, per has circulares fibras porrectae, movebit.

Quibus argumentis insuper etiam animam huius motui primo praeficies, sedentem in Telluris corpore? Multis, partim ab ipso motu, partim ab indiciis animae aliis, partim ab exemplis corporum mundanorum desumtis.

Quae habes a motu ipso? Primo, si maxime Tellus sic informata sit per tractus circulares, ut per eos apta videatur ad motum sibi inferendum, videntur tamen haec esse potius instrumenta causae motricis, quam ipsa causa motrix. Sic in humano corpore nervi, muscoli, ligamenta, articuli, ossa, licet sint ad motum aptata perfectissime, non tamen sunt causa movens prima, sed animae saltem instrumenta ad corpus movendum.

Secundo, constans hujus rotationis vigor seu celeritas aequabilis tutiora invenit in anima praesidia, quam in facultate corporea. Oritur enim celeritatis hujus modulus ex proportionem, quae est inter vires motoris et inter inertiam seu resistantiam materiae, nimirum ex illarum excessu super hanc, seu victoria. Quemadmodum igitur antea diximus, minus fatigari formam internam corporis, quam speciem motus ab extra illati, propterea quod illa subjecto proprio suffulta inhaeret comminus et continue, ista, in alieno peregrinata subjecto, tanto fit se ipsa debiliior, quanto plus temporis acquirens veluti longius a suo fonte discedit: sic nunc etiam magis fida et constans est vis animae, quam forma corporea, quia anima quidem de sese secundos emittit actus sine damno fontis, cum sit entelexia, se ipsam continenter resiliens; forma vero corporea temporis subjecta est, nec sine detrimento perennat ne ipsa quidem, licet insensibiliter marcescat ob temporis diuturnitatem, secundum illud: *mors etiam saxis marmoribusque venit.*

Tertio, ipsa motoris hujus origo prius tradita nobilior et angustior aliquid prae se fert forma corporea. Nam si est species abstracta seu defluxa a prima causa movente, quae motus hujus initium fecerit ab extra, nimirum ab ipso Deo, quid aliud erit quam primum movens, ipsum non mobile, id est anima? Sic enim et Deus superessentialiter est prima causa movens et crea-

rix, adeoque et ipse transcendenter est essentialis motus, hoc est aeterna generatio, ejus umbrae sunt omnes animae spiritusque, gestantes ejus typum allqualiter, ut umbrae corporum.

Quarto, tendit eodem et officium hujus motoris. Eato ut aequabilitas illa duratioque rotationis non indigeat alia re, nisi causa naturali bruta, ipsaque adeo levissima ejus intensio et remissio, attemperata ad accessum et recessum Solis, rem geometricam, materiae characterem, at certo superest inclinatio illa tardissima seu axis, seu medii circuli motus, de qua sumus incerti, saltem in hac astronomiae parte, an non illi mentis moderatione sit opus.

Quae de constantia motus dixisti, videntur enervari exemplo animalium, quae, quamvis anima praedita, fatigantur tamen. Animalia defatigationis suae causas habent evidentes in conditione suorum corporum, quae suas habent vicissitudines, non vero in anima motrice; tales vero causae desunt in globo Telluris, qui ad motum vel quietem potius est perpetuo dispositus aequaliter. Nam privativae habitudines in materia durabiliores sunt quam positivae, formarum soboles, quae expirare possunt.

Quae sunt illa alia indicia animae versantis in corpore Telluris?

1. Calor subterraneus perpetuus et sensibilis. Materiae namque, quatenus talis, proprium est frigus: omnis contra calor est animae vestigium, vel praegressae vel praesentis; nam etiam ignis materiam, qua pascitur et superest, animae facultatibus progeuitam obtinet.

2. Opera animae propria, ut sunt generatio metallorum, mineralium et fossillum, exsudatio humoris, nude ortus fluminum ex montibus perennis, exsudatio nebularum et exhalationes humidae vel aridae perpetuae, unde varii generis meteora. Sic ex sanguine, bili pituita, ex muco, odore, saliva, excrementis ratiocinamur de variis animae facultatibus.

3. Facultates eorum, quae ex Terrae visceribus eruuntur, ut quod sunt calida potestate, inflammabilia inque incem, cui est anima cognata, convertibilia: talia sunt sulphur, marcasitae, scintillas percussu reddentes, ignes denique ipsi subterranei. Et haec spectantur tantummodo in exteriori cortice Terrae; quanto mirabiliora censes eondi spatiosissimo ejus sinu interiore, per mille septingenta milliaria? Recte igitur a natura generatorum argumemur ad causam generantem. Sic enim etiam alias recte ratiocinamur, quae res oleum intra se concoquat, quod est calidum potestate et inflammabile, illam conformari ab anima.

4. Facultas formatrix in aëre, unde locustae, muscae adeoque et figura nris sexangula; sic pediculi nati in corpore hominis indieum faciunt alicujus facultatis animae praesentis in illo corpore. Formatrix facultas in marinis et fluvialibus aquis, unde oceanus monstrorum pater dictus; formatrix in Terrae superficie, unde tot stirpium genera spontanea, tot insecta; formatrix in lutimis Terrae visceribus, plane similis ei, quae est in femellis, ut species foris occurrentes intus exprimat, naves, pisces, reges, pontifices, monachos, milites fossiles.

5. Geometriae exercitium, quod citra mentis et sic animae operam praestari nequit. Exprimit enim quique corpora regularia in lapideis, sexangulas figuras in cristallis et salibus. Sic enim etiam ex sexangula figura cellularum recte concludimus, apes fictrices esse anima praeditas et geometriae suo modo capaces.

6. Geometrias extraneae et coelestis, quae consistit in radorum concursu, et perceptio et secundum illam agitatio materiae subterraneae. Nam Terra

exsudat meteora ad praescriptum aspectum; quorum rationes formales sunt mere geometricae. Sic enim et illud animal, quod movet pedes ad leges alienius cantilenae, recte concludimus et percipere cantilenam et mensuram intelligere, denique ab anima regi.

Etsi haec omnia habet et percipit anima Telluris instinctu primaevo; non discursu et ratiocinatione et profectu, ut homines.

Ubi perhibes exemplum occurrere, in quo rotationem globo praestet anima? In globo Solis, quem et convulsi in suo spatio et anima praeditum esse, in doctrina theoria comprobabitur.

Si anima est in Terra, sub quam igitur speciem animae eam refert? Constituit ipsa peculiarem speciem; nec enim crescere facit Terram, nec sentire, nec ratiocinari, veluti per discursum, sed tantum movet et promovet dicta opera, omnia solo instinctu expediens.

VI. Dic argumenta ducta a fine motus. Etsi hoc sciverunt physici et eoriphaeus peripateticorum Aristoteles, corporum coelestium circulares motus finem in se ipsis habere, nec illa moveri propter aliud aliquid, quam propter hoc ipsum, ut moveantur, sensus tamen oculorum nos docet, id non univocaliter de motibus omnibus circularibus intelligi et concedi posse. Testatur enim experientia, non secus atque nubila tranat aquila, non tantum ut exerceatur, sed primario ut praedam vagascatur, sic etiam primum motum contingere, ut Telluris partes successive omnes calore Solis potiantur et ne, si motus hic non esset, Telluris alterum hemisphaerium uratur, alterum perpetuo gelu rigeat.

Jam non est ereditibile, ut tota coeli machina talis privatae suae necessitatis causa vel circa Terram circumeat, ut a qua nihil accipit, vel etiam circa Solem, in medio sui sinu collocatum; reclamationem enim figura machinae cava, ex qua intelligimus, illam, sive quiescat sive moveatur, utroque modo Solis conspectu (adde si vis et Telluris) frui aequaliter. Itaque coelum et Sol in eo, si motu primo movetur, non sui ipsius sed Telluris causa motu primo circumagetur. Id vero perabsurdum est, tantam molem, quam etiam perfectiorem Terrae globo contendunt philosophi, propter hujus angustissimae pitulae figuram (qua fit, ut ipsa Solis igne tota frui una vice non possit) tantum iter peragere circummeando, cum Terra possit illam hoc opere sublevare compendiosissima volitione sui corpusculi, periode enim esset, ac si cocus ineptus carnem verum fixam vertere designatus, ignem potius circa carnem circulo circumageret.

Hujus argumenti vis infra libro tertio praecipue nitebit, ubi de causis inclinatis axia Telluris agemus. Quod enim zodiacus ad aequatorem obliquus est factus, ejus rei finis et utilitas toto mundo nulla apparet, nisi tantum in superficie Telluris: cur igitur alibi quam in ipsa Tellure inque axe ejus corporis proprio inclinato quaeremus hujus obliquitatis causam? Cur eclipticam in coelo inclinabimus per spatium vicies milles majus (ut vulgo computant) ut zona terrestris Solis accessu et recessu gaudeat, cum possit idem efflui inclinatione simpla axis Terrae? Porro axem sequitur motus, ejus causa ponitur axis.

Possent etiam ex philosophorum principis, qui coelum corpus perfectum, Terram elementarem et imperfectam tradunt, hoc disputari: quietem illam, quae primi motus est negatio, coelo competere, motum ipsum Terrae, propterea quod motus ex genere sit eorum, quae non sunt sed sunt; non igitur ad ea pertinet, quae suae perfectionis gradum in se ipsis habent perennem,

sed ad illa, quae, nisi moveantur, desidia torpent et corrumpuntur, ejusmodi sunt in ipsis Terris aquae et aër corporaque multa in his elementis degentia. Hoc argumento natus est Origanus. ¹⁷⁾

VII. Quod habes argumentum motus Telluris ab effectu motus ipsius?
 Experientia nautica deprebensum est, difficillius et longiori temporis spatio navigari oceanum Africanum in orientem quam in occidentem, propterea quod is motu perenni ruat in occasum, qua nullis fraenatur repagulis litorum. Sic in insulis Aromatiferis ex oceano eo in oceanum Indicum fluxus esse peribet perpetuus, quavis sagitta celerior, quia nimirum foris incumbit et urget immensa moles aquarum ab oriente ad hoc septum insularum accumulata; in australi oceano, quod habet litora Americae versus orientem, fluxus et refluxus maris pene nullus est, quia rapitur oceanus ab illis litoribus continuo versus occasum, non offendens intra duo millia miliarium Germanicorum ad ullum cursus sui obstaculum. Idem motus in occidentem sentitur etiam ad litora Americae, septentrioni obversa, ferturque fluxus velut offendens ad illa ductumque florum secutus in septentrionem circumflecti indeque veluti in orientem, sed jam extra tropicum, resillire.

Etsi vero causa hujus motus manifesta est, eadem nimirum, quae et fluxus refluxusque reciproci, Luna trahens undas, quoties supra horizontem est, versus occidentem, quorsum illi cursus esse censetur; ipsae tamen circumstantiae jam enumeratae videntur adungere Lunae etiam inertiam naturalem aquarum ad motum, restitanti in occidente, cum Terra se subducit in orientem.

Atqui multa obstant, quo minus credam, Tellurem rotari, et primum quidem visus: nam si montes, qui sunt ad occasum, ascendunt versus stellas, videbitur hoc potius, quam illud falsum, stellas descendere, hoc est occidere. Minime: ascensus enim a visu aestimatur ex desertione plani, in quo stamus, et ex appropinquatione rei ad verticem, in quem hominis statura surrecta est; jam vero montes ipsi sunt, qui formant nobis visibilem planitiem, nec appropinquant vertici, quia quantum montes procedunt, tantum procedit una et linea, in quam statura spectantis erecta est et in ea linea vertex, atque sic semper vertex aequaliter abest ab extremitatibus soli, in quod spectator insistit, id est a montibus extremis: non possunt igitur videri montes ascendere, etsi verissime Terra tota rotetur.

Eato ut montes non videantur ascendere, attamen videbuntur simpliciter et in genere moveri, stellae vero quiescere, quae quiescunt. Non sequitur, quod plurimis exemplis patet. Virgilius graphice, ut solent poëtae, sensum oculorum exprimit, cum canit: *Provehimur portus terraeque urbesque recedunt*, etsi hoc motu non urbes a nave, sed navis ab urbibus recedit.

Qui secundo flumine navigat, is non antea admonitus litora vicina putabit moveri in adversum, et si navis praeter stipitem vehatur, quem fluxus alluit mersum, vectores exclamabunt, sibi intram obviam ascendere. Qui curru vehitur inter sepes prorsum, jurabit sepes utrinque in se incurrere, qui retrorsum, jurabit sepes fugere: quem affectum oculi concipiant et impressum altius retinent, etiam cum homo interquiescit. Et qui retrorsum abripitur curru a turri aliqua insignis altitudinis per viam a turri directam, is ruinam turris capiti suo ingruentem expavesceat. Sic nubem debiscentem late explicatam conspicatus motam leniter a meridie in septentrionem, jurabit stellas, quae in fissuras incident exque illa emicant; moveri motu contrario a septentrione in meridiem.

Cur autem duorum id potius videtur, quod falsum est, quam quod verum? Causa ab una radice progerminans in duos porrigitur ramos. Motus enim non est proprium visus objectum, nec habet peculiarem sensum, quo percipiatur, sed sensu communi diiudicatur. Decipitur autem sensus communis his potissimum duobus modis, qui ad motum Terrae possint accommodari: primum homo existimat, quiescere oculos, quoties ipse motum, quo rapiuntur oculi, seilicet non venire ab interna sua facultate motrice, aut cum motum illum non sentit in suo corpore, successivis argumento; ut cum humo abripitur a navi, aut in praesenti negotio ab ipsa volutione loci sui in Terra. Deinde, quae maiora apparent oculumque vel excedunt vel late occupant, ea quiescere verisimile putat, ut nubem, ut planum terrae terminatum ultimis montibus; quae vero respectu illorum apparent minuta, ut stellas inter magna nubium volumina, Solem et Lunam super late diffusam Terrae planitiem, his potissimum tribuit motum illum, qui contingere cernitur, exempla per assuetudinem trahens a fœdis et projectilibus et aviculis in aëre, quae omnia sunt minuta. Inprimis autem id illi tunc evenit, cum magna illa lateque explicata visibilia retinent situm eundem versus oculum, propter communem illis motum cum ipso visu: sic enim fit, ut, quicquid accidat vere, magna illa putentur omnino quiescere, quia situm hunc oculis respectu non mutant.

Corpori, quod in centro est, non competit motus: at Terra in centro mundi est. Propositionum posterior nondum est ulla ratione probata, ut dictum parte IV, estque procul dubio falsa, ut in doctrina sphaerica probabitur; altera et prior secundum quid vera est et conceditur de Terra, quod ejus punctum intimum in centro sit primi motus eoque non feratur ab hoc primo motu nec ipsum nec axis et poli de loco in locum; at partes omnes corporis, axem circumstantes, quia extra centrum sunt, non prohibentur ab hoc argumento, quia moveantur motu convolutions circa axem.

Si Terra volveretur circa axem, tunc ea, quae recta sursum proficiuntur, non reciderent in locum pristinum, unde sunt projecta, quippe centro quidem persistente, loco vero superficiei, in quo stat projiciens, interim se subducente ex linea ducta ex centro Telluris ad projectile. Si gravia centrum per se peterent nihilque praeterea, sequeretur argumentum. At dictum in priori themate, motus gravium scopum non esse centrum per se primo, sed per accidens et secundario, quia scilicet centrum est medium et intimum corporis, quod gravia per se et primo petunt et a quo gravia attrahuntur.


Cum autem gravia petant Terrae corpus per se petanturque ab illo, fortius itaque movebuntur versus partes viciniores Terrae, quam versus remotiores. Quare transeuntibus illis partibus vicinis perpendiculariter subjectis, gravia inter decidendum versus superficiem transeuntem illam insuper etiam circulariter sequuntur, perinde ac si essent alligata loco, cui imminenti, per ipsam perpendicularem, adeoque per infinitas circum lineas, seu nervos quosdam obliquos, minus illa fortes, qui omnes in sese paulatim contrahi soleant.

Atqui dixisti, corpora materiata naturali sua inertia reniti motui sibi ab extra illato; id si verum est, gravia igitur extricabunt sese nonnihil ex hoc raptu exque suo illo perpendiculari ceterisque vinculis. Extricarent sese nonnihil, si abscederent a Terra intervallo tanto, quod ad semidiametrum Terrae vel saltem horizontis visibilis proportionem haberet sensibilem; aut si, ut paulo prius ingens oceanus, ad Terram in aliqua magnitudinis viriumque proportionem essent.

Quae est ergo genuina figura motus gravium, respectu spatii mundi?

Quidam sedulus astronomiae cultor, sed non satis consideratus, pingit casum lapidis versus Terram, cis et ultra perpendicularum serpentinis flexibus fluctuantem, ut flexus numero respondeant gyrationibus Telluris, interim dum lapis in casu est; non perpendit, quod lapis desertus a partibus Terrae, quibus erat initio perpendicularis, veniat in raptum succedentium vicinarum partium, semper in illam plagam deflexo lapsu, in quam volvitur Tellus, initio parum, in fine magis magisque, quia raptus e propinquo est fortior.

Fig. 17.



Itaque figura motus gravium, si eorum aliquid ex coeli loco remotissimo versum Terram, in uno certo loco rotatam, decideret, esset propemodum iste, qualis hic rudi Minerva depictus est, ubi circulo Terrae in 14 partes diviso, linea casus in totidem sed inaequales, supra breves, infra longiores, partes circuli ordine, trahendi munere defunctae, ad sua pristina loca redierant, tres solum residuae, praeventae sine lapsu, non traxerunt perpendiculariter.

At saltem emissi globi bombardici, alter in ortum, alter in occasum, cadent inaequalibus intervallis a loco primo; longius in occasum, quippe partes Terrae versus occasum sitas obviabunt globo, tendentes in ortum, brevius in ortum, quia partes orientales Terrae, in quas, si immobiles starent, globus fuerat casurus, fugiunt globum versus ortum. Non recte fit, quod comparantur spatia mundi, quasi Terra longissime absente, ab emissio globo, cum de hoc solo agatur, pomum, quod alter tenet manibus, quorsum ei facillime excutitur a socio ejusdem navis vectore, non quam longe a navi aut per quantum spatium inter navem et litora. Nam si litora consideres, quantum fugit navis a loco superiore, in quem excutitur pomum, tanto ferè languidior, respectu litorum quiescentium, est excussio, cedente quippe deorsum, quod excurrenti subternitur, enervata resistentia; ita quod erat defluxus navis, adjecturus saltui pomi, detrahit iterum cessio ejus, quo nitebatur suctus. Et vicissim, quod erat pernicitas navis praereptura saltui pomi deorsum, hoc addit resistentia fortior violentiae suctus; fortius enim deorsum exentit vis eadem, cum a navi deorsum et rapitur, quam cum in litore stat immobilis. At eum, ut par est, vires nudae considerantur manus pomum prehendentis ipsiusque pomi pondus, vis aequidem infertur utrinque eadem, nihil ad hanc magnitudinem effectus, qui foris extra navem, compositis causis, est secutus, etsi respectu navis solius (non etiam litorum) idem proxime futurum est ab ipsa intervallum.

Idem igitur iudicium mutatis mutandis et de bombardis esto. Equidem globus magnus, duobus minutis horae unius perdurans in volatu per aërem, trejicit in occidentem per unum milliare Germanicum in Terra, interimque Terra, subjecta aequatori, obviat per octo miliaria; quare respectu spatii mundani rapitur globus adhuc in contrariam motus violenti plagam, scilicet in orientem, septem miliaribus nihilque prodest ei aliud explosio in contrariam plagam, nisi quod octavum milliare absumit facitque, ut globus tardine in orientem sequatur; exeunte non potest pulvis globum penitus veluti de manibus Telluris, semper ille in virtute trahente haeret irretitus; si raptu prehensionem indicis, haeret in prehensione succedentis minimi digiti. E contra globus, in orientem emissus ejusdem temporis intervallo, promoveretur raptu

ipſius Terrae per octo millia additque nonum ipſe, violenter quippe exploſua litem in ortum. Ita ſive in orientem ſive in occidentem explodatur, ſemper in orientem fertur, tantum paulo plus hio quam ille. At hoc compositum ſpatium mundanum nihil attinet ad ſpatium in Terra, quod homines metiri poſſunt; hoc utrinque ſero idem eſt, quia vi eadem, quia vincula magnetica utrinque eadem, ex quibus globus velut eripitur inque alteriora transponitur.

Concurrent tamen in occaſum promotionis duae cauſae. Nam globus, de ipſo iners ad motum, ſi non raperetur verſus ortum, permaneret ſe ipſo in occidente, loco in ortum abeunte, facilius igitur de loco in occaſum promoveretur a violento motu; at in ortum vincenda eſt illi motui non tantum prehenſio magnetica Telluris, ſed etiam inertia materialis globi, reſiſtantis in occaſu. Eſto hoc ut ſupra de oceano conceſſum; at quicquid ſit, in globo certe bombardico inaeſtimabile quippiam eſt, nec ulla proportio ſenſibilis alterius pugnae ad alteram. Nam ſi globus bombardicus exploderetur eadem vi pulveris, poſitus extra virtutem Telluris attractoriam, transvolaret ſe non tantum per unum aut per octo millia ſpatii mundani, ſed plane per incredibilem eorum numerum.

Poſito etiam, quod differentia ſit perceptibilis ſe ipſa, tamen deerit occaſio experimentandi. Quis enim certum me reddet de eadem vi pulveris in utraque exploſione ceteriſque circumſtautiſ utrinque hſedem?

Si Terra in plagam unam iret, ſemper nubes et aves volare viderentur in plagam oppoſitam occaſus, quia in alto penderent. Minime. Nubes vel aviculae non ſunt in nlla comparatione ad molem aquarum oceani. Fuge ergo, nubem vel avem haerere ſuſpenſam in aëre, non ruentem impetu in partem ullam; illa, ut ſupra lapis decedens, virtute Telluris annexa ſubjectis et circumjectis campis, una cum Tellure (reſpectu ſpatii mundani) volvetur, ſemper eidem loco perpendiculariter immiſcens. Accedat igitur illi verſanti in tali conditione animalis impetus, patet quod ſi illam ex hoc ſuo perpendiculari ſit eliciturus in plagam, in quam vergit impetus, idque ſine diſcrimine, vel in ortum vel in occaſum.

Si Terra volveretur, animalia et aedificia quaeſarentur et collaberentur, creſcentia hoc motu impeditrentur et deſtruerentur. Nihil horum ſequitur. Nam motus eſt aequabilis nec impingit. Omnia enim iſta in intimo ſinu et complexu virtutis attractricis aëriſque et montium una euntium collocata et ſic circumlata, ſumma nihilominus quiete fruuntur. Adeoque ne in navigiſ quidem, per rapidiſſimos fluvios aequabiliter delatis, ulla ſentitur inquietudo, non evertuntur pocula viſo plana.

At certe ad minus hunc motum in corporibus noſtris ſentiremus, etiam clauſis oculis? Minime. Nam ne in navibus quidem ſemper ſentitur motus, quando aequabiliter decurrunt, cum tamen ibi corpora naturalia gravitate ſua rapiantur, non ad naves tanquam ad naves, ſed ultra naves extrorſum et deorſum ad ſubjectas terras, reſpectu fluminis quieſcentes, navis vero rapiat illa in tranſverſum huius lineae; quanto minus nos Terrae motum ſentlemus, qui gravitate noſtrorum corporum non alioſum, quam ad euntes terras, quibus inſiſtimus, attrahimur; ac proinde non extra lineam attractionis naturalis rapimur, cum illa linea una nos raptos comitetur.

At videre eſt in rotis incitatis, quicquid ſuperponitur, id deſilire veluti projectum impetu, quod et ſupra ipſe illegati. Sic igitur et lapides et ferramenta deſilirent a Tellure coeloque exciderent. Gravia rotis incitatis impo-

sita non attrahuntur a rotis gravitate naturali, sed a Tellure rotis subjecta; ibi igitur ex pugna motuum in plagas diversas oritur ille impetus et desultatio; quodsi gravia alligantur rotae, non desiliunt. At lapides virtute attractoria ad Terram sunt alligati et in nullam plagam extra locum rotationis Telluris gravitate sua tendunt; nullus igitur est locus pugnae et impetui. Illic, quo quidlibet in sua quantitate gravius est, hoc efficacior fit impetus, hic lapides ne graves quidem sunt, si Terram, quae rotatur, animo removeas.

Si Terra hoc velocissimo motu volveretur, ventus ex opposito motus sentiretur perpetuus. Posset hoc de summis montium fastigiis concedi et ex hac refrigeratione causa quaeri perennium nivium etiam sub zona torrida, item frigiditatis ventorum orientalium, amoenitatis matutinae et similium, dummodo et montana humilliora et valles intra summa illa abdita, quas animalia incolunt, essent tutae, et aer in illis per hanc exteriorem attritum imperturbatus atque quietus, et libertas in eo vaporibus ebullientibus, ruendi quaquaversum. At necesse non est, ut concedamus quod obijciat. Anra enim aetherea tot vicibus tenuior est nostro aëre, quem bauriunt animantes, ut tranquillior et sic insensibilior sit attritus ad auram aetheream mille milliarum in una hora, quam attritus faciei hominis ad aërem in una hora per dimidium milliare illum perambulantia.

Quid respondendum censes ad auctoritates omnium seculorum omniumque ordinum, sacras et profanas, quae contrarium sine controversia recipiunt, Terram in motu primo quiescere, coelum moveri? Copernicus sic respondet. 1) Cum vulgus, dicendi magister, sensum oculorum usu loquendi exprimat, philosophus veritatem, quae subest apparentibus rerum speciebus, inquirat, non esse absurdum, cogitationes philosophi remotas esse a iudicio vulgi. 2) Loca aliqua Scripturae male ad propositum astronomi detorqueri, eorumque, qui hoc soleant, iudicia utui temeraria contemnenda; nam palam esse, etiam sanctos ecclesiae patres de rebus astronomicis, quas non ex professo didicerant, interdum pueriliter locutos, errori suo patrociniū in Scripturis quaesivisse, ut Laetantius, qui Terram credere non poterat esse rotandam, cui Jobi liber, praeter institutum loquentis Dei ad philosophicam speculationem detortus, adstipulari videbitur.

Quae responsio potest explicari pluribus. Astronomia enim aperit rerum naturalium causas inquirique visus deceptiones ex professo, sacri codices, sublimiora multo tradentes, utantur sermone hominum, ut intelligi possint, eaque occasione naturalium rerum species visui occurrentes, unde sermo hominum ortus, obiter saltem et aliud agentes attingunt, id ipsum facturi nihilominus, etsi constaret omnibus omnino hominibus de visus deceptionibus. Nec enim in id astronomiam ut vos quidem astronomi excolimus, ut sermone vulgi mutemus, sed ut illo manente veritatis fores aperiamus nibilo minus. Planetas stare vel retrocedere, solstitia, Solis conversiones, Solem oriri, occidere, exire ab una coeli extremitate ut sponsum de thalamo, condi in alteram, conscendere coeli medium, moveri contra valles et montes certos: haec usurpamus cum vulgo, scilicet cum sensu oculorum, cum nihil horum ad litteram verum sit, omnibus astronomis in hoc consentientibus. Quanto minus exigendum erit a scripturis divinitus inspiratis, ut repudiata vulgari loquendi consuetudine verba sua ad scientiae naturalis amussim appendant, abstrusisque et importunitis locutionibus de rebus ultra captum erudiendorum populū Dei simplicem perturbent eaque se viam ipsis ad scopum suum genuinum longe sublimiorem interserant? Vide passim totē hoc libro primo vestigia popularium

Scripturae locutionem de mundi motuumque figura, de quibus nulla controversia est; cur igitur circa solum Terrae motum hic sudamus?

Quaedam etiam huc trahuntur, ut ad sensum quidem oculorum examinandam, sed plane aliena a scopo nostro, ut circumstantiae textus arguant; ut cum nou de statu vel quiete astronomica, sed de duratione physica Telluris loquuntur, intereuntibus interim nascentibusque animalibus in ejus superficie, aut cum firmitudo soli, super quod ingrediuntur animalia, eum varis eorum motibus comparatur, aut cum allegoria est, qua per confirmationem columnarum Terrae sopita bella et publica tranquillitas innuitur.

3. Quantum ad auctoritatem philosophorum, ostendit Copernicus, non defuisse statim inter principia natae astronomiae, qui Terram moveri ab oecasu in ortum statuerent, Nicetam apud Cleonem, Philolaum et Ecphantum Pythagoraeos, Heraclidem Ponticum apud Plutarchum; quibus adde ex Archimede et eodem Plutarcho Aristarchum Samium, Cleanthis aequalem, a quo sacrilegii accusatus est apud areopagitas, quod Vestae sacra movisset, Terram moveri asserens.

Hodierno tempore praestantissimi quique philosophorum et astronomorum Copernico adstipulantur, secta est haec glacies, vincimus suffragiis melioribus, ceteris pene sola obstat superstitio aut metus a Cleanthis. Hoc vero ex abundanti est; nam atsi nullus priorum huius veritati testimonium perhiberet, non eo minus illa philosopho fuerit amplectenda. Nam ut in theologia Christiana praepostere agit, qui, a ratione prius petito suffragio, postea demum auctoritates ponderat, sic non minus ineptum est in philosophia, primum auctoritatis expensile, postea demum ad rationes transire. Quanquam vulgus litteratorum, haud multo altius sapiens illiteratis, fors quidem auctoritates praetendunt, secum ipsi vero prius absurdum et insuetum dogma falsitatis damnant ignorantia caeci, quod postquam omnibus modis repellendum et destruendum esse statuerunt, tum demum auctoritates circumspectant hisque se muniant et armant, excepturi contra easdem profanas, sacras sine discrimine, modis iisdem, quibus Copernicus, si eas a partibus paradoxorum dogmatis stans deprehenderent: quod demonstrant in libro Jobis cap. 38, cum quis inde Terram planam et ad funiculi amussim extensam insuperque columnis quibusdam superpositam probat, ut littera sonat.

FINIS LIBRI PRIMI.

EPITOMES ASTRONOMIAE COPERNICANAE

LIBER SECUNDUS.

DE SPHAERA ET CIRCULIS EJUS.

Dixisti, ad demonstrationem motus primi opus esse sphaera materiali. Quid est igitur sphaera materialis et unde sic dicitur? Sphaera dicitur a figura globosa, globus enim Graecis σφαῖρα dicitur; materialis, quod sit facta ex materia aliqua, ut ex papyro, ligno vel metallo. Constat autem quibusdam certis circulis, superficiem unam sphaericam adumbrantibus, in cujus medio globulus ab axe, per mediam sphaeram transeunte, suspenditur; quae sic concinnata mundi effigies est, qualem sibi visus noster imaginatur, in id comparata, ut hoc velut instrumento demonstrari ad oculum possint rationes primi motus eorumque quae a primo motu dependent.

Quid repraesentatur per superficiem sphaerae? Coelum et stellae in eo.

Quid per globum intimum? Globus Telluris.

At necesse dixisti extimam superficiem mundi ubi sit; quomodo igitur potest illa repraesentari? Quemadmodum in geometria circa punctum quodlibet in plano circumducitur circulus licentia geometrica, sic etiam in optica disciplina omnis oculus aliquam circa se circumjectam superficiem sphaericam sibi imaginatur, sive illa per medias fixas transeat, sive supra illas sit, sive infra illas. Et talis superficiei, saltem imaginariae, effigies est in superficie sphaerae.

Posuisti supra Terram insensibilem ad coelum comparatam; globulus iste in sphaera necessario sensibilis est, non est igitur illius effigies. Repraesentat globus iste non magnitudinem Telluris, sed tantummodo Tellurem ipsam per se. Nec enim ipso videri nec fabrefieri, nec partes ejus distingui possent, si proportionem etiam responderet exilitati Telluris.

Negasti supra, Terram esse in centro mundi, cur igitur ejus effigies est in centro sphaerae? Quia Terra, quam globus iste repraesentat, est domicilium oculorum, et vero oculus quilibet imaginatione circa se architectatur sphaeram, se ipsum ponens in centro.

Cum vero oculi tam multi sint et imaginariae sphaerae totidem, cur unus tantum est hic globulus, oculi Telluris index, unica sphaera? Quia omnes imaginariae sphaerae sunt inter se similes adeoque etiam aequales, hoc est sphaera una. Etsi enim oculi multi et ideo contra sphaerae illius

multa, tam ob oculorum multitudinem per omnem Telluris ambitum, quam propter diversas situs Telluris in maximo circulo circa Solem, de quo in doctrina theorica: tamen omnis illa centrorum seu oculorum distantia, collata ad amplitudinem sphaerae fixarum, penitus evanescit.

Quot sunt circuli sphaerae materialis? Ordinarie decem. 1) Horizon. 2) Meridianus. 3) Aequinoctialis. 4) Zodiacus. 5. 6) Duo tropici. 7. 8) Duo polares. 9. 10) Duo coluri.

I. Horizon.

Quis eorum primus est? Horizon seu finitor, quia simplicissima ratione, solo nempe visu et visum secuta ratiocinatione constituitur.

Unde nomen est horizon? Graece *ὁρίζων*, latine finitor dicitur, quod visionem terminet seu finiat, dividens partem mundi superiorem et aspectabilem ab inferiore non conspicua, sic ut superiora omnia usque ad hanc metam seu *ὁρίζον* videri possint, at quas infra illam consistunt, jam non amplius videantur, et stella incidens in hunc circulum vel videri incipiat oriundo, vel desinat occidendo.

Quid igitur de mundo representatur per circulum horizontem sphaerae? Nulla certa et constans mundi pars, sed limbus ille coeli in quocunque ejus situ, in quem limbum desinit aspectabile hemisphaerium, id est in quem incident omnes lineae rectae ex oculo spectantis in partes ultimas aspectabilis globi Telluris, puta in montium cacumina marisque tumorem eductae.

Stellae non sunt in eadem superficie sphaerica; terminus igitur eorum, quae videntur, non est unius superficiei limbus, sed est superficies plana, in profunditatem mundi excurrans ab oculo. Repetenda est prior responsio; etsi enim verum est, stellae non esse in eadem sphaerica superficie, visus tamen illas omnes in eadem sphaerica superficie consistere imaginatur, quia in illis corporibus, quae sunt ultra montes extremos, visus caret adminiculo distinguendi inter propinqua et remota. Sphaera autem materialis est effigies imaginationis visoriae. Et horizon igitur representabit terminum eorum, quae videntur, quatenus illum visus sibi imaginatur ut lineam, non curato, quatenus res visa sit oculo propior aut ab illo remotior.

Proba horizontem esse circulum. Quum aliqua sphaerae superficies secatur plano, sectio fit circulus. Jam figura mundi ratione visionis est superficies sphaerica, horizon vero mundanus concipitur ut planities, secans sphaeram, visum quidem judice, ut initio dictum, est ergo circulus.

At prospectus ille, visus terminus, non est perfectus circulus, sed est limbus flexuosus, per summities extremorum montium incedens, quippe non ejusdem sunt altitudinis. Lineae vero visoriae per illas eductae non ordinantur in eadem planitie. Id quidem verum est. Quia tamen inaequalis haec altitudo montium aliis locis est alta, quibusdam vero locis, ut in medio oceano, nulla, ratio suavit, exprimere medium aliquid in effigie materiali, ad quod compararentur partes mundi, quae vel extuberant, vel subsident.

Quae hinc oritur distinctio horizontum? Horizon vel est visibilis vel rationalis.

Quid est horizon visibilis? In geographia visibilis horizon sumitur pro tanta superficiei terrae portione seu regione, quanta unica rotatione oculorum simul in conspectum venit, quae angusta est, si oculus in valle fuerit, latior, si in altissimo aliquo monte, vide fol. 180. tabellam; qualis quidem

horizon nullus esset, si et Terra perfecte rotunda et punctum oculi visorium in ipsissima Terrae superficie esset. Itaque ubi lata planities est, horizon liber dici solet, ubi montes obstant, horizon impeditus, stanti vero in altissimo aliquo monte vel promontorio et prospicienti vel secundum decursum fluvii vel in maris extrema, horizon dehiscere. Quae sunt epitheta horizonis mundani visibilibus comparati ad rationalem.

Quomodo ratio constituit horizontem rationalem, si ad hanc rem visus destituitur? Non plane visus destituitur, sed eo nititur adjuvatque illius instrumento dioptrae. Nam linea dioptrae, quando cum linea perpendiculi facit angulum rectum, dirigit oculum in horizontem rationalem describitque circumsecta planum horizonis rationalis. Itaque rationalis horizon undequaque quadrante circuli maximi abest a linea perpendiculi, et radius visivus per dioptram exiens, ubi in partes terreas seu montes inciderit, illas iudicat supra horizontem rationalem exstare; ubi vero in purum coelum, subsidente Terra, ibi iudicat, se respectu illius depressae plagae stare elevatum.

Qui sunt poli rationalis horizonis? Punctum verticale, Arabice zenith, ejusque oppositum, nadir dictum.

Quid est punctum verticale? Est punctum sphaerae, aspectabilis, in quod incidit perpendiculi linea, id est recta ex centro Terrae per oculum spectatoris imaginatione educta. Nam quae ex centro globi, necessario ad angulos rectos incidit in perfecti globi superficiem, eoque perpendicularis est illi, id est plano rationalis finitoris.

Unde dicitur verticale? Quia corpus hominis erectum est ad perpendiculi lineam ob pondus; extremum igitur perpendicularis lineae continuatae imminet vertici hominis.

Proba, verticale punctum esse polum horizonis. Recta ex centro circuli sphaerae perpendiculariter educta per polos illius circuli transit, ut docent geometrae. Talis circulus horizon est, talis recta perpendiculum, ut jam patuit ex definitione. Transit igitur per polum horizonis, at ducitur per zenith, ergo zenith est polus horizonis.

Unde hoc evenit oculis, ut putent, planitiem Terrae cohaerere ipsi coelo et sic secare sphaeram, cum sint tanto intervallo ab invicem remota coelum et Terra? Quia cum distantia non sit objectum visus primarium, ut docent optici, sed per ratiocinationem comprehendatur ex multitudine intersectorum corporum visibilibus, inter coelum et extrema Telluris aspectabilia nihil interjicitur, quare visus adnuculo destitutus est agnoscendi distantiam hanc.

Cum ergo sphaera materialis sit effigies mundi, ut is incurrit in oculos, non debuit aliud esse in illa circulus horizon, aliud globus Telluris in sphaerae medio, sed planum continuum, transiens per ipsum centrum, ut visio representaretur. Dehuit equidem, at fieri non potuit, si planum horizonis fuisset integrum, ut sphaera in eo moveretur. Itaque planities horizonis representatur forinsecus, intus vero est pertusa, ut det locum sphaerae. Cum igitur horizon sic expressus representet nihilominus apparentem sectionem sphaerae in duo hemisphaeria, interiora vero hujus planitiei exenta nulli sunt usui praeterea, facile illi sphaera carere potuit.

Telluris vero globulus in medio nihilominus appenditur, cum ob geographiam, tum ad monendum quadamtenus et de origine horizonis et de contenta Terrae exilitate. Qui tamen vult, is in circulo plano, aptato ad internam sphaerae amplitudinem, depingat loci sui, in quo versatur, visibilem

horizontem, id est regionem, eumque in sphaera fixum centro et horizonti exteriori circumposito respondere faciat.

Cujusmodi circulus est horizon respectu superficiei sphaericae? Circulus, sphaerae maximorum nous, quia per centrum sphaericae superficiei transit.

Quodnam centrum habet circulus horizon mundanus? Sicut in sphaera materiali est idem centrum et sphaerae et horizontis, sic oculus contemplan- tis, quem hoc centrum repraesentat, idem est centrum et horizontis sui munda- ni et totius sphaerae imaginatae.

Erunt ergo multi horizontes mundani, quia innumerabilia puncta per Terrae superficiem, in quibus oculus locari potest? Re vera sunt innumera- biles horizontes mundani, situ distincti, quorum plerique se mutuo secant; soli duorum quorumcunque oppositorum Terrae punetorum sunt inter se paralleli. Multo vero major oritur numerus horizontum, si cogitationes etiam ad motum Terrae annuum circa Solem transferamus, de quo in doctrina theoriae.

Cur ergo in sphaera horizon est unicus? Quia quaelibet sphaera in una qualibet sui positione est certae altitudinis et unice visionis coeli imago. Deinde, quia ille in sphaera uleus per vices omnibus in mundo horizontibus accommodari potest.

Si horizontes duo mundani duorum oppositorum locorum Terrae (aut etiam circumlationis Terrae circa Solem) sunt inter se diversi, distantes inter se ubique integra diametro Terrae (aut etiam orbis Terrae circa Solem), non dividetur iis coelum totum in duo hemisphaeria spectabilia, sed relin- quetur in medio limbus coeli, latitudine hujus diametri, qui neutri accen- sebitur hemisphaerio. Verum est, at limbus ille coelestis propter immensam ab oculo distantiam evanescit prae contentissima exilitate, quippe qui angus- tior apparet eminus, quam una ex stellis fixis, ut supra lib. I. fol. 161. proba- tum fuit. Quapropter etiam hoc loco sufficit in sphaera materiali horizon unicus, usurpatus pro duobus parallelis, inter se distantibus, perinde ac si uterque per idem centrum traducti coinciderent penitus.

Sufficere unum horizontem concedo pro fixis; quid vero sit de planetis, qui non tam longe remoti sunt a nobis ut fixae? Planetas in primo motu non aliter consideramus, quam quatenus eos visn duco inter ipsas fixas con- stitutos imaginamur; quin imo non ipsum planetam in sua remotione a Terra consideramus, sed pro planeta locum ejus inter fixas apparentem. Et plerun- que praesupponimus planetam in nro aliquo puneto immobilem per integram revolutionem diurnam seu horas 24. Nam quod is intra unam diem motu vel proprio vel accidentario et apparenti locum illum parumper commutat, ejus rei causas non a primo motu accersimus, nec in sphaera materiali demonstra- mus, sed transsumimus ex doctrina theoriae.

Axis et poli.

Quomodo in sphaeram inductus est axis et poli? Terra movetur velut globus in torno, ejus opposita duo puneta respectu motus primi manent; corpus reliquum circa illa immobilia circumvolvitur. Puneta illa duo dicun- tur poli Terrae; linea connectens illa puneta, quae et per centrum Telluris transit, dicitur axis Terrae.

Jam fingimus, axem Telluris continuatum esse utrinque usque ad extre- mitatem superficiei fixarum; ubi ergo superficies fixarum secatur ab hac linea, ibi sunt poli mundi; linea haec ipsa continuata dicitur axis mundi et reprae-

seutatur ab axe sphaerae, a quo suspensus est globalus medius; et extremitates ejus in mundo representantur per polos sphaerae.

In schemate 28 linea BAC axis est, B et C poli.

Ubi sunt poli Telluris? Alter est abhinc trans mare glaciale, quod est post Daniam, Norwegiam, Moscoviam, Lapplam, Tartariam in loco ignoto, ut de quo non constat, aequine superflus sit, an terram continentem insulasve habent. Reliquus est in medietate terrae Magellanicae multo minus cognitae, ut cujus litora novum circumcirca sunt detecta et explorata, nolum ut sciamus, perpetua introrsum continens sit, an maribus diremta.

Dixisti libro primo, axem et polos Terrae perpetuo iisdem Terrae partibus inhaerere: quæro unde hoc probes? Ex altitudine poli sphaerae. Nam si poli Terrae vagarentur in superficie Telluris, vertices locorum non retinerent eandem circularem distantiam a polis sphaerae, quippe qui sunt vertices polorum Terrae; et sic non semper aequali arcu elevaretur in aliquo Terrae loco certo polus sphaerae. Manente igitur altitudine poli sphaerae invariabili, ut dicitur libro III, poli etiam Terrae iisdem Terrarum locis inhaerent necesse est.

Ubi sunt poli mundi seu sphaerae? Transeunt de uno loco fixarum ad alium successu seculorum, et hodie alter, qui nobis in Europa semper apparet, est proxime extremam caudae Ursae minoris, alterum in Europa, Asia, America et magna parte Africae nunquam ceruimus; atque is fertur in loco coeli vacuo a stellis fixis notabilibus.

Quomodo appellatur polus nobis aspectabilis? Arcticus ab Ursa minore, graece ἀρκτος; dicta; et septentrionalis, quæ stellae Ursae Latius septem boves seu triones dicantur. Aquilonaris etiam a vento aquilone, qui spirat ex illa plaga; sic borealis a vento borea.

Quomodo dicitur polus inconspicuus? Antarcticus, quasi arctico oppositus, et meridionalis, quod nobis in hac medietate globi Terrae versantibus Sol meridiano vergat in illam plagam, versus quam polus iste sub Terra latet abditus; australis etiam, quod ventus ab illa plaga ad nos veniens anster appelletur.

Cur vero sphaera materialis circa hunc suum axem et polos est convolutibilis, globus contra medius illi affixus et immobilis, cum supra dixeris, sphaeram fixarum stare, Terram vero, cujus effigies est ille globulus, convolvi? Et si verum hoc supra dictum est, quia tamen visus aliter, nimirum populariter judicat, Terram stare, coelum volvi, ideo hoc in sphaera materiali, ad unum Terrae locum accommodata, sic exprimitur. Est enim sphaera effigies mundi talis, qualem sibi visus noster imaginatur, ut supra dictum.

At quomodo eorum, quae coelitus eveniunt, verae causae tradi possunt per instrumentum falsitatis particeps? Nihil nos impedit haec visus decipio, etiam in instrumentum relata, quo minus veras causas hauriamus. Nam circuli plerique in coelo et in Terra iidem sunt et sibi invicem subordinati linea ex centro Terrae in coelumeducta. Jam certum est, partes tractus coeli a subiectis partibus tractus Terrae, per quos tractus transeunt hi circuli, a se invicem separari motu diurno, peractoque circuitu ad primum correspondens repere, sive coelum quiescente Terra, sive haec quiescente illo moveatur super axe mundano: quorum utrumque in sphaera materiali representari potest.

Cur autem ex duobus idem praesentibus, sc. ex coeli et ex Terrae motu, non id potius in sphaera materiali exprimitur, quod verum est, sc. motus Terrae? 1) Quia astronomi officium est, causas dicere, cur visus noster hoc et illud sibi imaginetur, verbi gratia cur Sol jam hoc, jam illo loco ho-

risontia oriri videntur, vere enim non movetur. Jam hac causae aliter explicari non possunt, nisi etiam elementa prima, quae sibi visus imaginatur quibusque visus postmodum judicando innititur, sc. conformationem mundi ejusque motum apparentem seu imaginatam explicemus adeoque et instrumento sphaerae materialis exprimamus.

2) Posset sane fieri sphaera exterior et immobilis, horizon et meridianus cum verticali puncto mobiles intus; sed turbarentur non tantum discentes, verum etiam adulti: semper enim sibi easum imaginarentur, quoties vertex respectu situs sphaerae in menas vergeret deorsum.

II. Meridianus.

Quibus principiis constituitur meridianus? Imaginamur in Terra quidem circulum transeuntem per locum habitationis nostrae et per polos Terrae, inter fixas vero circulum traductum per punctum verticale ejusque loci ejusque oppositum, sive nadir, et per polos sphaerae.

In schemate hoc F est zenith, G nadir, B, C poli.

Fig. 23.

Cujusmodi circulus est meridianus? Est maximorum unus, ducitur enim per utrumque polum et sic planum ejus transit per axem et per oculum, qui est centrum sphaerae, secaturque sphaeram bisariam.

Unde dicitur meridianus? A meridie: cum enim super horizontem perpendiculariter sit erectus, secatur igitur hemisphaerium aspectabile in duas partes aequales, quare Sol ad eum applicans motu diurno facit meridiem in loco, ejus est ille meridianus; meridiem enim pro meridie vel media die usurpat, cum pars diei exacta aequalis est residuae. Hinc etiam stellae, cum ad hunc circulum applicuerint, coelum mediare dicuntur.



Quas in partes sphaera dividitur a meridiano? In duo hemisphaeria vel in hemisphaeriorum ab horizonte constitutorum semisses seu quartas coeli orientales et occidentales, seu surgentes at cadentes. Cum enim uterque sit in meridiano, polus et vertex, et stellae circa polum eant circulariter, uspiam igitur nisi in meridiano sunt vertici proprios, id est altiores.

Quot sunt meridiani? In sphaera materiali meridianus unus est, quippe sphaera quaelibet ipsa sui collocationis repraesentat unum aliquem Terrae locum. At respectu Telluris, cum horizontem visus, meridianum verticale punctum constituent, tot sunt meridiani, quot in uno circulo Terrae loci, in superficie mundi verticalia sua puncta habentes, hoc est innumeri, quibus tamen meridianis amobus unicus sphaerae meridianus (ut locis ipsis omnibus unica sphaera) satisfacit. Geographi constituunt pro innumeris certum numerum, sc. 180, quibus dividunt superficiem Terrae in partes 360 aequales.

Quomodo discernuntur ii inter se? Discernuntur numeris ab uno ad 180. Post 180^{ma} loca Terrae proxime succedentia referuntur rursus sub primum meridianum, sc. sub ejus semicirculum inferiorem, aut etiam continuant numerationem semicirculorum ad 360.

Unde fit hujus numerationis initium? Vetusto quidem instituto meridianus ille, qui per Canarias insulas in oceano Atlantico transit, primus fuit

tractus iste coeli u fixis, quae in eum inelidunt, earumque dispositione. Veteres enim cum in anno uno duodecim plenilunia fieri cernerent, interdum et tredecim, regionem etiam zodiaci in duodecim partes distinxerunt adminiculo diversae dispositionis fixarum, et diligenter attenderunt, in quo signo seu *ποση* quaelibet lunatio, plena aut dimidia Luna, censeretur.

Quae sunt illa duodecim signa, et quae cuiusque imaginandi causa vel adminiculum? Situs stellarum fixarum admonuit primis observatores de membris certis unimalium. Dicitur igitur est Aries a duobus potissimum cornibus, uno curvate et a subjecto corpore; Taurus a facie taurina et oculis duobusque cernibus; Gemini a duobus capitibus, quatuor veluti brachiis, genibus et pedibus; Cancer a nebulosis oculis, a multitudine pedum circa corpus; Leo a rictu et quatuor magnis stellis in fermam animalis dispositis; Virgo a duabus alis, capite et limbe symmetria. Libra nullum est signum *ζωδιου*, cum non sit animal, nec dispositio stellarum aliud argumentum praebet imaginandae librae, quam quod duae magnae stellae sunt pro duobus lancibus. Illae vere stellae accenscentur signe sequenti et dicuntur chelae Scorpii. Libra igitur dicitur ab aequilibrio diei et noctis, et sic ab *ee*, quod sit in hoc signo, non ab *ee*, quod apparet oculis, de fixis; Scorpiae a curvae caudae spondilis et aculeo, corporis vertebria, fronte et chelae protensis; Sagittarius ab arcu et sagitta et subjecta equina forma; Capricornus a cernibus, facie et ventre; Aquarius a capite, bumeris, brachio, corpore, urua et longo rive; Piscis a corporibus piscium, linea et nodo lini, situ stellarum expressis. De his triti sunt versiculi ad memoriam juvandam:

Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo;

Libraque, Scorpium, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces.

Quas sphaerae partes constituit zodiacus? Hemisphaerium septentrionale et australe, sicut aequater; de qua divisione infra plura.

V. VL Tropici.

Unde oriuntur Tropici? Ecliptica est ad aequinoctialem et sic ad primum motum obliqua. Finge igitur, eduei lineam ex centro Terrae in duo puncta eclipticae sub fixis, quae sunt ab aequinoctiali remotissima, alterum in septentriones, reliquum in austrum, Terramque interim ceu veli quiescente hac linea; secabit igitur hanc linea circumducta superficiem Terrae utrinque circule non maximo, sed minere et ad latus aequatoris stante. Horum duorum circulerum effigies depingi solent in glebulo sphaerae materialia. Deinde finge lineam hanc, in aliquo puncto hujus circuli terrestria affixam et nihilominus usque ad fixas extensam, circumire cum Terra aut etiam quiescere cum Terra, aeolo fixarum circumcunte: describit igitur ista linea circulum in summo coele fixarum, correspondentem circulo priori in Terra et hae in utraque plaga coeli. Horum igitur duorum circulerum effigies sunt illi duo circuli in sphaera materiali collateralis. In schemate 28. LS et RQ.

Unde nomen est Tropici? A graeca voce *τροπή*, conversio: Sed culm ad puncta eclipticae, per quae transeunt hi circuli, sc. ad principia Canceri et Capricorni veniens, cursum quadamtenus convertit, ut qui prius ab aequatore semper magis atque magis ad latus luter progrediendum exspatiabatur eoque in nostra sphaera positivie extra tropicos quotidie altius evaserat in meridie, iam incipiat ad aequatorem iterum deflectere cursum et quotidie humilior fieri in meridie; contrarium in opposito eclipticae puncto: que facto etiam tempestates in Graecia mutantur, quae mutationes ideo etiam *τροπαι* dictae

sunt. Et dicuntur tropicus Cancri, tropicus Capricorni, quilibet a suo eclipticae puncto, in quo tangit illam.

Quomodo aliter dicuntur? Solstitiales eo, quod, priusquam conversio illa cursus Solis qualiscunque seu potius conversio declinationis ejus a media aequatoris linea sentiat, Sol interim per dies aliquot in eadem elongatione ab aequatore eoque etiam in eadem altitudine temporibus meridianis inveniat, et sic respectu hujus invariabilis declinationis et altitudinis, ad quam quotidie enititur in meridie, quodammodo stare videntur. Lucanus lib. IX. Pharsaliae tropicam Cancri appellat circulum alti solstitii, eumque ait percutere, id est tangere medium orbem signorum, id est eclipticam, per mediam zodiaci latitudinem ductam. Et respondet locus; templum enim Hammonis in Africa, de quo hic Lucanus, Ptolemaeus ponit habere lat. 28° , quod Lucanus usurpavit pro $23\frac{1}{2}^{\circ}$. Frustra Sulpitius aliud subintelligit, solstitia multiplicans; nimium fidei Lucano, qui verborum prodigus multa hic glomerat, quae cum ipsi tropico Cancri, tum toti zonae torridae, pleraque mediae aequatoris lineae, quaedam etiam tropico Capricorni et locis australioribus competunt. ¹⁹⁾

Quae loca Terrae subeunt tropico Cancri? Initium ejus est in citeriori parte Africae, ultra Atlantem, transitque per confinia Libyae et per Syenen Aethiopiae. Inde trajecto mari Rubro ultra montem Sinal et Mecham, Mahometis patriam, exinde Arabiam felicem, Nabataeam dictam ²⁰⁾, mediam secat; ingressusque oceanum Indicum ultra sinum Persicum, litoribus Caramaniae et ostiis Indi fluvii, trajectaque India ostiis Gangis propinquat; rursusque continentem aggressus Indiam extra Gangem traiecit, ultimisque Sitis salutatis oceanum australem spatiosissimum traiecit et jam Americae appropinquans infra Californiam regnum Mexicanum adortus, Mechoaca et Mexico paulo citerior, egressusque in sinum Mexicanum, litora septentrionalia Cubae legens, in oceanum Atlanticum sese revolvit.

Quae loca Terrae subeunt tropico Capricorni? Hic in oceano Aethiopico ultimo inter insulam S. Helenae et caput Bonae Spei, seu australem Africae extremitatem, linguam illam Africae seu Monomotapae regnum et australem partem insulae Madagascar secat oceanumque orientalem longissimo tractu pervadens, rursusque linguam orae Magellanicae infra Javæ insulas, et post aliquantulum oceani allam Magellanicae oram, Novam Guineam dictam, traiecit; tunc australem oceanum ultra Salomonis insulas ingressus paulo minus dimidia sui longitudine oceani finitibus mergitur, donec in Americam evadens, ultimam ejus linguam praeseceat, ingressus ex parte provinciae Chili, egressusque in oceanum Atlanticum cis ostia fluvii Argentei in Brasiliâ; sic minima sui parte Terras adit.

VII. VIII. Polares.

Unde oriuntur Polares? Ecliptica sub fixis habet suos polos, distantes a polis mundi. Finge ergo duas rectas ex centro Terrae usque ad fixas, sc. in polos eclipticae eductas, quae quiescentes, intercedente motu Terrae diurno, secabunt superficiem Telluris, sectiones erunt circuli parvi circa utrumque Terrae polum; horum effigies depingi solent in globulo sphaerae medio. Affigantur jam istae lineae in uno aliquo circuli terreni puncto, rursus igitur intercedente motu diurno linea ista, una cum volutione Telluris circumtorta, sub fixis describet circulos respondentes illis terrestribus. Atque horum effigies sunt polares dicti in sphaera materiali.

In schemate 28. sunt TO et PV, circa polos aequatoris B, C a polis eclipticae O, P descripti.

Quae loca Terrae subeunt circulo polari arctico? Mediam trajicit Islandiam, Thulen veteribus dictam, sitam in oceano septentrionali supra Britanniam. Emensus autem illum oceanum, supremam Norwegiam ingreditur, inde ultimum recessum sinus Bodiel, in quem ex mari Baltico navigatur, praetervectus Lappiamque emensus, in sinum Moscoviticum illabitur; Tartariam autem extremam et Cathayae litora delibans, fretum Anian oceano Sineni contiguum trajicit, et de reliquo se incognitis Americae locis coudit, e quibus in freto Davis iterum emergit proximasque Groniandiae oras trajicit, in se rediens apud Thulen.

Quae loca Terrae incident in polarem antarcticum? Ad illa usque loca navigantium industria necdum est perventum; ceterum tota illa regio superficiei Telluris obsidetur incerta opinione perpetuae continentis, quae Magellanica appellari coepit quaeque post nostram illam in tres partes, Europam, Africam et Asiam, antiquitus subdivisam, et post Americam tertia est ex illa, quae circumcirca a se invicem, iustar insularum, oceso ejusque fretis sunt directae.

Quomodo sphaera dividitur per tropicos et polares, seu quid sibi volunt illi diversicolores limbi in globulo sphaerae intimo? Superficies Telluris per duos tropicos et duos polares dividitur in quinque partes, quarum tres mediae sunt limbi circulares; propter quod partes illae omnes dicuntur quinque zonae. Jam zonae mediae color rubeus significat zonam torridam estque tractus ille terrarum, quas supra dixi aequatori et tropicis subjectas cum interceptis Terrae partibus. Duarum lateralium viridis color zonas denotat temperatas, quarum alteram nos Europaei tenemus et Asiae potissima pars, nec exigua Africae, denique Americae dimidium supra novam Granatam Mexicanam; extremarum vero zonarum, quae patellarum potius speciem habent, color caeruleus vel albus significat zonas frigidas et tractus terrarum, cinctos illis locis, quae polaribus subjecta diximus.

Quae causa est nominum et colorum? Torrida dicitur ab aestu immenso et intolerabili, qui adurit et arescere facit terras, ut brunnem colorem induant; frigidae a frigoris excessu, quod enecat terras et pallere facit, aut spoliatas arboribus et plantis nive dealbat; temperatae a contemperatione caloris et frigoris, grata plantis et animalibus, unde omnia florent et virent suis temporibus.

Ergone frigoris excessus index est zonae frigidae, caloris intensio zonae torridae? Nequaquam sic simpliciter se res habet. Nam cum nos in zona temperata simus, aestate tamen aestu gravamur, hieme gelu, neque tamen interim de una zona in aliam transferimur. Et sunt in hac eadem zona temperata, sunt inquam loca frigidissima toto anno, ut in America nova Albion; sunt in zona frigida florentes terrae, ut est Groulandia a virore Tentonicae cognominata; sunt denique in torrida beatissimae et temperatissimae sedes, ut in Africa occidentalissima, in Peruana inque insulis ocean! indici et orientalis.

Cur ergo torridae tribuitur aestus, frigidis frigus, temperatis temperies per haec nomina et colores? Quia cum calor, frigus et quae has qualitates comitatur ubertas aut sterilitas terrarum varias habent causas, coelestes et terrestres: coelestes quidem universales sunt et praepollent, terrestres vero particulares et in quorundam locorum temporumque angustias redactae sunt

nec late patent, sed circumsessae conspiciuntur ab universalī causa. Igitur in hoc intimo sphaerulae globulo depingitur nobis modus causae coelestis. Adde quod in hac nostra Europa ejusque nobilissima olim parte Graecia causae terrestres cum coelestibus egregie conspirare deprehensae sunt a primis artium harum inventoribus. Vertentibus enim faciem ad orientem a dextris est Syria, Aegyptus et Africa, regiones fervidae, supraque illas Arabia, Aethiopia, Libya, saxosae aut arenosae regiones, cujusmodi loca calorem Solis adjuvant in immensum; a sinistris est Thracia, Sarmatia, Scythia, ex cujus paludibus et montanis nive tectis venti frigidi exspirantes Istrum vicinosque fluvios gelu constringunt per hiemem et unde per aestatem etesiae spirant, praecipuum aestus lenimentum.

IX. X. Coluri.

Qua ratione coluri duo sunt in sphaera constituti? Imaginati sunt astronomi circulum unum per polos aequatoris et eclipticae, alterum per polos solius aequatorie et per sectiones ejus cum ecliptica transeuntem, utrumque ex maximis, ut ii concursu et sectione sui mutua in polis aequatoris binos utrinque polos effigiarent, a quibus sphaera materialis, trajecto axe, euspenderetur et circumageretur, et in quibus reliqui sex circuli (excepto horizonte et meridiano) infingerentur atque compingerentur.

In schemate 29. est BMCN colurus aequinoctiorum, quia M, N sunt puncta aequinoctialia. Et OBLDPC colurus solstitiorum, quia L, Q sunt puncta solstitialia et O, P poli eclipticae.

Quomodo appellantur? Coluri graeca voce a curtatione caudae, quod eorum extrema circa polum inferum non cernerentur a nobis et sic veluti praecisa essent ab horizonte. Et prior quidem colurus solstitiorum dicitur, quia transit per puncta eclipticae solstitialia, alter vero colurus aequinoctiorum, quia transit per puncta aequinoctialia.

Quodnam habent nomen commune hae sectiones eclipticae? Dicuntur puncta cardinalia, quod in iis cardines tempestatum anni vertantur, hoc est quod Sole in iis versante praecipuae temporum mutationes contingant.

Unde dicuntur illa aequinoctialia, haec solstitialia? Aequinoctialia dicuntur, quod ibidem etiam aequinoctialis eclipticam secet, et quod Sol in illa lucidens dies aequet noctibus. Solstitialia vero et tropica, quod illis in punctis tropici tangant eclipticam et Sol iis transitis cursum conversurus stare videatur.

De Distinctione circulorum.

Explicata singulorum origine dic jam confirmandae memoriae causa, quot modis hi decem circuli inter se distinguantur? Sex modis: vel enim ratione subiecti, vel ratione originis, vel ratione quantitatis, vel ratione figurae, vel ratione situs ad motum comparati, vel ratione motus ipeius.

1. *Quomodo differunt inter se ratione subiecti?* Alii sunt proprii certorum et separatorum tractuum coeli solius, ut zodiacus et coluri duo, alii ratione proprii certorum et separatorum tractuum Terrae, in coeli vero certos et separatos tractus sunt tralatitii, ut aequator, duo tropici, duo polares; neque enim existimandum est, esse stellam ullam fixam vel erraticam, vel etiam Solem ipsum, quae motu trajiciat regionem illam fixarum, in quam transferuntur hi circuli; alii denique neque coeli neque Terrae separatis tractibus, sed omnibus promiscue tralatitii conveniunt, qui proprii sunt sphaerae, instrumenti primi motus, ut horizon et meridianus.

Eorum vero, qui sic coelo tribuuntur, alii easdem in eo sedes obtinent perpetuo, ut zodiacus, qui coelo competit non respectu motus diurni Telluris, sed propter astra sola motusque eorum secundos; alii successu seculorum migrant sedes suas et ad vicinas transeunt, ut il, qui coelo competunt respectu motus diurni Terrae, puta coluros et omnes lu coelum tralstitios. Ita qui Terrae inhaerent, immutabiliter quidem ei inhaerent omnes, alii tamen insunt ei tantum propter diurnum ejus motum ut aequinoctialis, alii propter comparisonem diurni motus cum circulo coelesti zodiaco, ut duo tropici et duo polares.

2. *Compara eos ratione originis.* Quidam sunt primarii, ex suis quilibet ortus causis, quidam secundarii, a primis junctis inter se dependentes.

Primarii originem habent vel mundi intrinsecam, puta motum: ut zodiacus, coelestis circulus, motum secundorum mobilium, aequator, terrestris circulus, motum primum Telluris; vel originem extrinsecam habent, ut horizon visum hominis, incolentis mundi machinam. Secundarii sunt, qui comparatione mutua primorum inter se existunt: In Terra quidem duo tropici et duo polares, comparationis zodiaci et aequatoris polorumque, in coelo vero coluri, comparatione eorundem, in sphaera denique materiali meridianus, comparatione horizontis et aequatoris polorumque, quae omnia hactenus explicata sunt.

3. *Distingue circulos ratione quantitatis.* Quantitas, ut hactenus, intelligitur comparata ad superficiem sphaericam, non vero ad materiam vel mundanum vel sphaerae fabrillem. Itaque alii sunt maximi, qui idem cum sphaerae centrum habent, ut zodiacus, aequator, horizon, meridianus, duo coluri, alii minores, qui alia centra habent quam sphaerae centrum, ut duo tropici, duo polares.

Si sex maximi sunt ideoque aequales inter se, cur in sphaera fabricatur meridianus major reliquis et horizon solus omnium maximus? Id fit necessitate materiae: non posset enim sphaera construi et manibus circumagi, nisi horizon extrinsecus complecteretur sustentaretque meridianum, meridianus sphaeram; ceterum non tota armillarum harum superficies, sed tantummodo intimus horizonis et meridiani, extimus vero reliquorum orbis, nomen circuli sui sustinet officioque ejus fungitur. Ac etiam intimus exteriorum latior est etiamnum extimo circularum interiorum orbe, id tamen rursum fit tantum ad facilitandum motum sphaerae, ratione vero intelligitur, aequales esse debere, quippe qui se mutuo tangere debbant; quae vero se mutuo tangunt, ea geometrice quoad contactum sunt unum.

Quid praecipue circulis sphaerae accidit inter se comparatis respectu hujus distinctionis? Cum plana circularum sphaerae aut concurrant intra vel extra sphaeram seque mutuo secant, aut non concurrant, sed parallela iuceant: in circulis quidem minoribus astronomi diligenter considerant parallelum situm, lu maximis vero mutuum eorum sectionem. Nam maximi inter se paralleli esse non possunt, sed aut coincidunt aut se mutuo secant; minores vero etsi non sint paralleli inter se, in superficie tamen sphaeras se mutuo non semper secant; nec magnus sectionum illarum est usus.

Quis igitur sectionum inter se maximorum est usus? Terni maximi constituent sphaericum triangulum, bini sphaericum angulum; in his versatur doctrina triangulorum, qua omnes primi motus rationes continentur, explicantur inque usum produciuntur.

Quot res considerantur in unoquoque triangulo sphaerico? Sex: tria latera, trium sc. circularum maximorum arcus, et tres anguli.

Quid metitur angulum sphaericum, ut is cum latere possit comparari? Sphaericum angulum metitur circulus litem maximus (aut etiam minor quicumque) ex angulo seu polo descriptus. Et rectum quidem angulum sphaericum non minus quam rectilineum metitur quadrans circuli. Itaque si bina anguli crura quadrantes fuerint, latus angulo subtensum est ipsa mensura illius anguli; si duo trianguli latera non fuerint quadrantes suorum circulorum, omnino sex circulis maximis ad id opus erit, tribus quidem, qui latera praebent, tribus aliis, qui mensuras angulorum.

Sic igitur angulos comprehensos inter circulos, qui per verticem transeunt, metitur horizon, angulos eorum, qui per polos mundi, aequator aut parallelorum unus, angulos eorum, qui per polos eclipticae, ipsa ecliptica.

Sit triangulum CAB, cujus omnia tria latera quadrante minora; si ergo sint CE, CD quadrantes, ED erit mensura anguli ACB, quia circulus ED ex C polo descriptus est. Ita si BF, BH quadrantes, FH arcus erit anguli ABC mensura. Ita si AI, AG quadrantes, GI metietur angulum CAB.

Quae est summa doctrinae triangulorum sphaericorum? Si fuerint ex sex rebus cujuscunque trianguli tria nota, ex his investigare quodcumque ex tribus reliquis beneficio rectarum circuli. De hac doctrina exstant peculiare libri.

Recense rectas cujusque arcus, utiles ad solutionem triangulorum sphaericorum. Ab uniuscujusque arcus quadrante minoris termino uno ducuntur duae, altera in centrum, quae dicitur radius vel sinus totus, altera tangens, in plagam arcus; ab altero arcus termino litem duae, altera perpendicularis in radium, seu parallela tangentis, quae dicitur sinus, dividitque radium in sinum complementi et sagittam seu sinum versum; altera introrsum quidem usque ad centrum, extrorsum vero usque ad tangentem, terminans eam vicissimque terminata ab illa, quae dicitur secans; sic recentiores. Antecessorum alii graeca utuntur appellationibus, pro radio semidiametrum vel basin, pro tangente cathetum (latino perpendicularum), pro secante hypotenusam (subtensam, puta angulo recto) dicentes; alii ad usum respicientes, tangentes seu potius earum numeros appellant foecundos.

Arcus BC, A centrum, BA radius, sinus totus, semidiameter vel basis; BD tangens, cathetus vel foecunda, CE sinus, EA sinus complementi, EB sinus versus vel sagitta, AD secans vel hypotenusa.


Quid amplius observandum de sectionibus inter se maximorum? Cum unus transit per alterius polos, vicissim etiam alter per primi polos transit, et per consequens, cum unus per duorum polos transit, habebit polos suos in eorum communibus sectionibus; et arcus ejus, interceptus inter polos, aequalis est arcui inter circulos eorum.

Ita in schemate 28. poli aequatoris B, C in meridiano sunt, nec minus et poli horizontis F, G, id est zenith et nadir, ergo etiam poli meridiani M, N (ex quibus ille veluti descriptus intelligitur) sunt in sectionibus aequatoris et horizontis mutuis. Quare meridiani arcus DH metitur angulum HMD, quem facit horizon cum aequatore. Sic LD et BO sunt aequales. Reliqua inveniuntur apud geometras.

Fig. 30.



Fig. 31.



4. *Ratione figurae quomodo circuli sphaerae distinguuntur?* Omnes alii latitudine carent, solus zodiacus cum aliqua latitudine est, limbi sphaerici figura.

Armillae tamen illae circulares omnes aliquam obtinent crassitiem, quae extrinsecus et intrinsecus limbi figuram repraesentat. Id rursum fit necessitate fabricae eoque in aliis materiis alia est crassities; constructio vero sic est aptata, ut alterutrum solummodo latus illius crassiae armillae lineam circularem, cui nomen et officium circuli competit, exhibeat.

5. *Quomodo inter se differunt circuli ratione situs ad motum primum?* Aequator per mediam sphaeram, ut ea movetur, traductus est regula motus, reliqui ad illum vel recti sunt, ut meridianus et duo coluri, vel obliqui, ut zodiacus, vel ei paralleli, ut duo tropici et duo polares, in quibus etiam ipse parallelorum maximus est dictus; ultimus horizon pro diversis sphaerae altibus, nimirum pro diversis in Terra habitationibus, jam rectus est, jam obliquus, jam coincidens cum aequatore et sic inter parallelos.

6. *Tandem ut differunt inter se circuli ratione motus?* Aliter ratione sphaerae materialis, aliter ratione mundi. Quoad sphaeram, immobiles sunt horizon et meridianus, ceteri mobiles omnes, quippe visus, horum immobilium auctor et origo, iudicat se quiescere. At quoad ipsum mundum, fit contrarium, nam solus horizon et meridianus mundani moventur, tractus vero coeli, in quos ceteri competunt, quiescunt. Denique quoad Terram, aequator, duo tropici et duo polares in ea affixi sunt meridiano et horizonti loci, et sic cum tota Terra sunt mobiles. Haec supra sunt explicata clarius.

Quae est causa huius discrepantiae inter circulos Terrae? Causa consistit in variis et multiplicibus usibus materialis sphaerae. Nam si hic solum esset usus ejus, ut et ipse et reliqui paralleli ostenderent, super quorum Terrae locorum vertices incedant illa eclipticae puncta, quae in unumquemque parallelorum incident: tunc in sphaera omnes paralleli potuissent et debuissent affigi meridiano fierique immobiles; sicut in Terra sunt eidem affixi, quippe cum bi circuli primo insint Terrae indeque in coelum per imaginationem transferantur. Nam tunc oculus fingeret sibi aliud quasi tabulatum, aut alium fornacem extra et supra coelum ultimum, sub quo veluti quiescente fixarum sphaera decurreret; et tunc quodlibet eclipticae punctum in illud exterius tabulatum, in quo finguntur inesse meridianus et horizon sphaerae, inscriberent etiam suos parallelos, respondentes parallelis Terrae, itidem veluti quiescentis; et sic per fictionem hanc affigeret eos meridianus. Sed quia tunc puncta duo eclipticae, in quibus illa secatur ab aequatore, pertransirent successive totum aequatorem, existentem immobilem, aequator vero propter alios usus debuit suscipere numeros ab 1 ad 360, initio non per dies singulos vago, sed certo et constanti, sc. a sectione vernali eclipticae: igitur affigi debuit aequator ipsi eclipticae et sic cum ipsa ecliptica sphaerae fieri mobilis. Uno vero parallelorum affixo ad sphaeram mobilem, causa nulla erat, quin reliqui paralleli omnes eidem affigerentur et pro quiescentibus fierent mobiles, nec videretur diversa eorum ratio causa originis. Quippe ad usus eorum parum interest, pro quiescentibus esse mobiles.

Quorum conducit haec admonitio? Conducit ad hoc, ut memores simus, non debere nos imaginari, quasi puncta vel poli eclipticae, aut Sol in illa puncta incidens, pertranseant in una diurna revolutione omnes illas fixas, quae in cujusque parallelo sunt collocatae circumcirca, sicut transit super omnes

locos in parallelis Terrae respondentibus collocatos. Hoc enim falsum est, ut infra saepius erit dicendum.

Dicis, meridianum respectu sphaerae materialis immobilem esse: atqui video illum esse trusatilem factum per crenas horizontis circuli. Quando meridianum facimus immobilem, intelligimus illum, ut est situs in sphaera, respectu motus diurni. Nam illa transio et situs mutatio nihili attinet primum motum.

Quorum autem pertinet, quod trusatilis est? Quia meridianus et horizon habent visum auctorem, visus vero seu homines observatores per totam Terrae rotundam superficiem sunt dispersi, ideoque puncta verticalia per totum etiam coeli ambitum habent dispersa, quorum aliud polo mundi propius est, aliud ab illo remotius. Dictum autem est, meridianum transire per polos mundi et polos horizontis seu punctum verticale et nadir. Ut igitur pro diversis locis punctum verticale diversimode posset appropinquare polo mundi et sic unus horizon sphaerae materialis servire omnibus locis eorumque horizontibus naturalibus seu visoribus, ideo meridianus exentilis et trusatilis est factus. Nam ejus variatione polus sphaerae supra horizontem attollitur vel deprimitur.

Hoc vero pacto servitur tantummodo illi varietati punctorum verticalium, quae est versus polos mundi: quomodo autem alteri varietati locorum versus ortum et occasum subvenitur? Respectu coeli varietas ista nulla est, cum diurno motu omnia puncta circuli in ortum et occasum porrecta per loci sui verticem successive transeant: ideo motus seu revolutio sphaerae compensat illam varietatem. Respectu vero Telluris globulus ille sphaerae medius non debet adherere immobili axi immobili penitus, sed debet fieri laxatilis (si modo tota effigies globi terrestris in eo est exprimenda), sic ut contorqueri et in alio situ figi et sic quilibet Terrae locus sursum in horizontis punctum seu verticale dirigi possit. Nam pro eo, quod homo aliquis observator siderum seu corpus seu mentem et cogitationes ab uno loco Terrae in alium orientaliorem vel occidentaliorem transfert, horizontem visum permittens, jam in sphaera vice versa locus ille Terrae seu globuli, in quem fit transitio, materiali horizonti, qui in sphaera est unicus, applicari debet, ne sit opus inclinatione horizontis materialis et eversione sphaerae perincommoda et absurda, ad repraesentanda loca Terrae diversa et dissita a loco contemplatoria.

De Divisione Circulorum.

Quomodo geometrae dividunt circumulum? Geometrica circuli divisio prima est in duos semicirculos et in quatuor quadrantes, quia quilibet quadrans est mensura anguli unius recti. Uterque tam semicirculus, quam quadrans, eum utcumque secantur, altera pars nomen habet arcus vel anguli, altera dicitur complementum arcus vel anguli ad semicirculum vel quadrantem. Concisiores vero et ordinarias subdivisiones, quibus innotescit quantitas cujusque arcus vel complementi, mutuantur geometrae ab astronomis, dividentes circumulum in 360 partes aequales.

Quae est causa hujus divisionis? Causa gemina est. Nam primum natura ipsa motusque Solis et Lunae praeivit in dividendo zodiaco; deinde ratio, naturam circuli contemplata, supplevit, quod perfectioni hujus divisionis a Sole Lunae affectatae decesserat.

Explica causas divisionis zodiaci. Animadvertendum est, interim dum Sol annum conficit, Lunam ad Solem redire duodecies, sic tamen, ut post duodecimum reditum adhuc aliquid Soli desit ad absolutum circuli decursum. Animadvertendum est secundo, interim dum Luna a Sole digressa ad Solem

redit, dies transire fere triginta, sic tamen, ut deest huic numero paulo minus dimidio diei. Quodsi uterque numerus esset praecisus, trieles igitur 12 essent 360. Igitur zodiacus in duodecim praeclae signa sectus est, signum in triginta praeclae gradus est subdivisum, et veteres 30 perfectos dies pro mense habuerunt.

Duodenarius quidem numerus etiam ideo tanto convenientior zodiaco est visus, quod hic circulus primum ab aequatore in duos aequales semicirculos esset divisus, post ab hoc et a coluris, altero per utriusque polos traducto, in quatuor aequales quadrantes. Jam vero naturae instinctu solemus unamquamlibet quantitatem in tria dividere, in principium, medium et finem, tria vero quater sunt duodecim. Alias duodenarii commoditates vide infra lib. III. et jam statim.

Sic numerus 360, hoc est divisio cujuslibet signi in 30, etiam ideo placuit, quia cum annus Solaris habeat dies 365 vel 366, annus vero Lunarum seu duodecim menses naturales habeant dies 354 vel 355, jam inter 354 et 366 medium arithmeticum est 360, sic etiam inter 355 et 365.

Explica causam divisionis trecentenariae sexagenariae natura circuli. Figurae primae circuli inscriptiles geometricae determinatione sunt: triangulum, quadrangulum, quinquangulum. Circulus igitur geometricae dividius est in tria, quatuor, quinque. Jam differentia tertiae et quartae, partium ab uno termino inceptorum, est pars duodecima; per has igitur duas figuras, per triangulum se. et quadrangulum circulus in 12 partes est dividius. Rursum differentia partium, tertiae et duarum quintarum est pars quindecima; quartae vero et quintae, est pars vicesima. Comparatis vero inter se partibus duodecima, quindecima, vicesima, differentia inter binas est pars sexagesima. Tres igitur primae figurae regulares, geometricae demonstrabiles, docent dividere circulum in partes sexaginta. Sexagesima vero geometricae bisecta gignit centumvicesimam.

Fig. 32.



Hic AB est quinta, AC quarta, ergo BC vicesima. Sic cum sit AC quarta, AD tertia, ergo CD est duodecima. Sic cum sit AD tertia, AE duae quintae, ergo DE est quindecima, differentia vero inter CD duodecimam et DE quindecimam, itemque inter hanc et BC vicesimam est sexagesima.

Itaque divisio in 60 et porro in 120 est circulo naturalis, id est rationalis et geometricae.

Etsi vero est contra naturam rerum geometricarum, ut ulla alia pars circuli, praeter totum, quatum, quartam, octavam, item quintam, decimam et ceteras harum subduplas, in tria dividatur (neque enim nonangulum in circulo scribi, hoc est tertia pars circuli geometricae in tria dividi potest, neque pars sexta neque duodecima, uti neque decima quinta, tricesima, sexagesima, centum et vicesima), sed sistitur circuli divisio continua rationalis in centum et vicesima, in qua inest divisio quinarya semel, ternaria semel, et binaria ter; inde vero continuata bisectio partes facit priorum subduplas in infinitum, ut 240, 480, 960; neque exit ulla sectio rationalis ulterius in earum subtripas, ale ut ex 120 fiant 360: tamen communis consuetudo dividendi unamquamlibet rem in tria, nullo circuli, sed solo longitudinis respectu, regnat etiam hic, ut pars quaelibet centum et vicesima

Intelligatur divisa in tres partes aequales, principium, medium et finem, perinde ac si arcus circuli, seu pars ejus centum et vicesima esset in rectam perfectam extensa. Ita centum et viginti ter sumta faciunt etiam partes 360.

Quodnam nomen habet unumquodque partium in quolibet circulo? Commune nomen per omnes circulos est *partis*; peculiariter vero in zodiaco *gradus* dicuntur, quod Sol intra unam diem pene tantum arcum transire videatur; in aequatore vero dicuntur *tempora*, quod is sit mensura temporis; in horizonte dicuntur arabica voce *azimutha*, latine plagae diei possent. Sed graduum nomen ab usu factum est commune per omnes circulos.

Qua vero serie numerorum scribuntur hae partes in unoquoque circulo? In aequatore et zodiaco fit initium a communi eorum sectione vernali, et priores numerantur, quae prius oriuntur in zonis temperatis et torrida, posteriores in zodiaco illae, in quas Sol posterius venit. In aequatore quidem ab una ad 360 fit numeratio continua per totum circulum, in zodiaco vero ab una ad triginta, qui modulus unum dodecatemorium facit; inde numeratio redit ad initium seu unitatem, donec alterum dodecatemorium est absolutum, et sic duodecies. Et cum numeratio vel motus hoc ordine procedit, ea dicitur signorum consequentia; contrario modo dicitur numeratio vel motus procedere in antecedentia.

In his vero circulis, qui transeunt per polos mundi, initium ab unoquoque polorum fit duplex, alterum ab uno semicirculo, reliquum in altero; et perducitur is numerus usque ad 90, scilicet ad medium circulum inter polos; ita quatuor sunt initia in quatuor cujusque quadrantibus. Alii initium a medio circulo faciunt et in polis finiunt. Sunt qui utramque seriem conjungant aut misceant.

In parallelis vero, sc. in tropicis et polaribus, non censetur necessaria divisio, quia sunt minorum e numero, et medius eorum, aequator, vice omnium fungitur.

In horizonte quoque dividendo artifices non unam sequuntur rationem. Cum enim meridianus dividat horizontem in duos semicirculos, ortivum et occiduum, aequinoctialis in septentrionalem et meridiana, quidam a sectionibus ejus cum meridiano, quidam a sectionibus ejus cum aequatore, quidam ab utrisque incipiunt, et vel ab 1 ad 180 progrediuntur utrinque, vel ab 1 ad 90.

Quare in aequatore et zodiaco fit numerationis initium a sectione vernali? In circulo quidem sua natura nec initium est nec finis. Quia tamen initium omnino faciendum est aliquod, natura duce ad unum e punctis cardinalibus devenimus, quippe quae vel sectionibus vel contactibus colorum, aequinoctialis et tropicorum monstrantur inque evidenti et conspicio loco collocantur. Jam puncta tropica obscurius signata sunt latentque in aliqua parte circuli, per quam insensibilis est motus declinationis Solis. Ex aequinoctialibus vero id placuit primis astronomiae inventoribus, quod ipsis in sua zona lucem et calorem reducebat et principium veris aperiebat, quando Terrae renovatur facies reviviscitque natura. Contraria enim omnia tempore autumnali cum eveniant, sectionem illam, quam Sol autumnus tempore adit, minori in pretio collocant.

Quomodo pars vel gradus unus subdividitur? In partes 60, quas scrupula vel minuta, graece *λεπτα* dicimus; et minutum unum in 60 minuta secunda, secundum unum in 60 tertia, et sic deinceps, quousque hac subtilitate opus est.

Quae est notationis earum ratio? Numeris integras partes notantibus

vulgo imponunt circellum, minantis nomen apicem, secundis duos et sic consequenter. In hoc libello nomen partis, gradus vel temporis, sic minuti primi, secundi etc. vel integrum vel abbreviatum in prima littera (ubi quidem desunt apices) promiscue vel praepositum vel postpositum. Quodsi id non fiat, numeri ex ordine discernendi sunt, et qui primo loco vel solitarii ponuntur, pro integris habendi, qui secundo, pro minutis primis, qui tertio, pro secundis.

Quam habet causam haec divisio sexagenaria? Nullam neque naturalem ex motu, neque rationalem geometricam, ex natura circuli deductam, quae quidem arcum tantillum per se attineat; sed solum arithmeticam. Nullus enim est numerus intra centenarium, qui plures habeat partes multiplices eoque ad tractandum sit aptior, utpote qui habet partes 60^{im} (1), tricesimam (2), vicesimam (3), quindecimam (4), duodecimam (5), decimam (6), sextam (10), quintam (12), quartam (15), tertiam (20), dimidiam (30). Adde, quod divisio haec est cognata priori circuli totius in partes 360; nam si circulus dividatur sexangulo, quae divisio est expeditissima, eo quod latus sexanguli aequet radium, idemque circulus, qui circulum descripsit, etiam eundem dividat: tunc nni sextae veniunt gradus decies sex, id est sexaginta, unde etiam sexta pars circuli sexagena dicitur. Conveniens igitur est, ut gradus unus de sexaginta etiam in scrupula abeat sexaginta et sic deinceps. Nam si interruptatur continua proportio subdivisionum, ut in re nummaria, labor computandi propter necessarias resolutiones integrorum in partes, aut reductiones partium ad integra, in immensum angetur.

De Divisione Zodiaci in specie.

Quibus nominibus a se invicem discernuntur partes duodenariae seu dodecatemoriae zodiaci aequalia? Usu receptum non est, ut illa numeris discernamus in sermone vulgari, nisi quando computationem institimus motuum; sed solemus illis nomina indere a constellationibus, quae in illis inveniebantur tempore illo, quo primi astronomias inventores floruerunt, ut supra dictum. Dicunturque communi nomine *signa*, non minus quam ipsae imagines, per fixas adumbratae.

Ergone hodie non amplius inventiuntur haec signa seu configurationes fixarum in suis dodecatemoriis a se denominatis? Hodie fere transferunt imagines per fixas delinatas in dodecatemoria sequentia, reliquerunt tamen pristinis suis sedibus seu dodecatemoriis sua nomina.

Existimabam autem, eclipticam, cujus partes sunt dodecatemoria, sub fixis non moveri, sed perpetuo iisdem inhaerere. Migratio ista imaginum ex suis dodecatemoriis non fit motu eclipticae, sed aequator, uti dictum est, migrat de uno loco fixarum in alium, itaque aliis atque aliis locis secat eclipticam; translata vero sectione, utpote principio numerationis, in praecedentia, transferuntur etiam dodecatemoria velut articuli numerationis in praecedentia, tam in ecliptica quam in fixis: itaque imagines transferri in consequentia videntur. Causae transpositarum sectionum habentur libro III. parte V. et inferiori ex motibus secundorum mobilium, praecipue libro VII.

Cum plurimum occupentur non astronomi tantum, sed etiam scriptores alii circa signa, quot modis illa solent distingui? Potissimum quinque modis: tribus quidem propter sectionem eclipticae cum aequatore et coluris, ubi contigua constituunt unam classem, duobus vero modis, ubi disjuncta sita rediguntur in unam classem, per inscriptionem figurae in circulum.

1. *Quomodo distinguuntur illa signa, seu ipsa ecliptica per circulum*

aequatorem? In semicirculum et signa septentrionalia sex, quae ab aequatore declinant et attolluntur in septentrionem, ut Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, et in meridionalia totidem, quae ab aequatore depressa sunt in meridiem, ut Libra, Scorpius, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, Pisces.

Numquid hic cavenda est aliqua ambiguitas in vocibus sept., austr.? Omnino. Nam etiam ecliptica totam sphaeram in duo dividit hemisphaeria, boreale et australe, quo pacto prior semicirculus aequatoris, unus tropicus et unus polaris polusque dicuntur boreales, aquilonares, arctici, reliquus aequatoris semicirculus etc. australis. Itaque una et eadem stella, ad signum aliquod pertineus, respectu aequatoris dicitur borealis, respectu eclipticae australis, et vicissim, si sita fuerit inter eclipticam et aequatorem.

2. *Dic distinctionem signorum per eorum solstitiorum.* Sex dicuntur ascendentes et eorum semicirculus ascendens, in quibus Sol et planetae ex austro in septentrionem versus zeolith nostrae zonae ascendunt, ut Capricornus, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini; reliqua sex seu eorum semicirculus contrariis ex causis dicuntur descendentes, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius.

3. *Quomodo distinguitur ecliptica cum signis per utrumque eorum et puncta cardinalia?* In quatuor quadrantes, congruentes quatuor anni partibus, a quibus denominantur.

Vernalia sunt: Aries, Taurus, Gemini, in quibus Sol ab aequatore in boream ascendeus ver constituit, estque primus quadrans. Aestiva: Cancer, Leo, Virgo, in quibus Sol a borea versus aequatorem descendens aestatem efficit; secundus quadrans. Autumnalia: Libra, Scorpius, Sagittarius, in quibus Sol ab aequatore in austrum descendens autumnum conficit, qui tertius quadrans est. Hiemalia: Capricornus, Aquarius, Pisces, in quibus Sol ab austro versus aequatorem rediens hiemem emittitur. Hic quartus est quadrans.

4. *Quae est quarta divisio et quis ejus usus?* Haec magis est astrologica. Numerantur enim in zodiaco tres quadranguli et in quolibet quatuor signa per zodiacum in forma tetragonica disposita, unde nomen est classis. Servit tamen comprehendendis motibus Solis et Lunae, ut sciamus, utrumque luminare tunc, cum Luna est bifida, in ejusdem quadranguli signis esse.

Primus quadrangulus est signorum cardinalium, a punctis cardinalibus inceptorum: Aries, Cancer, Libra, Capricornus. Haec signa etiam mobilia dicuntur ab astrologis, quod Sole in his versante tempestatibus variis aura fere mutabilis esse credatur. Secundus est mediorum luter cardinalia et bicorporea: Taurus, Leo, Scorpius, Aquarius. Fixa appellant astrologi, quod Sole in his versante tempestates constantiores ut plurimum censeantur. Tertius est bicorporeorum: ut Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces. Hoc commune nomen ut et suum quodlibet sortita sunt a constellationibus, quae in his dodecatemoria olim fuerunt, quas homines antiqui sunt imaginati bicorpores, Sagittarium ex semivro et semiequo compositum, Pisces et Gemellos geminatos, Virginem vero, loco alterius corporis, cum manipulo spiceo. Astrologi comparatione ad fixa et mobilia appellant ista communia.

5. *Dic quintam distinctionem.* Haec rursum est magis astrologica, quippe in qua disciplina numerantur quatuor trigoni et in quolibet tria signa in forma trianguli per zodiacum disposita, unde nomen habet classis, triplicitas seu triangulus.

Monstratur tamen haec divisio a motibus Saturni et Jovis, eorumque congressibus vicissim quoque anno, qui sunt in unius classis signis per annos fere ducentos. Anno enim 1603 colverunt in Sagittario, anno 1623 con-

venient in Leone, anno 1643 in Ariete, anno 1663 rursum in Sagittario; post 200 annos transcurrent hae conjunctiones in alia tria signa. Ita omnibus quatuor classibus absolutis post 600 annos fit novus circulus. (cfr. II. p. 637.).

Astrologi nomen his classibus posuerunt a quatuor elementis. Primus triangulus igneus dicitur habetque Arietem, Leonem, Sagittarium. Secundus terreus, habet Taurum, Virginem, Capricornum. Tertius aëreus: Geminos, Libram et Aquarium. Quartus aqueus: Cancrum, Scorpionem et Pisces.

Quot modis signum et in signo esse usurpatur? Tribus modis. Nam divisa sphaera fixarum sex circulis, per eclipticae polos euntibus, in partes 12, signum unum est vel eclipticae vel zodiaci vel etiam totius sphaerae fixarum pars duodecima, usque ad polos eclipticae utrinque continuata; et primo modo Sol in signo esse dicitur, secundus modus planetis ab ecliptica evagantibus et quibusdam fixis competit, tertius fixis ceteris; omnes vero tres modi competunt cometis pro re nata.

De Ventorum Plagis.

Quomodo nautae solent horizontem dividere? Antiquissimis temporibus quatuor horisontis quadrantes agnoscebantur, a quatuor mundi cardinibus descripti totidemque ventorum nominibus insignes. Venti n. ab Homero non plures nominantur, quam hi quatuor, Eurus flans ab ortu, Zephyrus ab occasu, Boreas a septentrione, Notus a meridie. Graeci vero posteriores, rei nauticae dediti, subtilius horizontem subdividere coeperunt, ortum quidem et occasum dividendes in solstitialem seu aestivum, aequinoctialem et hibernum seu brumalem; quibus consequens erat, ut etiam septentrio et meridies triplicarentur itaque duodecim venti fierent, quos intermedios in mari graeco, quod continentibus inclusum nec adeo late patens est, denominarunt a terris fere circumjacentibus, unde flarent. Hinc Phoenix, Afrius, Lips, Thrascias, Hellespontius, Olympias, Strymonia, Japyx. Vitruvius duplicat numerum, ut sint ipsi 24. Postquam vero coepit omnis continentibus circumfusus oceanus navigari, cum neque ortus occasusque solstitiales a brumalibus omnibus locis distarent aequaliter, neque nomina ab una gente confecta essent idonea locis omnibus, neque memoratu facilia tanto numero: Germani novam divisionem horisontis in ventos 32, continua duplicatione numeri cardinum quaternarii, introduxerunt haeque nomina ex suo idiomate posuerunt, quos reliquae nationes Itali, Galli, Hispani et moderni Latini scriptores applicatione veterum nominum ut plurimum quidem imitantur, at nequaquam pari felicitate.

Harum igitur partium unaquaelibet aequaliter occupat partes astronomicas seu gradus undecim cum quadrante.

Explica, quibus nominibus hae partes appellantur. Primum communis vocabulo solent a modernis latinis scriptoribus appellari rhombi. Pyxis enim nautica (bussola dicta) rotulam habet chartaceam impositam acui magneticae, quae semper dirigitur in septentriones; in hac charta depicti sunt 32 radii seu cuspides rhomboides diversicolors, ut acie magnetis cum superpicto lilio in suam plagam naturalem directa, quilibet rhombus etiam suam plagam indicet. Denominantur vero rhombi omnes a mundi cardinibus, aliter tamen cardinales ipsi, aliter intermedii.

Quos dies mundi cardines ventosque cardinales? Hos monstrat nobis in hemisphaerio septentrionali motus coeli; dicimus n. orientem, *Ori*, unde Sol oritur in aequinoctiis, occidentem, *Occi*, ubi se Sol condit eodem die, septen-

trionem, Rorb, qua polus mundi conspicitur, qui alias etiam peculiari praerogativa solet cardo mundi dici, meridiem, Sûb, unde Sol radiat hora meridiana. Haec quatuor puncta monstrantur astronomice sectionibus circulorum meridiani et aequinoctialis cum horizonte: habenturque potiores septentrio et meridies, quos meridianus designat.

Plaga.	Germanice.	Italice.	Latine.	Graece.
Oriens.	Öst.	Levante.	Subsolanus.	Apeliotes.
Meridies.	Sûb.	Ostro.	Anster.	Notus.
Occidens.	West.	Ponente.	Favonius.	Zephyrus.
Septentrio.	Rorb.	Tramontana.	Septentrio.	Aparctias.

Quomodo ergo denominantur venti seu rhombi intermedii? 1) Medii quatuor inter totidem cardinales nomina habent composita ex nominibus cardinalium suorum lateralium; ubi Germani praeponunt in compositione nomen praecipui cardinis.

Plaga.	Germanice.	Italice.	Latine.	Graece.
Sept. Or.	Rorb-Öst.	Greco.	Supernas.	Borrbapeliotes.
Or. Mer.	Sûb-Öst.	Scirocco.	Euroanster.	Arctapeliotes.
Mer. Oc.	Sûb-West.	Garbino.	Africus.	Notapeliotes.
Oc. Sept.	Rorb-West.	Maestro.	Notolybas.	Euronotus.
			Corus.	Lips.
			Etesiae.	Notozephyrus.
				Olympias.

Ita sunt octo venti, totidem nominibus apud Italos distincti.

2) Jam inter hos octo collocati medio loco alii octo iterum ex nominibus priorum octo composita habent nomina, singula ex binorum lateralium sibi vicinorum, praeposito nomine cardinalis in compositione, nude fit apud Germanos, ut nomen praecipuorum cardinum statim a principio duplicetur, reliquorum cardinum nomina initio et fine dictionis sicut.

Ergo viciniore.	Germanice.	Italice.	Latine.	Graece.
Septentrióni.	Rorb-Rorb-Öst.	Tramontana Greco.	Aquilo.	Boreas.
	Rorb-Rorb-West.	Tramontana Maestro.	Gallienus.	Thracias.
Meridiei.	Sûb-Sûb-Öst.	Ostro Sirocco.	Enronotus.	Pboenicinus.
	Sûb-Sûb-West.	Ostro Garbino.	Austroafricus.	Libonotus.
Orienti.	Öst-Rorb-Öst.	Levante Greco.	Caecias.	Hellespontius.
	Öst-Sûb-Öst.	Levante Sirocco.	Carbas.	Eurus.
Occidenti.	West-Rorb-West.	Ponente Maestro.	Corus.	Argestes.
	West-Sûb-West.	Ponente Garbino.	Caurus.	Lipabypbesperos.
			Africus.	
			Subsperus.	

Hoc pacto nomina oriuntur sedecim.

3) Inter hos vero sedecim interjecti sedecim alii composita habent nomina germanica, singuli ab uno primorum octo, cui cum praepositione annectitur nomen cardinis, quorsum ille declinat a suo duce.

Qui veterum ventos comparant, sequuntur aliam compositionis rationem forma graeca, utentes voce $\mu\epsilon\sigma\omicron\varsigma$ vel praepositione $\acute{\upsilon}\nu\omicron$, alii $\acute{\upsilon}\pi\epsilon\varsigma$, sed ordine non comparando eum germanica nomenclatura, nec inter se omnes consentiunt. Itali denominant hos 16 ab octo secundis, sed nominant quartas, quia quater octo sunt 32. Faciunt enim ex unoquoque horum octo nominum secundorum seu compositorum duo nomina, semper praeposcentes ejus cardinis nomen, ad quem vergit magis quaelibet quarta. Ita sunt nomina in quartis denominandis sedecim, quae cum octo compositis et octo simplicibus faciunt 32. Ergo

Germanice	est Italice.	Moderna latina nomenclatura.	Veteri nomenclatura.
Nord gen Osten vel ju Osten.	Quarta de Tramontana Greco.	Hypaqualio. Al. Hyperboreas.	Boreas.
Nord gen Westen.	Quarta de Tramontana Maestro.	Mesocircius. Al. Hyperthrascias.	Corus. Thrascias.
Süd gen Osten.	Quarta de Ostro Sirocco.	Mesophoenix. Al. Meseuronotus.	Altanus.
Süd gen Westen.	Quarta de Ostro Garbino.	Mesolibonotus.	
Ost gen Norden.	Quarta de Levante Greco.	Mesocacias.	Ornithias. Caecias.
Ost gen Süden.	Quarta de Levante Sirocco.	Hypeurus. Al. Hypeurus.	
West gen Norden.	Quarta de Ponente Maestro.	Mesocorus. Al. Mesargestes.	
West gen Süden.	Quarta de Ponente Garbino.	Hypafricus. Al. Hyperlips.	
Nord-Ost gen Osten. Nord-Ost gen Westen.	Quarta de Greco Tramontana. Quarta de Garbino Levante.	Hypocacias. Al. Hypercaecias. Mesaqualio. Al. Mesoboreas.	Aqualio. Boreas.
Nord-West gen Westen. Nord-West gen Norden.	Quarta de Maestro Ponente. Quarta de Maestro Tramontana.	Hypocoras. Al. Hyperargestes. Hypocircius. Al. Mesothrascias.	Favonius.
Süd-Ost gen Osten. Süd-Ost gen Süden.	Quarta de Sirocco Levante. Quarta de Levante Ostro.	Mesurus. Hypophoenix. Al. Hyperuronotus.	Vulturius.
Süd-West gen Westen. Süd-West gen Süden.	Quarta de Garbino Ponente. Quarta de Garbino Ostro.	Mesaphricus. Al. Mesolips. Hypolibonotus. Al. Hyperlibonotus.	

Unde nomen habent cardinales? Videntur Homerici cardinales denominati a suis qualitatibus; Eurus ab humore putri vel humida putredine, Auster

a siccando, quod est αἰὲρ, idemque Notus a nebulis, quae νοτίδες dicuntur, Boreas a voracitate, quam ejus frigus conciliat corporibus, Zephyrus a fervore, quod est ζεῦ. Alii Eurum et Zephyrum a plagis dictos autumant, ex illo Homeri Od. X:

οὐ γὰρ τ' ἰδυεὶς ὀπῇ ζῶρος, οὐδ' ὀπῇ ἥως;

ut sit εὐρος ab ἑρ ψειρ: ζεφυρος a ζῶρος, quod occasum notat

Homero.

De aliis circulis.

Num sufficiunt hi decem sphaerae circuli ad explicandas omnes rationes primi motus? Vultunt quidem in considerationem etiam alii, sed qui ex brevitate explicatis facile possunt intelligi.

Recensae potiores per sua genera. 1) Ex minoribus sunt paralleli plures, imo infiniti, et paralleli ut plurimum quidem ipsi aequatori, interdum vero etiam eclipticae vel horizonti. Nam per quodlibet sphaerae punctum vel stellam intelligitur unus traduci parallelus ipsi aequatori, propter motum diurnum. 2) Ex maximis sunt circuli declinationum per polos sphaerae, circuli latitudinum per polos zodiaci, circuli positionum apud astrologos per sectiones horizontis et meridiani; denique alii per quaecunque sphaerae duo puncta traducti.

Quam dicis in sphaera longitudinem et latitudinem? Quamvis sphaera sit rotunda, dicimus tamen ejus longitudinem extendi secundum ordinem signorum zodiaci, latitudinem versus utrumque polum eclipticae, quia hi sunt poli et circulus coeli proprii; in Terra vero longitudo secundum aequatorem censetur, latitudo ab uno polo Terrae ad alium, quia rursum circulus et poli sunt Terrae proprii. Utrique enim sic longitudo sit dupla latitudinis, cum ibi sint 360°, hic 90° versus utrumque latus.

Quae est cognatio circulorum horum cum iis, qui solent in sphaera exprimi? Inter circulos parallelos numerantur aequator, duo tropici et duo polares in sphaera; inter declinationum circulos duo coluri et meridianus, vicem omnium illorum supplens, ob mobilitatem sphaerae; inter circulos latitudinum est colurus solstitiorum; inter verticales est meridianus, omnium medius; denique inter circulos positionum meridianus et horizon.

Quinam ex tot parallelis, qui non sunt exstructi in sphaera, insigniores habentur? 1) Circuli dierum naturalium, de quibus libro tertio. 2) Arcticus et antarcticus ejusque loci ex doctrina veterum, qui sunt circuli minores ex utroque polo per sectiones horizontis et meridiani descripti, de quibus etiam libro tertio.

Quidnam cognitionem habet cum parallelis sphaerae? Paralleli terrestres, per media finesque climatum ducti, de quibus etiam libro tertio in geographicis.

Quomodo appellantur horizontis paralleli? Arabes, dediti astralabio, quod est effigies sphaerae in planum projecta, appellant illos idiomate suo circulos Almicanarat.

Etiamne declinationum circulis aliqui alii cognati sunt? Cognati sunt circuli latitudinum locorum in Terra, supra dicti meridiani terrestres.

Quodnam est nomen verticalibus penes Arabes? Arabes illos idiomate suo appellant Azimutha, sicut verticem Zenith, ejusque oppositum Nadir. Azimuthales igitur circuli transeunt per zenith et nadir.

Quomodo usurpant astronomi azimuth stellae et quo sensu? Azimuth stellae interdum est quadrans circuli maximi, a vertice per stellam usque in

horizontem ductus; sic Arabes. Interdum id, quo hi verticales inter se discernuntur, scilicet est angulus, quem circulus iste facit cum meridiano, aut mensura illius anguli, quae est arcus horizontis, interceptus inter verticalem et meridiani partem unam vel alteram aut etiam aequatorem, dicuntque azimuth a septentrione ad ortum vel occasum, a meridie ad ortum vel occasum, azimuth ab ortu vel occasu ad septentrionem vel meridiem pro re nata proque ratione inscriptionis numeri 360 in horizontem.

De positionum circulis quinam sunt insigniores? Praeter horizontem et meridianum, qui in sphaera exprimuntur, adhuc quatuor alii, qui ab astrologis communi cum illis nomine dicuntur circuli domorum coelestium, certa ratione distinguentes coelum omne in domos duodecim, quibus astrologi sua singulis attribuant nomina. Hinc versiculi:

*Vita, Lucrum, Fratres, Genitor, Nati atque Valetudo,
Uxor, Mors, Iter et Regnum, Benefactaque, Carcer.*

Nunquamne in sphaera exprimuntur plures circuli, quam decem? Imo 1) in quibusdam sphaeris arcticus et antarcticus exprimuntur ex sententia veterum. Sed illi tunc uni saltem positioni sphaerae sunt accommodati, non promiscue omnibus, ut circuli ceteri. 2) In quibusdam sphaeris meridianus habet volvulum trusatilem, qui verticali puncto potest applicari, et ab illo volvulo descendit quadraus usque in horizontem, qui immoto volvulo per totum horizontem circumagi potest, repraesentans in quolibet situ unum verticalem seu azimuthalem. 3) Rursum sunt quaedam sphaerae, quae ad binas horizontis crenas, quibus is meridianus capit, binos habent polos, a quibus necitur semicirculus, sic ut circa polos verti possit, qui semicirculus vicem uniuscujusque circuli positionum praestare potest. 4) Denique in sphaeris seu armillis magnis interdum adduntur duo circuli latitudinum, per polos eclipticae transientes et per eclipticam mobiles.

Quibus circulis utuntur gnomonici ultra eos, qui sunt in sphaera? Gnomonici praeter plana meridiani et horizontum omnium sub cuius loci meridiano alia lusuper tria agnoscunt genera planorum, super quibus describi debent sclaterica declinata, inclinata et declinata, hoc est declinata et inclinata simul. Inclinata compentunt in circulos eosdem, qui positionum circuli dicuntur: declinata in circulos verticales, in quibus agnoscunt gnomonici verticalem primarium, qui ducitur per sectiones mutuas horizontis et aequatoris, polos habens sectiones horizontis et meridiani, ut sit ad meridianum rectus, ex una plaga spectans recta meridiem, ex opposita septentrionem. Hic est ille circulus, in cuius plano delineantur horologia solaris, quae verticalia regularia appellantur; et hujus primarii verticalis respectu reliquorum verticalium plana dicuntur declinare vel ad ortum vel ad occasum, excepto plano ipsius meridiani, quod recta ortum et occasum spectat.

Declinata plana censentur omnia, quae in tales circulos maximos compentunt, qui neque per horizontis, neque per verticalis primarii cuiusque loci cum meridiano sectiones ducuntur, quae tamen reducuntur ad inclinata altitudinis poli majoris vel minoris, quam est loci propositi.

Omnibus generibus planorum tribuuntur sui meridiani, qui sunt ex circulis declinationum, respondentibus circulis latitudinis locorum, rectis ad plana, quorum sunt meridiani: ubi plani horizontalis et plani verticalis primarii in quovis loco adeoque planorum omnium reliquorum horizontalium et verticalium sub eodem meridiano idem est ipse meridianus sphaerae.

FINIS LIBRI II.

EPITOMES ASTRONOMIAE COPERNICANAE

LIBER TERTIUS.

DE DOCTRINA PRIMI MOTUS, DICTA SPHAERICA.

Cur praemittitur doctrina sphaerica theoricæ? Et si theoricæ motus planetarum proprii per se ipsam ex constitutis hypothesebus potest tradi et comprehendī, nullo indigens adminiculo motus diurni seu primi, motus contra primi accurata explicatio, quæ perfecta sit omnibus numeris, cognitione secundorum, praesertim vero Solis motum, deum absolvitur multisque rebus ex theoricæ per anticipationem petitis indiget: sunt tamen idoneae causae, cur diurno motu incipiamus. Primum enim motus diurnus sensui notior est magisque obviū, quippe celer et quotidianus et vitae nostrae rationibus proportionē magis respondens, itaque etiam prius innotuit humano generi; motus secundi sunt occultiores, a sensu remotiores et propter tarditatem variasque intricaciones cum primo indiguerunt longa doctissimorum observatione multoque magis speculatione ad constituendas hypotheses. Jure itaque traditio hujus doctrinae sequitur ordinem investigationis. Deinde primus instrumento tantummodo sphaerae indiget, quod est conforme coelo aspectabili possetque quodammodo vel in ipso coelo monstrari sine instrumento; secundorum causae et rationes nullo modo in coelo aspectabili demonstrantur, sed omnino tabula plana indigent, cujusmodi planitiem in coelo nobis non facile imaginamur. Sed nec facile est ea, quae demonstrantur in tabula de secundis, applicare coelo ipsi, ut illud oculis occurrat, nisi prius perceptus fuerit motus primus, ut mente possit a secundis abstrahi.

Quot sunt partes doctrinae sphaericae? Quinque potissimum. Prima et secunda sunt generaliores et continent praeparationem ad reliquas. Prima docet loca ortus et occasus variosque situs et moras stellarum supra horizontem; ubi discrimen cernitur positus sphaerae rectae, obliquae et parallelae in utroque hemisphaerio, septentrionali et anstrali. Secunda tradit magis in specie quorumvis eclipticae punctorum ascensiones et descensiones, per septenos sphaerae principales positus ad eclipticam relatos, in utroque hemisphaerio. Tertia, quarta et quinta versantur in explicatione temporum et quae temporibus accidunt. Tertia enim de anno vertenti diebusque et horis

agit, varias dierum nocturnumque moras per diversos Solis in ecliptica incesus, perque diversa Terrae loca dimetiens, unde dependet distinctio Terrae in climata. Quarta rationes explicat quatuor partium seu tempestatum anni vertentis, quae causae metaeque aestatis et biemis, quanta varietas altitudinis Solis umbrarumque longitudinis per varios sphaerae positus, unde est distinctio superficiei Telluris in quinque Zonas earumque diversitas in qualitatibus. Quinta continet alteram anni speciem, siderei dicti, signaque, quibus inter se partes tam ejus quam vertentis anni discernuntur, hoc est apparitiones occultationesque siderum per climata diversa. His tribus ultimis partibus adhaeret distinctio geographica Telluris incolarum in antoecos, perioecos et antipodas; et ratio computandi locorum distantias et longitudines.

DOCTRINAE SPHAERICAЕ

PARS PRIMA.

DE ORTU ET OCCASU SIDERUM.

Dixisti, horizontes in mundo multos esse, distinctos inclinatione puncti verticalis ad latera mundi: quomodo igitur distinguunt astronomi positus sphaerae secundum horizontem seu punctum verticale? Horizon aut est rectus ad aequatorem, motus diurni semitam, secans illum angulis rectis, aut obliquus ad illum, secans illum angulis obliquis, aut plane non secat illum, sed coincidit cum illo.

Quare sphaera ratione primae positionis dicitur recta, ratione secundae obliqua, ratione tertiae parallela, quod horizon et aequator fiat unus ex parallelis. Sequitur igitur hinc in prima, ut polus horizontis, id est verticale punctum, in aequinoctialem incidat, poli mundi in horizontem aequaliter defecti sint; in secunda verticale punctum est inter aequatorem circulum et ejus polorum alterutrum, horum enim alter est supra horizontem, alter infra; in ultima coincidunt poli mundi cum polis horizontis, sic ut mundus volvatur circa verticem.

Et sphaerae quidem obliquae, ut et parallelae, geminae sunt, alterae septentrionales, quibus polus mundi septentrionalis supra horizontem est, reliquae anstrales, quibus australis polus conspicitur, latente septentrionali. Harum unus communis fimes est sphaera recta. Sphaeram igitur rectam incolunt omnes illi, qui sunt per longitudinem aequatoris terrestris dispersi, seu nautica phrasi, qui habitant in *Linea*. Sphaeram obliquam septentrionalem nos Europaei inhabitamus et omnes illi, qui sunt eis lineam, usque ad illud unicum Terrae punctum, in quo est polus Terrae. Nam oculus in illo collocatus habet sphaeram parallelam septentrionalem solus. Qui vero sunt ultra lineam, quam frequenter hodie trajiciunt Lusitani et Belgae, navigantes oceanum, illi sphaeram obliquam anstralem, unus et intimus seu medius illorum locorum sphaeram parallelam australem habet.

Quid sonant voces oriri et occidere? Oriri est e pluvie in altum tolli vel assurgere, ascendere paulatim magis atque magis, emergere, ut montes navigantibus in oceano videntur ex undis emergere: ut non abs ratione credas, vocem ἀπο του ὄρους, quod montem significat, et ab ὀρσσειν, surgere, derivari. Graeca vox ἀνατελλειν, ἀνατολν, affinis est latinae tolli, sonat pro-

prie et plantis, eum se tollunt in auras ex terra humeeta, quae ~~reluxa~~ dicitur. Occidere et occumbere est pronum cadere: de cadentibus in acie usurpatur, inde de omnibus intereuntibus. Graeca vox ~~δυσ~~ usurpatur pro receptu in aliquod conclave, subire, intrare, condi; quod sidera post montes velut in thalamum se recipiant. Germanicae praepositiones *Kuff* und *nidbergang* manifestae sunt, sonant enim sus et de; *untergehen* est mergi, ut naves in undis.

Verene sidera quotidiana vicissitudine sunt alta et humilia, surgentia et cadentia alternis? Nequaquam hoc concesserit quisquam astronomorum. Nam etiamsi motus diurnus stellis attribuitur quiescente Terra, is erit circularis circa Terrae centrum; in circulo vero nulla pars altera humilior altiorve est a centro suo. Sunt igitur omnes istae locutiones ad sensum oculorum accommodatae, sive in profanis scriptoribus occurrant, sive in sacris codicibus, et ipsa rerum veritas longissime differt ab apparentibus speciebus, hoc sermonis genere expressis.

Quid igitur facit sidera quotidie videri attolli, ex undis vel montibus emergere, velut e thalamo exire, enasci, in altum surgere; vicissimque decedere, occumbere, Terras subire, post montes condi, oceani undis mergi? Convolutio horizontis visibilis circa axem Telluris immobilem, ut libro primo dictum: quas enim stellas ille detegit, illae videntur oriri, quas tegit, occidere.

Nam haec convolutio Telluris motum siderum diurnum repraesentare potest circularem, qualem experiuntur, qui sidera observant? Omnino. Nam circulus stellae apparens, ut libro secundo dictum, describitur in sphaera, quam visus imaginatur, per lineam rectam ex oculo ductam in aliquam stellam Terraeque affixam immobiliter, desertaque stella eum ipso corpore Telluris circumvolutam, seu quod idem est, per parallelam illi, ductam ex centro Terrae. Nam sicut in papyro plana circulus describitur circulo, cuius pes unus haeret in uno puncto immobilis, alter in papyro circumducitur, sic etiam hic locus in Terra, seu oculus circa Telluris axem volutus, repraesentat vodium seu articulum circini convertibilem digitis, linea ex oculo vel centro Terrae in polum mundi directa repraesentat pedem circini immobilem, linea in stellam ducta pedem circini circumductum, cavitas sphaerae est loco papyri, quae cum aequaliter circumstat centrum, ideo etiam circinis iste totus, per stellam descriptus, undique aequaliter a Terra concipitur abesse.

Quae sunt praecipua primi hujus motus phaenomena, respectu trium positionum sphaerae? Quinque: primum est altitudo, item ascensus descensusque siderum eorumque culminatio seu coeli mediatio, aut ejus loco simplex et aequalis circumgyratio. 2) Pinga, in quam videntur moveri sidera. 3) Distinctio stellarum in tres classes: perpetuo apparentium, perpetuo latentium, et orientium occidentiumque, aut pro ortu vel occasu horizontem stringentium, et quam unaqueque stella latitudinem horizontis occupet, interceptam inter sui ortus occasusque puncta. 4) Eversio situs constellationum. 5) Mora stellarum supra horizontem et sub illo.

1. Quid est astronomis altitudo stellae in hoc negotio? Vox altitudinis non est intelligenda populariter de longitudine perpendiculari, demissi ex stella in planum Terrae, sed technice sic, quod sit arcus circuli verticalis per stellam ducti, interceptus inter stellam et horizontem rationalem; cuius arcus complementum ad quadrantem est distantia stellae a vertice.

Proba varietatem circa apparentes ascensus descensusque ex convolutione Telluris. Cum vertatur Terra circa axem immobilem horis 24, necesse est, esse duo puncta in globo Telluris, axis extrema, polos dictos, in quibus ob-

servator constitutus et cum horizonte suo visibili conversus, coelum et sidera in eo immobilia putet vertigine correpta circa limbum extremum horizontalis visibilis circumire interimque toto circuitu a vertice, utpote in quo polus mundi est, aequaliter semper distare, sic ut stella nulla in plaga fiat altior vel humilior se ipsa. E contra omnes reliqui visibiles horizontes in superficie sphaerae eorumque centra, oculi spectatorum, sunt circa axem Telluris mobiles in circulis Terrae parvis, magnis vel maximo, prout loca parum vel magis ab alterutro polorum, vel aequaliter ab utroque distiterint. Locorum autem Terrae circumactorum vertices etiam sub immobili fixarum sphaera circumaguntur, desertisque stellis, per quas transierant, veniunt in stellas alias, aliis appropinquant, cominus vel eminus praetereuntes. Quare per ea, quae primo libro sunt ex optice allata, stellae ipsae nunc in verticem incidere, nunc a vertice desuere, rursumque eidem appropinquare videbuntur; et per consequens etiam ab horizonte rationali (quippe qui undique quadrante et sic aequaliter abest a vertice) minus magisque distare, hoc est humiliores altioresque fieri censebuntur. Atque hoc communiter evenit tam sphaeris obliquis utriusque hemisphaerii, quam sphaerae rectae, omnium mediae.

2. *Edisere varietatem plagarum, in quas videntur ire sidera.* Cum omnibus omnino hominibus, sive in septentrione versantibus, sive in austro, dextra manus eadem repetitur et sinistra eadem, illa scilicet, versus quam situs cordis spectat, unde sinistra, quippe cohaereus propius fonti motus (cui qules competit) et sic quasi in angustum redacta, minus ad motum fit prompta, dextra, velut remotior a motus fonte, expeditior est et ad plura munia apta, quippe quae et longius a corde protenditur spatiosioreque regnat ambitu: hinc nascitur humano generi praecipua planeque notabilissima et popularissima distinctio hemisphaeriorum septentrionalis et australis. Nobis enim in septentrione per omnes sphaerae positus omniumque maxime in sphaera parallela motus siderum quotidianus a sinistra versus dextram tendere videtur, illi vero, qui sunt in hemisphaerio australi, contrario modo a dextris ad sinistras; quod illi, qui transeunt a nobis trans lineam in oceanum australem, summae admirationis argumentum parit, quippe illi non ut polus noster polo australi, sic etiam dextra cum sinistra permutatur, nec illi, qui sunt in austro nati, eor contrariam nobis sedem corporis occupat, argumento maximo propagati utriusque gentis ab una stirpe. Hoc maxime mirum fuisse legatis regis Taprobanae, insulae australis, Romam venientibus, refert Plinius, scilicet umbras suas in nostrum coelum cadere (in septentrionem) non in suum (in anstrum) Solemque a laeva potius oriri (vultu ad iter Solis verso), at in dextram occidere, quam o diverso. Nam illi, qui sunt in austro, tractum aequatoris eclipticaeque, qui supra Terram est, spectantibus, signa partesque circulorum eodem quidem inter se ordine, quo penes nos, sed respectu nostri corporis a dextris oriri, ad sinistras descendere videntur.

Nullane major hic varietas occurrit? Imo et hoc notabile, quod in parallelis sphaeris omnes omnino stellae plagam eandem penitus pertransire videntur, quia vertex spectatoris in polum conversionis incidit; in obliquis vero stellae, quae circulos repraesentant inter verticem et polum circumductos, illae circa horizontem quidem id ipsum faciunt, at postquam in superiore semi-circulum venerint, tendere videntur in plagam contrariam, quia circulus apparentis sarum motus totus ex una verticis plaga stat, ejus igitur partes oppositae motus etiam nanciscuntur contrarios ad visum. Denique in sphaera recta sidera omnia in primo exortu surgunt recta, in neutram manum inclinato motu, at postquam in aliquam enisa fuerint altitudinem, sola illa, quae in aequa-

torem incident, in rectitudine illa perstant, teudentes usque in verticem, ut qui in hoc situ sphaerae in aequatorem incidit, reliqua declinant ad illa latera, unde stant, partim ad dextram, partim ad sinistram.

3. *Quae varietas est siderum per sphaeras orientium et non orientium, et quomodo illa ex convolutione Telluris circa axem?* In parallela sphaeris nihil occidit, sed unus semissis exercitus coelestis ex septentrionali polo Terrae perpetuo cernitur, in australi polo latet, reliquos semissis cernitur ex australi Terrae polo, latet in septentrionali; quae vero stellae sitae sunt in aequatore, perpetuo haerent et volvuntur in horizonte rationali, nisi quod refractio illas nonnihil attollit. Horizon enim seu finitor visus coincidit cum aequatore, mundum in hemisphaeria duo, septentrionale et australe, secante.

In sphaera recta sidera omnia oriuntur et occidunt nolis diel spatio. Horizon enim secat sphaeram et sic omnes parallelos per axem et polos; qui cum revolvatur cum globo Telluris intra 24 horas, omnes igitur circulorum partes intra diem altero sui semicirculo tegit vicissimque reteggit semicirculo reliquo: quodsi quando stella in ipsum polum incidit, illa conspicietur toto anno et omnibus noctis horis in eodem horizontis loco.

In sphaeris obliquis, cum quantum vertex seu zenith declinat ab aequatore, tantum etiam horizon subleat infra polum unum ex una plaga ascendatque supra reliquum ex altera, omnes igitur stellae, comprehensae in complexu circuli, quem describit horizon circa polum superiore puncto sui ambitus proximo, apparent perpetuo ut in parallela sphaera, omnes intra circulum oppositum, quem delineat horizon circa polum inferiorem, latent cum ipso illo polo, et stellae, per quas traducuntur hi circuli, semel in die horizontem attingunt statimque se vel condunt iterum vel in altum recipiunt. Hi circuli, ut libro secundo dictum, in quibusdam sphaeris exprimuntur et appellantur nomine arctici et antarctici. Stellae vero inter hos duos circulos intermediae omnes oriuntur et occidunt, ut in sphaera recta, proximae quidem hiis circulis et polo conspicuo puncta horizontis inter se valde vicina signant oriendo et occidendo: vix enim ubi sese condiderunt, rursus oriuntur, quasi eodem in loco sub polo; remotiores signant loca distantiora, ex eadem tamen plaga conspicua, usque ad illas, quae in aequatorem incident, earum enim ortus ab occasu distat integro semicirculo horizontis. Directa enim dioptra in orientem et fixa in eo situ, occidens per eandem ex contrario cernitur, cum sit oculus centrum horizontis. Harum igitur ortus et occasus loca simul uno intuitu conspici non possunt.

Stellae ultra aequatorem sitae, minus tamen, quam distat vertex ab illo, jam habent loca ortus occasusque sui in plaga meridiei utraque, non obstante, quod ipsae altissimae conspiciuntur in septentrionis plaga. Circuli n. ipsarum toti ultra aequatorem sunt, quare et sectiones eorum ultra sectiones aequatoris cum horizonte. Inde quo magis stellae ab aequatore distiterint, hoc propius in plaga meridiei coeunt puncta ortus et occasus tandemque videbis stellae aliquas, ubi vix emergerint, rursus sese condere, quasi eodem in loco horizontis versus plagam Solis meridiani.

Num ista singulis noctibus omnia simul apparent, in sua quodque stella? Minime; quin potius harum rerum observatio tempus requirit et diligentiam et moram in uno loco. Raro enim stella una et eadem intra spatium unius noctis simul et oriens conspici potest et occidens, propterea quod in plerisque stellis alterutrum horum, vel ortum vel occasum, lux diel occultet eoque expectanda sit dies alia, cum id in noctem etiam incidit.

Quomodo ergo phaenomena ista aliter quam observando possunt investigari, ut postea, investigata cum coelo ipso, suis quodque temporibus comparatur? Opus nobis est inquisitione altitudinis poli in quovis Terrae loco, altitudinis aequatoris, altitudinis cujusque stellae meridianae et declinationis ejusdem ab aequatore.

Quid est altitudo poli, aequatoris vel stellae meridianae? Est arcus circuli meridiani, interceptus inter horizontis partem vicinam et polum, vel aequatorem vel stellam.

Unde haec stellae altitudo dicitur meridianae? Non semper a plaga meridianae, sed a circulo meridiano, ad cujus partem etiam septentrionalem quaedam stellae videntur applicare, et his quidem illarum, quae non occidunt, aliquae, unde duplex est altitudo meridianae quarundam, una maxima, altera minima.

Explicet hanc altitudinum meridianarum varietatem particularius. In altitudine poli 45°, quae quantitas est dimidii quadrantis, stellae stringentes horizontem transeunt etiam per verticem; ab his igitur omnes polo viciniores bis videntur in meridianum ex plaga conspici poli; nulla earum, quae sunt a polo remotiores, his ad meridianum applicare videtur, inferiorem enim applicationem horizon occultat; nulla etiam harum remotiorum a polo conspiciendo applicat ad meridianum versus poli conspiciendi plagam.


In altitudine poli minori, quae sunt inter stellas verticales et stringentes, applicant ad meridianum ex plaga poli semel, quae viciniores sunt polo, his ex poli plaga.

In altitudine poli majori quaecunque sunt viciniores polo quam stringentes horizontem, bis applicare videntur; illae quidem, quae sunt propiores polo quam verticales, bis ex eadem plaga, quae vero sunt inter verticales et stringentes horizontem, semel a plaga poli, semel a plaga contraria meridiani.

Quomodo cognoscitur, quantus sit arcus iste altitudinis poli in quolibet loco? Varie, sed modus hujus loci proprius est iste: quando nox est longior quam dies, sic ut intra unam noctem possit fieri plus quam dimidia revolutio Telluris, tunc eligimus stellam prope polum mundi, quae non occidat, et quae in principio et fine noctis spectetur in meridianum, semel eum apparet altissima, iterum eum apparet humillima. Jam parallelus puncti verticalis ex definitione parallelorum habet eodem cum sphaera polos, ideoque circulus meridianus, quippe per polum transiens, secat hunc parallelum in punctis duobus oppositis, quorum alterum (verticis punctum in id incidens) proximum est stellae, alterum ab eo remotissimum. Quando ergo meridiani ille semicirculus, qui per verticem transit, stellam attingit, stella apparet altissima, quando contrarius semicirculus, tunc stella apparet humillima. Et tunc medium arithmeticum inter utramque stellae altitudinem meridianam est altitudo poli.

Sit V vertex, P polus, SI circellus motus stellae apparentis, verbi causa polaris (schemata enim expriment motum stellarum, non motum puncti verticalis, cujus motus esset VH), sit altitudo maxima stellae S, arcus SR, 51° 3', minima IR 45° 29'. Aufer IR ab SR, restat SI 5° 34', cujus dimidium est PI 2° 47'. Adde PI ad IR, consurgit PR; altitudo poli


Fig. 33.



48° 16'. Idem autem accideret, si esset S stella immobilis et V vertex mobilis, primum enim, si semicirculus PVL, habens verticem V, transeat per stellam S, distabit stella a vertice per VS, deinde sit vertex in H, ejusque semicirculus PHL et oppositus PVL transeat per stellam, ergo stellae distantia a vertice erit HS. Ablato VS vel aequali HL ab HS, manet SI, ut prius.

Quomodo altitudo aequatoris habetur? Altitudo poli et altitudo aequatoris compositae faciunt integrum quadrantem. Quare ablata poli altitudine a quadrante, relinquitur altitudo aequatoris.

Fig. 34.



In schemate PQ est altitudo poli, AH altitudo aequatoris: quia igitur HQ, linea horizontis, transit per centrum sphaerae, HVQ erit semicirculus, sed PA est quadrans, quia aequator est medius inter polos: ablato igitur PA quadrante a QH, semicirculo, arcus reliqui PQ et AH confluent etiam quadrantem.

Quomodo geographi solent appellare poli altitudinem? Geographis est latitudo loci: quanto enim arcu attollitur polus supra horizontem, tanto arcu distat locus ab aequatore.

Quid est latitudo loci? Est arcus meridiani terrestris, interceptus inter locum et aequatorem terrestrem.

Proba, proportionales esse arcus poli altitudinem et latitudinem loci. Ab aequatore ad polum ejus est quadrans, a vertice ad horizontem est itidem quadrans in circulo meridiano: sunt igitur hi arcus aequales. Communem aufer arcum a vertice ad polum, ergo residua sunt aequalia, illic ab aequatore ad verticem, hic a polo ad horizontem. Jam vero arcus coelestis et terrestris meridianorum, abscissi duabus ex centro rectis, perpendiculari et axe, sunt proportionales.

In schemate priori PA et VQ sunt quadrantes et aequales, communem aufer VP: erunt AV et PQ aequales, sic etiam in Terra NL et OD, sed NL est latitudo loci et PQ altitudo poli.

Quid appellant gnomonici declinationem plani? Arcum circuli horizontis, interceptum inter verticalem primarium et circulum plani declinantis.

Quid est illis inclinatio plani inclinati? Est arcus verticalis primarii, interceptus inter meridianum et circulum plani inclinati.

Quid est inclinatio plani deklinati? Est arcus verticalis ad deklinati circulum recti, interceptus inter illum et verticem.

Quid incumbit gnomonicis circa deklinatum? Ut illud primo omnium referatur ad inclinatum, quaesita altitudine poli, sub qua quodque deklinatum pro simpliciter inclinatum computari possit, et angulo inclinationis super illa poli altitudine.

Quomodo hoc fieri potest? Formatur rectangulum (triangulum) inter horizontem, meridianum et circulum deklinati; datur in eo latus in horizonte, quod est complementum declinationis plani, datur et angulus inter circulum deklinati et horizontem, qui est complementum inclinationis. Angulus vero inter horizontem et meridianum est rectus; lude quaeritur latus in meridiano, quod sc. est inter horizontem et id punctum, ubi deklinati circulus meridianum secat, ejusque sectionis angulus: hoc latus cum altitudine poli tui loci comparatum, detegit quaesitam altitudinem poli.

Processus est iste pro latere: Complementum inclinationis sit 60° , tangens 173205
Complementum declinationis plani declinati sit 70° , sinus 93969

Multipli-	1558845
centur ab-	51962
sectis 5 ultimis.	18588
	1039
	156

Lateralis in meridiano seu arcus $58^\circ 26'$ tangens 162759

Sit altitudo poli 48. 16. Aufer quia minus,
restat 10. 10. Haec est altitudo poli, sub qua hoc declinatum est inter
inclinata simpliciter. ²¹⁾

Pro angulo processus est talis: Complementum declinationis plani declinati sit 70°

tangens	274748	
Inventi lateris in meridiano sinus	85203	
dividat:	255609	3
	191390	
	170406	2
	20984	
	17041	2
	3943	
	3408	4
	535	
	511	6
	24	3
	25	

Quotiens (322463) est tangens arcus $72^\circ 46'$ in-
clinationis ad meridianum inventae altitudinis poli.

Quid incumbit astronomo circa circulum plani inclinati? Quaerenda est elevatio poli super illum, tanquam super horizontem aliquem, quae semper est minor altitudine poli super horizontem loci; item et arcus ejusdem circuli, interceptus inter meridianos, unum ipsius plani, alterum illius elevationis poli, sub qua planum hoc censetur inter inclinata simpliciter. Hunc enim arcum appellant gnomonici angulum linearum meridianarum.

Quo medio investigantur ista? Formatur rectangulum inter altitudinem poli, sub qua circuli planum habetur pro inclinato, seu meridianum loci illius, tum inter meridianum ipsius inclinati et inter circulum inclinati, in quo datur angulus seu ejus mensura inclinatio, latus etiam in meridiano loci illius, id est dicta altitudo. Quare latere non poterit nec latus in meridiano proprio, id est altitudo poli quaesita, nec latus alterum in meridiano loci.

Processus est talis pro latere priori. Altitudo poli sub quo planum habetur pro
inclinato, sit $10^\circ 10'$, sinus 17651
Inclinatio $72^\circ 44'$, sinus 95496

Multipli-centur abjectis 5 ultimis.

95496
66847
5730
477
10

Altitudinis poli super planum inclinatam arcus $9^\circ 42'$ sinus 16856

Processus pro angulo inter lineas meridianas est talis: alti- Appone 5 cyphas
tudo poli, sub quo planum habetur pro inclinato $10^\circ 10'$, secans 101595
Altitudo poli super planum $9^\circ 42'$, secans 101451 100
Dividat; quotiens (100142) est secans anguli inter meridianas $3^\circ 3'$. 144

102	1
42	42

Quid agendum cum planis declinatis? Etiam super haec altitudo poli

et angulus meridianarum est quaerendus: sed processus pro altitudine poli super horizontem loci utitur altitudine aequatoris seu distantia poli a vertice, haec enim est altitudo poli super planum meridiani; in ceteris est plane idem, qui prius in inclinatis. Est autem et haec altitudo poli inventa semper minor usurpata distantia ejus a vertice.

Quid agendum est astronomo cum circulis positionum? Quaerenda est elevatio poli super illorum unumquemque, veluti super aliquem horizontem. Rursum autem ista semper minor est elevatione poli super horizontem loci.

Unde haec habetur? Vel ex inclinatione circuli positionum ad meridianum loci, quomodo Campanus et Gazulus circulos domorum construunt, et tunc processus est plane idem qui prius, cum altitudo poli quaeretur super circulum plani inclinati in gnomonicis; vel ex arcu aequatoris inter meridianum et circulum positionis, quomodo Regiomontanus circulos domorum construit. Tunc formatur rectangulum ex meridiano, aequatore et circulo positionis, in quo latus in aequatore datur, latus in meridiano est altitudo aequatoris; quare ei oppositus angulus non poterit nos fugere, quem metitur altitudo aequatoris super circulum positionis.

Processus est iste: Altitudo aequatoris loci sit $41^{\circ} 44'$, tangens 89201
Arcus aequatoris inter meridianum et circulum positionis sit $30^{\circ} 0'$, sinus 50000
Dividat: quotiens 89201 : 50000 = 178400 est tangens arcus $60^{\circ} 44'$ altitudinis aequatoris super circulum positionis. Ergo $29^{\circ} 16'$ est altitudo poli super eundem.

Quo documento constat, altitudinem poli in locis superficiei Terrae semper esse eandem? Pragae ante 200 annos observata est altitudo poli $50^{\circ} 6'$, sicut et hodie.

*Atqui Joh. Maria ante 100 annos dubitasse de hoc legitur, comparatione geographicae Ptolemaicae cum moderna.*²⁷⁾ Creditur culpa in Ptolemaeo haerere, qui in locis occidentis non coram observaverit, sed ea procul dubio ex tabula geographica minus accurata transcripserit, aut ex longitudine diei aestivae, uti eam ex crasso relatu didicerat, investigaverit.

Quomodo metimur altitudinem stellae aut distantiam ejus a vertice? Instrumento quadrantis, seu solitarii, seu is sit pars circuli in astrolabio; cujus quidem quadrantis unum latus beneficio perpendiculari in punctum verticalem dirigatur, alterum in plenum horizontis, et tunc regula visu duce et adimpleculo pinnacidiorum in stellam est dirigenda. Quae quantum tunc abscindit de limbo diviso, tanta pronuntiatur altitudo stellae, siquidem quadrans in partes 90 divisus sit, progrediente numeratione ab horizontis sursum; sin autem a summo versus horizontem procedat ordo numerorum, tunc abscinditur distantia stellae a vertice.

In schemate 31. directae sit AB in horizontem, AF in verticem, AD regula in stellam, ergo BC reputabitur pro altitudine stellae. CF pro distantia ejus a vertice.


Quomodo vero scitur, stellam hoc momento esse in meridiano et altissimam, cum meridianus circulus non pateat oculis in coelo? Investigatione lineae meridianae et collocatione quadrantis super illam aut ejus parallelam; stella enim in hoc planum iudice visu incidens est in meridiano.

Quomodo linea meridiana habetur? Variet et haec, sed modus hujus loci proprius et expeditissimus est iste: nocte clara respice ad stellam circumam in cauda Ursae minoris, est enim prope polum; itaque plaga illa est plaga septentrionis in nostro hemisphaerio et e regione ejus est meridies praeter propter. Cognita plaga meridiei elige stellam, quae a meridie est ad sinistram; versus ortum ejus cape altitudinem DE per quadrantem TD et

tudo aequatoris in meridie, tanta est profunditas oppositi puncti aequatoris in septentrione sub horizonte; stella igitur, plus distans ab aequatore quam horizon, exstat supra horizontem cum est humillima. Sin autem ex libris offeratur stella tantae declinationis meridianae, illam scias esse unam ex illis, quae in proposita altitudine poli uou oriuntur vel conspiciuntur. Ergo illae tantum stellae oriuntur et occidunt, quarum declinatio est minor altitudine aequatoris.

Numquid etiam extra meridianum potest capi declinatio stellae? Si cognita et constituta sit linea meridiana, tunc ex observato azimutho, altitudine poli et stellae computatur ejus declinatio, mediaute calculo triangulorum.

Fig. 36.



inventum quadrante, complementum ejus ad quadrantem SE, sin majus, excessus ejus supra quadrantem SQ erit quaesita declinatio, illic septentrionalis, hic meridiana. Praecepta ipsa sunt a geometria petenda: hic vero habes typum operis.

Ex altitudine aequatoris et distantia stellae a vertice

quod majus 42° complm. 48°

quod minus 30° . Idem 30

Summa minor quadrante ergo complm. 18° 72° 78° ; sinus 97815

(Si summa fuisset major quadrante, Residuum 66918

sinum excessus addidisses) dimid. 33457

Angulus ad verticem sit 100° .

Sinus versus anguli 117365; superius dimidium 58457 90. 100000

multiplica abjectis ultimis: factus 39267 est minor sine 10. 17365

prime. Subtrah. (97815—39267), dif. 58548 sinus arcus 117365

35. 50. ²⁹) 33457

Haec est declinatio stellae, septentrionalis, quia quotiens minor. Si factus fuisset major et ab ipso subtractum, declinatio esset meridiana.

Quomodo, cognita stellae declinatione ex libris praestantis alicujus artificis, et altitudine poli, vicissim linea meridiana investigatur sine taediosa expectatione horarum ante et post meridiem? Observatione altitudinis stellae in certo situ instrumenti et triangulo eodem. Dantur enim tria latera, PV, VS ut prius, PS vero, subtracta declinatione sept. SE a quadrante PE, vel addita decl. meridiana SQ ad quadrantem PQ. Tunc enim quaeritur angulus SVP, seu GR, ejus mensura. Itaque notato situ instrumenti seu G puncto horizontis, in quod directum est, patescit etiam, quantum meridianus HVR ad illius planum inclinetur, seu anguli HCG, GCR in plano horizontis.

Prima quidem processus pars manet eadem quae prius, altera pars est talis.

Sit sept. declinatio 35° 50', sinus	58548	(Subtr.)
Sinus primus	97815	
(Meridianae declinationis sinum addidisse)	39267	Continua 5 cyphris.
Dimidium superius dividat:	33457	1
	58100	
	33457	1
Quotiens 100000 90.0.	24643	
17365 10.0. est sinus versus arcus	23420	7
100.0.	1223	
Angulus ergo ad verticem est tantus, et angulus exterior GVA est 80° 0' 34)	1004	3
	219	
	200	6
	19	5

Quomodo appellant astronomi angulum ad polum, seu inter meridianum et circulum declinationis stellae? Dicitur elongatio vel distantia stellae a meridiano. In schemate est SPV.

Quibus mediis inquiri potest quantitas huius anguli ad polum, ejus sc. mensurae in aequatore? Opus est cognitione altitudinis poli et declinationis stellae, quibus accedere debet vel altitudo stellae vel azimuth ejus ex observatione; denique possumus carere declinatione, si habeamus ejus loco altitudinem et azimuth simul: et in eodem triangulo, quod fuit hactenus, invenitur quaesitum. Sed posteriores duo modi sunt operosiores et rarior eorum est usus.

Processus igitur cum meridianae declinatione et altitudine est talis. Dantur enim PS, SV, VP, quaeritur VPS.

Decl. complm.	82° 29' 43",	decl. ipsa	7° 30' 17".
Alt. aequatoris	38° 28'.	Eadem	38° 28'.
Summa	120. 57. 43.	Summa	45. 58. 17,
major quadrante, ergo excessus	30° 57' 43",	sinus	71899.
(Si summa minor esset, complementum subtrahisset.)		sinus	51449 Adde.
		Aggregatum	123348
		dimidium	61674 est divisor.
Sit altitudo stellae 23° 45', sinus	40275		
Sinus primus	71899		
Quotiens 181682 (semper prodeunt 6 numeri) est sinus versus arcus 144° 58'.		Addantur:	112174. Continua 5 cyphris
Ejus complementum ad semicirculum 35° 2' est angulus ad polum.		dimidium prius	61674
		(divisum)	

Processus cum septentrionali declinatione et altitudine. Ex altitudine aequatoris et complemento declinationis.

Quod majus 68° 45', compl. 21° 15'.			
minus 36. 22. Idem 36. 22			
Summa 105. 7.	summa 57. 37,	sinus	84448
Ejus quadrantis majoris excessus 15. 7	sinus	26079	Add.
(Si summa minor fuisset, compl. sinum subtrahisset.)	Aggregatum	110527	
	dimidium	55264	
Sit altitudo 46° 25', sinus 72437			
Sinus primus	84448		
Subtrahendum 12011			
divisum (12011 : 55264)			

Quotiens 21734 (possunt prodire 6 numeri) est sinus versus arcus 38° 30', quia 21734 de 100000 reliquit 78266 sinum arcus 51° 30', compl. Hic igitur ipse quotientis 21734 ut versu arcus 38° 30' est angulus ad polum quaesitus. 79)

Num etiam angulus ad stellam seu inter verticalem et circulum declinationis computari solet? Omuino; usus ejus in refractionibus, parallaxibus, eclipsibus solaribus et alibi passim occurrit. (In schemate VSP.)

Describe varietates ejus generaliter. Oriente stella minimus est hic angulus nec unquam aequat altitudinem aequatoris, nisi tantum, si oriens stella in aequatore fuerit. Ex eo crescit hic angulus fitque rectus cis et ultra meridianum; in stella igitur, cujus declinatio est major altitudine poli cognominis, augetur usque dum in meridiano fiat aequalis duobus rectis. At si minor declinatio vel etiam contraria fuerit, minuitur iterum, usque dum in meridiano penitus evanescat.

Doce hunc angulum ad stellam computare. Opus est vobis in eodem triangulo primario altitudinis poli complemento, PV, sc. arcu meridiani inter verticem et polum, declinationis stellae complemento vel excessu, seu latere inter stellam et polum, PS, et altitudinis stellae complemento, seu latere inter verticem et stellam, VS, vel ejus loco azimutho stellae, HG, GR, seu angulo ad verticem SVP, aut etiam angulo ad polum VPS, ut ita varii casus fiant.

Processus per tria latera. Ex complemento altitudinis stellae et distantia stellae a polo,

Quod majus	82° 30', compl.	7° 30'.
minus	66. 15.	Idem 66. 15.
Summa major quadrante	148° 45'.	Summa 73° 45'; sinus 96005.
Ejus ergo excessus	58. 45.	sinum 85491 adds.
(Si summa minor esset, complem.		Aggregatum 181496.
sinum subtraheres.)		Dimidium 90748.

Sit alt. poli	51° 32', sinus 78297
Sinus primus	69005 (Addo, si declinatio austr-
	lis; subtraheres, si sept.)
	147302

Superius dimidium 90748 dividat. Quoties 192072 est sin. vers. arcus 157° 2'. Hic, quia declinatio australis, complementum hujus ad semicirculum 22° 58' est quaesitus angulus; in septentrionali ipse arcus quotientis ut sinus versus esset angulus quaesitus. 76)

Processus per azimuth loco altitudinis cum duobus reliquis lateribus.

Inter verticem et punctum ortus vel occasus aequinoctialis

80° 20'; hujus compl.	9° 40'.
Altitudo poli	51. 12.
Summe	131. 32.
Excessus	41. 32. 66306
(Si minor quadrante esset, complementi	Residuum 21043
sinum addidisses.)	Dimidium 10522

Distantiae stellae a polo vicino 82° 33' sinus 99156. 10522 : 99156 = 10616 est sinus anguli 6° 6' quaesiti. 77)

Notetur, in hoc processu idem esse, ac si summisses angulum azimuthi intra vel extra triangulum, uter minor quadrante: 9. 40

et distantiam poli a vertice	38. 48	Compl.
Summa	48. 28	41. 52,
differentia	29. 8	60. 52.

Et cum sinibus horum complementorum egisses ut supra, quia vides, eosdem arcus prodire. Ubi si summa excederet quadrantem, excessus sinum adderes.

Quid cognatum est declinationibus stellarum? Latitudines locorum in Terra, de quibus paulo antea, quia subordinatis et correspondentibus circulis definiuntur.

Quomodo solent astronomi loqui de locis horizontis, in quibus stella quaelibet videtur oriri vel occidere? Utuntur voce amplitudinis ortivae.

Quid est amplitudo ortiva? Est arcus horizontis, interceptus inter aequatorem et punctum orientis stellae. Quanquam denominatio primum fluxisse videtur a constellationibus integris quaesitumque, quam amplum horizontis spatium occupet oriendo constellatio quaelibet cum omnibus stellis ei tributis.

Quomodo cognoscitur haec amplitudo ortiva, seu etiam arcus horizontis, quo distant puncta ortus et occasus stellae? In sphaera quidem id ad oculum patet praeter propter, quantus horizontis arcus intercipiatur inter aequatorem et puncta ortus et occasus stellae, polo sphaerae ad justam altitudinem erecto et stella in horizontem revoluta.

Sin autem id accurate lubet explorare calculo, cum sphaera non adeo subtilis esse possit: id fieri potest in eodem triangulo ut hactenus, sed facilliori methodo. Nam dato PV , arcu inter polum et verticem, qui dicitur aequatoris altitudo, arcu PS inter polum et stellam ejusdem hemisphaerii, qui complementum declinationis est, denique arcu VS inter verticem et stellam, qui semper est quadrans, quippe stella in horizonte posita, quaeritur SVP vel SVA angulus ad verticem, qui metitur arcum horizontis inter stellam et meridiani semicirculum viciniorum, hoc processu.

Fig. 37.



Declinatio stellae 40° , sinus 64279

Alt. aequatoris 42° , sinus 66913

Diviso (appositis 5 cyphris) prodit sinus 96064 arcus $73^\circ 52'$, qui est amplitudo ortiva, cujus complementum $16^\circ 8'$ est arcus inter stellam et meridianum, ejusque duplum $32^\circ 16'$ est distantia ortus et occasus in parte horizontis septentrionali. ¹²⁹

Si declinatio est meridiana, etiam quod prodit a meridiana plaga denominationem sortitur, cetera utrinque eadem sunt.

Potest pro hoc triangulo formari aliud sub Terra, cum septentrionalis est stella, vel super Terram, cum meridionalis, inter circulos declinationis SQ , horizontem ST et aequatorem QT , cum angulo recto, manetque processus idem. Data enim sunt quantitate eadem: latus unum SQ quidem declinatio, angulus Q rectus et angulus STQ inter horizontis seu amplitudinis ortivae arcum quaesitum ST et aequatorem, cujus mensura est altitudo aequatoris HA .

4. *Quomodo fit, ut constellationum aliarum situs spectetur diurno motu eversus, aliarum minime?* Accidit hoc stellis propter conversionem vultus spectatoris erecti stantis in plagas contrarias, in quas transeunt stellae, aut in plagam semper eandem.

Quotuplex est situs eversio? Duplex, pro duplici discrimine stellarum in sphaera obliqua; una plenaria, altera semiplena, ut cum ea, quae stare videbantur, postea strata apparent. Earum enim constellationum, quae non occidunt in elevatione poli majore quam 45° , quae sunt extra complexum VQ circuli paralleli (Fig. 34), quem V verticale punctum in primo motu describit, hae non videntur everti. Nam figurarum partes seu membra eadem semper ad polum mundi sunt ordinatae, semper igitur vertex, in quocunque puncto paralleli sui constitutus, vergit a constellatione in plagam, in qua P polus est, sive supra polum appareat constellatio, sive infra illum. Stans igitur contemplator sic adpiceit figuras, sicut si verticem sub ipso polo haberet in sphaera

parallela; eodem scilicet modo situs videt tam altas in plaga meridiæ, quam humiles in plaga septentrionis. Illic igitur conversio vultus sequentis stellam cavet, ne situs evertatur. Quae vero sunt intra complexum VQ paralleli per verticem, sic ut bis in septentrionali quadrante meridiani veniant ad meridianum, semel cum sunt altissimae in S, semel cum humillimae in I, quia tunc utrobique vultus spectantis in eandem plagam poli convertitur, earum igitur situm necesse est everti plenarie; aliarum enim partes a polo remotissimae sunt supremæ, humilium contra partes polo proximæ.

Contrarium fit in stellis, quæ oriuntur et occidunt. Nam conversio vultus, constellationem sequentis in plagas contrarias, eversum earum situm repræsentat. Orientium enim partes præcedentes sunt superiores, occidentium partes sequentes. In sphaera igitur recta fit hoc modo itidem plenarie eversio, in sphaeris obliquis semiplena; quæ enim oriuntur erectæ, occumbunt strata, prout vel supina, idque varie pro majori vel minori obliquitate sphaeræ proque situ constellationum in superficie sphaeræ fixarum.

5. *Quomodo cognoscitur mora stellæ vel puncti cuiusque supra horizontem?* Beneficio paralleli per stellam seu punctum ducti: secat enim illum horizon, itaque pars sub horizonte latens est argumentum absentiae stellæ infra horizontem, vel, si de Sole agimus, noctis, diciturque arcus nocturnus; pars exstans est argumentum moræ supra horizontem, seu, cum de Sole agimus, diei, diciturque arcus diurnus, quem licet vel circino dimetiri adque totum parallelum comparare.

Sequeretur hoc, si stella vel Sol describeret motu suo talem parallelum; sed dixisti supra, stellam vel Solem non tenere in alia puncta illius circuli, sed esse illi velut affixum in unico puncto. Nihil hoc impedit, nam ut libro secundo monitus es, fingitur alius parallelus immobilis, superstans huic parallelo mobilis in eodem plano continuato, quem parallelum stella describat velut in aliquo tabulato cavo, quod fixas tegat. Talem igitur immobilem repræsentat hic mobilis parallelus.

At hoc figmentum quadrat tantum ad motum coeli; tu vero vis Terram moveri. Saepè responsum est, rationem esse plane eandem. Qualis enim hic fingitur parallelus immobilis in tabulato aliquo supra fixas, talis etiam respondet parallelus in Terra, subordinatus parallelo coelesti, ut apparet ex genesis parallelorum. Finge ergo fieri, ut rotatione Telluris stella in ipsa superficie Terræ per loca illi parallelo inserta transcat, spectator vero non sit in superficie globi, sed intus in centro, habeat horizontem parallelum ei, qui tangit superficiem in loco spectantis: nascetur plane eadem species, quæ prius, cum ponimus, stellam in sublimi coelo circumire, spectatorem in globi superficie stare.

Vellem hunc arcum stellæ vel puncti superiorem non circino mechanice, sed accurato calculo dimetiri. Id fit rursum in primo illo primi motus triangulo, quod est inter polum, verticem et stellam. Datum enim oportet esse latus PV (Fig. 87) inter polum superum et verticem, latus PS inter polum et stellam ejusdem hemisphaeris, quod est complementum declinationis, denique latus VS inter verticem et stellam, quod est semper quadrans, quippe cum stella hoc in processu semper sit in orto vel occasu ponenda. Ex tribus his præcognitis quaeritur VPS angulus ad polum, metiens arcum SM semidiurnum stellæ. Cum ergo declinatio sit minor altitudine aequatoris (alias non oreteret occideretque stella, ut prius dictum) processus fit talis:

*Declinatio stellae sept. 40° , tangens 83910 augeatur cyphris radil.

Altitudo aequatoris 42° , tangens 90040 (dividant.)

Prodit sinus 93192 arcus $68^\circ 44'$ adde quadrantem 90, fit $158^\circ 44'$, angulus ad polum et sic semidiurnus arcus stellae. Ergo duplum $317^\circ 28'$ est arcus stellae superior, seu in Sole diurnus.

Quodsi stella sita fuerit in ipso aequatore, parallelus ejus est ex maximis, quare secabitur ab horizonte in duos semicirculos, et dies seu praesentia stellae aequatur ejus nocti seu absentiae.

Si declinatio stellae fuerit meridiana, assumendum est triangulum oppositum infra Terram LSN, ejus anguli L polus inferus, N nadir, S stella; et manente eodem processu, prodibit arcus stellae inferior, seu in Sole nocturnus, quo subtracto de circulo integro relinquitur arcus diurnus.

Rursum hic aliud triangulum, SQT, formari potest, paulo prius descriptum, inter declinationem SQ, amplitudinem orbitam ST et aequatorem QT, quod in septentrionali stella sub Terra est, in meridionali supra. Prodit enim QT arcus aequatoris, qui infra differentia ascensionalis dicitur, metiens excessum arcus paralleli semidiurni supra quadrantem, est enim idem processus.

Recense omnes varietates harum morarum per omnes tres sphaerae positiones. In sphaera recta, seu apud illos, qui habitant sub aequatore, omnium stellarum arcus superi sunt aequales inferiori, sic ut quolibet 12 horas super horizontem moretur, 12 infra. In obliquis sphaeris, quibus eadem est altitudo sui cuique poli, sicut stellae uni non orientes alteri non occidunt et vicissim, sic etiam stellae uni stringentes horizontem quasi occasurae, cum non oriantur; ex orientibus vero stellae declinationis majoris, hinc septentrionalis inde australis, dies habent longiores, noctes breviores; contrariae declinationis contrarium, usque ad illas, quae in aequatorem ineidunt, quae solae dies noctibus aequant, inde quo majorem declinationem plagae contrariae habuerint, hoc vox illarum longior, dies brevior. Denique quibus sunt aequales declinationes plagarum contrariarum, illae in eodem loco Terrae rationes et mensuras dierum et noctium permutatas habent, ut unus dies aequetur alterius nocti. Rursus eadem stella in eadem altitudine contrariarum polorum, quantum hic supra horizontem maeret, tantum illic infra et vicissim.

In parallelis sphaeris nihil oritur, nihil occidit, quare dimidia pars stellarum habet in una continuum diem, in altera continuum noctem; dimidia reliqua contrarium.

Diristi, stellarum radios refringi circa horizontem: num igitur hoc nihil turbat doctrinam hactenus traditam? Cum sidera per refractionem attolli videantur justo altius in circulo verticali, tam in ortu quam in occasu, quare declinationes eorum in sphaera quidem recta nihil mutantur, quod sentiri possit, in obliquis mutantur sensibiliter; et eorum quidem, quae sunt eognomina cuiuslibet hemisphaerii, repraesentantur declinationes justo majores, reliquorum justo minores, unde sequitur, arcus illorum diurnos justo majores, eorum justo minores esse, quae differentia in sphaera recta est maxima, in parallelis nulla; quin etiam amplitudo orbita passim alteratur, nihil quidem in sphaera recta et parallelis, plurimum tamen circa alt. poli 45° .

LIBRI TERTII

PARS SECUNDA.

DE ASCENSIONIBUS, ET DESCENSIONIBUS, SIGNORUM SEU PUNCTORUM ECLIPTICAE.

Hactenus in genere de quibuscunque punctis sphaerae dictum. Velim nunc in specie doceri, quid astronomi super eclipticae punctis et arcibus potissimum inquirere? Astronomis ad partes hujus doctrinae sphaericae sequentes pertractandas imprimis opus est punctorum eclipticae declinationibus et ascensionibus tam rectis quam obliquis, angulisque quos format ecliptica apud illa puncta cum horizonte obliquo vel recto, id est meridiano.

Quae causa est, cur potissimum considerent eclipticam? 1) Quia omnes planetae cis et ultra illam perpetuo versantur, 2) in specie vero Sol, rex planetarum auctorque temporum, centro suo sub illa perpetuo versari cernitur, 3) denique, quia omnes etiam fixas stellas ad eclipticam referimus.

Declinationes punctorum eclipticae.

Quid metitur declinationes punctorum eclipticae? Meridianus in sphaera vicem praestat omnium declinationis circulorum, nec minus et horizon in sphaera recta. Puncto igitur, cujus declinatio quaeritur, ad hos circulos applicato, patet ad oculum, quantus intersit arcus inter aequatorem et punctum illud eclipticae.

Num etiam calculo possunt investigari declinationes istae punctorum eclipticae et ex quibus principiis? Cum praesuppositum sit verissimum ipsoque usu probatum, eclipticam esse perfectum circulum maximum, non minus quam aequatorem: data igitur maxima ejus declinatione ab aequatore, quae est mensura anguli, quo se mutuo secant interque circulus, investigari potest cujusque eclipticae puncti declinatio, beneficio doctrinae triangulorum.

Quid metitur maximam eclipticae declinationem in specie praeter meridianum et horizontem rectum? Colurus solstitiorum, quippe tractatus per eclipticae et aequatoris polos. Quanta enim est distantia utrinque polorum, tanta est etiam haec declinatio ipsorum.

Die, quo medio effectum, ut ecliptica declinaret ab aequatore, et cui fini? Causa hujus declinationis genitrix et formalis est axis illius, circa quem velut immobilem Tellus rotatur, inclinatio super eclipticae planum, in quo centrum Terrae versatur, annuo motu circa Solem circumiens. Nam si super hoc planum, motu Terrae annuo formatum, staret erectus axis motus Terrae diurni, coinciderent aequator et ecliptica. (Vide abhinc schema secundum.) Causa finalis hujus inclinationis est procul dubio usus hominum et animantium per omnem circumeirca superficiem Telluris dispersorum: ut varietas phaenomenon coelestium ad omnia omnino Terrae loca pertingeret, quod infra pluribus explicabitur parte quarta. Haec igitur in astronomia Copernicana jucundissimis rationibus demonstrantur ingeniosissime, sic ut in eadem Tellure statuatur et modus rei et finis; in astronomia vulgata hoc solum docemur, quod sit; cur sit et quomodo, id involutum est ibi multa caligine.

Quomodo inquiri solet maxima eclipticae declinatio? Non aliter nisi observando. Nam 1) attendunt astronomi continuis diebus, quando Sol omnium maximam et rursum in opposita circuli annique parte omnium minimam, tempore utrinque meridiano, repraesentet altitudinem, quarum utramque quadrantis instrumento metiuntur. Deinde minimam a maxima subtrahunt, residuum bifariam sectum habetur pro declinatione maxima.

2) Paulo alius est modus, si prius observet astronomus altitudinem poli, ut supra docebamur, per stellas circumpolares, deinde maximam Solis altitudinem meridiana, aestivis diebus observatam, ad altitudinem aequatoris comparet; differentia eorum est iterum maxima eclipticae declinatio.


3) Aut ut supra, cognita altitudine poli et linea meridiana, ex quocunque azimutho et altitudine Solis simul observato habetur per calculum ejus declinatio, in die quidem solstitii maxima.

Quanta est haec maxima eclipticae declinatio ab aequatore? Non plane consentiunt in minimis omnium saeculorum astronomi. Indi vetustissimi faciunt eam 24 praecise graduum, quae est quidecima totius circuli pars. Eratosthenes toto circulo diviso in partes 83, earum undecim dicit aequari duplo declinationis maximae. Itaque illi declinatio maxima est $23^{\circ} 51\frac{1}{3}'$ proxime, quantam etiam Hipparchus et Ptolemaeus, Eratosthenem secuti, retinuerunt. Albategnius prodidit 23. 35, Arzachel 23. 34, Almeon 23. 33, Probatius Judaeus 23. 32, Tycho Brahe 23. $31\frac{1}{2}$, itemque alia ratione 23. $30\frac{1}{2}$, et cum Peurbachio, Copernico aliisque hujus temporis astronomis in arctoo orbe 23. 28 vel etiam 23. 27. Ita omnis dissensus inter 24 minuta versatur, quae sunt pars vngentesima circuli non major. Ultimur tamen hodie in astronomia Brsheana communiter 23. $31\frac{1}{2}$.²⁹⁾

Quae est hujus varietatis causa? Una vera causa coelestis est in eo, quod putatur axis quidem Telluris recte suam inclinationem, ecliptica vero pauculis minutis ab illa fixis, quibus olim erat insignita, hodie recessisse. Sed haec causa pertinet ad librum VII. Altera causa est terrestris et particularis Germaniae sen arctoo orbi, quod Sol in humillima sua altitudine meridiana propter aëris densitatem radios in eo refringit refractosque ad nos mittit, quo pacto aliam censetur altitudinem habere, quam vere habet. Id non fit adeo sensibiliter in australioribus Terrae locis, quibus Sol in meridie non est adeo humilis.

Doce ergo calculo investigare cujuslibet puncti eclipticae declinationem. Conciplendum est triangulum inter sectiones mutuas aequatoris, eclipticae et

Fig. 28.



circuli declinationum per polos aequatoris ducti, in quo rectus est angulus ad sectionem aequatoris et circuli declinationum; notus praeterea angulus sectionis aequatoris et ellipticae; denique datur sen sumitur ut notum latus inter aequatoris cum elliptica sectionem propriorem, et inter punctum, ejus declinatio quaeritur. Tribus igitur rebus in triangulo cognitis, non poterit ignorari quantum, sc. declinatio.

FE colurus solstitialium, AD elliptica, F ejus polus, AE aequator, G polus ejus, B punctum susceptum, ejus declinatio BC quaeritur. DE est declinatio maxima, mensura anguli BAC; ACB rectus, AB latus datum. Processus, si una sola declinatio quaeratur, brevissimus

est iste:

I. Sit proposita declinatio 17° Tauri, qui distat a sectione verna propior 47° 0.

Latus ellipticae	47° 0.	— AB
Declinatio max.	23. 31. 30.	— BAC vel DE.
Differentia	23. 28. 30.	compl. 66. 51. 30, sinus 91724.
Aggregatum	70. 31. 30.	

Ejus ut quadrante minoris compl. 19. 28. 30. sinus 33339. subd.

sinus arcus 16° 58' 22", quae est declinatio quaesita (BC).²⁰⁾

Residuum 58385.
Dimidium 29193 est

II Sit proposita declinatio 13° Cancri, cui cum sit vicinior sectio autumnalis tan 0° 0, latus ellipticae est 77°.

Latus ellipticae	77°.	— AP.
Declinatio maxima	23. 31. 30.	— DE.
Differentia	53. 28. 30.	
Complementum	36. 31. 30.	— sinus 59518.
Aggregatum	100. 31. 30.	

Ejus ut quadrante majoris excessus 10. 31. 30. — sine 18266. Add.

Sinus arcus 22° 53' 13", quae est declinatio quaesita (PQ).

Summa 77784.
Dimid. 38892.

Sin autem multae declinationes ordine sunt investigandae, praestat multiplicare sinum declinationis maximae in sinus omnium arcuum ellipticae ordine, usque ad quadrantem. Quotientes enim, abjectis 5 ultimis figuris, sunt sinus declinationum quaesitarum.

Quomodo vicissim ex declinatione quaeritur arcus ellipticae quantitas, cui competit ista declinatio? Sinus declinationis auctus 5 cyphris dividitur per sinum declinationis maximae, quotiens est sinus quaesiti arcus.

Sit decl. 16. 45. 24.

Sinus auctus 5 cyphris 2883100000.

Sinus decl. maximae 39916.

279412.

88980

79832

91480

79832

116480

79832

366480

Quotiens est sinus arcus 46. 14. 40.
sc. AB.

7

2

2

2


9

Quid hic observandum summaria ratione de diversorum punctorum eclipticae declinationibus? 1) In quadrantibus eclipticae a quatuor cardinalibus punctis incipientibus puncta, quae distiterint aequaliter a punctis aequinoctialibus, bina et bina se. invicem opposita, habent aequales declinationes; sic etiam puncta illa 4 inter se, quae aequaliter a punctis solstitialibus distiterint, hoc discrimine tamen, ut quae ab eodem solstitiali puncto bina puncta distiterint aequaliter, illa habeant ejusdem puncti solstitialis denominationes; quae ab eodem aequinoctio, contrarias inter se.

2) In tricesimo gradu ab aequinoctio ante retroque declinatio est semissis maximae.

Si inclinatio axis Telluris est causa declinationis eclipticae, et si illa inclinatio axis manet constans per integrum annum: qui sit igitur, quod partium eclipticae non omnium eadem est declinatio? Etsi inclinatio axis Telluris semper est eadem super planum eclipticae, situsque omnes hujus axis inter se paralleli, sic ut semper vergat polus Terrae aquilonaris in partem illam sphaerae fixarum, ubi censetur principium Cancri: at non semper vergit in Solem, circumferitur enim globus Terrae cum axe,

Fig. 39.



polis et centro circa Solem, ut libro II. dici coeptum exque doctrina theoricæ assumptum fuit: qua circumlatione fit, ut polus Terrae aquilonaris, vergens in Cancrum, Terra sub Capricornum delata, vergat in Solem, quippe sub Cancro visum, eadem vero transposita sub signum Cancri oppositum, ipse in id signum ut antea vergens, a Sole abnuat, quippe qui ipsi tunc in Capricorno apparet. Consequens igitur est, ut sub Arietis et Librae signis axis Terrae, versus Cancrum quidem inclinatus, ut antea, sed Solem habens a latere, nec annuat illi nec abnuat, sed rectum efficiat angulum cum linea, quae centra Solis et Terrae connectit. His igitur principiis efficitur, ut Sol seu ecliptica, sub qua Sol perpetuo videtur, in Arietis et Librae principiis aequaliter ab utroque polo Terrae absit, id est in aequinoctium, qui circulus inter polos medius est, incidat, in Cancro declinet ad polum Terrae boreum, in Capricorno ad australem; et quod consequens est, ut Sole transire viso ex Capricorno in Arietem, declinatio ejus australis paulatim decrescat et evanescat, rursumque ab Ariete in Cancrum oriatur paulatim consummeturque declinatio septentrionalis.

Ascensiones.

Quid appellant astronomi ascensionem et descensionem? Idem, quod Graeci vocibus compositis *ανατολή* et *παραδυσος*, ac si latine dixeris

conscensio et coudescensio. Sunt autem arcus aequatoris, qui cum aliqua coeli parte extra aequatorem sita, cujus certum initium certusque finis in sphaera datur, supra horizontem ascendere aut sub eum descendere videntur.

Cur potius aequatoris arcus, quam alterius alicujus circuli coorientes aut coudescendentes spectantur? Quia ex circulis maximis solus aequator aequalibiter movetur, ceterorum partes aequales crebro moventur temporibus inaequalibus.

Eto verum de maximis; sunt autem et minores paralleli aequatori, qui non minus aequaliter moventur, quam aequator: an non etiam horum motu aequali ceterorum tempora ortus et occasus metiri possemus? Non ita commode, nec semper nec ubique, hoc est non in omni situ sphaerae. Nam omnis minor in aliqua sphaerae positione totus exstat supra horizontem, ubi non oriuntur ejus puncta nec occidunt. Rursum quia potissimum eclipticae arcuum tempora metienda sunt, ceteri paralleli aut non connectuntur cum ecliptica, aut non in ejus punctis cardinalibus, exceptis duobus tropicis qui in punctis quidem cardinalibus initii Cancrī et Capricorni, sed non praecipuis illi connectuntur. Solus aequinoctialis ubique in omni sphaera oritur et occidit, ubiqueque aliquid de coelo oritur et occidit, et connexus est eclipticae in punctis duobus opportunissimis iustis, sc. Arietis et Librae, sic ut illum medium secet.

Proba evidenti argumento, eclipticae partes aequales oriri temporibus inaequalibus. Sumantur ergo semicirculi integri, sumatur et regio tempusque, quando dies est longior sua nocte, ut in Germania tempore solstitii dies est horarum 16, duplo longior quam nox; et perpendatur, quod oriente Sole occidat pars eclipticae, quae est illi e diametro contraria, rursumque hac oriente Sol occidat: ecliptica enim et horizon sunt circuli maximi, secantes se invicem in partes aequales. Ex eo igitur tempore, quando Sol oritur, usque dum ejus oppositum oritur ipso occidente, ortus fuit successive semicirculus eclipticae et lapsae sunt interea horae 16. Ex eo vero tempore, quo Sol occidente pars ejus opposita oritur, usque dum Sol oritur, rursum oritur successive reliquus semicirculus eclipticae interjectus, et labuntur interim horae tantum octo: unus ergo semicirculus eclipticae oritur duplo celerius quam alter.

Quare dicis in Germania? An igitur unus idemque arcus eclipticae unico suo motu diversis in locis diversae celeritatis est, et quomodo hoc est possibile? Ortus et occasus punctorum coeli ipsiusque adeo eclipticae non sola sphaerae terrestri convolutione, sed insuper etiam visus accidentibus seu deceptionibus et horizontis imaginatione constat. Non igitur vere inaequalis efficitur unus idemque motus per diversa loca, sed horizontes diversorum locorum diversos et inter se distantes habent terminos initiorum et finium circuli aequinoctialis, coorientium et occidentium cum liadem initis et finibus arcuum eclipticae.

Cur autem non idem etiam evenit ipsi etiam aequinoctiali per diversorum locorum horizontes? Quia motus ille Telluris, quo repraesentantur ortus et occasus siderum, est secundum ductum aequinoctialis, non secundum ductum eclipticae. Inde igitur evenit, ut horizon et aequinoctialis circumcirca se mutuo secant in eodem puncto horizontis, ecliptica vero diversis suis partibus secat horizontem in punctis diversis, illaque etiam per locorum seu sphaerae positionum intervalia differentibus.

Quot modis investigamus ascensiones arcuum eclipticae? Duobus modis. Aut enim arcus illos sumimus continuos, hoc est a communi sectione vernali luceptos cum aequatore, aut discretos, hoc est non a sectione vernali incipientes.

An non etiam stellarum aut punctorum eclipticae quaerimus ascensiones, quae sunt non arcus, sed termini arcuum? Quoties usu venit, ut sic loquamur, verbi gratia ascensio 23° Leonis et cetera, tunc subintelligitur integer arcus eclipticae continens a principio Arietis usque ad nominatum 23° Leonis. Est igitur tantummodo compendiosa locutio. Idem tene etiam, cum dicimus ascensionem stellae. Nam perinde est ac si numeremus arcum circuli magni, interceptum intersectionem vernalem et stellam ejusque arcus ascensionem quaereremus.

Quomodo ascensiones vel descensiones hujusmodi arcuum inveniuntur? Posita sphaera ut loci ratio postulat, initium dati arcus collocatur in ortivo horizonte notaturque signo aliquo punctum aequatoris, per quod tunc transit horizon; idem fit cum fine dati arcus. Arcus igitur aequatoris, interceptus inter bina facta signa, est propositi arcus eclipticae ascensio. Si idem fiat in horizontis parte occidua, signabitur hoc pacto ejusdem dati arcus descensio. In arcu continuo tantummodo finis ejus in horizontem collocatur. Initium enim ejus et aequatoris in idem punctum coincidunt, nec opus est horizontis indicio. Tunc igitur numerus ad punctum fini coarctatus appositus statim prodit ascensionis vel descensionis quantitatem, in partibus vel temporibus, quorum totus circulus habet 360.

Quot sunt species ascensionum et descensionum? Totidem, quot sunt species positionis sphaerae. Sicut enim post sphaeram rectam succedunt nonaginta positiones sphaerae per totidem gradus elevationis poli posentque infinitae intermediae nominari, donec ultima polum in ipso vertice habeat horizontemque coincidentem enim aequatore in sphaera parallela: sic etiam incipiunt ascensiones a rectis transeunt per totidem obliquas desinuntque in ascensionem et descensionem nullam. Nam in sphaera parallela coelum gyra- tur in modum lapidis molaris superioris (seu Terra eum horizonte gyratur, ac si quis gyraret molarem inferiorem stante superiori), nihil enim neque oritur neque occidit.

In tabulis primi mobilis Regiomontani, Reinholdi, Magini ³¹⁾ etc. exstant post tabulam unam ascensionum rectorum aliae 89 tabulae ascensionum obli- quarum ad singulos gradus elevationis poli. Alii etiam ad intermedias poli elevationes penitantes tabulas construxerunt.

Num qua hic est dyarquia, quae incautum possit fallere? Equidem. Nam nunc modo in sphaera recta totus circulus dicitur ascendere recte, in obli- qua oblique. At alio sensu totius circuli partes diversae inter se compa- ratae alia recte, alia oblique oriri dicitur, tam in recta sphaera, quam in obliqua.

Quo respectu arcus recte dicuntur ascendere et oblique? Arcus eclip- ticae, qui horizontem secant angulis rectoribus, veluti erectiores, dicuntur ascendere recte, qui obliquioribus veluti incliniores, oblique.

Quo argumento cognoscimus horum angularum rectitudinem, et obli- quitatem majorem minoremve? Et qui recte ascendit, qui oblique? Anguli quo obliquiores, hoc minor arcubus ascensio competit; ergo quo rectoriores, hoc major ascensio. In universum igitur ille arcus eclipticae recte dicitur oriri, cum quo ascendit arcus de aequatore major se ipso, ille oblique, eum quo minor.

De Ascensionibus Rectis punctorum et arcuum eclipticae.

Num ut cuilibet loco seu positioni sphaerae sua deputata est tabula

obliquarum ascensionum, sic rectae ascensiones ad eam rectam sphaeram, ad eos sc., qui sub aequatore habitant, pertinet? Imo rectas ascensiones oportet inquirere in omni positione sphaerae, primum quia illa opus habemus ad investigationem obliquarum, quae sine rectis non innotescunt, deinde propter se ipsas: quia quantum in unica sphaera recta cum quolibet eclipticae arcu ascendit, tantumdem etiam cum illo meridianum transit in omni sphaera. Cum enim ecliptica inaequaliter etiam meridianum transcat aequalibus soli partibus, necesse est etiam hos transitus inaequales metiamur aequabili volutione aequatoris per meridianos locorum coelestes.

Quomodo quaeritur ascensio recta cuiusque arcus eclipticae calculo geometrico? Eodem utimur triangulo ABC (fig. 38), quo prius, cum declinatio quaereretur, quia circulus declinationum BC repraesentat etiam horizonem rectum, ut quorum uterque per polos sphaerae duellitur. In hoc igitur triangulo dantur tria: angulus C inter AC aequatorem et BC circulum declinationum, rectus, angulus BAC inter aequatorem et eclipticam, et AB arcus eclipticae propositus, latus sc. recto oppositum, quod incipit a sectione vernali et terminatur in punctum expressum numeris graduum et nominibus signorum. Interdum ex abundantia datur et quartum, scilicet BC, declinatio illius puncti eclipticae: non poterit igitur nos fingere AC, arcus aequatoris, terminatus inter punctum aequinoctiale vicinum A et circulum declinationis BC, qui arcus AC est arcus eclipticae AB ascensio recta.

Processus per angulum sectionis seu declinationem maximam est talis:

Declinatio maxima — DE — 23. 31. 30.

Ejus complementum GD 66. 28. 30. sinus 91688

Sit positus 13° =, unde ad 0° V sectionem vicinam sunt 47°, tangens 107237

Multiplicetur abjectis 5 ultimis prodit 98323, tangens arcus 44° 31' 6".

Itaque hinc vice 47° ablati a fine eclipticae vel 30° X relinquunt 13° =, sic etiam 44° 31' 6", ablati a fine aequatoris seu temp. 360, relinquunt ascensionem rectam 13° =: temp. 315. 28. 54.

Quomodo vicissim dato arcu aequatoris investigatur arcus eclipticae cum illo coascendens in sphaera recta seu coelum medians in omni sphaera non parallela? Per processum contrarium, qui sic habet:

Arcus AC aequat. sit 44° 31' 6". Tangens 983320.

Continua 5 cyphris, Sinus GD compl. declinationis maximae 91683 (divide).

Quotiens 107236 est tangens AB 47° arcus eclipticae coascendens.

Insigniores et memoratu faciles rectarum ascensionum regulae.

1. *Compara ascensiones rectas cum descensionibus.* Ascensio recta est aequalis deascensioni ejusdem puncti: quia horizontis uterque semicirculus secat aequatorem angulo recto manetque idem arcus eclipticae idemque angulus inter aequatorem et eclipticam: tribus igitur manentibus in triangulo, oportet et reliqua tria manere, quae inter est arcus aequatoris, qui illic ascensio, hic descensio recta est.

2. *Compara oppositarum aequalium partium et semicirculorum ascensiones.* Sunt etiam harum ascensiones inter sese aequales utcumque inceptae, quia angulus sectionis vernalis angulo sectionis autumnalis aequalis est, cetera ut prius. Aut igitur ab aequinoctialibus incipiunt, et patet propositio per se, aut non ab aequinoctialibus, tunc, quod superest ad vicina utrinque aequinoctia, utrinque est idem: ablati igitur aequalibus ab aequalibus, relinquuntur aequalia; aut si semicirculi sunt, ille secantur per puncta aequinoctialia,

et rursus singularum utrinque aequalium partium ascensiones sunt aequales, quare et junctarum, id est totorum semicirculorum.

8. *Compara integros eclipticae quadrantes cum suis ascensionibus.* Cum eclipticae quadrante integro a puncto cardinali conscendit quadrans aequatoris.

Horizon enim FE, traductus per puncta solstitialia D, E, transit etiam per F, polum eclipticae: secat igitur eam angulo recto non minus quam aequatorem. Cum ergo sint aequales ADE, AED, erunt et AD, AE aequales.

Si quadrans eclipticae non incipit a puncto cardinali, non est aequalis suae ascensioni, sed vel maior vel minor.

Horizon GC, non traductus per punctum solstitiale D, aberrat etiam a polo F eclipticae AD, secat igitur eam oblique in B, aequatorem in C recte, idem facit et meridianus. Partes igitur aequatoris inter horizontem et meridianum sunt quadrantes; at partes eclipticae, quarum polus simul interceptitur, sunt quadrante minores, reliquae majores.

4. *Compara minorum partium diversarum ascensiones inter se.* Partes quadrantum non sunt aequales suis ascensionibus ascenduntque oblique, quae incipiunt a punctis aequinoctialibus, habent sc. ascensiones se minores, recte vero ascendunt, quae incipiunt a solstitialibus habentque ascensiones se majores. Cum duorum ecliptico arcuum unus, ab aequinoctiali puncto inceptus, aequalis est alterius ascensioni in solstitiale terminatae vel vicissim: differentia inter arcus eorumque ascensiones eadem est aequalis. Partes discretas, quo sunt propiores aequinoctialibus, hoc ascendunt ubi liquius, quo solstitialibus, hoc rectius.

Angulus enim inter eclipticam et horizontem rectus est apud solstitia, obliquissimus (acutus sc.) apud aequinoctia, cum angulus aequatoris et horizonis sit semper rectus et major illo; major igitur huic subtenditur arcus eclipticae, quam illi arcus aequatoris.

Quo puncto discernuntur quadrantis unius a solstitiali puncto incepti et aequinoctiali puncto terminati partes recte ascendentes a partibus oblique ascendentibus? Puncto illo eclipticae, in quo differentia inter arcum eclipticae et suam ascensionem rectam est maxima seu quod quadrantem dividit in partes duas, quamlibet aequalem ascensioni partis reliquae, sic ut arcus eclipticae cum ascensione sua compositus efficiat quadrantem: id autem fit necessario circa medietates quadrantum.

Quomodo punctum hoc inquiritur geometricè? Id sic definit Regiomontanus ex Gebri Arabe, quod ejus a polo aequatoris distantiae sinus sit medio loco proportionalis inter sinus arcum, quibus extremitates quadrantis ab eodem polo distat.

Principium quadrantis distat a polo 90° , ejus sinus est 100000: finis quadrantis distat $66^\circ 28' 30''$, sinus 91688: hi in se multiplicati habent radicem 95754, cujus arcus $73^\circ 14' 36''$, tantum igitur distat a polo punctum quaerendum, ergo distat ab aequatore $16^\circ 45' 24''$. Punctum autem, quod sic distat, ex doctrina superiori invenitur recedere a sectione eclipticae $46^\circ 14' 40''$. Tantus igitur arcus ascendit oblique a sectione inceptus, residuus arcus $43^\circ 45' 20''$ ascendit recte. Quadruplicatis vero omnibus, oblique ascendunt partes $181^\circ 58' 40''$, recte $175^\circ 1' 20''$. At quidam signis assueti integra favent rectis ascensionibus, dicentes octo signa recte, quatuor oblique ascendere, propterea quod rectae ascensiones distributae inveniuntur in Tauro, Geminis, Cancro, Leone et Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario, dissimulant vero, extrema signorum Tauri, Leonis, Scorpii, Aquarii, oblique ascendere.

Restat in triangulo nostro angulus inter eclipticam et horizontem, meridianum, vel circulum declinationis, cui ascensio recta subtenditur: de illo

quae habes observationes? Angulus hic, ut jam de horizonte recto dictum, est acutus, et tanto minor, quanto propior punctis aequinoctialibus, nunquam tamen aequat complementum declinationis maximae; in ipso vero solstitiali puncto est rectus. Ultra solstitial punctum obtusus efficitur respectu antecessoris remotioris aequinoctii, acutus ut prius respectu sequentis prioris.

Si a solstitiali vicino puncto numeretur in aequatore arcus aequalis proposito arcui eclipticae ab aequinoctiali incepto, et ab ejus termino ducatur circulus declinationis, ejus arcus inter polum sphaerae et eclipticam metitur angulum, quem meridianus facit cum puncto eclipticae primo proposito.

Ut si proposito B puncto (Fig. 38), sumeretur EQ aequalis ipsi AB, ducto GQ, arcus GP erit mensura anguli ABC. Vicissim proposito P puncto, sumatur EC aequalis ipsi AP; ducto GC, arcus GB metitur angulum APQ.

Quomodo computatur hic angulus? 1. Si fuerit ad manus tabula declinationum et tabula ascensionum rectarum, quare complementum arcus eclipticae, a viciniori aequinoctio incepti, inter ascensiones rectas, tunc e regione in columna declinationum invenies complementum anguli quaesiti.

2) Sin autem calculo placet uti, processus erit iste.

Arcus eclipticae a vicino aequinoctio	30°		
complementum	60°	sinus	86603
Declinatio maxima	23. 31. 30.	tangens	43533
Multiplica abscissa 5 ultimis.			
			348264
			26120
			2612
			12
			37701

Arcus 20° 39' 25" tangens 37701
Compl. 69. 20. 35. est angulus quaesitus. 2)

Quid est ascensio recta stellae vel puncti in sphaera, quae est extra eclipticam? Est arcus aequatoris, interceptus inter principium Arietis et circulum declinationis stellae vel puncti et in consequentia numeratus. De hac vero plura infra, parte doctrinae sphaericae quinta.

Quid est cognatum ascensioni rectae stellae? Longitudo loci in Terra.

Quid est loci longitudo? Est arcus aequatoris terrestris (vel etiam paralleli per locum ducti), interceptus inter primum meridianum terrestrem et inter meridianum loci, et in consequentia numeratus. De hac infra parte quinta.

De ascensionibus obliquis punctorum et arcuum eclipticae.

Quomodo investigantur ascensiones obliquae? Opus est cognita propositi puncti declinatione, ascensione recta et differentia ascensionali, quae ex declinatione innotescit. Nam hac differentia ascensionali ad ascensionem rectam addita vel inde ablata constituitur ejus puncti ascensio obliqua.

Quid est differentia ascensionalis et quomodo investigatur? Collocato puncto proposito in horizonte ortivo, formatur rectangulum ab horizonte, aequatore et circulo declinationis puncti propositi; in quo triangulo tria dantur: latus in circulo declinationis, id est declinatio puncti, angulus sectionis aequatoris et horizontis, quem metitur altitudo aequatoris, et angulus inter aequatorem et circulum declinationis, qui rectus est; non poterit igitur effugere et quartum, sc. latus in aequatore seu differentia ascensionalis.

Processus: Sit 0° Gem. vel 0° Aquar. punctum propositum.

Sit altitudo poli 48° 30',	tangens	11802 9
Declinatio 20. 13. 22,	tangens	3683 8
	Multiplicator	33908 7
		6781 7
		904 2
		33 9
		90
		41638
Arcus 24° 36' 23" sinus 41638		


est differentia ascensionalis. 23)

Quomodo se habet haec differentia ascensionalis in una et eadem positione sphaerae, et quomodo usurpanda per diversas partes eclipticae?

1. Puncta eclipticae, a solstitialibus punctis aequaliter remota, habent eandem differentias ascensionales, ut et amplitudines ortivas: quippe easdem habent declinationes, per quas differentia ascensionalis investigatur. 2. Cum declinatio septentrionalis est, triangulum infra horizontem cadit et differentia asc. auferatur ab asc. recta; siu anstralis fuerit declinatio, triangulum supra horizontem est et differentia asc. additur ascensioni rectae proditque sic utrinque obliqua.

Hic HRI est horizon, P polus, PAR meridianus, AEQT aequator, EL pars eclipticae septentrionalis, EC pars ejus australis: puncta proposita C, L, et PQC, PLT circuli declinationum; trianguula LTH, CQH; quaerantur HT, HQ differentiae ascensionales ex declinationibus TL sept. et QC anstrali; ET, EQ sunt ascensiones rectae, EH communis utrinque ascensio obliqua, quae formatur illic ablata TH, hic addita QH.

Asc. recta 0° II.	57. 48. 7.
Aufer	24. 36. 23.
Asc. obl. 0° II.	33. 11. 44.
Asc. recta 0° x	237. 48. 7.
Adde	24. 36. 23.
Asc. obl. 0° x	262. 24. 30.



Quae hinc oritur generalis comparatio ascensionum obliquarum per diversa eclipticae puncta? Bini arcus eclipticae aequales ab eodem aequinoctiali puncto incepti, vel saltem aequaliter ab illo remoti, alter in antecedentia, reliquis in consequentia, habent ascensiones obliquas aequales. 2. Partium aequaliter a puncto solstitiali remotarum, alterius prorsum, alterius retrorsum, ascensiones obliquae sunt inter se inaequales. 3. Idem teus etiam de partibus aequalibus oppositis, quippe hoc ex illo sequitur.

Compara generaliter obliquas ascensiones cum rectis. Portiones aequales semicirculo minores ab aequinoctiis inceptae, quae a verno, celeriores sunt inter oriendum in nostro hemisphaerio, quam in sphaera recta et oriuntur obliquius, quam in ea; quae vero incipiunt ab autumnali, tardiores sunt, quam in recta sphaera, eoque rectius oriri dicuntur, quam in sphaera recta, licet abusive: raro enim in obliqua nec nisi circa tropicos erectior potest oriri ecliptica, quam in recta. Arcus vero discreti, hoc est non ab aequinoctiis incepti, quo propiores sunt aequinoctiali verno ante vel post, hoc ascendent obliquius, quo propiores autumnali, hoc rectina.

Quomodo investigatur obliqua descensio? Cum differentia ascensionalis

subtracta facit ascensionem obliquam, eadem addita facit descensionem obliquam, et vicissim quae additur, ut fiat ascensio obliqua, subtrahi debet, ut sit descensio obliqua.

Quae hinc oritur analogia inter ascensiones et descensiones obliquas?

1. Quanta est ascensio areus ab Arietis principio incepti, tanta est descensio areus aequalis a principio Librae incepti et vicissim. Idem verum est etiam de discretis arcibus aequalibus oppositis. Nullae itaque sunt tabulae descensionum, sufficiunt ascensionum. 2. Partes eadem ascendentes recte descendunt oblique et vicissim.


Quot sunt genera positionum sphaerae respectu aequatoris et eclipticae junctorum, per quas variantur ascensiones obliquae? Senae sunt in utrovis hemisphaerio positiones, quibus accedit septima sphaerae rectae. Nam vertex loci vel sub aequatorem cadit, vel inter aequatorem et tropicum, vel sub ipsum tropicum, vel inter tropicum et polarem, vel sub ipsum polarem, vel inter polarem et polum, vel sub ipsum polum. In prima quidem harum positionum ascensiones sunt tantum rectae, de quibus jam est transactum, in ultima sunt ascensiones plane nullae. Supersunt igitur pro ascensionibus obliquis quinque in utroque hemisphaerio positiones intermediae.

Compara ascensiones et descensiones utriusque hemisphaerii inter sese.

1. Quanta est in aliqua certa poli septentrionalis elevatione signi, gradus vel puncti ejusque eclipticae ascensio obliqua, tanta est in aequali elevatione poli australis ejusdem signi, gradus vel puncti descensio obliqua, et quanta illi descensio, tanta hic ascensio. 2. Quicquid demonstratur de signo, gradu vel puncto certo eclipticae in hemisphaerio septentrionali, verum id erit etiam de signo, gradu vel puncto opposito in australi hemisphaerio alterutrius poli elevatione utrinque eadem.

Quomodo se habet differentia ascensionalis ad ascensionem rectam per varios sphaerae positus? In sphaera recta sicut ascensio obliqua nulla, sic areus eclipticae ab aequinoctio propiori retro vel porro extensi differentia ascensionalis quantitatem obtinet nullam, in obliquis cum digressionem ab aequatore acquirit aliquam quantitatem, et quamdiu quidem est inter aequatorem et polarem, minor est ascensio recta, sub poli aequalis ei, intra polarem major illa per omnes proportionales successivae, quo propius ad polum venitur.

Fig. 41.



Nam sub poli junguntur ecliptica et horizon, quoties polus eclipticae in verticem venit: quare semicirculus integer ascensionem habet vel nullam. absumpta enim est in differentiam ascensionalem subtractoriam, reliquus vero semicirculus eclipticae addit semicirculo aequatoris coorienti in recta sphaera semicirculum reliquum. Cumque sub poli angulus EQO inter aequatorem et horizontem sit aequalis angulo inter eclipticam et aequatorem QEO, versus rectam major, versus parallelam minor, amplitudo igitur ortiva QO sub poli aequatur arcui eclipticae EO proposito, a vicino aequinoctio incepto, extra minor est, intra major; ducto igitur circulo declinationis PTO in punctum eclipticae oriens O, qui ascensionem rectam ET a differentia ascensionali TQ separat,

partes etiam hae factae sequenter proportionem sui quaelibet lateris reliqui, illa quidem ET eclipticae arcus EO, haec vero TQ amplitudinis ortivae QO.

Quae ratio est ortus et occasus signorum per illos sphaerae positus?
Ab aequatore usque ad polarem oriuntur omnia signa, et ordine quidem recto, secaturque horizon eclipticam intra tropicum quidem bis angulis rectis, quoties sc. polus ejus in horizontem venit; sub tropico id fit semel, extra tropicum usque ad polarem aectio est magis magisque obliqua, sub polari arctico ecliptica jungitur horizonti semel, et subito totus semicirculus, ascendens dictus, seu in cujus medio verum est aequinoctium, simul in momento oritur; reliquis, per quem Sol descendere censetur, a Cancro per Libram in Capricornum eodem momento descendit; simulque in ipsa sectione horisontis et meridiani septentrionali (lt) recto ordine oriri incipiet, donec circumvoluto integro aequatore finis ejus, hoc est 30° Sagitt. in ipso meridiei puncto (II) quasi ascensus in horizontem veniat. Ita ascensio hujus medietatis eclipticae totum aequatorem coascendentem habet.

Intra vero polarem, cum circa punctum solstitiale inferius arcus aliquis nunquam oriatur, sed semper sub Terra sit, circa solstitiale superius arcus altius semper supra, nunquam occidens, semper tanto major, quanto vicinior vertici polus, donec sub ipso polo arcus uterque fiat semicirculus; arcus intermediarii quidem et occidunt, sed alter, in quo vernale aequinoctium (in nostro hemisphaerio), ordine praepostero, reliquis, in quo autumnale, ordine recto; habentque totum aequatorem coascendentem, ille tamen majorem ejus partem, qui inverso ordine oritur. Sequitur eandem varietatem ipsa etiam amplitudo ortiva. Nam inter aequatorem et polarem haec amplitudo ortiva dilatat sese paulatim ab ortu aequinoctiali Q versus septentrionem R et meridiem H, et partes a Cancro per Libram in Capricornum ordinatas habent regiones ortuum a septentrionalibus horisontis partibus R versus meridiem H, inde a Capricornio per Arietem in Cancrum ordine retrogrado a meridie H versus septentrionem R, initio modicis spatia, donec sub ipso polari et versus interiora haec ortuum amplitudo totum horisontis semicirculum pervagetur, ab ipsissimo puncto horisontis septentrionali R per ortivum Q usque in ipsissimum meridionale H. Intra vero polarem nulla talis fit ab oppositis arcibus transpositio retrograda ortuum a meridie in septentrionem, sed utriusque semicirculi arcus orientis, tam is qui recto ordine oritur, quam qui praepostero, priores ortus in septentrione R, posteriores versus plagam orientis Q, postremos in meridiano horisontis puncto H faciunt.

Loquor autem de partibus eclipticae, sine respectu motus Solis per illas. Nam si series ortuum, quos Sol facit, consideretur, id aliud erit.

Unde innotescit arcus eclipticae perpetuo apparens aut latens? Ex altitudine aequatoris, quae cum sit minor declinatione maxima eclipticae, quaerendum igitur est per tradita praecepta, quodnam eclipticae punctum, quanto se. arcu ab aequinoctiali puncto remotum, habeat declinationem aequalem altitudini aequatoris. Nam complementum illius arcus est semissis arcus non occidentis, si septentrionalis declinatio (per nos in septentrionali hemisphaerio), aut non orientis, si meridiana.


Sit altitudo poli 80° , aequatoris igitur 10° . Tantam vero declinationem invenitur habere $25^{\circ} 47' 16''$ Ar. Ejus igitur complementum ad quadrantem 64. 12. 44. duplicatum, facit 128. 25. 28. Tantus arcus non occidit.

Compara in specie integras eclipticae medietates ad suas obliquas ascensiones per hos sphaerae positus. Solae illae medietates, quae sunt inter puncta

aequinoctialia, suis aequantur ascensionibus, extra quidem polarem, ubi medietates hae possunt ascendere, nullae praeterea undecunque leceptae, in quacunque positione sphaerae obliquae.

Compara etiam segmenta harum medietatum principalium cum suis obliquis ascensionibus. Nullus arcus eclipticae minor semicirculo, neque extra

Fig. 42.



tropicum, et aequatorem quadrantes, id est bina unuscujusque circuli aequalia; versus aequatorem sunt inaequalia magis magisque.

Quid varietatis oritur per diversas sphaeras, in comparatione ascensionum obliqvarum cum rectis? 1. Inter aequatorem et polarem summa ascensionum rectarum, quas habent oppositi duo arcus aequales, est distributa inter eorundem ascensiones obliqvas. Sub polari unus oppositorum habet nihil, alter totum, hoc est summam et suae et sui oppositi arcus ascensionum rectarum, duplam sc. ascensionem obliquam rectae. Intra polarem arcus orientes ordine recto non tantum duplum habent suae ascensionis rectae, sed insuper addunt ascensionem obliquam arcus oppositi praepostere orientis. Extra polarem igitur a summa ascensionum utriusque rectarum ablata unius ascensio recta, sub polari ablata nihil, additum nihil. Intra polarem addita ascensio obliqua praepostere orientis constituit obliquam ascensionem arcus aequalis oppositi.

2. Intra tropicos, quando ecliptica per verticem transit, partis unius de quadrante ascensio recta, alterius obliqua compositae, quadrantem et ipsa efficiunt. Ut si in schemate proximo non V sed A esset vertex, et AQ jam ecliptica, VO aequator. Tunc enim inter HAR meridianum et HQR horizontem interceptus est quadrans eclipticae AQ, non minus quam aequatoris VO, etsi cardinalia puncta non inciderint in hos circulos. Ipsius igitur EQ asc. obliqua EO, et complementi EA ascensio recta EV composita faciunt quadrantem VO.

Unde innotescit nobis angulus, quo secatur ecliptica horizontem? ²⁴⁾ Concipiendum est triangulum VNM (Fig. 40) inter V verticem, N nonagesimum gradum eclipticae ab ejus oriente gradu, et inter punctum ejusdem M, quod coelum mediat. In hoc triangulo primo investigatur latus in ecliptica NM, inter nonagesimum et meridianum. Dato enim eclipticae puncto oriente, datur ejus ascensio obliqua, a qua numeratus quadrans retro, prodit ascensionem rectam medii coell. Data hac, datur etiam punctum eclipticae M, quod coelum me-

diat cum illa. Eodem modo quadrans a puncto oriente retro extensus in ecliptica signat nonagesimum eclipticae N. Comparatis igitur invicem eclipticae nonagesimo N et puncto M coelum mediante, innotescit arcus interceptus NM.

Secundo in hoc triangulo investigatur latus in meridiano VM inter verticem V et eclipticam M. Dato enim eclipticae puncto M, coelum mediante, datur ejus declinatio AM, quae, si septentrionalis fuerit, ablata, si meridionalis, addita ad altitudinem poli VA, constituit distantiam illius eclipticae puncti a vertice VM, angulus vero apud nonagesimum eclipticae VNM est reectus: tribus igitur datis, et quartum haberi poterit, latus sc. in verticali seu distantia nonagesimi a vertice NV; complementum est altitudo nonagesimi super horizontem, mensura anguli quacsiti.

Typus hujus processus.

Oriatur	7° 5' Virg.
In altitudine poli	48. 24.
Ergo ascensio obliqua	148. 31.
Anfer	90
Ascensio recta medii coeli	58. 31.
Cum eo coelum mediat	0. 41. Gemin.
cujus declinatio	20. 22. sept.
ablata ab altitudine poli relinquit	28. 2.
Hoc igitur est latus MV, ejus compl.	61. 58. altitudo M.
Sic a	7° 5' Virg.
anfer	90
erit nonagesimus ab ortu	7. 5. Gemin.
Hinc anfer coelum medians	0. 41. Gemin.
erit latus MN	6. 24. ejusque
complementum	83. 36.

Hinc computatur latus VN sic: altitudo puncti coelum mediantis 61° 58', sinus 88267; complementi lateris MN 83° 36' sinus 99377. Divide, quotiens 88267 est sinus 62° 39'. Tautos est angulus inter horizontem et eclipticam in 7° 5' Virginis, ejusque complementum 27° 21' distantia nonagesimi a vertice.

Quae observanda varietas circa hunc angulum? Angulus iste nunquam sit major altitudine puncti solstitialis aestivi, nunquam minor altitudine puncti solstitialis hiberni. Illam magnitudinem habet oriente puncto aequinoctiali autumnali (in hemisphaerio nostro), hanc oriente puncto vernali. Nonagesimus est in orientali quadrante, cum ascendunt signa septentrionalia, in occidentali, cum meridionalia.

Etiamne verticalis cum ecliptica sectione constitutus angulus solet inquiri? Sane necessarius est ejus usus, in doctrina praecipue eclipsium Solis.

Quomodo inquiritur? Vel ex altitudine Solis, in ecliptica semper versantis, vel ex distantia puncti sectionis a nonagesimo, adjuncta utrinque distantia nonagesimi a vertice. Nam si punctum sectionis oriatur, ipsa haec NV metitur angulum, ex eo, quo vicinior nonagesimo fuerit sectio, hoc major angulus. Itaque tangente NV 5 cyphris prolongato, diviso per sinum NS, distantiae sectionis a nonagesimo, prodit tangens hujus anguli. Aut si altitudo habeatur, per ejus sinum diviso sinu NV, prodit sinus anguli NSV.

Tabula Ascensionum Rectarum, Declinationis et anguli inter
Eclipticam et Meridianum.²⁵⁾

°	V	Asc. Rectae.		In- crem. in 10'	Declinatio. in 10'	In- crem. in 10'	Ang. eclipticæ et meridiani.	In- crem. in 10'	Temp.	Temp.	Se. com.	In- crem. in 10'		
		Temp.	Se. com.											
													0	180
0'	0	180	0' 0"		0' 0'		0' 20' 30"		180"	360	0' 0"	30"		
1	0	180	55, 1	550	0, 23, 56	219	28, 42	2	179	359	4, 39	580	29	29
2	1	181	56, 2	550	0, 47, 53	219	29, 16	6	178	358	9, 58	580	29	29
3	2	182	45, 4	551	1, 11, 46	219	30, 14	10	177	357	14, 56	580	27	27
4	3	183	40, 7	551	1, 35, 43	219	31, 34	17	176	356	19, 53	581	26	26
5	4	184	35, 11	551	1, 58, 47	219	33, 18	21	175	355	24, 49	581	25	25
6	5	185	30, 17	551	2, 23, 28	219	35, 24	25	174	354	29, 43	581	24	24
7	6	186	25, 23	552	2, 47, 16	219	37, 34	29	173	353	34, 35	582	23	23
8	7	187	20, 29	552	3, 11, 4	219	40, 46	33	172	352	39, 25	582	22	22
9	8	188	15, 47	553	3, 34, 47	217	44, 0	37	171	351	44, 13	582	21	21
10	9	189	11, 2	553	3, 58, 28	217	47, 40	41	170	350	48, 58	583	20	20
11	10	190	6, 20	553	4, 22, 4	216	51, 47	44	169	349	53, 40	583	19	19
12	11	191	1, 41	554	4, 45, 37	215	55, 6	48	168	348	58, 19	583	18	18
13	11	191	37, 6	555	5, 6, 3	214	58, 5	51	167	347	63, 1	584	17	17
14	12	192	32, 35	556	5, 32, 29	213	61, 5	55	166	346	67, 25	584	16	16
15	13	193	28, 6	556	5, 55, 47	213	64, 11	59	165	345	71, 31	585	15	15
16	14	194	23, 46	557	6, 18, 59	211	67, 17	63	164	344	75, 36	585	14	14
17	15	195	19, 32	557	6, 42, 6	210	70, 23	67	163	343	79, 41	586	13	13
18	16	196	15, 21	558	7, 5, 6	209	73, 30	71	162	342	83, 46	586	12	12
19	17	197	11, 16	560	7, 28, 0	208	76, 37	75	161	341	87, 51	587	11	11
20	18	198	7, 7	561	8, 50, 46	207	79, 45	78	160	340	91, 56	587	10	10
21	18	199	23, 24	562	9, 13, 26	205	82, 52	82	159	339	95, 59	588	9	9
22	20	200	18, 37	563	9, 36, 20	204	86, 6	86	158	338	100, 2	588	8	8
23	21	201	15, 37	563	9, 59, 20	204	89, 13	90	157	337	104, 5	589	7	7
24	22	202	12, 24	564	10, 22, 34	203	92, 20	94	156	336	108, 8	589	6	6
25	23	203	8, 38	567	10, 45, 41	202	95, 27	97	155	335	112, 11	590	5	5
26	24	204	5, 39	567	11, 8, 39	201	98, 34	101	154	334	116, 14	590	4	4
27	25	205	2, 26	569	11, 31, 24	200	101, 41	105	153	333	120, 17	591	3	3
28	26	206	56, 25	571	11, 54, 2	200	104, 48	109	152	332	124, 20	591	2	2
29	27	207	53, 43	574	12, 7, 27	200	107, 55	113	151	331	128, 23	592	1	1
30	27	207		574	12, 30, 43	211		116						
II														
1	28	208	51, 3	575	12, 33, 49	209	32, 13	120	151	331	8, 55	575	28	28
2	29	209	48, 36	575	12, 12, 40	207	44, 13	124	150	330	11, 24	577	27	27
3	30	210	46, 16	576	12, 33, 21	205	56, 85	127	149	329	13, 44	577	27	27
4	31	211	44, 6	580	12, 33, 46	203	70, 9, 16	131	148	328	15, 55	580	26	26
5	32	212	42, 0	584	13, 14, 5	201	82, 25	135	147	327	17, 37	581	25	25
6	33	213	40, 11	588	13, 34, 7	199	95, 34	138	146	326	19, 48	583	24	24
7	34	214	38, 29	590	13, 53, 57	198	108, 44	142	145	325	21, 31	583	23	23
8	35	215	36, 37	596	14, 13, 32	196	121, 57	146	144	324	23, 5	586	22	22
9	36	216	35, 35	596	14, 32, 33	194	134, 30	150	143	323	26, 25	586	21	21
10	37	217	34, 23	590	14, 51, 50	191	147, 44	154	142	322	28, 37	588	20	20
11	38	218	33, 22	592	15, 10, 50	189	160, 57	158	141	321	30, 58	590	19	19
12	39	219	32, 38	595	15, 29, 28	187	173, 72	162	140	320	32, 28	592	18	18
13	40	220	31, 52	595	15, 47, 47	184	186, 23	166	139	319	34, 8	595	17	17
14	41	221	31, 22	597	16, 6, 31	181	200, 36	170	138	318	36, 37	597	16	16
15	42	222	30, 5	599	16, 25, 36	178	213, 58	174	137	317	38, 5	599	15	15
16	43	223	30, 35	600	16, 44, 6	175	227, 10	178	136	316	40, 24	600	14	14
17	44	224	30, 36	604	17, 3, 22	172	240, 28	182	135	315	42, 5	602	13	13
18	45	225	31, 11	607	17, 13, 14	169	254, 36	186	134	314	44, 49	604	12	12
19	46	226	31, 36	606	17, 31, 54	167	268, 45	190	133	313	46, 49	604	11	11
20	47	227	32, 72	606	17, 49, 14	160	282, 53	194	132	312	48, 48	606	10	10
21	48	228	32, 59	610	18, 4, 14	157	296, 61	197	131	311	50, 47	608	9	9
22	49	229	33, 57	611	18, 16, 37	153	310, 69	200	130	310	52, 46	611	8	8
23	50	230	35, 6	611	18, 35, 18	150	324, 77	204	129	309	54, 45	611	7	7
24	51	231	36, 25	613	18, 53, 21	147	338, 85	208	128	308	56, 44	613	6	6
25	52	232	37, 23	613	19, 11, 26	144	352, 93	212	127	307	58, 43	613	5	5
26	53	233	38, 36	617	19, 29, 26	140	366, 101	216	126	306	60, 42	617	4	4
27	54	234	41, 28	621	19, 47, 27	136	380, 109	220	125	305	62, 41	619	3	3
28	55	235	43, 31	622	20, 6, 27	133	394, 117	224	124	304	64, 40	621	2	2
29	56	236	45, 44	624	20, 24, 28	129	408, 125	228	123	303	66, 39	622	1	1
30	57	237	48, 7	624	20, 43, 28				122		68, 38	624	0	0
III														
1	28	208	51, 3	575	12, 33, 49	209	32, 13	120	151	331	8, 55	575	28	28
2	29	209	48, 36	575	12, 12, 40	207	44, 13	124	150	330	11, 24	577	27	27
3	30	210	46, 16	576	12, 33, 21	205	56, 85	127	149	329	13, 44	577	27	27
4	31	211	44, 6	580	12, 33, 46	203	70, 9, 16	131	148	328	15, 55	580	26	26
5	32	212	42, 0	584	13, 14, 5	201	82, 25	135	147	327	17, 37	581	25	25
6	33	213	40, 11	588	13, 34, 7	199	95, 34	138	146	326	19, 48	583	24	24
7	34	214	38, 29	590	13, 53, 57	198	108, 44	142	145	325	21, 31	583	23	23
8	35	215	36, 37	596	14, 13, 32	196	121, 57	146	144	324	23, 5	586	22	22
9	36	216	35, 35	596	14, 32, 33	194	134, 30	150	143	323	26, 25	586	21	21
10	37	217	34, 23	590	14, 51, 50	191	147, 44	154	142	322	28, 37	588	20	20
11	38	218	33, 22	592	15, 10, 50	189	160, 57	158	141	321	30, 58	590	19	19
12	39	219	32, 38	595	15, 29, 28	187	173, 72	162	140	320	32, 28	592	18	18
13	40	220	31, 52	595	15, 47, 47	184	186, 23	166	139	319	34, 8	595	17	17
14	41	221	31, 22	597	16, 6, 31	181	200, 36	170	138	318	36, 37	597	16	16
15	42	222	30, 5	599	16, 25, 36	178	213, 58	174	137	317	38, 5	599	15	15
16	43	223	30, 35	600	16, 44, 6	175	227, 10	178	136	316	40, 24	600	14	14
17	44	224	30, 36	604	17, 3, 22	172	240, 28	182	135	315	42, 5	602	13	13
18	45	225	31, 11	607	17, 13, 14	169	254, 36	186	134	314	44, 49	604	12	12
19	46	226	31, 36	606	17, 31, 54	167	268, 45	190	133	313	46, 49	604	11	11
20	47	227	32, 72	606	17, 49, 14	160	282, 53	194	132	312	48, 48	606	10	10
21	48	228	32, 59	610	18, 4, 14	157	296, 61	197	131	311	50, 47	608	9	9
22	49	229	33, 57	611	18, 16, 37	153	310, 69	200	130	310	52, 46	611	8	8
23	50	230	35, 6	611	18, 35, 18	150	324, 77	204	129	309	54, 45	611	7	7
24	51	231	36, 25	613	18, 53, 21	147	338, 85	208	128	308	56, 44	613	6	6
25	52	232	37, 23	613	19, 11, 26	144	352, 93	212	127	307	58, 43	613	5	5
26	53	233	38, 36	617	19, 29, 26	140	366, 101	216	126	306	60, 42	617	4	4
27														

Asc. Rectas.				In- erum. in 10'	Declinatio. in 10'	In- erum. in 10'	Ang. eclipticon et meridian. in 10'	In- erum. in 10'	Temp. in 10'	Temp. in 10'	St. con. in 10'	In- erum. in 10'
II	Temp.	St. con.	II									
0°	57	237	45' 7"		20° 45' 21"		77° 45' 15"		122	302	11. 53	30°
1	38	278	50. 40	678	25. 37	125	78. 4. 47	617	121	301	8. 20	626
2	39	279	51. 20	677	25. 38	122	78. 26. 37	616	120	300	8. 37	612
3	40	280	52. 19	676	26. 40. 56	118	78. 49. 15	615	119	299	9. 14	609
4	41	281	53. 19	675	21. 1. 23	115	79. 11. 45	614	118	298	0. 41	631
5	43	283	54. 22	674	12. 20	111	80. 34. 32	613	116	296	37. 24	632
6	44	284	55. 25	673	23. 7	107	80. 57. 32	612	115	295	51. 5	633
7	45	285	56. 27	672	33. 22	103	80. 20. 49	611	114	294	30. 33	637
8	46	286	57. 8	671	43. 15	99	80. 44. 17	610	113	293	46. 32	637
9	47	287	58. 16	670	21. 23	95	81. 7. 35	609	112	292	43. 2	638
10	48	288	59. 24	669	22. 15	90	81. 31. 53	608	111	291	39. 4	640
11	49	289	60. 29	668	22. 10. 22	86	81. 56. 0	607	110	290	35. 1	641
12	50	290	61. 32	667	18. 35	82	82. 20. 18	606	109	289	30. 48	642
13	51	291	62. 32	666	26. 22	78	82. 44. 47	605	108	288	26. 29	643
14	52	292	63. 31	665	33. 44	74	83. 9. 26	604	107	287	22. 1	646
15	53	293	64. 33	664	40. 39	69	83. 34. 37	603	106	286	17. 37	647
16	54	294	65. 34	663	47. 10	65	83. 59. 17	602	105	285	12. 47	648
17	55	295	66. 35	662	53. 13	61	84. 21. 25	601	104	284	8. 3	649
18	56	296	67. 34	661	58. 51	57	84. 49. 42	600	103	283	3. 9	650
19	57	297	68. 31	660	28. 4	53	85. 15. 4	599	102	282	39. 19	650
20	58	298	69. 27	659	8. 47	49	85. 40. 38	598	100	280	35. 12	651
21	59	299	70. 22	658	13. 5	45	86. 9. 15	597	99	279	44. 6	651
22	60	300	71. 17	657	16. 56	41	86. 34. 34	596	98	278	42. 56	652
23	61	301	72. 18	656	20. 20	37	86. 57. 49	595	97	277	37. 42	653
24	62	302	73. 15	655	21. 18	33	87. 23. 41	594	96	276	32. 25	654
25	63	303	74. 10	654	22. 48	29	87. 49. 38	593	95	275	27. 3	655
26	64	304	75. 15	653	27. 54	25	88. 15. 39	592	94	274	21. 42	656
27	65	305	76. 18	652	29. 27	21	88. 41. 42	591	93	273	16. 18	657
28	66	306	77. 19	651	30. 35	17	89. 7. 48	590	92	272	10. 53	658
29	67	307	78. 18	650	31. 17	13	89. 33. 54	589	91	271	5. 27	659
30	68	308	79. 15	649	28. 31. 30	9	90. 0. 0	588	90	270	0. 0	660

Ascensiones rectas.

Synopsis Differentiarum Ascensionum praeicipuarum.

Alt. Poli.	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84
1	9. 26	4. 42	3. 4	2. 15	1. 41	1. 23	1. 10	0. 31	0. 41	0. 35	0. 37	0. 30	0. 13	0. 4
2	15. 22	5. 19	4. 8	4. 29	3. 27	2. 45	2. 19	1. 48	1. 47	1. 9	0. 33	0. 29	0. 19	0. 13
3	24. 26	12. 30	9. 9	8. 42	7. 11	5. 31	4. 20	3. 43	3. 41	2. 44	1. 30	0. 59	0. 25	0. 19
4	36. 40	22. 05	17. 8	16. 11	14. 22	12. 31	10. 36	9. 36	9. 34	8. 14	6. 47	5. 15	3. 41	2. 15
5	51. 34	31. 17	24. 10	22. 13	20. 16	18. 16	16. 17	14. 23	14. 20	12. 37	10. 53	9. 17	7. 41	6. 15
6	69. 18	42. 01	33. 01	30. 42	28. 13	25. 31	22. 46	20. 01	19. 58	17. 17	14. 33	12. 49	10. 53	9. 17
7	90. 56	56. 33	45. 13	42. 16	39. 13	35. 51	32. 18	28. 41	28. 38	24. 50	21. 06	17. 22	13. 37	10. 53
8	115. 48	81. 25	67. 42	63. 42	59. 13	54. 31	49. 58	45. 17	45. 14	40. 20	35. 36	30. 52	26. 07	21. 22
9	145. 36	109. 15	93. 21	88. 13	82. 13	76. 13	70. 13	64. 13	64. 10	58. 13	52. 29	46. 45	40. 52	34. 59
10	180. 00	144. 00	126. 00	117. 00	107. 00	96. 00	84. 00	72. 00	72. 00	60. 00	48. 00	36. 00	24. 00	12. 00
11	219. 18	183. 33	163. 42	152. 42	140. 13	126. 51	112. 18	97. 41	97. 38	84. 50	72. 06	59. 22	46. 37	33. 52
12	263. 04	227. 19	206. 42	194. 42	181. 13	166. 51	151. 18	134. 41	134. 38	121. 50	109. 06	96. 22	82. 37	68. 52
13	310. 56	275. 15	253. 42	240. 42	226. 13	210. 51	194. 18	176. 41	176. 38	163. 50	151. 06	138. 22	124. 37	110. 52
14	362. 04	326. 19	303. 42	289. 42	274. 13	257. 51	240. 18	220. 41	220. 38	207. 50	195. 06	182. 22	168. 37	154. 52
15	418. 18	382. 33	358. 42	343. 42	327. 13	309. 51	291. 18	270. 41	270. 38	257. 50	245. 06	232. 22	218. 37	204. 52
16	478. 36	442. 51	417. 60	401. 60	384. 13	365. 51	346. 18	324. 41	324. 38	311. 50	299. 06	286. 22	272. 37	258. 52
17	542. 56	506. 71	480. 42	463. 42	445. 13	425. 51	405. 18	382. 41	382. 38	369. 50	357. 06	344. 22	330. 37	316. 52
18	611. 04	574. 83	547. 54	529. 54	510. 13	489. 51	468. 18	444. 41	444. 38	431. 50	419. 06	406. 22	392. 37	378. 52
19	684. 18	647. 95	620. 66	601. 66	581. 13	559. 51	537. 18	512. 41	512. 38	499. 50	487. 06	474. 22	460. 37	446. 52
20	761. 36	724. 13	696. 84	676. 84	655. 13	633. 51	610. 18	584. 41	584. 38	571. 50	559. 06	546. 22	532. 37	518. 52
21	842. 56	805. 33	777. 04	756. 04	733. 13	709. 51	685. 18	658. 41	658. 38	645. 50	633. 06	620. 22	606. 37	592. 52
22	928. 18	890. 51	861. 22	839. 22	815. 13	790. 51	765. 18	737. 41	737. 38	724. 50	712. 06	699. 22	685. 37	671. 52
23	1018. 36	980. 69	950. 40	927. 40	902. 13	876. 51	850. 18	821. 41	821. 38	808. 50	796. 06	783. 22	769. 37	755. 52
24	1113. 56	1083. 87	1052. 60	1028. 60	1002. 13	975. 51	948. 18	918. 41	918. 38	905. 50	893. 06	880. 22	866. 37	852. 52
25	1214. 18	1185. 05	1153. 76	1128. 76	1101. 13	1073. 51	1045. 18	1014. 41	1014. 38	1001. 50	989. 06	976. 22	962. 37	948. 52
26	1319. 36	1290. 23	1257. 94	1231. 94	1203. 13	1174. 51	1145. 18	1113. 41	1113. 38	1100. 50	1088. 06	1075. 22	1061. 37	1047. 52
27	1429. 56	1400. 41	1367. 12	1339. 12	1309. 13	1278. 51	1247. 18	1213. 41	1213. 38	1199. 50	1187. 06	1174. 22	1160. 37	1146. 52
28	1545. 18	1515. 59	1481. 30	1451. 30	1419. 13	1386. 51	1353. 18	1317. 41	1317. 38	1303. 50	1291. 06	1278. 22	1264. 37	1250. 52
29	1665. 36	1636. 17	1600. 88	1569. 88	1536. 13	1502. 51	1468. 18	1431. 41	1431. 38	1417. 50	1405. 06	1392. 22	1378. 37	1364. 52
30	1790. 56	1761. 37	1725. 08	1692. 08	1656. 13	1619. 51	1582. 18	1542. 41	1542. 38	1528. 50	1516. 06	1503. 22	1489. 37	1475. 52

In arcu declinationum.

Primum, quod majorem ista declinationem habet, sub altitudine poli subscripta, non attingit horizontem necnon descensum.

Tabula Asc. Obliquarum, Occid. ☉, Anguli orientis.

V	Asc. Obl.	Occid. ☉	Angulus orient.	Asc. obl., temp. semidurum, vel minuunt, Ang. inter eclipt. et horiz. ad alt. pol. 46° 15'				□	Asc. Obl.	Occid. ☉	Angulus orient.	Asc. obl., temp. semidurum, vel minuunt, Ang. inter eclipt. et horiz. ad alt. pol. 46° 15'			
				0° 15'	30° 0'	45° 0'	30°					0° 15'	30° 0'	45° 0'	30°
1	0. 26	6. 2	15. 13	359. 32	29			1	34. 10	7. 39	23. 18	325. 54	29		
2	0. 56	6. 1	15. 13	359. 4	28			2	34. 55	7. 40	23. 54	325. 5	28		
3	1. 21	6. 2	15. 14	358. 36	27			3	35. 41	7. 41	25. 30	321. 19	27		
4	1. 59	6. 7	15. 14	358. 7	26			4	36. 28	7. 42	26. 7	323. 52	26		
5	2. 21	6. 9	15. 15	357. 39	25			5	37. 19	7. 43	26. 24	322. 44	25		
6	2. 49	6. 11	15. 19	357. 11	24			6	38. 4	7. 44	26. 41	321. 56	24		
7	3. 17	6. 13	15. 47	356. 43	23			7	38. 29	7. 45	26. 59	321. 8	23		
8	3. 46	6. 14	15. 19	356. 14	22			8	39. 41	7. 46	27. 17	320. 19	22		
9	4. 15	6. 15	15. 21	355. 45	21			9	40. 54	7. 47	27. 34	318. 28	21		
10	4. 41	6. 18	15. 21	355. 17	20			10	41. 20	7. 48	27. 55	318. 37	20		
11	5. 12	6. 20	15. 26	354. 46	19			11	42. 14	7. 49	28. 13	317. 46	19		
12	5. 40	6. 21	15. 28	354. 20	18			12	43. 4	7. 50	28. 33	316. 54	18		
13	6. 9	6. 21	15. 31	353. 51	17			13	43. 59	7. 50	28. 55	316. 8	17		
14	6. 38	6. 23	15. 34	353. 22	19			14	44. 52	7. 51	29. 16	315. 8	16		
15	7. 7	6. 27	15. 36	352. 58	15			15	45. 47	7. 52	29. 37	314. 13	15		
16	7. 38	6. 29	15. 39	352. 21	14			16	46. 41	7. 52	29. 58	313. 16	14		
17	8. 5	6. 30	15. 42	351. 55	13			17	47. 37	7. 53	30. 20	312. 23	13		
18	8. 31	6. 32	15. 45	351. 28	12			18	48. 31	7. 54	30. 42	311. 28	12		
19	9. 4	6. 34	15. 48	350. 56	11			19	49. 31	7. 54	31. 4	310. 29	11		
20	9. 31	6. 36	15. 52	350. 26	10			20	50. 29	7. 55	31. 26	309. 31	10		
21	10. 4	6. 37	15. 56	349. 56	9			21	51. 27	7. 55	31. 49	308. 33	9		
22	10. 34	6. 39	15. 0	349. 28	8			22	52. 27	7. 55	32. 13	307. 33	8		
23	11. 4	6. 41	15. 4	348. 56	7			23	53. 26	7. 56	32. 36	306. 34	7		
24	11. 34	6. 43	15. 9	348. 26	6			24	54. 26	7. 56	33. 0	305. 34	6		
25	12. 5	6. 44	15. 14	347. 55	5			25	55. 26	7. 56	33. 23	304. 33	5		
26	12. 36	6. 46	15. 20	347. 24	4			26	56. 26	7. 56	33. 46	303. 32	4		
27	13. 7	6. 48	15. 26	346. 53	3			27	57. 25	7. 57	34. 10	302. 33	3		
28	13. 39	6. 49	15. 32	346. 21	3			28	58. 24	7. 57	34. 34	301. 33	3		
29	14. 10	6. 51	15. 38	345. 50	1			29	59. 23	7. 57	35. 3	300. 17	1		
30	14. 42	6. 53	15. 45	345. 18	0			30	60. 22	7. 57	35. 31	299. 15	0		
X															
1	13. 14	9. 54	19. 32	341. 46	29			1	61. 33	7. 57	35. 97	298. 7	29		
2	13. 47	9. 56	19. 39	341. 13	28			2	63. 0	7. 57	36. 91	297. 0	28		
3	14. 16	9. 58	20. 7	340. 41	27			3	64. 7	7. 57	36. 31	295. 58	27		
4	14. 52	6. 59	20. 14	341. 8	26			4	65. 15	7. 56	37. 18	294. 46	26		
5	17. 85	7. 1	20. 21	342. 85	25			5	66. 23	7. 56	37. 48	293. 37	25		
6	17. 58	7. 3	20. 29	342. 9	24			6	67. 32	7. 56	38. 13	292. 28	24		
7	18. 32	7. 4	20. 36	341. 36	23			7	68. 42	7. 56	38. 40	291. 18	23		
8	13. 6	7. 6	20. 44	340. 54	22			8	69. 53	7. 55	39. 6	290. 7	22		
9	16. 40	7. 8	20. 59	340. 20	21			9	71. 3	7. 55	39. 36	289. 57	21		
10	20. 15	7. 9	21. 1	339. 45	20			10	72. 15	7. 55	40. 5	288. 45	20		
11	20. 51	7. 11	21. 10	338. 9	19			11	73. 27	7. 54	40. 34	288. 33	19		
12	21. 27	7. 12	21. 19	338. 32	18			12	74. 40	7. 54	41. 2	288. 20	18		
13	22. 9	7. 14	21. 29	337. 67	17			13	75. 53	7. 53	41. 31	287. 7	17		
14	22. 39	7. 16	21. 38	337. 31	16			14	77. 7	7. 52	41. 56	286. 50	16		
15	23. 16	7. 17	21. 50	336. 44	15			15	78. 91	7. 53	42. 25	286. 39	15		
16	23. 63	7. 19	22. 0	336. 7	14			16	79. 36	7. 51	42. 54	286. 24	14		
17	24. 30	7. 20	22. 10	335. 30	13			17	80. 51	7. 50	43. 23	285. 9	13		
18	25. 8	7. 21	22. 31	334. 52	12			18	82. 6	7. 50	43. 53	284. 52	12		
19	25. 47	7. 22	22. 33	334. 13	11			19	83. 24	7. 49	44. 23	284. 36	11		
20	26. 26	7. 24	22. 45	333. 34	10			20	84. 41	7. 48	44. 51	283. 19	10		
21	27. 3	7. 26	23. 56	333. 54	9			21	86. 58	7. 47	45. 20	282. 4	9		
22	27. 46	7. 27	23. 11	333. 14	8			22	87. 15	7. 46	45. 49	281. 45	8		
23	28. 26	7. 28	23. 34	332. 34	7			23	88. 34	7. 45	46. 17	280. 26	7		
24	29. 7	7. 30	23. 37	331. 53	6			24	89. 53	7. 44	46. 45	279. 0	6		
25	29. 49	7. 31	23. 50	331. 11	5			25	91. 10	7. 43	47. 14	278. 50	5		
26	30. 31	7. 33	24. 4	330. 29	4			26	92. 29	7. 42	47. 43	277. 39	4		
27	31. 14	7. 34	24. 15	329. 48	3			27	93. 49	7. 41	48. 11	276. 28	3		
28	31. 57	7. 35	24. 32	328. 6	2			28	95. 8	7. 40	48. 39	275. 17	2		
29	32. 41	7. 36	24. 47	327. 19	1			29	96. 28	7. 39	48. 6	274. 5	1		
30	33. 24	7. 38	25. 3	326. 36	0			30	97. 48	7. 38	48. 34	273. 13	0		

Q	Asc. Obl.			Occid. ☉	Angulus Orient.			Asc. obl. temp. semidura. vel semiosc. Ang. later script. et horis. ad alt. pol. 60° 15'			Rp	Asc. Obl.			Occid. ☉	Angulus Orient.			Asc. obl. temp. semidura. vel semiosc. Ang. later script. et horis. ad alt. pol. 60° 15'		
	0°	0'	h. g. o'		10° 13'	360° 0'	30°	0°	0'	h. g. o'		10° 13'	360° 0'	30°							
1	99	9	7. 56	30. 14	260. 31	29	1	1401. 17	6. 51	61. 19	219. 43	29									
2	100	29	7. 35	30. 31	259. 31	29	2	1411. 40	6. 49	61. 35	219. 20	28									
3	101	31	7. 34	30. 58	238. 9	27	3	1413. 3	6. 48	61. 30	216. 57	27									
4	103	11	7. 33	31. 23	216. 46	26	4	1411. 25	6. 46	62. 4	215. 35	26									
5	101	33	7. 31	31. 52	235. 27	25	5	1405. 47	6. 41	62. 18	214. 13	25									
6	105	55	7. 30	32. 18	254. 5	21	6	1417. 10	6. 45	62. 31	212. 50	23									
7	107	14	7. 29	32. 41	232. 41	23	7	1408. 32	6. 41	62. 44	212. 28	21									
8	108	38	7. 27	33. 10	224. 22	22	8	1406. 35	6. 39	62. 57	210. 5	22									
9	110	0	7. 26	33. 36	226. 7	21	9	1401. 38	6. 37	63. 9	209. 42	21									
10	111	32	7. 24	34. 1	245. 38	20	10	1392. 40	6. 36	63. 21	207. 20	20									
11	112	43	7. 23	34. 20	247. 47	19	11	1384. 2	6. 34	63. 33	205. 34	19									
12	114	6	7. 21	34. 51	215. 54	18	12	1355. 24	6. 32	63. 44	201. 26	18									
13	115	28	7. 20	35. 15	214. 32	17	13	1356. 46	6. 30	63. 55	203. 14	17									
14	116	51	7. 19	35. 39	245. 9	16	14	1398. 8	6. 28	64. 5	201. 38	16									
15	118	14	7. 17	36. 2	231. 66	15	15	1399. 31	6. 27	64. 14	200. 29	15									
16	119	36	7. 16	36. 25	210. 34	14	16	1390. 33	6. 25	64. 22	194. 7	14									
17	120	30	7. 14	37. 49	239. 1	13	17	1422. 15	6. 23	64. 28	197. 43	13									
18	122	21	7. 12	37. 10	237. 30	12	18	1403. 37	6. 21	64. 35	196. 23	12									
19	123	44	7. 11	37. 32	236. 16	11	19	1404. 59	6. 20	64. 41	195. 1	11									
20	125	7	7. 9	37. 31	231. 33	10	20	1408. 21	6. 18	64. 47	193. 20	10									
21	126	29	7. 8	38. 13	213. 31	9	21	1407. 45	6. 16	64. 52	192. 55	9									
22	127	32	7. 6	38. 36	232. 8	8	22	1409. 3	6. 15	65. 1	191. 33	8									
23	129	16	7. 4	38. 33	210. 11	7	23	1376. 27	6. 13	65. 1	189. 33	7									
24	130	35	7. 3	38. 13	229. 22	6	24	1417. 40	6. 11	65. 3	189. 11	6									
25	132	1	7. 1	38. 32	237. 39	5	25	1373. 11	6. 9	65. 9	186. 49	5									
26	134	24	6. 59	38. 31	216. 36	4	26	1474. 33	6. 7	65. 12	185. 27	4									
27	134	47	6. 58	39. 10	225. 13	3	27	1375. 34	6. 5	65. 14	184. 6	3									
28	136	9	6. 56	40. 26	223. 51	2	28	1377. 16	6. 4	65. 15	182. 41	2									
29	137	52	6. 54	40. 46	222. 24	1	29	1379. 38	6. 2	65. 16	181. 22	1									
30	138	54	6. 56	41. 3	221. 6	0	30	1381. 9	6. 0	65. 16	180. 6	0									

n

LIBRI TERTII

PARS TERTIA.

DE ANNO ET PARTIBUS EJUS, DEQUE DIEBUS ET EORUM INCREMENTIS VEL DECREMENTIS.

Quotupliciter considerat astronomus tempora? Dupliciter, vel ex civili consuetudine, vel astronomica certitudine.

Quomodo definitur annum civilem seu politicum? Est spatium temporis seu certus dierum integrorum numerus, ad quem motus Solis vel Lunae vel sideris utriusque digitum tutendit eminens, populari cujusque gentis instituto receptus.

Quae civilis anni forma ex omnibus est astronomicae disciplinae commodissima? Annus Julianus Calendarii vsteris, constans diebus 365 et adjiciens in quatuor annis diem unum, ut post tres simplices quartus sit dierum 366. Haec enim mensura media est inter annos astronomicos, haec omnium gentium saltem tacita temporum annumeratio fuit, haec penes nos inde a Caesaribus observatione continua trita et culta; ad hanc anni formam identidem recurrendum est astronomo, quamcunque aliam stilo patriae suae magis familiarem sub manus sumserit.

Quomodo definiunt annum astronomi? Annus illis est spatium temporis, intra quod Sol curriculum suum in coelo videtur absolvere, quod efficit, ut in theoricis dicetur, circuitus centri Telluris circa Solem vere immobilem.

Quotuplex est annus penes astronomos? Duplex, pro duplicibus solaris revolutionis metis, sidereus et tropicus seu vertens.

Quae sunt anni sideris metae? Punctum eclipticae, in quod circulus magnus ex polo eclipticae per certam stellam fixam propositam, ut per Sirium vel per cornu Arietis etc., descendit.

Dic anni vertentis metas. Eae sunt eclipticae puncta, in quibus secatur illam aequinoctialis aut colorum alter, uno nomine puncta cardinalia.

Quae anni species ad quas partes hujus doctrinae spectant? De civilibus annis peculiaris est disciplina, nec potest de his in universum agi, priusquam ex doctrina theorica motus Solis et praecipue Lunae fuerint explicati. De anno sidereo rectius agitur ultima parte hujus libri tertii, quanquam etiam hujus perfecta cognitio ex doctrina theorica petenda est. Restat igitur huic parti tertiae annus tropicus seu vertens.

Nihil ergo nobis ad hujus cognitionem ex anticipato tenendum est de motu Solis apparenti seu Telluris proprio? Imo ad perfectam explicationem anni vertentis non pauca ex theoria doctrina petenda sunt.

Cur ergo de illo ugitur in doctrina sphaerica? Annus vertens habet plures respectus: aut eum dividimus curriculum Solis, qui annum efficit, metis suis naturalibus ex primo motu petitis, partiumque illarum affectiones varias respectu dissimilitudinis dierum et noctium exquisimus; et sic pertinet ad doctrinam sphaericam; aut metimur ejus cum totius, tum partium singularum longitudo diversae, et causae diversitatis hujus ex theoria sunt petendae.

Quid est annus vertens? Est spatium temporis, intra quod quatuor existunt vicissitudines, ver, aestas, autumnus, hiems, Sole ab uno puncto rum cardinalium ad idem revertente.

Unde nomen est anno vertenti? Graeci τροπικὸς ἀπὸ τῶν τροπῶν, quod conversiones vel vicissitudines significant, appellarunt; cui latina vox vertens ad verbum respondet. Idem et temporalem appellant, quia haec quatuor anni tempora solent nuncupare. Dicitur et naturalis, quod hae vicissitudines universam naturam animantium terraeque nascentium ipsorumque adco elementorum attingant.

Num igitur in anno sidereo non sunt eadem quatuor partes? Insunt quidem et illi, sed per accidens. Nam si succedant invicem anni siderali magno aliquo numero, fiet tandem ut principium ejus, quod hibernum erat initio, tandem in aetatem incidat, itaque interdum unus sidereus non quatuor, sed quinque habet tempora, unum sc. duplex.

Qua mensura metimur anni partiumque ejus longitudinem? Diebus, qui intra metas unius anni partis existunt. Nam haec mensura et brevior est anno mensurando, et notior eo et observatu numeratque facilis, propter vicissitudines diei noctisque, et denique satis aequabilis.

Quot sunt in anno vertente dies? Totidem fere, quot observamus in anno civili Gregoriano seu novi Calendarii, scilicet 365 et paulo minus quarta diei parte, minus inquam tribus quadringentesimis unius diei circiter; nam in doctrina theoria excutietur haec particula accuratius.

Quot sunt sensus vocabuli dies apud astronomos? Duo praecipue. Nam aut idem sonat, quod Graecis τροχικὸς, spatium nempe temporis, intra quod semel dies et semel nox efficitur, quae dies naturalis diei solet; aut sumitur dies pro noctis opposito, seu accuratius tempus id, quo centrum Solis est supra horizontem, diciturque dies artificialis.

Quam tu putas esse rationem horum nominum naturalis et artificialis? Quemadmodum domus, navis, cista, mensa naturaliter quidem sub uno omnia genus rerum pertinent, quod ex ligno sunt, ars vero distinctionem hanc inter ligna fecit, ut hoc navis esset, illud mensa, et quemadmodum hominum omnium est eadem species, ex qua nomen ipsis competit hominis, mens vero et consuetudo gentiumque instituta naturae supervenientia discriminant homines, diversis munitis nominibusque inter eos distributis, ut hic sit rex, iste episcopus, ille opilio, omnes ejusdem naturae homines: sic unam et idem naturam proveniens τροχικὸς per diversos horizontes, id est per diversas visuum diversorum imaginationes diversimode figuratur in diei noctisque segmenta inaequalia, aliter hic, aliter ibi.

Quomodo diem dividunt astronomi? Dividunt eum, ut vulgo solent, in horas, quas veteres, ut ex Homero patet, in una die naturali quatuor solum, alii duodecim, postea 24 statuerunt, quod retinent astronomi ut infra dicetur.

Quomodo numerant astronomi horas et dies? Vel a media nocte ab uno in 24 mediae noctis sequentis, ut Prutenicae. Vel a meridie, numerato iterum 24 usque ad meridiem sequentem, et dies interdum nominatur completa, interdum currens, cujus pars sunt horae expressae.

Quot sunt horarum genera? Totidem quod dierum: quaedam enim dicuntur aequinoctiales, *ἡμερησίου*, quaedam temporales, *καιρῶνα*, quod pro ratione temporum totius anni variam nanciscantur longitudinem.

Quid est hora aequinoctialis? Est pars vicesima quarta *τῆς νυκτὸς*, seu diel noctisque naturalis junctorum.


Quomodo dividitur hora aequinoctialis astronomiae? Dividitur ut circuli aliquotus pars 360^{ma}, gradus vel tempus, in minuta sexaginta, sic ut 15 minuta faciant horae quadrantem; minutum unum in 60 secunda abit, unum secundum in 60 tertia et sic continue, quousque opus est.

Compara sectiones aequinoctialis horae cum pulsu humano. In homine valente, robusto et perfectae aetatis, complexionis melancholice aut consenescente fere singulis secundis existunt singuli pulsus arteriae, nullo discrimine inter systolen et diastolen: ita essent in uno minuto pulsus sexaginta; sed rara est haec tarditas, vulgariter numerantur 70, in cholerice et senilis 80, quatuor in terna secunda. Breviter in una hora quatuor millia plus minus.

Quomodo efficitur dies naturalis? Revolutione apparente Solis ab ortu per meridiem in occasum immoque coeli redituque in ortum, quae re vera est revolutio Telluris et in ea horizontis, per Imaginationem in coelum usque continuati, circa axem Telluris velut immobilem, ut libris antecedentibus est demonstratum.

Quae sunt hujus revolutionis metae? Per centrum Solis S immobile,

Fig. 39. (rep.)



perque Telluris axem PL planum imaginatione concipitur tractatum. Ergo locus in superficie Terrae quiscunque, constitutus in hoc plano, habet initium diel naturalis, quod vel meridianus est vel media nox; qui totus illi loco decurrit interim dum ipse locus, deserto plano PLS, ex

illa plaga per plagam oppositam in eundem situm idemque planum PLS revoluzione Telluris restituitur.

Quomodo hoc cum sphaera convenit? Quod dixi planum PLS, id in sphaera per circulum declinationum repraesentatur, tractatum per mundi polos et centrum Solis, et cum eo quasi mobilem. Locus vero Telluris, vere mobilis circa Telluris axem, repraesentatur in sphaera per meridianum immobilem. Itaque naturalis dies est spatium temporis, intra quod centrum Solis ab eodem semicirculo meridiani digressum ad eundem reverti videtur.

Num omnes dies naturales per totum annum invicem sunt aequales?

1. Revolutiones quidem integrae Telluris ad planum per eandem fixam tractum, ut libro primo dictum, sunt ad omnem sensus subtilitatem aequalissimae, numerus tamen aliquis plurimum revolutionum accumulatur ex insensibilibus differentis aliquid sensibile, ut aestivae revolutiones aliquot differant tempore ab hibernis totidem. 2. Etsi vero plane essent aequalissimae revolutiones ipsae Telluris ad planum per axem ejus et aliquam fixam tractum, nondum tamen sequeretur, dies naturales inter se plane ad unguem aequales esse.

An igitur dies naturalis non est aequalis integrae revolutioni Telluris?
Est paulo longior, quod patet ex diversis utriusque metis. Nam meta, quae determinat revolutionem corporis Telluris integram circa suum axem, est planum aliquod per axem Telluris ductum invariabiliter, seu quod annuo motu (de quo libro VI.) cum ipso axe Telluris circumlatum non mutat situm partium, sed manet sibi ipse parallelum, in quantum scilicet axis ipse sibi parallelus manet, ut vides apud PL in omnibus quatuor sitibus. Et locus aliquis in superficie Terrae tunc censetur integram aliquam revolutionem absolvisse, cum in hoc planum PSL eandemque ejus partem recurrit. At meta, quae determinat integram diem naturalem, ut jam dictum, est planum PSL per axem quidem Telluris PL ductum, sed variabili situ; quia dum circumfertur cum axe Telluris annuo motu, unum ejus punctum affixum haeret centro Solis S immobili, itaque situm partium varie mutat, adeo ut neque parallelum sibi ipse maneat, neque semper eodem angulo secet eclipticam planum. Itaque ponamus, Terra in Capricorno constituta, unde Sol apparet in Cancro, coincidere haec bina plana, erunt igitur utraque ad eclipticam recta, ex eo, Terra versus Arietem pergente, prius quidem planum PL deseret S, centrum Solis, et manebit rectum ad eclipticam sibi paralleum; posterius vero planum PLS, haerens centro Solis, separabitur a plano priori PLS, et partes ejus exteriores, ultra axem Telluris versus fixas porrectae, praecurrent, et fugient a consimilibus prioris plani partibus, interimque etiam ad planum eclipticae inclinabitur hoc planum PLS, ut parte secunda dictum, quoad usque Terra in Ariete constituta, Sole in Libra spectato, integro quadrante praeverterit et una cum plano priore parallelos Telluris in 4 quadrantes secuerit, angulo SPL recto facto. Tunc itaque locus aliquis in superficie Telluris, revertens ad planum prius PL, abest adhuc uno quadrante revolutionis integrae a plano posteriore PLS, sitque hoc pacto in omnibus 4 annis partibus junctis, ut dies quidem naturales proveniant 365 cum quadrante, revolutiones vero Telluris una plus, sc. 366 cum quadrante.

Quomodo hoc ad sphaeram accommodabo? Ut prius; planum alterum PLS per Solem et axem Telluris representatur in sphaera per circulum declinationis tractum per centrum Solis et polos sphaerae, alterum PLS representatur per circulum declinationis alium, qui per fixam et polos sphaerae transit. Quod igitur una dies naturalis plus sit, quam una revolutio Telluris, adeoque et aequatoris sphaerae, id sic demonstratur per sphaeram. Posito enim Sole in principio Cancrī et meridiano, interea dum sphaera et principium Cancrī revolvitur, Sol jam a principio Cancrī discessit ad finem primi gradus Cancrī, itaque praeter revolutionem integram opus est adhuc pene uno gradu revoluti, donec Sol in meridianum redeat.

Quod nomen est illi portunculae, quae supra integri aequatoris revolutionem accedit, et quomodo definitur? Appellatur additamentum. Est

autem portio aequatoris, nimirum ascensio recta motus Solis diurni proprii, seu arcus eclipticae, quem Sol in uno die naturali conficit.

Si dies naturales sunt inaequales propter inaequalia additamenta, quae est ergo mensura aequabilis, quae eos metitur? Ipsa Terrae seu aequatoris revolutio, inter citatissimam et remississimam media, qualis est hodie paulo post aequinoctia.

Quid facit additamenta inaequalia? Duae causae sunt, altera petenda ex doctrina theórica et motu Solis proprio inaequali, unde fit, ut diurni arcus Solis in ecliptica sint inter se inaequales. Hodie namque Sol post solstitium conficit 57' 5" in una die, post brumam vero 61' 21". Et causae hujus inaequalitatis pro diversa auctorum sententia variae traduntur, ut suo loco doceatur. Parvus autem motus diurnus habet parvam ascensionem rectam, ceteris paribus, magnus magnam.

Altera causa est hujus loci propria, quod, quamvis arcus motus diurni Solis essent aequales inter se, tamen in diversis locis eclipticae diversas et sic inaequales habent ascensiones rectas. Quin etiam in iisdem eclipticae locis non omnibus seculis aequalissimae sunt ascensiones rectae propter obliquitatis eclipticae variationem, de qua supra nonnulla, infra vero libro VII. plura dicentur.

Quotuplicia igitur sunt additamenta apud astronomos? Duplicia 1) *κατακαινα*, hoc est temporalia, quae diversis temporibus vere nunc minora sunt, nunc majora. 2) Et *ὁμαλα*, media inter majora et minora, ficta ab astronomis mensurandi causa, quae sunt aequalis.

Quomodo constituunt astronomi additamenta media seu aequalia? Quia diebus anni 365 cum quadrante per additamentorum accessionem integra denique revolutio aequatoris supernumeraria accrescit, astronomi illam dividunt per dies anni 365 cum quadrante et portionem unam diem additamentum aequale; est autem id aequale motui diurno Solis in ecliptica medio, scil. 59' 8".

Quotuplicia sunt νυχθημερα seu dies naturales? Ad normam additamentorum alii sunt apparentes seu veri, alii aequales medii quantitate et ficti ab astronomis, qui constant scilicet tali additamento.

Quantus est dies naturalis medius, quanta ejus hora? Longitudo diei naturalis medii habet aequatoris tempora 360. 59' 8". Hora ejus igitur valet tempora 15. 2' 28" lere.

Quot temporibus differunt inter se dies naturales veri? Binorum inter se proximorum differentia est inobservabilis. Unus etiam solus ex brevissimis ad unum ex longissimis comparatus non valde magnam efficit differentiam; at juncti invicem aliquam, multi ordine in una parte anni, totidem junctis in altera parte anni, satis evidenti differentia breviores longioresque sunt.

Maestlinus ad legem hypotheseum Copernici partemlarium circa motum Solis et praecessionem aequinoctiorum, quae non omnes recipiuntur et quae ad doctrinam theoricam pertinent, colligit, differentiam dierum brevium totius anni a diebus naturalibus seu νυχθημεροις longis esse hoc nostro saeculo unius horae et unius scrupuli cum 2 secundis, posse autem aliis saeculis ad trientem horae supra integram horam excurrere.⁴⁰ Quod sic intelligendum, totum anni vertentis spatium inter duas classes dierum, quorum alii pauciori numero longi sunt, alii majori numero breves, non esse distributum proportionabili ratione; nam una hora eum triente meliorem esse partem pauciorum in sua proportionem, quam partem plurium in sua. Tychoni Brahe, ad pauciores causas respicienti, summa differentia hoc saeculo est horae unius et minutorum quinque.

Qui sunt longiores, qui breviores dies? et quo argumento? Macæstinus ex Copernico, supponens omnes revolutiones æquatoris æquabiles, longiores illos ostendit, qui existunt, Sole ab 11° Scorpil usque in 22° Aquarii currente, reliquos omnes totius anni breviores, quam est æquabilis modulus diei. Nec multum variat ab hoc Braheus. Nam in 8° Scorpil aufert plurimum minuta 24, in 22° Aquarii addit minuta octo plurimum. Causæ ad doctrinam theoricam pertinent potiori parte, ubi apparebit, si causæ omnes conjungantur, longe aliam futuram distributionem dicrum totius anni.

Responde igitur de causa hujus loci propria, et quantum illa dies naturales variet et ubi? Causa hujus loci propria est differentia ascensionis rectæ a suo arcu eclipticæ, quanta potest esse maxima, quam supra indicavimus contigera in 16° 4' 44" Tauri et Scorpil et in 13° 45' 16" Leonis et Aquarii. In his igitur 4 locis dies naturales ipedil et veri sunt longitudinis ejusdem. Igitur a 17° Tauri usque in 14° Leonis proveniunt dies longiores, propter hanc causam seorsim consideratam, a 14° Leonis in 17° Scorpil breviores; lucrum illorum præ his est temporum 9. 56' 20", seu minutorum paulo minus 40 minus borac. Eadem ratio est in altero semicirculo, rursus enim a 17° Scorpil usque in 14° Aquarii sunt longiores, a 14° Aquarii usque in 17° Tauri breviores.

Hanc rationem Braheus peculiariter, quando Lunæ motus colligit, sequitur, periode ac si causæ doctrinæ theoricæ propriæ in Lunæ motibus præcise compensarentur.

Quid facit revolutiones æquatoris inter se inæquales? Inæqualis distantia Solis a Terra, qua sit, ut tardior fiat volutio globi Telluris Sole longe distante, velocior Sole propinquo. Igitur æstate una revolutio durat paulo longius quam hieme.

Dic regulam generalem, quæ sit utilis etiam in doctrina theoricæ æquandi temporis? Tempus est constituendum, quando Solis apogæum, de quo libro VI, in principium Cancrî iucidit, ut sic utraque inæqualitas, tam additamentorum quam ascensionum totarumque adeo revolutionum ab eodem principio incipiat. Et hoc tempus, sine æquatione sumtum, est statuendum pro radice, ad quam cetera per æquationem comparentur. Tunc proposito quovis tempore apparenti, quaeritur ascensio recta loci Solis; quaeritur etiam motus medius Solis ab æquinoctio: differentia utriusque est æquatio temporis, constans ex dictis duobus causis.

Verbi causa, sit anno Christi 1260, completo apogæum Solis in 0° Cancrî. Et sit tempus æquandum anno 1457. 3. Sept. h. 11. 6'. Colligitur igitur ad hoc tempus locus Solis, ut lib. VI. discemus, 19° 17' Virg., cujus ascensio recta 170° 19'. At motu medio Sol elongatur ab æquinoctio 171° 27'. Hic igitur differentia est temp. 1. 8', id est h. 0. 4' 32". Tantum est auferendum apparenti tempori, ut sciatur, quot æquatoris tempora inde ab anno 1260. lapsa sint.

Denique ex anomalia Solis annua (de qua libro VI.) descendendum est iurum vel damnum boræ minorum, quod patiuntur integræ revolutiones; methodus ad doctrinam theoricam pertinet.

Num omnes omnino causæ per hanc regulam observantur? Præsupponitur motus fixarum secundum eclipticæ longitudinem (vel ut Copernicus docet, præcessio æquinoctiorum) æquabilis: quæ si quam habuerit inæqualitatem (de qua libro VII.), illa post justum seculorum intervallum, quando emergit hæc inæqualitas, esset insuper adhibenda in æquandis illius ævi

temporibus. Sed qualiscunque sit haec inaequalitas, illa intra haec duo millia annorum, quibus exstant observationes conscriptae, negligi tuto potest.

Quomodo ex coelo ipso discimus, quota diei sit hora astronomicae numerationis? 1. Opus est cognitione altitudinis poli. 2. Tunc de die Sole tantum, de nocte insuper aliqua stella fixa utimur, cujus sit cognita declinatio et ascensio recta. Solis quidem ascensio recta facile comparatur per doctrinam secundae partis, ex cognito ejus loco in ecliptica; stellae vero ascensionem rectam inquirere docebit pars quinta. 3. Si fuerint ista in promptu, capitur altitudo Solis vel stellae ad momentum propositum. 4. Tunc secundum doctrinam partis primae ex declinatione et altitudine quaeritur elongatio Solis vel stellae a meridiano circulo. Per elongationem vero stellae a meridiano de nocte quaeritur ipsius etiam Solis elongatio ab eodem, ablata elongatione stellae a differentia ascensionum rectarum, si Sol et stella in contrariis a meridiano plagis fuerint, addita vero, si in eadem: Ita patescit etiam Solis distantia a meridiano. 5. Haec elongatio Solis, cum sit arcus aequatoris, interceptus inter circulum declinationis Solis vel stellae et meridianum, resolvitur in horas, sumtis 15. 2. 30. temporibus pro una, si asc. recta illius loci babeatur, quem Sol obtinuit vel obtinebit in ipso meridie. Sin autem usus esses loco Solis ad ipsam horam inquirendam, erasso modo praecognitam, tunc 15 tempora praecisa valent unam horam. 6. De die igitur horae istae, Sole adhuc surgente, auferuntur a 12, ut scilicet, quot horae sint elapsae a media nocte; at Sole jam eadente subtractione non est opus, ipsae enim horae, quae prodeunt, numerantur a meridie more astronomico.

Quomodo vicissim ex data hora quaeritur ascensio recta medii coeli, ascensio obliqua horoscopi, punctum eclipticae coelum medians et oriens, denique ascensiones obliquae domuum coeli et initia eorum in ecliptica? Ante omnia opus est cognitione veri loci Solis in ecliptica ad annum, diem, horam et minutum horae propositum temporis apparentis. Illius loci quaeritur ascensio recta ex praemissis, cui pro singulis horis a meridie numeratis adduntur 15 tempora, pro 4 minutis nunc tempus etc. Ita constituitur ascensio recta medii coeli.

Pro ascensionibus obliquis insuper est opus cognitione altitudinis poli super enjunque loci horizontem et reliquos 4 circulos positionum, qui tricesis gradibus aequatoris (secundum Regiomontanum) vel verticalis (secundum alios) ab invicem distant, initio a meridiano capto: quae methodus tradita est parte prima. Tunc igitur ad ascensionem rectam medii coeli seu X. domus additis 30, 60, 90, 120, 150 temporibus aequatoris, constituuntur ascensiones obliquae domuum XI, XII, I, seu horoscopi II, III. Cum his ascensionibus obliquis coorientia puncta eclipticae, quodlibet in sua propria poli altitudine, inveniuntur per doctrinam secundae partis. Oppositarum vero domuum IV, V, VI, VII, VIII, IX. initia tenent eclipticae puncta opposita. Ita tota coeli facies seu thema coeleste erigitur eique suis locis inserantur planetae.

Si hora est pars 24. diei naturalis, illa vero valet tempora aequatoris 60. 59. 8, videtur igitur et hora plus valere quam 15 tempora. Equidem etiam illud additamentum 59' 8", quo dies quaelibet excedit integrum aequatorem, disperdiendum est in 24 horas, si numerentur illae a puncto aequatoris invariabili, quod enim Sole fuit in meridiano. At quando verus locus Solis ejusque asc. recta non nude ad meridiem, sed plaus ad ipsam horam computatur, tunc hoc ipso jam accessit medio coeli tantum, quantum debebatur totidem horis de additamento; sufficit igitur tunc pro una hora computare 15 tempora.

De diebus et noctibus artificialibus.

*Quibus proprietatibus distinguuntur inter se diversae partes anni ver-
tentis? Duabus potissimum: longitudine et brevitate dierum noctiumque arti-
ficialium, et caloris frigorisque vicissitudine.*

*Quid proprie est apud astronomos dies vel nox artificialis? Dies arti-
ficialis est temporis spatium, quo centrum Solis radiis liberis et non refractis
supra horizontem rationalem spectari potest; nox, quam diu infra, licet magna
et diurnae propemodum aequalis sit lux crepusculi in noctis extremis.*

*Sunt igitur hae partes diei naturalis unus dies et nox artificialis? Ac-
curate loquendo dies unus artificialis, in quo quidem Sol oritur et occidit,
dividitur in ipso sui medio inter duos dies naturales, quorum unus coepit in
meridie antecedenti, alter finitur in meridie sequenti. Nox vero artificialis
pars est unius solum ex hisce duobus diebus naturalibus, scilicet antecedens
antecedenti, sequens vero sequenti. Et tunc, quando scilicet Sol occidere et
oriri potest, dies artificialis minor sane est die naturali partisque rationem
habet, non minus quam socia sua, nox artificialis. At ille dies artificialis, in
quo Sol nequit horizontem subire, componitur ex aliquot integris diebus natu-
ralibus. Et nox artificialis illa, in qua Sol per revolutionem diurnam non
potest eniti supra horizontem, componitur similiter ex aliquot diebus natu-
ralibus integris.*

*Quid ergo circa hos dies noctesque praecipue venit in considerationem?
Illa maxima dierum noctiumque inaequalitas per diversas tam anni partes quam
sphaerae positus.*

*Qua mensura metimur hanc inaequalitatem? Metimur eam circulis die-
rum naturalium eorumque arcibus; effertur vero longitudinem ejusque nu-
mero horarum aequinoctialium seu mediarum, aut etiam dierum naturalium.*

*Quos dicis circulos dierum naturalium et quot? Parallelos aequatoris
180, ex quibus extremi sunt duo tropici, ceterorum quilibet per binorum eclip-
ticae graduum terminos, aequaliter a punctis tropicis distantes, sunt traducti.*

*Quomodo constituuntur hi circuli et qua occasione? Eadem propemodum,
qua supra parte prima et superius libro secundo circulus stellae, nisi quod
hic fit duobus Telluris motibus inter se compositis, uno revolutionis, altero cir-
cumlationis (in qua, ut parte secunda dictum, axis revolutionis translatus ma-
neat sibi ipsi in omni situ parallelus) ut circumlorum alius ex alio vectatur.*

*Finge namque primo, axem et centrum Telluris manere loco suo con-
uexumque esse cum centro Solis per lineam rectam, quae per superficiem
Terrae trajecta erit; corpus igitur Telluris, in hac dispositione circumvolu-
tum, secabitur in superficie circumeica ab hac linea circulo perfecto, sic ut
sectio eodem redeat unde coepit. Admitte secundo considerationem hanc, quod
axis Telluris interim parumper sit transpositus, eoque jam paulo aliter ad
Solem inclinetur, quam in principio revolutionis unius; quo medio, ut parte
secunda didicimus, Sol alteri polorum redditus sit paulo propior. Ergo in
fine susceptae revolutionis linea, connectens centra Solis et Terrae, secabit
globum Terrae propius polum et sic aberrabit a principio sectionis dabitque
novo circulo principium, necesse circulum unum ex alio, ut fit in cylindris,
in quos agglomerantur fila. Tales igitur spiras efficit in superficie Terrae
series locorum, quorum vertices Sol transire videtur per diei annique curri-
cula, haec loca deserens, illis superveniens. Verbi causa Moluccae insulae
haec serie a septentrione versus meridiem dispositae sunt inter magnas insulas*

Gilolo et Celebes: 1) Ternate, 2) Tidore, 3) Macbian, 4) Baebian. Jam in meridie 22. Septembris fuerit Sol verticalis insulae Ternatae, inde decedens versus Celebes transit Borneo, Sumatram, Maldivas in oceano Indico, Aethiopiam Africam, oceanum Atlanticum, in America Guajanam et Manosam ad Parimen lacum, oceanumque Australem, quoad confectis 24 boris die 23. Sept. ex oriente revertatur, non jam amplius super Ternate, sed super Tidore, et die 24. Inferius super Baebian transiens novisque circulis faciens initia.

Atque his circulis in Terra finguntur superstare in sphaera perpendiculariter circuli dierum naturalium, ut libro secundo doctum; non quod etiam in coelo Sol, deserta ecliptica, in alias fixarum plagas expatiatur secundum ductum circuli diei naturalis, sed quia, si in aliquo superiore laqueari cavo quiescente vestigia Solis ejusque puncti ecliptici cernere quis imitari et exprimere posset, circulus talis hac notatione exprimeretur.

Atqui non respondent circuli dierum naturalium in coelo, sicuti quidem eos descripsisti, circulis illis in Terra, neque figura neque numero. Nam perfecti sunt circuli et a se mutuo non nexi, non excedentes longitudinem perfecti circuli quantitate additamenti, quod accedit integrae revolutioni Telluris, ut dies perfecta sit; et sunt numero 180, cum dierum anni paria sint 182 vel 183. Familiare est geometris, ea, quae sunt irregularia, accommodare regularibus proxime accedentibus ad figuram propositam, artis et mensurandi causa; nam ars nulla sine certis regulis exerceri potest. Ita hic quoque, quamvis dies naturalis decurrit interim, dum non tantum Integra revolutio Telluris existit, sed etiam particula de subeunte altera revolutione, tamen astronomi comparant totum diei tempus perfecto et in se redenti circulo; qui traducatur per terminum gradus Solis, proximum loco Solis per diem integram, ac si nihil ei circulo insuper accederet, vel ac si Sol ratione motus proprii quiesceret in uno quolibet initio gradus eclipticae per integram diem; postea subito et in momento saltum faceret ad initium gradus sequentis.

An vero sic non turbatur certitudo comparationis rationumque astronomicarum? Quicquid per hanc fictionem peccatur, id penitus insensibile et in una die, quare veteres id non curandum censuerunt, quod hic unaquolibet dies seorsim consideretur, non vero ut prius naturales, sic hic etiam artificiales aliquot accumulenter.

Quomodo perficitur mensura diei noctisque artificialis? 1. Vel circulo, si descriptus sit in sphaera circulus diei naturalis. Nam quae est proportio segmentorum cujusque circuli, factorum ab horizonte, ad se mutuo in quolibet Terrae loco, eadem est ibi et proportio diei ad suam noctem, Sole in illo eclipticae gradu versante, per quem transit circulus. Hanc rationem veteres tenuerunt praecipue in metiendi longitudine diei noctisque et longissimae et brevissimae, eo quod eorum circuli, hoc est tropici, in sphaera exprimantur, potissimum ob hunc usum. 2. Vel calculo et aequatore circulo, seu ascensionibus obliquis semicirculorum eclipticae, quorum qui locum Solis antecedit, ascensionem obliquam habet, noctis inditem et mensuram, qui sequitur, diei. Et tunc 15 praecise tempora aequatoris faciunt horam unam mediam seu aequinoctialem, quasi nullum accederet additamentum; quia Solem fingimus in unico puncto eclipticae per diem integram quiescere.

Quae est ratio metiendi diem vel noctem illam, quae constat ex multis diebus naturalibus? Quia circuli dierum naturalium nec numero respondent diebus, nec in sphaera exprimuntur, his igitur missis, quaeritur arcus eclipticae perpetuo apparens per doctrinam parte secunda traditam. Deinde per

doctrinam theoricam vel ex ephemeride inquirendum, quam diu Sol in arcu invento commorari videatur, faciens diem vel noctem continuam.

Edisserere nunc varietatem dierum et noctium artificialium per septem sphaerae positus, parte secunda notatos. Sub aequatore et ab illo usque ad utrumque polarem nulla dies caret sua nocte, nulla nox sua die, quae sit pars diel naturalis; hoc tamen discrimine, quod sub aequatore quidem omnes dies sunt aequales suis noctibus, inde vero discedentibus versus nostrum septentrionem oritur dierum inaequalitas, sic ut nulla dies totius anni sit alteri aequalis, nisi tantum bini, quibus Sol versatur in punctis a solstitiali puncto aequidistantibus. Etenim progressis versus polum dies aetivi paulatim incipiunt crescere, noctes contrahi, vicissim hiberni dies contrahi, noctes extendi: sic ut semper una dierum aetivarum aequae longam habeat unam noctem hibernam oppositi puncti, vel etiam aequaliter ab aequinoctiali puncto remoti, et una nox aetiva diem unam hibernam, Sole versante vel in opposita vel in aequae remota parte a puncto aequinoctiali.

Ordo vero incrementorum est iste: a brumali solstitio, cum dies brevissimus, paulatim incipit lux crescere primum insensibilibus incrementis, circa vero aequinoctium velocissime, versus solstitium aetivum et diem longissimum rursus insensibiliter: inde incipit idem ordo decrementorum.

Porro haec differentia diel longissimae a brevissima in locis aequatori vicinis parum sentitur; sub tropico jam trium horarum est, extra tropicum penes nos jam horarum octo; ulterius tantum crescit, ut sub polari totam diem naturalem consumat unaque jam dies aestate sit, quae nullam habet noctem, una nox hieme, quae nullam diem; nam Sol dimidio orbe emergens in ipsa hora meridiei statim iterum se condit.

Intra polarem duo genera dierum noctiumque artificialium existunt: quidam enim dies ante et post aequinoctia suas habent noctes, quidam contra cis et ultra solstitium coalescunt in diem unam, exclusis noctibus, et vicissim noctes quaedam cis et ultra solstitium alterum continuantur nullius interpositu diel, augeturque numerus dierum naturalium in una tali prodigiosa die cum appropinquatione ad polum; adeo quidem, ut sub polo sit unicus denique dies, durans per totum semestre, nox itidem unica per semestre reliquum, dies vel nox naturali brevior nulla.

Est autem hoc discrimen in illis prolixis diebus, quod intra polarem arcticum hoc aere longiores sunt dies isti continui aetivi noctibus continuis hibernis, adeoque sub ipso polo dies octiduo longior nocte; intra polarem autarecticum fit contrarium. Causa est in motu Solis tardiore per hemisphaerium boreale, quam per australe, ut dicitur in theoria doctrina.

Proba haec omnia et singula, tam per circulos dierum naturalium, quam per ascensiones.

1. Quod ab aequatore usque ad polarem nulla dies careat sua nocte.

Quia vertex extra polarem est, polus igitur eclipticae nobis semper ad septentrionem est, igitur omnes partes eclipticae, cum in meridianum veniunt, supra horizontem sunt, quare etiam omnes partes oppositae sub horizonte sunt. Omnium igitur partium paralleli, hoc est omnes circuli dierum naturalium secantur ab horizonte, seu omnia puncta eclipticae oriuntur et occidunt et Sol in iis quonibus.

2. Quod aut polari dies longissima excreseat in horas 24, ut et nox longissima.

Si enim vertex in polarem incidit, polus igitur eclipticae in verticem venit et ecliptica tunc horizonti jungitur, quando solarius solstitiorum coincidit cum meridiano,

solstitiorum igitur alterum non oritur, alterum non occidit, et tropicorum alter totus latet, alter totus exstat: ille longissimae noctis, hic longissimae diei mensura. Sic cum una medietate totius aequator ascendit, cum altera nihil, Sol igitur, in communibus medietatum terminis versans, in uno facit diem aequalem diei naturali, noctem nullam, in altero contrarium.

3. Quod intra polarem dies naturales plures, non tamen omnes, sub polo totum semestre in unam diem vel noctem artificialem coalescat.

Quia vertex seu polus horizontis intra polarem est, medius est igitur luterum inter polum aequatoris et polum eclipticae, et sic polus eclipticae tunc humilior est versus meridiem, quare eclipticae arcus circa alterum solstitium in meridiano est sub horizonte, non igitur oritur: oppositus arcus sub polo aequatoris supra horizontem est et sic non occidit; illic igitur latent, hic exstant toti circuli dierum naturalium, quos habent isti arcus; intermedii vero secantur ab horizonte; sub polo secantur plures, sed dimidium eorum latet, dimidium exstat. Sic cum ecliptica secetur ab horizonte tali in arcus quatuor, quorum superior non occidit, inferior non oritur, intermedii oriuntur et occidunt et Sol in iis versans.

4. Quod sub aequatore omnes dies suis noctibus aequales.

Quia centra circulorum dierum naturalium in axe mundi sunt, axis vero illic in horizon, horizon igitur circulos illos omnes secat in segmenta aequalia. Sic ascensiones semicirculorum undecunque inceptorum omnes inter se sunt aequales, semper igitur semicirculus ante Solem, noctis argumentum, aequali tempore oritur cum semicirculo post Solem, diei indice.

5. Quod extra aequatorem tantum duo dies anni suis noctibus sint aequales, reliquorum aliqui longiores noctibus, aliqui breviores, et brevissimus dies nobis in Capricorno, longissimus in Canero.

Solus enim aequator habet centrum in plano horizontis traductus per opposita duo eclipticae puncta, solus igitur secatur in aequalia ab horizonte. Reliquorum parallelorum centra omnia vel supra vel infra aequatorem sunt, quis axis mundi bisecatur ab aequatore, habens illa centra; illorum igitur major pars est supra, horum infra, et maxima illius, cujus centrum in axe remotissimum ab aequatore et sic vel elevatissimum vel depressissimum. Sic illae solum medietates eclipticae in obliqua sphaera aequales habent ascensiones, quae incipiunt a punctis aequinoctialibus, reliquae aliunde inceptae inaequales. Et quidem semicirculi, quorum latus penes nos in septentrione sunt, majores habent ascensiones, quia differentia ascensionalis principii subtrahitur, finis additur; maximam vero ascensionem habet, qui a principio Cancri lucipit, quia haec differentia asc. est ibi maxima.

6. Quod bini dies, Sole in punctis aequaliter a solstitio remotis versante, sint inter se aequales earumque noctes similiter.

Quia per talia bina puncta idem parallelus traducitur. Sic, quia ascensiones semicirculorum inceptorum a talibus binis punctis aequales sunt.

7. Quod una dies aestiva aequalem habeat noctem hibernam, Sole aequaliter ab uno punctorum aequinoctialium remoto.

In talibus enim punctis declinant circuli aequaliter in utrumque latus, secantur igitur ab horizonte alternative aequaliter, ut quantum de uno exstat, tantum de altero lateat et vicissim. Sic, quia ascensiones semicirculorum eclipticae sunt aequales descensionibus semicirculorum oppositorum. Si ergo Sol sit in principio talis semicirculi, tamdiu manet supra horizontem, quamdiu manet infra eum, si sit in illius semicirculi fine, sc. post semestre.

8. Quod incrementa dierum vel noctium sint in aequinoctiis celerissima, in solstitiis tardissima.

Quia, cum ecliptica in sectionibus obliquissima sit, declinatio ibi celerissime crescit, in solstitiis vero enectatur consistens, donec ex crescente fiat decrescens. Decl-

nationis vero quantitatem sequitur distantia circularum dierum naturalium et differentia sectionis eorum ab horizonte; sequitur eandem et differentia ascensionalis, varians dici noctisque mensuras.

Haebntne longae illae noctes aliquas tenebrarum medelas? Multae sunt causae, quae lucem absente Sole locis illis prorogant, tenebras in angustum redigunt. Primum omnis portio Solis illuminat, quantulaeunque sit. Incipit igitur dies populari aestimatione desinitque etiam, cum Solis centrum 15 minutis est infra horizontem; haec causa 16 dies adjicit temporis, quo Sol videri potest proxime intra polares. Deinde fit propter refractiones in aëre, ut Sol interdum solito citius oriri videatur. Itaque Batavi 14 diebus ante tempus Solem conspexerunt, cum intra polarem biemarent. Tercio crepusculum potissima parte noctis tam longae durat, quia Sol non profunde illis mergitur in diei nostrae medio, nec ultra 70 dies sunt, quibus extincta sunt locis sub polo erepuscula. Quarto, Sole penes ipsos latente, Luna, quoties perueniat arcum exstantem circa Solis oppositum, apud ipsos pleno orbe pernoctat, et tunc quidem diutius, quando ab ecliptica in septentrionem evagatur. Quinto habet et polus septentrionalis otidui lucrum pro australi, quod adjicit diei suae longae. Sexto addunt aliquid chasmata ignita, continua fere, nescio an ab experientia certa.

Dixisti supra, duo esse horarum genera, aequinoctiales et temporales seu καίριας, dic jam, quid sit ἀρα καίριας? Est duodecima praecise pars uniuscujusque diei aut unius noctis artificialis, itaque longorum dierum vel noctium horae καίριας sunt longae, brevium breves.

Unde sunt dictae horae καίριας, temporales? A quatuor anni temporibus, καίριος, in quos distinguitur annus per Solis cursum in ecliptica, de quibus parte quinta.

Quo discrimine et quas ob causas uno genere horarum utuntur praeter alio? Primi cultores astronomiae cum versarentur in locis non ita multum ab aequatore distantibus, non magna etiam scnserunt discrimina diei longissimae noctisque brevissimae. Tunc igitur apud Chaldaeos, Syros, Judaeos (ut in Evangelio) etiamque apud Graecos et Romanos et postea apud Arabes in usu fuerunt horae inaequales istae, ne unquam variet numerus horarum 12. Accessit etiam consuetudo numerandi ab ortu horas diei, ut igitur meridies eandem sedem semper tueretur in hora sexta neque vagaretur per horas, oportuit cujusque diei horas esse eodem numero duodecim. At penes nos Europaeos cum evidentiora sint dierum discrimina et in septentrione brevi terrarum intervallo multum inter se dissimilia, adeoque quibusdam diebus nullus ortus vel occasus, commodior visa est ratio numerandi horas a meridie et media nocte easque toto anno aequales usurpare; haec enim universalior est observantiae facilis, et magni usus in dinumeranda diei noctisque longitudine. Accessit automatorum horologiorum inventio, quae facilius aequales horas indicat, quam inaequales, cujusmodi machinis cum tota Europa referta sit, horae etiam aequales inoleverunt, inaequales in desuetudinem abierunt.

Cur autem in 12 partes divinus est tam dies quam nox potius, quam alio numero? Consentaneum est, primos auctores in hoc voluisse imitari naturam anni, in quo duodecim menses totidem lunationibus constituuntur fere. Nam indidem factum, ut zodiacus in duodena signa et as in partes seu uncias totidem divideretur, ut lib. II. dictum. Accedit et commoditas numeri duodeuarii, qui habet partes dimidiam, tertiam, quartam, sextam et duodecimam, sc. 6, 4, 3, 2, 1. Hermes Trismegistus fertur hunc elegisse

numerus, quod Apis bos, quem Aegyptii pro umniue colunt, quotidie duodecies urinam faceret, indeque ὥρας dictos ab ὕμνος, *urina*. Maestlinus existimat, morem transsumtum a gallinaceis, quod illi cantus suos, tam noctu quam interdiu, duodenis interstitiis dispensent.

Virus es diversa diei initia statuere, recensae igitur consuetudines nationum rationesque cujusque circa hoc diei initium. Etsi principium diei ex ipso coelo natura nullum est, in terra tamen manifesta sunt discrimina lucis et tenebrarum, praesentiae et absentiae Solis et permutationis unius in alterum, quam veluti naturalem sepe plerique spectant. Igitur Judaei incipiunt a vespere, juxta naturam spectantes etiam creationis ordinem: mundo enim jam condito, adhuc erant tenebrae, quibus successit lux, factumque est ex vespere et mane dies unus. Idem tribuitur Atheniensibus, puto quia nox insumta a magistratibus, qui in dies permutabantur, meditatione earum rerum, quas sequenti die suae *πρωτῆρας* agerent, aut quod dies mensis secundum Lunam agerent, quae vesperi, occidente Sole, apparere incipit. Redolent eundem morem etiam horologia Italica et Bohemia, quae 24 horas aequales a principio noctis incipiunt terminantque in occasum Solis sequentem.

Orientis populi, uti dictum, cum oriente Sole diem dieique horas computabant, quod totum *πυγμαίον* a die tanquam potiori denominetur, cujus naturale principium in ortu Solis. Quam numerationem horarum Romani sunt imitati; moris auctores inter Babylonios Chaldaei astrologi fuisse videntur, Judaeorum septimanam imitantes, cujus dies septem inter planetarum dominia distribuerunt finiebantque imperium cujusque planetae cum nocte in ortu Solis. Et numerat sic etiam Epiphanius serias septimanae cum Christianis, eo quod Christus jam orituro Sole resurrexerit, quae praecipua Christiani dogmatis est professio. Hinc est, quod vigiliac festorum, quae sunt noctu, adscribuntur in Calendario Romano diei, quae festum antecedit. Utcunque tamen vel horologia vel munia sacra, profana hoc vel illud initium usurpent, tacito tamen vulgi consensu fit, ut noctem inter binos dies circumstantes aequis portionibus partiamur, tanquam minus conspicuam minusque rebus gerendis accommodam, dum noctem non aliter computamus, quam pro limite communi temporum, ac si tempus illa non esset, eo quod cessatione a rebus agendis et somno, qui morti similis, vitae dissimilis, transigatur. Itaque et Bohemi, quod factum est horis duabus vel tribus post occasum, id non sequenti sed antecedenti diei tribuunt, non curantes horologii sui ordinem; et apud Romanos quae scripta erant tempore antelucano, a die sequenti denominarunt, ante diem huic vel illum scripta esse professi. Astronomi, cum artificialibus diebus ad suas computationes non indigeant, initium naturalis diei spectant, promiscue et pro re nata vel meridiem vel mediam noctem pro principio habentes, propter circulum meridianum, in quo ascensiones rectae loci Solis per omnia Terrarum loca sunt eadem, cum obliquae in horizontibus diversis multum variantur. Et a media quidem nocte incipiunt propter ipsas temporum rationes, a meridie vero propter Ephemerides, in quibus exprimuntur loca planetarum, quae in coelo illi obtinent in puncto meridiei, quod aequaliter a principio et fine diei abest; commodius id rati, praesertim in Sole, propter observationem ejus altitudinis meridianae, a qua omnis astronomica operatio nectitur. Hunc igitur morem imitantur nostra horologia per Germaniam pleraque, quae et in media nocte et, ne tacidior esset pulsuum numerus, etiam in meridie ad numerorum duodecim

principium revertuntur. Itaque nostrum etiam vulgus huic rationi penitus assuevit indeque fit, ut bipartiantur diem in horas ante et post meridiem.

Dixisti de distributione dierum septimanæ inter planetas; velim audire rationem ejus, quam observant Chaldaei. Cum horæ diei sint duodecim noctisque totidem, planetae vero septem hoc ordine: Saturnus, Jupiter, Mars, Sol, Venus, Mercurius, Luna (sic enim ab ipsis numerabantur), ineperunt igitur a prima septimanæ Judaicæ die, tribuentes Soli, auctori diei, primam illius horam, Veneri secundam, Mercurio tertiam, Lunæ quartam; tunc reversi ad Saturnum, quintam eidem tribuebant horam et sic deinceps; veniebat igitur ei etiam duodecima et ultima hora diei, quare Jovi venit prima noctis, et sic fiebat, ut ultima noctis cederet Mercurio; tota vero dies hucusque denominabatur a Sole, ut cui prima diei illius hora erat data. Post Mercurium cum Luna sequatur, Lunæ igitur data prima hora diei sequentis, unde et nomen toti illi diei. Hæc ratione factum, ut semper quartus a priori planeta nomen daret diei sequenti primique dies esset Solis, secunda Lunæ, tertia Martis, quarta Mercurii, quinta Jovis, sexta Veneris, septima et ultima, quæ sancta et solennis erat Judæis, Saturni primi et altissimi ex planetis, tanto majori lusu bujus gratulatione, quod eam diem Judæi ex præcepto divino per quietem et cessationem ab opere transigerent, eum etiam Saturnus omnium planetarum tardissimus esset, ut qui 30 demum annis curriculum absolveret. Unde tandem et Judæi, cognitione planetarum a Chaldaeis accepta, Saturno fecerunt nomen in quiete sabbathoque.

Si diem longissimam sequitur nox brevissima et utraque in 12 horas æquales dividitur, etiam horæ noctis breviores erunt horis diei immediate præcedentibus; an igitur tunc non sit injuria planetis, quibus veniunt horæ nocturnæ tan breves? Equidem penes nos in principio Canceri hora temporalis ultima diei duplo longior est hora prima noctis immediate sequente, nec tamen Babylonii aliter horas observant. Recentiores igitur, ut concinnius disponerent horas, nec injuriam cuiquam planetarum facerent, contendunt, aliam esse faciendam horarum distributionem, sic ut illæ etiam intra unam et eandem diem observentur inæquales, et illæ solæ æquales, quæ meridiem quæque median noctem æqualibus circumstant interstitiis, sic ut in exemplo allegato meridiana saltem hora sit dupla ad horam median noctis, ceteræ versus ortum et occasum paulatim ad æqualitatem reducuntur, sic ut ultima diei sit paulo longior prima noctis, et circa ortum et occasum toto anno temporales ab æquinoctialibus minimum differant: quæ ratione futurum, ut in æquinoctiis temporales horæ rursus sint eadem cum æqualibus seu æquinoctialibus. Alii, quibus ratio ista operosa videtur, contendunt, magis esse consentaneum naturam sequi in hæc inæqualitate et omnium plane dierum totius anni horas inter esse inæquales statuere, sic ut ascensio obliqua cujusque dimidii signi in ecliptica seu graduum 15, a loco Solis initio facto, metiatur unam horam temporalem: quæ ratio in æquinoctio vernali brevissimæ essent horæ circumstantes ortum, longissimæ, quæ circumstant occasum, essetque inæqualitas horarum per diei partes ambulatorio annuo circuitu. Cordati vero astrologi, qui naturæ etiam respectum habent, hæc dominia planetarum aspernantur itaque et distributionum harum subtilitatem otiosum esse censent.

De erepuseulis, noctis artificialis accidente.

Quomodo longitudinem crepusculi inquirimus? Datam esse oportet altitudinem poli PR, declinationem Solis ST, et profunditatem Solis sub hori-

zonte OS, a qua incipit crepusculum. Ea statuitur 16, 18 vel 19 graduum, ut libro primo dictum et parte quinta dicitur amplius. Assumpto igitur N nadir et L polo australi, si declinatio est austrina, et altitudine Solis in hemisphaerio infero OS tanta, quanta est nobis profunditas Solis, vel si septentrionalis, assumpto latere in verticali excedente quadrantem et hemisphaerio supero, quaeritur per doctrinam partis primae TI vel AT, distantia Solis a meridiani semicirculo illic inferiore, PI, qui nobis denotat medium noctis, hic superiore, PA, qui nobis denotat meridiem, et comparatur cum hora ortus Solis, ab eadem media nocte vel meridie numerata. Exempla sunt parte quinta.

Fig. 43.



Quae est crepusculorum varietas per loca et tempora, causarum astronomicarum respectu? 1. In sphaera recta crepuscula sunt brevissima et toto anno, quoad causas quidem coelestes, fere aequalia. Nam Sol in aequinoctia secundum rectitudinem verticalis circuli ascendit, coincidentis cum aequatore, ut ascensio arcus eclipticae inter horizontem et Solem aequalis sit ejus profunditati. 2. In obliquis longissima sunt aestiva, brevissima hiberna crepuscula, augeturque inaequalitas et utrumque longitudo cum ipsa poli altitudine. Fit enim rectangulum ex circulo diei naturalis, horizonte, verticali, ubi arcus circuli, recto QOS subtensus, major est arcu verticalis OS seu profunditate. Et quemadmodum penes nos Sol in aestivis signis celeriter, in hibernis tarde acquirit altitudinem 16, 18 vel 19 graduum, ita etiam in hemisphaerio altero fit hoc in partibus lisdem anni sui, quae tamen cum contrariis anni vestri partibus coincidunt. In aestivis igitur signis Sol tarde fit tam profundus, ut crepusculi lucem exstinguat, in hibernis celeriter. 3. Sub altitudine poli 47° , 48° vel 50° crepuscula solstitialia pernoctia sunt. Ablatis enim 19, 18 vel 16 gradibus ex maximae declinationis Solis $23\frac{1}{2}^\circ$ complemento $66\frac{1}{2}^\circ$, restant illi arcus altitudinum poli. Id multo evidentius et longiori tempore fit in altitudine poli adhuc majori. Ita brevissimum in toto mundo crepusculum, per has quidem positiones astronomicas, habet horam 1. 4', 12' vel 16', longissimum vero terminum nullum habet.

De Climatibus.

Quis est praecipuus unus doctrinae de diebus artificialibus? Astronomi eosque secuti geographi superficiem Terrae distinguunt in climata secundum incrementa diei, adque illa referunt apparentias coelestes, commemorantes, quae illis diversa secundum aliud et aliud clima competant. Pro eo enim, quod in reconditiori astronomia sic loquimur, sub hac vel illa poli altitudine, astronomi et geographi, magis populariter et cum vulgo locuturi, dicunt in hoc vel illo climate.

Quae est ratio nominis hujus? *Κλίματα* a *κλίνειν* quasi inclinamenta dicta sunt pro illis plagis Terrarum, quae a locis sub aequatore veluti solis rectam et libratam planitiem habentibus, ut quibus uterque polus in horizonte est, ad utrumque polum declives esse videntur, sic ut polorum alter illis elevatus esse cernatur.

Quid est igitur clima? Est spatium seu ciugulum Terrae, comprehensum inter duos circulos aequatori parallelos, tantum distantes a se mutuo, ut intra illos excessus diei longissimae supra suam noctem per unam horam aequinoctialem possit variari.

An non sufficit, totam Terrarum superficiem in quinque zonas dividere? Zonae primariae 4 paralleli, qui sunt duo tropici et duo polares, a se invicem discretae, magnam obtinent latitudinem, ut dicetur in sequentibus. Veteres igitur, dissimulato zonarum discrimine, totam illam latitudinem inter aequatorem et polarem nova hac ratione concisius dividerunt. Partiantur etiam zonae totam superficiem Telluris suntque considerationis magis astronomicae, climata, geographis notiora, spectabantur tantum in particula Terrae, quae veteribus erat cognita, quae in longitudine semicirculum, in latitudine quadrantem non excedebat.

Quot parallelis describitur quodlibet clima? Tribus: nam bini semper quodlibet clima terminant, unus vero, per medium fere clima incedens, medium habet diei longitudinem inter longitudines initii et finis. Veruntamen unus semper idemque parallelus est initium unius climatis et simul alterius finis.

Suntne climata aequalis latitudinis? Minime, semper enim, quae sunt aequatori propiora, latiora sunt.

Estne certus parallelorum et climatum numerus? Cum omnia pendeant a geographorum arbitrio, non mirum est, numerum apud diversos variari. Ptolemaeus initio parallelos per semisses horarum differentiae inter diem et noctem disposuit, hoc est per quadrantes incrementorum diei longissimae: ut ita clima quodlibet differentiam inter diem et noctem una hora augeat; qua ratione eum pervenisset ad parallelum decimum quartum et climata inciperent dimidio minus habere de latitudinis primorum, subito statuit sequentia incrementa dupla priorum, sc. horarum semisses, ut climata rursus haberent latitudinem primorum. In decimo nono parallelo rursus attentabantur climata ad prioris latitudinis dimidium, igitur inter hunc et vicesimum rursus statuit duplum prioris incrementi, scilicet horam integram. Climatum vero numerum auctor idem continnavit in hemisphaerio septentrionali usque ad septimum, in quo coeperat parallelos dilatare. Recentiores vero, retenta distantia unius quadrantis horarii, parallelos ab aequatore usque ad polarem 48 numerant, climata vero 24.

Ubi ponitur medium primi climatis? Primum clima habet in sui medio differentiam longissimae diei a nocte brevissima horarum duarum, secundum horarum trium, tertium quatuor et sic consequenter.

Cur non inceperunt ab aequatore, ponentes medium primi climatis, ubi differentia diei et noctis est horas unius, sicut semper in sequenti climate differentia haec est una hora auctior? Prima portio de hac aequabili progressionem per integras horas, differentiae inter diem longissimam et noctem brevissimam, eis et ultra aequatorem (ut et media regio sub ipso aequatore, in ejus medio differentia haec est nulla) ideo non fuit numerata inter climata, quia debebat etiam aliquod justum spatium reputari pro recto mundi situ et non inclinatio, ejus respectu situs ceteri κλίματα, hoc est inclinatione diei possent. Quare sicut alias in arithmetica generaliter numeri 2, 3, 4 et reliqui respectu 1 (unitatis) dicuntur numeri, unitas vero non venit in censum numerorum, sed statuitur pro illorum principio: sic etiam hic inclinatio tanta, quae efficiebat in medio horam unam, non habita fuit pro inclinatione seu climate. Accessit alia causa, quod interiora et aequatori proxima loca minus

erant habitata et cognita, cum, qui astronomicas apparentias illo tempore conscribebant, illi studerent illas accommodare ad usum circumjectarum et cognitarum nationum.

Num tantummodo a numeris denominarunt climata? Imo crebrior magisque ad usum accommodata erat denominatio ab insignioribus locis, circa medium cujusque climatis jacentibus. Itaque haec erant illis nomina: *δια Μεσοτης*, *δια Συνετης*, *δια Αλεξανδρουσας τε Αιγυπτου*, *δια Τροης*, *δια Ρωμης*, *δια Ηερου*, *δια Βορυσθηριος*. Australia denominari possent a borealibus, quorum sunt rationes oppositae, ut *αρκι δια Μεσοτης* etc.

Quis est usus doctrinae de climatibus? Potissimus ejus usus versatur in explicandis et intelligendis scriptis veterum astronomorum, geographorum et medicorum. Hodie non ita creber est eorum usus, nam pro mentione hujus vel illius climatis usitatius nos ipsam poli alterutrius altitudinem exprimimus.

Quomodo ex dato climate investigatur altitudo poli? Dato climate, datur differentia diei a nocte brevissima, nam in primo climate est haec differentia duarum horarum, in secundo trium et sic consequenter. Sit clima septimum; differentia est horarum octo, sic ut nox brevissima habeat horas octo, dies longissima sedecim; tempus semidiurnum horae octo, excessus igitur supra aequabile (horarum 6) horae duae, seu tempora aequatoris 30. Ex his igitur, quae supra sunt tradita, differentia ascensionalis est 30°. Formatur igitur triangulum idem QTS, quod supra (fol. 225), ab horizonte, aequatore et coluro solstitiorum, in quem Sol incidit, cum diem facit longissimam. Cetera habent ut supra; processus specialis est iste:

Declinatio maxima 23° 31' 30" tang. 43533

Differentia ascensionalis: 30. 0. 0. sinus 50000 dividat.

Quotiens 87066 tangit 41° 2' 30" altitudinem aequatoris. Ergo complementum ejus 48° 57' 30" est altitudo poli.

Quomodo via contraria ex altitudine poli scitur clima? Quacrenda est ex superioribus doctrinis differentia ascensionalis, Sole in solstitio versante, et ex illa longitudo diei, quae ad suam noctem comparata prodit argumentum climatis.

Eto altitudo poli 41° 21'. Quare differentia ascensionalis maxima invenietur 22° 30', qui faciunt h. 1. 30'. Semidiurnum igitur tempus est h. 7. 30'. Dies 15 horas longa, nox 9, differunt horis 6. Haec vero differentia indicat medium climatis quinti, *δια Ρωμης*.

LIBRI TERTII

PARS QUARTA.

DE TEMPORIBUS ANNI ET QUANTITATIBUS ZONARUM.

Quot sunt anni vertentis partes, tempora naturalia seu tempestates? Quatuor: ver, aestas, autumnus, hiems. Etsi veterum historicorum aliqui duas tantum usurpent, aestatem et hiemem.

Unde dictae sunt? Aestas, Graecis *ἔρος*, utraque voce ab aestu dicta est, quod illa pars anni ferveat, Germanis *der Sommer* a Solis praesentia. Hiems a pluvia, quia *ἕμς* Graecis est pluiere, quod coelum plerumque turbidum illam anni partem praesertim in Italia teneat, Graecis *χειμώνας* est procellosa aëris constitutio, quippe vocem a fundendo pluvias derivari volunt. Germanis *der Winter*, a copiosis ventis. Ver graece *ἄρ* et *ῥε*, unde latinum ver, ab hebraea vel syriaca voce *Eijar* derivata videtur, qui in anno judaico secundus est ex mensibus vernalibus, unde et Germani suum *Jahr* derivant. Cognationem *Eijar* habet eum hebraeo *aër*, quod vaporem significat, unde graecum *ἀῖρ*, latinum *aër*. Germanis est *der Frühling*, *das Fröhe* oder *Vorjahr*, quasi matutina pars anni. Autumnus *hetruscam* terminationem habet; cognata tamen vox videtur graecae *ἀύτη*, quae a crebra expiratione nebularum dicta videtur. Graece *ὀπωρῆ*, *ἀπο τοῦ ὄρος*, a succulentis forte arborum fructibus: unde et Germanorum *Obst*, quod fructus arboreos significat. Germanica nomenclatura *Herbst* a populando descendere videtur; unde *verheren*, *vastare*, *herling*, racemus superstes foliis delapsis.

Quibus qualitatibus inter se distinguuntur haec tempestates anni? Aestas calida est, hiems frigida, reliquae tempestates tenent medium.

Forsitan igitur longitudo dici, quae est aestate, causa erit caloris, brevis frigeris? Etsi haec est inter causas, non est tamen pleuaria et genuina causa. Nam longiores sunt dies in zonis frigidis, quam vel in temperatis vel in torrida, aestas tamen major est in torrida.

Quae est ergo ex coelestibus genuina causa caloris et frigeris et sic aestatis et hiemis? Appropinquatio Solis ad verticem temporibus meridianis est causa aestatis, et recessus ejus a vertice in boris meridianis, quando omnium proximus esse potest vertici, est causa hiemis.

Unde est hic accessus et recessus Solis? Ex obliquitate eclipticae, sub qua Sol videtur incedere. Nam ejus semicirculus ab aequatore vergit versus sep-

tentionem $23\frac{1}{2}$ gradibus, alter totidem gradibus in meridiem infra aequatorem dejectus est. Summu utriusque 47° efficit variationem altitudinum Solis meridianarum, plus quam senissem anguli recti.

Cur autem Sol altus et vertici propinquus magis calefacit, quam humilis et horizonti approximans? Quia quanto altior, tanto rectiori radio ferit planities Telluris, tanto igitur fortius. Humilis vero ex obliquo terras illuminat, quae irradiatio, ut alias in ictibus, ob declivitatem irrita et imbecillis efficitur.

Quonodo describuntur et definiuntur anni quatuor partes, ver, aestas, autumnus, hiems? Ver in zona temperata est illud temporis spatium, quo Sol ab aequinoctio ascendit ad solstitium, aestas, a solstitio ad aequinoctium autumnale, autumnus ab eo ad solstitium alterum brumale, hiems a solstitio brumali ad vernale aequinoctium.

Quid appellas hoc loco solstitium, quid aequinoctium? Supra libro secundo erant ipsu quatuor eclipticae puncta cardinalia, hic vero solstitium significat tempus seu dies illos anni, quibus Solis declinatio ab aequinoctiali consistere videtur; seu potius illud momentum, quo Solis centrum solstitialia puncta attingit, in quibus maxime declinat indeque ad aequatorem redire incipit; aequinoctium vero illud momentum, quo Solis centrum occupat puncta aequinoctialis, diem antecedentem faciens aequalem nocti sequenti vel contra. Graeci solstitia significantiore voce nominant *ῥεπτης ἡμέρη*, conversiones enim Solis in momento sunt. Appellant et quatuor centra seu puncta, voce a punctis sphaerae translata ad tempora anni respondentia; Hebraei sunt thecaphae. Latini sermonis consuetudine solstitium altum intelligitur, cum solstitium nominatur; humile vero bruma dicitur. Graeci conversionem aestivam vel hibernam dicere solent.

Videtur non recte definita aestas; nam si Solis altitudo aestum intendit, cur non a medio Tauri per Cancrum usque ad medium Leonis quadrans aestivus numeratur, ut maxima Solis altitudo et sic maximus aestus in ejus medio sit, fines quadrantis utrinque habeant aequalem Solis altitudinem? Non solae causae coelestes efficiunt aestivos menses calidos a $12\frac{1}{2}$. Junii in $15\frac{1}{2}$. Septembris, sed plurimum hic potest materiae tarditas. Nam etsi Sol aequae altus est in medio Tauri et in medio Leonis, at crassum Terrae corpus demum ineipit calefieri, Sole in Tauro versante. At in Leone Sole transgresso, calor jam tres menses duravit, et Terrae jam antea fervefactio novus quotidie calor superingoritur calore quo haerentes aliquamdiu in materia accumulatur. Haece etiam causa est, cur dies ferventior sit duabus horis post meridiem, quam ipsa hora meridiana. De hieme judicium idem esto. Nam etsi quadrantes autumnalis et hiemalis humilitate Solis aequales sunt; per autumnum tamen calor est aliquis, hieme merum frigus, quia, Sole post aequinoctium paulatim discedente a nostro hemisphaerio, Terra, caloris aliquid ex aestate retinens, tempore opus habet, ut refrigeretur, hieme vero Terra jam satis frige facta nivibusque et glaciei crustis obiecta non ita facile a radiis Solis nudari, refoecillari et calefieri potest, etsi Sol seorsim paulatim a puncto eclipticae humillimo per eosdem gradus altitudinis, quos habuit in autumnali quadrante, sustollit. Recte itaque faciunt astronomi, quod tempora, a qualitatibus denominata, redigunt intra metas quadrantum cardinalium, non punctorum Intermediorum.

Quae est zonarum quinque comparatio cum quatuor anni tempestatibus? Torrida respondet aestati, frigida hiemi, temperata vero veri et autumnos.

Quo argumento nititur haec comparatio? Quia aestus causam diximus esse Solis altitudinem, consummatum igitur aestum praestat consummata Solis altitudo, quando sola agit, non adiuta tempore. Jam vero in zona torrida est consummata Solis altitudo; definitur enim zona tropicis duobus, intra quos Sol locis singulis quotannis binis meridiis in ipsum verticem venit, eum ecliptica, Solis iter, porrigatur ab uno tropico ad alium. Vicissim quia hiemis causam diximus esse Solis humilitatem temporibus meridianis: plenaria igitur Solis humilitas, hoc est depressio sub horizontem et sic absentia tempore meridiano merum frigus causatur. Jam vero in zonis frigidis, quas circulus polaris circumseribit, nullus est locus, qui non per aliquot anni dies Sole careat, ut demonstratum parte tertia. Recte igitur istae zonae a frigore, torrida a calore, quo torretur, denominantur. Relinquitur igitur, ut temperatae zonae temperatis anni partibus comparentur, quia intra tropicos et polares sunt constrictae, nusquam Solem passae verticalem, nusquam Sole per totum diem naturalem unquam carentes.

Receae varietates solstitiorum, aestusque et hiemis, per septem positus sphaerae ab ecliptica distinctos, quibus quinque zonae distinguuntur et terminantur. In zona torrida solstitia nusquam nisi in ejus terminis Solem habent altissimum. Cum igitur maxima Solis altitudo in meridie deficiat aestatis principium, minima hiemis: non igitur ineipit hic aestas ab alterutro solstitio, nisi in extremitate zonae, sub tropico; cetera loca torridae intermedia analogice loquendo duas habent aestates, Sole per verticem transeunte, duas hiemes, Sole in solstitiis existente, quando quam potest longissime deflectit in meridianis horis ab illorum verticibus ad latus utrumque mundi. Reliquae zonae singulas habent aestates, singulas hiemes in annos singulos, illam a solstitio alto, hanc ab humili ineipientes. Sub aequatore igitur, in medio zonae torridae, binae aestates sunt in binis aequinoctiis, hiemes binae aequaliter fere inter aestates interjectae, quibus temporibus penes nos aestatis hiemisve principium est: utrobique enim aequaliter illis a vertice Sol deflectit. Haec tamen varietas perpetuae temperiei similior est, quam aestati et hiemi. Sol enim non multorum dierum meridianis horis in verticem incidit, sed celeriter ab austro transit in septentrionem et vicissim, cum potissimam temporis partem in arcibus solstitio vicinis consummat. Dies etiam tam aestivi quam hiberni, cum suis noctibus sint aequales, habent igitur fervoris aestatis interposita justa nocte gratam temperiem; habent hiemes Solem, eum longissime absistit in solstitiali meridie, vicinum adhuc vertici, nec longius $23\frac{1}{2}$ gradibus absistentem, cum apud nos in aestate nostra distet longius. Itaque causae hiemis ipsorum plus disponunt ad fervorem, quam causae nostrae aestatis.

Inter aequatorem et tropicos, scilicet in uno latere zonae torridae, bini quidem sunt dies anni, quibus diebus Sol illis summum causatur aestum, per verticem quippe transiens; at illi bini dies cum discessu loci ab aequatore et sibi invicem et uterque solstitio paulatim appropinquant: sic ut hiema seu remissio caloris una, duabus interposita aestatibus, hieme contraria sit brevior adeoque et calidior, quia Sol in illa non tam longe discedit a vertice, quam in altera, dies etiam et eum illi aestus longiores habere incipit, quam non tantum in hieme altera, sed etiam vel in ipsis binis aestatibus. Adeoque in locis tropico vicinis aestates illae binae, solstitium circumstantes, adeo eocunt, ut hiemem alteram, quam habere zona torrida potest in solstitio altiori, penitus elidant inque continuam aestatem convertant. In summa, zona torrida perpetuum quodammodo sentit aestatem, respectu zonarum ceterarum; hiemem,

hoc est frigora, pene nullam. Temperatur tamen, cum ferventissima est, perpetuis imbribus et coelo nubilo, aut ventis frigidis flantibus ex montanis altissimis, quae in illa zona nihilominus nive perpetuo sunt tecta. Sentiturquo gratissima haec et efficacissima refrigeratio, primum atque quis se vel sub arboris campestris umbram ex violentissimis Solis radiis receperit, ut testantur, qui multorum annorum experientiam illis in locis sibi compararunt.

Sub tropico, in confinio zonarum torridae et temperatae, primum incipit aestas unica confici in ipso alto solstitio et die longissima: tunc enim Sol illis per verticem transit; reliquo anni tempore toto praeter verticem vectus in austrum declinat. Aestas autem hic est violentissimus longeque intensior, quam in locis versus aequatorem vel sub eo: quia Sol tunc et a vertice demittit radios, et multos ordines meridianos, nulla propemodum mutatione declinationis animadversa, continue affligit et dies longos, noctes breves efficit. Quin etiam bisce seculis sub tropico Cancrī violentiores sunt istae causae, quam sub Capricorni, quod Sol motu proprio diutius in septentrione commorari videatur, quam in austro.

Inter tropicum et polarem, seu in zona temperata, loca tropico vicina nihil differunt ab illis, qui sub ipso tropico. Quo vero longius a tropici recesserimus, hoc plus etiam Sol meridianus in solstitio desistit a vertice, hoc minus etiam urit aestate minusque calefacit hieme, quanquam in compensationem nonnullam deficientis rectitudinis radiorum accipit longas dies per aestatem, et quo longius Sol meridianus a vertice abfuerit in solstitio, hoc dies sunt productiores, at simul etiam hoc violentiores hiemes, Sole et parum se attollente, et paucis horis quotidie lucente. Summatim dicendo: solis pene zonis temperatis propria est permutatio aestatis et hiemis, comparatione instituta ad zonas ceteras.

Sub polari circulo, qui confinia signat zonae temperatae et zonae frigidae, primum vera et consummata causa frigoris hiemisque sese in conspectum profert, Sole in hiemali solstitio non oriente in uno die naturali, penitus scilicet non calefaciente terram. Quemadmodum vero sub tropico adhuc est continua pene aestas, pro hieme vero tantum aliquantula remissio caloris, ita sub polari e contrario continua pene hiems est, pro aestate vero tantum aliquantula remissio frigoris, cum Sol, quamvis continuas 24 horas luceat, nunquam tamen attollatur altius 47 gradibus, quantam altitudinem penes vos habet mense Aprili et Septembri, proinde imbecillior est vis calefactoria, quam ut nives et glaciem per hiemem saevissimam generatam dissolvere mature possit. Et ut sub tropico aestas violentior est quam in medio zonae torridae, ita vicissim sub polari calor aestivus qualiscunque minus habet virium quam in medio zonae frigidae, eo quod Sol nivosos montes non ex omni latere nec continua praesentia illuminet, ut jam patebit.

Inter polarem et polum seu in zonae frigidae lateribus hiems est prope continua, aestas nulla, nisi si resolutionem glaciū velimus aestatem appellare, ejus respectu, quo propius polum venit, hoc humilior quidem Sol est meridianus horis dierum solstitialium, at vicissim hoc etiam altior manet in mediis noctibus illa anni parte, quando non occidit, atque ita glacies et nives et gelu induratas glebas undique circumvectus, nullo spatio concessio frigoribus ad se recolligenda per suam absentiam, quippe nunquam absens, aliquid sane virium per aestatem colligit ad dissolvendum gelu, minus quidem prope polarem, plus vero versus polum ipsum. E contra frigoris hiemalis diuturnitas augetur cum ipsa nocte continua, cui tamen succedit aliqua adhuc vicissitudo dierum et

noctium, et in eorum medio fruuntur aequinoctiorum binorum conspectu, praeter solstitium aestivum. At hibernum solstitium, seu Solis in maxima declinatione meridiana consistentis observationem longa illis nox et terrae glacialis horizon superiectus occultant et eripiunt. Et aestivi quidem solstitii duo sunt argumenta, alterum in meridie, si Sol jam non altior fiat quam pridie, alterum in opposita diei parte, quae nostrae respondet mediae nocti, si Sol etiam tunc consistentem prope naneascatur altitudinem, quaeque ante et post minor deprehendatur.

Sub polo, qui medius zonae frigidae situs est, nuncium rursum idque in tota circumvolutione Telluris observabile est solstitium, sine discrimine meridiei vel mediae noctis. Nec enim altior est illis Sol una hora quam altera, nec plagas Terrarum, ut nos, ad Solis siderumque motum discernunt; perit apud ipsos omnis vicissitudo dierum et noctium nostratum, nulla aequinoctiorum est scientia, nulla solstitii hiberni; idem est ipsis dies, quod aestas, idem nox, quod hiems, semestri utrumque longitudine, Solis in medio aestatis et diei tanta altitudo, quanta Italiae in media hieme. Cum nos habemus aequinoctium, hoc est cum nobis Sol dimidio diei naturalis manet conspicuus, ipse dimidiatum Solis corpus conspiciunt: si tamen aëris, refractionis rationes hasce non turbat. Consuetaneum enim est his, quae Hollandi in zona frigida observant, saepe fieri, ut Sol, quamvis australis, in certa aliqua horizontis plaga (quam montibus tantummodo notent necesse est) vel etiam in pluribus plagis, incidat in evaporationes Telluris recentes, adhuc pellucidas, nondum scilicet frigoribus domitas, perque illos radios refractos subito se ingerat in conspectum, iterumque revoluta Terra et sicciore plaga objecta, disparcat. Quantum autem glaciei nivumque per integrum semestrem absentiae Solis colligatur, quanta vis sit illius hiemis, cuilibet facile est aestimare, et Hollandi nonnulli in rem praesentem venerunt. Ac etsi frigora haec Terram incrustantia non penetrant interiora ejus viscera, etsi Terra iustus naturalis facultate calet, etsi Sol praesens toto semestri glaciemque circumvectus aequabiliter eamque ex omni latere lambens, liquans atque consumens, aliquid sane proficit ad depellendam hiemem, tamen adhuc supersunt venti frigidi ex circumjectis locis, solari tractui vicinis (ubi vis glaciei major), spirantes, qui hoc aestivum Solis opus non parum impediunt quoties perfiant.

Itaque ut summariam quandam comparisonem instituamus: in zona torrida aestas dominatur, in frigidis hiems prope continuus, in temperatis quaedam utriusque est vicissitudo, aequabilis in medio, ad latera vincit proprietas zonae vicinae tributa.

Quam observant astronomi differentiam umbrarum inter zonas? Lucolas torridae zonae dicuntur ἀμφοτέρως, frigidarum περὶ ἑκάστην, temperatarum ἰσότητι; ubi particula ἀμφί valet idem quod in voce ἀμφιδέξιος. Nam in zona torrida habent umbram utramque, hoc est dextram et sinistram, sic denominatas a plagis, in quas moveri cernuntur. Hoc vult Lucanus poeta, cum canit

Ignotum vobis Arabes venistis in orbem

Umbras mirati nemorum non ire sinistras.

Arabia enim felix sita est in zona torrida, ubi Sol non tantum in septentrionem projicit umbras in solstitio brumali, sed etiam in austrum, in contrario solstitio. Cum igitur umbra pergat viam Soli contrariam, Sole se. verus occasus promotus, ipsa tendat ad ortum: ergo spectanti suam umbram septentrionalis quidem videbitur versus dextram pergere, plane ut nobis, australis vero versus sinistram, quae umbra nos carens. Nam ex zonis

temperatis quaelibet habet alterutram tantum umbram, septentrionalis dextram, australis sinistram: rectius igitur *ἐκταρσμοί* diceantur. Frigidarum luculae sunt quidem et ipsi *ἐκταρσμοί*, sed placuit auctoribus, illos a peculiari proprietate indigetare periscios, eo quod umbrae illis, Sole non occidente, circumcirca per omnes horizontis plagas agantur.

Quas figuras describit extremitas umbrae in qualibet zona super horizontis plano? Materia est propria gnomonica, genuitque nobis in geometria doctrinam de sectionibus conicis. Imaginandus enim est conus, cujus basis sit circulus diei naturalis, vertex in extremitate stili, cui est ad verticem conus alter, quem secat horizontis planum, sectio circumscribitur per extremitatem umbrae mobilem. Ergo iter umbrae aequinoctialis in omnibus zonis est linea recta, praeterquam sub polo, ubi linea projectionis umbrae est horizonti parallela, itaque in eum non incidit. Reliquarum umbrarum iter, quod illae suis extremitatibus signant, est sectio conica: quarum cum sint tria genera, sicutae, ut ellipsis vel circulus, infinitae ut hyperbola seu sectiones oppositae, et media earum parabole, finitatem quadamteus affectans, cum sit tamen et ipsa infinita: in solis igitur frigidis zonis omnes hae figurae existere possunt, sic ut illis propria sit ellipsis, quae sub ipso polo est circulus perfectus, seu potius spirales, circulum vel ellipsin affectantes, si plurium dierum, quibus Sol non occidit, copulationem respicias; planum enim horizontis secat tunc conus latius utrumque. Die vero illo, quo Sol horizontem stringit in media aequinoctiali, jam occasurus sequentibus diebus, iter umbrae est parabole, quia planum horizontis est parallelum superiori lateri coni, quippe cum declinatio Solis fiat aequalis altitudini poli. Et haec parabole sub polari circulo sola locum habet in unica die solstitiali: ut sicut ibi terminatur zona frigida, sic ibidem terminetur et ellipsis et parabole. Postea vero quam incipiunt invicem per vices succedere dies et nox tam in frigidis, quam in temperatis et torrida, figura itineris umbrae est hyperbola, seu sectiones oppositae, communis figura zonarum omnium umbris. Nam planum horizontis secat axem conorum (axem sc. mundi) extra conorum vertices. Quo vero discrimine sint sectiones oppositae in unaquolibet zona, id particularius explicatur in gnomonica.

Ubi et quando possunt umbrae rerum perpendiculariter erectarum fieri retrogradae? In zona torrida, quando altitudo poli major est declinatio cognominis: tunc enim, cis aequatorem oriente Sole, umbra hominis ad dextram fertur ab occasu hiberno versus occasum aequinoctialem, ibi aliquamdiu evincta veluti consistens interimque brevior effecta relegit vestigia versus sinistram, sc. versus occasum hibernum, et austrum, et ortum primo hibernum, deinde aequinoctialem, ubi iterum stationaria, Sole jam occasuro, secundo fit retrograda versus dextram et ortum hibernum.

Estne etiam penes nos aliqua cognitionis hujus exoticæ utilitas? Conducit ad constructionem sciaticorum ex variis planis compositorum, quorum hoc repraesentat horizontem zone torridae, illud zone frigidae et cetera.

De causis numeri et latitudinis zonarum.

Ut intelligam, tantam varietatem temperierum anni dierumque et noctium et quae inde dependet zonarum, ex una sola inclinatione axis, circa quem Tellus rotatur, existere: dic quid tunc esset, si axis Telluris non esset inclinatus? Si axis ille rectis angulis insisteret plano eclipticae, Terraque sic circa illum rotaretur ut nunc, et simul circa Solem ut nunc circumferretur, constanti hoc recto angulo: tunc Sol quidem annuo spatio sub fixis stellis

circumire et in dies singulos oriri et occidere videretur; at nulla esset distinctio eclipticae in medietates, quadrantes vel signa, nulla distinctio anni per qualitates diversas aestus et frigoris, omnes dies omnibus noctibus aequales, nulla distinctio in globo Telluris, nisi secundum magis et minus. Nam cum sic axis Telluris parallelus statuatur axi eclipticae, poli mundi imaginarii etiam coinciderent cum polis eclipticae. Duo ergo puncta essent in Telluris superficie, quibus Solis corpus dimidiatum aeternis rotationibus horizontem circumficeret, nunquam se attollens, nunquam mergens; ab his quo propius aequatorem veniretur, hoc altius in meridie Sol fieret, sed semper toto anno in altitudine constanti, donec sub aequatorem veniretur, ubi Sol perenni dierum nocturnumque vicissitudine semper in meridie verticem supergredereetur, summa igitur et unica et perpetua illis esset aestas, summa et unica et perpetua sub polis hiems. Sol etiam in quovis loco sic oriretur et occideret, sicut nunc aliquam stellam fixam, easdem perpetuo plagas horizontis observans. Itaque tantummodo ratione diei et noctis esset aliqua vicissitudo in Terra, nulla ratione anni, perinde enim esset, ac si Terra annuo motu non circumficeret circa Solem, nisi tantum, quod aliis anni temporibus alias stellas, ut nunc quoque, visura esset.

Quid vero, si axis Telluris totaliter inclinatus jaceret in ipso plano eclipticae, retinens interim dum Terra circa Solem vehitur, situm parallelum? Tunc essent saepe vicissitudines, non tantum dierum et noctium per revolutionem Telluris circa axem, sed etiam temporum anni per circumlationem Telluris, sed essent vicissitudines improprietariae et omnibus terrarum locis omnes quodammodo communes. Nam poli eclipticae viderentur circumvolvi in aequatore, poli mundi essent in ecliptica, scilicet in principio Cancri et Capricorni, Sol igitur aestate veniret in polum mundi supernum, hieme in inferum: illic faceret his, qui sub polo habitant, diem unius semestris longitudine, et in illius medio adurere illos violentissime, quippe et rectis angulis, ut jam in torrida, et simul non occidens, ut jam in longa die zonae frigidae, insuperque non permutans locum ex loco. Hieme contra rigerent illi sub polo aequaliter ut nunc, noctem vero meram profundissimamque et nullo crepusculo, ut nunc, dilutam haberent, ita per aestatem flammis et squalore, per hiemem gelu et tenebris encareantur: extreme contraria in unum locum ingruerent.

Vicissim qui sub aequatore habitant, his Sol in punctis aequinoctialibus per verticem, ut nunc, transiret, in punctis solstitialibus subsideret usque ad horizontem ibique in uno horizontis loco velut in torno rotaretur, alias et alias corporis sui particulas spectandas exhibens.

Ita locis inter polos et aequatorem intermediis omnibus convenirent omnes omnium zonarum proprietates. Nam et Solem verticalem haberent binis per annum aestatibus, et continuos dies in una suarum hiemum, et continuas noctes in altera hiemum. Qui propius polum sunt, haberent et continuam diem et Solem continue verticalem eodem tempore eoque non modico.

Die etiam, quid tunc fieret, si quacunque axis Telluris inclinatione constanti posita, situs axis non maneret parallelus in circumlatione Telluris, sed Solem ipsum perpetuo respiceret? Quid futurum fuerit, recto inclinationis angulo posito, dictum est initio; nulla esset vicissitudo. Idem sequeretur, si axis in planum eclipticae projectus, Soli perpetuo recta obversus maneret, nisi quod illic poli mundi coincidunt cum polis eclipticae, hic in ipsa ecliptica annuo motu circumficerent et quae hinc sequuntur. Inclinato vero

axe posito, sic ut axis cum linea, quae centra Solis et Terrae connectit, constantem tueatur angulum obliquum, in plano tamen ad planum eclipticae recto, quaecunque varietas et vicissitudo contingit ad positionem cujusque anguli inclinationis, ea jam per annum totum vicissitudo nulla esset, sed loca diversa Telluris tanto majori diversitate afficeret, quanto esset obliquior, sic ut loca, quae nunc semel in anno Sol degerit, tunc aeternum Solis conspectu essent privata, quae Solem habent semel in anno non occidentem, tunc illius jugi conspectu fruerentur, nec sub aequatore, sed sub tropico, aut (si axis plane stratus esset in planum eclipticae, ad Solem porrectus) sub ipso mundi polo semper Solem verticalum haberent. Fixae totum zodiacum emetiri viderentur spatio annuo, polo Terrae vel sub ipsa ecliptica vel sub alio parallelo circuitum annum absolvente. Ita fixae, quae loci rationem habent, non fixae, Sol, qui locati, fixis censeretur, quin oppositis anni partibus in motu diurno contrarias incederet vias; magna esset, confusio motuum, difficillima comprehensio.

Nec aliud quicquam sequeretur, si angulus inter axem Telluris et lineam centra connectentem esset in plano obliquo ad eclipticam: nisi quod tunc Sol non sub tropico circulo, per initia Caneri vel Capricorni traducto, sed sub aliquo interiori et (axe tunc in planum proeumbente) rursum in tropico in latum ambulatorio moveri videretur. Ubique deest vel vicissitudo tempestatum anni, vel distinctio zonarum ad vicissitudines accommodata, vel utrumque.

Cum ergo rejectus sit angulus axis cum eclipticae plano rectus, ne nulla esset vicissitudo, rejecta sit inclinatio totalis, seu mera projectio axis in planum eclipticae, ne nimia esset: cur non electus est angulus medius inter 90 et 0, sc. 45°, semirectus? Si angulus iste semirectus esset, zonae tantum tres essent, una torrida, duae frigidae, et ubi desinit aestate Sol fieri verticalis, ibidem desineret in solstitio hiberno oriri. Contrariae qualitates aestatis et hibernis sic inter se distributum haberent globum Telluris, ut nulla media et temperata regio intercederet; cum alias naturaliter qualitates istae recipiant medium.

Unde igitur putas desumtam esse a sapientissimo conditore quantitatem anguli, quo axis Telluris inclinatur, seu quod idem est, declinationis eclipticae? Equidem et precor casta mente, ut propitio illius numine, ut favente, ut dictante illius spiritu de consiliorum ejus arcanis disserere possimus, et fas, quin et jus esse existimo, inquirere modeste in numeros, mensuras et pondera, ad quas regulas ipse omnia condidit, quia ipse harum rerum notitiam homini secum communem fecit eaque in re non minimam particulam statuit imaginis suae in homine, comprobans, quam secerat, ut valde bonam, probaturus multo magis, si hujus imaginis lumino etiam usum numerorum, ponderum et mensurarum, quem ipse creando demonstravit, in cognitionis lucem proferamus. Non sunt enim haec arcana talia, quorum scrutatione nobis sit interdictum, sed sunt nobis speculi loco posita, ut illorum explicatione bonitatem et sapientiam Creatoris quadamtenus intueamur.

Cum autem duo potissimum sint causarum genera, quae Creator Opt. Max. passim secutus esse deprehenditur: formalis, seu pulchritudo archetypi, et finalis, seu utilitas animantium: Igitur existimo, si Creator hac in conformatione respexisset pulchritudinem figurarum demonstrabilium, non electurum fuisse quindecangulum, cujus latus abscindit de circulo 24°, quantum obliquitatem eclipticae observarunt Indi, paulo minus Eratosthenes, sc. 23° 51' 1/2". Quamvis enim quindecangulum sit figura demonstrabilis, demonstratio tamen

ejus remotum obtinet gradum ab aequalitate et accidentaria quodammodo est quindecangulo ut tali propriaque potius triangulo et quinquangulo, quarum figurarum vi et proprietatibus expeditur haec demonstratio, vide supra fol. 202. figuram. Equidem haec extranea quodammodo demonstratio nihil quindecangulo prodest ad compositionem corporis regularis, cum ceterae figurae demonstrabiles hanc compositionem et *συναρμογήν* juvent varie. Pulchritudo igitur figurarum alium habet locum, et nominatim in conformatione orbium coelestium, in distributione zonarum usus animantium, quae illam incolituras erant, praecedere debuit. De illo vero usu jam est dictum, oportuissio esse aliquam varietatem et vicissitudinem. Cum enim Soli calorem habeat, Terra frigus, ex natura materiae, sit vero corpus opacum rotundumque, Sol certe, nisi motu intercedente, callescere totam ex omni latere nequibat, proptereaque revolutio Telluris circa axem diurna decreta esse videtur, ut supra libro primo disputatum. Rursum, quia Terra futura erat domicilium generandorum et corrupturorum, non oportuit igitur partes Terrae singulas aequabiliter omni tempore a Sole affici, pro suo quaque modulo. Sic, quia per revolutionem simplicem, axe ad eclipticam planum recto, poli et loca polis vicina deseri a calore videntur, oportuit inclinari axem, ut illae partes alternis Soli obverterentur. Denique revolutione simplici et axe recto, ut supra dictum, frigus in duobus saltem punctis spectabatur, calor in unica solum linea, quae nullam habet latitudinem: tota sphaerae superficies sine manifesta distinctione confusas habitura fuisset caloris et frigoris metas. At placuit conditori, distinguere ut lucem a tenebris, sic metas etiam et regiones tractusque lucis et umbrae, caloris et frigoris. His de causis oportuit axem inclinari.


Tertio cum vel simplex revolutio Telluris, axe recto ad planum eclipticae, signa quaedam ponat frigori sub binis polis, et calori sub aequatore, tractus igitur zonarum frigidarum polis, torridae aequatori circumjici, frigidas duas, propter polos duos, torridam unam fieri oportuit.

Quarto, cum bonum non esset, extrema jungi sine medio, duas igitur temperatas intercedere oportuit.

Quinto, his ab usu desumptis jam pulchritudinis respectus colophonem imponat. Nihil enim magis in geometria pulchrum est aequalitate, si nihil illi obstet. Non est itaque dissimile veri, Creatorem ab initio latitudes zonarum quinque aequales ordinasse. Cum autem meridianus per polos traductus secet torridam et temperatas locis oppositis, hinc sunt portiones meridiani sex, quibus accedunt singulae singularum frigidarum sectiones, suntque numero octo portiones. In schemate CE, EI, IM, MN, NR, RS, ST, TC.

His igitur elementis, non vero respectu aliquo pulchritudinis in ipsa figura octangularem, non inscriptione ejus in meridianum, puto constituisse divisionem meridiani terrestris octonariam; ut esset communis omnium zonarum latitudo 45° , miliarium germanicorum 675, declinatio eclipticae $22^\circ 30'$.

Fig. 44.



Videris alienam a veritate tradere latitudinem sonorum. Equidem latitudo zonae torridae est dupla obliquitatis eclipticae, scilicet $47^{\circ} 3'$, miliaria 706 hodie; tanta est igitur et latitudo frigidarum doarum, restatque temperatis latitudo $42^{\circ} 57'$, miliarium 644, quia declinatio eclipticae est $23^{\circ} 31\frac{1}{2}'$ hodie. At sicut olim maior est deprehensum, sc. $23^{\circ} 51\frac{1}{2}'$, ita etiam ante illa tempora potuit esse minor, et in mundi creatione $22^{\circ} 30'$ indeque creascere per sesquigradum. Itaque speculatio haec relinquatur posteris nostris amplius probanda. ²⁷⁾

Nullane alia hic apparet aequalitas, quam sola partium meridiani seu latitudinis sonorum? Imo et hoc considerandum, si esset obliquitas eclipticae $24^{\circ} 17' 42''$, tanto sc. major quam fuit tempore Eratosthenis, quanto fere minor est hodie quam olim, quod non est absurdum aliquando fuisse: tunc superficies zonae torridae una cum superficiebus duarum frigidarum praecise tantam haberet aream, quantum duae temperatae habent; ita superficies Telluris aequalissime esset distributa inter excessus et temperiem. Quodsi esset declinatio $23^{\circ} 35'$, quantum invenit Albategnius ante annos 730, tunc zona torrida esset ad unam ex temperatis ut 4 ad 3.

Quae est hodie proportio superficierum ad se invicem? Hodie sic se habent spatia zonarum.

	Miliaria Germ quadrata	Fere ut
Qualium superficies tota valet 100000	92880000	10
tallum torrida valet 39915	37060978	4
temperata 25887	24018536	
frigida 4156	3859210	
Temperata et frigida 30043	27877746	3
Duae frigidae 8311	7718420	
Torrida cum 2 frigidis 48226	44779398	
At duae temperatae 54774	48037072	5
Differentia 3548	3257674	

Quod est paulo minus quam una frigida.

Cum ergo, quicquid est temperatae superficiei, pateat spatio quatercenties octuagies centenum millium quadratorum germanicorum miliarium, demus dimidium aquis (nam ut septentrionalis temperata terris ut plurimum panditur, sic australis aquis oceani est tecta), restabunt ducenties quadragies centena millia praeterea decies octies mille miliaria quadrata terrae contemperatae et habitabiles: de qua parte superficiei pars ducenties quadragies millesima habet centum miliaria quadrata, decem sc. in longum, decem in latum, quantum fere exporrigitur Austria superior. Et o ridiculum, qui in aliquo censu ponat hanc metiri: nam de tota superficiei Telluris portio est haud multo maior decies centies millesima.

LIBRI TERTII

PARS QUINTA.

DE APPARITIONE ET OCCULTATIONE SIDERUM PER DIVERSAS ANNI PARTES.

De anno sidereo.

Hactenus de anno vertenti seu tropico, jam etiam de sidereo agamus, de quo primo quaero, an non sit ejusdem longitudinis cum anno vertente? Non est ejusdem cum eo longitudinis, sed paulo longior: stellae enim, quas pro meta hujus anni ponimus, paulatim mutant loca sua respectu eclipticae, et circulus per polos eclipticae et stellam secat eclipticam semper longius a puncto sectionis ejus cum aequatore.

Putabam ego, fixas apud Copernicum vere id esse, quod dicuntur; num igitur etiam illae moventur? Minime, sed principium numerationis partium zodiaci, seu sectio ejus cum aequatore vernalis movetur retrorsum. Punctum igitur eclipticae, in quod a fixa stella descendit arcus perpendicularis, semper quidem idem re ipsa punctum est, at non semper pro eodem numeratur, mutato numerationis partium eclipticae principio semperque anterius, a sectione sc. aequatoris ambulatoria incepto.

Demonstra ex causis propriis, sectiones seu aequinoctia in praecedentia moveri. Non equidem puncta incorporea moveri statuuntur per se ipsa, sed Tellus, res corporea, cum axe et fibris magneticis, circa quas velut immobiles ipsa diurno motu volvitur, inclinatur paulatim a fixa una ad aliam, ut libro primo dici coeptum saepiusque repetitum. Hic igitur axis, quatenus intra unius anni spatium eandem semper fixam aut punctum sub fixis spectat, facit, ut fixae sub ecliptica non videantur moveri. Quatenus vero successu seculorum pristinam fixam vel punctum paulatim deserit adque alias vicinas annuit, imaginationem facit, quasi polus mundi seu sphaerae ad illam fixam transeat. Jam vero dictum est libro secundo, colurum solstitialium traduci per polos eclipticae et mundi: polis igitur mundi circa polos eclipticae euntibus tardissimo motu, colurus etiam sequitur. At sectio coluri solstitialium cum ecliptica habetur pro principio Cancri, quare principium Cancri ad inclinationem axis Telluris moveri videtur sub fixis et sic etiam principium Arietis, qua-

drante distans, quod est sectio aequatoris et eclipticae matua, a qua sectione numeratio incipit partium eclipticae, ut libro secundo dictum est. Ita igitur fit, ut puncti alicujus eclipticae re vera quiescentis numerus augeatur et sic illud progredi videatur.

Cui usui nobis est hoc loco haec cognitio? Non possunt intelligi scripta veterum de apparitione et occultatione siderum, nisi sciamus, quanta sit inter nos et illos differentia facta sidereorum annorum a totidem tropicis.

Quantus est annus tropicus, quantus sidereus, excessusque hujus supra illum et supra annum Julianum hujusque supra tropicum; et quanta portio circuli competens spatio intersectorum annorum? Media et aequabilis quantitas anni tropici seu vertentis (non sunt enim omnes omnibus penitus aequales, ut in theoria octavae sphaerae dicitur) deprehensa est continere dies 365, horas 5, scrupula horae 49. 15" 46" ex mineris Copernici et Prutenicarum, ut desint sex horis seti diel integrae in annos quatuor, hoc est anno Juliano scrupula 10. 44" 14" annuatim. Anni vero sideris quantitatem mediam, quantum hucusque diligentia consequi potuerunt astronomi, censuerunt ultra suas horas addere scrupula 9. 39". Itaque differentia inter tropicam et sidereum est quatuordecim annorum 20. 23" 14", et in annis 60 totidem horarum. Ita in annis 70 cum besse fere una dies intercedit, in 707 dies 10, in 1413, quantum est a seculo Ptolemaei fere, dies 20, in 1767, quantum ab Hipparcho, dies 25, quibus Sol sub fixis totidem gradus conficit, minus 22 minutis. Itaque Juliani tot sunt 13 diebus longiores quam tropici, sideris vero 12 diebus longiores quam Juliani.

Quomodo astronomi potuerunt observare longitudinem utriusque anni tam tropici quam sideris, cum neque puncta tropica, neque fixas praesente Sole adque ipsas applicante cernere queamus? Longitudo tropici facile observatur his modis, quibus supra docti sumus observare altitudinem Solis meridiana et altitudinem poli, denique declinationem Solis. Anni enim tropici longitudo tunc exacta censetur, cum Sol rursum eandem declinationem maximam ab aequatore ejusdem qualitatis, aut rursum mediam inter utramque maximam nanciscitur.

Longitudo anni sideris subtilioris est observationis, nec una via res est tentata. Veteres Aegypti incolae cum fruerentur seronitate perpetua, cum sit Aegyptus plana, cum pyramides habeat altissimas, speculati sunt ortum stellae inter fixas maximae, quam Canem Sirium nominare solent, diligenter notantes, quo primum mane illa ante Solem emergeret, indeque numerantes dies eousque, dum illa rursum mane ex radiis Solis emergeret. Quae observatio cum nonnisi sub ortum Solis locum habeat, Graeci, carentes tot commoditatibus, confugerunt ad contemplationem eclipsium Lunae, notantes, quibus cum fixis appareret Luna, versans in umbra Terrae: tunc enim sciebant, Solem e regione esse apud fixas oppositas. Alii prius didicerunt locum Lunae computare, quod differtur in doctrinam theoricam. Tunc observant, quando Luna tegeret aliquam fixam: quantum enim Lunam a Sole putabant abesse, indice suo calculo, tantum et fixam statuerunt a Sole abesse, atque id si bis fiat cum eadem fixa, intercedente justo aliquo spatio annorum, detegit tempus reversionis Solis ad eandem a fixa illa distantiam.

Hipparchus, non confusus calculo motus Lunae, coepit Lunam ipsam nudam ad Solem et ad fixas comparare. De die enim, Sole jam occubitaro, mensus est per istrumenta, quanto arcu eclipticae Luna distaret a Sole; post horam, Sole jam merso, fixis detectis, eandem Lunam quanto arcu eclipticae

ab aliqua fixarum distaret consuluit, distantia, illico a Sole, hic a fixa, in unam conflata, arguebat Solis remotionem a fixa, qua ratione post aliquot secula repetita, rursum detegitur quaesitura. Haec observandi ratio, ut debitam sortiator subtilitatem, multis cautelis opus habet semperque minimum aliquid in incerto relinquitur. Igitur Tycho Brahe alique hoc seculo pro Luna Venerem adhibuerunt, quod illa aeque atque Luna de die quandoque cernatur, neque tamen tot tricus sit obnoxia neque tam celeris, tam in horas mutabili cursu, ut Luna.

Quodnam est initium anni sideris? Initium ejus natura non magis monstrat, quam circuli; quaelibet enim fixa potest pro initio statui, nisi forte certa quaedam sidera quovis tempore in punctis cardinalibus versentur, quae natura nobis commendat, ut ab iis principium anni tropici capiamus. Verum hoc pacto fixae observabuntur pro tropici, non vero pro sideris initio, ut talis. Dedit tamen supremi Architecti providentia nostro arbitrio quaedam adminicula eligendi sidus aliud prae alio, eum dissimilitudine dispositionis fixarum omnes coeli partes ab omnibus sint distinctae. Sic igitur antiquitus factum est, ut Aegyptii annum suum inchoarent ab ortu Canis, quia in aetatem cadebat, Aethiopes ab ortu Vergiliarum; sed haec observatio politica fuit.

Quae in classes stellae antiquitus sunt distributae? Primum homines lineamenta secuti dispositionis variae stellarum, distribuerunt omnem coelorum exercitum in nostra zona temperata conspicuum in imagines 48. Deinde astronomi non causa loci vel configurationis, sed causa magnitudinis fecerunt sex classes hinc inde dispersarum toto coelo, quarum maximas appellarunt primae magnitudinis, minimas sextae, interjectas eodem ordine.

Quae sunt illae 48 imagines? Duodecim in zodiaci longitudinem quodammodo lucidunt, quae supra libro primo sunt commemoratae. Reliquae in hemisphaeris a zodiaco distinctis locantur, in septentrionali 21, in australi 15.

De his teneantur versiculi triti:

*Ad Boreas partes ter septem sidera cernes:
Ursa minor, Major, Custos, Draco, Gemma Genuque
Prolapsus, Lyra, Olor, Cepheus et Cassiopeja,
Perseus, Andromeda, Deliotum, Auriga, Caballus,
Rictus Equi, Delphin, Telum; hinc Aquila, Anguifer, Anguis.
Signifer inde subest, bis sex qui sidera torquet.
Suntque Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,
Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces.
Post ter quinque tibi signa haec vertuntur in austrum:
Cetus et Eridanus, Lepus et nimboeus Orion,
Sirius et Procyon, Argo ratia Hydraque, Crater,
Corvus, Centaurus, Lupus, Ara, Coronaque Piscis.*

His addunt Lusitani imagines 12 circa polum australem, quae penes uos inconspicuae sunt.

Utere, si libet, hoc disticho:

*Phoenix, Grus, Indus, Xiphias, Pavo, Anser et Hydrus;
Passer, Apus, Tricetrum, Musca Chamaeque Leon.*

De longitudine et latitudine stellarum.

Quid intelligis per duorum siderum distantiam? Intelligendus est arcus circuli sphaerae maximi, inter binorum siderum centra intercepti.

Quomodo innotescit distantia duorum siderum? Simplicissima est via per observationem, quae fit instrumento, habente arcum circuli et duas regulas ex centro, dioptris instructas. Una enim regula, quae fixa est in principio arcus,

in unam stellam directam, reliqua mobilis in reliquum alius dirigitur: arcus igitur interceptus, qui est mensura anguli ad centrum, respondet arcui circuli sphaerae maximi, eumque insculptis numeris graduum et minutorum exprimit. Typum instrumenti vide in Mechanicis Tychonis Brahe, praecipue sextantis.


Quomodo definiuntur astronomi longitudinem stellae? Est arcus eclipticae numeratus in consequentiam signorum et interceptus inter aequinoctialem et semicirculum latitudinis, qui per stellam ducitur: ostendit enim hic arcus, quantum stella a principio eclipticae versus ejus finem recedat secundum sphaerae longitudinem.

Quid est latitudo stellae? Arcus circuli latitudinis interceptus inter eclipticam et stellam; ostendit enim, quantum stella recesserit ab ecliptica ad latera mundi via brevissima.

Compara longitudinem cum ascensione recta, latitudinem cum declinatione. Longitudo et ascensio recta incipiunt ab eodem principio, sed longitudo in ecliptica censetur, ascensio in aequatore; illa circulo latitudinis, haec circulo declinationis terminatur, quorum ille per polos eclipticae, hic per polos aequatoris ducitur.

Quomodo inquiritur alicujus fixae longitudine et latitudo? Varii sunt modi, qui non possunt omnes in epitoma tradi; sed praecipui sunt hi. Vel enim utimur instrumento sphaerae armillaris vel calculo. Quodsi sphaera nititur, oportet prius cognitum esse locum Solis in ecliptica, vel ejus vice longitudinem unius stellae. Deinde opus est, ut sphaera erigatur secundum altitudinem poli et lineam meridianam loci exacte habeat habeatque duos latitudinum circulos mobiles, dioptris mobilibus sic instructos, ut lineae visivae per dioptras directae sint parallelae eductae ex centro sphaerae. Inspice in Brahei Mechanicis armillas zodiacales. Quibus omnibus sic praeparatis, circulus alter latitudinum applicatur et firmatur super loco Solis vel stellae cognito in ecliptica; dioptra etiam ponitur super latitudinem ejus cognitam et una cum sphaera sic volvitur, ut linea visionis in centrum Solis vel stellae praecognitae incidat: quo facto et sphaera materiali sic coelo respondente, circulus alter latitudinis in ecliptica manente immobili et dioptra ejus in ipso suo circulo tam diu volvitur, donec per eam stella proposita videatur. Tunc igitur ejus longitudo per circulum latitudinis monstratur in ecliptica, latitudo per dioptram in circulo latitudinis. Sin autem tali sphaera caremus aut uti non possumus, tunc alio instrumento idoneo capitur distantia propositi sideris a Sole vel a fixa alia,

Fig. 45.



cujus sit cognita ascensio recta et declinatio, deinde ipsius etiam propositi sideris declinatio est declinatio per observationem, ut parte prima sumus edocti.

Ex his igitur datis prius inquirenda est ascensionum rectarum differentia et per eam ascensio recta stellae, ex qua postea habetur etiam longitudo et latitudo.

Quomodo ex declinationibus et distantia duarum stellarum quaeritur earum differentia ascensionalis? Formatur triangulum PID inter P polum sphaerae et duas stellas I, D, notorum trium laterum: nunc ID est distantia, duo reliqua PI, PD sunt complementa declinationum IC, DL septentrionalium; vel

si declinatio est meridiana, ut TS, tunc latus componitur ex quadrante PT et declinatione TS. Quaeritur igitur in eo angulus ad polum IPD vel IPS, qui est differentia ascensionum rectarum CL vel CT, quae addita vel ablata ab ascensione prius nota, efficit ascensionem propositae stellae. Ex ascensione deinde recta et ex declinatione quaeritur longitudo propositae stellae.

Processus inquirendi differentiam ascensionum rectarum ex declinationibus et distantis.

Et primum, si utraque declinatio est ejusdem plagae.

Complementum declinationis minoris	60 ^o	Decl. minor	30 ^o
Compl. decl. majoris	50		50
Summa plus quadrante	110.	Summa	80 ^o
Ergo excessus	20 ^o .	Sinus	98481
Adds sinum	20 ^o		34202
(Si summa esset minor quadrante, ajus compl. sinum subtraheres)		Summa	132683
		Dimidium	66342 est divisor.
Sit distantia stellarum 41 ^o . Complementi 49 ^o sinum 75471 subtrahat a superiori 98481 (si distantia excederet quadrantem, excessum sinum in hoc casu adderes). Residuum 23010.			
23010 : 66342 = 34684. Quotiens est sinus versus,			
ergo sinus 65316 dat complementum			
differentiae asc. rectarum 40 ^o 47'; diff. asc. rectarum = 49 ^o 13'.			

Sin altera declinationum septentrionalis, altera australis.

Compl. decl. minoris 48 ^o ; declinatio minor 42 ^o	
" " majoris 32 ^o 32.	
Summa 80 ^o 74 ^o . sinus 96126	
Ergo compl. 10 ^o sinum subtrahat 17365	
(At excessus sinum adderes ut prius)	Residuum 78761
	Dimidium 39381 est divisor.

Sit distantia stellarum 130^o, excessus 50^o, sinus 76604. Hic subtrahatur a superiori 96126, diff. 19522. (Si distantia esset minor quadrante, ajus compl. sinum hic adderes, contra quam prius.) 19522 : 39381 = 49572; quotiens est sinus versus, sinus = 50428 compl. 30^o 17', hic ergo invenitur arcus 59^o 43' secundum analogiam casus prioris. Sed quia hic diversae latitudines, sumendum est hujus arcus complementum ad semicirculum 120^o 17' pro differentia ascensionum rectarum.

Vel sit distantia 110^o, excessus 20^o, sinus 34202 subtrahatur a superiori 96126, differentia 61924 : 39381 = 157243. (Hic in divisione prodeunt figurae sex.) Quotiens ut sinus versus ostendit 124^o 55', ejus hoc loco compl. ad semic. 55^o 5' est differentia ascensionum rectarum. ²⁹⁾

Quid est coeli mediatio? Est arcus eclipticae inter principium Arietis et cireulum declinationis per stellam ductum.


Quomodo jam ex cognita stellae ascensione recta et declinatione inquiritur ejus longitudo et latitudo? Huic rei servit angulus inter eclipticam et meridianum. Data enim ascensione recta stellae, quaeritur vel calculo vel ex tabula punctum eclipticae, habens eandem ascensionem rectam, ita ut simul cum stella in horizontem rectum inque meridianum veniat et sic coelum mediet. Illius puncti eclipticae quaeritur declinatio rursum vel ex calculo vel ex tabula, una cum angulo, quem ecliptica facit cum meridiano apud illud punctum, qui dicitur angulus latitudinis. Deinde comparatur haec puncti declinatio cum declinatione stellae. Nam si diversae denominationis fuerint, addantur invicem, sin ejusdem, minor a majori subtrahitur; ita potescit arcus circuli declinationis inter stellam et eclipticam, qui basis latitudinis dici potest: subtenditur enim angulo recto inter eclipticam et circulum latitudinis stellae. Ex hac igitur basi et angulo latitudinis computatur ipsa latitudo et arcus inter stellam et punctum eclipticae coascendens recte.

Latitudo quidem sic computatur: sinum basis latitudinis multiplica in sinum anguli latitudinis abjectis 5 ultimis, prodit sinus latitudinis. Quodsi stella

et punctum eclipticae declinationes cognomines habuerunt et simul stellae declinatio fuit major, manet latitudini denominationi puncti eclipticae: sin vel contrariae declinationes, vel minor stellae fuit, indult latitudo stellae contrariam puncto eclipticae denominationem.

Longitudo sic computatur: tangentem basis latitudinis multiplica in sinum complementi anguli, prodit tangens arcus parvi prosthaphaeretic. Nam si declinationes fuerint cognomines et major stellae, additur arcus hic ad medietatem coeli in quadrantibus post aequinoctia, subtrahitur in quadrantibus post solstitia, ceteroqui fit contrarium proditque sic tandem justa longitudo.

Fig. 48.



In schemate hoc S stella, ON aequator; in N terminatur asc. recta ipsius S; DO ecliptica, in D terminatur medietas coeli ipsius S. NS declinatio stellae, ND declinatio puncti coascendentis D, SD basis latitudinis, NDO vel SDI angulus latitudinis, ESI circulus latitudinis, SID rectus, SI latitudo, ID arcus prosthaphaereticus; in I terminatur longitudo stellae S. Quodsi O esset principium Arietis et ODIC signorum consequentia, OI esset longitudo stellae; exempla sequuntur infra.

An non posset et haec computatio cedere tabula anguli dicti? Est quidem via Tychoni Brahe usitatissima, quae hoc angulo non utitur, sed longa est et difficillior, in qua pro DSI triangulo sumitur PSE, ubi

est P polus mundi, E polus eclipticae, EPC colurus solstitiorum, PS compl. decl. SN, PE distantia polorum, aequalis obliquitati eclipticae, angulus EPS notus ex mensura ejus NOQ, arcu aequatoris inter stellae declinationis circulum et colurum solstitiorum: hinc non potest latere ES, complementum latitudinis SI, et PES seu ejus mensura CI, remotio I loci longitudinis a C puncto eclipticae solstitiali.

Processus est iste.

Ex declinatione maxima eclipticae et complemento declinationis stellae, utraque septentrionali.

Quod majus $51^{\circ} 32'$,	ejus compl. $38^{\circ} 28'$.
Quod minus $23. 31. 30.$	idem $23. 31. 30.$
Summa minor quadrante $75. 3. 30.$	Summas $61. 59. 30.$ sinus 88287
ergo compl. $14. 56. 30.$	sinum 25784 subtrahere.
(Si summa major esset quadrante, excessus sinum adderes.)	Residuum 62503 dimidium 31252

Jam sit ascensio recta stellae $275^{\circ} 52'$, ergo angulus inter circulum declinationis et colurum solstitiorum est . . . $5^{\circ} 52'$ (quadrante minor)

compl. $84^{\circ} 8'$; 99476
Ejus sinus versus 524
dimidium superius 31252 ; multiplicentur abjectis 5 ultimis,
factus minor 164
sinus primus 88287 fiat subtractio.
sinus 88123

Arcus $61^{\circ} 47' 30''$.

Haec igitur est latitudo stellae sept. quia factus minor; si major fuisset, lat. esset australis; qua detecta, etiam longitudo ejus, numerata ab eodem coluri semicirculo, sc. a principio Capricorni (ejus ascensio recta 270°), patebit sic.

Complementorum declinationis $51^{\circ} 32'$ sinus 78297 (appositis 5 cybris).
latitudinis $28. 12. 30''$ sinus 47268 dividat.

Quotiens 165645

ducatur in anguli ad polum $5^{\circ} 52'$ sinum 10221.

Abiectis 5 ultimis, prodit 16931, sinus arcus $9^{\circ} 45'$, haec est longitudo stellae a 0° Capricorni.

Potest haec pars abbreviari sic.

Angulus $5^{\circ} 52'$.

Complementum declinationis $51. 32.$ Complementa. Sinus

Summa $57. 21.$ $32. 36.$ 53877

Differentia $45. 40.$ $44. 20.$ 69883 Subt.

Residuum 16006

Dimidium 8003. (Si summa superaret

quadrantem, sinum excessus adderes.)

Hoc dimidium divisum in 47268, complementi latitudinis sinum, prodit etiam 16931, sinum anguli longitudinis, ut prius.³⁹⁾

Cum autem in hoc processu Tychonis faciles sint lapsus, consultum est, singulis casibus sua genuina aptare schemata. Nam si septentrionalis declinatio, polis septentrionalibus utendum, sin australis, australibus: utrinque stella vel antecedit solstitium propinquum, vel sequitur, utrinque vel Canceri principium sumitur vel Capricorni.

Si notae essent latitudines binarum stellarum et distantia earundem, quomodo hinc longitudinum differentia innotescit? Eodem plane processu, quo supra inveniebatur differentia ascensionum rectarum, tantum ut pro ascensionis vocula subintelligas longitudinem, pro declinatione, latitudinem, pro polo mundi, polum eclipticae etc.

Exemplum. Complementa latitudinem $89^{\circ} 0'$, $83^{\circ} 29'$. Summa $172^{\circ} 29'$, major quadrante, ergo excessus $82^{\circ} 29'$.

Lat. ipsa minor $1^{\circ} 0'$, majoris compl. $83^{\circ} 29'$. Summa $84^{\circ} 29'$ (sint latitudines diversarum plagarum). Sinum $84^{\circ} 29'$ (99537) adde ad sinum $82^{\circ} 29'$ (99141). Aggregati 198678 dimidium 99339. (Si summa esset minor, complementi sinum subtraheres.)

Sit jam distantia $33^{\circ} 15'$, minor quadrante, ut fere saepe. Complementi $56^{\circ} 45'$ sinum 83629 adde ad 99537 ob diversas latitudines, ceteroqui subtraheres. (Si distantia superaret quadrantem, excessus sinum subtraheres in diversa, adderes in cognominibus latitudinibus.)

183166 : 99839 = 184385. Quotiens est sinus versus arcus $147^{\circ} 33'$; ergo hujus compl. ad semicirculm $32^{\circ} 27'$ est quaesita differentia longitudinum, quia latitudines diversae.⁴⁰⁾

(Nisi fuissent diversae latitudines, non complementum, sed arcus ipse hujus sine versu prodiret quaesitum.)

Eodem processu etiam praecedentis operationis pars altera expeditur, quando ex stellae data latitudine et declinatione cum ascensione recta quaeritur ejus longitudo. Nam polus mundi cognominis latitudini sumitur pro stella altera, cujus poli longitudo est in principio Canceri vel Capricorni; pro latitudine ejus est complementum maximae declinationis, pro distantia ejus a stella est complementum declinationis stellae cognominis, aut si diversae plagae, arcus compositus ex quadrante et declinatione.

Exemplum superius (pag. 278). Ex maxima declinatione eclipticae et complemento latitudinis sept.

Quod majus $28^{\circ} 12' 30''$, compl. $61^{\circ} 47' 30''$

Quod minus $23. 31. 30.$ $23. 31. 30.$

Summa $51. 44$ $85. 19.$ Sinus 99666

Compl. $38. 16$ sinum 61982 substrahe.

Residui 37734 dimidium 18867.

Declinatio sept. $38^{\circ} 28'$, sinus 62206. Sinus primus 99666, differentia 37460 (meridianae sinum adderes.) $37460 : 18867 = 198548$ est sinus versus arcus $170^{\circ} 13'$. ⁴¹⁾

Hic est igitur trianguli quæsitus angulus interior ad polum eclipticæ, ostendens stellam tanto arcu eclipticæ distare retro a principio Capricorni, id est in $9^{\circ} 47'$ Capricorni (fere ut prius).

Quomodo vicissim ex longitudine et latitudine inquiritur ascensio recta et declinatio stellæ? Eadem ratione, qua prius contrarium faciebamus, eaque etiam ipsa gemina. 1) Per tabulam anguli, tantum mutatis nominibus longitudinis et latitudinis in ascensionem et declinationem, eclipticæ in aequatorem et angulo inter eclipticam et circulum declinationis transmutato in angulum inter aequatorem et circulum latitudinis. Exempla cum stellis Canis infra sequentur.

2) Sed ne confusio oriatur ex hoc diverso usu tabulae ejusdem, præstat uti altera via, quia generalis est et schemate eodem nititur. Nec pluribus opus est nisi exemplo unico.

Ex maxima declinationis et latitudinis complemento.

Quod majus $58^{\circ} 57'$, compl. $31^{\circ} 3'$.

Quod minus $23. 31\frac{1}{4}'$, Idem $23. 31\frac{1}{2}'$.

$82. 28\frac{1}{2}'$ Summae $54. 34\frac{1}{2}'$ sinus 81488

Summa minor quadrante ergo compl. $7. 31\frac{1}{2}'$ sinum 13096 subtrahæ,

Residuum 68392

dimidium 34196

(Excessus sinum adderes)

Distet stella a principio Capricorni retro per $108^{\circ} 48'$, id est $90^{\circ} 0'$ 100000

(Hic igitur est angulus ad

et $18. 48$ 32227

polum eclipticæ.)

Ejus sinus versus 132227

Ergo sinum versus anguli duo in superius dimidium abjectis 5 ultimis, prodit 45216, sinus primus 81488, differentia 36272 est sinus arcus $21^{\circ} 16'$, hæc est declinatio stellæ.

Pro angulo ad polum seu differentia ascensionum rectorum.

Angulus differentias longitudinis $108^{\circ} 48'$, vel ejus compl. ad semicirculum $71^{\circ} 12'$. Compl. latitudinis $58^{\circ} 57'$. Summa $130^{\circ} 9'$ major quadrante. Excessus $40^{\circ} 9'$ sinus 64479.

Differentias $12^{\circ} 15'$ compl. $77^{\circ} 45'$ sinum 97723 addo. Summae 162202 dimidium 81101 (summae quadrante minoris complementum requireret subtractionem). Compl. declinationis $68^{\circ} 44'$ sinus 93190 dividat. Quotiens 87028 est sinus arcus $60^{\circ} 29\frac{1}{2}'$. Hæc igitur est differentia ascensionum rectorum stellæ et 0° Capricorni, retro extendenda, quia etiam longitudo sumta est a 0° Capr. retro extensa, ut sit asc. recta stellæ $209^{\circ} 30\frac{1}{2}'$.

Quorum conducit, indagare loca fixarum secundum longitudinem? Tres sunt potissimum utilitates hujus rei. Prima est in doctrinae sphaericæ parte hactenus tradita, ut per observationem fixarum possimus scire, quota sit hora noctis, et per consequens totius coeli faciem ad quodvis momentum, erecto themate vel figura coeli, describere. Hac de causa fixarum loca inseruntur in rete astrolabil. Secunda est in doctrina theórica, ut per collationem planetarum ad stellas fixas loca eorum scire possimus quovis momento, cognitis prius fixarum locis, per quas transeunt planetae. Nisi enim prius observati essent planetae, quibus locis consisterent ad certa quaedam tempora, rationes motus eorum non possent in apertum proferri. Tertius et potissimus usus hujus loci est iste: quia ortus occasusque siderum signant certas anni tempestates, his vero signis veteres agricolæ et ex eorum traditionibus scriptores rei rusticæ nec non et medici, poëtæ et historici sunt usi, nec intelligi possunt sine hac doctrinae parte.

An non sufficeret, stellas ad aequatorem referre? Minime. Nam 1) aequator non est origine coelestis, sed terrestris tantum circulus, ut supra pluribus locis dictum. 2) Distantia fixarum ab aequatore seu declinationes earum suc-

cessu seculorum mutantur valde sensibilibiter, latitudo seu distantia ab ecliptica manet quam proxime eadem omnibus seculis. 3) Progressus apparens fixarum secundum longitudinem aequatoris invenitur inaequalis diversis seculis; secundum eclipticam progressus aequabilitatem longe perfectiorem observat. 4) Quod caput est hoc loco: si stellae habeo ascensionem rectam et declinationem, ortum quidem ejus super horizontem quemlibet computare possum, et occasum sub illum, at nondum apparitionem et occultationem sub radios Solis, qui sub eclipticam incedit, nisi et illum ad aequatorem referam, ubi quaelibet positio sphaerae habet aliquid peculiare. At si fixarum loca per eclipticam describatur, omnium varietatum per varias sphaerae positiones norma et regula per medium illarum incedens constituitur. 5) Planctarum etiam ceterorum loca perpetuo cis et ultra eclipticam ordinantur disceduntque cum ipsis eclipticae arcibus ab aequatore. Expedi igitur, omnia sidera ad unam eclipticam velut in communem ordinem redigere.

De coorientibus eclipticae punctis.

Quomodo scitur, cum quo gradu eclipticae quaelibet stella oriatur et occidat? Praescienda est altitudo poli, declinatio et ascensio recta stellae, et per haec ex parte secunda differentia ascensionalis, quae addita vel ablata ab asc. recta, prout meridionalis vel septentrionalis fuerit declinatio, constituit stellae asc. obliquam. Data stellae asc. obliqua, facile vel ex tabulis vel ex doctrina partis secundae datur punctum eclipticae coorientis cum hac asc. obliqua et sic etiam cum proposita stella; aut si descensio est, condescendens.


De variationibus horizontalibus, refractione et parallaxi.

Quid accidit stellis orientibus vel occidentibus? Refractio radorum, quae in ipso ortu vel occasu attollit sidera (ad aestimationem vius) in circulo verticali per 30 minuta, quae summa celeriter decrescit, adeo ut in altitudine 20 graduum penitus evanescat.

Quid efficit haec altitudinis refractione in ascensione obliqua et declinatione, in longitudine et latitudine? Ascensionem et longitudinem in ortu, declinationem et latitudinem meridianas minuit; e contra descensionem et longitudinem in occasu, declinationem et latitudinem septentrionales augeat, et minuendo distantias, in quantum rectae sunt ad horizontem, si unius fixae loco utimur ut certo et irrefracto, errores dictos in calculum ex distantia concinnatum ingerit.

Quomodo computando discimus, quantum quaelibet refractione altitudinis efficiat in longum et latum, ut locus stellae per refractionem vitiatu corrigatur? Generalis methodus est per obliquangulum primi motus primum VPS, in cujus latere VS, arcu verticalis, eligatur R signum altius, pro loco refractionis stellae S, et ducto arcu ex P polo per R continuatoque, descendat in eam SI perpendicularis. Igitur in PVR triangulo cognita sunt latera. Nam data quantitate RS refractionis, datur et VR distantia stellae a vertice seu ejus complementum, latitudo RO, cui illa quantitas competit: ex altitudine vero refractione af-

Fig. 47.



fecta (seu refracta, ut loquitur Tycho) calculus parte prima descriptus prodit PR declinationem refractam et angulum VRP apud locum stellae refractum R. Demisso igitur perpendiculari ex S loco irrefracto in PR circulum declinationis refractae continuatum, bina sunt rectangula, RIS, PIS, in quorum inferiore RIS datur angulus ad R cum basi RS, quae est refractionis quantitas, quare computari et latera possunt: alterum RI in circulo declinationis, quod est refractionis declinationis, alterum IS in demisso perpendiculari, argumentum refractionis asc. rectae, quod tanto aequalius est ei, quam arguit, quanto minor est stellae declinatio. At si magna sit declinatio, ad alterum rectangulum PIS devenitur, cujus latera nota sunt, PI arcus circuli declinationis, refractione inventa RI auctus, et IS perpendicularum hoc; per haec quaeritur P angulus ad polum, quae est refractionis correctio asc. rectae.

Processus brevissimus. Sinum arcus RS (potius arcum ipsum, quia nulla re sensibili differt a recta) multiplica in sinum anguli IRS vel VRP, et abjectis 6 ultimis prodit sinus arcus IS (vel ipse arcus IS). Deinde secantem arcus RS continuatum 6 cyphris divide per secantem arcus IS, prodit secans arcus RI, qui cum PR facit PI. Tangentem igitur IS (vel etiam ipsum arcum IS) continuatum 6 cyphris divide per sinum arcus PI, prodit refractionis asc. rectae.

Igitur ex correctis declinatione et ascensione recta provenit et longitudo et latitudo libera a refractionibus.

Quid vero, si non ascensio recta et declinatio stellae detur, sed longitudo et latitudo: num semper his ambagibus utendum, ad ascensionem sc. et declinationem recurrendum? Si longitudo et latitudo stellae detur ex loco Solis et hora, inquirendus est nonagesimus eclipticae et ejus altitudo, ut sit P polus eclipticae, PR, PS circuli latitudinum, eritque RS refractionis latitudinis, IPS refractionis longitudinis, manebitque processus idem in reliquis qui prius.

Quid est cognatum refractionibus? Quorundam siderum parallaxes, de quibus libro sexto. Data enim cujusque altitudinis parallaxis in longum et latum deducitur eadem plane methodo, sed effectu contrario; nam ubi refractionis minuit, parallaxis, si qua est, auget et vicissim; ideo ante omnia sit subtractio minoris a majori, et cum residuo, quod retinet naturam majoris, agendum est ut hactenus cum alterutro ejus elemento. Hoc intelligo de sideribus, quae habent parallaxin.

Num hic aliquod lucrum est, si stellae sint aequatori vel eclipticae vicinae? Si parallaxis solitaria proponatur, est aliquod compendium, ut non sit opus angulo ad sidus; sed cum parallaxis praecipue Lunae attineat, quae etiam prope eclipticam semper versatur, praesertim in eclipsibus Solis, quando maxime opus parallaxi, ideo differtur hoc compendium ad motus Lunae.

Quae sunt igitur potissima discrimina refractionum et parallaxium? Primum discrimen in effectu jam est dictum, parallaxis deprimit, refractionis attollit. 2) Refractionem altitudinis ex aequo patiuntur omnia sidera, quodcumque eorum in die eodem, vel diversis ejusdem qualitatis in loco horizontis eodem, vel qualitate eisdem in eandem venerit altitudinis, quia causa refractionum est penes nos in aëre; parallaxin diurnam sensibilem perpetuam sola facit Luna et cometarum aliqui; Mercurius, Venus, Sol et Mars in suspicionem quidem sunt parallaxeos, at possessio controversa, sensus nullus. De superioribus ne suspicio quidem est ullius sensibilia parallaxeos, nedum de fixis. 3) Refractiones cito desinunt esse sensibiles in altitudine 20° vel 30°, ut libro primo videre est; parallaxium portiones usque in ipsum verticem supersunt, proportionales sibi distantiae a vertice.

De ortu poetico.

Quo discrimine agitur de ortu et occasu siderum per varias hujus libri partes? Prima parte dictum est de his, quae sideribus accidunt quotidie, sine consideratione eclipticae motusque Solis per eam, de quibus dictum parte secunda, diei artificialis, de qua parte tertia, aut diversarum anni tempestatum, de quibus parte quarta; jam vero comparandi sunt ortus siderum non tantum cum ecliptica, ut jam modo, sed etiam cum motu Solis per eam, cum luce diurna et cum tempestatibus anni. Ibi de ortu et occasu illo dicebatur, quem ipsa faciunt seu potius secundum Copernicum horizon mundanus: at hic agitur de apparitione et occultatione, quae a Sole causam habet et a luce diurna.

Quomodo appellantur ortus et occasus hoc loco considerati? Vulgo poetice o s dictos putant ideo, quod his utantur poetae in descriptionibus temporum; mihi hoc nomen non videtur esse generis, sed unius speciei.

Quo ergo sensu hic usurpantur voces oriri et occidere seu discedere? Duplex est sensus harum phrasium etiam hoc loco, alter popularis, cum adventante nocte et extincta luce diei astra promiscue omnia dicuntur oriri, quae prius, quamvis essent praesentia, latebant sub luce diei; et vicissim orta luce sub adventum Solis discedere dicuntur astra, quae cum priusincerent viderenturque, jam occultantur a luce diei, ut, quamvis adhuc in summo coelo praesentia, cerni tamen amplius non possint. Altera significatio restrictior est et artis propria, sumiturque de his sideribus, quae propter motum Solis annum per zodiacum vicissitudines ortus et occasus subeunt.

Quot sunt species hujusmodi ortuum? Hodie vulgo tres numerant species ortus et occasus poetici: cosmicum, acronychum et heliacum.

Quid appellant ortum et occasum cosmicum? Cosmici epitheto signant moderni astronomi principium diei, obscura de causa: quasi cosmice oriatur illa stella, quae oriente Sole oritur, cosmice occidat illa, quae oriente Sole occidit. Ego definio ortum vel occasum cosmicum simpliciter et generaliter illum, quando stella sine respectu Solis super horizontem mundanum emergit vel sub eum descendit.

Quid est ortus vel occasus acronychus? Acronychus ortus est, cum stella in uno acro seu termino noctis, id est in ejus principio oritur emergens supra horizontem, occidente Sole e regione. Plinio est ortus vespertinus. Addit vulgus hodiernum occasus acronychi definitionem hanc, cum stella occidente Sole occidit, id est una cum Sole. Ego definio occasum acronychum, cum stella in altero acro seu termino noctis, id est in ejus fine occidit; Plinio est occasus matutinus.

Quid est ortus et occasus heliacus? ⁴²⁾ Oritur stella heliace, hoc est incipit apparere, quando, quae prius latebat sub radiis Solis, sic ut eodem fere tempore cum Sole et oriretur et occideret, postridie e radiis Solis emersit in tantum, ut Sole latente sub horizonte ipsa primum cerni possit, jamjam vel occubitura sub horizontem vel extinguenda (si orta est ex horizonte) super-ventu lucis diurnae. Occidit stella heliace seu occultatur, quae cum prius, Sole non multum infra horizontem merso, adhuc cerneretur supra, jam in tantum sese condidit Solis radiis, ut postridie, orta ex horizonte vel occubitura sub illum, cerni amplius non possit. Illa rectius apparitio seu emersio, haec occultatio diceretur. (Plinius lib. XVIII. cap. 25: *aut adventu Solis occultantur stellae et conspici desinunt, aut ejusdem abscusu proferunt se. Eminent hoc melius,*

quam exortus consuetudo dixisset, et illud occultationem potius, quam occasum.) Ita Graeci appellant *ἀπὸλῃς* non *ἀνατολῃς*, item *φάσις*, et *κρύψις* seu *ἀφανισμός* pro *δύσις*. Hanc speciem ortus et occasus puto speciali nomine olim poetice (ποιητικῆς) dici solitam, quasi fictam; eo quod non vere oriantur vel occidant, sed tantum appareant oriri vel occidere.

Quid ergo fiet de vulgi ortu cosmico et occasu acronycho? Censeo species illas, ut vulgus illas definit, aliter appellandas, si modo loens iis ullus in hac parte doctrinae relinquitur. Certe poetici non sunt, notione hujus vocis vulgari; nam qui poetae iis uterentur, cum non conspicerent? Dicantur potius astronomici vocenturque ortus et occasus eum Sole; Plinius exortus matutinos occasusque vespertinos appellere videtur, licet eodem nomine etiam belliaci veniant. Ergo pro ortu, quem vocant cosmicum, expectet poeta ortum heliacum proximè coincidentem, pro occasu vulgi acronycho, hoc est cum occidente Sole, praeoccupet occasum bellacum proximum.

Dic causas cur censeas eas species expungendas? Primo pro me faciunt nomina, noctis enim non unum tantum, ut vulgo hic tenet, sed duo sunt *ἀκρα*, principium et finis, et Ptolemaeus planetas vocat acronychos tota nocte, sc. tam in principio orientes, quam in ejus fine occidentes. Videturque consilium ejus, qui hoc nomen excogitavit, hoc fuisse, ut ostenderet, stellam tunc pati contraria Soli, oriri sc. in principio noctis, cum Sol oriatur in principio diei, quare et occidere, cum Sol oritur. Cosmici vero vox quid aliud sonat, quam id quod Soli opponitur, cum quaeritur, ejus respectu sidus oriatur occidatque, Solis an mundi, id est horizontis mundani? Deinde in praecipuis sideribus, quae scilicet in zodiacum incidunt, juncti sunt ratione temporis ortus vespertinus et occasus matutinus, cur ergo distinguerentur ista cognominibus, ut ille acronychus, hic cosmicus diceretur? Eadem est ratio cum ortu matutino et occasu vespertino: cur eodem die dicantur ortum cosmicum et occasum acronychon ejusdem sideris consuescerem? Tercio ortum et occasum cum Sole circumstant plerumque emersio et occultatio; quid opus est tempora angusta distinguere adhuc subtilius et operosius per istos ortus cosmicos et occasus (vulgi sensu) acronychos? Denique quos heliacos appellamus, ii cernuntur, quos ego acronychos appello, cernuntur et ipsi; apti sunt agricolis, medicis, bistoricis, poetis ad descriptiones vulgares temporum; at illi spurii ortus et occasus cum Sole, quorum illos cosmici, hos acronychi nomine locupletant, nequaquam cernuntur, nec ex coelo sed ex libris astronomorum petendi sunt, nec nisi ab iis, qui astronomiam didicerunt, agnoscuntur. Itaque nullum ego notavi probatum scriptorem, qui his esset usus nominibus vulgi sensu, at ne rebus quidem ad vulgares descriptiones; contra Plinius alique, cum in descriptione temporum his in conspicuis exortibus et occasibus utuntur, et alia ponunt nomina, ut praedictam, et alio fine faciunt, non ut describant tempora notis vulgaribus, sed ut causas commemorent tempestatum abstrusas, ex astrologia petitas.

Quibus diei partibus incidunt ortus et occasus heliaci? Fixae semper, planetae plerumque mane emersisse e Soles radiis, vesperi vero ejusdem jam demersi radiis conditi disparuisse deprehenduntur; ut sic in ortus plaga spectentur emergentes, in occasu amittantur conditi sub radios. Excepe tamen 1) Lunam semper, Mercurium vero et Venerem tunc, quando, ut Luna, velociiores sunt ipso Sole et directi: tunc enim (ut Luna) vesperi deprehenduntur emersisse in occasu, mane disparuisse in ortu, conditi sub Soles radios. 2) Jubet etiam analogia excipere aliquid intra polares seu in zona frigidis;


nimirum si Sol et sidera versentur in his signis, quae praepostere oriuntur et prope eclipticam; nam si Sol in his tam profunde immergeretur sub horizontem, ut emicare sidera possent, non tantum ceterae species ortuum et occasuum, sed ipsi etiam hellaci rationes omnes hic explicatas tenerent permutatas.

Quousque Sol debet a fixa discessisse, ut illa cerni possit libera a Solis radiis? Etsi res haec multum habet varietatis, tam quoad fixarum et planetarum claritatem, quam quoad diversam aëris dispositionem per varia loca et tempora, adde etiam diversas horizontis plagas, quae non aequaliter illuminantur a crepusculo: artifices tamen ponunt aliqua certa, quae sint observatis quam proximè consuetanea, nimirum ista: primo quod Sol in circulo verticali demersus 19° sub horizontem crepusculorum initia finesque faciat; etsi Tycho Brabe non ultra 16° desiderat, in ortu quidem aequinoctiali, alii 18° . Deinde quod fixas minimae nisi Solis 18° demerso cerni in horizontis ea plaga, quae ad Solem est, non possint. Pro sextae magnitudinis stellis statuunt demersionem Solis 17° , pro quintae 16, pro quartae 15, pro tertiae 14, pro secundae 13, pro stellis primae magnitudinis 12° . Planetis minori Solis demersione opus esse: Marti $11^\circ 30'$, Saturno 11° , Jovi et Mercurio 10° , Veneri 5° . Quanquam planetarum inaequalis a centro Telluris distantia multo maiorem varietatem videntur requirere.

Posito, quod certa sit haec observatio: scire nunc expeto, quomodo investigem, in quo eclipticae gradu debeat esse Sol, ut, stella oriente vel occidente motu mundano, ipsa justo modulo deprecatur esse possit sub horizontem? In sphaera collocato gradu eclipticae coorientem vel cooccidentem cum stella in horizonte ortivo vel occiduo, circulus verticalis, debito graduum modulo ultra quadrantem prolongatus, tantisper in horizonte proposito rursum prorsumve movetur, donec extremitate sua tangat eclipticam: illo contractu monstrat Solis locum, quem occupet necesse est, ut stella proposita possit oriri vel occidere hellace.

Velim idem inquirere posse calculo. Opus igitur est ex doctrina praemissa cognitione gradus eclipticae coorientis vel cooccidentis cum stella proposita, et anguli, quem facit ecliptica cum horizonte in partibus illis. Tunc polo eclipticae C, vertice V et ecliptica EOS, nonagesimo E, oriente O, imaginabimur triangulum OIS inter eclipticam OS, horizontem OI et verticalem IS, in quo (sub horizonte semper latente) praeter rectum angulum OIS, quem verticalis cum horizonte facit, datur etiam angulus IOS, quem ecliptica apud punctum O cum horizonte facit, et latus IS illi oppositum, scilicet arcus verticalis VS, quum demergitur Sol sub horizontem. Quare invenitur et arcus eclipticae OS oppositus recto, qui arcus est inter O coorientem vel cooccidentem et inter S Solem. Sinus enim huius arcus demersionis prolongatus 5 cybris, divisus per sinum anguli eclipticae et horizontis, quotientem facit, qui est sinus arcus quaesiti addendi ad punctum eclipticae, quod cum stella cooritur, subtrahendi ab eo, quod cooccidit eum stella, proditque locus Soli occupandus.


Fig. 48.



Quo ordine invicem insequuntur ortus et occasus varii stellae ejusdem *flexae*? 1. Semper stella prius oritur cum Sole quam ex Sole, posterius occidit cum Sole quam sub Solis radiis. 2. Quando latitudo stellae septentrionalis est, stella prius oritur cum Sole, postea cum eo coelum mediat, ultimo cum Sole occidit; et eodem ordine etiam ortus occasusque aeronychos conficit. Quando stella meridionalis est, fit contrarium; in ipsa ecliptica versante stella, omnia tria necesse est coincidere. 3. Heliaci ortus occasusque etiam permutant ordinem apud alias aliasque stellas, cum inter se, tum etiam cum dictis orbitibus occasibusque cum Sole, sed communis fines hujus permutationis non est ecliptica, est vero apud stellas illas, quae tantam habent latitudinem septentrionalem, ut uno et eodem die simul et oriri et occidere possint heliace. Stellae enim, quae sunt septentrionaliores haece in qualibet eclipticae longitudine, prius emergunt ex radiis Solis, postea condantur sub eos, et hoc quidem diebus mediantem coeli propriis, quam sunt earum ortus occasusque cum Sole. At stellae, quae sunt australiores dictis terminis, prius occultantur, posterius emergunt, et tempore intermedio cum Sole oriuntur atque occidunt, sic ut longius distent a mediantione coeli ortus occasusque heliaci.

Cape hujus varietatis schema *μηνόγεωγραφ.* KEOQS linea ortus cum Sole. LNPDT linea ortus heliaci. HMODV linea occasus heliaci. IEPRX

Fig. 49.



linea occasus cum Sole. AB consequentia signorum et motus Solis et successio dierum. F australis stella, ordo apparitionum H, I, K, L. E stella in ecliptica, ordo apparitionum M, E, N, eodem enim die et oritur et occidit cum Sole. Stella C septentrionalis, sed meridionalior quam D, eodem tempore et oritur cum Sole et occidit heliace et vicissim, scilicet ordine O, P. Stella D primum oritur cum Sole, postea eodem die et oritur et occidit heliace, rursum posterius occidit cum Sole: sc. ordine Q, D, R. Stella G septentrionalior quam D

prius oritur cum Sole, postea heliace, tunc occidit heliace, denique cum Sole; ordo apparitionum S, T, V, X. Stellae F, E, C aliquamdiu latent penitus, id indicat color niger. D ultima est, quae unica nocte, quando Sol est in E, penitus latet, nec nisi mane et vespere momentanee cernitur; prima earum, quae omnibus noctibus totius anni cernuntur, habentes duas apparitiones eodem die, alteram quotidianam et communem seu popularem, quando vel noctu oriuntur ex horizonte, vel exstincta luce diurna ex alto promineant, alteram temporariam ante vel post Solem, quae contingit inter dies ortus et occasus heliaci.

Qua methodo invenitur locus, in quo stella quaelibet simul et mane oriri et vespere occidere potest heliace, Sole in quovis gradu eclipticae versante? Primum quaeritur cujusque loci Solis S propositi asc. recta ET et declinatio ST. 2. Ex RS, depressione Solis sub horizontem, quantum postulat cujusque stellae magnitudo, ut in horizonte posita primum aut ultimum cerni possit, et ex declinatione loci Solis ST, assumto hic, propter declinationem australem, triangulo LSN, ut SN sit complementum profunditatis Solis, LS complementum declinationis, quaeritur per doctrinam superiorem angulus SLN seu TI, et sic I gradus aequatoris in meridiano et gradus Q in oriente constitutus; haec est asc. obliqua stellae requisita, quae, comparata cum prius

Ostende diversitatem apparitionum harum exemplo Arcturi. Arcturum Tycho Brahe locat in $18^{\circ} 40'$ Librae, lat. $31^{\circ} 3'$ bor. Ergo ejus asc. recta 209. 24. Coeli mediantio $1^{\circ} 34'$ Scorpii, declinatio $21^{\circ} 19'$ bor. Hinc ejus ortuum et occasum species computantur a Maestlino, ut habet tabella sequens:

	Sole in	Arcturus
$12/23$. Martii	$2^{\circ} 24'$ Arietis	oritur vespri.
$6/16$. Junii	25. 18. Gemio.	occidit mane.
$10/25$. Sept.	2. 24. Librae	oritur cum Sole.
29. Sept. 9. Oct.	15. 40. Librae	emergit e radiis.
$12/25$. Oct.	1. 34. Scorp.	culminat cum Sole.
$15/25$. Novemb.	3. 2. Sagitt.	occultatur vespri.
$7/17$. Decemb.	25. 18. Sagitt.	occidit cum Sole.

Ergo ab aequinoctii tempore usque in solstitium fere, sc. a 23. Martii usque in 16. Junii stella Arcturi cernitur pernox, ortus vero ejus supra horizontem occasusque sub illum cerni prae diei luce non possunt. Nam 23. Martii oriens in ipso Solis occasu longiores moras necit supra horizontem, quam Sol infra. Sequentibus diebus occidente Sole Arcturus jam enisus est supra horizontem, ita ut detegatur cum stellis ceteris extincta luce diei; conditurque luce sequentis adventante, nondum occidens. Interim Sol venit ad $1^{\circ} 34'$ Tauri, tunc Arcturus coeli medium occupat in puncto mediae noctis, distantque exortus ejus supra horizontem et occasus sub eum aequalibus spatii a principio et fine lucis diurnae.

Ceteris igitur stellis in austro sitis breves sunt morae supra horizontem, non sunt igitur pernoctes, sed intra eandem noctem et oriri et occidere videntur, Sole in earum opposito versante; Arcturus vero hoc situ oritur ante Solis occasum occiditque post ejus exortum, neutra vice conspicuus. Die 16. Junii, quamvis brevissima nox sit, desinit tamen Arcturus per totam illam videri; quippe occidit in ipso Solis exortu indeque ante illum adhuc de nocte sese sub horizontem ex oculis nostris subducit. Igitur a 16. Junii usque ad 25. Nov. occasus Arcturi in noctem incidit, transiens paulatim a principio noctis usque ad ejus finem: cernitur igitur ejus occasus per 5 integros menses. Vicissim a 9. Octobris ortus ejus supra horizontem e Solis radiis sese explicat manetque ex eo die conspicuus ejus exortus usque ad 23. Martii, quando, ut dictum, post finem diei et sic in nocte oriri desinit. Inter haec intervalla communi spatio temporis, quod est inter 9. Octobris et 25. Novembris, per dies 47 uterque in proximas invicem noctes incidit, tam exortus Arcturi supra horizontem, quam occasus ejus sub illum, et sic conspici uterque potest Sole proxime Arcturum transeunte cumque eo coelum mediante. At stellae versus austrum e contrario, quando Solem praesentem habent, plane non cernuntur. Et australes quidem prius conduuntur radiis Solis vespri, posterius exeunt e radiis mane, Arcturus ordine contrario prius quidem 9. Octobris emergit mane, posterius vero 25. Novembris conditur vespri.

Quomodo scriptores utuntur his ortibus et occasibus siderum, et qua occasione? Graecae nationes et ex illorum instituto Romani antiquitus utebantur anno mixto ex Lunari et Solari, nude fiebat, ut nunc praevenirent Solem et nunc sequerentur. Cum autem tempestates anni non revertantur cum erroneo Calendario, sed cum Sole et solstitiis: ut igitur operae rusticae, domesticae, militares suas quaeque tempestate fierent, veteres proposuerunt ortus et occasus siderum Calendarii loco, quidam necessitatis dictae, quidam doctrinae causa, quod exempla Calendarii non haberi possent in tanta copia ut

hodie et si proponerentur in publico, non possent ab agrestibus cognosci, qui et literas ignorabant et in agro debebant absentes; haec vero signa possent etiam ab illiteratis observari. Quidam denique ornatum quacivissent orationi suae, ut poëtae, qui florido dictionis genere luxuriantes ut res alias, sic etiam tempora solent per circumstantias suas describere et veluti pingero, cum circumstantiarum nulla sit pulchrior, quam ortus occasusque tot siderum tam varii.

Quot modis comparantur tempora vetera cum hodiernis causa hujus signationis per ortus et occasus siderum? Triplex est comparatio. 1) Ratione unius et ejusdem Calendarii Romani. 2) Ratione motus Solis in ecliptica. 3) Ratione ipsius ortus et occasus siderum. Ex his prima et ultima parum est utilis, nisi reducantur ad mediam. Prima enim comparatio tantum est historica seu politica, ultima sapit astrologicam subtilitatem; media vero est rustica, domestica, medica, naturalis.

Cur mediam solum comparisonem naturalem appellas? Nihil ergo operantur ortus illi siderum? Veteres quidem in illa fuerunt opinione, quaecumque vehementiores tempestates sub exortu cujusque sideris quotannis fere solebant existere, a sideris illius exortu vel occasu effici aut saltem significari. Hinc nata est Graecis peculiaris usus vocis *σημειον, προσημαντι, επισημαντι*, pro eo quod Germani dicimus: *es wittert vor oder nach*; cum velient hoc dicere, sidus illud esse efficax et generare magnam aurae commotionem. Plinius graecam vocem latine reddidit eodem usu, significat, inquiens, aut indicat: hinc quaedam sidera prae ceteris indicantia dicta, ut Canis. Adeoque res rediit, ut per metonymiam ipsa etiam tempestates statae sidera nominarentur et sidus aequinoctii Cicero valde perturbatum quereretur. Siderari etiam dicuntur arbores, quae grandine, pruina, carbunculis, aestu, morbis temporum infestantur; et siderati, hoc est sidere afflati, qui latentem ob causam subito aegrotant, quasi lue coelitus immissa aut fulmine repente percussa. Geminus vero opinionem vulgi adeoque et doctorum omulorum sui seculi refutavit argumentis naturalibus et astronomicis; vixit ante Christum. Sed nulla hujus opinionis manifestior esse potest refutatio illa, quam nostra nos docuit aetas, quando sidera sedibus suis in zodiaco pristinis excessere oriunturque mensibus sequentibus, tempestates vero cum Sole redeunt et hodie signa illa sua pristina praeventiunt; jamque verum est quod canit Virgilius:

Solemque suum sua sidera norunt;

id est, retinet quaelibet pars anni a solstitio computata suam naturam suamque ingenium et suas tempestates, stellis fixis magis atque magis in dies sequentes migrantibus.

Doce comparare tempora hodierna cum veteribus ex eodem signo expressi ortus vel occasus siderum. Ad banc rem opus est longitudine et latitudine stellae motusque Solis ephemeride, accommodatis ad tempora scriptoris, et hac quidem in forma anni Juliani veteris retro extensi. Tunc si scriptor exprimit diem anni Romani ortumque vel occasum stellae sub certa poli elevatione, quaerendus erit in ephemeride veteri locus Solis ad dictam diem. Deinde quaerendum est punctum eclipticae coarctum cum stella vel una occidens, et comparatione loci Solis cum hoc coarctante puncto facile elucescet fides scriptoris, et, si vera scripsit, species ortus vel occasus. Itaque resumpta eadem die Calendarii Romani etiam hodie, politicorum quidem annorum summa exacta erit, at neque tempestas anni, neque sidera eadem illo die revertentur; et ratione quidem anni vertentis ventum erit ultra metam propositam, anni

vero sideris metam nondum erimus asseenti. Secundo igitur, ad sciendam metam anni naturalis seu tropici revertentem, locum Solis, ex veteri depromptum ephemeride, quaere in nostrae aetatis ephemeride, et dies anni Juliani, in qua illum invenisti, ratione tempestatis ejusdem comparanda erit cum die, quam scriptor consignavit. Praevertet autem dies moderna vetustam in ordine dierum Calendarii. Tempestas anni sic revertetur eadem, at non signum idem. Sin autem tertio seire desideras, qua die Juliani et quo in eclipticae gradum Sole versante hodie revertatur ejusdem sideris ortus vel occasus idem, qui a scriptore est consignatus: per hodiernam igitur longitudinem et latitudinem stellae propositae quaere rursum gradum eclipticae, coorientem cum illa hodie vel cooccidentem; qui quanto intervallo sequetur coorientem vel cooccidentem tempore scriptoris (sequetur enim), tanto fere intervallo locus Solis in ecliptica hodie posterior erit loco ejusdem ad diem a scriptore signatum sui seculi. Denique locus Solis sic inventus, si in ephemeride hujus aetatis quaeratur, diem anni Juliani ostendet, comparandum cum die scriptoris, ratione ejusdem sideris: tardius scilicet incidet hodie idem exortus in anno Juliano.

Nullumne compendium suppetit operae tam operosae? Quot dierum differentiam a Calendario Juliano Sol faciat, id supra dictum est, in annis sc. 1767 dierum 13 fere, qui dies 13 diei anni Juliani, retro ad seculum Hipparchi extensi, constanti observatione possunt adjungi: non enim opus est hic scrupulosiore computatione, nec eurandum, quod in una parte anni propter inaequalem motum Solis et progressum apogaei abundemus, in alia deficiamus nonnihil, quod sane ad haec usque tempora perparum est.

At ortus occasusque siderum, ut sunt variarum specierum, sic etiam per climata diversa perque declinationes suas a Sole minutas vel auctas hodie, denique per loca eclipticae, longiorum hodie vel breviorum ascensionum obliquarum, multum variantur, ut ita plus hic erroris in compendis insit. Possumus tamen et hic prope verum venire, additis pro Hipparchi seculo diebus (ut supra) 12 ad diem in anno Romano, quo sideris cujusque ortus expressus est. Ac cum incerta sit suspicio, quasi tropicus annus olim fuerit longior (de quo libro VII.), nihil nocerit, exemplo Tychois Brahe secula nos inter et Hipparchum pro amussi statuere proportionemque eandem ad intermedia adque antiquiora tempora continuare per tabellam sequentem, in qua Ptolemaei quidem observationibus vis inferitur in anni tropici columna; nam pro 11 ipsius observata dant $12\frac{1}{2}$. Sed de hoc libro VII.

Stel
tis
ram
sum
dioc
aesta
cane
Deni
ca n

quod
orta,

Tyche
39° 3
bellu
declit
todo
Borys
146°
Desce
eclipti
nulla
verre
dote
Tari
it. z.

T a b e l l a.

Ad seculum	Ante Christum anno	Adde ad diem anni Juliani hodiernum pro natura et tem- peratibus anni et loco Solis hodierni	Aufer a die anni Juliani hodie- rno pro exorti- bus et occasi- bus siderum hie- dem	Ad hodiernum diem Solis cu- jusque diei in anno Juliano adde pro loco Solis in hodie- rno exorti- bus et occasi- bus siderum
Hesiodi . .	800.	dies 17 1/2.	dies 16 1/2.	84°
Thaletis . .	600.	16.	15.	31.
Hippocratis . .	450.	15.	14.	29.
Metonis . .	426.	15.	14.	29.
Eudoxi . .	360.	14 1/2.	13 1/2.	28.
Arati . .	270.	14.	12 1/2.	26 1/2.
Hipparchi . .	135.	13.	12.	25.
Caesaris . .	46.	12.	11 1/2.	23 1/2.
	post Chr.			
Ptolemaei . .	140.	11.	10.	21.
Nicaeae synodi . .	325.	10.	9.	19.
Dionysii Abb. . .	532.	8 1/2.	8.	16 1/2.
Albategni . .	880.	6 1/2.	6.	12 1/2.
Alphonsi . .	1260.	3.	3.	6.
Regiomontani . .	1460.	1.	1.	2.

Quodnam ex omnibus sideribus celebratissimum est apud scriptores?
 Stella Canis major et Sirius dicta: est enim stellarum maxima, est ab Aegyptiis ereberrime observata prognostici causa; erat ortus ejus insignitus eccliarum statu in Gracia et Aegypto, re celebratissima apud veteres historicos. In summa, quicquid naturaliter evenit illa parte anni, ob aestum adnatum jamque discessu Solis marcescentem, id huic sideri fuit adscriptum. Ut quod gravescit aestas, fervent maria, morbo earbunculari infestantur uvae, vina mutantur, canes in rabiem aguntur, morbi ingruunt, cura morborum difficilis evadit. Denique illa pars anni totis jam bis mille annis cognominati sunt dies caniculares.

Præcedit autem Canis ortum aliud sidus insigne, paulo tamen minus, quod Graeci Procyona, Pilius Caniculum seu Canem minorem appellat; qua orta, selmus proximo secuturum Canem majorem.

Declara præscriptum methodum exemplo duorum istorum siderum.
 Tycho Braheus ad annum 1600 completum collocat Sirium in 8° 36' Cancri, cum lat. 39° 30' australi. Ergo haec est ex his stellis, quae ab occasu heliaco usque in ortum heliacum penitus latent. Ascensio igitur ejus recta ad prædictum annum est 96° 53', declinatio 16° 11' australis, ut cum ipsa stella coelum mediet 6° 19' Cancri. Sit altitudo poli 48° 30', quantum habet Danubii tractus, qui est in climas septimo, Diaborythensos. Ergo differentia ascensionalis stellae est 49° 29', ascensio obliqua 146° 22' et coascendens 13° 32' Leonis; angulus inter eclipticam et horizontem 55° 10'. Descensio vero obliqua est 47° 24' et condoscendens 26° 40' Tauri; angulus inter eclipticam et horiz. 50° 51'. Cum his angulis et cum profunditate Solis 12° (quia stella proposita est primae magn.) inveniuntur arcus eclipticae inter Solem et horizontem 14° 40' et 15° 33', quorum ille additus ad coorientem, hic ablatas a cooccidente, monstrant Solis loca in exortu stellae heliaco 28° 12' Leonis, in occasu 11° 7' Tauri. Ergo hodie Sole in 11° 7' Tauri versante, quod fit 21. Apr. st. v. vel 1. Maii st. n., Canis major apud ripas Danubii occiditur vesperti, et 1/11. Maii cum Sole occidit

manetque absconditus per menses tres, in quorum medio, sc. $\frac{12}{25}$. Julii, coelum cum Sole mediat, quando Solem quam potest proximum habet. Inde 27. Julii st. v. vel 6. Augusti st. n. oritur cum Sole, pauloque post $\frac{11}{21}$. Augusti mane rursus apparet. Sequitur, ut per reliquum anni tempus, per quod conspici potest, mane quidem occidat die $\frac{2}{10}$. Novembris, vesperi vero oriaturs 23. Jan. st. v. vel 2. Febr. st. n.

Sic Canicula habet Tycho Brahe anno 1600. in $20^{\circ} 19'$ Cancri, cum lat. $15^{\circ} 57'$ austr., cujus asc. recta $109^{\circ} 37'$, declinatio $6^{\circ} 12'$ bor. Coelum mediat cum $18^{\circ} 6'$ Cancri. Sub eadem igitur altitudine poli invenitur differentia asc. $7^{\circ} 3'$, ut sit asc. obliqua $102^{\circ} 34'$, coorientis $3^{\circ} 40'$ Leonis, cujus angulus $50^{\circ} 56'$. Descensio vero obliqua $116^{\circ} 40'$, coorientis $27^{\circ} 36'$ Geminorum; ubi angulus $36^{\circ} 17'$. Cumque stella sit Braheo magis secundae, profunditas Solis sistenda est 13° , quae cum angulis dictis arcus eclipticae inter ortum et Solem postulat $17^{\circ} 27'$ et $23^{\circ} 14'$, quorum ille additus, hic ablatas, designant loca Solis in apparitione stellae $21^{\circ} 7'$ Leonis, in occultatione $4^{\circ} 16'$ Geminorum. Si vero cum Ptolemaeo stellam referamus luter magn. primae, eoque Solis demersionem 12° , duobus gradibus posteriori existente Sole stella occidet, duobus anteriori oriatur bellice. Ergo Sole versante inter $4^{\circ} 16'$ Gem. et $21^{\circ} 7'$ Leonis, hoc est a $\frac{16}{12}$. Maii usque in $\frac{4}{14}$. Augusti, Canicula latet sub Solis radiis. Occidit cum Sole $\frac{9}{10}$. Junii, oritur cum eo $\frac{11}{27}$. Julii, coelum cum eo mediat $\frac{1}{10}$. Julii. Occidit in principio diei $\frac{16}{24}$. Novembris, oritur in principio noctis seu e regione Solis $\frac{11}{22}$. Novembris.

Haec cadem deducemus etiam circa seculum Hippocratis medici, qui dierum calcularium observationem inculcat; quo non multo sunt posteriores Meton et Eudoxus, il nempe, quorum sententiam secutus est Aratus in carminibus, quibus imagines coelestes descripsit, quorum carminum exstant versiones in latinum sermonem Ciceronis et Caesaris Germanici. Quin etiam Plinio et scriptoribus rei rusticae creber in ore est Eudoxus. Fixae quidem Eudoxi seculo 28° erant anteriores quam hodie, assumatur ergo Sirius in $10^{\circ} 36'$ Gem., Canicula in $22^{\circ} 19'$ Gem. circiter. Latitudines vero retinebimus easdem $39^{\circ} 30'$ austr. et $15^{\circ} 57'$ austr. Et si enim major olim fuit, id tamen erat propter obliquitatem eclipticae majorem tidem. Itaque compensatione facta, nihil in asc. recta et declinatione peccabitur, quae inventantur per assumpta secundum praecepta supra tradita de tabula quidem anguli in hunc modum.

Arcus longitudinum $70^{\circ} 36'$, $82^{\circ} 19'$ a 0° Ariet. Hi quæsihi hac vice non per gradus eclipticae, sed inter ascensiones rectas, ostendunt quasi de gradibus eclipticae

12. 6. Gem. 22. 57. Gem.

Vel arcum 72. 6. 82. 57.

A nobis vero pro arcubus aequatoris sunt habendi. Respondent autem eisdem sub titulo declinationum arcus 22. 20. 23. 20, qui tamen a nobis pro circuli latitudinis arcubus sunt habendi. Est autem uterque porrectus ab ecliptica in meridiem. Atqui et latitudo utraque erat meridionalis $39. 30. 15. 57$, illa major arcu superiore, ista minor arcu suo: ab illa igitur subtrahere arcum, hanc ab arcu, restant $17^{\circ} 10'$ mer. (sin. 29515); $7. 23$. sept. (sinus 12851) uterque ab aequatore: et hae sunt bases declinationis hac vice (nam usu directo tabulae essent bases latitudinis). Tertio fisdem primo positis arcubus sub titulo anguli respondent hi anguli $62^{\circ} 23'$ (sinus 99117), $86^{\circ} 56'$ (sinus 99857). Multiplicatis invicem sinibus, ut jubet praeceptum, prodeunt sinus declinationum harum $17^{\circ} 0'$ merid. et $7^{\circ} 22'$ sept.

Pro ascensionibus rectis sumuntur complementa angulorum istorum $7^{\circ} 37'$ (sinus 13254) $3^{\circ} 4'$ (sin. 5350); et multiplicantur in tangentes basium altitudinis 30891 et 12908. Et abactis 5 ultimis prodeunt tangentes horum arcuum prosthaphaereticorum $2^{\circ} 20'$ add., $0^{\circ} 23'$ subtr. Ille igitur additus ad ascensionem rectam, quia basis meri-

dionalis in Geminis tendit prorsum, hic ablatas, quia septentrionalis basis hic tendit retrorsum, constituent ascensiones rectas $74^{\circ} 26'$ et $82^{\circ} 34'$.

Sit nobis propositum clima Dia-Rhodu; quartum, quia hoc est medium inter climata a veteribus numerata.

Sit altitudo poli 36° , aequatoris 51° . Cujus tangens 137638: qui multiplicatus in tangentes declinationum, australis 30573, borealis 12869, abjectis 5 ultimis conficit sinus arcum differentiae asc. $12^{\circ} 50'$ add, et $5^{\circ} 23'$ subtr. ab asc. r. ⁴⁾ Igitur ascensionea obliquae sunt has 87. 16, coor. 13. 49. Canc., 77. 10, coor. 4. 37. Canc.

desc. 61. 36. coor. 20. 25. Taur., 57. 56, coor. 11. 39. Gem.

Anguli eclipticae et horisontis sunt hi 56. 20, 52. 8.

67. 20, 58. 22. Dmersio Solis sit 12° vel

13° ut prius. Hinc arcus inter eclipticam et horizontem isti 14. 28 vel 17. 12.

12. 1 vel 15. 59.

Et superiores additi ad coorientes, inferiores ablati a coocidentibus, ostendunt loca Solis

Pro ortu hel. 28. 17 Cancr., 21. 49. Cancr.

Pro occasu hel. 7. 24 Tauri, 25. 40. Tauri.

Quibus vero diebus anni Juliani veteris Sol et hodie occupet proditos gradus et olim occupaverit, sequens tabella indicat.

Ubi bodie Sol est dia	Ibi erat tempore Hippocratis die circiter	Et ibi Sole versante, ac. in	Ad Hippocratis tempora tantum.	
			Canis	Canicula
17. Apr.	2. Mail.	7. 24. Taur.	Occultabatur.	
1. Mail.	16. Mail.	20. 25. Taur.	Occid. cum Sole.	
6. Mail.	21. 23. Mail.	25. 40. Taur.		Occultabatur.
23. Mail.	7. Junil.	11. 39. Gem.		Occid. cum Sole.
27. Mail.	11. Junil.	15. 38. Gem.	Culminabat.	
4. Junil.	19. Junil.	22. 41. Gem.		Cul. cum Sole.
16. Junil.	1. Julil.	4. 37. Can.		Oriebat. cum Sole.
26. Junil.	11. Julil.	13. 49. Can.	Oriebat. cum Sole.	
4. Julil.	19. 17. Julil.	21. 49. Can.		Emergebat.
11. Julil.	26. Julil.	28. 17. Can.	Emergebat.	
3. Nov.	18. Nov.	20. 25. Scor.	Occidebat mane.	
24. Nov.	9. Dec.	11. 39. Sag.		Occidebat mane.
16. Decemb.	31. Dec.	4. 37. Cap.		Oriebatur vespert.
25. Decemb.	9. Jan.	13. 49. Cap.	Oriebatur vespert.	
Julianl.	Julianl retro extensl.			

Compara nunc testimonia veterum. Multum obscuritatis habent scripta veterum, vel quod nondum esset vulgo nota astronomia, vel quod nondum animadversa seculorum varietas; unde factum, ut nec astronomi ab erroribus essent immunes, nec inter se consentirent. Itaque scriptores astronomiae imperiti ducentque certum sequentes, aut dubii quem sequantur, magna cum attentione et discretionem sunt legendi.

Virgilius tamen consentit huic calculo versibus hisce:

Candidus auratis aperit dum cornibus annum

Taurus et adverso cedens Canis occidit astro.

Sole, inquit, in Tauro versante, Canis occidit eedens adverso astro. Causam fingit poeta, cur occidat Canis, quia nimirum cedit adventanti Soli; et cur cedit? Quia Sol canibus adversum est astrum; alludit ad caniculares, quando ob aestum, cujus causa est Sol, canes aguntur in rabiem, ut annotavit Plinius. Vides adscriptum esse occasui Canis bellaco 8° Tauri et

2. Mali tempore Hippocratis, quod erat circa finem Aprilis tempore Caesaris: itaque poëta voce *aperit* etiam ad nomen mensis alludit, in quem incideret hic occasus, vel saltem ad mensem, quo Sol Taurum ingreditur.

Plinius vero *Caniculam* ait *oriri Assyriae XVI. Cal. Aug.*, alibi habet XV, id est 17. 18. Julii: et tabella notat in climate quarto emersionem ejus 19. Julii. Ergo in rectiori sphaera, sc. in Assyria, omnino 18. vel 17. Julii, praesertim si illam cum Ptolemaeo faciamus primae magnitudinis, qua de causa etiam 17. Julii et superius 23. Maii apposuit. Respexit ergo hic Plinius ad Eudoxi tempora. Alio loco perplexius multa simul involvit, dicens id fieri (Canis ortum nominat, pro Caniculae) XV. Cal. Aug. Sole in primo Leonis; cum tabella nostra habeat 22° Caneri, et sic 8 minus, quam ille dicit. Arrigendae sunt aures, quid hoc sibi velit. Nam addit, *diebus 23 post solstitium id fieri*. Alibi *post dies XXIV. a solstitio in VIII. Cal. Julii*, ubi Caniculam appellat.

Quod igitur 23 vel 24 dies a solstitio ad emersum Caniculae notat, id cum tabella consentit ad Eudoxi tempora. Nam solstitium conficitur in 0° Caneri et tabella exprimit 22° Caneri, fere complementum, qui arcus conficitur a Sole 23 diebus. Quod autem hunc 22° vel 23° Caneri appellat 1° Leonis, id cognationem habet cum illius aevi vulgata perplexitate, credentia, solstitia in octavis partibus signorum confici. Nam si solstitii sedes, quae nobis est 1° Caneri, transfertur a Plinio in 9. vel 8. Caneri, quod disertis verbis expressum est lib. 18. cap. 28, consequens est omnino, ut quem nostra tabella nominat 23° Caneri, is a Plinio habeatur pro 1° Leonis. Quare etiam haec annotatio Pliniana eousensum priorum sequitur.

Occasum Canis bellacum sic describit Plinius. VI. Cal. Maii *Canis vesperi occiditur Atticae*, id est 26. Aprilis; alibi: III. Calendas Maii *Assyriae*, id est 29. Aprilis. Alibi: *post dies undeviginti ab aequinoctio verno, per id quadriduum varia gentium observatione in IV. Cal. Maii Canis occidit, cui praecedere Caniculam necesse est*. Vides loqui Plinium de Cane majore. De Canicula quidem frustra est Plinius. Non enim, si haec praecedat oriendo, propterea et occidendo priores tenet, quin potius ejus occasum sequi necesse est ob id ipsum, quia praecedat ortu, contractiori utroque termino suae occultationis. Sed et illud obscurum, quomodo hic dicat, IV. Cal. Maii esse post dies 21 (19) ab aequinoctio verno? An ergo vernum hic aequinoctium reponit in 9. Aprilis, a se ipso dissentiens? cum alias aequinoctia in 25. Martii, 24. Sept., solstitium in 24. Junii ponat crebro. Anne bis hallucinatus hic est in illius seculi perplexitatibus, deceptus affinitate rerum? Inter initia signorum et anni cardines veteres quidam statuerant gradus octo; inter eosdem temporum cardines et Calendas mensium Caesar etiam dies octo interjecerat: quare in Calendis mensium Sol tenebat sedecimas partes signorum vetustatis (octavas secundum veram rationem), Plinius ergo etiam sedecimum diem a vera sede aequinoctii tribuit aequinoctio, tantum a Calendis descendens, quantum scire debebat Calendas a vera sede aequinoctii descendisse quantumque Hipparchus principia suorum signorum a principiis veterum descendere fecit. His igitur Plinii manifestis erroribus dissimulatis, id jam ad rem pertinens perpendamus, quod Plinius a 28. Aprilis quadriduum succedens tribuit occasui Canis Sirii, cum tabella ad Hippocratis tempora reponat occultationem ejus ad 2. Maii, quod esset tempore Plinii ultimis diebus Aprilis. Hic igitur ex sectis quatuor, quas praefatur, Caesaris potissimum sectam secutus esse videtur. Rursum idem Plinius ex disciplina Aegyptiorum prodit

occultationem Canis vespertinam VIII. Idus Mali, octo diebus serius, ortum vero Procyonis matutinum secundum eosdem Aegyptios IV. Non. Julias (sic enim legendum esse, non Jnnias, testantur antecessoria et sequentia). Ita spatium temporis, quod indulget per alia climata Canis occultationi, scilicet dies 75 circiter, secundum Aegyptios commemorat multo brevius, sc. dierum 56. An tantum possit aëris Aegyptiaci puritas et diligentia observatorum in gente, cui Sirius pro Deo colebatur, a cuius exortu omnes spes suas suspendebant? Id videndum. Nam tabella Caniculæ exortum cum ipso Sole in Rhodo tempore Hippocratis posuit ad diem 1. Julii, tempore Caesaris sane per dies duos vel tres posterius; non igitur emersionem, sed ortum cum Sole intellige.

Quæ fuit apud veteres, quæ hodie, ratio dierum canicularium, causa principii? Plinius lib. II. cap. 17. tribuit ortum Caniculæ diei XV. ante Cal. Aug., quo die putabat Solem in Leonem ingredi, cum vere esset in 22° Cancr. Ad hunc ergo diem ex traditione veterum adscribi solebat initium dierum canicularium. Atqui a temporibus Hippocratis usque ad nos hic Solis situs a 17. Julii retrocessit usque ad 2. Julii. Quare calendariographi, dissimulato transitu fixarum in signa sequentia, alii sedem hanc canicularibus fixerunt antiquissimam in 17. Julii; alii, eam ad clima septimum accommodantes, transposuerunt ad 19. Julii retinentque adhuc hodie, perinde ac si anno Juliano vel Sol reverteretur vel fixæ; alii, considerata differentia naturalis anni a Juliano politico, quisque sua ætate expenderunt modulum anticipationis anni naturalis in Juliano et hoc canicularium nomen, despectis fixis, a quibus est ortum, cum ipso Sole in Juliano fecerunt ascendere. Quare in hodiernis Calendariis, prout mos, quem quisque sequitur, vetustus est, ita caniculares vel in 19. vel in 17. vel in 16. vel 7. vel 6. Julii incipiunt. Post correctionem enim Gregorianam, exemptis diebus 10, sedes ista vetustissima in 17. vel 16. Julii uno momento ascendit in 7. vel 6. Julii, relictis canicularibus in 17. 16. novi Calendarii; quod ad rationes anni naturalis factum non male, quippe retracti hic sunt dies 17. 16. Julii propius ad 22° Cancr., quem olim occupabant. Ast alii ponderosam et pene sacrosanctam existimantes recentissimam quamque observationem in Calendariis, nec attendentes ad primam ejus originem, ne per exemptionem 10 dierum coelo naturæque scilicet vis inferretur, caniculares ex 16. 17. vel 19. Julii, sic ut hi dies per tot secula sunt prolapsi, transposuerunt ad correspondentes anni Gregoriani 26. 27. 29. Julii. Alii vicissim traductos per exemptionem 10 dierum in 6. 7. Julii Juliani usurpatosque sic aliquamdiu, instulerunt in 6. 7. Julii Gregoriani, vel 26. 27. Junii Juliani. Haec igitur de more in Calendariis recepto et anno politico.

At si naturam anni sideris naturalisque respiciamus, duo nobis hodie nascentur exordia canicularium, alteri aestum habent eundem cum Hippocraticis, alteri sidus et nomen idem. Ad 22° Cancr. enim, quo loco Sol versans olim detexit Caniculam, redit hodie 4. 14. Julii, vel si in nostro climate sideris ortus antiquus esset expensus, 6. 16. Julii. At in nostro climate et nostro seculo Canicula deprehenditur emergere, ut supra dictum, 4. 14. Augusti. Jam penes naturæ consultos est, utri vim canicularium tribuere velint, Solis altitudini, an sideri Canis. Nam si etiamnum hodie, licet divulsorum, temperatus tamen vires autumant ex intervallo dierum aequali, manebit apud primam sedem in 17. vel 19. Julii anni politici Juliani, 27. 29. Gregoriani.

Quantus est numerus canicularium et quæ ejus numeri ratio? Etal non minus hic quoque variant calendariographi, quidam 80 numerantes, alii 34, alii

40, alii 42, antiquitus tamen 45 dies statuebantur, non jam coeli, sed tempestatum observatione, quippe totidem diebus flant etesiae post ortum Canis, ut observarunt veteres. Plinius quidem etesiarum prodromos ponit VIII. Cal. Augusti, diebus 7 post ortum Caniculae, in ipso exortu Canis Sirii, finem in Assyria V. Cal. Sept., in Aegypto XVI. Cal. Octob., dies igitur 34 vel 34, quorum medium est 44. Videtur tamen omne tempus inter Canis et Arcturi sidera Cani attributum, eo quod anni natura per id tempus fere maneat uno statu, donec appropinquans exortus Arcturi matutinus tempestatem (observatorum iudicio) inducat contrariam et evidentem: nam et Arcturi exortus a Plinio vehemens sidus appellatur.

Examina etiam Arcturi ortus et occasus, sed ad seculum Hesiodi, qui de illo scripsit. Ex tabella superiori apparet, fixis per annos 2400, quantum est ab Hesiodo ad nos, deberi motum 34 graduum eirelter, qui subtracti de loco hodierno in $18^{\circ} 40'$ Librae, reliquant $14^{\circ} 40'$ Virginis. Methodo priori quaero ejus ascensionem rectam et declinationem sic.

Angulus $164^{\circ} 40'$ dat $163^{\circ} 21'$; decl. $6^{\circ} 34'$, ang. $67^{\circ} 21'$ compl. $22^{\circ} 39'$. Sinus 38510. Maneat hodierna lat. sept. $31^{\circ} 5'$ ($+ 6^{\circ} 34'$): basis declin. $37^{\circ} 57'$. Tang. 77057 mult. in 38510 dat 29675, tangentem arcus $16^{\circ} 32'$.

Sin. $67^{\circ} 21'$ (92287) mult. in 61038, sin. $37^{\circ} 57'$, dat 56640, sinum $34^{\circ} 30'$ declin. Arcturi, $163^{\circ} 21' + 16^{\circ} 32' = 179^{\circ} 53'$ asc. recta Arcturi.

Sit eadem alt. sequentis 54° per Rhodum, ejusque tangens 137638 dividat tang. $34^{\circ} 30'$, 68728, quotiens 49934 est sinus $29^{\circ} 57'$ diff. asc.; $179^{\circ} 53' - 29^{\circ} 57' = 149^{\circ} 56'$ asc. obliqua; $179^{\circ} 53' + 29^{\circ} 57' = 209^{\circ} 50'$, descensio. Cooritur $5^{\circ} 11'$ Virg., coecidit $11^{\circ} 38'$ Scorpil.

Anguli ad haec puncta $74^{\circ} 58'$ et $35^{\circ} 0'$; horum sinus 96578 et 57358 dividant sinum dimensivis 19° , 20791; quotientes 21528 et 36250 sunt sinus arcuum $14^{\circ} 39'$ et $21^{\circ} 15'$, ille add. ad coarctentem, hic auferendus a coecid., ut ostendantur Isos Solis $19^{\circ} 50'$ Virg., $25^{\circ} 17'$ Librae.⁴⁰⁾

Hinc Tabella apparitionum Arcturi ad seculum Hesiodi.

Ubi Sol hodie est die.	Ibi tempore Hesiodi fuit die	Et ibi Sole versante, sc. in	Arcturus
13. Februarii	3. Martii	$5^{\circ} 1'$ Pisc.	Oriebatur vesp.
25. Aprilis	13. Maii	14. 32. Taur.	Occidebat mane.
19. Augusti	6. Sept.	5. 11. Virg.	Oriebatur cum Sole.
2. Septembris	20. Sept.	19. 50. Virg.	Emergebat e radiis
23. Septembris	1. Octob.	29. 52. Virg.	Culminabat cum Sole
7. Octobris	25. Octob.	23. 17. Librae	Occidebatur vesp.
28. Octobris	15. Novemb.	14. 32. Scorp.	Occidebat cum Sole
Juliani	Juliani retro extensi circiter.		

Compara jam versus Hesiodi.

Εὖτ' αὖ δ' ἐξηκοντα μᾶτι τροπᾶς ἡλίου
 Χειμῶν ἀτελεσθ' Ζεὺς ἡμάτι: θῆ γὰ τοῖ' ἡσυχίᾳ
 Ἀρκτορος, προλαβὼν ἱεροὶ ἔσσι ὠκεανοῖο
 Πρωτοῖς παμφαιῶν ἐπιτελλεται ἀνροντεφῶος.

Diserte exprimit ortum stellae ex horizonte vespertinum seu acronychon, addit diem 60. post brumae solstitium. Cernis autem, tunc illum vesperi solitum oriri, Sole in 5° Piscium existente, id est 65° post solstitium hibernum. Habes ergo testimonium Hesiodi, solstitium post princepsium Capricorni confici

5 diebus et pluribus, si minorem motum fixarum statuerimus inter secula Hipparchi et Hesiodi, uti tenuit Hipparchus et Ptolemaeus: eredique potest, hoc etiam inter illa fuisse documenta, unde Eudoxus vel Hipparchus ratiocinati sunt, solstitia in octavis pertibus signorum consilii; sed de hac re plura libro VII.

Plinius exortum stellae ponit 11 diebus ante aequinoctium, quod congruit fere ad Hesiodi tempora, quia vides, Solem in emersione Arcturi poni 10^o amplius ante aequinoctium. Occasum ter commemorat, primo VIII. Idus Junias, quod verum est hodie de occasu matutino, quem vides 6. Junii Juliani contingere; rursum eundem VIII. Idus Aug., quod plane abhorret; tertio occasum vespertium vel prid. Cel. vel V. Novas Nov., quod solum congruit. Plinius enim triente intervalli temporarii distat ab Hesiodo, besse a nobis. Et nobis occultatur Arcturus 25. Novemb., Hesiodo 25. Octob., ergo ad analogiam Plinio 5. Novembris.

De antoecis, perioecis et antipodibus.

Quos appellant *geographi ἀντοικες*, quos *περιοικες*, et quos *ἀντιποδες*? Antoeci et perioeci quasi adversaeolae et circumcolae dicuntur. Antoeci habitant sub eodem meridiano terrestri, sed in diversis climatibus, aequaliter utrinque distantibus ab aequatore; ut L, O (Fig. 44). Perioeci contra habitant in eodem climate, sed contrariis ejus sectionibus eum meridiano uno et eodem, ut L, P. Antipodes et in diversis climatibus, ab aequatore aequaliter remotis, et in contrariis illorum eum uno meridiano sectionibus, hoc est diametraliter invicem oppositis, habitant, ut L, A. Solent aliqui eos, quos antoecos dico, appellare *ἀντοικες*; ad comparationem *ἀντιποδες*, quod ut his pedes, sic illis humeri sint oppositi et obversi; *περιοικες* vero et *ἀντιποδες* promiscue solent interdum nominare *ἀντιχθονιας*.

Quibus inter se proprietatibus apparentiarum distinguuntur? Antoecis contraria sunt discrimina temporum anni, perioecis contraria discrimina diei et noctis, antipodibus utrumque. Antoecis enim eodem momento meridies, eodem media nox, at aestas et dies alteris longae, quando reliquis hiems et noctes sunt longae et vicissim. Excipe zovam torridam, ubi cum diebus et eum aestato sic est comparatum ut dixi; hiemem possunt simul habere, at non aequaliter comparetem, nec ejusdem, sed contrarii census. Sic et excipe aliquid in zonis frigidis, quando continua dies est, quae ob motum Solis proprium alteris contingit longior quam reliquis. Perioecis dies noctesque eodem tempore eveniunt aequae longae; diei tamen medium habent alteri, quando reliqui mediam noctem, seu veram noctem, seu analogum quid mediae nocti. Antipodibus omnia contraria eveniunt: aestas et longae dies, vel noctes nullae, quando alteri hiemem et breves vel nullas dies habent, nox vero ibi, quando hic dies, et dies, quando hic nox. Eodem insuper momento, quo nobis Sol oritur, occidit illis, et quando nobis occidit, illis oritur.

Hic adde ex superioribus, quod antoecis et antipodibus, quippe incolis australis hemisphaerii, contrariae sunt rationes ortus et ocessus stellarum, ascensionumque et descensionum signorum eclipticae. Nam stellae, quae semper apparent penes nos, illae nostris antoecis et antipodibus nunquam cernuntur, et quas nos nunquam videmus, illi semper vident. Reliqua sidera orientia et occidentia ortus occasibus permutant, nobisque cum illis, sed in diversa parte revolutionis diurnae, sunt communia: quibus enim cum gradibus aequatoris et eclipticae quaeque penes nos oriuntur, iisdem cum gradibus penes illos occultantur et vicissim. Nimirum quia etiam signa eclipticae, quae

pene nos sunt in semicirculo ascendenti, constituunt illis semicirculum descendentem.

Quid observandum super antoecis, perioecis et antipodibus habitantium in sphaera recta et parallela? Habitantium in sphaera recta antoeci vultu sunt, antipodes inter perioecos. Ita etiam, qui utramque sphaeram parallelam, hoc est qui sub utroque polo habitant, inter se et antoeci sunt et antipodes, perioecos nullos habent.

Etiame umbrarum est aliqua apud antoecos, perioecos et antipodas diversitas? Nulla admodum. Nam utrique ex comparibus sunt vel amphiscii, ut antoeci, perioeci et antipodes zouae torridae, vel periscii, ut frigidarum, vel heteroscii, ut temperatarum. Comparatione vero ad corpus humanum antoecis et antipodibus contingit idem circa umbras, quod supra dictum his contingere circa ortus et occasus Solis. Umbra enim his ad sinistras, illis ad dexteris partes ire videtur.

De longitudinibus et distantis locorum.

Cum passim comparaveris ascensionem rectam stellarum cum longit. locorum in Terra, declinationem cum eorum latitudine, dic igitur, quorum conducat cognitio longit. et latit. locorum in Terra. 1) Pars est astronomiae de differentis longitudinum locorum in Terra, seu differentia meridianorum horaria, ut ad diversos meridianos possit accommodari phaenomena coelestia. 2) Sine longitudinibus et latitudinibus locorum non possunt investigari calculo distantiae locorum.

Quantum temporis valet gradus unus de differentia longitudinum in Terra? Cum Sol ad ejusdem loci meridianum reversus, unde erat digressus, metam figat diei et nocti naturali, horarum 24, ergo 15 tempora aequatoris terrestris valent horam unam, tempus seu gradus unus quatuor horae minuta et sic deinceps.

Quomodo differentia longitudinis locorum in Terra investigatur? Ex altitudinibus poli et distantia locorum. Nam si sciatur distantia itineraria viae directae in milliariis Germanicis, ea convertitur in gradus unius circuli magni, per utrumque locum ducti, sumtis 15 milliariis pro uno gradu; vel si alter locus ex altero conspici possit, arcus circuli magni inter loca investigatur ea methodo, quae libro primo est tradita. Tunc igitur formatur triangulum SIP (Fig. 45) inter ista loca S, I et polum Terra P, uotorum laterum, estque processus investigandi angulum ad polum, seu differentiam longitudinis, plane idem, qui fuit superius, cum quaereretur differentia ascensionalis, itidem ex distantia, itaque tantum exemplis opus est.

Sint loca latitudinis ejusdem.

Licet est alt. poli seu lat. loci $48^{\circ} 16'$, compl. $41^{\circ} 44'$

Grati Styriae 47. 2. . . . 42. 58.

Utrique septentrionalis. Numerantur autem Licet Gratium millaria ad summum 30, id est gradus in circulo magno 2.

$42^{\circ} 58' + 41^{\circ} 44' = 84^{\circ} 44'$; summa minor quadrantis.

$47^{\circ} 2' + 41. 16 = 88. 48$. sinus 99978; compl. $84^{\circ} 44'$ sinus 9179 subtrahere, residuum 90799, dimidium 45400 (si summa superaret quadrantem, excessus sinum adderes).

Compl. distantiae 2° sinum 99939 a sinu primo 99978 subtrahere, residuum 39 continua 5 cyphris (si distantia superaret quadrantem, excessus sinum adderes).

$3900000 : 45400 = 86$; quotiens est sinus versus, ergo sinus 99914 compl. $87^{\circ} 37' 30''$, ergo sinus versu arcus est $2^{\circ} 22\frac{1}{2}'$.⁴⁶⁾

Hic est quaesitus arcus aequatoris terrestris seu angulus ad polum, differentia

longitudinis inter Gratium et Lineum. Valet in tempore minuta unius horae $9\frac{1}{2}$. Tantum igitur Grati plus numeratur temporis quovis momento, quam Linei.

Sint loca latitudinum diversarum. Ut si Christianus aliqua ex civitate Pemba regni Congo, sit in meridionali et occidentali litore Africae, peregrinationem devotionis ergo susceperet Jerosolyma, feratque se emensum esse miliaria Germanica 708 vias directae, quanta erit differentia longitudinum, cum sciamus, Jerosolymarum esse latitudinem $31^{\circ} 40'$ sept., Pembae vero latit. merid. $8^{\circ} 10'$ circiter. Ergo miliaria 708 sunt arcus $47^{\circ} 12'$ circuli magni.

Compl. $8^{\circ} 10' - 31^{\circ} 50'$

$58. 20 - 58. 20$ compl. $31^{\circ} 40'$

Summa $66. 30$ $140. 10$; sinus $66^{\circ} 30' - 91706$

Excessus $50. 10$ sinus 76791

(Si summa minor esset quadrante,

Aggregatum 168497 .

compl. sinum ut prius subtraheres)

Dimidium 84249 .

Sinus complement. distantiae $42^{\circ} 48'$ 67940 ; adde sinum 91706 (hilo si excessus esset, subtraheres, contra quam prius). Summa $159646 : 84249 = 189493$, est sinus versus arcus $153^{\circ} 30'$. Hujus vero jam compl. $26^{\circ} 30'$ est diff. longitudinum quaesita. Ergo Pemba $26^{\circ} 30'$ esset occidentalis Jerosolymis, id est h. l. $46'$.

Quomodo utendum est hac temporis differentia? Cum certum est, phaenomenon aliquod eociesse contingere eodem momento in omnibus Terrae locis, ut cum Luna ineipit umbram ingredi, tunc si tempus habetur phaenomeni in certo loco, semper minus a meridie numerant illi, qui a loco illo sunt occidentiores, plus, qui orientiores. Itaque differentia horaria longitudinum pro occidentaliioribus est subtrahenda, pro orientaliioribus addenda.

Dic aliquod mirum phaenomenon, ex hac causa resultans. 1. Lusitani, quorum est mentio facta lib. I. fol. 128, post trienuli peregrinationem consummatam in suo orbis periplo, domum reversi seriam quartam numerarunt, cum Lusitania quitam ageret: meridianum enim suae navis, unde diei naturalis numerabant initium, Solem secuti, circumtulerunt semel, cum meridianus Lusitaniae mansisset suo loco. Contrarium illis evenit, qui in orientem egressi ex occidente domum revertuntur, nam Soli obviantes una die plus numerant deique, quam illi, ad quos sit reversio. 2. Exercent haec quaestio Judaeos: si Judaei duo, alter per occidentem, alter per orientem penetrantes in Chinam, invicem obviant, utrius sabbathum valeat? nam diversa (uno die differentia) sabbatha conferent, et praevertetur, qui per orientem advenit. (Cfr. IV. 39.) Quia etiam Christiani, festorum suorum observatores rigidi, vexabuntur eadem perplexitate; cum omnia festa, ut Judaei ab occasu Solis in quovis loco, sic Christiani ab ortu luceant.

Quibus praeterea modis inquiritur differentia longitudinum? Astronomea media sunt tantum duo, alterum per observationem eclipsium Lunae jam explicatam, altera per locum Lunae visibilem, versantis in nonagesimo ellipticae gradu, de quo non est hujus loci plura dicere; utrumque servit locis longe distantibus. Physiici tentant modum unum per magnetem rotundum, Terrae effigiem, cujus principia sunt adhuc quidem incerta; postulatur enim, ut sicut axis magnetis naturalis sponte dirigatur in planum meridiani, et sicut polus magnetis mergitur sponte pro ratione propinquitatis loci ad polum Terrae profundius vel altius, ut sic etiam sit in circulo magnetis medio pars certa, quae sponte se convertat ad locum nativum. Quicquid in re sit, observationem certe nonnulli crassam esse posse eoque minus utilem, verisimile est.

Est etiam modus unus chorographicus pro locis non multum distans, sc. quorum unus ex altero possit conspici, ut utriusque loci sciatur altitudo poli, alterius linea meridiana et reliqui azimuth, ab huius meridiana numeratum, quos angulos positionis appellant. Datur sic in triangulo priori SIP angulus PSI cum duobus lateribus PS, PI, quaesitum SPI comprehendentibus: quem modum nautae quadamtenus imitantur usu rosae nauticae, si in ejusdem venti plagam continuo navigent, altitudinem poli et in loco unde solvunt et ubi appellant observent. At quia ipsi non in circulo magno navigant (plagam eandem observantes), sed spiralem globi, misum igitur hunc modum faciamus, ut mere geographicum.

Ostende, quomodo distantia locorum aliter quam iter faciundo pateat. Id fieri potest, praeter alios modos, etiam beneficio astronomiae, ex latitudinibus duorum locorum et differentia longitudinum, in triangulo SPI eodem quo prius; processus prima parte eadem, secunda vero contraria, fere ut cum supra declinatio ex distantia stellae et poli a vertice et ex angulo azimuthi quaerebatur.

Processus est iste.

Sint latitudines cognomines. Verbi causa, navis Conimbria Lusitaniae solvens tendat in Americam, appulsura ad ostia fluvii Panuco in sinu Mexicano; et notum sit ex observatione astronomica, differentiam meridianorum esse h. 6' 16". Latitudo Conimbriae sit 40°, ostiorum Panuco 23°, utraque septentrionalis.

Ergo minoris lateris compl. 67°, majoris compl. 50°, summa 117°, excessus 27°, 23° + 50° = 73°, cujus sinum 95630 adde ad sin. 27° (45399); compl. sinum subtraheres. Aggregatum 141029, dimidium 70515.

Differentia meridianorum in gradus resoluta facit 94°. Anguli huius sinum versum 106976 multiplica (subjectis 5 ultimis) in 70515; factus 75434, subtr. a sinu primo 95630, restat 20196, sinus arcus 11° 37'; compl 78° 23' est distantia locorum in circulo magno. Sumtis autem 15 miliaribus pro gradu, constatur miliaria 1175 $\frac{3}{4}$.

Sint latitudines diversae. Ut si quaseratur, quantum sit miliarium a promontorio Bonae Spei in extremo angulo Africae meridionali, cujus lat. 35° austr., usque Diem Cambajae, castellum Lusitanorum ad ostia Indi fluvii, cujus lat. 21° septent. Constet autem ex observatione eclipsium, differentiam meridianorum esse h. 4. 4', id est gradus anguli ad polum seu aequatoris terrestris 61°.

Minoris lat. compl.	69°	minor lat. 21°
Majoris lat. compl.	55.	55.
Summa	124	76.
Excessus	34°, sinus 55919	
	sin. 76°	97030

(Complementi sinum
subtraheres.)

Aggregatum 152949
Dimidium 76475

Anguli 61° complementi ad semicirculum (119°) sinus versus 148481 multiplicetur in 76475, subjectis 5 ultimis. Factus major 113550
Sinus primus 97030

Differentia 16520 est sinus arcus 9° 30'. Excessus supra 90°, quia factus major, ergo 99° 30'. Quia diversae latitudines, non hic arcus est distantia quaesita, sed ejus compl. ad semicirculum 80° 30'. Valet miliaria 1207 $\frac{1}{2}$. 47)

LIBRI III. ET CUM EO DOCTRINAE SPHAERICA FINIS.

EPITOMES

ASTRONOMIAE COPERNICANAE,

Usitata forma Quaestionum et Responsionum conscriptae

LIBER QUARTUS,

DOCTRINAE THEORICAE PRIMUS,

Quo

Physicae Coelestis,

Hoc est omnium in coelo magnitudinum, motuum proportionumque
causae vel naturales vel archetypicae explicantur,

et sic

PRINCIPIA DOCTRINAE THEORICAE DEMONSTRANTUR.

Qui, quod vice supplementi librorum Aristotelis de Coelo esset, certo consilio seorsim
est editus.

AUCTORE:

Joanne Kepplero.

Cum Privilegio Caesareo ad Annos XV.



LENTIS AD DANUBIUM,
excudebat Johannes Plancus.
Anno MDCXX.



LECTORI S.

Undecimus est annus, ex quo Commentaria mea de motibus stellae Martis edidi. Qui liber, cum in psuca multiplicatus esset exemplaria doctrinaeque de causis coelestium inter spineta numerorum et reliqui apparatus astronomici velut abscondisset, cum et pretio libri tenuiores abstergerentur, visum est amicis, recte me et ex officio facturum, si Epitomen conscriberem, in qua summa doctrinae tam physicae de coelo, quam astronomicae, resectis demonstrationum taediis, oratione simplici et plana proponeretur. Factum id a me ante multos annos, sed dum editioni variae intercedunt morae, non relictus tantum libellus ipse fuit aliquoties et ni fallor, qua dabatur, perfectus, sed ipsum etiam editionis consilium coepit labefactari. Quibusdam enim in doctrina sphaerica ante triennium edita diffusior visus sum in disputatione de motu vel quiete Terrae dinrva, quam pro ratione epitomes. Cogitabam igitur, si hanc partem non concoquerent lectores, quae tamen in uila epitoma astronomica deest, quanto igitur insolentior illis futurus sit libellus iste quartus, qui tamen multa de omni coelorum natura nova et inopinata ventilat, ut dubitare possis, physicaeue potius an astronomiae partem facias, nisi astronomiam ipsam speculativam totam physicae esse partem scires. Ex adverso reputabam, hanc ipsam esse materiam, ejus amplificandae inque publicum inculcandae causa scribendi libelli auctores mihi facti sint amici, omitti speculationes has non posec, nisi data opera tuebras doctrinae theoricæ, suis quippe principiis spoliatae, studcam offundere. Tandem disceptationem istam diremit necessitas, utinam nuspiam minus importuna, quae, quod fieri aliter non potuit, quasi consilio susceptum videri fecit. Fervebat praelum, surgebat opus doctrinae theoricæ, curatore ejus legitimo, quem in praeambulo doctrinae sphaericae tetigi, antiquum obtinente, dormitante an animam forsitan agente, partes vero ejus suppiante liberalitate patroui eminentissimi, cum ecce mihi causam subitam proficicendi opusque interrumpendi, quo ipso tempore et typi finem libri quarti attigerant et uuudinae Fronscofurtenses adessent. Incidit, rectissime futurum, si liber quartus, qui communiter tam physica quam astronomia scriptus est, seorsim etiam ederetur, ut pro arbitrio emtoris astronomi vel omitti vel inseri possit in reliquam epitomen. Habes, lector benevole, rationes editionis, quas spero tibi satisfacturas.

Quod vero genus ipsum attinet philosophandi, non alienum a proposito fuerit, ex nupera quadam epistola, quam ad magni principis familiarem, magnum et ipsum virum scripsi, nonnulla hic praemittere, quibus vel comparatio instituitur tam hujus libelli, quam cognati operis Harmonicorum, anno

superiori editi, cum libris Aristotelis de Coelo et Metaphysicorum, vel philosophia a curiositatis et novationis protritit criminacionibus vindicatur.

Hae sunt igitur ex epistola dicta pericopae ad institutum pertinentes.

De Aristotele mihi videor esse securus: Serenissimus in philosophia Platonius est, in religione Christianus: quicquid propius convincit, vel primum a certo temporis initio conditum esse mundum (ut est opus meum Harmonicum), vel olim interitum aut saltem obnoxium esse interitui (ut sunt alterationes aerae aetherae et coelestis), id Serenissimus odire non potest, nec magistrum Aristotelem veritati, quam ignoravit ille, praeferet unquam.

Quodsi Aristoteles apud Serenissimum est in pretio, sicuti philosophiae pandit mysteria, si quid aut graviter monet, aut laudabiliter tentat: equidem is est, qui quaerit lib. II. de Coelo cap. 5: *quam ob causam plures sint motus*? sicut ego quaero, *quae sint causae numeri planetarum*? Quaerit ille seq. cap. 5: *quam ob causam coelum potius ab ortu feratur in oceanum, quam ab oceanu in ortum*? sicut ego quaero, *quam ob rem quilibet planeta feratur tanta celeritate, non majore nec minore*? Quaerit cap. 9, *an stellae sonos edant harmonice contemperatos*, negatque. Ego sententiam divido, sonos enim concedo nullos edi, at motus affirmo et demonstro esse contemperatos proportionibus harmoniceis. Quaerit cap. 10. *de sphaerarum ordine, de intervallis, de proportionibus motuum ad orbis*; sed quaerit tantum deficiente in conatu. Ego non ista tantum expedio demonstrationibus tuculentissimis per quinque corpora regularia, sed insuper et numerum planetarum adjicio, deductum ex archetypo, ut constet, mundum esse creatum. Quaerit cap. 12: *quam ob rem non motus in singulis planetis cum ipso descensu a superioribus ad inferiores inveniantur multiplicior?* et addit sententiam ex modestia confessionis et ex sapientia assertionis ornatissime temperatam: *tentemus, inquit, dicere id saltem, quod pro vero apparet; arbitramur enim promittuntur istam (verisimilia etiam proferendi) modestiae potius elogio dignam, quam audaciae, si quis ad sedandam philosophiae sitim, in rebus, circa quas maximae dubitationes existunt, etiam minutulis istis discussionibus contentus sit.* Ego vero eadem illa laudabili philosophiae siti adductus primum nebulas istas multiplicis motuum in planetis singulis ab oculis astronomiae abstersi, deinde hoc demonstratum reddidi: non aequabilem esse motum planetarum toto circultu, quod ille cap. 6. et 7. contenderat, sed re vera intendi et remittere idquo locis periodi statim interque se oppositis; et causas intensionis efficientes seu instrumentales explicavi, diminutionem intervalli a Sole, unde velut ex fonte ille motus oritur. Deuquo cum in unoquoque planeta sit motus velocissimus et motus tardissimus certa proportione, non quavis tantum causam hujus proportionis, cum in singulis seorsim, tum inter se omnium, et quare Saturnus et Jupiter mediocres habeant eccentricitates, Mars magnam, Sol et Venus minutas, Mercurius maximam: sed attuli etiam dubitationis hujus maximae solutionem et discussionem non villorem, sed omnino legitimam ex archetypo harmonici ornatus, unde constat, nec meliorem esse posse hunc ornatum, quam est, nec fieri posse, ut non a certo temporis initio creatus sit mundus. Qui meus conatus verecundia cobiberi non debuit, fortitudine animi, quippe in summa fiducia oporum Dei conspicientium (si cui vacet cognoscere) proferendus in lucem fuit, vel ipso Aristotele hortatore, qui ut verisimilia quidem, nedum certa et exploratissima de hisce questionibus reticenda et suppressenda censet. Denique hic est ille Aristoteles, qui lib. XII. Metaphysic. cap. 8, quo loco sublimissimam philosophiae suae partem, de Diis

eorumque numero exaedicat, qui, inquam, suos discipulos ad astronomos ablegat, qui astronomis testimonii pondus et auctoritatem defert, nunquam equidem neque Tychonem Brahe, neque etiam me repudiaturus, si fatulis illa seculorum necessitas conjunctos nos dedisset. Jubet enim percitari ex utroque, tam ex Endoxo, quam ex Calippo, quorum alter alterum correxerat, id esset hodie tam ex Ptolemaeo quam ex Tycho; sequi vero non inquit vetustiores, sed accuratiores. Itaque si Aristoteles Principi aequalissimo cordi est, Aristotelem ego testem sisto, nihil sibi factum injuriae, si astronomus argumentis his usus, quae recentior aetas de coelo protulit, ortas in ipso coelo creaturas vanescentesque rursus indicavit, contra quam illi visum, quippe qui experientiam quidem allegabat, sed eam non satis longam.

Quod academias attinet, sunt illae introductae ad formanda studia discentium, et interest, leges docendi non crebro mutari: ubi, quia de profectu discentium agitur, frequenter fit, ut sint eligenda, non quae verissima, sed quae facillima. Quo de rerum discrimine ut varia sunt variorum iudicia, ita contingit etiam, quosdam praeter opinionem suam errare. Mihi quidem veritas de natura coeli mutabili commode doceri posse videtur; aliis iudicat, perturbari hoc dogmate discentes aequo atque docentes. Sed nec usu suo caret, explicari de philosophia Aristotelis etiam illas partes, quae sunt manifeste falsae, ut sunt illa lib. VIII. Physicorum de motu et lib. II. Coelestium, de coeli ipsius aeternitate: ut se. institui possit collatio inter philosophiam gentilium et veritatem Christianae doctrinae. Non igitur, si subtilia nonnulla et capta difficilia proponi non debent incipientibus, aut si non praeferenda receptis et necessariis, illa propterea neque scribi neque privatim legi debent. Paucas academias numerabis, in quibus lege receptum sit, explicari Metaphysicam Aristotelis: scripsit tamen et Metaphysicam Aristoteles eamque iudiciis omnium facultatum doctoribus utilissimam. Hic igitur, ut nemo Serenissimo vitio vertet, si academiarum leges teneatur, si honorem etiam academicorum, etiam iudicio forte peccaverint, contra censores praesumptuosos, contra rixatores importunos defendendum existimet: Ita vicissim et de Principe sapientissimo mihi haud facile persuaderi sino, hoc illum petiturum, ut omnes publice privatimque maneant intra hos academicae philosophiae limites, nec quisquam privatim de proferendis illis, hoc est de manifestatione operum Dei laboret.

At neque de coelo ipso pugnabit Serenissimus; scit enim, philosophos de visibili loqui, Christum de invisibili, seu, ut scholae appellant, de empyreo locutum, ut vero Christiani simplices accipiunt, de sedibus beatis, ad quas nulla unquam pertinet corruptio, eum de hoc nostro visibili, non Tycho, non ego, sed Christus ipse pronunciet: *Coelum et Terra transibunt, et Psalter: ipsi ut vestimentum veterascent, et Petrus: radicibus tollentur et igne combusti solentur.* Quid quod ne aeternitatem quidem, si esset, destruerent istae in coelo alterationes, non magis, quam ipsius Telluris aeternitatem, aequae creditae Aristoteli, destruunt alterationes terrestres, quippe perennes et in circulum redeunt. Sed hoc argumenti genus forte nimium litigiosum videbitur in Aristotelem. Utamur igitur potius ipsius testimonio, qui, non undiquaque sibi similis, in Metaphysicis quidem motum coelestibus circulem tribuit propter se ipsam, moveri ipsa tradens ut moveantur; at in libris de Coelo, rebus ipsis admonitus, nescio quid simile terrestribus nostris negotiis, multiplex id et turbulentum, astris, imo eorum motoribus tribuit, quibus illi machinationibus et motibus finem alium extra motum ipsum et querant et diffici-

huc alius alio consequatur: adeo quidem, ut in Luna etiam ipsam motuum paucitatem testem adducat inferioris Lunæ conditionis majorisque cognationis cum Terra. Vult enim, quæ suam summam naturam consequi nequeunt omnimodo, illa ne uti quidem multis molitionibus. Et Terræ quidem plane inutilem futurum fuisse motum ad illum suum consequendum, eoque illam penitus quiescere; Lunam aliquosque progredi seseque ad suum illum cunius extendero, superiores siue potiri, sed multis motibus, supremum coelum uno simplici motu. Itaque Lunæ *πρωξιν* (plane hac voce etiam utitur) vitæ plantarum uniformi comparat; superiorum vero *πρωξιν* vitæ animalium magis variae. Omnia tamen ista corpora harum actionum iudicia facit, eo quod finem et beatitudinem extra sese habeant. Hunc igitur Aristotelem ego mihi lectorem et censorem opto epilogi meo libri V. Harmonicorum, Serenissimo ipsi, summo iudicio Principi, ut optem plus otii, fas non est. Illud mihi certo persuadeo, si et in ea, quæ scripsit Aristoteles, et in epilogum meum exquisitam ingenii vim intenderet, totum et a nostris partibus staturum et quod nunc; Te ominante, dissidium inter nos animo concepiet, suoapte arbitratu compositurum.

Ad occurrendum novationis invidiæ, primum ex usu meo fuerit, Serenissimum, etsi facile omnia se ipso videre posset, ex abundantia tamen admoneri de discrimine inter amorem seu Aristotelico verbo sitim cognitionis rerum naturalium et inter contradicendi contraque sentiendi libidinem. Omnes philosophi Graeci, Latini, omnes poetæ etiam, agnoscunt raptum divinum ad indaganda opera Dei, nec ad indaganda tantum privatim, sed etiam ad docenda publice: in quem raptum conjici potest, calumnia curiosæ novationis adhaerescere non potest.

Est Deus in nobis, agitante calemus illo:

Sedibus aetheris spiritus ille venit.

Hic declamatione apud Te non est opus, non etiam apud Serenissimum: sola de metis addenda est mentio. Nec enim figendæ sunt indagationi metæ in paucorum hominum angustis ingenis. *Pusilla res mundus est, nisi in ea, quod quaerat, omnis mundus inveniat*, inquit Seneca. Veræ quidem speculationis metæ sunt eadem, quæ et operis mundani, falsæ vero et exorbitanti cancelli a religione Christiana nonnulli sunt objecti, ne error in precipitia ferat, ceteroqui se ipso lunoxius futurus. Docuit nos exemplo antiquitas, quam frustra metas homo figat, ubi Deus non fixit. Quam graviter sunt increpiti a primis Christianis astronomi omnes? Nonne de uno scripsit Eusebius, illum Christianitatem maluisse deserere (puto quia excommunicatus) quam professionem? Quis hodie imitandum censet? Nonne Tertulliano et Augustino nimium sapere visi sunt, qui antipodas esse docuerunt? Et fuit quidem Virgilius Salisburgensis Episcopus ab officio dejectus, quod id esset ausus asserere. Quoties Romani philosophos urbe ejecerunt, et id quidem moribus illis suis antiquis, quibus res stabat Romana? Nos tamen hodie academias ubique constituimus, philosophiam doceri, astronomiam doceri, antipodas doceri jubemus.

Ego vero etiam privatim a me novationis vitium idoneis removeo documentis. Veritatis in me sit amor an gloriæ, loquantur dogmata mea, quæ pleraque aliis accepta fero: totam astronomiam Copernici hypothesibus de mundo, Tychoonis vero Brahei observationibus, denique Gulielmi Gilberti Angli magneticæ philosophiæ inaedifico: si novatione delectarer, forsitan aliquid comminisci possem simile Fracastorianis aut Patricianis conceptionibus.

Ut is, qui delectatur occupationibus, raro socii, nunquam sui causa descendit ad lusum alicui aut latruncolorum, ita mihi in veris aliorum dogmatibus, aut in corrigendis etiam, quae non undiquaque bene constant, tantum est negotii, ut nunquam vacet ingenio ludere novis, verorum contrariis, ex me ipso iuveniendis. Quicquid foris profiteor, intus credo: nulla mihi maior crux, quàm, non dico contraria mentis proloqui, sed intima sensa non prodere posse. Selo multos affectu simili novatores fieri, sed li erroris, qui eos seducit, facile redarguuntur; mihi errorem nemo demonstrat, subtilitates rerum aliqui, quia ipsi non capiunt, mihi in crimen novationis imputant.

Descendo nunc ad opus ipsum Harmonices. Non dubito eum, qui damnat pruriginem nova comminiscendi, audaciam nova et pomposa profitendi, inventurum in epilogo libri V, quod censoria virgula notet. Hic enim maculae et flammulae Solis producuntur in argumentum exhalationum ex Sole, quae sint analogae exhalationum ex Terra; hic generationum animalium simulacra statuuntur in planetis; hic tanguntur confinia mysteriorum religionis Christianae, pulsantur parietes magiae, theurgiae, idololatriae Persarum, Solem pro Deo colentium, quod crebrae interjectae cautiones non dissimulant. De his igitur curiositatibus, si non satisfacient ea, quae hactenus sunt dicta, saltem id Serenissimo inculcetur: caput illud ipso titinio nil profiteri nisi conjecturas, et quamvis id plurimum conferat ad speciem operis, quia, ut habet capitula exordium, a Musis ad Apollinem ratio ipsa ducit, tamen eum cetera operis constent suis demonstrationibus, caput ipsum seu epilogum illum pro abspecto haberi posse. Nam etiam sine eo thema hoc invictis demonstrationibus obtentum fuit: in extremis binorum planetarum motibus universum ornatum proportionum harmonicarum expressum esse, adeoque, ut hic ornatus motibus concillari posset, eccentricitates planetis illas ipsas, quas pro se quisque sortitus est, conciliandas fuisse. Hoc quantam faciat accessionem ad illustrandam gloriam operis mundani Deique architecti, sapientissimus Princeps facile aestimabit.

Sin autem etiam hoc ipsum curiositatis accusetur inquirere, fateor equidem, ferri caput astronomiae; quae cum aut propter hanc philosophiam aut propter astrologicas praedictiones discatur (quantum ad hanc scrupulosam subtilitatem et physicam cansarum excussionem, quae se in usus vitae quotidianos non ita evidenter profert), posteriorem certe finem Serenissimus ipse, me circa futura contingentia suffragante, repudiat: prior igitur mihi ereptus, totam enecat astronomiam (subtilem hanc) planeque facit inutilem.

Ut tamen etiam in hunc eventum me muniam: largiar, hoc meum opus Harmonicum nihil esse nisi quandam veluti picturam aedificii astronomici, qua ad lubitum respicientis derasa, stat tamen ipsa per se domus, astronomia dicta, quam selo a Serenissimo non damnari, sed propter certitudinem praedictionis motuum maximi fieri. Forsitan igitur ejus architectum et instauratorem post magistrum Tychonem pene unicum, qui huc vitam suam impendere dignatus sit, non indignum suo favore censebit.

Hactenus ex epistola, quae pleraque etiam de indagine causarum abstrusissimarum, hoc libello conspicienda, dicta et intellecta sunt, ad quem nunc tempus est, ut lector transeat.

EPITOMES ASTRONOMIAE COPERNICANAE

LIBER QUARTUS.

THEORICAE DOCTRINAE PRIMUS.

DE PARTIUM MUNDANARUM SITU, ORDINE ET MOTU, SEU DE SYSTEMATE MUNDANO.

Quodnam est subjectum doctrinae theoricæ? Motus planetarum proprii, quos motus secundos appellamus, et planetas, secunda mobilia.

Quo respectu dicis motus planetarum proprios? 1. Quia communis ille tam planetarum quam fixarum adeoque totius mundi motus apparens diurnus, de quo doctrina sphaerica, ab ortu quidem in occasum tendere videtur, planetarum vero singulorum singuli motus longe tardiores in contrarium, ab occasu in ortum tendunt: itaque certum est, hos ab illo communi motu mundi, de quo hactenus egimus, dependere non posse, sed planetis ipsis attribuendos et sic planetarum in genere proprios esse.

2. Etsi vero in his motibus propriis singulorum ab occasu in ortum inest etiamnum commune aliquid, non diurnum sed annuum, quod adventitium est et a visu solo praeter ipsius rei veritatem causam trahit; quodque interdum planetas in motu suo proprio retrocedere facit ad speciem, ab ortu sc. in occasum, quia tamen hoc commune in singulorum illorum planetarum singulas periodos ita implicatur varieque transformatur, ut primo intuitu discerni non possit, quidnam omnibus commune, quid cuique proprium, ideo totus ille compositus cuiusque planetae motus, ut is in oculos incurrit, dicitur etiam in specie proprius illius planetae; praesertim cum commune illud multorum non ab illo communi motu primo totius mundi, sed a proprio motu unius planetae originem habeat.

Quot sunt partes doctrinae theoricæ? Supra libro primo fol. 126. divisa est tota doctrina in partes tres proprias: primam de principiis, ex quibus motus secundos Copernicus demonstrat (materia libri IV.), secundam de instrumentis manuariis, quibus hi motus subjiciuntur oculis, scil. de orbibus eccentricis et similibus (materia libri V.), tertiam de ipsis singulorum plane-

larum motibus apparentibus et junctorum inter se communibus accidentibus (materia libri VI.) et in quartam, communem doctrinae sphaericae et theoriene, de motu octavae sphaerae apparenti (materia libri VII.).

Quae sunt hypotheses seu principia, quibus astronomia Copernicana saveat apparentias in motibus planetarum propriis? Haec sunt potissimum: 1. Solem in centro sphaerae fixarum (vel quasi) collocatum esse, immobilem loco. 2. Planetas singulos moveri re vera circa Solem in singulis systematibus, quae ex pluribus circulis perfectis, aequabilissimo motu conversis, componantur. 3. Tellurem esse unum ex planetis, sic ut orbem inter orbes Martis et Veneris medium annuo motu circa Solem describat. 4. Proportionem orbis hujus, collati ad diametrum sphaerae fixarum, esse inensabilem adeoque immensae similem. 5. Sphaeram Lunae ordinari circa Terram ut centrum suum, sive ut motus annuus circa Solem (et sic de loco in locum) toti sphaerae Lunae cum Tellure communis sit.

Censes tu, retinenda esse principia ista in hac Epitome? Cum astronomia duos fines habeat, salvare apparentias et contemplari genuinam formam aedificii mundani, de quibus actum est libro I. folio 119 s., ad primum quidem finem non est opus omnibus hisce principiis, sed possunt aliqua mutari, aliqua omitti, secundum etiam necessario est emendandum; ad alterum finem etsi necessaria sunt pleraque, vix tamen ista sufficiunt.

Quaenam horum principiorum possunt mutari vel omitti salva apparentiis? Tycho Braheus demonstrat apparentias, mutato primo et tertio: Terram enim ipse eam veteribus collocat in centro mundi immobilem, Solem vero, qui centrum et ipsi est orbium quinque planetariorum, cum ipso systemate sphaerarum omnium facit annuo communi motu circumire circa Terram, dum interim in hoc communi systemate quilibet planeta suos proprios motus conficit. Quartum vero idem penitus omittit, fixarum sphaeram non multo majorem exhibens, quam est sphaera Saturni.

Quae vicissim loco secundi principii substituis, et quae insuper addis ad genuinam formam mundani domicilii, seu naturae coeli pertinentia? Etsi planetis singulis singuli relinquendi sunt motus veri, attamen hos motus ipsi moventur non se ipsis nec per conversionem sphaerarum, quae solidae nullae sunt, sed Sol in centro mundi, conversus circa corporis sui centrum et axem; hae sui conversione fit planetis singulis causa circumeundi. Amplius, etsi planetae re vera sunt a Solis centro eccentrici, non sunt tamen aliqui circuli minores, epicycli dicti, qui conversione sui variant haec intervalla planetae et Solis, sed ipsa planetarum corpora vi insita praebent occasionem huius variationi.

Quae igitur erit materia libri quarti? Continebit liber iste IV. ipsissimam physicam coelestem, seu formam et rationes operis mundani causaque genuinas motuum. Et hoc erit illud primum astronomi muus, de quo lib. I. pag. 120 s., scil. demonstratio hypothesis suarum.

Recense libri IV. partes primarias. Partes libri IV. potissimum tres erunt: Prima de corporibus ipsis, secunda de corporum illorum motibus, tertia de motuum accidentibus realibus.

Prima eum docebit conformationem totius universi, distributionem ejus in partes seu regiones praecipuas, locum Solis in ejus centro; numerum, magnitudinem et ordinem seu situm sphaerarum planetariorum; denique proportionem inter se omnium mundi corporum. Secunda tradet revolutionem Solis circa suum axem ejusque effectum in circumagendis planetis, causas propor-

tionis inter se motuum, hoc est temporum periodicorum; immobilitatem centri Solis, motum annum centri Telluris circa Solem; revolutionem Telluris circa suum axem ejusque effectum in circumagenda Luna; adjumenta movendae Lunae ex lumine Solis, et quae sint causae proportionum inter diem, mensem et annum. Tertia causas aperiet inaequalitatis triplicis, altitudinis, longitudinis, latitudinis, in planetis singulis, et quomodo inaequalitates istae in Luna, vi illuminationis ex Sole, duplicentur.

P A R S P R I M A.

I. De partibus mundi praecipuis.

Quam censes esse dispositionem partium mundi praecipuarum? Copernici philosophia partes mundi praecipuas adnumerat distinctis figurae mundanae regionibus. Cum enim in sphaerico, Dei creatoris imagine mundique archetypo (ut primo libro probatum), tres sint regiones, trium S. S. Trinitatis personarum symbola, centrum Patris, superficies Filii et intermedium Spiritus sancti: totidem etiam praecipuae mundi partes sunt factae, singulae in plagis sphaerici singulis, Sol in centro, fixarum sphaera in superficie, planetarum denique systema in regione inter Solem et fixas intermedia.

Putabam ego, praecipuas mundi partes esse numerandas Coelum et Terram. Equidem nobis Telluris incolis visus noster partes alias magis notabiles, ut libro primo sol. 122 a. dictum, nequit ostendere, cum alteram pedibus calcemus, altera tegamur, ambao communis horizontis limbo commissae et conglutinatae esse videantur, instar palatii, in quo stellae, nubes, aves, homo et varia animantium terrestrium genera sint inclusa. At cum nos in disciplina versemur, quae rerum causas aperit, visus deceptiones discutit, mentem altius utraque visus metas evehit, nemini mirum esse debet, visum a ratione, disciplinam a magistro novi quid discere, quod ignorabat prius: Terram scilicet, per se solitarie consideratam, non inter mundi magni partes primarias habendam, sed uni primariorum, sc. planetariae regioni seu mundo mobili accensendam et in eo principii quandam rationem obtinere. Solem vicissim e numero stellarum secretum, pro una ex praecipuis totius universi partibus constituendum. Loquor autem jam de Terra, quatenus est pars aedificii mundani, non vero de dignitate dominatricis creaturae, quae illam inhabitat.

Quibus inter se proprietatibus distinguis tria haec magni mundi membra? Mundi perfectio consistit in luce, calore, motu et harmonia motuum, quae sunt analogae facultatibus animae, lux sensitivae, calor vitali et naturali, motus animali, harmonia rationali. Et in luce quidem mundi consistit ornatus, in calore vita et vegetatio, in motu quaedam quasi actio, in harmoniis contemplatio, in qua Aristoteles ponit beatitudinem. Jam cum ad omnem affectionem tria necessario concurrant, causa a qua, subjectum in quo, et forma sub qua: Sol igitur per omnes dictas affectiones mundi vicem sustinet efficientis, fixarum regio vicem formantis, continentis et terminantis, intermedium vicem subjecti, pro natura cujusque affectionis. Omnibus igitur his modis Sol fit totius mundi corpus praecipuum.

Nam quod lucem attinet, ea cum Sol ipse pulcherrimus est et quidam voluti oculus mundi, tum vero mundi reliqui corpora ipse ut fons lucis aut clarissima fax illuminat, pingit, exornat. Intermedium non ipsum est lucidum, sed pellucidum et perspicuum et rivus, per quem dispensatur lux a suo

fōnte, suntque in eo globi et creaturae, quibus lux Solis infunditur et qui ea fruuntur. Fixarum sphaera vicem praestat alvei, in quō decurrunt hoc lucis flumen, estque quidam veluti paries opacus et illuminatus, lucem Solis repertiens et conduplicans: rectissime laternae comparaveris, quae ventos arceat. Sic in animalibus cerebrum, sedes sensitivae facultatis, toti animali sensus omnes communicat, et actu sensus communis causatur illorum sensuum omnium praesentiam, eos veluti excitans et vigilare iubens. Et aliter: in hac comparatione Sol scire habet instar ipsius sensus communis, globi in intermedio instar organorum sensoriorum, fixae instar objectorum sensillum.

Quoad calorem, Sol focus mundi est, ad hunc focum globi in intermedio sese calefaciunt; fixarum sphaera continet calorem, ne diffuset, veluti quidam mundi paries, pellis aut ventis, ut Psalmi Davidici flosculus utar: Sol ignis est, ut Pythagorae dixere, vel lapis seu massa candens ut Democritus, fixarum sphaera glacies est seu sphaera crystallina, comparate loquendo. Quodsi non creaturarum tantum terrestrium, sed etiam totius aerae aetherae per universam mundi amplitudinem est aliqua facultas vegetans, cujus conjecturam praebet nobis cum manifesta Solis energia calefaciendi, tum contemplatione physicae de cometarum ortu; eam credibile est radicatum esse in Sole velut in corde mundi indeque remigio lucis una cum calore excurrere in hoc amplissimum mundi spatium, ad eum modum, quo in animalibus sedes caloris et facultatis vitalis est in corde, vegetabilis in epate, unde per spirituum commercia facultates hae excurrunt in reliqua etiam corporis membra; fixarum hic regio, stans undique ex opposito, vegetationem hanc adjuvat, calorem concentrans, ut loquuntur, veluti quaedam mundi cutis.

Quoad motum, Sol est prima causa motus planetarum universi primusque motor, etiam ratione sui corporis. In intermedio spatiantur mobilia, globi scilicet planetarum; fixarum regio praestat mobilibus locum et basin quandam, cui velut innitantur mobilia, et cujus per se immobilis comparatione motus intelligatur fieri. Sic in animalibus cerebellum est sedes facultatis motricis, corpus ejusque membra sunt id quod movetur; Terra corpori animali, corpus brachio vel capiti, brachium digito est basis, super qua ut immobilis motus fiat ejusque partis.

Denique quoad harmoniam motuum, Sol illum locum obtinet, in quo solo planetarum motus faciunt apparentiam quantitatum harmonice contemporatarum, planetae ipsi, diacurrentes in intermedio, annectum exhibent sequi terminos, in quibus consistunt harmoniae; fixarum sphaera seu zodiacus circulus exhibet mensuras, ex quibus quantitas motuum apparentium cognoscitur. Sic etiam in homine intellectus est, qui abstrahit universalia formatque et numeros et proportionem, ut quae non sunt extra intellectum; individua vero, per sensus intro recepta, sunt fundamentum universalium, individuae et discretae unitates, numerorum, termini reales, proportionum; memoria denique quibusdam veluti oculis quantitatum et temporum, ad quoddam instar sphaerae fixarum distincta, est penus et repositorium sensuum. Et amplius, de sensibus nusquam fit iudicium nisi in cerebro, nusquam oritur affectus laetitiae ex perceptione sensuali nisi in corde.

Respondet igitur nutritioni animalium et plantarum dicta vegetatio, respondet vitali facultati calefactio, animali motus, sensitivae lux, rationali harmonia. Quare optimo jure Sol cor mundi habetur vitaeque et rationis sedes et primariorum trium mundi membrorum praecipuum; suntque vera eûcomia sensu philosophico, cum poëtae regem astrorum, Sidonii vero et Chal-

dae' et Persae (proprietas linguae, quae etiam in teutonismo cernitur) regnam coeli, Platonicus vero regem ignis intellectualis celebrant.

Non satis apte videntur respondere tria haec mundi membra tribus superficiei sphaericae regionibus, cum centrum sit punctum, Sol vero corpus; sic superficies extrema intelligitur esse continua, fixarum regio non collucet tota, sed passim lucidis punctis ab invicem discretis est consita; denique intermedium in sphaerico totum explet spatium, at in mundo, quod est inter Solem et fixas, non omne videtur in motu constitui. Equidem hoc ipsum indicat responsum trium mundi partium aptissimum. Cum enim punctum aliquod vestiri seu exprimi, nisi per corpus aliquod, non posset, atque sic corpus, quod est in centro, defecerit ab indivisibilitate centri: par erat, ut etiam sphaera fixarum a continuitate superficiei sphaericae deficeret inque fixarum innumerabilium minutissima puncta dehisceret, ipsum denique intermedium non omne occuparetur a motu et ceteris affectionibus, nec plane perspicuum, sed paulo densius esset, quippe quod omnino vacuum esse non potuit, sed aliquo corpore implendum erat.

Suntne orbes solidi, in quibus vehuntur planetae, iisque interjecta intervalla, vacua orbibus? Solidos orbes tribus rationibus refellit Tycho Braheus: una est a motu cometarum, altera a lumine irrefracto, tertia a proportionem orbium. Nam si solidi essent orbes, cometae non cernerentur ex uno orbe in alium trajicere, impedirentur enim a soliditate; at trajiciunt ex uno in alium, ut demonstravit Braheus. A lumine porro sic: cum sint orbes eccentrici et Terra ejusque superficies, in qua oculi, non sita sit in ipso centro cujusque orbis, ergo si solidi essent orbes, densiores nimirum quam illa limpidissima aura aetherea, tunc radii stellarum refracti ad aërem nostrum pervenirent, ut docet optica, itaque planeta irregulariter appareret et quasi in locis longe aliis, quam quae ab astronomo praedici possent. Tertia ratio est ipsius Braheus accommodata principiis: testantur illa, ut et Copernicana, Martem fieri quandoque propiorem Terris, quam est Sol; hanc vero permutationem non potuit Braheus credere possibilem, si solidi sint orbes, cum Martis orbis deberet intersecare orbem Solis.

Quid igitur est in illis planetarum regionibus praeter planetas? Nihil nisi aura aetherea, tam orbium quam intervallo communis, limpidissima illa et cedens mobilibus haud minus expedite, quam cedit illa luminibus Solis et stellarum, ut ad nos delabi possint.

Si est aura, erit corpus materialum, habens densitatem: resistet igitur ejus materia mobilibus nonnihil. Immo illa aura aetherea tenuior est hoc nostro aëre, etiam cum purissimus est, immenso propemodum intervallo.

Quomodo hoc probas? Ex optica per refractiones: nam noster aër aetheri contiguus refractionem causatur .30 circiter minutorum. Aqua vero, aëri contigua, 48 graduum circiter: unde quodammodo constat proportio densitatis aquae ad aërem, aëris ad aetherem, multiplicatione cubica. Nam 30' continentur in 48° propemodum centies, quod est in quadratis decies milles, in cubis decies centies milles. Toties igitur tenuior est aër aqua, aether aëre.

Est tamen materia aetheris non plane nulla: adhuc igitur ab ea impediuntur sidera. Tantum impedimentum motus, tantulam sc. resistantiam aetheris largiri possumus mobilibus sine incommodo, ut quibus antea etiam propter propriam corporum materiam aliqua resistentia largienda est, ut infra patebit. Et quid si nulla sit concedenda aetheris resistentia? cum credibilis

sit, auram aetheream, quae proxime globum mobilem circumstat, comitari globum ob summam limpideitatem.

II. De loco Solis in centro mundi.

Quibus vero argumentis astruis, Solem in ipsissimo mundi centro situm esse? Horum aliqua suppeditant nobis vetustissimi Pythagoraei et philosophi Italici apud Aristotelem lib. II. de Coelo cap. 13, et desumuntur a dignitate tam Solis quam loci, et a Solis officio in mundo vivificandi et illuminandi.

Dic primum argumentum a dignitate. Sic habet ratioe inatio Pythagoraeorum ad verbum ex Aristotele: corpori dignissimo et pretiosissimo digniorem etiam locum deberi. Jam vero Solem quidem (pro quo ipsi ignis vocabulo sunt uti, ex instituto seetac occultantes sua dogmata) digniorem esse Tellure, totiusque mundi pretiosissimum et dignissimum, ut paulo ante ostensum. Atqui superficiem et centrum seu meditullium esse binos sphaerici terminos. Horum igitur alterum Soli competere: non vero superficiem, nam id corpus, quod est totius mundi praecipuum, debuisse omnium maxime custodiri, centrum vero aptum ad hanc rem esse, quod ideo Jovis eustodiam appellitare soliti sunt. Itaque non esse par, ut Tellus in medio sit, Soli enim illum locum competere, Tellurem vero annuo motu circa medium ferri.

Quid respondit ad hoc argumentum Aristoteles? 1. Dicit illos sumere inconcessa, scil. idem esse medium et magnitudinis (hoc est sphaerici) et rei (h. e. corporis mundani) et ipsius adeo naturae (h. e. informationis seu vivificationis). Atqui et in animalibus non sit idem medium et vivificationis et corporis (cor enim intus quidem est, at non aequaliter ab extremis abest), sic etiam de coelo cogitandum, neque metuedum incolunitati totius universi, aut praesidium ad centrum collocandum: quin potius quaerendum, illud cor mundi seu medium vivificationis quale corpus sit et in quo mundi loco situm. 2. Vult ostendere dissimilitudinem medii naturae a medio loci. Illud enim medium naturae, seu illud dignissimum et pretiosum corpus habere rationem principii: loci vero medium esse potius ultimum, in quantitate metaphysice considerata, quam primum aut principium ejus. Quod enim est quantitatis medium, hoc est intimum, id finiri seu circumscribi, terminos vero id esse, quod finit seu circumseribit. Jam praestantius et dignius esse quod exterius ambit, finit et concludit, quam quod intus terminatur: nam materiam inter ea esse, quae finiuntur, terminantur et continentur, formam vero seu essentiam creaturae cujusque esse de numero eorum, quae finiunt, circumscribunt et comprehendunt. Ita putat se probasse, Soli (seu ut ille intellexit, igni Pythagoraeorum) non tam medium mundi locum competere, quam extremitatem.

Quomodo tu diluis hunc Aristotelis elenchum? 1. Et si verum est, non in omnibus creaturis minimeque in animalibus id esse in totius molis medio, quod est totius creaturae praecipuum, at eum de mundo disputamus, nihil est verisimilius hoc ipso. Nam figura mundi rotunda est, animalis non item. Quia cum animalia instrumentis egeant extra se porrectis, quibus terrae insistant, super ea moveantur, cibum, potum, species rerum sonosque ab extra exceptos intra se recipiant; mundus e contrario solus est, nihil habens extra, se ipso nixus et quoad totum immobilis, ipse solus omnia: causa itaque nulla est, cur cor mundi sit alibi, quam in medio, ut id, quod est (eor scilicet), esse possit omnibus mundi partibus extimis aequaliter, quippe ab aequali undique intervallo. 2. Porro quod juisset quaerere, quodnam corpus sit illud

totius universi praeceptum, turbatus quidem est aenigmate Pythagoraeorum, existimans illos ignis elementum pro praecepto venditare; non male tamen iussit. Et nos igitur, consilium Aristotelis secuti, Solem eligimus, non adversantibus nec Pythagoracis in sensu suo mystico, nec ipso Aristotele. Quem Solem dum quaerimus, quo mundi loco sit situs, Copernicus eoeli peritus nobis medium indicat, ceteri, qui alium ejus ostendunt locum, non coguntur ad hoc argumentis astronomicis, sed aliis quibusdam ad speciem metaphysicis, ex Terrae ejusque loci contemplatione ductis; quorum argumentorum acutissimatio nobis cum illa est communis, et quibus non indicant, sed quaerunt ipsi quoque Solis locum. Dum igitur, quaerentes locum Solis in mundo, centrum invenimus mundi, facimus hoc aequo ipso Aristotele, nec hic ejus elenchus est contra nos. 3. Quod vero centro vilitatem adstruit Aristoteles, Pythagoracis directe contradicens: facit id praeter figurarum naturam praeterque considerationem earum seu geometricam seu metaphysicam. Nam supra libro primo centrum sane non ultimum erat in sphaerico, sed ejus omnino principium generis mentalis aequabilissimae, gerens in S. S. Trinitatis adumbratione Dei Patris, quae prima personarum est, similitudinem. 4. Denique physice aestimans ea, quae sunt geometrica, possit alieni videri non congruè facere, nisi quae hic de materia et forma disputat, ex ipsa schematum geometricorum consideratione per analogiam quandam transsumta essent. Vero enim in quantitativis solidis interna corpulentia, quaquaversum patens aequaliter nec se ipsa cujusquam figurae particeps, genuina est imago materiae in rebus physicis; externa vero corpulentiae figura ex superficibus certis composita, terminantibus soliditatem, repraesentat in rebus physicis formam. Itaque concedatur illi sana comparatio haec, sed ex qua apparet, ipsum ludere aequalitatione medi: cum enim de intimo sphaerici puncto dixerint Pythagorici, omne spatium intra ipse superficiem comprehensum intelligit voce medi. De spatio igitur concedenda est illi victoria, sed inutilis, de centro enim totius spatii medio vineunt Pythagoraei et Copernicus. Nam etsi medium, ut est spatium, non meretur nomen termini, at meretur, ut est centrum, quo respectu maxime est accensendum formantibus et terminantibus, cum supra libro primo centrum fuerit origo generis sphaerici, metaphysice expensae.

Proba ab officio Solis, centrum ei deberi. Id partim jam est factum in dissolutione elenchis Aristotelici. Nam 1) si totus mundus, qui sphaericus est, indiget Solis lumine et calore aequaliter, optimum igitur Solem in medio esse, unde aequaliter ista in omnes mundi plagas disperitur: quod sit aequabilis et rectius quiescendo in centro, quam circumeundo circa illud. Nam si accederet aliquas partes calefactionis causa, recederet ab oppositis causareturque vicissitudines, ipse existens simplicissimus. Et mirum est, quosdam ludibris causa uti similitudine luminis in medio lateruae, cum aptissima sit similitudo minimeque ad exagilandam hanc sententiam comparata, sed potius ad depingendam vim hujus argumenti exprimis idonea.⁴⁸ 2. De lumine vero peculiaris textur demonstratio, concinnitatem supponens, non necessitatem. Finge sphaeram fixarum esse speculum concavum: notum est, oculum in centro talis speculi collocatum undique se ipsum intueri, et si lux sit in centro, cum undique a superfice concava repercuti angulis rectis, repercussos colore rursum in centro: atqui id in nullo alio concavi puncto fieri potest, praeterquam in centro. Ergo cum Sol sit fons lucis, mundi oculus, centrum ei debetur, ut (ipse in divina symbolisatione Pater) se ipsum in tota superfice concava (quae Dei filii gerit symbolum) contempletur et in ea

sui imagine sibi complacent seque ipsum illuminando illustret, calcaciendo incendat. Huo pertinent versiculi melici:

*Tuam qui faciem inspicis
Undiquaque resultans
Aetheris umbilice,
Vitream per inane fluentem
Fulgurum scatebra, Sol,
Quae reflexa resorbet.*

Copernicus tamen Solem non penitus in ipsum mundi centrum redegit. Hoc fuit intentum Copernici ostendere, quod nodus ille communis omnium systematum planetariorum, de quo infra, tantum distet a centro Solis, quantum veteres faciunt Solis eccentricitatem: quem nodum ipso centrum mundi statuit, nulla demonstratione astronomica adactus, sed propter solam convenientiam, ne differret ille nodus et commune veluti centrum orbium mobilium ab ipsissimo centro mundi. Quodsi quis alius eadem convenientia usus contendere voluisset, illud potius esse cavendum, ne Solem ipsum a centro mundi differre faciamus, at nodo illi regionis mobilium sufficere, ut stet proxime, et non sit plane in ipso centro: qui hoc inquam contendere voluisset, is nihil turbasset in astronomia Copernicana. Ita primo etiam per hanc opinionem Copernici, distantiam sc. nodi illius a Sole, permanent nihilominus argumenta ultima de loco Solis in ipso centro, secundo vero ne quidem acquiescendum est huic opinioni Copernici, quod nodus ille a Solis centro distet. Nam communis ille nodus regionis mobilium est in ipso Sole, ut infra probabitur: itaque quibuscunque verisimilitudinibus vel unum vel alterum refertur in centrum ipsum sphaerae fixarum, illud etiam reliquum eodem redigitur vel ipso Copernico approbante.

III. De mobilium sphaerarum ordine.

Quomodo distinguuntur inter se planetae? In primarios et secundarios; primarii sunt, quorum corpora circa Solem vehuntur, ut infra docebitur, secundarii sunt, quorum circuli proprii non circa Solem, sed circa unum e primariis planetis ordinantur, quibusque praeter motum proprium circa corpus primarii etiam motus sui primarii circa Solem communis est; tales Saturnus habere secumque circumducere creditur duos, qui interdum ope telescopii in conspectum veniunt. Tales Jupiter habet circa se quatuor, Tellus unum, Luna dictum. De Marte, Venere, Mercurio, primariis et ipsis, nondum constat, num et illi comites seu satellitum tale habeant.

Quot ergo sunt in doctrina theórica planetae considerandi? Non plures septem; sex quidem dicti primarii: 1) Saturnus, 2) Jupiter, 3) Mars, 4) Terra (Sol ad visum), 5) Venus, 6) Mercurius et 7) unicus e secundariis, Luna, quia sola circa Tellurem, nostrum domicilium volvitur; ceteri secundarii nihil nos attingunt, qui Telluris sumus incolae, nec eos sine lectissimis telescopiis conspiciamus.

Quo ordine dispositi sunt inter se planetae, num in eodem coelo sunt, an in diversis? Visus quidem omnes in suprema et altissima illa fixarum sphaera collocat Interque fixas ipsas discurrere opinatur. At ratio omnium temporum omniumque sectarum hominibus diversum nasit. Nam si omnium centra in eodem essent orbe, cum videamus illos inter se ad visum saepius

conjugi: fieret igitur, ut alter alterum impediret, nec possent illorum motus esse regulares et perennes. Copernici vero et vetustissimi Aristarchi ratio, subnixta observationibus, regiones singulorum ingentibus intervallis inter se et a fixis distinctas esse convincit.


Quodnam est hic discrimen inter veterum et inter Copernici ratiocinationem? 1. Veterum ratio probabilis saltem est, Copernici demonstratio ex suis orsa principis, necessarium infert. 2. Illi hoc tantum docent, non esse plures uno planetas in una quolibet sphaera, Copernicus illud insuper addit, quantum quemlibet super alterum elevatum esse necesse sit. 3. Veteres igitur coelos sibi mutuo superaedificant, ut latres in aliquo muro, aut, quod similis est, tunicae coeparum, interior exteriorcm sustinet, ratl spatia omnia explenda esse orbibus et tantam statuendam esse sphaeram superiorem, quantam esse patitur sphaera inferior notae quantitatis, quac conformatio materialis saltem est; Copernicus, ex ipsis observationibus spatia singulis sua metatus, tanta inter binos interesse ostendit, ut incredibile sit, illa orbibus impleri; itaque haec ejus dispositio urget mentem contemplatricem, ut spreta materia et contiguitate orbium, aspiret ad indagationem formalis dispositionis seu archetypi, ad quem facta sint intervalla. 4. Veteres sua structura materiali mandum planetarium seu mobilem coguntur majorem facere multis partibus, quam Copernicus sua dispositione formali; Copernicus contra mobilium regionem modice amplam, fixarum vero quiescentem immensam facit, quam veteres non multo majorem statuunt sphaera Saturni. 5. Veteres dispositionis suae rationem non, ut optant, explicant et comprobant: Copernicus in rationibus stat egregie.

Quas dicis rationes dispositionis orbium, et quomodo iis praestat Copernicus? Docet Aristoteles lib. II. de Coelo cap. 10, nihil magis esse consentaneum rationi, quam ut respondeant cujusque planetae tempora conversionis ejusdem altitudini seu orbis amplitudini. Jam veteribus quidem altissimus idem est, qui et tardissimus, nimirum Saturnus, quia 30 annos habet; quem sequitur loco et tempore Jupiter, qui 12 annos, et hunc Mars, qui minus 2 annis habet. Jam vero in reliquis ratio veteribus perturbata est. Nisi enim Terrae concesseris motum annum circa Solem, fiet ut Sol, Venus et Mercurius, tres distincti planetae, idem habeant annum tempus circuitus sui, quibus tamen tribuunt orbis diversos, Soli superiorcm, Veneri medium, Mercurio tertium; tum denique Lunae tribuunt imum locum, uti illa quidem etiam habet tempus angustissimum, menstruum scilicet.

Copernicus vero, Terram statuens circa Solem circumferri, habet eandem per omnes planetas primarios analogiam et motuum et temporis. Ei Sol est in centro mundi et sic intimus, circuitu centri carcus, hoc est centri et axis respectu immobilis: corpus vero Solis circa axem immobilem turbinari, pancel abhinc annis deprehensum est, citius quam unus mensis spatium. Proximus circa illum Mercurius orbe angustissimo, quem absolvit tribus mensibus; circa hunc orbem Venus ampliori orbe et prolixiori temporis spatio, sc. sesquilocto mensium. Circa Veneris coelum est Tellus cum pedissequa sua Luna (est enim Luna secundarius planeta, quorum inter primarios ratio non habetur) circumitque duodecim mensium spatio. Postea sequuntur Mars, Jupiter, Saturnus, ut apud veteres, cum suo quisque satellitio. Post Saturnum est sphaera fixarum, ut immenso intervallo distans, sive penitus etiam quiescens.


Theoria Saturni, Jovis, Martis et Telluris.

Fig. 51.



Theoria Telluris, Veneris, Mercurii, ampliata orbita Telluris.

Fig. 52.



Qua mensura Copernicus admetitur intervalla planetis singulis? Mensura hic utendum vobis est proportionata, ad quam comparari ceterae sphaerae possint nobisque proxime convexa et sic nobis quodammodo nota: ea est ampliatio orbis, in quo centrum Telluris orbiculi que Lunae circum Solem vertuntur, seu ejus semidiameter, vel distantia Telluris a Sole. Haec veluti decem-peda est aecommodata negotio; Tellus enim nostrum est domicellum, e quo distantias coelorum metimur, estque planetarum medius et inter eos multis nominibus, de quibus infra, principii rationem obtinet. Sol vero visus nostri indicio et judicio est praecipuus planetarum, rationis vero suffragio supra expenso est ipsum cor regionis mobilium, ad mensurandum propositae. Ita haec nostra decem-peda duos habet terminos insignissimos, Tellurem et Solem.

Quanta igitur sunt orbium singulorum intervalla? Distantiam Saturni demonstrationes Coperuicanae evincunt esse paulo minorem decupla Telluris a Sole, Jovis quintuplam, Martis sesquiplam, Veneris subsesquiertiam, Mercurii subtripulam circiter. Itaque diameter orbis Saturnii habet minus duplo vicul sui Jovialis, Jovialis habet triplum Martialis inferioris, Martialis sesquiplum Terrestris orbis circa Solem positi, Terrestris Veneris plus sesquiertio, Veneris Mercurialis quinque tertias vel octo quintas circiter. Ubi tamen notandum, distantiarum proportionem aliis orbitarum partibus alias esse, praesertim in Marte et Mercurio.

Quae vero causa est intervallorum ipsorum planetariorum, ex quibus periodica tempora sequuntur? Causa intervallorum in archetypo eadem est, quae numeri primariorum planetarum senarii.

Obsecro, num tu speras, numeri planetarum causas assignari posse? Successit haec cura, Deo propitio, non male. Geometriae rationes Deo coaeternae sunt; in iis primo est curvi et rekti discrimen. Curvum supra libro primo dictum est gerere Dei quodammodo similitudinem, rectum creaturas repraesentat. Et in mundi exornatione primum extrema regio fixarum sphaerica facta est ad illam geometricam Dei similitudinem, quod illa ut Deus aliquis corporeus (gentibus sub nomine Jovis cultus) omnia reliqua in se continere debuerat. Rectae igitur quantitates pertinnerunt ad extremae sphaerae intima contenta, primae et pulcherrimae, ad primaria. Ex rektis vero sunt primae,

perfectissimae, pulcherrimae et simplicissimae, quae quinque corpora regularia dicuntur, quae jam ante bis mille annos Pythagorae dixerunt esse figuras mundanas, existimantes, quatuor elementa et coelum (quintam essentiam) ad illorum archetypum esse conformata. Sed verior est ratio, ut illae quinque figurae totidem eonformant intervalla orbium, sese mutuo includentium. Si ergo sunt intervalla quatuor linearia quinque necesse est esse orbes: sicut ad intervalla quatuor linearia quinque necesse est esse digitos.

Quae sunt illae quinque figurae regulares? Cubus, tetraëdron, dodecaëdron, icosaëdron, octaëdron.

Quomodo distinguuntur hae figurae et in quae genera? Cubus, tetraëdron et dodecaëdron sunt primariae, octaëdron, icosaëdron secundariae.

Quare illas facis primarias, has secundarias? Tres illae habent ortum priorem et angulum simplicissimum, h. e. trilinearem, et planum quaelibet primum; duae posteriores habent ortum ex primariis, et angulum plurium linearum magisque compositum, et planum mutuatitium.

Quis est ordo primariarum? Primariae istae dicuntur tantum respectu secundariarum, inter se enim habent adhuc ordinem prioritatis istum: cubus, tetraëdron, dodecaëdron. In his enim figuris apparet prima omnium metaphysica oppositio, inter idem et alterum vel diversum. In cubo spectatur identitas, in reliquis duabus diversitas. Et inter has quidem est prima contrarietas geometrica, scil. quae est inter plus et minus ipso. Cubus enim est res ipsa, tetraëdron est minus cubo, dodecaëdron plus cubo, sen cubus est prima genitarum, tetraëdron prima exsectorum e cubo, dodecaëdron prima compositarum, aucto et operio cubo; quae idea etiam in earum planis, tetragono, trigono, pentagono dominatur: tetragonus enim gignitur primo omnium duobus simplicissimis et aequabilissimis, ut libro primo dictum; idem solvitur in bina triangula, pentagonus vero compositur ex tribus triangulis idoneis.

Explica cubi genesin et primum et speciem. Rectae quantitates ortum habent mente conspicuum; sphaericum, ut supra dictum, quandam gerit aeternitatis seu generationis aeternae characterem. Posito vero sphaerico, ponitur punctum in ejus medio et puncta insita in ejus superficie. Ex fluxu igitur puncti ad punctum oritur linea, ex fluxu lineae laterali superficies, ex fluxu superficiei laterali corpus. Si fluxus est rectus etiamque brevissimus, recta hinc oritur duobus terminata punctis; si fluxus lineae rectae talis est, ut aequaliter fluant omnia ejus puncta, parallelogrammum oritur, quatuor terminatum lineis; si sic etiam parallelogrammum fluat, oritur parallelepipedum, sex terminatum planis. Rursum si lineae fluxus est aequalis rectae fluenti, angulus lineae, secundum quam fit fluxus, ad fluentem qualescunque praeter rectum, oritur planities, rhombus dicta, cujus latera inter se aequalia; si angulus rectus fuerit, quadratum est, quod oritur; si sic etiam fluat quadratum, oritur cubus, cujus sex plana omnia quadrata et sic inter se aequalia. Jam brevissimum anfractuoso prius est, aequale sibi quod simile inaequali et dissimili, rectum obliquo. Quemadmodum igitur inter lineas genitas recta prior est (circulus enim posterior est plano, planum recta), inter superficies quadratum, sic inter quantitates ea, quae perfecta, hoc est trina dimensione constat, nempe inter corpora, primum esse cubus evincitur.

Explica primum tetraëdri inter sectas et modum sectionis e cubo et speciem. Diminutis corporibus, ut existat minus, solent existere figurae solidae aliae, quarum prima esse censenda est illa, quae existit, si prima ex genitis, sc. cubus, simplicissime et aequalissime sectus fuerit. Non est autem

sectio (earum quidem, quae novam figuram planam designant) aequabilior vel simplicior, quam si quatuor cubi angulos praecidas radicitus: totidem enim

Fig. 53.

praeclis tetraëdra, singula angulo solido recto B, basi triangulari aequilatera ACD, relinquitur veluti quidam venter cubi, scilicet tetraëdron quintum, undique sibi ipsi simile, quatuor ulmum triangularis aequilateris contentum. At si sectione illa utaris cubi, de qua libro primo, non quinque, sed sex irregularia fient tetraëdra. Ex diminutis igitur tetraëdron est figura prima; est autem tertia pars de corpore cubi secti, et quilibet absectus angulus, ut BACD (Fig. 53.) est ejusdem totius pars sexta.

Explica etiam ortum dodecaëdri ex augmentatione, et rationes ejus posterioritatis inter tres primarias, prioritatis vero in auctis. Sicut in diminutione cubi pro quatuor angulis cubi resectis plana constituta fuerunt quatuor, reliqui quatuor anguli cubi manserunt tetraëdro, sed diminuti et speciei quidem ejusdem, hoc est trilinearis: sic etiam, si primam ex auctis, seu quae plus cubo sunt, constitinere velimus, pro cubi planis constituimus angulos, cubi vero angulos etiam aucto transmittimus, sed vestitos auctoque, trilineares tamen etiam ipsos, seu quod eodem ducit, duodecim cubi lateribus totidem plana sunt internenda, sicuti prius senis tetraëdri lateribus totidem plana quadrata instrata erant: sicut enim cubus tetraëdron tegit, sic haec aucta figura, quam hic inquirimus, tegit cubum. Quodsi pro singulis cubi planis singulos statueremus angulos, quadrilineares angulos sex statueremus, quia cubi sex plana sunt quadrangula, manerent octo cubi anguli trilineares: mixta igitur esset figura. Ut igitur maneat trilinearis angulus augmentationis et anguli omnes solidi inter se homogenei, imponendi sunt singulis planis cubicis bini anguli, non unicus, sex prismata, quale prius unum BCAED, non 6 pyramides, qualis hic est una (Fig. 55.), sic ut binorum prismatum contiguum semper sit unum commune planum, instratum uni lateri cubi. Et haec 6 prismata paulo minus faciunt ipso cubo, cui imponuntur. Ita sicut ex augmentatione anguli 12, quibus accedunt octo anguli cubi; summa 20 angulorum.







Fig. 54.



(Hic AE, ED et reliquae lineae punctatae sunt latera cubi recti: AED est planum cubi, pro quo sunt duo anguli B, C: et manent etiam anguli cubi A, E: et lateri cubi AE, internitur quinquangulum ABCEF, sic lateri ED, quinquangulum ECD.)

Fig. 55.



Quomodo hinc extruitur species plani dodecaëdrici? Anguli figurae, ut jam dictum est, debent esse 20, triam singuli linearum, quarum quaelibet ad binos concurrat angulos, tres termini vicies sunt 60, binl vero termini claudunt unam lineam: ergo lineae seu latera figurae sunt 30, quae sunt potestate 60, respectu planorum figurae; quodlibet enim figurae latus ad duo plana concurrat. Sexaginta vero lineae seu latera plana divisa in duodecim plana, figurae huic solidae necessaria, quotum indicant quinque. Plana igitur sunt quinquelatera. Ex auctis igitur rursum primum est dodecaëdron, habens plana quinquelateralia.

Quis est ortus secundariorum et quare tantum duae? Tribus his figuris, cubo, tetraëdro, dodecaëdro, tres quidem aliae respondent, sed una earum coincidit cum sua primaria; et ipsae quoque gignuntur diminutione trium primariorum, sed diminutione generis diversi, ubi non latus pro plano relinquatur, sed angulus, pro superficie scilicet primariae figurae non linea secundariae,

Fig. 56.



Fig. 57.





Fig. 58.



Fig. 59.



Fig. 60.



sed punctum, manente laterum numero; simul autem (ut prius) planum secundariae generatur pro angulo primariae, et planum quidem triangulare, quia angulus primarii sui est trilinearis, connexis tribus centrīs trium planorum primariae, solidum angulum circumstantibus. Sunt igitur istae secundo genitae veluti quaedam priorum viscera. Nam cadit de cubo, quicquid exterius apparet, relinquuntur de eo sola 6 centra, velut umbilici quidam 6 planorum, suntque anguli novae figurae sex: et quia cubus habuit 8 angulos, figura jam pro his accipit 8 plana triangula aequilatera, diciturque inde

octaëdron, quod est sexta pars cubi sui.

Sic de tetraëdro: pro 4 ejus planis triangularibus, constituuntur 4 anguli; pro 4 angulis 4 triangula, oriturque figura eadem cum sua primaria: Itaque pro nova non censetur. Est autem pars vicesima septima tetraëdri, cui inscriptum est. Sic est etiam cum dodecaëdro, quod de suis 12 basibus largitur novae figurae 12 angulos, pro suis 20 angulis largitur secundariae suae 20 bases triangulas, unde figura icosaedron dicitur: estque paulo minus dimidio dodecaëdri sui.

Primariorum una diminutione cubi fuit genita, una augmentatione. Hic jam

diminutione sunt genitae secundariae, nihilne gignitur secundarium augmentatione? Secundae huic diminutioni respondet quidem etiam secunda augmentatio trium illarum primariorum, angulo in locum plani succedente, plano in locum anguli, sed sunt figurae eadem, quae hac diminutione sunt factae. Sicut enim prius cubo erat inscriptum octaëdron, dodecaëdron icosaeëdron, sic nunc vicissim octaëdron inscriptus fingitur cubus, icosaeëdron dodecaëdron. Omnibus igitur perinstratis, reperiuntur figurae primae quinque.

Quare appellas figuras simplicissimas? Quia quaelibet clauditur planis unicus solum speciei, scilicet triangulae vel quadrangulae vel quinquangulae, tum etiam unico speciei solido angulo, trilineari quidem tres primariae, quadrilineari octaëdron, quinquelineari icosaeëdron. Ceterae figurae variant vel in uno vel in altero. Sunt enim quae nunc quidem habent genus planorum, ut rhombica praemissa, sed non unum genus solidorum angularum, rhombus enim dodecaëdros habet 6 quadrilineares angulos et 8 trilineares, rhombus triaëdros habet 12 quinquelineares et 20 trilineares. Sunt aliae, quae miscent diversa plana, angulos habentia uniformes solidos, ut 13 species Archimedeorum. (cfr. Vol. V. p. 123 et.)

Quare pulcherrimas facis et perfectissimas illas quinque? Quia sphaericum, Dei imaginem, quantum a recta figura fieri potest, imitantur, angulos omnes in eodem sphaerico ordinales et sphaerico inscriptiles; et ut sphaericum sibi ipsi undiqueque est simile, sic plana hic uniuscujusque figurae omnia inter se sunt similia, omnia etiam uni et eidem circulo sunt inscriptilia, angulis aequalibus.

Non possent alia aliqua methodo constitui plures figurae harum similes? Nequaquam. Nam solidus alienius figurae angulus constituitur a tribus minimum planis. Igitur triangula aequilatera trinis, quaternis, quinis, quadrangula trinis, quinquangula itidem trinis angulis coeunt ad solidum. Seni vero triangulares et trini sexangulares implent planitiem nec assurgunt in solidum. At vero horum plures ut etiam, trini septangulares et trini quicunque alii, sperant summam 4 rectorum, qui circa idem punctum in plano ordiantur. Vide prop. ult. lib. XIII. Euclidis scholion, et librum II. Harmonicorum meorum.

Quomodo igitur ex his figuris sphaerarum primariorum numerus et intervalia planetariorum orbium desumpta sunt? Figura quaelibet intelligitur habere duas sphaeras, unam circumscriptam sibi et planorum suorum centra tangentem, adeo ut primus figurae conspectus veluti invitet architectum aliquem ad circumscribendas et inscribendas sphaeras: qualis igitur est proportio exterioris sphaerae ad interiorem, talis etiam est facta proportio sphaerae planetae superioris ad proximam inferiorem, inter quas quidem est illud intervallum.

Quae sunt istae proportionales orbium in singulis figuris? Semidiameter circumscripti aut 100000, erit inscripti proportio ista.

In cubo	57735	Potestate tertia pars radii circumscripti.
In tetraëdro	33333	Pars tertia radii circumscripti.
In dodecaëdro	79465	Pars ineffabilis inter duas tertias et tres quintas potentiae radii circumscripti, abscissa scilicet potentia apotomes ab undecim quindecimis potentiae radii.
In icosaeëdro	79465	
In octaëdro	57735	Potestate tertia pars radii circumscripti. ⁴⁹⁾

Habet autem octaëdron etiam in sui medio quadratum, a quatuor me-
Kapler Opera. VI.

diis lateribus formatum, cui si circulus inscribatur, ejus semidiameter erit 70711, potestate diuidia pars circumscripti.

Ostende nunc, quis sit locus orbi Telluris inter has figuras. Quinque corpora in duas supra classes erant tributa, in tria primigenia et duo secundo genita, quorum illa tria linearem habebant angulum, haec plurilinearem. Nam ut Adam est primogenitus, Eva ejus non filia, sed pars, qui ambo protoplastae appellantur, Cain vero et Abel et sorores sunt jam illorum proles: sic cubus est primo loco, ex quo aliter et simplicius sunt ortae tetraëdron, veluti costa quaedam cubi, et dodecaëdron, sic ut tamen omnia tria mancant inter primaria; octaëdron vero et icosaeëdron ex cubo et dodecaëdro patribus, et tetraëdri, velut matris, plano triangulari, duae jam proles prognatae sunt, quaelibet sui parentis gerens similitudinem.

Tres igitur primae figurae ejusdem classis debebant includere circuitum centri Telluris, duae secundo genitae, tanquam classis altera, debebant includi ab orbe, in quo Tellus volvitur, atque ita orbis iste communis fieri maceries ordinis utriusque, quia praecipuus mobilium globorum erat futura Tellus, domitium imaginis Dei. Hoc enim pacto et natura inscriptionis est servata in secunda classe, circumscriptionis in prima: naturalius enim et concinnius est, ubi inscribi octaëdron, dodecaëdro icosaeëdron, quam octaëdro cubum, icosaeëdro dodecaëdron.

Sic itaque centri Telluris circuitus factus est medius planetarum; extra enim tres circumponi debebant, propter tres figuras primarias, intra ejus circuitum duo, propter duas figuras secundae classis, quibus tertius accedebat Sol in ipso ultimo complexu centri mobilium. Itaque Saturnus, Jupiter, Mars superiores facti sunt, Venus, Mercurius, Sol inferiores; Luna vero circa Tellurem in eodem communi circuitu Tellurem privatim ambiens, inter secundarios planetas est, ut supra dictum.

Quis est ordo inter tres exteriores figuras et quis cuique locus inter planetas? Cubus prima est figurarum, collocata igitur est inter duos extremos orbes, Saturnum et Jovem; sequitur in genesi figurarum tetraëdron, hoc igitur locum obtinuit inter Jovem et Martem; ultima trium erat dodecaëdron, ultimus igitur illi locus tributus est inter regiones orbiculares Martis et Telluris.

Loca etiam duas interiores. Etsi octaëdron habet naturam cubi, cujus primae sunt partes, icosaeëdron dodecaëdri, cujus ultimae: non tamen octaëdro proximus locus post dodecaëdron competeat propter duas causas. Nam primo duae figurarum classes sunt quodammodo inter se oppositae: conveniebat igitur, ut ab oppositis etiam terminis fieret locationis principium. At cum exteriorum figurarum primis is censeretur locus, qui magis ad exteriora vergebat, consequens erat, ut interiorum figurarum esset is primus locus, qui magis ad interiora versus centrum vergebat. Deinde convenientius erat naturae simillimum figurarum, dodecaëdri et icosaeëdri, et aptius ipsarum inscriptioni mutuae, ut proxime sibi invicem succederent, intercedente circuitu seu orbe Telluris, ad quem velint ad communem maceriem utraque figurarum classis desineret. Sic igitur est factum, ut inter Telluris et Veneris orbitas locaretur icosaeëdron, inter intimas vero Veneris et Mercurii octaëdron. Sol vero orbem non habet, in quo ejus centrum circumferatur, est igitur is extra eorum mobilium primariorum, sed habet in se fontem motus, sicut exterius fixae habent in se quietem et locum dant mobilibus eaque continent.

Etiamne invenitur proportio figurarum inter orbes, quos cuique figurae dedisti? Sic invenitur eadem proportio, ut quamvis in minimis desit aliquid,

nullum tamen intervalium binorum planetarum propius accedat ad alterius figuræ orbium proportionēs, quam quæ hæcenus optimis rationibus binis planetis fuit adscripta.

Vides enim, sicut Saturnus supra habuit minus duplo de diametro orbis Jovis, et Veneris similiter minus duplo de Mercurii diametro, scilicet quinque tertias vel octo quintas, sic etiam in cubo et octaëdro 100000 esse minus quam duplum ipsius 57735. Nam si tres quintas sumseris, 60000 habebis, sin quinque octavas, tunc 62500 veniunt. Rursum sicut Martini orbis ad orbem, qui centrum Telluris vehit, minimam fere habuit proportionem et pene æqualem proportioni orbis Telluris ad Venerium, sic vides etiam in dodecaëdro et icosædri minimam esse orbium proportionem, scilicet 100000 ad 79465. Vides tertio, sicut Jupiter ad Martem maximam constituit proportionem orbium, nimirum triplam, sic etiam in tetraëdro circumscripti diametrum esse triplam inscripti.

Si tam prope accedunt intervalla ad proportionēs figurarum, cur igitur superest aliqua discrepantia? 1) Quia mundi mobilis archetypus constat non tantum ex quinque figuris regularibus, quibus curricula planetarum et cursorum numerus definirentur, sed etiam ex proportionibus harmonicis, quibus cursus ipsi ad quandam veluti musicae coelestis seu concentus harmonici sex vocum ideam attemperandi fuerunt. Cum autem ornatus iste musicus desideraret distinctionem motus in uno quolibet planeta, tardissimi a velocissimo, quæ distinctio perficitur variatione intervalli inter planetam et Solem, et cum quantitas seu proportio variationis hujus in aliis planetis alia requireretur: hinc necessarium fuit, ut intervallis istis figurilibus, quæ exhibentur a figuris sine variatione uniformia, minimum aliquid adimeretur et libertati harmoniæ relinqueretur ad repræsentandas motuum harmonias.

2) Neque tamen neglecta fuit, ne in hac quidem adeo minuta discrepantia, proprietates figurarum regularium. Sicut enim tetraëdri quidem orbium proportio est perfecta, hoc est effabilis simpliciter, cubi et octaëdri semiperfectæ, hoc est effabiles potentia, ineffabiles longitudine, at dodecaëdri et icosædri plane imperfectæ, hoc est penitus ineffabiles: sic etiam tetraëdricorum planetarum proportio perquam exacte, hoc est in ipsis fere intervallorem extremitatibus, imitatur figuralem; cubicorum et octaëdricorum proportionēs minus exacte sunt figurales, quia extrema quidem intervalla ab his recedunt, at intermedia quadrant; dodecaëdricorum vero et icosædricorum tota spatia figurales suas proportionēs deseruerunt, quanquam nulla alia propius assequantur. Ecce enim, ut de Jovis intervallo minimo Martis longissimum sit perquam exacte pars tertia, ut in tetraëdro orbis interior exterioris, ut sic angulis tetraëdri collocatis in orbe Jovis intimo, plana tetraëdrica tangant quodammodo orbem Martis extimum; ecce iterum, ut positis angulis cubi quidem in Saturni, octaëdri vero in Veneris orbibus intimis, plana figurarum immergantur quidem in regiones, illa Jovis, ista Mercurii, neque tamen totas illas transcendunt, sed usque ad medias circiter penetrent; ecce denique, ut positis angulis dodecaëdri quidem in Martis, icosædri vero in Telluris orbibus intimis, plana figurarum nullatenus assequantur subjectas regiones, illa Telluris, ista Veneris: ut interim tamen nulla planetarum intervalla propius accedant ad harum figurarum proportionēs omnium minimas. Vide de his Harmonices meæ lib. V. cap. 9. prop. 48. et per totum, ubi causæ enuntur non tantum exactæ quantitatis proportionum inter binos, sed etiam extremorum uniuscujusque solitarii intervallorem.

Num etiam a periodicis temporibus aliqua conjectura de figurarum interpositione decumi potest? Omnes quidem proportionum temporariae sunt majores proportionibus usurarum orbicularum et sic etiam proportionibus suis figurabilibus, ut parte secunda hujus libri explicabitur: potest tamen etiam inter illas agnosci proprietates figurarum non difficulter. Sicut enim figurarum proportionum tres sunt, maxima quidem solitaria, media vero et minima ambae geminatae (quippe illa ex unico tetraëdro, ista et ex cubo et ex octaëdro, haec et ex dodecaëdro et ex icosaëdro): sic etiam inter Jovem et Martem maxima et solitaria est temporum proportio fere ea quae 6 ad 1, quippe annorum 12 ad minus quam 2, argumentum interpositi tetraëdri; inter vero Saturnum et Jovem interque Venerem et Mercurium proportio temporum est minor et utrinque fere eadem, argumentum interpositorum corporum cognatorum, illic cubi, hic octaëdri, quae proportionem orbium suorum faciunt eandem. Nam sicut se habent 30 anni Saturni ad 12 annos Jovis, sic quam proxime se habent 225 dies Veneris ad 88 dies Mercurii; denique inter Martem et Tellurem interque hanc et Venerem proportio temporum est minima rarumque pene eadem utrinque, argumentum interpositi illic dodecaëdri, hic icosaëdri, cognatorum et ejusdem proportionis corporum. Nam sicut se habent 687 dies Martis ad 365 $\frac{1}{4}$ Telluris, sic dies 365 $\frac{1}{4}$ se habent ad 194, cum Venus habeat pro his dies 225, scilicet aliquanto plus, minimam faciens omnium hanc temporariam proportionem. Causae tantulae dissimilitudinis explicantur Harmon. lib. V.

Num aliud habes documentum, praeter illud ex figurarum duabus classibus, globi Telluris in locando praecipuam rationem habitam? Equidem fortuitum non est, quod Telluris, medii planetae, medium intervallum a Sole praecipue admodum invenitur medio loco proportionale inter Martis superiorum infimi intervallum brevissimum et Veneris inferiorum supremi longissimum. Nam ut supra dictum, spatium inter Martem et Venerem pro Tellure reliquebatur per inscriptiones figurales indefinitum et laxum et sic liberum, in quo dividendo per orbem Telluris vel haec vel illa proportio, si melior alla fuisset, exprimi posset. Medius igitur iste classium figurarum, medius superiorum et inferiorum planetarum paries, mediare etiam geometrica debuit.

Quid igitur definitur spatium illud, quod non definitur inscriptiones? Est est figura quaedam aucta, dodecaëdron scilicet aculeatum, quae hoc spatium deprehenditur definire tam accurate, quam spatium inter Jovem et Martem definitur a tetraëdro, nec illius imperfectae figurae associatio ad cognatas suas, dodecaëdron et icosaëdron, sua ratione carere videtur: tamen nec haec nec quaecunque alia spatia solae figurae definiunt exacte, sed relictum fuit hoc munus ornatui harmonico motuum, qui sibi postulavit aliquam in definiendis exacte spatii hanc libertatem.

IV. De praecipuorum mundi corporum inter se proportionibus.

Unde censet initium faciendum esse indagandi corporum proportionem? A Tellure, 1) ut domicilio creaturae contemplatricis, 2) ejusdemque etiam imaginis Dei creatoris, 3) legimus enim in divino Mose, quod initio creaverit Deus Coelum et Terram. 4) Est etiam Telluris orbis medium figurale inter planetas et communis illorum macerles, et inter fines planetarum superiorum inferiorumque etiam geometricum medium proportionale. 5) Denique ipsa fabrica proportionum harum clamat elata voce, Deum creatorem in accommo-

dandis corporibus et intervallis ad corpus Solis, ut ad mensuram ortu priorem, initium a Tellure fecisse.

Quam causam censes esse magnitudinis corporis Solaris? Solis globum esse primum omnium mundi corporum in ordine creationis saltem archetypali, si non etiam temporali, suadent ista: 1) Moses primae diei opus facit lucem, pro qua nos possumus intelligere corpus Solis. 2) Corpus Solis supra plurimis nominibus principatum obtinuit in naturalibus, quin igitur etiam in quantitate inque tempore, quo creatum est. Jam vero primum corpus, eo ipso quia primum, proportionem ad sequentia nullam accepit, sed sequentia potius ad ipsum ut primum. Quare magnitudinis Solis causa archetypalis nulla est, nec alius futurus fuit globus duplo major atque nunc est: quippe una mundus etiam reliquus universus et homo in eo futurus fuisset duplo major, quam nunc est.

Quo igitur medio accommodata fuit magnitudo Telluris ad magnitudinem globi Solaris? Medio visionis Solis. Tellus enim erat futura domicilium contemplatricis creaturae et in cuius gratiam mundus universus est conditus. Jam vero contemplatio ortum habet ex visione siderum, quare etiam quantitas contemplandorum ordinem habere debuit ex quantitate videndorum. Primum vero visibile lux est sen Sol, quippe 1) primae diei opus et 2) visibilibus omnium superexcellens, principalissimum, primum, et quod ceteris omnibus visibilitatis causa erat futurum. Sequitur igitur, ut a visione Solis in Terra principium sit factum proportionandi corpora mundi, sicut etiam in superioribus ipsa mundi spatia proportionali mediatione orbitae Telluris inter se distincta fuerunt.

Quanta est apparentia diametri Solis in Terris? Constat vetustissimis Aristarchi et recentissimis nostri temporis observationibus, si Terra quam longissime a Sole recesserit, tunc centro visionis descripto circulo, de illo circulo exactissime septingentesimam et vicesimam partem, id est dimidium gradum occupari et quasi determinari a diametro Solis, seu quod idem est, angulus inter lineas stringentes utrumque Solis marginem est septingentesima et vicesima pars quatuor rectorum.

Quam putas hujus numerositatis causam? Primae rei causam etiam archetypalem inter primas quaerere oportet. Jam vero geometrica causa divisionis circuli in 720 ex figura nuda tot laterum est nulla. Nam haec figura per bisectionem derivatur ex figura 45 laterum, quae demonstrationem nullam habet, ut probatum libro I. Harmonicorum. Sequitur, ut desumpta sit haec sectio circuli ex compositione signarum et sic ex rationibus harmonicis. Et videtur inferre necessitatem, ut circulus zodiacus, in quo motus suos harmonicos exercere debuerunt cum planetae omnes re vera, tum etiam Sol ad apparentiam, ut inquam circulus iste dividatur ab apparentia primi corporis in partes numerositatis harmonicae. Jam vero numerus minimus, qui se praebet determinandis omnibus partibus monochordi ad constituendum systema diapason duplex, hoc est et mollis et duri cantus, hic inquam numerus est 720, ut demonstratum est lib. III. Harmon. cap. 6.

Quare cum omnium planetarum motus, ut lib. V. Harmonicorum demonstrato, ad hoc systema duplex essent accommodandi, consentaneum fuit, ut etiam primum corpus, quod choragus esset hujus musicae, apparentia suae diametri in Terris divideret terricolis, id est contemplatrici creaturae, circulum illum ut indicem et mensuram apparentiae motuum harmonicorum, divisione monochordi, id est in partes 720, quod est bis 360, ter 240, quater 180, quinquies 144,

sexies 120, octies 90, novies 80, decies 72, duodecies 60, quindecies 48, sedecies 45, octodecies 40, vices 36, vices et quater 30, numerosissima forma divisionis in partes aliquotas.

Quid igitur sequitur in intervallum Solis et Terrae ex hac assumpta hypothese, aut quanta est haec decempeđa, hactenus a nobis usurpata, pro mensura orbium planetariorum? Si Solis diameter debuit occupare semissem gradus visui in Terra constituto, oportet visum vel ejus loco centrum globi terrestris a centro Solis recessisse 229 semidiameteris corporis Solaris rotundi, paulo plus, ut in geometria doceatur.

Teneo intervallum, dic etiam quantitatem globi Telluris per causas suas. Nondum ista sufficiunt ad quantitatem Telluris determinandam, sed opus est axioma insuper alio. Nimirum, quia Tellus domicilium erat futura mensurantis creaturae, debuit etiam ipsa Tellus et corpore suo corporum mundanorum et semidiametero sua, ut linea, linearum, id est intervallorum fieri mensura. Cum autem distincta sit mensuratio corporum a mensuratione linearum, et cum sit prima proportio inter corpora Telluris et Solis, prima etiam inter diametrum Telluris et intervallum Telluris a Sole, nihil magis est rectae et coeinae et ordinatae contemperati consentaneum, quam ut aequalitas statuatur proportionis utriusque, ut quoties corpus Telluris continetur in corpore Solis, toties etiam semidiameter Telluris contineatur in intervallo eentrorum Solis et Terrae, ut sit sicut corpus Terrae ad corpus Solis, sic semidiameter Terrae ad distantiam eentrorum.

Quomodo jam ex his duobus axiomatibus elicitor quantitas semidiameteri Telluris? Statuta Solis semidiametro particularum 100000, ut sit intervallum eentrorum Solis et Terrae 22918166 talium particularum; cubus de 100000, id est 1000000000000000, dividendus est per intervallum 22918166, et quotientis (qui est sinus $0^{\circ} 15' 0''$ continuatus) quaerenda est radix, quae erit 6606. Tanta erit semidiameter Telluris. Nam sicut 6606, semidiameter Telluris, continetur in 22918166, intervallo Solis et Terrae (3469 vicibus cum triente), sic etiam cubus de 6606, semidiametro Terrae, continetur in cubo de 100000, semidiametro Solis, totidem, sc. 3469 vicibus cum triente. Jam vero notum est ex geometria, quod quae cuborum inter se est proportio, eadem sit globorum itidem cubis inscriptorum. Ita semidiameter Solis continebit semidiametrum Terrae quindecies, paulo plus; corpus vero Solis continebit corpus Terrae 3469 vicibus circiter.

Triplum fere dicis ejus quantitatis, quam veteres tribuerunt distantiae Solis a Terra longissimae, ut quam illi minorem statuerunt, quam 1200 semidiametrorum Terrae, vigecuplum vero dicis proportionis corporum, quia ipsi Solem tantum 166^{ies} fecerunt majorem Terra: nonne observationes astronomicas metus? Nequaquam. Veteres enim tam propinquum fecerunt Solem, ut parallaxin debuerit facere trium minutorum. Unde Tycho Braheus ratiocinatus est, Martia, cum Terrae propior sit, quam Sol, parallaxin debere observari multo majorem tribus minutis. Atqui observavi ego, parallaxin Martis nequaquam esse sensibilem. Major est igitur distantia Martis, etiam cum proximus sit, major etiam distantia Solis, quam 1200 semidiametrorum.

Diametri Martis et Veneris possunt observari, cum antiquis instrumentis, tum etiam recenti illo telescopio Belgico et inveniuntur paucissimorum minutorum. Si ergo Sol tam est propinquus, quam dixerunt veteres, etiam hi planetae in sua quisque proportionis tam propinqui fient, quam dixit Tycho Braheus ex Copernico. Si Mars tam propinquus, erit sub sua visibili diametro

etiam minor. Erit igitur Mars minor quam Terra, minor scilicet superior, quam inferior; ut ita nulla futura sit analogia magnitudinis corporum ad eorum ordinem, quod non est consentaneum ornatui mundi.⁵⁹⁾

Quanto major statuitur Solis distantia, tanto minor sit Solis parallaxis, quanto minor Solis parallaxis, tanto major parallaxis Lunae a Sole, si ex suis principiis assumatur simplex Lunae parallaxis: quod egregie servit doctrinae eclipsium emendandae. Confirmatur igitur potius, non vero refutatur, tanta magnitudo intervalli Solis ab observationibus astronomicis. Physice vero ad votum est, ut corpus Solis, quod ceteris planetis omnibus motum infert, multo omino partibus sit majus corporibus mobilibus omnibus in unum coactis.

Cujus corporis determinatio proxime sequitur Telluris determinationem? Lunae, secundarii planetae. 1) Quia hoc sidus peculiariter Terrae tributum est, quod et vegetationem creaturarum terrestrium adjicaret, et a creatura contemplativae in Terris observaretur, et a quo siderum observatio inciperet. 2) Quia rationes proportionis constituendae propemodum eadem sunt.

Ediscere fundamenta proportionis inter Lunam et Terram, tam ratione corporis, quam ratione intervalli. 1) Rursum hic Luna in remotione maxima a Terra debuit occupare diametro sua visibili partem circuli 720^{am}, cum propter ipsum numerum ut prius, tum etiam propter eclipses Solis, spectaculum a creatore ordinatum, ut eo doceretur contemplativa creatura de ratione cursus siderum; quod rectissime fiebat tunc, si semidiametri Solis et Lunae in utriusque remotione maxima apparerent aequales: ut ita Luna Solem exacte tegere posset in hac utriusque sideris conditione, si daretur, et sic tam Luna quam Sol eundem angulum in Terra conitinerent.

2) Deest etiam, ut proportio corporum Terrae et Lunae sic se haberet ad proportionem intervalli Lunae et semidiametri Telluris, sicut prius proportio corporum Solis et Terrae se habuit ad proportionem intervalli Solaris et semidiametri Terrae: ut scilicet proportionum binarum eadem utrinque esset analogia. Luna enim, planeta terrestris et secundarius et Sol obscurando factus, exemplum etiam proportionum orbi Solis vel Terrae sequi debuit.

Quid hinc sequitur? Duae res sequuntur ex positis duobus axiomatibus, quarum unaquaelibet per se ipsam, miro consensu verisimilitudinum, etiam ex praecedentibus non sequeretur, axiomatis loco posset usurpari, cum sint per se fide dignissimae. Prima est ista, quod cum analogia proportionum ex parte Solis sit ipsa proportio aequalitatis, id est, sicut corpus Terrae in corpore Solis majori toties continetur, quoties semidiameter Terrae continetur in distantia vel semidiametro orbis Terrae vel Solis, non vero saepius illud quam hoc, sic etiam corpus Terrae continebit corpus Lunae minus et se angustius toties, quoties semidiameter Terrae continetur in distantia vel semidiametro orbis Lunae, non vero rarius illud quam hoc. Hoc ipsum, ut axioma usurpatum, dignitatem suam habet inde, quia Terra est domicilium mensurantis creaturae, quare et ipsa corpore suo metitur minus etiam Lunae corpus, velut prius metiebatur Solis corpus se majus; et semidiametro sua metitur semidiametrum orbis Lunae, utrumque vero sub ratione aequalitatis ideo, quia solius Lunae orbis circa Terram est situs, sicut Terrae orbis circa Solem: itaque mensuratio orbis et corporis Lunae prae corporibus planetarum ceterorum est Terrae propria, non minus quam prius orbis et corporis Solis mensuratio. In propria vero mensuratione par est obtinere rationem aequalitatis, ut primam et principem, si ubi impedit.

Alterum, quod sequitur ex praemissis longo demonstrationis ambitu, quem vide in meo Hipparcho,⁶¹⁾ est hoc: quod hac ratione semidiameter orbitae Lunae seu distantia medio loco proportionalis fit inter distantiam seu semidiametrum orbis Telluris et inter semidiametrum corporis Telluris: ut sicut semidiameter Terrae est ad semidiametrum orbis Lunae, sic haec sit ad semidiametrum orbis Telluris vel Solis. Hic iterum est aliqua proportionis utriusque aequalitas, etiam se ipsa verisimilis, quia quod est Soli orbis Terrae, circa Solem positus, id est Terrae orbis Lunae, circa Terram positus.

An etiam observationes adtutulantur huic intervallo Lunae et Terrae? Omnino ad unguem: nam Braheus Lunae perigaeae distantiam a Terra invenit paulo minus quam 54 semid. Terrae in quadris, apogaeae in iisdem quadris majorem quam 59, minorem paulo quam 60, cum ex his principiis consueatur illa quidem 54, ista vero 59.

Quomodo jam ex positis axiomatibus et conclusis, axiomatum aemulis, elicienda est quantitas semidiametri Lunae? 1) Statuta Lunae aemidiametro particularum 100000, ut sit intervallum centrorum Lunae et Terrae 22918166 talium particularum: cubus de 100000, id est 1000000000000000, multiplicandus est in numerum intervalli 22918166, et facti radix biquadrata est extrahenda, quae erit 389085, ostendens quantitatem semidiametri Terrae in iisdem particulis. Nam sicut 389085, semidiameter Telluris, continetur in 22918166, intervallo Lunae, 59 vicibus paulo minus, sic etiam cubus de 389085 continebit cubum de 100000, 59 vicibus paulo minus, et sic etiam globus Telluris globum Lunae. Ita semidiameter corporis Telluris continebit semidiametrum corporis Lunae minus quam quater.

2) Aliter et simplicius ex conclusu posteriori: quaeratur de 3469 cum triente, sc. de intervallo Solis, radix quadrata, quae erit 59 paulo minus, tanta est distantia Lunae, quallum semidiameter Telluris est 1. Diviso vero cubo semidiametri Telluris 1 per 59 et quotiens radice cubica sumta, proditur semidiameter corporis Lunae in eadem dimensione.

Quae hinc extruitur proportio diametrorum Solis et Lunae? Eadem, quae est orbis Solis ad orbem Lunae, vel bujus ad corpus Telluris, scilicet quae est inter numeros 59 paulo minus et 1. Itaque corpus Solis continet corporum Lunae plus quam ducenta millia.

Quae globorum planetariorum inter se mutuo est proportio? Nihil est magis naturae consentaneum, quam ut idem sit ordo magnitudinum, qui est et sphaerarum, ut ex sex primariis planetis minimo sit corpore Mercurius, quia intimus est et orbem angustissimum obtinet; proxime major sit Venus, sed adhuc minor Tellure, quia angustiore quam haec orbe circumit, laxiore tamen quam Mercurius; Tellure proxime sit major globus Martis, quia hujus orbis jam est exterior et amplior, superiorum tamen minus; rursus major globus Jovis, superiorum medius, denique maximus mobilium Saturni globus, quia est altissimus.

Cum autem tres sint dimensiones corporum, vel secundum diametros, vel secundum superficies, vel secundum spatia superficiebus contenta seu corpulentiam, et diametrorum quidem proportio dupla sit, quae est superficialium, tripla quae corporum: consentaneum est, proportioni intervallorum usam ex his tribus globorum accommodatam esse. Verbi causa, cum Saturnus sit decuplo fere altior a Sole, quam Tellus: aut diameter Saturni erit decupla diametri Telluris, superficies superficiei Telluris centupla, corpus millicuplum corporis Telluris, aut Saturni superficies erit decupla superficiei Telluris, ut cor-

porum proportio fiat sesquialtera proportionis intervallorum, et sit Saturnus trigeeuplo major Terra, sicut et trigeeuplo est tardior, diametrorum vero proportio fiat saltem dimidia proportionis intervallorum, scil. tripla paulo plus; aut denique corpora ipsa habent proportionem intervallorum, ut Saturnus sit saltem decuplo major Terra, sicut est et decuplo altior, in superficibus vero servetur bes proportionis intervallorum, in diametris triens, et ita diameter corporis Saturni sit paulo major quam dupla diametri de corpore Telluris.⁵²⁾

Ex hisce tribus modis primum citra controversiam repudiant cum rationes archetypicae, tum etiam observationes diametrorum, habitae instrumentis telescopii Beigiei, secundum ego haetenus, tertium Jo. Remus Quietanus probat. Pro me stare videbantur rationes archetypicae meliores, pro Remo stant observationes, sed in tanta scrupulositate metuebam, ne omni exceptione majores non essent. Cedo tamen locum Remo et observationibus. Nam Jupiter acronychus in perigaeo eccentrici crebro mihi visus est occupare circiter 50'', Saturnum Remus censet occupare 30'', Mars acronychus et in Aquario perigaeus major quidem apparet Jove, non tamen multo. Equidem corpus, aequale Terrae, si videretur ex intervallo, quantum Soli tribuimus, 3469 semidiametrorum Telluris, appareret diametro 2'. At nunc ex propinquitate Martis ista corpora idem, Telluri aequale, plus quam 5' cernitur occupare et sic sex Joves aequare; quanto igitur diameter globi Martii sit major diametro Telluris, tanto auctior erit ejus apparentia. Non igitur plus quam forte sexta parte majorem debemus facere diametrum globi Martii, quam est diameter Telluris, quod fit in modo tertio.

Ex rationibus vero archetypicis haec fortasse non inepte militabit: quod sicut antea proportionem ipsorum corporum Solis et Telluris, Telluris et Lunae fecimus eandem, quae erat inter semidiametrum Telluris et semidiametros sphaerarum, sic nunc etiam proportio corporum planetariorum statuitur eadem, quae est inter semidiametros orbium. Ita Saturnus mole corporis erit paulo minus decuplo major Tellure, Jupiter plus quintuplo, Mars sesquiplo, at Venus paulo minor dodrante corporis Telluris, Mercurius paulo major ejusdem triente.

An non ut Telluris, sic omnium etiam planetarum corpora iisdem quibus Tellus legibus attemperari debuerunt ad corpus Solis? Minime. Nam si hoc sequeremur, planetarum corpora fierent ordine sphaerarum contrario magna; maximus se. Mercurius, minimus Saturnus, diametro minori quam est triens diametri Terrae. Id vero et rationibus dictis et observationibus diametrorum repugnat. Saturnus enim acronychus, quando est novies altior Sole, occupat circiter 30'', occuparet igitur, si staret in propinquitate Solis, 4 1/2'. cum Terra ex tanto intervallo occupatura sit 2'. Itaque diameter Saturni plus quam duplo major est diametro Terrae. Atque hoc est, quod statim initio hujus loci dixi: evidentissimum fieri rebus ipsis, quod initium constitutarum proportionum factum sit a Terra. Nam observationes Lunae et eclipsium testantur de aequalitate proportionum duarum, quarum una est inter corpora Lunae et Terrae, altera inter diametros Terrae et orbis Lunae; hinc certitudini observationum refragari nullatenus possumus. Jam vero verissimum erat, ut iisdem legibus et Terra ad Solem attemperaretur: quod cum statuissimus, jam observationes etiam hic eminus consentientes habuimus, quia illae non ferunt propinquitatem Solis semidiametrorum Terrae 1200, sed duplum vel triplum requirunt, et postulavit sane haec attemperatio triplum. Terra igitur certe mensura est tam corporum Solis et Lunae, quam sphaera-

rum. Sic vero corpus Saturni aut alterius alicujus planetae nequaquam fieri potest mensura rei utriusque: de quo rursum testes adduximus observationes diametrorum certas. Sola igitur Terra talis mensura est; a mensura vero dimensionum natura postulat initium fieri conformationis.

De raritate et densitate horum sive globorum quid tenendum? Primo, non est consentaneum, eandem in omnibus esse densitatem materiae. Nam ubi necessaria est aliqua corporum multitudo, ibi etiam conditionum varietas ad distinctionem adhibenda fuit, ut essent illa vere multa. Praecipua vero corporum, ut corpora, conditio est interna dispositio partium. Nam molium inaequalitas quodammodo corporibus ipsis accidit propter superficies, molem definientes, nec pars interna corporis unius a parte alterius hae molis circumscriptione differt. Praecipuum vero argumentum dissimilitudinis materiarum ducitur a contemplatione periodicorum temporum, ut quae non procedit, si faciamus eandem globorum densitatem, ut infra audiemus.

Secundo, consentaneum est, ut quodque corpus est Soli vicinius, ita et densius esse. Nam et Sol ipse est omnium corporum totius mundi densissimus, ejus rei testimonium perhibet immensa multiplex vis, quae non potest esse sine subjecto proportionato; et loca ipsa, centro vicina, ideam quandam angustiae gerunt, qualis est in condensatione materiae multae in locum angustum.

Tertio: neque tamen magnitudini corporum proportionaliter erit admetienda raritas, parvitas densitas. Verbi causa, distantia simul et amplitudo globi Saturnii per superiora est ad distantiam adque amplitudinem globi Jovialis ut 10 ad 5 fere. Dico densitatem materiae in globo Saturni ad densitatem in globo Jovis non esse in ea proportionem statuendam, quae est inter 5 ad 10. Nam si quis hoc sequeretur, is peccaret jam in aliam varietatis legem, introducens copiam materiae non inaequalem, sed eandem per omnes planetas. Multiplicata enim mole Saturni 10 in densitatem 5, prodiret copia materiae 50, tantundem scilicet, quantum, si molem Jovis 5 in densitatem ejus 10 multiplicasses. At praestabilius et ornatius esse videtur, ut neque moles ipsae globorum diversae densitatis sint inter se aequales, neque densitas in molibus globorum inaequalibus sit eadem, neque etiam copia materiae aequalibus sit distributa portionibus per omnes globos, mole et densitate materiae distinctae: quin potius ut omnia varient, ut quo ordine globi mobiles inde a centro sibi invicem succedunt, eodem etiam (ordine, inquam, non proportionem) non spatia tantum corporum inque iis raritatem, sed ipsam etiam materiae copiam ipsis admetiamur: ut si Saturnus haberet copiam materiae 50, Jovi relinqueretur minus quidem quam 50, plus tamen quam dimidium 25, puta forte 36: sic enim erunt corpora quidem ut 50 : 25, copia materiae ut 50 : 36, raritas ut 50 : 36 vel 36 : 25, seu contraria densitas ut 25 : 36 vel 36 : 50.

Praeterea cum antea aequalitatem copiae materialis essem secutus, coactus sum transcribere magnitudini corporum proportionem ipsorum periodicorum temporum, ut sicut Saturnus habet 30 annos, Jupiter 12, sic etiam amplitudo globorum Saturnii ad Jovalem esset ut 30 ad 12. Hanc vero proportionem, ut nimiam, observationes diametrorum meae et Remi redarguerunt.

Quarto: proportionem copiae materialis esse statuendam praecise dimidiam proportionem molium seu amplitudinum (et sic sesquiplam diametrorum in globis et dodrantem superficierum) ista suadent. Nam primo sic fiet, ut tam haec copiae proportio, quam densitatis, utraque sit dimidia proportionis intervallorum a Sole, atque sic aequalibus portionibus illius proportionis sibi

invicem obvieu, huc copia materiae major, inde densitas in eodem magno corpore minor, quae est omnium optima mediatio. Duplo scilicet erit Saturnus altior Jove, sesquialtero ponderosior, sesquialtero et rarior, seu Jupiter sesquialtero densior; et comparatione proportionum unius, erit Saturnus duplo altior quam ponderosior, duplo et amplior quam rarior.

Idem etiam semiasis proportionis intervalloꝝ stabilitur concinnitate hanc geometrica: ut sicut superius inter duorum planetarum intervalia a Sole (verbi causa sint 1 : 64, ob facilitatem numerorum) statuenda fuerunt duo media proportionalia 4, 16, quippe ad formandas duas residuas dimensiones corporum, ut ita corpora quidem ipsa globorum mobilia essent inter se etiam ut 1 ad 64, superficies vero globorum ut 1 ad 16, vel 4 ad 64, diametri denique eorundem ut 1 ad 4 vel 4 ad 16 vel 16 ad 64: sic nunc inter eorundem duorum planetarum intervalia a Sole 1 : 64 statuatur unum medium proportionale 8, quippe ad physice formandam inter corporum materiam, quae est res una; ut ita rursus ipsa quidem globorum spatia sint ut 1 ad 64, copia vero materiae et simul raritas in minori ad illam in majori sit ut 1 ad 8 vel 8 ad 64: seu contraria densitas ut 8 ad 1 vel 64 ad 8. In hac enim ratione nihil quicquam interest, qualis modus sit, quo condensetur vel rarefiat aliqua corpulentia, num in longum tantum, an etiam in latum, an denique in omnes tres dimensiones. Proportio enim introducta praescribit aliquam rei econdensandae copiam, cui accidunt illi diversi econdensationis modi, copia semper eadem manente. Ex his igitur principiis si computemus densitates planetariorum corporum, quaesito semper medio proportionali inter binorum intervalia a Sole, seu accuratius inter binarum sphaerarum seu orbitarum diametros, numeris omnibus denique ad communem aliquem rotundum comparatis et reductis: prodeunt numeri isti, qui sequuntur in tabella, eum quibus inventi consentientes proportionem materias terrestres iuxta positas, quam proxime: ut videre est in meo libro tentonici idiomatis, quem anno 1616 scripsi de ponderibus et mensuris. (Off. Vol. V, p. 609.)

Saturnus	324	Gemmae durissimae
Jupiter	438	Magnetis Lapis
Mars	810	Ferrum
Tellus	1000	Argentum
Venus	1175	Plumbum
Mercurius	1605	Hydrargyrum

Ut aurum, cujus densitas in hac proportionem est 1800 vel 1900, reservemus Soli.

Quam denique statuis esse proportionem magnitudinis inter tres istas praecipuas mundi regiones, inter spatium, in quo Sol, spatium seu regionem mobilem, et spatium totius mundi seu regionem a fixarum sphaera terminatum? Etsi ad altitudinem fixarum determinandam ne Copernici quidem rationes observando pertingunt, ita ut illa videatur infinitae similis, quippe ad quam totum intervallum inter Solem et Tellurem, quod iudicio veterum 1200, nostris vero rationibus 8469 semidiametros globi Telluris complectitur, est insensibile: ratio tamen coeptis insistens vestigiis etiam ad hanc usque pervadendi semitam aperit.

Ae initio respiciendum est nobis ad exemplum Telluris orbisque Lunae et Solis, quia totius mundi proportionem ex Terrae propriis proportionibus derivantur, et regio ex tribus hisce corporibus eorumque cursibus descripta est quidam quasi parvus mundus. Nam quod Sol est in regione fixarum Coper-

nico, id Terra est ad apparentiam quidem in sphaera seu regione Solis, Tychoi quidem etiam in rei veritate. Et sicut Sol in centro fixarum est, immobilis ipse in domicilio immobili, sic etiam, respectu quidem motuum Lunae, Terra immobilis est in centro sphaerae Solis, quasi immobilis. Sicut enim regio mobilium circa Solem est ordinata, sic etiam orbis Lunae circa Terram circumductus est: illi fixae planctis, hic Sol ipse Lunae limes est, ad quem illa confecto mensephasibusque omnibus revertitur. Consentaneum est itaque, ut sicut orbis Lunae medium proportionale factus est rationibus necessariis inter orbem Solis apparentem et corpus Terrae in ejus centro, sic etiam regio mobilium, seu extimus Saturni ambitus, sit medium proportionale inter extimam sphaeram fixarum et corpus Solis in centro mundi.

Rursum idem conficitur etiam, sine respectu ad mundum parvum, ex consideratione ipsius magni mundi. Cum enim mobilia ex una parte affectent immobilitatem ambientis corporis, quod locum praebet, dum motui reituntur, ut non tanta celeritate moveantur, quantam affectat motor, ex altera parte motum ex motore quadamtenus suscipiant, ut in mobilibus misceantur quodammodo motus ex motore et quies ex corpore locante: igitur si rem physicam licet enunciare verbis mathematicis, mobilia poterunt aptissime dici medium proportionale inter corpus, quod motus fons est, et inter corpus immobile, quod locum praestat. Quod cum et physice et localiter sit verum (fons enim est intus, locus extra, mobilia in medio), nihil igitur verisimilius est, quam ut etiam geometricè semidiameter regionis mobilium sit medium proportionale inter semidiametrum corporis Solis et semidiametrum sphaerae fixarum, ut sicut se habet globus Solis ad sphaericum systema planetarum omnium, sic hoc se habeat ad sphaericum totius mundi corpus, fixarum regione terminatum.

Quomodo scimus diametri corporis Solis proportionem ad diametrum regionis mobilium? Ex angulo, quantum ipsum corpus Solis occupat in visu nostro, instrumentis mathematicis adjuto. Cum enim is proxime sit dimidii gradus, sequitur, illum abesse a visu 229 semidiametris suis. At vero visus est in Tellure, et Telluris orbis, circa Solem positi, diameter paulo major est decima parte orbis Saturni: ergo extimus mobilium orbis, hoc est Saturni, fere decuplo plures Solis diametros continet, hoc est circiter 2000.

Quanta per hanc rationem evadit sphaera stellarum fixarum? Sicut diameter Saturni, extimae sphaerae mobilium, continet in se diametrum corporis Solaris bis milies circiter, sic etiam diameter sphaerae fixarum contineret diametrum Saturni in se fere bis milies. Itaque diameter fixarum continebit in se circiter quadragies centena millia diametrorum corporis Solaris, diametrorum Terrae (secundum proportionem corporum Solis et Terrae a veteribus creditam) quintuplum et plus, h. e. ducenties centena millia plus, et secundum nostras rationes triplum, sc. sexcenties centena millia.

Incredibilis vero haec est amplitudo sphaerae fixarum, quam tu facis bis milies majorem sphaera Saturni, cum apud veteres illa proxime superet Saturno. Immo vero multo incredibilior est apud veteres pernicietas fixarum et Saturni; quorum alterutrum cum necesse sit statuere, probabilius est, bis milies vel milies esse ampliorem sphaeram fixarum atque veteres dixerant, quam vices quater milies esse celeriore atque Copernicus statuit. Ibi enim in subjecto amplissimo et quod est infinito simile motus inest nullus, hic in orbe Saturni modico motus inesse statueretur infinito similis. Per se vero

tanta amplitudo nec observationibus Brahe repugnat, nec rationi dissentaneum, quiescentia a mobilibus immenso intervallo distare.

Quomodo scis, tantam amplitudinem non repugnare observationibus Brahe? Observavit ille altitudinem maximam stellae polaris, quae huc tempestate est in 7^o Arietis, anno 1586. in media nocte post aequinoctium autumnale, fuitque 58° 51'. Eandem observavit etiam circa solstitium hiemale 26. Decembris vesperi hora circiter sexta, invenitque rursum 58° 51'. Itaque differentia non fuit ulla; cum tamen mense Septembri horizon secaret sphaeram fixarum tota fere semidiametro orbis, in quo Tellus circumfertur, inferius, quam 26. Dec., quippe ibi Sol in Libra apparuit, hic in Capricorno. Idem factum etiam, cum minima altitudo observata fuit in media nocte post aequinoctium vernale et post hiemale solstitium mane hora sexta, utrinque enim inveniebantur 52° 59¹/₂', quanquam mense Martio horizon tota fere semidiametro orbis, in quo Tellus, altius secaret fixas, quam Decembri. Ergo diameter ista orbis, in quo Tellus circumfertur, per Instrumenta Braheana non est sensibilis.

Cum itaque non faciat illa unum minutum in sphaera fixarum, non est igitur ter millesima quingentesima pars semidiametri fixarum. Saturni igitur orbis semidiameter, quae est semidiametri orbis Telluris fere decupla, non nequat trecentessimam quinquagesimam, neque quadringentesimam partem semidiametri fixarum. An igitur faciat ejus partem bis millesimam, hoc est, an altitudines stellae polaris supradictae differant quinta parte unius minuti seu 12 secundis, multo minus discerni potest, cum diameter stellae polaris videatur unum ad multum minutum aequare, neque diligentiae artificum de quibus parte unius minuti credendum sit.

Saturnus abest a Terrae centro secundum Braheum 12300 semidiametris Terrae. Eius ergo circulus diurnus, cum est in aequatore, continet 7314 semidiametros Terrae, hoc est 66420000 miliaria germanica, quae divisa in horas 24 portionem unius horae efficiunt 2767500, de qua summa miliaria 240 (tot enim Saturnus, secundum Copernicum, conficit in una hora) sunt sesquidodecies millesima.

Sed secundum Ptolemaeum, per Copernici correctiones, proportio orbium talis esset: Luna a Terra 64. 10 semidiametris.

50 pro corpore Lunae et Mercurii.

65 inum orbis Mercurii | ut 28. 30 ad 91. 50.
209 summum.

1 pro corpore Mercurii et Veneris.

210 inum orbis Veneris | ut 19. 50 ad 140. 20.
1407 summum.

7 pro corpore Veneris et Solis.

1414 inum orbis Solis | ut 57. 30 ad 62. 30. | Etsi Copernicus habet
1537 summum. 1094

6 pro corpore Solis. 1190

2 pro corpore Martis.

1545 inum orbis Martis, | ut 14. 30 ad 105. 30.
11241 summum.

2 pro corpore Martis.

5 pro corpore Jovis.

11248 inum orbis Jovis | ut 45. 45 ad 74. 15.
18253 summum.

5 pro corpore Jovis.

5 pro corpore Saturni.

18263 inum orbis Saturni | ut 49. 48 ad 70. 12.
25737 summum.

5 pro corpore Saturni.

25742. ²²)

Hoc est amplius duplo ejus quod Braheus habet; et 240 millaria, motus Saturni horarius apud Copernicum, sunt portio minor vices quater millesima de Saturni borario apud Ptolemaeum.

Quam putas esse proportionem densitatis inter se corporum Solis, aurae aetherae, mundum universum permeantis, et sphaerae fixarum, omnia extrinsecus concludentia? Cum haec tria corpora sint analogae centro, superficiei sphaericae, et intervallo, tribus symbolis trium in S. S. Trinitate personarum: credibile est, tantundem esse materiae in uno, quantum in unoquolibet duorum reliquorum; sic ut tertia pars materiae totius universi compacta sit in corpus Solis, quamvis id sit respectu amplitudinis mundi angustissimum; tertia item pars materiae extenuata et explicata per immensum mundi spatium: ut ita Sol intra corpus suum tantundem possideat materiae, quantum ille extra se valentissima virtute luminis sui illustrandum radiisque suis permeandum est uactus; tertia denique pars materiae expansa in orbem et mundo exterius promoenibus circumjecta. Atque ut proportionem quamdamtenus adumbremus re simili nota, etsi eam nequaquam aequamus, fingamus, corpus Solis esse totum aureum, orbem fixarum aereum, vitreum vel crystallinum, spatium interius aëre plenum. Unde quamtenus intelligi datur, quid divinus Moses per firmamentum (raquia, quod proprie sonat expansionem, puta insufflationem aurae aetherae), quid item per aquas supercoelestes significaverit. Sic enim et pueri ludunt quandam creationis ideam, excitantes bullas ex aqua et smegmate, insufflantes aërem: differentia haec est, quod Deus guttam, ut sic dicam, aquae rethluit intus in centro, pueris aquae gutta ob pondus non manet in centro, nec dividitur a superficie per insufflationem, sed haeret in fundo bullae.

Quantam status crassitiem seu distantiam superficiei intimae fixarum ab extrema? Cum tantum ei dederimus materiae, quantum est in toto spatio mundi, quod illa complectitur, excepta ea materia, quae est in angustissimo Solis globo, et vero nequaquam ejusdem densitatis sit statuenda materia orbis fixarum eum materia spatii mobilium, sed densitatis proportionem mediae inter densitatem aurae aetherae et densitatem materiae in corpore Solis: itaque et spatium illi debetur proportione medium inter spatium corporis Solis et spatium aurae aetherae. Erat autem supra diametrorum Solis et aurae aetherae proportio illa, quae 1 ad 4000000, spatiorum igitur ipsorum tripla, hoc est 1 ad 64000000000000000000. Inter hos vero numeros medium proportionale est 8000000000, tot igitur spatia corporis Solis aequavit spatium inter superficiem concavam et convexam orbis fixarum. Itaque totus mundus tribus coagmentatus membris repraesentatur hoc numero, 64000000008000000001, ejus radix cubica 4000000 et una sexies millesima ostendit, quod orbis, crassitie unius sexies millesimae particulae de semidiametro corporis Solaris, circumjectus aurae aetherae, complectatur in suo corpore spatia 8000000000 capacia corporis Solaris. Haec igitur est illa mundi cutis seu tunica, seu crystallinus orbis supercoelestis, tantae subtilitatis propter amplitudinem expansionis: quae si in unam massam coangularetur sphaericam, haberet semidiametrum 2000 vicibus majorem semidiametro corporis Solaris, eum jam non sit crassa magis, quam unius semidiametri corporis Solaris sexies millesimam vel duo millaria Germaniae, plus.

Quanta erit apparentia Solis, si oculumingas in una fixarum collocatum esse? Quadrages ecuties millesima semidiametri fixarum subtendit circiter vicesimam unius secundi: Solis igitur corpus apparet diametro 6 scrup-

pulorum tertiorum seu sexcentiesimae de uno scrupulo primo, emetiens circulum magnum 1296 myriadibus vicium; seu apparentia Solis diametri inter fixas est particula octodecies millesima suae apparentiae in Terris.

Quanta vicissim apparent fixae ex Tellure? Periti artifices negant, ullam quantitatem veluti rotundi corporis detegi per inspectionem telescopii; quin potius, quo perfectius instrumentum, hoc magis fixas repraesentari ut puncta mera, ex quibus radii lucidi in speciem erinulm exeant disperganturque.

Videtur igitur unaquaelibet fixarum tale corpus esse, quale Sol est, et Sol vicissim inter fixas videtur tantus et talis appariturus, quanta et qualis unaquaelibet fixarum. Non existimo: nihil enim impediunt haec observata, Solem esse majore mole corporis, quam sunt fixae. Praeterea et clarior esset conspectus Solis ex tanto intervallo fixis quibuscunque. Nam si vel acu solum perfores parietem, ut per foramen Sol irradiare possit, claritas ex ea radiatione major diffunditur, quam omnes omnino fixae sub dio collucentes faciunt. Nee ineditur oculus ab ulla fixarum, at Solis aspectum non toierat, ne eminus quidem appropinquantem.

LIBRI QUARTI

PARS SECUNDA.

DE MOTU CORPORUM MUNDANORUM.

I. Quot et quales sint motus.

*Quid sentit Copernicus de motu corporum, quid illi movetur, quid quiescit? Motus localis duae sunt species: vel enim convertitur totum loco suo manens, partibus vero invicem succedentibus, qui motus *directus* seu rotationis turbinatioisve a similitudine, aut versionis ab instrumento vertice diei potest; aut ipsum etiam totum de loco in locum fertur circulariter, quem motum Graeci *γογάρ*, Latini fere circuitum aut circumlationem aut ambitum, utrumque vero communiter revolutionem appellant.*

Solem igitur Copernicus ponit apud centrum mundi consistere, ratione totius, centro sc. et axe, immobilem; quem tamen ratione partium corporis circa suum se. centrum et axem converti a paucis annis deprehendimus sensu, quod dudum asserueram rationibus; celeritate quidem tanta, ut spatio 25 vel 26 dierum una conversio absolvatur.⁵⁴⁾

Jam ut quisque primariorum est Soli propior, ita breviori periodo circum Solem fertur, sub eodem quidem communi circulo zodiaco et in plagam omnes eandem, in quam partes corporis Solis praecedunt; Mercurius spatio 3 mensium, Venus $8\frac{1}{2}$. Tellus cum coelo Lunae 12, Mars $22\frac{1}{2}$, seu minus quam duobus annis, Jupiter 12, Saturnus 30 annis. Fixarum vero sphaera Copernico penitus est immobilis. Tellus interim circa suum etiam axem et circa Terram Lunam circumvolvitur, rursus in plagam utraque, si ad exteriora mundi respicias, eandem, in quam omnes primarii.

Omnes autem motus Copernico sunt tantum in directum et continuum, nulla penes illum statio in rei veritate, nulla retrogradatio.

Quibus argumentis probatur, fixarum sphaeram non moveri? Quod illa non convertatur circa centrum et axem, demonstratum est libro I. Nam quicquid hujus in oculos incurrit, totum id Terrae tribuimus. Argumenta cetera requirantur ibi, fol. 168 et seqq. Duo sola hujus loci propria repetamus. Unum a celeritate. Nam si sphaera extrema saltem 4000000 diametros Solis in dimetiente habet, circumferentia longa erit 12566370: quae si tota intra 24 horas volvitur, in una igitur volventur 523600, in uno minuto 8727, in

uno secundo, quod fere aequat pulsum bominae, transibunt 145 diametri Solis, quaelibet non minor 13 millibus milliariorum Germanicorum: itaque spatio temporis, quo semel dilatatur iterumque contrahitur arteria pulsu gemuato, circiter septuagies quinquies centena millia milliarium circuli maximi volverentur, et Saturnus, bis millies angustiori orbita, adhuc fere per 4000 milliariorum trajiceret.

Alterum argumentum destruit omnem omnino motum sphaerae fixarum: quippe non apparet, cui bono, cum extra nihil sit, unde aut quorsum illa translata situm et apparentias variet obtineatque per quietem, quicquid nancisci posset motu quocunque. Nam ex hujus quiete intelliguntur motus omnium corporum, et uisi illa locum praeberet, quod rectissime praestat quiescendo, moveri nihil posset.

Quomodo se habet proportio periodicorum temporum, quae assignasti mobilibus, ad proportionem jam praemissam orbium, in quibus illa vehuntur? Non est aequalis proportio temporum proportioni orbium, sed major ea, et quidem in primariis planetis praecise sesquialtera illius. Hoc est, si de annis Saturni 30, Jovis 12, sumseris radices cubicas easque multiplicaveris quadrate, in quadratis bis numeris fuerit genuina proportio orbium Saturni et Jovis. Sic etiam est, si non proximos inter se orbes comparaveris. Verbi causa Saturnus habet annos 30, Terra annum unum. Radix cubica de 30 est 3 cum 11 centesimis circiter, at radix cubica de 1 est 1; radicem harum quadrata sunt 9 cum 672 millesimis et 1. Ergo Saturni orbis est ad orbem Terrae ut 9672 ad 1000, et accuratior prodit numerus, si tempora assumseris accuratiora.

Quid hinc colligitur? Non feruntur planetae omnes eadem celeritate, ut voluit Aristoteles, alias tempora essent ut orbes eorumque diametri, sed ut quisque superior est et a Sole remotior, ita minus spatium in una hora conficit motu medio, Saturnus quidem (secundum magnitudinem sphaerae Solis a veteribus creditam) 240 milliariorum Germanica, Jupiter 320, Mars 600, Terrae centrum 740, Venus 800, Mercurius 1200. Etsi secundum intervallum Solis, a me in superioribus demonstratum, numerus milliariorum ubique triplicandus erit.

II. De causis motus planetarum.

Dic sententiam veterum astronomorum, quomodo existiment planetas moveri. Vetustissimi Eudoxus et Calippus eosque secutus Ptolemaeus non ultra circulos sunt progressi, quibus illi demonstrare phaenomena sunt soliti, securi quomodo astra circulos hos absolverent. Sic eum scribit Ptolemaeus libro XIII. magni operis, cap. II:

Nemo vero difficile censet has quas supponimus circularum implicationes, propterea quod videt penes nos homines perplexam admodum esse illarum imitationem manuariam. Non enim aequum est, humana nostra Diis immortalibus equiparare rerumque sublimium fidem ab exemplis petere rerum dissimilimarum.

Nam quid cui magis dissimile, quam ea, quae semper eodem modo habent, iis, quae nunquam sibi constant, et ea, quae undique ab omnibus, iis, quae ne a se ipsis quidem impediri possunt? Quin potius id operae dandum, ut, si fieri possit, simplicissimae suppositiones aptentur motionibus coelestibus, si minus vero successerit, at quales possint. Per harum enim consequentiam hypothesis si solummodo praestentur omnia, quae apparent in coelo, de aeterno mirari nequaquam convenit, implicationes hujusmodi posse motionibus illis corporum coelestium accidere: quippe penes quae natura nulla est, quae motum impediat, sed quae apta uata est ad

cedendum et ad locum praebendum naturalibus ejusque globi motionibus, etiam contrarias illas sibi mutuo contingat esse: adeo ut omnia simpliciter ab omnibus penetrari non difficilius quam perspicui possint. Neque tantum circa singulos circulos ista facilitate ntendum, sed et circa integras sphaeras et circa axes curvarum et conclusionarum superficierum. Etsi enim etiam horum, propter diferentes motus, variae implicationes et aliorum in aliis insertiones, in exemplis theoriarum, quae humana manu solent apparari, perdifficiles sunt, nec facile succedunt ita, ut motus ipsi nihil impediantur: in coelo tamen videmus nequaquam ob stare tam multiplicem motuum concursum, quo minus eveniant singuli. Quin imo ne hoc ipsum quidem, quid in coelestibus simplex sit, judicari oportet exemplis earum rerum, quae penes nos simplices esse videntur: utique cum neque hic in Terris omnibus idem ex aequo simplex esse videatur. Facile namque fiet, ut qui sic aestimare voluerit coelestia, is nihil eorum, quae sunt in coelo, simplex agnoscat, ut ipsam quidem primi motus invariabilem constantiam: nimirum quia hoc ipsum (ut sit sc. aliquid, quod eodem se modo perpetuo habeat) inter homines inventu non tantum difficile est, sed penitus impossibile. Non igitur ex rebus nostratibus, sed ex ipsis naturis eorum, quae in coelo sunt, et ex motuum ipsorum immutabili tenore iudicium est informandum. Ita fiet, ut hoc pacto motus omnes videantur simplices multoque simpliciores, quam ea, quae penes nos talia videntur esse: quippe nullum laborem, nullam difficultatem in circuitionibus eorum suspicari possumus. Hactenus Ptolemaeus.

Quid desideras in hac Ptolemaei sententia? Etsi verum est, non esse censendam facilitatem motuum coelestium ex difficultate motuum elementarium, propter causas bene multas, nondum tamen sequitur, motuum coelestium nulla in Terris exempla propinqua esse; et videtur Ptolemaeus ulmis longe extendere hanc excusationem, adeo ut universam rationem astronomicam confodiat, itaque neque astronomis satisfaciatur, neque philosophis, neque in Christiana etiam disciplina tolerari possit.

Nam quod astronomiam attinet, omnes omnino hypotheses in suspicionem falsitatis adducit, dum tantopere urget discrimen coelestium et terrestrium rerum, adeo ut etiam ratio ipsa errare ponatur in dijudicatione ejus, quod geometrice simplex est. Nam si, quod rationi nostrae de coelo videtur compositum, componentem circulos, id in ipso coelo simplex est; in coelo igitur non sunt compositi invicem circuli ad unum motum effiglandum: falsum igitur supponit astronomus, et quod summopere mirum, ex mere falsis verum elicit. Id vero est honorem astronomiae destruere, quem Aristoteles in libris *Metaphysicorum* asseruit, *audiendos existimans astronomos super forma et dispositione motibusque corporum coelestium*. Quin imo Ptolemaeus se ipsum prodit, quid optet: jubet enim confingere hypotheses quam simplicissimas, si fieri potest. Itaque si quis simpliciores ipso confinxerit, geometrice intelligendo, suae ille compositae hanc excusatione contra non munit, sed proferre illas iubebit, quae nobis hominibus de Terra, videbuntur simpliciores, etiam exemplis utamur terrestribus.

Quantum ad philosophiam, negabunt philosophi hoc sufficere, ut materia corporis coelestis sit liquida et permeabilis a globis eoque non resistat motionibus globorum per illam; quaerent enim, quid sit illud, quod globum ipsum circumagat, praesertim si constet, materiam globorum reniti motoribus; quaerent, qua vi motor corpus de loco in locum moveat, nullo substante campo immobili, cum neque adsint rotundo corpori adminicula pedum aut alarum, quorum motione animalia corpus hoc suum per auram aetheream, sicut aves per aërem nisi quodam et renis illius aurae, transportent; quaerent, quo mentis lumine, quibus mediis centra cirenlorum orbitasque circum-

jectas motor vel perspiciat vel efformet? Denique non fert theologia, non rerum natura, ut Ptolemaeus, gentili superstitione imbutus, astra Deos visibiles faciat (ex aeterna sc. ipsorum motione vitam immortalē coniciens) illisque plus tribuat, quam Deus ipse conditor habet, ut scilicet rationes geometricae simplices sint illis, quae sunt re vera compositae, quarumque intellectum Deus homini, imagini suae, communem secum esse voluit.

Die etiam sententiam Aristotelis, quomodo ipse putet planetas circumire? Aristoteles, solidis orbibus coelum refertum credens (licet aequivocae materiae) et philosophi posteriores, quos secuti esse videntur Arabes et post eos Purbachius, Theoriarum scriptor, bi, inquam, primum crediderunt astronomiae de numero circulorum, ad demonstrandas apparentias necessario; sic Aristoteles Eudoxo et Calippo credidit de orbibus 25. His totidem attribuit intelligentias motrices, quae periodi tempus et plagam mundi, in quam esset tendendum, mente circumgestarent. Cum autem esset verisimile, omnes ad idem principium respicere, Aristoteles bis 25 orbibus alios 24 censuit interponendos, quos ἀνελισσόμενος, revolvētes, appellavit: ut scilicet inferior quisque orbis eo raptu, quem propter contiguitatem superficieum erat a superiore passurus, per interpositum revolvētem liberaretur, aequali tempore nūntem in contrarium superioris eoque rēnu speciem quiescentis praebentem, in quo velut in loco immobili inferior innixus suam peculiarem periodum absolveret. Ita cuiusque orbis motor orbi suo et omnibus inferioribus, quos esset ille complexus, motum aequabilissimum in orbe superiore, qui se proxime contingeret, praestare statuebatur. Ac cum placuisset illi philosopho, motum ab aeterno esse, motores quoque statuit aeternos et immateriatos, quod infinitatis non essent capacia materia: sequebatur igitur, motores esse principia separata et immobilia. Cum autem haec essentiae coelestis duratio aeterna videretur illi totius mundi bonitas et perfectio, quippe opposita interitui, qui malum quid erat: principiis quoque illis perfectionem summam tribuit ejusque intellectiōnem, et ex intellectu boni voluntatem id prosequendi, ne, quod bonum est, non bene faceret: quo pacto mentes separatas et denique Deos, acque atque Ptolemaeus, nobis introduxit, motus coelorum perennis administratos. Quia et Scaliger professione Christianus alique sectatores Aristotelis disputant, hunc motum orbium esse voluntarium, et principium voluntatis illis motoribus esse intellectiōnem et desiderium. Et sane si mundas aeternus esset, quod contenderat Aristoteles, ad minimum plaga certa, in quam voluitur planeta, testaretur de intellectiōne. Negare enim Christiani non possumus, summam sapientiam praecedisse institutioni motum, qua in plagam quilibet suam inclatus et quasi e carceribus in sua spatia dimissus fuit: id vero munus Aristoteles motoribus ipsis, quippe aeternis, transcripsit. Additae etiam fuerunt animae motrices, orbibus ipsis arcibus alligatae eosque informantes, ut intelligentia tantummodo assisteret, vel quod necesse videretur, motorem primum et mobile in aliquo tertio convenire, vel quod potentia motus ratione spatii trajiciendi finita esset, nec infinitae celeritatis esset motus, sed tempore descriptus, ad spatium admenso: quod argumento erat, certam et dimensionem esse proportionem potentiae motricis ad corpus mobile adque spatia. Per hanc itaque soliditatem orbium et per constantem fortitudinem potentiae motricis omnibus omnino motibus seu apparentiis coelestibus ita prospectum erat, ut dato motus principio jam porro omnis varietas motuum ex dispositione et pluralitate orbium proficisceretur, sine labore aut sollicitudine intelligentiae; movebanturque orbes super polis quiescentibus eo fere modo, quo libro I.

corpus Telluris dictum est rotari super axe et polis suis; eoque motu quilibet orbis (quos quidam plane adamantinos faciunt, sic ut corpori alicui nequaquam cedant) suum sibi planetam certo loco alligatum circumvehbat, alteri alteros sustinentes, ut supra dictum, nec erat metus, ut vel globi vel orbes caderent, sic invicem religati.

Quid tu de hac philosophia sentis? Rursum illi obicio non tam auctoritatem Christianae disciplinae, quam ipsam absurditatem dogmatis, Deos fluentis, quorum munia sint ex naturae operibus, easque interim adscribentis ab aeterno talia, quae necesse est ab uno primo principio rerum omnium in temporis exordio esse profecta. Qua theologia cum non potuerit haec ratiocinatio carere, Diis igitur negatis tota concidit. Deinde neque solidi orbes concedi poterunt, ut supra probatum. Rursum autem philosophia haec innititur solidis orbibus, iisque subrutis concidit. Facile enim hoc concesserit Aristoteles, corpus aliquod ab anima sua transportari non posse de loco in locum, si destituta fuerit orbis instrumento, qui per totum circuitum absolvendum sit exportectus, si item absit corpus immobile, cui orbis inultatur. Tum autem, si concesserimus orbes solidos, intervalla tamen intersunt immania inter orbes. Illa aut plena orant orbe inutuli nihilque ad motus circumstantiam pertinente, quod est absurdissimum, aut si per ista intervalla non sunt orbes solidi, non igitur se mutuo contingunt aut gestant spbaerae. Denique se ipsum destituit haec ratio, prospiciens orbibus, quomodo quilibet in altero niteretur, oblita vero infimi. Nam ut concedamus, orbes ab orbibus sustineri contiguosque esse invicem, quid igitur sustinet ultimum Lunae orbem, aut quibus ille columnis innixus est Telluri, ut putant, quiescenti, cum in tota superficie Telluris circumcirca nulla occurrat soliditas? venti, nubes, aves liberrime et facillime commovent quaque versum? Cur non pondus ingens coelorum interdum pecus nos subsidit, praesertim spissioribus orbium partibus nostro vertici appropinquantibus? Aut si pondus in coelo nullum, quid igitur est vobis opus orbibus ad vehendos globos planetarum?

Si orbes solidi nulli sunt, tanto magis intelligentiis opus esse videbitur ad motus coelorum administrandos, licet illae Dii non sint; esto enim, ut sint angeli aut alia aliqua creatura rationalis. Nec opus est his, ut probabitur, nec fieri potest, ut globus planetarius circumagatur per solam intelligentiam. Nam primo mens, destituta potentia animali, sufficienti ad motum inferendum, nec possidet ullam vim motricem in solo vultu, nec audiri et percipi a bruto globo potest, nec, si perciperetur, globus materiatus facultatem haberet obsequendi neque ipsum movendi. Jam antea vero dictum, nullam sufficere vim animalem transfereendi suum corpus de loco in locum, nisi adsint instrumenta et quiescens aliquod corpus, super quo fiat motus; res igitur ad superiora recidit. E contrario vero potentiae naturales, insitae corporibus ipsis planetarum, praestare hoc possunt, ut planeta de loco in locum transferatur.

Posito vero, sufficere ad motum, ut intelligentia velit movere in hanc vel illam plagam, jam absurda fiet inventio figurae, in qua linea motus ordinata est. Convincimur enim observatis astronomicis legitime tractatis, viam planetarum esse quam proximè circulem et quidem eccentricam, hoc est, cujus centrum non sit in centro mundi vel corporis alicujus, et quod insuper successu seculorum de loco in locum transeat. Totidem autem argumenta depromi possunt contra inventionem talis orbitae, quot sunt ejus jam descriptae partes.

Nam primo, planetae orbita non est perfectus circulus, et si mens hanc

efficeret, ordinaret utique eam in perfectum circulum, cujus est mentalis pulchritudo et perfectio. Ex adverso figura elliptica itineris planetarii legesque motuum, quibus talis efficitur figura, sapiunt potius naturam staterae seu necessitatem materiale, quam conceptum et destinationem mentis, ut infra patebit. Deinde ut demus, aliam quam circuli ideam in mente motrice relinquere, quae-ritur, quibus modis mens vel haec vel illam possit applicare regionibus mundi. Circulus quidem certo aliquo centro, ellipsis vero, qua figura sunt planetarum orbitae, duobus centris describitur.

Quam igitur sedem dabis menti, ut circulum vel ellipticam orbitam in humentibus aetheris campis metetur? Num in illo centro illam locabis? In aura igitur aetherea locas illam, quae nihil differt a toto reliquo mundi spatio, quia orbita planetae est a Solis corpore eccentrica. At hoc valde absurdum, cum alias principium individuationis animarum transcribatur materiae et corpori, cui anima est addita, quae loco et tempore multisque aliis notis differt a materia mundi reliqua. Certe animae et menti situs alius non competit, quam per corpus suum, quod illa informat. Et qua vi movebitur mens de loco in locum in circello parvo circa centrum mundi, ut sit cum centris orbitarum planetarum successu seculorum, si mens corpore caret, si ut situa-bilis, sic mobilis se ipsa non est? Quo medio mens tuebitur situm suum, suam a centro mundi distantiam? Est vero illi prospectum de sede in centro, quomodo jam illa efficiet, ut planeta longissime absens orbitam suam ordinet circa hoc centrum? si funiculo illum haberet alligatum, circumvolitaret ille forsitan, ex centro nexus, sentire forte posset mens ex centro prospectans, praesertim si corporeis oculis esset instructa, an planeta iret in circulo, si viximur is aequali semper angulo spectaretur: at exorbitantem qua via reduceret, si orbitam ipsam per se non videret? quomodo vero mens intelliget orbitam, quae corpore aliquo peculiariter non est insignita? Nam de idea circuli in-tellectuali hic uou est sermo, in qua non est magni et parvi distinctio, sed de reali itinere planetae, quod praeter ideam habet etiam certam quantitatem. Quodsi mentem motricem collocaveris extra centrum orbitae, deterior erit ejus conditio. Aut enim erit in corpore, quod obtinet mundi centrum, et sic omnes mentes erunt in eodem corpore durabuntque difficultates superiores de reti-nendo planeta in sua orbita, deque ejus orbitae inventionem. Aut erit mens in ipso planetae globo: tunc in utroque casu quaeritur, quo medio mens sciat, ubi sit centrum, circa quod ordinanda est orbita planetae, et quantum ipsa cum globo suo ab illo puncto distet. Recte enim Avicenna censuit, opus esse motori planetae, si mens est, cognitione centri et suae ab illo distantiae. Circulus enim isdem et definitur et perficitur, centro et aequali curvatura circa illud, aequali scilicet distantia circumferentiae ab illo: itaque quantumcumque motricem mentem extolias, circulus tamen ut Deo quidem aliud quid est, quam quod jam est dictum; quod idem et de elliptica figura suo modulo fuerit intelligendum.

Quare dicis, corpus aliquod coeleste, sua constans materia, solo nutu circummagi non posse? Atqui coelestia nec gravia sunt nec levia, sed aptis-sima ad motum circularem, non resistunt igitur menti motrici. Et si globus aliquis coelestis non est sic gravis, ut aliquod in Terra saxum grave dicitur, nec sic levis, ut penes nos ignis: habet tamen ratione suae materiae natura-lem admotum, transeundi de loco in locum, habet naturalem inertiam seu quietem, qua quiescit in omni loco, ubi solitarius collocatur. Inde vero ex situ et quiete sua ut emoveatur, opus est illi potentia aliqua, quae sit am-pullus quippiam, quam sua materia et corpus nudum, quaeque inertiam hanc

eius naturalem vincat. Nam talis facultas jam est supra naturae ingenium, formae soboles aut vitae index.

Unde probas, materiam coelestium corporum reniti suis motoribus et ab eis vinci, velut in libra pondera a facultate sua motrice? Probatur hoc primo ex periodicis temporibus convolutionis globorum singulorum circa suos axes, ut Telluris tempore diurno, Solis tempore 25 dierum circiter. Nam si nulla esset inertia in materia globi coelestis, quae sit ei velut quoddam pondus, nulla etiam opus esset virtute ad globum movendum: et posita vel minima virtute ad movendum, jam causa nulla esset, quin globus in momento verteretur. Jam vero cum globorum conversiones fiant in certo tempore, quod in alio planeta est longius, in alio brevius, hinc apparet, inertiam materiae non esse ad virtutem motricem, ut nihil ad aliquid. Non est igitur nulla inertia et sic renitentia materiae coelestis.

Idem secundo probatur ex circumstatione globorum circa Solem, junctim consideratorum. Nam unicus motor unica sul rotatione movet sex globos, ut infra audiemus. Quodsi globi non haberent naturalem renitentiam certae proportionis, causa nulla esset, quid motoris sui turbinationem exactissime sequerentur et sic cum ipso uno et eodem tempore converterentur. Jam vero omnes quidem in eam plagam eunt, in quam motor turbatur, nullus tamen celeritatem motoris sul plene attingit, et alius alio segnior sequitur. Miscent ergo celeritati motoris suam materiae inertiam in certa proportionem.

Videtur proportio periodicorum temporum esse mentis opus, non necessitatis materialis. Ipsa quidem motuum extremorum tardissimi et velocissimi in unoquoque planeta temperatio exquisitissime harmonica est summae et adorandae creatricis mentis seu sapientiae opus: at longitudines temporum periodicorum, si essent mentis opus, haberent aliquid pulchritudinis, ejusmodi sunt proportionem effabiles: dupla, tripla et similes. Jam vero periodicorum temporum proportionem sunt ineffabiles (irrationales vulgo) et sic infelicitatis participes, in qua nulla pulchritudo mentalis, quia nulla finitio. Secundo mentis opus esse non possunt (non loquor de creatore, sed de natura motoris) haec tempora, quia colliguntur tempora unius periodi ex inaequalibus moris in diversis circuli partibus. Illae vero inaequales morae, ut infra dicetur, oriuntur ex materiali necessitate et veluti ex ratione staterae.

Tu ergo qua vi suspendis globos, ut vis, materiales, Terram praesertim, sic ut quilibet intra metas maneat suae regionis, destitutus licet illis solidis orbium vinculis? Cum certum sit, solidos orbes nullos esse, necesse est, ut confugiamus ad hanc inertiam materiae, qua fit, ut globus aliquis, quoeunque mundi loco collocatus extra virtutes motrices, illo loco quiescat naturaliter, ob id ipsum, quia materia, ut talis, facultatem nullam habet transferendi corpus suum de loco in locum.

Quid igitur est, quod planetas facit circa Solem ire, quemlibet intra metas suae regionis, si nec solidi sunt orbes, nec ipsi globi possunt aliud quam haerere fixi, nec sine solidis orbibus de loco in locum moveri possunt ab ulla anima? Etsi res a vobis remotissimae et quae sine genuino exemplo sunt, difficiles habent explicatus et censuram efficiunt lubricam admodum, ut vere monuit Ptolemaeus, si tamen verisimilitudinem sequamur, attenti ne quid vobis ipsis contrarium statuamus: haud obscurum esse poterit, neque mentem aliquam introducendam esse, quae dictamine rationis et veluti nutu globos circumagat, neque animam huic quidem circumstationi praeficiendam, quae sic, ut fit in convolutione circa axem, virium aequabili contentione faciat impres-

sionem in globos, sed solum et unicum esse corpus Solare, situm in medio totius universi, cui motus iste primariorum planetarum circa corpus Solis possit adscribi.

III. De revolutione corporis Solaris circa suum axem ejusque effectu in motu planetarum.

Quibus causis adducere, ut Solem facias causam moventem, seu fontem motus planetarum? 1. Quia apparet, quanto quilibet planeta longius ceteris a Sole distat, tanto illum incedere segnins, ita ut proportio periodicorum motuum sit sesquipla proportionis distantiarum a Sole. Ex hoc igitur ratiocinamur, Solem esse fontem motus. 2. Idem usu venire singulis planetis, audimus infra, ut quanto magis appropinquat unus aliquis planeta Soli quovis tempore, tanto provehatur se ipso celerior in proportionem exquisita dupla. 3. Nec abluat dignitas aut aptitudo corporis Solaris, quod pulcherrimum est et rotunditatis absolutissimae, maximum etiam, et fons lucis atque caloris, unde omnis vita in vegetabilibus scaturit: adeo ut calor et lux quaedam quasi instrumenta censi possint, idonea Soli ad motum planetis inferendum. 4. Imprimis vero numeros omnes probabilitatis implet Solis in suo spatio rotatio circa axem immobilem in plagam eandem, in quam omnes planetae sequuntur, et periodo quidem breviori quam proximus illi et citissimus omnium Mercurius.

Quod enim hodie telescopia detegitur et quotidie videre est, Solis corporis maculis scaterere, quae intra dies 12, 13 vel 14 dieum Solis seu hemisphaerium ejus inferius transeunt, initio et fine tarde, in medio celeriter (quod argumento est, illas haerere in superficie Solis et eum illa converti), id plane necessarium esse, ut fiat, rationibus ex hoc ipso planetarum motu deductis longe prius, quam de maculis Solis constaret, comprobatum est a me in Com. Martis cap. XXXIV.

De Solis itaque corpore quid tenendum putas, qua id ei convertitur circa suum axem? Dictum est libro primo, et hoc corpus et si quod aliud circa suum axem volvitur, non tantum in ipso rerum exordio ab omnipotentia creatrice fuisse in gyrum actum, sed etiam videri continuare hunc motum praesidio animae motricis. Nam et si alia etiam ratione ibi explicata motus iste continuari possit, tamen animae praesidio diuturnitas et perennitas motus hujus, in quo totius mundi vita consistit, rectius obinetur.

Habes etiam alia argumenta praeter motum, quibus verisimile fiat, in corpore Solis animam inesse? 1. Magnum a materia corporis Solaris ejusque illuminatione ducitur argumentum, quae videtur esse qualitas in corpore Solis, orta ab informatione animae valentissimae, utpote ejus materiam, ut supra dictum, consentaneum est esse densissimam totius mundi corporum: maximas igitur vires credi par est illi animae adesse, quae tam pertinacem domat inflammationem materiam. Vide Opt. cap. VI. (Vol. II. p. 269)

2. Animam autem potius statuendam esse puto, quam formam inanimam, quia ex macularum in Sole ortu et discussione exque illuminatione inaequali partium ejus diversarum diversis temporibus apparet, non unam continuam et perpetuo uniformem esse energiam in omnibus corporis Solaris partibus, sed admittere motum et variationem et vicissitudines, fierique talia in globo Solis, qualia in globo Telluris, mutatis mutandis; ut ex intimis ejus visceribus hinc inde nubium simulacra (quae sunt forsitan atrae fulgines) exspirent, consumtaque earum materia, lux partium, quae prius illis maculis erant tectae, fiat

nitidior: quae vicissitudines cum sint perennes, sapiunt animae potius praesidium, quam formae simplicis.

3. Ipsa etiam per se lux cognatum quid est animae, non minus quam supra lib. I. de calore hoc idem fuit comprobatum. Nihil enim penes nos inflammatur, id est luminosum efficitur, quod non ab anima aliqua in corpore fuerit prognatum: ut ligna ab anima stirpis, spiritus vini ab anima vegetante vitis, scintillae ex ferro et lapidibus, quae res sunt excoctae in visceribus Terrae ab anima Terrae. Lucem vero cognatum quid esse flammis nostratibus patet inde, quia lux condensata speculis cavis aut vitris convexis incendit ut flammae et carbones. Itaque corpus Solis, in quo lux insidet originaliter, consentaneum est anima praeditum esse, quae inflammationis illius auctor, custos et continuatrix sit.

4. Nec aliud suadere videtur Solis officium in mundo, ut sicut omnia illuminaturus, lucem est sortitus in suo corpore, sic omnia calefactorus, calorem, omnia vivificaturus, vitam etiam ipse corporalem, omnia moturus, principium et ipse motus et sic animam in se habeat.

Num etiam mentem aut intelligentiam addes Solis animae, quae morderetur hunc ejus motum circa axem? Ad motus quidem munia nihil penitus opus est mente. Nam plaga, in quam volvitur Sol, est a primo rerum exortu; constantia vero revolutionis et periodici temporis, ut supra explicatum, dependet a proportionem constanti potentiae motricis ad contumaciam materiae. Directio vero axis corporis Solaris in plagam perpetuo eandem quies potius est, quam mentis opus, quippe a primo rerum ortu nulla in axem facta est impressio motus hujus. Directionem vero axis medius etiam circulus inter axis extrema, polos, necessario sequitur et axe manente manet, iisdem perpetuo fixis subordinatus. Ipsa denique prensatio corporum planetariorum, quos Sol rotatus circumagat, corporalis est virtus, non animalis, non mentalis.

Et haec quidem ob motum dicta sunt. Ceterum, quas conjecturas de intelligentia suppeditet consideratio harmoniarum coelestium, de eo vide lib. V. Harmon. caput ultimum.

Ergone Sol gyratione sui corporis circumfert planetas? et quomodo hoc potest, cum careat Sol manibus, quibus prensat planetam tanto intervallo absentem secumque convolutus circumagat? Pro manibus est ipsi virtus sui corporis, lineis rectis in omnem mundi amplitudinem emissis, quae eo ipso, quod est species corporis, una omni corpore Solis rotatur instar rapidissimi vorticis, totam illam circuitus amplitudinem, ad quantamcumque pertingit, aequè celeriter pervagans, atque Soli in angustissimo suo spatio circa centrum se convertit.

Posses rem aliquo exemplo declarare? Nimirum hic subsidio venit nobis illa sympathia magnetis et lingulae ferreae, magnete imbutae, cujus illa vim attritu combibit. Convertite magnetem in vicinia lingulae, convertetur simul lingula. Etsi prensatio formae diversae est, vides tamen, uti neque hic intercedat ullius contactus corporum.


Certum quidem est exemplum, at obscurum: explica quid sit virtus ista et quo ex rerum genere. Sicut duo sunt corpora, movens et motum, sic sunt etiam duae potentiae, quibus motus administratur: altera est passiva et magis ad materiam vergens, similitudo scilicet corporis planetae cum corpore Solis, in forma corporea, et pars quidem corporis planetarii, amica Soli, pars opposita, inimica; altera potentia est activa et magis formam sapiens, scilicet quod corpus Solis vim habet attrahendi planetam parte ejus amica, repellendi

parte inimica, retinendi denique, si fuerit sic situs, ut neque amicam partem Soli obvertat, neque inimicam.

Quomodo fieri potest, ut totum corpus planetae sit simile vel cognatum corpori Solis, pars tamen planetae amica Soli, pars inimica? Nimirum etiam cum magnes magnetem trahit, corpora sunt cognata, tractus tamen sit una sola parte, repulsus opposita. Haec igitur amicitia et inimicitia ab effectu concensus aut fugae denominatur, non a dissimilitudine corporum.

Unde vero est illa diversitas partium oppositarum corporis ejusdem? In magnetibus quidem diversitas est ex situ partium in toto. Nam si lapidem magneticum AB confregeris in CD, fragmenta, utcumque transpantur, non aliter se mutuo attrahunt, quam per easdem utriusque fragmenti partes A et CD, ut quae prius in lapide integro spectabant eandem mundi plagam: quodsi talis fiat applicatio fragmentorum, ut situs partium inter se pristinus sit, ut CAD, BCD: tunc fragmenta se mutuo repellunt.

Fig. 31.



In coelo res paulo aliter est comparata. Sol enim non ut magnes una plaga, sed omnibus sui corporis partibus facultatem hanc activam et energeticam possidet attrahendi vel repellendi vel retinendi planetam. Itaque credibile est, centrum corporis Solaris respondere uni extremitati vel plagae magnetis, superficiem vero totam alteri magnetis plagae. Et in corporibus igitur planetarum, quae pars vel extremitas in primo rerum exortu inque prima colloca-tione planetarum Solem spectabat, illa centro Solis cognata est, illa a Sole trahitur; quae vero a Sole versus fixas extensa erat, illa superficiei Solaris naturam est acta, illa si ad Solem convertatur, Sol planetam a se repellit.

Ut vim turbinationis Solis rectius intelligam, dic quid censeas futurum fuisse, si Sol non turbina-retur? Quemadmodum magnes magnetem amica parte in se conversum non cessat attrahere, donec illum ad contactum corporum adducat penitusque sibi uniat, parte vero inimica sibi obversum aut convertit et conversum similiter attrahit, aut si eum convertere non potest, repellit, nec ullum illi locum relinquit intra orbem virtutis suae, si quidem non impediatur: sic cogitandum est etiam de Sole, quod si hic non convolveretur circa axem suum, nullus etiam primariorum planetarum circa Solem esset circumiturus, sed pars eorum adnavigaret ad Solem perpetuo, donec uniretur ipsi ad contactum, pars, quae posticum Soli obvertit, expelleretur versus fixas, qui vero latus praebent Soli, illi haererent suo loco penitus immobiles, luctante virtute Solis tractoria cum repulsoria.

Quid igitur nunc sit, Sole circa suam axem rotato? Nimirum corpore Solis converso virtus etiam ista convertitur, quemadmodum magnete converso vis partis unius tractoria in plagas mundi alias atque alias transfertur. Cumque Sol illa virtute sui corporis arripuerit planetam, seu trahens illum, seu repellens, seu dubius inter utrumque, secum etiam circumducit illum et cum illo forte etiam omnem aetheream circumfusam. Trahendo quippe et repellendo retinet, retinendo circumducit.

Si hoc sic se haberet, planetae omnes eodem tempore cum Sole restituerentur. Equidem si hoc tantum esset. At dictum est hactenus, praeter hanc vim Solis vectoriam esse etiam naturalem inertiam in planetis ipsis ad motum,

qua fit, ut inclinati sint, materias ratione, ad manendum loco suo. Pugnant igitur inter se potentia Solis vectoria et impotentia planetæ seu inertia materialis; utraque suam partem habet victoriæ, illa planetam sede sua emovet, hæc suum, hoc est planetæ corpus nonnihil eripit e vinculis illis, quibus a Sole erat prehensum, ut ab alia atque alia circularis bujæ virtutis et veluti circumferentiæ Solaris parte apprehendatur, ab ea scilicet, quæ proxime succedit illi, ex qua planeta se modo extricaverat. In schemate species corporis Solaris rotati intelligatur sub circulo exteriori, punctis signato, et intelligatur talis circulus ductus esse per quemcunque situm planetæ in A, B, C, D, E, F, G vel H. Vertatur Sol et cum eo sua species a dextris ad sinistras: sit primo planeta A prehensus illa parte speciei Solis, quæ per radium A signatur, moveatur radius A sub certo temporis spatio usque in locum radii D planetamque trahat, sed reluctantem et se extricantem, sic ut in eodem temporis spatio is propellatur tantum ab A usque in B, itaque primus radius reliquit post se planetam spatio BD; at vicissim radius H jam successit apprehenditque planetam in B. Quantum enim A promotus est in D, tantum et H processit usque in B.

Fig. 62.



Atqui si omnia potentiis naturalibus efficiuntur, quæ laborant et pugnant cum inertia materiæ movendæ, quomodo tueri planetæ possunt sua tempora periodica, sic ut illa semper inter se quam exactissime sint æqualia? Facilius, quam praesidio mentis: nam cum proportio virtutis vectoriæ universæ ad materiam globi vebendi sit invariabilis, sequitur, ut et periodica tempora sint perpetuo æqualia.

Cur autem planetarum alius alio sese plus extricat ex hoc raptu, sic ut Saturnus in una hora solum per 240 milliaria provehatur, Mercurius per 1200 secundum Copernicum? 1. Quia virtus ista, ex corpore Solis effluens, eosdem imbecillitatis gradus habet in diversis intervallis, quos gradus habent ipsa intervalla, seu orbium per intervalla hæc descriptorum amplitudo; hæc est causa potissima. 2. Aliquid etiam causæ est in ipsa planetariorum globorum inertia vel renitentia majori vel minori, qua fit, ut proportio tantum ex dimidio respondeat: sed de hoc paulo post plura.

Planetæ corpus semper est idem, expellitur vero, uti vis, a Sole et allicitur ad illum, diversos igitur gradus virtutis vectoriæ pererrat; non manet igitur constans proportio virtutis ad corpus planetæ. Non sane, ei partes revolutionis unius consideremus, ideoque etiam planeta idem celerior fit in parte revolutionis una, ut supra in E, quam in altera A, ut infra dicetur. At hoc non obstante, collecta universa virtus vectoria per omnes illos gradus, in quos planeta venit intra revolutionem unam, semper et in omni reditu est ejusdem quantitatis.

Quomodo fieri hoc potest, ut virtus emanans ex corpore Solis sit imbecillior in majori intervallo apud A, quam prope Solem in E? Quid illam affligit aut imbecillum reddit? Quia virtus ista est corporea et quantitatis particeps: quare spargi et attenuari potest. Cum igitur tantundem sit virtutis in orbem Saturni amplissimum diffusum, quantum est in angustissimo

orbe Mercurii collectum: tenuissima est igitur per partes in Saturni orbe coque et imbecillima, densissima vero penes Mercurium coque fortissima.

Si de ipso corpore Solis ageretur, possem in illo concedere hanc potentiam naturalem movendi: sed tu edueis hanc potentiam materialem a corpore, et statuis eam sine subjecto in amplissimo aethere: hoc absurdum videtur. Absurdum non debere videri, patet exemplo magnetis, cui hoc idem posset objici. At neutrobique vis haec est sine subjecto analogo. Quemadmodum enim in ipso fonte subjectum est ipsi facultati naturali corpus Solis seu fibrae a centro porrectae in circumferentiam ejus: sic etiam in hoc ipso egressu puto distinguendum ratione inter speciem corporis Solaris immaterialem, effluentem usque ad planetas et ultra, et inter vim seu energiam ejus, quae communis prensat et movet planetam, ut illa sit hujus subjectum, licet non sit corpus, sed immateriata corporis species.

Posses hujus rei dare exemplum? Genuinum exemplum est in luce et calore Solis. Non est dubium, quin sicut Sol totus est luminosus, sic sit etiam totus ignitus et propter materiae densitatem omnino caudenti massae auri, aut si quid densius, comparandus. Jam ex luce illa Solis egreditur et ad nos delabitur species non corporea, non materiata, quam lumen vel radios Solis dicimus, quae tamen quantitates et accidentia recipit: rectis quippe lineis effluit, est condensabilis aut extenuabilis et omnino sectilis per specula et vitra, per repercussum sc. et refractionem, ut docemur in opticis. Atqui haec species lucis Solaris defert etiam calorem ipsum et pro ratione fortitudinis suae, majori vel minori, qua incidit in corpora illustrabilia, plus etiam vel minus calefacit illa. Quemadmodum igitur species ista seu lumen, quam speciem certo scimus ab illa Solis luce defluere, subjectum est caloriginae facultatis, itidem a Sole per speciem prorogatae: ita etiam species corporis Solis immateriata, delapsa ad planetas usque, comitem habet speciem illius virtutis energeticae in corpore Solis, quae nititur unire sibi similia, repellere dissimilia.

Evidentius est exemplum in eadem luce, cum per vitra vel per telas coloratas transiens, aut coloratis superficiebus communicata, coloratur et ipsa: ubi negari non potest, lucem (quamvis sit immateriata species ejus lucis, quae allapsa fuit in corpus coloratum) fieri subjectum coloris illius et quasi vehiculum etiam extrorsum.

Quid si haec ipsa lux, non vero alia species ipsius corporis Solis, esset etiam subjectum facultatis illius apprehensivae, qua Sol corpora planetarum prensat? Non simpliciter: nam videtur potius hoc sequendum, effluere speciem immaterialem corporis ipsius, cui speciei et vis prensandi et lux, luci vero et calor et color, quodlibet ex suo fonte derivatum, inhaereant.

Dic causas hujus distinctionis specierum immateriarum unius et ejusdem globi Solaris. 1. Oportet materiam corporis Solaris esse distinctum quid a luce in illo. Lucis enim radiorum motus in directum contingit in momento, corporis vero Solaris conversio fit in tempore. At si statueremus, speciem lucis nudam esse subjectum et vehiculum virtutis prensandi, lux ipsa Solis unica omnem corporis ejus essentiam sibi vindicaret. Idem enim est originaliter in re, quod invenitur in specie rei. 2. Luci delapsae quantitates competunt, procul dubio non plane secundum intimam lucis essentiam, sed secundum aliquid a luce ipsa diversum, scilicet quia est in corpore quanto et quia junctae species tam corporis quam lucis delabuntur. 3. Lucis species a superficie delabitur corporis luminosi, vel si maxime etiam ex profundo corporis

pellucidū, tamen quasi ex superficie. Itaque lux ut superficies consideratur et eadem habet, quæ alia superficies, in motu et impactu; a corpore vero, quod intra superficiem illustratum est, nihil patitur, quia a corpulentia interiori sui fontis non descendit: vis prensandi corpus a corpore descendat necesse est, ut sit causa movens analoga suo objecto mobili. Itaque etiam corporis dimensiones admittit et corpora movet non tantum secundum superficiem, sed etiam in ipsam eorum materiam se insinuans. 4. Hinc etiam luci nulla obstat materia superficiei objectas, quo minus in momento illa superficies illustraretur; quod vero luci obstat, opacum nempe, id perpetuo obstat nec unquam vincitur, quamdiu se. opacum manet. At virtus prensandi non totum assem vincit: nam obstat et derogat illi renitentia materiae in corpore planetae, qua fit, ut planeta vim prensantem promotam non exacte assequatur, sed ab ea reliquatur et destituatur; in qua mutua contentione temporis locus est. 5. Eiusdem causae est et hæc diversitas, quod lux terminatur et impeditur superficiebus corporum opacis, quo minus ulterius penetret ad alia corpora in eadem recta constituta. At vis hæc, quæ planetam prensando circumducit, non impeditur superficie ejus, sed penetrat in corpus quod prensat, et per corpus penetrat etiam in corpus planetae ulterioris, si contingat, binos cum Sole in lineam rectam incidere: ut ita nihil turbetur motus ab interpositione corporum. At si motus a lucis illustratione proficiaceretur, contingeret hoc absurdum, ut quoties superior eclipsaretur ab inferiore, toties motus ejus cessaret tantisper, donec inferior celeritate sua sese eriperet ex linea. 6. Denique non esse necessario motum planetarum a Solis lumine nudo, patet exemplis rerum aliarum, ubi motus similis coelestium fit sine lumine, ut videre est in magnete et iuxta patebit exemplo Lunae, quæ movetur a Tellure, corpore minime luminoso. Etsi tunc suas etiam partes inveniet illuminatio Lunae et Telluris, sed quæ etsi cooperatur ad movendam Lunam multifariam, non tamen id per se facit, sed saltem speciem motricem Telluris fortificat, ut suo loco dicetur.

Quæ est similitudo inter species lucis et hujus virtutis prensandi? Similitudo absolutissima est in ipsa genesi et conditionibus speciei utriusque: utriusque descensus de luminoso corpore fit in momento, utraque transit medium magnum et parvum sine jactura, non vectigalis, nihil perit in itinere ex fonte suo, nihil inter fontem et illuminabile vel mobile dispergitur. Effluxus igitur uterque immateriatus est, non qualis odorum cum diminutione substantiæ, non qualis calor ab aestuante fornace et si quid est simile, quibus media implentur: nec enim uspiam est species illa, nisi in opposito et occurrente corpore, lucis quidem in ejus superficie opaca, virtutis vero motoriae in tota corpulentia, in spatio vero intermedio inter Solem et superficiem non est, sed fuit. Quodsi occurreret sphaerica superficies concava corporis opaci, species utraque Solaris totis copiis, quibus egressa erat e corpore Solis, in id concavum dispergeretur, sic ut tantundem ejus esset in ampla et remotiori aliqua sphaera hujusmodi, quantum in angusta et propinqua. Ac cum proportio orbium convexorum sit dupla ad proportionem diametrorum, duplo igitur tenuior efficeretur species ista in orbibus inaequalibus, quam remotior; et rursum, quia circulorum est eadem simpla proportio, quæ et diametrorum: in longum igitur species eadem proportionem est tenuior, quæ et a fonte remotior.

Unde desumuntur argumenta hujus comparationis? De luce proprietates istae demonstratae sunt in opticis; de virtute Solis motrice per analo-

giam eadem probantur, servata differentia inter opera illuminationis et motus et obsectorum utriusque, inveniunturque consentaneae experimentis astro-nomicis.

Cum enim planeta unus et idem, ut infra dico-tur, in partibus eccentrici circuli aequalibus re vera, sed inaequalibus intervallis a Sole distantibus, moras terat inaequales, idque in ipsa hac intervallorum proportionem: sequitur igitur, etiam virtutem motricem in longum attentuari eadem proportionem, quae lux in longum attenuatur, in proportionem scilicet ampli-tudinis circulorum, quorum sunt intervalla illa seu semi-diametri. In hoc schemate sit Sol S, planeta idem CA propior et FD remotior, et sint DH, AI partes eccentrici aequales (subintellige in locis oppo-sitis eccentrici), DH quidem remotior, AI vero pro-prior. Sicut igitur se habet SD ad SA, sic mora planetae in DH ad moram ejusdem in AI. Ex hoc sequitur etiam hoc, sicut est SD ad SA, sic conver-sim esse densitatem lucis inferioris CA in longum ad densitatem FD lucis remotioris.

Fig. 62.



Atqui lux in dupla intervallorum proportionem attenuatur, id est in proportionem superficiem; cur non igitur etiam virtus motrix in dupla po-tius proportionem fit debilior quam in simpla? Quia virtus motrix subiectum habet speciem corporis Solaris, non ut nude est corpus, sed ut est in motu constitutum convolutionis circa suum axem et polos immobiles. Etiam igitur species corporis Solaris attenuatur in longum et latum, non minus quam lux, attenuatio tamen ista proficit ad debilitandam virtutem motricem tantummodo causa longitudinis, quippe motus localis, quem Sol planetis infert, tantum fit in longitudinem, in quam etiam ipsius Solis partes corporis sunt mobiles, non etiam in latitudinem versus polos corporis, respectu quorum Sol est immobilis.

Attamen etiam corpora mobilia habent latitudinem non minus quam longitudinem, quare vehuntur ab hac virtute, tam ut illa longitudinem, quam ut latitudinem suam habet; cur non igitur etiam in latitudinem de-bilitaretur virtus motrix et sic in dupla proportionem intervallorum? Equi-dem non has tantum duas dimensiones habent planetarum corpora, sed etiam tertiam crassitiei seu altitudinis, occupantque hanc virtutem plane trifariam, et est sane ob id virtus unius planetae prensatrix, vectrix et motrix non unus circulus, latitudine carens, sed constat ex infinitis quasi circularibus parallelis in latum et in altum; at non ideo sequitur, attenuationem hujus virtutis vel in dupla vel in tripla intervallorum seu semidiametrorum proportionem esse debere. Nam sicut alias in geometricis aequemultiplicium est eadem proportio, sic etiam hic in physica, sicut se habet una linea minima physica, ut pars cor-poris planetarii, ad unius circuli virtuosam tenuitatem, proportionem simpla inter-vallorum constitutam, sic se habent etiam infinitae lineae minimae physicae, ut partes omnes corporis planetarii, tam in latum quam in altum dispositae, ad totidem circulos virtutis motricis, qui omnes et singuli vim habent mo-vendi tantum in longum, nullam in latum, nullam in altum, nec singuli nec inter se juncti. Sicut igitur singulae lineae seu fibrae binorum corporum planetariorum solitariae moverentur a singulis circularibus motricis virtutis in pro-

portione intervalloꝝ simpla, sic etiam universae librae globi planetarii junctim ab universis circulis virtutis junctim moventur in eadem proportione simpla: quippe cum ista latitudo et altitudo virtutis motricis non sit de essentia ipsius, sed de accidente ei re mobili.

Sunt tamen ista difficiliora creditu de specie corporis et virtutis Solaris, planetas (proassertim Terram) circumagentē, quam illa priora philosophoꝝ de intelligentiis, animabus motricibus et orbibus solidis? Nihil nocet creditu esse difficilia, dummodo sint comprehensu faciliora, nec possit illis obijci, quod orbibus et intelligentiis fuit objectum, aut aliud quippiam, quo impossibilitas comprobetur. Nam primo utcumque fidem superent, exemplum tamen est genninum in magnete. Deinde si quis dubitat, an magnetiae, h. e. terrestres facultates in coelo sint, et an Terra, grave corpus, de loco in locum transporti possit a specie immateriata Solis, is Lunam intueatur, quam Terrae eognatam videt circumire nullo substrato solido orbe. Valere vero ad inferendum motum species corporum mutuo commeantes, patet in eadem Luna, quae per emissam speciem penes nos movet maria. Exemplis igitur non caremus. Nec nos modus fatigat, quem mente perspicimus qualis sit: sola incredibilis fortitudo hujus speciei nos suspensos tenet. Atqui recte hic cum Ptolemaeo respondere possumus, aequum nequaquam esse, ut ex imbecillitate nostra virtutes divinorum operum, ex parvitate nostra magnitudinem illorum aestimemus. Modi quidem et figurarum aestimatio menti competit, magnitudinis aut parvitas, hoc est quantitatum indefinitarum, nullus in hac aestimatione census esse debet.

IV. De causis proportionis periodicorum temporum.

Dixisti in principio hujus speculationis de motu, periodica planetarum tempora reperiri exactissime in proportione suorum orbium seu circularum sesquialtera; quaero quae sit hujus rei causa? Causae ad constituendam temporis periodici longitudinem concurrunt quatuor. Prima est itineris longitudo, secunda pondus seu copia materiae transportandae, tertia fortitudo virtutis motricis, quarta moles seu spatium, in quod explicatur materia vehenda. Sicut enim fit in molendino, cujus rotam circumagat fluminis impetus, ut quo latiores et longiores alas, tabulas seu remos rotae affixaris, hoc majorem vim fluminis, fusam scilicet per latitudinem et profunditatem ruentis, in machinam derives: sic etiam fit in hoc coelesti vortice ruentis in gyrum speciei Solaris, quae motum causatur, ut corpus, quo fuerit spatiosius (ut fig. 63. A, D) hoc latius etiam et profundius occupet virtutem moventem, ut BCA, pro latitudine intellectam: hoc celerius etiam ceteris paribus provehatur hocque citius iter suum periodicum absolvat.

Jam vero itinera circularia planetarum sunt in proportione intervalloꝝ simpla: sicut enim est SA ad SD, sic etiam se habet totus circulus BA ad totum circulum ED: pondera vero seu copia materiae in diversis planetis sunt in proportione intervalloꝝ dimidiata, ut supra probatum, sic ut semper, qui altior, is plus habeat materiae eoque et tardius promoveatur et plus temporis in periodum suam accumulet, cum jam antea ratione itineris plus temporis desideraverit. Nam sumto medio proportionali SK inter SA et SD, duorum planetarum intervalla, ut SK se habet ad majus SD, sic se habet copia materiae in planeta A ad illam in planeta D: tertia vero et quarta causae se mutuo compensant in diversorum planetarum comparatione, simpla vero et dimidium proportionis intervalloꝝ constituunt proportionem ejusdem sesquial-

teram: periodica igitur tempora sunt in proportione intervallo-
rum sesquialtera: ut si sint continue proportionales SD, SK, SA, SL, erit ut SL ad SD, sic
periodus temporaria planetae A ad alteram planetae D.²²)

*Proba, in comparatione binorum planetarum exacte pensari debilita-
tionem virtutis moventis ab amplitudine, qua corpora planetarum mobilia
eam occupant.* Corporum moles seu spatia sunt in proportione intervallo-
rum simpla et directa, ut supra est demonstratum. Hoc est, sicut se habet SA
ad SD, sic se habet moles corporis planetae in A ad molem alterius planetae
in D. Jam vero etiam virtus motrix densa et fortis est in proportione eorum-
dem intervallo-
rum simpla, sed eversa; sicut enim se habet idem intervallum
SA ad SD, sic se habet fortitudo speciei CA ad fortitudinem speciei FD.
Ergo qua proportione virtus ista debilitatur, eadem vicissim occupatur; verbi
causa Saturnus a decuplo imbecilliore virtute vehitur quam Terra, at vicissim
corpore suo etiam decuplo plus de virtute suae regionis occupat, quam Terra
suo corpore de suae regionis virtute; et divisa tota virtute, quam Saturnus
occupat mole sua, in partes decem, quas sint toti virtuti, quam Tellus occu-
pat, spatio aequales, quaelibet harum partium seu spatiorum virtutis habet
decimam solummodo partem fortitudinis ejus, quam habet una illa, quam oc-
cupat Terra: quare decem illae, decem suis decimis in unum collectis, po-
testate sunt aequales illi unicae, qua Terra vehitur. Itaque si in illa globi
Saturni rarioris amplitudine non esset plus materiae, quam in angustia cor-
poris Terrae densioris, Saturni globus in uno anno per tantum spatium pro-
veheretur orbis sol, quanta est longitudo totius orbitae Terrae, et sic in decem
annis conficeret suam propriam orbitam. At nunc circiter triplo plus habet
materiae et ponderis, quam Terra, quare triplo longius tempus requirit, annos
sc. triginta.

*Quid opus fuit, hanc compensationem docere? An non aequè fuisset
facile ad expediendam demonstrationem, statuere, quod nulla plane sit causa
inaequalis talis motus, nec in diversis gradibus virtutis motoriae, nec in
diversa globorum planetariorum amplitudine?* Ad hanc quidem demonstra-
tionem diversarum in planetis periodorum earumque proportionis, quod sit
sesquialtera proportionis intervallo-
rum, nihil interfuit, hoc an illud statueretur:
at si jam ad unius et ejusdem planetae diversas moras in diversis intervallis
progressi fuisset, causam expedire non potuissemus, ex eodem quidem re-
rum genere, cur morae in arcibus praecise aequalibus sequerentur proportio-
nem intervallo-
rum.

*Quae est igitur causa, cur, quo longius a Sole distat arcus eccentrici
quilibet ex aequalibus, hoc longiores in eo moras planeta nectat, idque in
ipsissima proportione intervallo-
rum?* Ipsa omnium illa debilitatio virtutis
motricis, ut quae non secus quam lux in SD longiori intervallo a Sole ex-
tenditur in longum ED prolixius, quam est BA extensio ejusdem quotae in
breviori intervallo SA; itaque quod tunc de ea occupatur a corpore planetae,
ut FD, id est debilius, quam quod ab eodem CA, propiori facto, occupatur
de virtute densiori.

Hic enim tres reliquae causae nobis desunt. Arcus enim seu iter sup-
ponitur utrinque ejusdem longitudinis, ut DH, AI; corporis densitas manet
eadem, figurae quantitas itidem, quia FD et CA est hic unus et idem pla-
neta: restat sola fortitudo virtutis. Sed de hoc plura in sequentibus.

*Videtur hic occurrere difficultas aliqua major quam supra. Nam
planeta, propinquior Soli factus, non longiores tantum arcus de circulis,*

virtutis moventis occupat, sed confertiores etiam: quare potius in dupla quam in simpla proportionis intervallo moras extendere debuit? Imo et idem dicitur quod supra et idem respondetur. Esi enim Saturnus tunc nobis non descendeat in orbem Terrae, comparabamus tamen cum spatio virtutis a Saturno occupatae non spatium tantum virtuosum id, quod Terra in orbe Saturni fulasset occupatura, sed omnino id, quod Terra in suo proprio orbe occuparet. Ergo ut prius, quod confertiores sunt circuli, id est transcribendum speciei corporis, quae distinctum quid est ab inhaerente virtute movente, quae in solam longitudinem tendens, nihil lucris accipit ab illa subiecti sui condensatione in latum, nisi quod linea tenuis, latitudine carens, naturalem vim nullam ne in longum quidem habet; ubi talis lineae latitudo non densitate sed spatio censetur, propter ipsam scilicet corporum vehendorum latitudinem, ut supra etiam monui.


V. De Telluris motu annuo.

Terram igitur haec Copernici philosophia facit unum ex planetis et inter sidera circumfert; quaero, quid praeter dicta requiratur ad faciliorem dogmatis argumentorumque perceptionem? Cum Telluris motus annuus fiat necessarius, statuta quiete centri Solis in centro mundi, efficiaturque ex corporis Solaris conversione in illo spatio, et plane tollat veritatem stationis et retrogradationis planetarum eamque per meram deceptionem visus excuset, distinguendae sunt diligenter quaestiones istae: 1) An Sol in centro mundi haereat? 2) An orbes omnes quinque planetarum et Terrae illorum medii circa Solem circumducti sint, sic ut Sol in omnium complexu sit? 3) An Sol occupet centrum ipsum totius systematis planetarii, an vero propter id consistat? 4) Ipsumne hoc centrum systematis et in eo Sol annuo motu circumseat, anne potius, Sole manente immobili, Terra motum annum babeat per partes oppositas earum, sub quibus Sol versari putatur quovis tempore?

Probasti supra, Solem esse 1) in centro sphaerae fixarum: proba nunc etiam, quod is sit 2) intra complexum orbium planetariorum. Solem esse in medio circuituum planetariorum, probatur primo ab accidente motus huius, sc. ab apparentia stationum et retrogradationum, quae visus est fallacia, vel etiam, cum directi celeriores videntur, quam re vera sunt. Nam ut incipiamus ab inferioribus, jam dudum a multis seculis, Ptolemaeum insecutis (ut de vetustissimo Aristareho nihili jam dicamus), suboluit auctoribus, Martino Capellae, Campano et aliis, fieri aliter non posse, ut Sol, Venus et Mercurius eandem habeant periodum temporis, annum scilicet, nisi etiam eundem habeant orbem, et Sol centrum obtineat duorum orbium Veneris et Mercurii, illique circa Solem cursitent⁶⁶⁾: qua ratione fit, ut hi planetae, cum retrogradi videntur, non sint re vera retrogradi, sed pergant eandem viam sub fixis, Solem circumcundo: id quod naturae rerum coelestium magis erat consentaneum.

Haec argumentationem ante paucos annos clarissima demonstratione confirmavit Galilaeus, detecta per telescopium illuminatione Veneris, quae cum est directa et Soli vicina, rotundam habet figuram, cum retrograda, corniculatam. (cfr. Vol. II. p. 465.) Hinc enim evincitur certissime, et illuminationem ejus esse a Sole, et illam, quando rotunda apparet et directe incedit, supra Solem esse, quando corniculata et retrograda, infra Solem, et sic circa Solem circumire. Demonstratio huius rei lucis causa conjungatur cum demonstratione illuminationum Lunae (Fig. 64). De Mercurio non dissimilia profert Marius (cfr. Vol. II. p. 470.), ejusdem telescopii ministerio deprebensa luminis imbecillitate descendente ad

Terram planeta: quod iudicio est, speciem illuminationis mutari lumenque in cornu attenuari, sic ut minus moveat oculum de propinquo quam de longinquo, quod sine hac attenuatione in cornu absurdum esset: quippe propinqua alias maiora apparent, quam si recesserint longius. Jam quod tres superiores attinet, demonstrant Aristarchus, Copernicus et Tycho Brahe, si etiam illos circa Solem ordinemus Solemque commune quasi centrum quinque planetarum statuamus, sic ut motus Solis seu verus seu apparens totos quinque planetarum orbes attineat, liberari nos, ut prius in Venere et Mercurio duobus eccentricis supervacuis, sic nunc in superioribus 1) tribus epicyclis, 2) motus eorum realis consensu caeco et incredibili cum motu Solis, 3) itaque stationes et retrogradationes eorum, non minus quam supra in Venere et Mercurio, respectu Solis quem circumveunt, re vera nullas esse, 4) sic etiam plurimas in motu latitudinis intricaciones et doctrina theoricæ tolli; 5) denique causas aperiri discriminis, cur quinque planetae fiant stationarii et retrogradi, Sol et Luna nunquam; et cur 6) Saturnus altissimus superiorum habeat minimum retrogradationis arcum, Jupiter medius medium, Mars proximus maximum. Quae omnia inferius explicabuntur libro VI. Harum vero apparentiarum causae penitus ignorantur apud astronomos veteres.



Sed et secundarii nobis aliquod huius rei testimonium praebent. Deprehendit enim Marius in suo Mundo Jovialis, restitutiones satellitum Jovialium circa Jovem nequaquam regulares esse ad lineas, quas ex centro Terrae in Jovem ejicimus; esse vero regulares, si comparentur ad lineas ex centro Solis per Jovemeductas. Nimirum id maximi argumenti loco est, Jovis orbitam circa Solem ordinatam esse, et distantiam Solis a centro orbitae Jovialis esse certam et fixam quodammodo, Terram vero suas ab hoc centro distantias variare per annum.


Quot sunt astronomorum sectae circa speculationem hanc, ex qua secundum argumentum ducitur? Tres: prima, veterum nomine communiter nota, Ptolemaeus tamen coryphaeus habet; secunda et tertia recentioribus adscribuntur, licet secunda, a Copernico denominata, sit antiquissima; tertiae auctor est Tycho Brahe.

Ptolemaeus igitur errantium stellarum singulas separatim saltem tractat, causasque motuum omnium retrogradationumque et stationum apparentes singulis in suis ipsarum orbibus assignat, sic tamen, ut in singulis ponat unum certum orbem, qui periodum suam absolvat respectu ad motum Solis habito: quod quibus de causis fiat, Ptolemaeus non explicat, nisi quod latini scriptores vim aliquam obscuram certis Solis radiis attribunt, ignorantia radiorum mera fascinatio.

Reliqui duo auctores planetas inter se comparant, quaeque in eorum motibus communia deprehenduntur, ex eadem communi causa deducunt. Haec vero communis causa (quae planetas efficit videri stationarios retrogradosque in certa aliqua configuratione planetae cum Sole) a Braheo quidem adhuc

tribuitur motui reali totorum orbium planetariorum, a Copernico vero ab ipsis plauetarum orbibus penitus removetur. Nam Braheus docet, omnes quinque orbes primariorum planetarum connexos esse communi aliquo puncto, quod non longe absit ab uniuscujusque orbis centro (ut si hic omnes descripti casent

Fig. 65.



in communi tabula circulari B), et hunc vpluti communem nodum re vera circumire annuo tempore una cum Sole et quidem proxime illum (in circello A, punctis signato) secumque totos orbes circumgestare eque suis in mundo spatii veluti luxare, in modum talem, quo pollinates cribrum una parte limbi prehensum versant manibus, ventilantes: ut situs totius systematis planetarii sit verbi causa Junio mense secundum circulum B, Augusto secundum C, Octobri secundum D, Decembri secundum E, Febuario secundum F, Martio secundum G, inde rursum secundum B; interimque planetam, nihil turbatum hac luxatione sui orbis, intra orbem, veluti

fixo ejus centro, circulum suum perficere. Copernicus vero contra orbium, quod annum tempus attinet, relinquit penitus fixa, fixum etiam centrum Solis in centrorum dictorum vicinia, motum vero annum circa Solem adscribit Telluri et sic visui nostro: ex quo fiat ut, cum visus se putet quiescere, Sol annuo motu moveri, planetae vero omnes quinque nunc stare, tunc viam contrariam ire, nunc celerrimam viam directam pergere videantur.

Quibus igitur argumentis probas 3, communem illum nodum seu centrum systematum omnium primariorum competere non proxime corpus Solis, sed in ipsum corpus et centrum Solis? Argumenta hujus rei in doctrina astronomica texuntur ista. 1. A motu altitudinis et longitudinis planetarum. Observationes legitime tractatae testantur, uniuscujusque theoriae primariae lineam longissimam, quae orbem in binos semicirculos et quantitate et celeritate partium earundem aequales exacte bisecat, transire per centrum Solis. Omnes igitur quinque lineae altitudinum concurrunt perpetuo in centro Solis. Inspice schemata Nro. 51. 52.

2. A motu latitudinis planetarum. Ex eodem rerum genere, sc. ex observationibus discimus, uniuscujusque primarii planetae orbitam ab ecliptica secari locis ex centro Solis, non ex alio vicino puncto, oppositis.

3. Quodsi differrent ista duo centra Solis et regionis mobilium, tunc aut centro Solis aut centro regionis mobilium adscribendus esset motus tardissimus in circello parvo, propter progressum apogaei Solis, ut lib. VI. et VII. docebitur. Et sic non posset ex his duobus alterum, quod movetur, vel esse vel manere in centro mundi. At utrumque verisimile est, et in centro mundi esse et ibi quiescere; Solem quidem propter argumenta et superiora et sequentia, nodum vero mobilium propter rationes et fontem motus, quem jam diximus ex hoc communi centro mobilium scaturire; fonti vero motus quies competit et propter quietem locus in centro tam mobilium quam totius mundi.

4. Eadem fonti motus sedes assignanda est non in aliquo puncto mathematico, proxime corpus nobilissimum, sed potius in illo ipso corpore nobilissimo, propter tres causas: primo ut absurdum effugiamus, fontem motus, qui

necessario statuitur esse in illo communi nodo sphaerarum omnium, ut iuxta probabitur, esse proxime cor mundi, nec tamen in ipso corde mundi, Sole scilicet; secundo, quia vis motrix non potest residere in puncto mathematico, sed requirit corpus, nimirum cor mundi, Solem; tertio, quia vis motrix omnino sibi postulat centrum mundi, in quo Sol ipse est, sicut superfleui mundi quies, motus intermedio competit.

5. Inprimis vero Braheanae sententiae eripiendum est hoc et demonstrandum, quod non differat centrum regionis mobilium a centro Solis. Nam si hoc sequatur Braheus, cogetur assignare Soli alium motum, huius vero centro mobilium etiam alium differentem, quo motu fiat, ut Sol jam antecedeat hoc centrum, jam sequatur, jam supra stet, jam infra, et tamen utrumque eandem semper habeat periodum temporis.

6. Quin etiam accideret Braheo absurdum et mirabile quid. Sol enim moveretur motu eccentrici, habens apsidem hodie in Canero, centrum vero mobilium haberet motus sui eccentrici apsidem in opposito signo Capricorno. At quae hujus rei causa esset?

7. Haec duo ultima argumenta praesent unum argumentum etiam contra Copernicum, quatenus etiam ipse nodum istum planetarum omnium collocat proxime Solem, non in ipso Sole. Omnium reliquorum primariorum planetarum motus in hoc conveniunt, quod puncta, circa quae motus eorum aequabiles apparent, differunt situ a centro communi regionis mobilium, sola Tellus hoc ipsum punctum pro norma sui motus observaret, si Sol non esset in ipsissimo centro regionis mobilium. At quae hujus diversitatis causa esset?

8. Denique causa, cur Copernicus et Braheus differre fecerint ista duo centra, non est sufficiens nec satis astronomica. Nam ad id illi redacti sunt tantum per hoc, quod in suis formis hypothesium voluerunt exprimere omnimodam aequipollentiam formae Ptolemaicae. Atqui necesse non erat, ut Ptolemaei vestigiis tam presse insisterent. Quippe Ptolemaeus non omnes partes suae hypotheseos ex observationibus extruxit, sed multa super hac praecipue falsa opinione fundavit, quod oportet praesupponere motus planetarum per totum circulum aequabiles, quod demonstratur ex observationibus esse falsum. Haec argumenta astronomica, hic sub unum aspectum collocata, qui solide cupit intelligere, is adcat mea Commentaria de motibus stellae Martis.

Quibus denique argumentis probas tu 4, centrum Solis, quod est in medietate orbium planetariorum, gestans totum eorum systema, non circumire aliquo motu annuo, ut vult Braheus, sed secundum Copernicum haerere in uno loco immobile, Terrae vero centrum annuo motu circumire? Et si uno demonstrato et alterum necessario sequitur, quaedam tamen argumenta ipsum Solem propius attinent, quaedam Tellurem, quaedam aequaliter utrumque.

Primum hic militat idem argumentum, quo jam modo vindicavimus Soli medietatem orbium: supervacua scilicet multitudo orbium et motuum sublata. Nam sicut est, multo probabilius, esse unum aliquod systema orbium Solis, commune et centro Solis et illi nodo quinque orbium, secundum Tychoem Brahe, quam ut credamus Ptolemaeo, in unoquoque quinque planetarum praeter orbem ad motus eorum proprios spectantes inesse insuper unum integrum systema orbium, simile ad unguem sexto Solis systemati: sic etiam porro nunc est multo probabilius, unius Telluris centrum annuo motu circumire, Sole quiescente secundum Copernicum, quam illi nodo quinque systematum cum orbibus et planetis ipsis et sexto Sole eundem annum motum (praeter motus

ceteros cuique proprios) competere secundum Braheum. Is enim etsi super-
vacuas illas Ptolemaei quinque theorias, Solaris similes, e planetarum genninis
systematibus sustulit adque nodum illum systematum communem deduxit, oc-
cultavit, in unam conflavit, rem tamen ipsam, quae per illas theorias efficie-
batur, reliquit in mundo: ut planeta quilibet praeter illum motum, qui est ei
re vera concedendus, moveatur etiamnum ipso insuper motu Solis, miscens
ntrosque in unum; ex qua mixtura, cum orbes solidi unlli stut, spirae in
spatio mndano efficiuntur perplexissimae. Vide schema hujus perplexitatis
in Com. Martis fol. 3 (III. 173). Copernicus contra planetas quinque motu hoe
extraneo Solis per unicum simplicem motum centri Telluris penitus exnit effi-
citque, ut sex primariorum planetarum centra, Telluris sc. et reliquorum quin-
que, quodlibet unicum simplicem et perptuo sibi similem in spatio mndano
describat orbitam, seu lineam circulari proximam.

Secundum argumentum a motu latitudinis. Si Terra stante circumenit
epicyclos, vel secundum Ptolemaeum vel secundum Braheum, oportebit illos
epicyclos, praesertim inferiorum, varie tam latera concutere, quum caput pedes-
que, id est dupliciter librari; at Terra eunte, omnes orbes constantissime ad
eclipticam inclinati sunt. Vide lib. VI. parte III. latitudines inferiorum, quae
evidentissimum praebent argumentum motui Telluris.

Tertio, sicut supra in doctrina sphaerica, concessa revolutione diurna
Telluris, liberata fuit sphaera fixarum immensa motu diurno pernecitatis in-
aestimabilis, sic nun etiam, concessa eidem Telluri motu annuo ad exemplum
ceterorum planetarum, conficimus motum fixarum tardissimum illum, qui prae-
cessio aequinoctiorum a Copernico dicitur. Vide de his lib. VII. Multo
enim credibilis ista tribuuntur axi unius terreni exigui corpusculi, quam
tantae molli.

Quarto militat hic consideratio proportionis orbium. Etenim verisimile
nequaquam est, centrum magni orbis in parvo orbe circumire. Jam trium
superiorum orbes proprii sunt multo majores orbe Solis, Saturni quidem pene
decuplo, Jovis quintuplo, Martis sesquiplo. Non ergo circumvehuntur sen
luxantur situ suo quinque hi orbes, sed fixa fere haerent ipsorum centra, et
quod consequitur, pro hoc illorum et Solis communi motu Tellus circumit.

Quintum argumentum, priori cognatum, est idem, quo etiam Braheus orbes
solidos tentavit decicere. Si enim valet ratio Brahei, sic ut orbita Martis
sit sesquipla orbitae Solis, Martis corpus certis temporibus in illud punctum
spatii mndani succedet, in quo alius temporibus Sol fuit; quod de primariis
planetis valde est incredibile, sic confundi ipsorum regiones, quas permeant,
cum in Copernico sint non tantum distinctae, sed amplissimis intervallis
vacuis interseptae.

Sextum texo simile quarto, a corporum mobilium magnitudine. Credi-
bilis enim est, magnum esse corpus, circa quod minora circumenit: sic enim
Saturnus, Juppiter, Mars, Venus, Mercurius omnia minora sunt corpora ipso
corpore Solis, circa quod illa circumenit, sic Luna minor est Tellure, circa
quam Luna circumit, sic quatuor satellites Joviales minores sunt ipso Jovis
corpore, circa quod illi volvuntur. Jam vero, si Sol movetur, Sol maximus
et tres superiores, omnes Terra majores, circa Tellurem minorem circumibunt:
credibilis igitur est, Tellurem, corpus parvum, circa Solis corpus magnum
circumire.

Septima ratio desumitur a causis intervallorum, supra parte prima hujus
libri explicatis, quae turbantur et mutilantur, ubi etiam Telluri suum orbem

concedamus, quem dat et Copernicus inter orbes Martis et Veneris. Nam etsi intervalium Saturni et Jovis a cubo, Jovis et Martis a tetraëdro, Veneris et Mercurii ab octaëdro deduci posset etiam in Brabei ordinatione, at jam porro superasset inter Martem et Venerem intervalium unicum, in numero vero figurarum mundanarum supersunt figurae duae. Nec illud intervalium Martis et Veneris, quod est in ratione majore quam dupla, ad unam barum figurarum, ad dodecaëdron scilicet aut icosaedron, quadraret, nec a duabus figuris, non intercedente inter eas aliquo orbe, posset deduci.

Octavo, eadem dicenda sunt etiam de harmonia motuum coelestium, quae numeris et proportionibus plane illis constant, quibus nostra scala musica, quae, sive praestantiam operis consideres, sive contemplationis jucunditatem, sive denique vim persuasionis inevitabilem, vere anima et vita dici potest totius astronomiae. Illa vero sic tandem succedit, si Tellus suo loco et ordine inter planetas suam chordam pulset auumque tonum per semitonii variationem veluti decantet, cujus semitonii, quae rursum anima est cantus, nulla alias esset representatio. Quia etiam semitonio Telluris exempto, perit inter motus coelestes representatio generum cantus, duri et molles, res totius hujus tractationis jucundissima, subtilissima et admirabilissima. Sed de hoc in Harmonicis.

Nono, quodsi vim ordinationis Braheanae consideremus et si imaginemur nobis aliquam materiam orbium quinque laxatillam, quae una cum ipsa regione mobilium annuo motu iuxetur, jam in hac materia, in hoc, inquam, coelesti orbe, per omnes planetarum regiones fuso, Tellus etiam quiescens talem orbitam circa Solem scribet, qualem illi Copernicus quiescente et Sole et centro regionis mobilium assignavit inter orbes Martis et Veneris. Ita ratione absurda et impropria ad eandem pulchritudinem eminus alluderetur, Terra scilicet orbem unum peragraret quiescendo. Credibilius, orbitam sextam Telluris describi motu reali ipsius Telluris, sicut et reliquae quinque orbitae totidem motibus describuntur.

Decimum argumentum, a periodico tempore desumptum, hoc esto: quod motus Solis appareus habet dies 365, quae mensura est media inter periodum Veneris 225 dierum et Martis 687 dierum.⁵⁷⁾ Annon igitur alta voce exclamat natura rerum, circuitum, in quo consumuntur isti dies 365, loco etiam medium esse inter circuitus Martis et Veneris circa Solem, et sic non Solis esse hunc circuitum circa Tellurem (quippe circa quam primariorum nullius orbitam suam ordinatam habet, ut concedit Braheus), sed Telluris circa quiescentem Solem, sicut etiam ceteri primarii, puta hi ipsi, Mars et Venus, circa Solem currendo has suas periodos absolunt.

Undecimum a causis motricibus (ex sententia quidem Brabei supposita, licet non ab omnibus sit concessa) desumitur. Nam quia orbes solidi nulli sunt, motrices igitur facultates usquam poni possunt, quam in corporibus mobilibus. Atqui sic valde dura fiet conditio animarum motricum, durior intelligentiarum, dum illae corpus, in quo insunt, de loco in locum duplici motu transferre sine cujusquam rei reituentia, hae vero ad valde multa respicere jubeantur, ut planetam duobus per omnia distinctis et inter se permixtis motibus ordine suo iuvebant; ad minimum enim simul eodem momento cogentur respicere ad utriusque motus principia, centra, periodos, figuras. At si Sol quiescat Tellusque moveatur, motus cujusque planetae est unicus et potest effici virtutibus corporeis magneticis, animae facultate vix ad unicum revolutionem corporis Solis, mentis vero praesidio plane usquam est opus. Vide Com. Martis passim.

Duodecimum a fonte motus. Nam demonstratum est modo pluribusque confirmabitur infra, omnem motum quinque primariorum planetarum, partim etiam secundariorum, ex Sole oriri. Primam vero motus causam par est credi immobilem esse. Sol igitur suo loco haeret immobilis, et per consequens Terra movetur annuo motu, vice Solis.

Tredecimum ab instrumentis motoris. Nam si Solem et Terram patimur circa suos axes gyron, tunc horum corporum species sunt subjecta virtutum moventium, quibus planetae sex a Sole, Luna a Terra moveantur. At si Sol circumit anno motu quiescente Terra, tunc Soli movendo species nulla corporis, quae motum inferat, praesto est; nec Terra, si non diurno tempore circa suum axem torquetur, quidquam habet, quo Lunam moveat. Sed hoc argumentum magis urget motum diurnum.

Quartum decimum a motu longitudinis tale est. Si Sol movetur, circumgestans orbium omnium systema, novi quid sit circa ipsum: aliquod enim corpus movebit se ipsum, aut certe ab extrinseco peculiari motore, enim cetera primaria corpora moveantur ab uno communi Sole et sic ab alio, quam a se ipsis. At si Tellus movetur in circulum, a Sole et ipsa movetur ut ceteri primarii, novi nihil accidit. Itaque hanc verisimile est moveri, quippe apparento verisimili causa ejus motus, Solem vero fixum stare.

Quindecimum argumentum a motu altitudinis. Partim dictum est jam et demonstrabitur infra plenius, planetas omnes in recta linea librari, quae in Solem vergit, exque hac libratione leges petere celeritatis et tarditatis suae in quolibet eccentrici loco, ut ita certum sit, Solem omnibus quinque causam fieri variationis hujus; demonstratum vero juxta est in Com. Martis et infra lib. VI, idem locum habere in Terra, si illa moveatur, quod et illa libretur in diametro versus Solem extensa, sin autem Sol statuitur moveri, tunc e contrario Terram Soli fieri causam tarditatis et celeritatis et sic etiam circuitionis ipsius. Atqui corpora ipsa inspiciantur Solis et Telluris, fiatque judicium, utrum sit verisimilius, Solem, fontem motus quinque planetarum, Terra multis vicibus majorem, una cum illo nodo quinque systematum planetariorum moveri a Terra, an e contrario Tellurem, unam inter primarios, moveri a communi fonte motus ceterorum? Vide Com. Martis.

Sedecima verisimilitudo sit ista, quod, cum libro primo multis argumentis et contrariorum solutionibus asserta sit Terrae rotatio diurna circa suum axem, inter quae non infirmisima erant ista, quod, posito Terrae diurno motu, causa et finalis et instrumentalis ex eadem ipsa Tellure desumi possit obliquitatis eclipticae, quorum neutrum, quiescente Terra, explicari aut a sphaera ipsa fixarum, in qua zodiacus, peti possit extra respectum hujus exigui corpusculi, quod Terra dicitur: jam igitur neque translatio centri Telluris amplius adeo absurda esse possit. Sufficit autem verisimilitudo, si rem ipsam requirant argumenta reliqua. Nam pro necessario argumento non venditandum hoc est, quia etiam Sol torquetur circa suum axem, est tamen loco immobilis ut totus.

Septemdecima ratio: si Terra motu annuo circumit, non tantum ipsius translationis eclipticae a fixis ad alias causas reperimus verisimiliorem, quam si hanc variationem Soli tribuamus, corpori primo, sed etiam eadem opera rationem reddimus inaequalis progressionis nodorum planetariorum, et adscito axe motus Terrae diurni causas explicamus mutatae obliquitatis eclipticae, ut et alicujus inaequalitatis in praecessione aequinoctiorum (quam quidem ipsam

totam argumento tertio deiecimus). Horum verò tot phaenomenon causas penitus ignorari necesse est, si Terra annuo motu non circumit.

Octavum decimum argumentum esto a fine motus, ex quo probatur, motum Telluri competere, tanquam contemplatricis creaturae domicilio. Neque enim decuit, ut homo, hujus mundi incola et speculator futurus, in uno ejus loco, velut in clauso cubiculo resideret, quo modo ad dimensionem et contemplationem siderum tam remotorum nunquam pervenisset, nisi dotibus aliis supra quam humanis fuisset praeditus: quin potius his, quos nunc habet, oculis et his mentis facultatibus instructus, in hoc aedificio amplissimo, translatione annua Telluris, domicili sui, circumambulare, stationes, ut solent mensores, diversas capere, hoc est spatiari debuit, ut singula domus membra tanto rectius intrari et dimitti posset. Intelligis nimirum, ut hujus libri IV. pars prima concinnari posset, scriptorem ejus navi Terra et navigatione ejus annua circa Solem indiguisse. Terra vero eunte, Solem necesse est quiescere.

VI. De revolutione corporis Terrae diurna circa suum axem ejusque effectum in movenda Luna, et proportionibus inter se anni, mensis et diei.

Quia Telluri, qui unus est ex planetis primariis, praeter circumlationem annuam circum Solem tribuitur etiam rotatio diurna: quaero, num omnes primarios existimes sic converti circa suos axes? Id sane verisimile est, primo de Venere, ut quae maculas alias post alias explicare videtur, indice scintillatione illa, diversae formae a scintillatione fixarum; iterum de Jove, ut qui vehit quatuor satellites, et de Saturno, qui duos, sicut Terra vehit unum, Lunam dictum: de quibus infra.

Quibus principiis perficitur haec gyratio corporum circa suos axes? Libro primo de Terra et hoc libro IV. de Sole dictum, quod haec corpora torquentur insito principio animati aut simili. Id vero in Terra gyranda non esse solitarium, sed adjuvari a Sole, colligitur ex duobus documentis: primo, quia numerus revolutionum Terrae diurnarum in anno, qui est 365 cum quadrante, excedit vicinum archetypicum 360. Consentaneum est enim, nisi vis motrix Telluris interna vegetaretur a praesentia Solis perpetua, Terram aliquanto lentius circa suum axem incessuram fuisse, sic ut in eodem spatio anno pauciores revolutiones, puta solas 360 factura fuerit. Hoc posito sequitur, residuas et veluti supernumerarias revolutiones quinque cum quadrante accedere illis 360 propter adjumentum ex Sole. Alterum documentum conditionem hanc dicit, ut locum habent aequationis temporis illa pars, de qua libris praecedentibus I. et III. dictum, quam Tycho Braheus manifestis eclipsium experimētis in lucem protulisse visus est egoque in formam physicae redegi. Nam quia haec temporis aequatio ponit revolutionem Telluris aestivam paulo tardiores hiberna, id eundem ex insito Terrae principio nequit esse, ut quae solent esse perpetuo uniformia, sed oportet esse ex intervallis Solis et Terrae, quae sunt aestate nostri hemisphaerii longiora, quam hieme.

Fortasse vis omnis turbinationis hujus effectrix in unico Sole est, nulla in aliquo principio motus separatim Terrae insito. Repugnat utraque dictum causarum. Nam 1) si numerus 365 non esset compositus ex duobus effectibus duarum causarum distinctarum, causa nulla esset, cur ille non sit unus ex archetypicis, id est rotundis potius, quam ex inarticulatis et igno-

billbus et fractis. 2) Posita vera aequatione temporis physica, tunc si Sol omnia faceret, integrae Telluris revolutiones diurnae proportionales essent intervallis Solis et Terrae: at postulat quantitas hujus aequationis temporariae, ut non integras revolutiones, sed particulae saltem aliquas minutas revolutionum proportionentur illis intervallis variabilibus.

Virtutem internam Telluris aestimas 360 revolutionibus in uno anno: quam hujus numeri causam exhibes ex archetypo? Quis Soli partem circuli seu curriculae sui apparentis 720° tegere debuit in longissima sua distantia a Terra: existimo tantam huius rotationis virtuti conelliatam esse fortitudinem, ut Sol motu medio in unaquolibet Telluris revolutione per duas hujusmodi particulas circuli sui promotor apparere posset, ad numerum duarum revolutionis partium, quarum altera dies, altera nox dicitur, intuitu unius alicujus loci in superficie Terrae: ut ita duobus spatii zodiaci circuli, signatis a sitibus Solis in duobus succedentibus meridiis, spatium aequale illorum alterutri interciperetur vacuum seu non signatum, essetque ut dies ad noctem, sic spatium Sole plenum ad spatium vacuum, diurnum scilicet centri Solis ad nocturnum.

In omnibus enim hisce natura hominis, observatricis creaturas, incolae Telluris futuri, inter causas archetypicas recepta fuit, ut qui corporis Solaris quantitatem aestimaturus dieique et noctis discrimina contemplaturus fuerat.

Atqui si hoc quaesitum fuisset, videtur et obtentum futurum fuisse: jam vero fateri ipse, turbatas esse rationes istas, cum incitamentis illis ex Sole accessoriis pro 360 facti sint dies 365 etc. et sic diurna itinera breviora. 1) Non simpliciter quaesitum hoc esse dici potest, sed saltem in accommodatione principii motus interni in Tellure; quo modo et obtentum fuit. 2) Etsi vero in hoc motu secundario concursus cansarum turbat numerum institutum, at non tanta fuit haec turbela, quin etiam sic mensibus Novembri et Januario quantitas haec ipsissima obtineretur, quia tunc quantitas diurni motus Solis est unius gradus seu bis 30 minutorum. Et jam antea, si stiam nulla talis turbela esset, bis tantum in anno quantitas ista futura fuisset motus diurni Solis, propter necessariam inaequalitatem motus Solis apparentis.

Quomodo Sol fortificat virtutem Telluris motoriam, augens celeritatem revolutionis Terrae diurnae? Valde verisimile est, id fieri mediante Solis lumine, quod Telluri infunditur, per illuminationem hemisphaerii ejus. Nam quia physica aequatio temporis postulat inaequales diurnas revolutiones Telluris, prout intervalla ejus a Sole variantur, certo in brevi intervallo fortis est illuminatio, quippe a lumine densiori, in longo debilis, utpote a lumine tenuiori et sic pauciori, idque (quoad unam dimensionem longitudinis, in quam tendit motus) in ipsa intervallorum proportionem. Ita copia luminis, quae est quovis tempore, fit apta, loco intervallorum, ad dispensandam per annum hanc accelerationem.

Qui sunt effectus revolutionis Terrae diurnae, et in genere primariorum circa suos axes? Duo: primus Terrae proprius, quod vobis Terras incois sidera coeli omnia, fixa, errantia adeoque etiam Sol et Luna videntur diutem ab ortu surgere et in occasum eundi: quamvis respectu hujus diurni motus ipsa re vera suis locis fixa maneant. De hac apparentia fallaci actum est libris tribus primis doctrinae sphaericae. Alter effectus physicus et verissimus, communis omnibus primariis ipsique adeo Soli, est iste, quod primarii, per sui corporis in circumvolutione constituti speciem egressam client suos se-

secundarios, ut Terra Lunam, effluuntque, ut secundarii in eandem plagam sequantur, tardius tamen et quasi relinqui post tergum.

Quibus argumentis verisimile redditur, primarios ipsos conciliare secundariis motus suos circa se, praesertim vero Terram Lunae? Primam fidem Luna et Terra faciunt. Sicut enim supra ex eo, quod planetae Soli appropinquantes celerius provebantur, ratiocinati sumus, Solem per speciem sui corporis, id est in rotatione constitutum, clere circa se planetas in plagam eandem, sic etiam quia deprehendimus, Lunam, 1) quanto magis appropinquat Telluri (non vero Soli), tanto concitatius circa Terram incedere, 2) et in eandem quidem plagam, in quam Tellus circa axem volvitur, summa probabilitate illum motum Lunae ex hac turbinatione Telluris derivamus idque tanto magis, quod 3) etiam hoc respondet, ut sicut Solis conversio circa suum axem brevior est periodo Mercurii brevissima, sic etiam Terra tricies fere convertatur, donec Lunam semel restituat. Nam si Luna Tellurem anteverteret, non sane posset ejus motus a rotatione Telluris esse. 4) Confirmatur vero fides hujus rei comparatione quatuor Jovialium et Jovis cum sex planetis et Sole. Etsi enim de corpore Jovis, an et ipsum circa suum axem convertatur, non ea documenta habemus, quae nobis suppetunt in corporibus Terrae et praecipue Solis, quippe a sensu ipso: at illud sensus testatur, plane ut est cum sex planetis circa Solem, sic etiam se rem habere cum quatuor Jovialibus, ut circa corpus Jovis quilibet, quo longius ab illo potest excurrere, hoc tardius redent, et id quidem proportionem non eadem, sed majore, hoc est aescupla proportionis intervallorum ejusque a Jove: quae plane ipsissima est, quam utebantur supra sex planetae. Intervalla enim quatuor Jovialium a Jove prodit Marius in suo Mundo Joviali ista: 3, 5, 8, 13 (vel 14 Galilaeo) ac si orbiculi illorum interstingerentur tribus figuris rhombicis, 1) rhombo dodecaëdro inter intimos, quorum intervalla 3, 5; 2) rhombo triacotaëdro inter medios, 5, 8 et 3) cubo, non vere rhombico, sed principio quodam rhomborum, inter extremos 8, 13 (vel 14). Periodica vero tempora prodit idem Marius ista: dies 1. b. $18\frac{1}{2}$, dies 3. b. $13\frac{1}{8}$, dies 7. b. 3, dies 16. b. 18: ubique proportio est major quam dupla, major igitur quam intervallorum 3, 5, 8, 13 vel 14, minor tamen quam quadratorum, qui duplicant proportionem intervallorum, sc. 9, 25, 64, 169 vel 196, sicut etiam aescupla sunt majora simplis, minora vero duplis. (v. cap. 67.)

Cum itaque tam exactus sit consensus Jovialium cum ipsis sex primariis: non lautum hinc recte supra coniecimus, etiam Jovis corpus circa suum axem verti ad exemplum Solis, ut constet analogia omnibus suis membris, sed hic jam insuper etiam hoc in genere confirmamus haud inepte, rotationem hanc primariorum circa suos axes causam esse circuitus secundariorum circa suos primarios: id 5) tanto probabilius, quod videmus, uti Sol major est omnibus planetis, quos ipse movet, sic etiam Terram Luna sua, Jovem suis satellitibus esse multo majores eoque nomine aequae ac Solem aptos ad movendum. Reliquae verisimilitudines rerum Lunam attinent. Nam 6) cognata esse corpora Lunae et Terrae, docuit nos telescopium, quod iudicia facit in Luna montium et marium, qualia sunt in nostro Terrae globo. Cognationem hanc agnovit etiam Aristoteles, defensor alias quintae coelorum essentiae accrimus, qui, referente Averroë, Lunam dixit videri Terram quandam aetheream. Taceo Plutarchum et philosophos ceteros apud Macroblum.

Quomodo igitur, ut magnes magnetem aut ferrum trahat, cognatio corporum efficit, sic etiam de Luna non est incredibile, ut illa moveatur a

Terrae cognato corpore, licet nec hic nec illic intercedat aliquis contactus corporum. Adeoque 7) quid mirum, Lunam a Terra moveri, cum videamus vicissim et Lunam transitu suo super vertices locorum causari fluxum oceanum reciprocum in Tellure? Nonne satis evidens hoc est documentum communicationis motuum inter haec duo corpora? Tandem 8) confirmatur idem etiam hac analogiae parte residua: Sol et Tellus gyrantur circa suos axes, quod experientia certum est, de Sole per se, de Terra saltem apud Copernicum, scilicet ut hac gyratione planetis circa se positus motum inferant, Sol sex primariis, Tellus Lunae; Luna vicissim non gyratur circa eam corporis axem, maculis id arguentibus. Cur autem hoc, nisi quia circa Lunam nullus amplius planeta circumire cernitur? Nullum igitur habet Luna planetam, cui motum inferat gyratione sui corporis, gyratione igitur in Luna, ut supervacua, fuit omissa.

Haec octo argumenta si non prosunt singula, juncta juvabunt.

Absurdum vero videtur, Terram, quae lumine caret, aequiparari Soli, fonti lucis; hac enim qualitate vis Solis motrix redditur verisimilior. Et si lumen Solis suas partes in expediendo motu peragit, non pollet tamen corpus Solis vi motrice propter solum lumen; nihil enim impedit, duo veluti subiecta virtutis motricis in Sole concurrere, lumen et corpoream affectionem magneticam, eorumque posterius tantum in Tellure inesse: sane quia Tellus etiam nunc solum eumque ignobilissimum planetam (quippe secundariorum unum) movet, nec sola sine adiumento movet virtus Telluris magnetica, ut audiemus, nec hanc vim Tellus omnem ex se habet, licet in se, sed eam ex parte continuatione lineae ex Sole in sece, veluti canali quodam, et omnino cum ipsa sui corporis illuminatione hausisse inque novum fontem, in corpus ac. eum derivasse videtur, ut paulo ante dictum et infra clarius dicitur.

Terrae gyratione circulum aequatorem observat, Lunae motus zodiacum, qui multum ab aequatore declinat; non est igitur verisimile, Lunae motum esse a gyratione Telluris. Nihil magis hoc nobis officit in Luna quam in planetis ceteris, qui etiam declinant in plagas quilibet suas, temonemque, ut sic dicam, tenent manibus versantque suo arbitratu et ad latera seu ripas fluminis enavigant, tamen nihilominus rapiuntur interim vi vorticis motorii communis ex Sole emanantis, et sic etiam illum suum distinctum motum communis fluminis motui ferunt acceptum, sicut Luna suum obliquum motum per zodiacum acceptum fert motui Telluris recto secundum aequatorem.

Cur igitur Luna universum iter suum zodiaco potius accommodat, quam aequatori? Quia praeter proprium circuitum Lunae circa Telluris globum, de quo hactenus, movetur etiam totum coelum Lunae communi motu cum centro Telluris circa Solem sub zodiaco ut ceteri planetae: quae ex compositione fit, ut Luna respectu quidem centri Solis semper teneat directum cursum in consequentia, non tantum tunc, quando plenam illam et Sol et Terra extentis spatii iucitant in plagam eandem, sed etiam tunc, quando extinctam seu vacuum Sol quidem prorsum, Tellus vero (respectu quidem centri Solis) retrorsum impellit. Nam hic impulsus ex Terra adhuc multo est minor illo ex Sole, quare diminuit quidem hic illum in consequentia latum, at non penitus absorbet, multo minus proficit in contrarium. Vide schema huius compositi motus Lunae in Com. Martie fol. 149. (III. 387.)

Cum igitur fluxus ille speciei Solaris sub zodiaco incedens sit major, alter speciei Terrestris, qui sub aequatore, minor, cum insuper Luna Soli conjuncta ratione celeritatis et plagae ortus vel occasus, in spatio mundano

plus illi obsecundet quam huic: huic fieri existimo, ut etiam ratione plagarum laterarum Solaris ut fortiori plus obsecundans, sicuti toto suo coelo circa Solem, sic etiam corpore circa Terram, sub zodiaco cogatur incedere, seu orbitam suam circa Terram zodiaco subordinare.

Nullane hinc nascitur anomalia motus Lunae, si illa in signis quidem tropicis secundum ductum speciei terrestris incedat, quia zodiacus et aequator illis in partibus sunt paralleli, at in signis aequinoctialibus obliquo tramite hanc speciem terreni corporis traficiat? Rursum eadem ad hanc objectionem diluendam respondeo, quae circa latitudines. Scilicet species corporis Telluris in sui medio sub aequatore est fortissima, ad latera aequatoris debilior, quia etiam in fonte, sc. in globo Terrae, circuli aequatoris paralleli, ut minores, tardius incitantur quam aequator, circulus maximus. Fit igitur compensatio: ut qua Luna fortem experitur speciem motricem, ibi non totam observet, in transversum abiecit, qua totam observat, illi penitus obsecundans, ibi debilem experiat. Et si de omnimoda compensatione nihil prouincio, cum Lunae observationes etiamnum in minimis dissentiant a quibuscunque calculis, incertumque sit, quorsum referenda sit illa discrepantia.


Quomodo Luna potest etiam circa Solem ferri motu annuo, satellites quatuor circa Iovem communi motu duodecennali, sic ut interim non descendant vel dimittant, Luna Terram, Joviales Iovem, si nullis orbibus annexi sunt, illa Terrae, hi Jovi? Circa Solem quidem occurrunt vehuntur eadem virtute speciei Solaris, qua etiam primarii illorum, Tellus et Jupiter vebuntur, circumagerentur vero tanto celerius quam sui primarii, quanto sunt expeditiores ad motum densitate, mole, pondere, nisi retineantur et preussentur a Terra et Jove vi magnetica, ejus simili, qua etiam Sol praeditus est. Haec vero prensationis vis, ut supra etiam de planetis dictum, continetur contrariis virtutibus accessus recessusque Lunae a Terra, ut quae revoluta circa axem hac prensatione secum etiam Lunam circumagat, plagas sui corporis, quibus accessus et recessus perficitur, interim permutantem. Respice ad sechema 62. Finge plagam globi Lunae amicam Terrae obverti nec permutari cum plaga contraria, finge etiam Terram non rotari circa axem, ferri tamen circa Solem: hic Luna curret eundem cursum cum Terra interimque et trabetur a Terra, usque dum illi ad contactum veniat. Finge vicissim idem de plaga inimica: hic Luna fugiet Terram tantisper, dum extra orbem virtutis Terrae magneticae venerit, tunc sane se permittet soli raptui Solis et sic penitus aberrabit a Terra.

Didisti, medium circulum Terrae paulo minus quam sexagies angustiorum esse orbe Lunae: est vero idem Terrae circulus tricies tantum celerior Luna, quia triginta diebus minus semisse Luna revertitur. Tardior igitur est circulus Terrae centro Lunae circa Terram in ratione dupla. Quomodo igitur corpus, quod incedit tardius, inferet Lunae motum suo ipsius motu majorem duplo et celeriorum? Non est haec objectio Lunari motui peculiariter adversa, sed communiter omnibus planetis, nec quicquam habet absurdum. Corpora enim ista Solis et Telluris non moventur contactu, sed speciebus sui dilatatis seu explicatis in omnem corporis mobilis orbitam. Jam species corporis Terrae, quantumcunque per spatium emanans, vertitur cum Tellure, fonte suo, eodem tempore horarum 24, cum tamen eo loco, quo prenasat Lunam, sit ejusdem amplitudinis cum orbe Lunae. Permeat igitur ista species, sexagies amplior Terra, permeat inquam Lunae orbitam totam in uno mense trices, cum Luna intra idem spatium revertatur tantum semel, Terrae speciem

insecuta. Manet itaque verisimilitudo, quod species ista corporis Telluris mota moveat Lunam, sic tamen, ut vincat inertia corporis Lunaris partes spatii fere 29 dietim, vincatur non plus quam 30.

Quare statuis, speciei Telluris motrici Solem concurrere etiam ad illum motum, quo Luna circa Terram volvitur? 1) Quia Tycho Brahe deprehendit, motum Lunae medium (hoc est, exutum illa anomalia, quae in omnibus

Fig. 66.



planetis existit propter eccentricitatem orbitae) etiamnum esse anomalon seu inaequalem. Semper enim celerior est Luna in copulis, ut hic in CD, GH, tardior in quadris EF, IK, quam fert ratio eccentrici, sive in apogeo utrobique fuerit, sive in perigaeo, seu quocunque alio loco sui eccentrici; et (si presse insistendum est hypothesei Tyconicae variationis sic dictae) praecise quidem tanto celerior illic, quanto tardior hic. At vero species ipsa Telluris in rotatione constitutae, intelligenda sub circulo DFHK, celeritatis est uniformis circumcirca, tam iis partibus, quae versantur in copulis D, H, quam iis, quae in quadris F, K, intellige in uno et

codem intervallo Lunae et Terrae. Oportet igitur ad speciem hanc motricem accedere causas motus alias, quae ad Lunae phases sint accommodatae; atqui Lunae phases efficiuntur a Sole: Sol igitur adjuvat motum Lunae circa Terram.

2) Firmat fidem huius concursus Solis, quod prius fol. 360. idem Sol accersitus fuit, qui etiam Telluris in revolvendo celeritatem adjuvaret illuminatione globi, cujus hic medius circulus AB. Hinc enim primam tanquam in exemplo Telluris intelleximus, etiam in lumine Solis vim inesse vegetandi motum, deinde necessarium etiam pro Luna argumentum indidem uocimus. Nam si DFHK species corporis Terrae AB, ut illa est in turbinatione constituta, movet Lunam, Sol vero turbinationem hanc lucitat: per Terram igitur ejusque speciem incitatum incitabit et Lunam.

Num igitur aliter se habet haec illuminatio, Luna in quadris F, K versante, aliter in D, H copulis? Minime vero: nam utrobique medietates globorum illuminantur, tam Telluris AB, quae motum infert, quam Lunae CD vel GH, cui motus infertur. Quin etiam Telluris ex hac illuminatione celeritatem utroque tempore aequalem esse, jam modo dictum est.

Unde igitur huic accessoriae causae disparitas illa venit effectus, ut motum Lunae in D, H copulis acceleret plurimum, in F, K quadris nihil? Et quid e contrario retardat motum Lunae in quadris F, K? Nulla pars physicae coelestis hac ipsa difficillior fuit explicatu: quam ut qua licet expediamus, schemate erit utendum Nro. 66.

Memineris igitur, circulos omnes, qui terminant illuminationem globi Lunae, ut CD, GH et reliquos, esse partes totidem superficierum sphaericarum, in quas lumen, ex Sole ut centro veniens, explicatur, circulum vero DFHK repraesentare speciem corporis Telluris AB, in ejus centro siti, motricem Lunae. Vides in D, H copulis invicem applicari per contactum speciem luminis CD et speciem corporis Telluris OCDL, quae in L, M, N, O se mutuo secant angulis obliquis, ut applicatio sit imperfectior, at in EF, IK quadris,

sectio fit ad angulos rectos, applicatio igitur fit plane nulla, cum sectio Lunae teudat in centrum Terrae eique de circulo NIO merum punctum respondeat.

Cum igitur alia causa non appareat accelerationis in copula, statuendum erit, facultatem confortatoriam speciei Terrae motricis ODL inesse lumiui CD seorsim, non jam quatuor fons ipsius, id est corpus Solis rotatur (valuit haec a motu modificatio supra, cum de speciebus ipsorum corporum Solis et Terrae sine respectu lumiuis loqueremur), sed qua lumen, nimirum secundum genuitum luminis et essentialem quodammodo figurationem. Si igitur statuamus, fortificari speciem hanc corporis Telluris per modos applicationis ejus ad orbes luminis, causa et mensura erit in promptu accelerationis in copulis CD, GH validissimae, nullae vero in quadris. Cum autem per DFHK repraesentetur non tantum species corporis Terrae ut agens seu motrix, sed etiam orbita ipsa Lunae ut patientis seu rei motae (quanquam tunc Terra non erit in centro circuli locanda, sed propter), concipiendum erit amplius, vel Lunae corpus in CD, GH copulis disponi ad motum secundum diffusionem seu superficiem luminis, melius quam in EF, IK, ubi Luna transversos diffusionis circulos secat, vel viam Lunae ipsam in D, H quasi lubricam effici, in F, K asperari, veluti super tabula per transversos ligni poros. Nec id absurdum valde fuerit. Cum enim iussit in lumine vis fortificandi motum, ut positum est, certe qua tendit una dimensio luminis, faciliorem par est esse tractum. Porro idem dicunt quoad effectum, alter, qui Lunam dicit accelerari in D, H retardarique in F, K, ntrumque in proportione, quam haec applicationes pariunt, simplici, alter, qui Lunam in D, H plurimum, in F, K nihil accelerari dicit, sed id in proportionem dupla ejus, quae ex hie positis applicationibus resultat.

Nisi quis hanc geminatum luminis efficaciam malit transcribere duabus dimensionibus superficiei lumiuis, ut, quanvis non minus species quaecunque corporum immateriae, quam lumen, diffundantur tam in longum quam in latum, illae tamen efficaces hactenus fuerint saltem longitudinis respectu, hoc vero et longitudinis et latitudinis, propterea quod species quidem movet, ut mota, movetur autem in longum tantum, lumen vero fortificat ut lumen, hoc est, ut suam obtinet densitatem tam in longum quam in latum.

Quare lumini vim fortificandi causam motricem tribuis seorsim et citra respectum rotati sui fontis? Quia, quatenus species rotati fontis movet, semper in consequentia ODL movet, et de hoc ejus effectum in movenda Luna jam est transactum in principio hujus loci; haec vero vis luminis proficit ad Lunam incitandam etiam in antecedentia MIIN respectu centri Solis, tunc scilicet, cum illa nobis apparet lumine vacua seu Soli juncta. Non igitur lumen se ipso conciliat motui plagam, sed per speciem MIIN incitatum.

Si haec vis inest lumini, major inest densiori circa GH, utpote in vicinia Solis, minor sparsiori, circa plenam Lunam in CD, cum illa tricesima parte intervalli remotior est a Sole: celerior igitur erit nova quam plena, ceteris paribus. Compensat debilitatem luminis CD perfectior applicatio, quippe cavitatis CD plaurioris quam GH. Cum igitur fortificatio fit per applicationem specierum, in plena Luna sparsior lux, applicata perfectius, tantumdem praestat, quantum in silente densior, applicata imperfectius. Eadem autem sunt intervalla Lunae et Solis, et quae luci densitatem, et quae circulis CD, GH curvitatem admetuntur suam; quare perfecta fit compensatio densitatis in longum per curvitates CD, GH. Alteram vero illam partem effectus luminis pensat altera diversitas applicationis. Nam etsi aequaliter

curvae essent CD et GH, tamen ibi convexum OCDL se insinuat cavo CD, hic convexum MGHN obvertitur ipsi GH speciei lucis, versus Terram convexae.

Si appendix ista graduum 133 ad synodos 12 in anno sidereo est ex incitatione illa copulari motus Lunae, oportebit et quantitatem incitationis illius respondere. Equidem incitatur apud Tychonem Brahe motus Lunae in uno gradu in copulis $1' 26''$, tantundem et retardatur in uno gradu in quadris: quare si retardatio deleatur per duplicem incitationem, erit maxima copularum incitatio $2' 52''$. Quare si omnium 90 graduum sinus quadrati portioneculas suas in unam summam conferant, accumulabimus $2^{\circ} 9'$, in anno igitur sidereo $106^{\circ} 22'$, non vero $132^{\circ} 45'$.

At primo non est certissima quantitas maximae variationis apud Tychonem, qui eam in gradu 45° exhibet $40\frac{1}{2}'$, itaque si ea statuatur $51'$, aequamque summam praescriptam, sumta primi gradus incitatione $3' 34'' 40'''$ (seu forma Tychonis $1' 47'' 20'''$ et aequali retardatione nonagesimi seu in quadris) colligiturque sic in uno quadrante summa $2^{\circ} 41'$, quae infra, cum de causis inaequalitatum agemus, magnam acquirat verisimilitudinem. Deinde si maxime retineamus quantitatem Tychnicam parvam in gradu 45° , possent et antecedentes et sequentes alia forma, quam est Tychnica, distributae summam efficere optatam, aut latent nos causas minutulae, quae nonnihil de illis 133 demont in variationis tractatione. (Cfr. annot. 58.)

Qua igitur proportione distributum putas motum Lunae menstruum circa Terram inter has duas causas, speciem scilicet corporis Telluris et circulum illuminationis corporum? Videmus, dum Tellus circa suum axem revolvitur tricies, minus quam semisse deinto, Lunam interim circa Terram redire semel, a Sole scilicet ad Solem. Ita fit, ut in uno anno seu diebus 365. h. 6. 9' $26''$ Luna duodecies revertatur et de revolutione tredecima plus quam trientem, hoc est 132° cum dodrante adjiciat. Consentaneum igitur est, sic attemptatam esse densitatem materiae in corpore Lunae ad illum gradum archetypicum fortitudinis in specie corporis Telluris, ut nisi illuminatio adjuvaret Telluris revolutionem diurnam et per hanc etiam Lunae promotionem, ipsa Luna simplici virtute motrice Telluris paulo tardius, nimirum praecise duodecies reversura fuerit. Hoc posito sequitur, residuos et veluti supernumerarios illos 132° cum dodrante revolutionis tredecimae inchoatae ferendos esse acceptos alteri causae motrici, sc. illuminationi.

24. Densitatis igitur in corpore Lunae temperamentum aestimas 12 revolutionibus Lunae in uno anno; quam hujus numeri causam dices archetypicam? Causa videtur esse composita ex pulchritudine geometrica et ex officio planetae hujus in mundo, in hunc modum. Est enim Luna planeta secundarius et Terrae tributus circaque Terram privatim suos cursus exercet. Jam vero Terrae destinabantur revolutiones 360, interim dum centrum Terrae semel circa Solem revertitur. Sicut igitur Lunae orbis in superioribus medium proportionale fieri debuit inter corpus Telluris et orbem, in quo centrum Terrae vere, Sol apparetur, circumit, sic etiam revolutiones Lunae plures una, pauciores vero quam 360 esse debuerunt. Et medium quidem proportionale inter 1 et 361 est 19; sed quia numerus 361 non est 360, nec 19 ullam habet pulchritudinem, nec geometricam nec harmonicam: duo igitur ipsi 19 proximi, qui in se ducti 360 efficerent, iidemque geometrici et harmonici pulcherrimi debuerunt eligi. Proximi quidem qui 360 efficiunt, sunt 18 et 20, quia sola unitate est ille minor, hic major quam 19; at figura 18

laterum non est demonstrabilis. Sequuntur proximi 15 et 24, qui etiam 360 efficiunt. Hi jam habent suas demonstrationes geometricas, sed viliores nec inter se proportionem efficiunt praestantem, sed illam, quae est inter 5 et 8, nec in harmonicis omnium sunt excellentissimi et primi. At bi 12, 30 (nec enim propiores alii efficiunt 360) omnibus modis excellunt: tam geometricae, ut qui a primis figuris in circulum inscriptis gignuntur, quam harmonice, quia omnes harmoniae duabus hisce divisionibus chordae repraesentantur. Ex his igitur, qui in se mutuo dacti 360 efficerent, pulchriores nulli fuerunt. Porro minor 12 debebatur revolutionibus Lunae, non major 30, quia cum Lunae orbis quandam gerat imaginem orbis Solis, conveniebat etiam, ut sicut annus, qui est tempus periodicum Solis, divisus est in 360, numerositate multa, sic etiam mensis, qui tempus est periodicum Lunae, partes seu dies sortiretur numero plures, quam toti menses in anno insunt, utque cresceret numerositas in progressu, si primum annus, magnum tempus, in menses 12, partes grandes, inde mensis, parvum tempus, in dies 30, partes minutae divideretur; numerositas enim parvis apta est. Id non eadem pulchritudine futurum erat, si triginta menses in anno, singuli duodenorum dierum, fuissent.

Unde verisimile facis, ab eadem causa esse et illud auctarium revolutionum Telluris in anno ad numerum 360, et hanc appendicem motus Lunae in anno ad revolutiones Lunae menstruas duodecim? Testimonium huic rei praebent cum ipsae rationes huius philosophiae, ut, quia diurna conversio globi Terrae movet Lunam, pinas etiam et celeriores factae Terrae conversiones celerius moveant Lunam saepiusque restituant, tum imprimis numerus dierum anni Solaris 365 hor. 6 paulo plus, comparatus et cum archetypico 360 et cum numero dierum anni Lunarum 354 hor. 9 paulo minus.

Cum enim ex archetypo debuerint esse dies in anno 360, revolventes Lunam duodecies, sint vero per accessionem causae alterius facti 365: omnes igitur revolutiones sunt factae celeriores in proportionem, ut est 360 ad 365, eoque et fortiores ad movendam Lunam. Simul autem et plures sunt factae, sc. 365: ergo archetypicarum 360 facultas aestimanda est numero 360, at jam harum 365 facultas aestimari debet non numero 365, quippe celeriorum, sed numero, qui est tertio loco proportionalis, sc. 370. 36' 50'', si minutias consecretur. Quodam facultas, signata numero 360, movisset Lunam, ut 12 reditus ad Solem et eorum ultimum ad ejus locum initialem sub fixis absolvisset: ergo in eadem proportionem facultas aestimata numero 371 faciet illam superare Solem duodecies et insuper locum ejus initialem 127° 10', et quia Sol post absolutos 360 dies, quot erant in archetypo, adhuc abest ab initiali sub fixis loco per 5° 10', quanto spatio circulus, qui erat in archetypo divisus inter 12 loca lunationum, factus est contractior: adjecti igitur hi 5° 10' ad illos 127° 10' efficiunt 132° 20'. Ecce quam prope veniat haec rationatio ad veritatem in tabulis astronomicis, ut quae superationem Lunae in anno sidereo produnt 132° 45', tantum 25' amplius. Idem etiam per dies anni Lunarum colligemus sic. Facultas motrix revolutionum Terrae 360 restituisset Lunam Soli in loco quidem ejus initiali, duodecimum: ergo facultas pauciorum revolutionum, sed tanto fortiorum factarum, tantundem praestabit. Ut igitur 365 (1/4) revolutiones ad 360, sic facultas archetypalium 360 ad facultatem modernarum 354 cum horis 19. 33'. Tot igitur revolutiones Terrae, jam intensiores factae, restituturae fuerunt Lunam Soli duodecimum, siquidem spatia inter binas copulas non fuissent contracta per augmentum numeri revolutionum. At quia inferetis in annum diebus supernumerariis, dies 360^{mas}, ut

archetypicus, abscindit modulum contractionis de zodiaco, de quo debentur anni Lunaris longitudini proportionaliter $5^{\circ} 6' 41''$, totidem igitur gradibus etiam Luna sublevatur, ut illa etiam non confectis in spatio mundano tamen ad Solem redeat duodecimum; valent autem horas 10. 4', quibus ablatis ab inventis h. 19. 33', manent in appendice ad dies 354 horae 9. 29', pro quibus astronomicae tabulae tradunt horas 8. 49', tantum besse unius horae minus, quae differentiola aliis minutis circumstantiis transcribi potest. Interim satis exacte comprobatum est utraque via, numerorum hanc aberrationem ab integris et pulchris esse ex concursu cansarum motus Lunae, patetque causa, cur 360 sit fere medium proportionale inter longitudes annorum, Lunaris et Solaris sideris. ⁸⁶⁾

451: 91

LIBRI QUARTI

PARS TERTIA.

DE MOTUS PLANETARUM REALI ET VERA INAEQUALITATE ET CAUSIS EJUS.

Unde nomen habent planetae, quod latine sonat erronnes? Ab illa multiplici varietate motuum propriorum, quae, si oculorum iudicium sequaris, nullam legem, nullum certum circulum, nullum definitum tempus habet, comparatione cum stellis fixis instituta.

Quotupliciter errare videntur planetae? Tripliciter. 1. In longitudinem sphaerae fixarum, quam diximus extendi secundum eclipticam. 2. In latum, seu ad latera bina eclipticae versus ejus polos. 3. In situm, hoc est in linea recta a centro visus in profundum aetheris porrecta. Etsi haec varietas non solis oculis detegitur, sed accedit ratiocinatio ex variata magnitudine apparenti tam corporum quam arcuum.

Quid tenendum est de his erroribus planetarum, verene errant omnem illam varietatem, an visus tantummodo fallitur? Etsi motus iste non, plane sic, ut incurrit in oculos, corporibus ipsis planetarum inest, sed multa hic sese fallacia visus iusinnat, tamen sublati mente fallacis bisec, restat etiamnum inaequalitas aliqua motuum inestque re vera planetis omnibus.

Qualis igitur est ille verus planetarum motus per circumstantias? Est constans quidem, quoad periodos integras, tenditque circa Solem, centrum mundi, in signorum consequentia perpetuo, nec unquam haeret uno loco, stantii similis, multoque minus unquam fit retrogradus; sed tamen inaequalis est celeritatis per partes facitque planetam in una certa parte circuitus longius a Sole excurrere et in opposita proxime Solem venire, ubi quo longius excurrit, hoc tardior est, quo propius accedit, hoc velocior, denique in una circuli parte egreditur ad septentrionem ab ecliptica, in altera in austrum; itaque inaequalitas illi realis adhuc triplex superest, in longum, in latum et in altum, id quod astronomi documentis idoneis probant, de quibus libro VI.

I, Causae verarum inaequalitatum.

Dico, quid de hujus inaequalitatis causis senserint veteres. Veteres hoc voluerunt esse munus astronomi, ut causas apparentis hujus inaequalitatis tales

afferat, quae de ipso vero planetae vel orbium motu testimonium praebeant, quod is sit regularissimus, aequalissimus et constantissimus, figurae etiam simplicissimae, scilicet circularis exactissime, neque audiendum esse censuerunt illum, qui aliquid inaequalitatis re vera poneret in ipsis corporum horum reabilibus motibus.

Censen' tu retinendum esse hoc axioma? Trifariam respondeo. 1) Regulares esse motus planetarum, id est ordinatos adque certam et immutabilem legem descriptos, id est extra controversiam. Hoc enim nisi esset, nulla astronomia esset, nec praedici possent motus coelestes. 2) Sequitur igitur, ut aliqua sit inter periodos integras conformitas. Nam lex illa, de qua dixi, una atque perpetua est, vices seu emensiones circuituli coelestis innumerabiles. Quodsi omnibus eadem lex regula, sunt igitur omnes vices inter se similes et decursu temporis aequales. 3) At nonnum concessum est, etiam in uniuscujusque circuitus partibus diversum motum re vera esse aequalem. Testatur enim astronomia, si ab illa confusione planetarii motus apparenti removeamus mentis omnes visus fallacias, relinqui planetae circuitum talem, in cujus diversis partibus, re vera aequalibus, inaequalis sit planetae celeritas, non minus quam in angulis ad Solem, causa temporis aequalibus, est apparens inaequalitas. Et Ptolemaeus ipse, diversis centris pro regula motus eccentricorum et epicyclorum constitutis, facit illos suos circulos uno tempore moveri incitatus, alio remissius. Denique testatur et de hoc astronomia, subtilitate decenti tractata, planetarum itinera seu circuitiones singulas non ordinari praecise in perfectum circulum, sed fieri ellipticas.

Quibus vero argumentis veteres suam sententiam huic tuae contrariam stabilierunt? Quatuor potissimum: 1) a natura corporum mobilium, 2) a natura virtutis motricis, 3) a natura loci in quo sit iste motus, 4) a circuli perfectione.

Dic argumentum eorum a natura corporum. Sic sunt ratiocinati: corpora illa non esse composita ex elementis, nullam itaque neque generationem neque corruptionem, nullam alterationem quicquam in illa juris habere. Testari de hoc seculorum omnium experientiam: semper enim eadem spectari corpora, nihil in mole, nihil in numero, nihil in specio mutatum deprehendi. Jam vero motus corporum elementariorum ob hoc ipsum esse varios et inconstantes, quia elementa varie misceantur ad eorum constitutionem et in mixtis inter se pugnent. In coelestibus igitur, ubi nulla talis mixtio, nulla in mixtis elementorum pugna, nullum etiam locum esse turbulentiae, nullum inaequalitatis.

Quid respondendum censes ad hoc argumentum? Si de inordinata turbulentia motuum loquitur argumentum, talis equidem in coelo nulla est; nulli tumultus coelestes, quales in tonitribus

Pugnantum inter se flammae et stillantis aquae:

quia compositio corporum mundanorum generis est diversissimi. Siu autem omni etiam regulari inaequalitati opponitur, jam non omnis, non certe regularis ista motuum intensio remissioque est ex elementorum pugna et mixtione in corporibus motis nec ex eo, quod illa sunt mutabilia. Oritur enim inaequalitas aliqua motuum ex hoc ipso, quia corpora sunt, tam quae moventur, quam quae motum inferunt, et quia sua materia constant, sua quantitate, sua figura, tam intus quam extra, et secundum quantitates et figuras etiam sua potentia naturali sunt praedita, quae minus potest in mobile longinquum quam in propinquum: ubi facultates inter se moventis et moti concedunt po-

tius, quam pugnant. Sic magnes lapide una corporis parte ferrum trahit, altera abigit, non utique propter aliquam mixtionem elementorum, sed propter internamfigurationem rectilineam, secundum quam habet insitam virtutem; sic idem magnes fortius attrahit ferrum propinquum quam longinquum, non quod, cum propior est, plus ignis aut terrae habeat, sed quia virtus ejus cum ipsa elongatione extenuatur. Manent nihilominus corpora coelestia (hoc est mundana) perennia et immutabilia, quoad totas moles (nam quae in eorum superficiebus mutationes eveniunt, eas nullum afferre momentum possunt ad turbandos totarum motuum), ex qua totorum globorum perennitate et ex eo, quod nihil est in mundo inordinatum, quod motus eorum impediat, dependet etiam illa regularitas circuituum similitudineque perpetua, et inaequalitatis per partes singulas constans aequalitas per vices integras.

Recense secundum argumentum veterum, a causa movente ductum. Dixerunt, virtutes motrices corporum coelestium esse simplicissimae substantiae, mentes nimirum divinas et purissimas, quae quod agunt constanter agant, perpetuo similes; aequabilissima contentione virium usas, nunquam fatigatas, quia laborem nullum sentiant. Causam itaque nullam esse, cur aliis temporibus aliter moveant suos globos, adeoque etiam figuras motuum ob hanc ipsam mentium naturam perfectissimos esse circulos.

Quid tu contra opponis? Etsi virtus motrix neque Deus aliquis est, neque mens, concedendum tamen est, quod vult argumentum, partim etiam de illa causa motrice, quam velut philosophia insinuat, scilicet de potentia naturali corporum, quod ubiennque et in quantum talis potentia est solitaria; aequabilissime et in perfectum circulum moveat, idque sola nisi necessitate et essentiae suae simplicitate perenni. Sic fit in convoluzione corporum Solis (et forte etiam Telluris), quae ab una sola causa motrice est, seu illa corporis sit qualitas, seu soboles animae, corpori connatae. Manet enim axis enim duobus oppositis polis, corpus vero circa axem volvit aequabilissime et circularissime. Sic fieret etiam, si globus aliquis planetarius eodem semper intervallo a Sole abesset; raperetur enim a Sole perfectissimum in circulum aequabilissime per emissam speciem immateriatam corporis Solaris, in aequabilissimo gyrationis motu constituti, quo eodem aequabilissimo motu species etiam ista corporis in amplitudine spatii mundi circumit, instar conellati vorticis.

At quamvis haecenus concesserimus argumentum veterum, nondum tamen hinc sequitur omnimoda motuum aequalitas. Ad motum enim concurrunt non tantum virtus motrix et corpus mobile, sed etiam interna figuratio corporis mobilis rectilinea, quae pro diverso situ ad Solem diversimode etiam in motu afficitur, ex una plaga expellitur, ex altera trahitur introrsum; concurrunt axis magnetici de mobili corpore quies in situ parallelo, ex qua quiete interna et ex circumrotatione ab extra veniente existit illa permutatio situs partium planetae ad Solem; concurrunt denique intervallum inter Solem et planetam, quod per illam expulsionem et attractionem variatur: mutato vero intervallo et planeta veniente in virtutem densiorem aut rariorem, necesse est motum ejus etiam intendi vel remitti et figuram itineris fieri ellipticam. Ita respectu concursus tot requisitorum virtus planetam movens non potest dici simplex, quia movet alio atque alio gradu suae speciei.

Quod erat veterum argumentum a loco? Sic collegerunt: elementarem regionem circa centrum mundi esse, coelum in superficie, corporibus igitur elementaribus competere rectum motum, qui principium et finem habeat,

quique gravitatis et levitatis contrariis principiis dispensatus quodlibet illorum corporum in suum locum referat, indeque fieri, ut pro alia atque alia appropinquatione ad locum naturalem, seu ad scopum, alia etiam atque alia sit celeritas et denique mera quies. At coelestia corpora in circulari spatio mundi versari perpetuo, quod argumento esse, illa neque gravia neque levia esse, nec illa moveri causa quietis seu loci occupandi, ut in quo semper vereretur, sed ideo tantum moveri, ut moveantur: itaque et motum eorum aequabilem et speciem motus aliam quam rectilineam, sc. aptam aeternitati motus, hoc est in se redeuntem, esse oportere.

Quid respondes ad hoc tertium argumentum? Non omnis inaequalitas motuum est ex gravitate et levitate, proprietatibus elementorum, sed aliqua etiam ex mutatione intervallii, ut patet in vecte et staterna, atque haec causa progignit motuum coelestium intensiorem et remissionem, ut haecenus explicatum. Aliud iterum est cavendum, esse nihilominus aliquam cognationem inter principia gravitatis et levitatis in elementis et inter naturalem inertiam globi planetarii ad motum, sed per quam nulla excusatur inaequalitas motus. Quod vero figuram attinet motus, argumentum non plus concludit, quam ipsi largiri possumus: motum scilicet esse in se ipsum reflexum, cujusmodi est non tantum circularis, sed etiam ellipticus, itaque assumpta non negantur. Vere enim corpora, quae circa suos axes volvuntur, in hoc tantum moventur, ut motu suo perenni servantur alieui necessitati globi sui, quidam etiam, ut replant planetas circa se in gyros perennes.

Dic quartum ceterum argumentum a figura circulari petittum. Sic philosophati sunt: ex omnibus motibus in se redeuntibus simplicissimum esse circularem et perfectissimum, ceteris omnibus, ut ovali et similibus, rectitudinis aliquid admixtum esse, hunc igitur circularem naturae corporum simplicissimae, hunc divinis mentibus motricibus (ut cujus pulchritudo et perfectio sit quippiam mentale), hunc denique coelo, quod sphaericam habet figuram, esse familiarissimum.

Quomodo dituendum hoc est? Ad haec ego sic respondeo: primo si motus coelestes essent mentis opus, ut crediderunt illi veteres, admodum speciosa concluderetur, itinera planetarum esse perfecte circularia. Nam tunc species motus, mente concepta, esset virtuti pro regula et scopo, ad quem motus referretur. At motus coelestes non sunt opus mentis, sed naturae, hoc est naturalis corporum potentiae aut animae, secundum illas corporales potentias uniformiter agentis, quod non alia re validius comprobatur, quam hac ipsa observatione astronomorum, qui fallacis visus legitime separatis deprehendunt, relinqui in reali et verissimo motu planetae figuram cirenit ellipticam, quae de potentia naturali corporea deque ejus speciei emanatione et quantitatibus testimonium fert. Deinde, ut largiamur illis intelligentias, nondum tamen obtinent quod volunt, omnimodam scilicet perfectionem circuli. Si namque de sola pulchritudine circuli ageretur, circulus et mente rectissime cereretur, et corpora ipsa qualiacunque, maxime coelestia, decoraret, quippe quantitatis participia, quantitas pulcherrima. Sed quia praeter mentem tunc opus esset etiam facultatibus naturalibus et animalibus ad movendum, illae suum etiam sequerentur ingenium, nec omnia ex mentis dictamine, quod non perciperent, sed multa ex materiali necessitate agerent: non mirum igitur, si facultates istae perfectionem, inter se mixtae, nequirent assequi penitus. Concedunt ipsi veteres itinera planetas eccentrica, quae multo major videtur de-

formitas, quam via elliptica, et tamen mentium suarum providentia hanc deformitatem cavere non potuerunt.

Saepe autem monui, dum nego, motus coelestes esse mentis opus, me tum non loqui de mente crestrice, quam equidem omnia decent, sive circuli sive elliptica, sive per mentes administranda et repraesentanda, sive per materialem necessitatem coacta ex principiis semel positis.

II. De causis inaequalitatis in longum.

Quas ergo tu causas tradis, cur, quamvis omnia primariorum planetarum itinera circa Solem ordinentur, anguli tamen (quibus quasi ex centro Solis spectantur diversae partes itineris unius planetae) non conficiantur a planeta temporibus proportionalibus? Causae duae concurrunt, altera optica, altera physica, utraque aequalis propemodum effectus. Prima causa est, quia iter planetae non aequali intervallo undique circa Solem circumductum est, sed pars ejus una Soli propinqua est, pars opposita tanto remotior a Sole. Ex aequalibus vero propinqua majori spectantur angulo, remota minori; et quae aequali spectantur angulo, propinqua quidem minora sunt, remota majora. Altera causa est, quia planeta re vera tardior est in majori distantia a Sole, velocior in minori.

Compositis igitur in unum causis duabus, facile patet, ex duobus ad visum aequalibus majori arcui per se majus etiam tempus competere, multo vero majus tempus propter tarditatem planetae realem in illo arcu remotiori.

An non una causa posset sufficere, ut, quia omnino planetae orbita ex una parte longius recedit a Sole, quam ex adversa, remotionem tantam faciamus, ut tota ista inaequalitas apparens per solam hanc inaequalem distantiam partium orbitae excusetur? Non patiuntur observationes, ut tantam faciamus inaequalitatem distantiarum, quanta est inaequalitas temporis, quo planeta aequales angulos ad Solem absolvit, sed hoc testantur, dimidio saltem hujus inaequalitatis excusando sufficere illam intervallorem inaequalitatem: residuum igitur est a reali acceleratione et retardatione planetae.

Quae sunt hujus celeritatis et tarditatis leges et exempla? Exemplum genulinum est in statera: quemadmodum enim ibi, quando brachia sunt in aequilibrio, ponderum ex utroque brachio suspensorum ad se mutuo proportio est permutata proportionis brachiorum; majus enim pondus, breviori brachio suspensum, aequalia facit minori ponderi, quod est a longiori brachio suspensum: itaque sicut se habet brachium breve ad longum, sic se habet pondus longioris ad pondus brevioris; et si jam mente removeamus alterum brachium et pro ejus pondere concipiamus aequalem potentiam in ipso jugo attollendi brachium residuum cum suo pondere, tunc apparet, potentiam banc jugi non tantum posse in pondus elongatum, quantum potest in pondus idem propinquum: sic etiam testatur astronomia de planeta, quod Sol non tantum possit ad illum movendum et circumvehendum, quando planeta longius abest a Sole in linea recta, quantum cum intervallum minuitur, et uno verbo, si arcus aequae longos de orbita planetae sumseris, quae est proportio inter utriusque arcus abscissus a Sole, eadem est proportio temporum, quae planeta consumit in illis arcubus. Ita centrum Solis seu mundi repraesentatur a jugo staterae, ejusque potentia motrix ab altero brachio ejusque pondere, quod jam jussi sumus dissimulare et meute in ipsum jugum redigere: planeta vero repraesentatur in residui brachii pondere, intervallum inter Solem et planetam in brachio illius ponderis.

Sit statera AC, pondera D, B ex C, A dependentia, jugum EF, anguli FEC, FEA recti,

erit sicut CE ad EA, sic B pondus ipsius EA ad D pondus ipsius EC; mente remove EA, et potentia ponderis B per EA formata sit potentia ipsius jugi E, haec igitur potentia jugi E

Fig. 47.



tenebit pondus D ex C suspensum in aequilibrio horizontis, scilicet ut FEC sit rectus. At si idem pondus, a C revulsus, ingreditur usque in G, potentia eadem ipsius E plus poterit in hoc pondus attolletque illud supra lineam EC.

Sit jam E non jugum sed Sol, et D sit planeta, EC, EG diversae distantiae planetae a Sole. Testantur igitur observationes, sicut EC

est ad EG, sic esse GK promotionem planetae propioris in G ad GI vel CH promotionem ejus remotioris in C.

Pondus ergo tribus planetae? Dictum est in superioribus, pro pondere considerandam esse naturalem illam et materialem reituentiam seu inertiam ad deserendum locum, semel occupatum, quae eripit planetam velut e manibus Solis rotati, ut illam pressantem vim non exacte sequatur.

Quae causa est, cur Sol non aeque fortiter prensat planetam eminus atque comminus? Attenuatio ipsa speciei corporis Solaris, major in effluxu longiori quam in breviore: quae attenuatio quamvis sit in proportione intervallorum duplicata, hoc est tam in longum quam in latum, operatur tamen solum in proportione simpli, hoc est secundum solum longitudinem; causae supra sunt dictae.

III. Causae inaequalitatis in altum.

Quid vero planetam extrudit in spatia remotiora reducitque versus Solem? Idem, qui prensat planetam, Sol nempe per speciem sui corporis virtuosam, emissam per omnia mundi spatia. Sunt enim extrusio et attractio prensationis hujus quaedam veluti elementa. Nam extrusio et attractio fiunt lineis virtuosis ex centro Solis exeuntibus, quae lineae eum una eum Sole circumeant, planetam quoque, qui trahitur et trahitur, has lineas insequi neesse est, pro illarum fortitudinis proportionem ad reituentiam corporis planetae. Ita extrusionis et attractionis contrarii motus componunt quodammodo hanc prensationem.

Corpori simplici Solis ejusque speciei immateriali tribus operationes contrarias, attractionem et expulsionem, et sic non simplices. Una est actio seu *impetus* naturalis, movendi corpus planetae assimilationis causa seu reductionis in situm primaeum; videtur vero diversa, propter diversitatem obiecti. Nam planetae corpus ex una saltem plaga familiaritatem habet ad corpus Solis, ex altera discedit. Jam vero ejusdem simplicis est operae, amplecti similia et respuere dissimilia. Munitur haec sententia exemplo magnetum, qui licet non sint corpora coelestia, non est tamen in illis biformis ista virtus ex compositione elementorum, sed ex forma corporea simplici.

Erit ergo ipsius planetae corpus compositum ex contrariis partibus. Nee hoc quidem: nam id solummodo sequitur, globum planetarium esse figuratum intus rectis lineis seu fibris, quales sunt magneticae, quibus accidit duabus contrariis plagis terminari, in quarum una non propter corpus ipsum, sed propter situm ejus ad Solem, regnat familiaritas cum Sole, in altera discordia.

Incredibile vero est, corpora coelestia esse quosdam ingentes magnetes. Legatur ergo Gulielmi Gilberti Auglii philosophia magnetica, quo libro, quamvis non crederet auctor, Terram inter sidera ferri, tribuit illi tamen naturam magneticam argumentis bene multis, ejusque fibras seu filamenta magnetica docet extendi lineis rectis ab austro in septentrionem. Quod igitur est unus ex primariis, Tellus uimirum, id esse unumquemlibet ex primariis absurdum nequaquam est nec incredibile.

Esto, ut planeta habeat internamfigurationem magneticam rectilineam; quid igitur est, quod illum facit aliam corporis sui plagam post aliam obvertere Soli? num ipse fibras suas convertit? Nequaquam: quin potius hoc quaerendum, quid sit illud, quod corpus planetae retineat, quo minus illud axem suum magneticum situ suo, quem is semel accepit, respectu partium mundi deserat, cum tamen corpus circa axem (ut corpus Telluris) convolvatur simulque emoveatur loco suo et in circulum circa Solem transportetur. Nam ex hac directione magnetis in eandem mundi plagam toto circuitu et ex transportatione corporis de loco in locum circa Solem, tanquam ex duobus elementis componitur hic effectus, ut globus planetae situm plagarum cum Sols permutet. Respice ad schema 62.

Quae sunt hujus permutationis exempla? Familiare rursus exemplum est in magnetica pyxide, scil. cujus lingula forrea imbuta est magnete. Quamcunque enim in regionem transportetur illa, semper pyxidis lingula septentriones spectat. Itaque, si circumas castellum quodpiam, gestans pyxidem, fiet ut jam caput jam cauda lingulae spectet castellum, eo ipso, quod caput semper in omni parte circuitus septentriones spectat.

Aliud exemplum astronomicum supra libro tertio fuit, quando axem convolutionis Telluris, interim dum circumfertur Tellus circa Solem, diximus manere in eodem perpetuo situ parallelo, sol. 231.

Quae igitur causas tradis directionis fibrarum magneticarum corporis planetarii in eandem mundi plagam toto planetas circuitu? Easdem, quae supra lib. I. sol. 174. Indicatae sunt, quibus axis convolutionis Telluris firmetur. Nam primo parallelus fibrarum situs identitatem quandam repraesentat, quae quies potius est, quam motus. Causa igitur illius non videtur aliqua potentia naturalis positiva seu activa, sed privativa potius motus omnis. Itaque videtur illa naturalis inertia materiae ad motumfigurationem habere rectilineam internam, et secundum has fibras extensa, aut condensatione partium in rectum fortius et insuperabilior reddita esse.

Sin minus hoc verisimile: sicut ergo distinctae advaria, prior materiae omnis, siue figuratione interna consideratae, quae hoc praestat planetae, ut ille non exeat e loco suo, nisi proliciatur ab extrinseco, scilicet a Sole: posterior corporis planetarii, ut illud est intus figuratum fibris rectis qua tutae sunt illae fibrae, ne a circumgestaltunge corporis inclineantur aut situ suo emoveantur. Denique liberum sit philosophantibus hoc ipsum, quod jam dixi, advaria solummodo definire, an divinus.

Tu hanc seu advaria seu divinus definis sola tuitione sui situs, quid si vero subesset aliquid aliud, et divinus ista spectaret certas aliquas coeli stellati partes? Supra lib. I. sol. 174, cum quaestio esset de axe convolutionis Telluris similiter immobili, responsum est, cur tale quid non cogitandum sit: quia scilicet causa nulla esset, cur in punctum coeli vacuum potius, quam in stellam aliquam dirigeretur, et cur potius in banc partem, quam in illam, et quia hae fibrae planetarum, non minus quam supra axis convolu-

tionis Telluris, successu seculorum deprehenduntur parum lucinari et sic deserere fixas pristinas, annuere ad alias succedentes, quantum generaliter iudicari potest. Nam motus iste tardissimus est, sic ut intra 1400 annos a Ptolemaeo ad nos non satis into de omnibus planetis hoc affirmari possit.

Forſitan axes illi convolutionis corporum fibrarum, quas hic introducis pro librationibus, vices ſuſtinent? Axis conſervationis Telluris diurnas, de quo in ſphaerica doctrina, tenditur cauſa longitudinis verſus principia Caucri et Capricorni perpetuo. Nam productus hic axis utrinque ſignat polos mundi, ut eſt lib. II. fol. 189. Atqui arcus ex polo mundi rectus in eclipticam tranſit etiam per polos eclipticae, eſt igitur is colurus ſolſtitiſſorum, ſignans principia dictorum ſignorum. Sed fibrae, quibus Terra a Sole repellitur vel allicitur, tranſeunt de ſigno in ſignum. Erat enim apheſium Telluris olim in Sagittario, nunc eſt in Capricorni gradu ſexto. Ergo differunt inter ſe axis convolutionis Terrae et fibra intervallum mutans.

Videtur igitur Terra nihilominus in principio Capricorni longiſſime diſtare debere. Si enim totum Terrae corpus rotatur circum axem illum, rotabitur et fibra, utcumque ab illo differat ſitu, ſcribetque quaſi duos conſonos, verlicibus in centro Terrae cocuntes; nec niſi unico momento diſtinctim ſpectabit in locum proprium, reliquo diei circumibit principium Capricorni, monſtratum ab axe Terrae, et ſic vim omnem ſuam in hunc axem congeret Terramque a Sole quadam veluti cochleata linea ſemper in plagam axis proſticiet. Equidem hoc pacto et per cohacrentiam fibrae cum axe motus diurni conſolidatam fieret, quod dicitur, nec nunquam diſcederet aſis Telluris a principio Capricorni. Cogimur igitur concedere aut globum intra cruſtam exteriorem, ut iſta rotetur motu diurno, ille, fibras habens, non rotetur pertineatque uſitata virtus magnetica ad cruſtam externam, quia ſemper oſtendit polos conſervationis diurnas, non vero apoſidem Solis vel Telluris. Adjuvet hinc phyſicus aliquis J. C. Scalgerum, diſputantem de fluminum ortu deſus maris fluxu et refluxu, videatque, ſi laboranti illi ſuccurrere poſſint haec Telluris ſeparata viſcera. Etſi mihi Luna et anima Telluris ſufficiunt.

Si globi planetarii habent internam figuratiſſimam magneticam reſtitutionem, quare non illis ipsis potius adſcribis, quod fugiant a Sole adque Solem accedant, pro diuerſitate plagarum ſui corporis, ut factum in Commentariis Martis? 1. Quia teſtatur aſtronomia, diſceſſum a Sole et acceſſum ad illum fieri in linea quaſi verſus Solem extenſa, quantum eam non variat intermixta circumlatio; fibrae vero magneticae raro ſunt verſus Solem porrectae. 2. Quia fibris iſtis magneticis duo diuerſiſſima tribuerentur. Nam primo illae dirigerent ſe ipſas in mundi plagam eandem, quod quieti ſimile quid eſt, deinde loco moverent corpus ſuum jam a Sole, jam ad Solem. Atqui hoc per modum expulſionis et attractiſſimae ſimplicis concillatur cum preſſione et circumvectione corporum, quam Sol praestat. 3. Quia etiam verſiſſimillius eſt, ſpeciem corporis Solaris virtuosam continuari uſque ad planetas, quam horum uſque ad Solem, ut illum fugiant repellentes petantque trahentes. Sol enim corpus ingens eſt; planetarum exigua; Solis lumen et calor ad nos manifeſto delabuntur, Sol planetas velit. De Solis igitur virtutibus aliis conſtat vobis antea, de virtutis planetariae prorogatione uſque ad Solem nou habemus ita tamque evidentiſſima teſtimonia. 4. Infra patebit, fibras corporis pati a Sole levem aliquam inclinationem: eſt igitur verſiſſimillius, librationem etiam totius corporis eſſe illi adventitiſſimam ex Sole potius, quam innatam; ſive ſc. paſſionem ab alio, non actionem ſeu motum a ſe ipſo.

At saltem communem statueres hanc virtutem inter Solem et planetas, mutuoque commeanem vim expulsionis attractionisque, ut est communis inter binos magnetes. Immo haec ipsa quilibet ratio est, cur planetis ipsis non tribuatur ista expulsio et attractio, ne mutua sit ex ipso creatoris Instituto, qui nihil facit frustra; ergo si porrigeretur virtus planetae usque ad Solem, Sol a planetis in proportionem corporum conversa situ suo, quem habet in centro mundi, emoveri vel saltem titubare deberet, jam huc jam illuc protractus, prout multi planetae ab uno latere, simili inter se facultate, in Solem ingruerint.

Videris hoc incommodum ne sic quidem effugere: Sol enim species sui corporis virtuosa seu conto connixus trudendo planetas se ipsum extrudet proportionaliter, trahensque planetam velut unco, se ipsum parumper ad planetam attrahet. Omnibus modis hoc effugimus, negata mutua attractione et expulsionem. Primo enim nec forma dispositioque corporum huc directa erit, si virtus planetae talis non ad Solem prorogata est; deinde neque ipso actu tale quid sequitur, quasi citra consilium creatoris, ex sola materiali necessitate. Nam tanta est moles, tanta densitas in materia corporis Solaris, tanta ejus vis attrahendi pellendique, tanta visiosim exillitas et planetae et reituentiae ejus, ut Sol de statu suo nihil periclitetur. Sic cum navis haeret in arena potestque non nisi a ducentis equis revelli et loco moveri, centum equi, quomvis sint pars dimidia requisitae virtutis, non tamen promoveant dimidium solitarii, quia inter motum et uou motum nulla datur dimidiatio, cum ista sint contradictoria.

Die hypothesin evidentem, quomodo planeta quilibet suos circuitus conficiat interinque trahatur et trudatur. Incipiamus ab eo momento, quando fibrae magneticae latus praebent Soli, sic ut ab eo distent aequaliter utraque fibrarum extrema, et sit hoc in distantia omnium longissima A: tunc Sol nec expellit planetam, nec allicit, sed, veluti dubius inter utrumque, prensat tamen illum et rotatione sui corporis emissaeque speciei prensam promovet ab A versus B, vincens reituentem, victusque vicissim ab illo, sic ut illum velut e manibus, hoc est e radius A antecedentibus speciei virtuosae amittat excipiatque sequentibus H, idque in certa proportionem virtutis speciei in illo intervallo. Hoc pacto promotus planeta, dum interim fibrae magneticae vi directionis in eandem mundi plagam spectant, fit ut plaga Soli amica paulatim obvertatur Soli, discors abeat a Sole: tunc igitur globus incipit a Sole trahi, parum, si parum inter se differant extremitatum a Sole distantiae; quo tractu planeta ex amplitudine circuli inchoati in A paulatim introrsum circa B recipitur versus Solem, velut in angustiore ambitum inque virtutem pressantem fortiorum, quippe densiorem, a qua igitur se ipse minus extricat eoque citatius abripitur. Hic attractus initio lentissimus proxime A, tunc est rapidissimus, quando Sol totum hemisphaerium corporis planetarii amicum in conspectu habet, discors vero totum post corpus planetae occultatur, id est quando fibrae magneticae recta diriguntur in ipsum Solem, quod fit circa C, quadrantem totius ambitus circularis; inde versus D rursum remissior fit hic attractus ad

Fig. 68.



22

Solem, at pergit crescere velocitas provectionis in circulum, quippe adhuc decrescente (per attractum) intervallo inter planetam et Solem. Haec remissio attractus initio post C pene nihil, mox magis atque magis sentitur, quo magis inimica planetae pars sese exserit Solique conspiciendam praebet, versus D, donec semisse circuitus peracto in E rursum utrumque globi transvolantis hemisphaerium aequaliter Solem spectet, tunc enim cessat omnis attractus et planeta est Soli proximus eoque et velocissimus, quippe qui cum densissima eoque et fortissima virtute prensante conflictatur exque ea circumeunte se minimum extricat.

Statim autem globus praetervectus hunc orbitae suae locum E versus F, quia jam discors hemisphaerium fit Soli propius amico altero vergitque magis atque magis ad Solem: planeta etiam incipit a Sole extrudi, velut ex angustiore et densiore speciei Solaris orbe in ampliorem, rariorem et debiliorem, unde decremenda etiam motus ejus sequuntur idque ordine contrario, primo lentius, post E versus F, inde ubi totum discors hemisphaerium seu plaga fibrarum recta in Solem dirigitur, plaga vero amica a Sole aversa est, expellitur planeta citatissime, motus vero jam rursus ad mediocritatem elanguit. Id rursum fit circa G quadrantem circuitus alterum. Ultra profecto planeta versus H, rursum remittit haec expulsio, donec penitus evanescat in A, planeta in pristinum locum restituto et a Sole longissime expulso.

Incredibile vero est, planetam, hac libertate permissa, absoluto reditu restitui exactissime ad idem intervallum. Nimirum hic tandem genulus est locus illi excusationi Ptolemaei supra (p. 337.) descriptae, admonentis nos, in coelo nihil occurrere, quod impediat motiones cuique corpori naturales quodque illa quasi a semitis suis aberrare faciat. Itaque si leges motuum tales a natura sunt institutae, ut planeta in se ipsum redeat exactissime, fiet etiam hoc certissime, quanquam siue compedibus orbium, in libero aethere. At sunt sic comparatae leges, quas descripsimus. Nam aequales sunt inter se semisses circuitus, alter in quo planeta attrahitur, reliquis in quo expellitur; aequalia deprehenduntur utriusque semisseis tempora; virtus quoque Solis eadem et perpetua est, et quae attrahit et quae expellit; eademque ejus proportio ad inertiam planetae semper eandem, in corpore quippe pereuni: igitur tantum proficit per unum semissem attrahendo, quantum per alterum expellendo. Cur igitur diffidamus planetarii corporis ad pristinum Intervallum restitutioni intra unam quidem temporis periodum? Nonne etiam in his terrenis et violentis motibus mobilia separantur ab eo, quod motus causa fuit, ut in scorpionibus, ballistis, catapultis, bombardis, fundis? et tela projecta liberum tranant aërem, neque tamen illa minus destinatum locum ferunt, suntque miraculo scopetarii et funditores aliqui, collimationis inimitabili certitudine? Si hic species illius motus, qui ad momentum fuit in impellente directus in certam plagam, impressa in mobile ad breve tempus et evanida, tantum potest, ut mobile, quamdiu fertur a specie nondum penitus elanguente, in plagam destinatam tendere non desinat: quanto firmitioribus praesidiis munita erit certitudo reditus coelestium, quos gubernant internae et plane coelitalis eoque perennes mobilis rei fibrae, cum illis aër impactu et occursu turbet motus, hic aetheris permeandi densitas ad effectum vel levissimum plane nulla sit?

Quare librationes diversorum planetarum non sunt in eadem proportionibus ad distantias suas mediocres, hoc est quare maxima est Mercurii eccentricitas, post illum Martis, post hunc Saturni, Jovis, Telluris, minima vero Veneris? Instrumentalis causa est diversa fibrarum fortitudo, seu natura

terminio quadrantum N intervallum AN (in legitime pieta orbita) aequale sit semidiametro BP, ut libro V. patebit.

Quid si vero planeta non praecise post confectum quadrantem orbitae superiorem PN, sed tardius aliquanto in Solem dirigeret fibram NQ? Hic oppositum est in adjecte. Nam is ipse est terminus quadrantum, ab apsidibus computatorum, ubi fibra in Solem dirigitur. Semper enim crescit inclinatio ista fibrae IH ad IS perpendicularem, quamdiu fibra H Solem quærit, crescit vero una et incrementum librationis, effectus cum causa.

Si ergo in hoc opere attrahentis planetae versus Solem consumitur plus quadrante orbitae, respectu ad fixas habite: plus etiam quadrante consumendum erit planetae in restituendo recte angule intra fibram et Solem apud R, luque ejus effectus seu parte librationis residua, qua planeta ex propinquitate NA perducitur ad propinquitatem RA, per eosdem gradus lucrementum, erdine jam contrario decrecentium.

Excessus igitur quadrantum inter se junctorum supra semicirculum ostendet quantitatem mutatae in uno periodi semisse, directionis fibrarum sub fixis, seu translationis centri orbitae B et apsidum P, R in signorum consequentiam; ablata igitur hac quantitate de ee, quod est plus semisse orbitae ad fixas expensae, restabit non plus semisse orbitae ellipticae, ab apside P putatae.

Manent igitur apsidæ, an transferuntur de loco sub fixis in alium? In Jove observationes veterum cum hodiernis collatae testantur, apsidæ fere consistere sub eadem fixis, aut etiam parum admodum retrocedere. In reliquis omnibus inveniuntur sedibus suis pristinis excessisse, transitu facto in fixarum consequentiam, exemplo apogaei Lunae, sed illis motibus omnino tardissimis, cum Lunae apogaeum progreditur valde sensibilibiter.

Quae causa est, cur in primariis fibrae adeo perfecte inveniuntur restituae post reditus integros peractos, ut progressus apsidum sit insensibilis? Quia idem Sol est, qui et librat planetae corpus et fibras ejus inclinat restituitque, et quia eadem in utroque opere fibrae, quibus ut instrumentis planeta et librat et inclinatur: nihil igitur causae est, quin etiam vires utrique operi per aequalitatem temporum admetiamur. Sicut enim planeta, fibram NQ directe tendens in Solem, si non exiret e linea NA, sub certo aliquo tempore jungeretur usque ad contactum, sic etiam planeta idem, collocatus in eodem N, et fibram per fictionem tendens ad angulos rectos cum linea NA, converteretur cum fibra sua sub aequali tempore plenarie, sic ut in fine fibram NQ in Solem tenderet. Sicut autem librationi supervenit opus tertium, emotio sc. planetae ex situ AN, sic ut fibra NQ non amplius in Solem tendet eoque non eadem fortitudine trahatur versus Solem (qua ratione cavetur, ut non fiat contactus plenarius adnavigatione per NA, sed praeveniatur translatione ex N in R fiatque non major quam RA): sic etiam hanc inclinationem fibrae praevenit eadem translatio planetae ex N in R, in longe citius fibra obviet Seli, quam toto quadrante a Sole converti potuisset, itaque pre quadrante conversionis opus sit non plus quam arcu QM. Aestimantur autem inclinationum peractarum anguli, seu virtus in eos impensa sinibus, ut libro V. exemplis rerum naturalium elarum fiat. Quare sicut se habet teta distantia mediocris PB (vel in ellipsi NA) ad dimidia librationis quantitatem BA, unius quadrantis opus, quae eadem est et eccentricitas: sic etiam se habebit semidiameter globi planetarii NQ, pro sinu toto usurpatus, ad sinum anguli inclinationis maximae MNQ, quae contingit eoque, dum translatione planetae quadrans praecise confectus fuit a P, loco maximi intervalli PA.

Ex hac vero proportionē supposita demonstratur, fibrām NQ tunc in Solem A tendere, cum PN est quadrans sub fixis praecise. Sit enim AN aequalis ipsa PB, ut in ellipsi, et B sit centrum eccentrici, et ABN rectus, quia ejus mensura NR est quadrans: descendat etiam ex Q, termino solipeta, recta in BN, quae sit QM: formantur duo rectangula ABN et QMN, et quia ponitur sic esse NQ ad QM, sicut NA ad AB, erunt igitur N, Q et A in una recta, seu Q dirigetur in Solem.

Jam supra vero demonstratum est, si absoluto quadrante sub fixis PN planetae fibra Q dirigatur in Solem, ut sit inflexa angulo BNQ, sequi, ut in alio quadrante NR sub fixis fibra NQ restituatur, consumto hoc inflexione BNQ angulo, sic ut, planeta in R stante, fibra rursus sit ipsi BN parallela, sicut erat in P: quae perfecta est restitutio fibrarum post peractum semicirculum. Idem judicium esto de altero semicirculo, quo absoluto, planeta redit ad eundem locum sub fixis. *)

Vicissim cum testetur experientia, insensibiliter transferri apsidēs, nec manere sub iisdem locis inter fixas: sequitur igitur, NQ in Solem spectare non praecise quadrante a loco pristino apsidis P. Quae causa est hujus aberrationis a proportionē aequalitatis jam stabilita? Tarditas horum motuum inobservabilis videtur in materiali necessitate quaerenda, si quicquam aliud, sc. in aberratione dictorum duorum motuum, librationis et inclinationis, ab invicem, per intercursum motus terit. Diffundit enim sese in quandam temporis infinitatem, quae nihil habet pulchritudinis, quippe velut interminata. Quatenam vero sit intercurrentis causa, difficile est prodere, quia neque de re ipsa penes omnes constat, neque certa est rei quantitas in plerisque. Quantitate vero adempta, caremus examine causarum, quas quis conjecturis indagaverit, qualis esse potest excursus planetarum ad latera eclipticae. Non sit enim ille sine inclinatione fibrarum istarum NQ ad radium Solis AN, tanta quidem, quantus est cujusque excursus. Ex majori vel minori tali inclinatione consentaneum est, nonnihil debilitari fibrarum opus, idque varie pro varia excursuum habitudine ad apsidēs. In Saturno, Marte, Venere, Mercurio,

*) Fine libri IV. haec monet Keplerus: Textum antiquum et optime deliberatum pervertit nova et properata correctio: 1) Principium petitur. 2) Non est consilii, quod fol. 380 lin. 8. fuit necessitatis: consensus librationis cum inclinatione. 3) Idem, causa non causa. 4) Aliud propositum lin. 10. aliud folio 381. demonstratum, illic ad fixas respectum, hic ad apsidēs. Causa vera restitutionis pene perfectae est necessitatis physicae. Sive enim parallelae manent fibrae, sive inclinentur in uno semisse ab apside deorsum, ut NQ, in altero sursum, cum utrinque perfecta sit compensatio ut fol. 379. dictam, etiam sic fibrae in utraque apside sunt invicem parallelae, restitutio igitur perfecta.

Ergo fol. 381. falsum et contradictorium proponitur, aberratio librationis ab inclinatione: potius causa haec fuit dicenda, quae sine fol. 379. insinuat. Sol enim in superiori quadrante PN paulo minus inclinat, in inferiori NR paulo plus reclinat, siquidem fixae terminos figent quadrantibus. Cum igitur in R, puncto fixarum, terminus solipeta G jam sit supra SY, vicinior igitur adhuc Soli, adhuc igitur planeta ednavigat: quare ultra R fixarum erit R apsis perigaea. Si latitudo planetae hujus rei causa est, aliter illa explicanda erit, quam fol. 382, ubi lin. 1. pro apsidēs lege longitudines mediae, quia in Jove P non est nodus, sed limes. Nec sufficit in Jovem respicere causasque stantis apsidis hanc dicere, quia apsis in limite: oportet et hoc explicare, quare progressus apsidum in planetis ceteris inaequalissimarum periodorum sit propemodum aequalis sub fixis. Rectius igitur fol. 382. a l. 3. in 10. una litura facta, duas literas Romanae curiae N. L. transmittimus ed posteris.

apsides (longitudines mediae) habent aliquam latitudinem, in Jove nullam, et ad hanc analogiam illorum apsides progrediuntur, hujus stant. Cum igitur alias vis inclinandi fibræ planetarii corporis sit maxima in apsidibus P, R, ubi rectis angulis fibræ Soli objicitur, credibile est, eam vim ob latitudinem esse paulo remissorem. Quo minus idem damnum etiam in libratione sentiatur, causa est, quia ibi libratio per se pene nulla. Vicissim in N est inclinationis vis pene nulla, librationis maxima: damnum igitur in hac sentitur, in illa non, pro latitudinis modulo, potestque fieri, ut sic plus retardetur inclinatio fibræ; quo dato fit, quod jam explicatum est, ut fibræ tardius, sc. ultra metas quadrantis in Solem spectet. Atqui tunc transferri apsides in consequentia, prius est demonstratum. Haec igitur dicti phaenomeni possit esse causa, necessitatibus physicis seu geometricis nexa secundum anteposita principia.

At non interim rigide negaverim, hunc effectum potius in consilii parte fuisse, ut non sit vel non sit mera necessitatis appendix, quia hujus quantitatem adhuc ignoramus. Tunc locus erit dicendae causae finalis, huc tendere contemperatorem inter se virium librationis, fibrarum inclinationis, circulationis, certa in unoquoque proportione: ut quia librationes quidem comparatae sunt ad constituendas harmonias motuum, harmoniarum quaelibet enascere non semper in una aliqua binorum planetarum configuratione, sed successu seculorum omnes omnino configurationes pervagaretur, atque sic harmoniae motuum omnes (quae sunt lib. V. Harmonicorum) cum harmoniis configurationum omnibus (libri IV. Harm. materia) permiscerentur.

IV. De motu latitudinis.

Quibus legibus planetae excurrunt in latera eclipticae? Rursum lege simplicissima tali, ut planum, quod circumscribunt centro corporis sui, sit in unaquoque periodo exacte rectum et ad planum eclipticae inclinatum inclinatione constanti et invariabili; praeterquam in Luna.

Plana aequabilia, si sint ad invicem inclinata, concurrunt secantque se mutuo in una recta linea: quaero, quae sit illa communis linea, super qua inclinatur ad eclipticam planetae orbita. Transit illa per centrum Solis in omnibus planetis et extenditur cujusque planetae linea in sua propria loca eclipticae, invicem ex centro Solis opposita.

Fig. 70.



Unde hoc constat? Constat inde, quia cum planeta in duobus diversis reditus sui partibus, ut schemate 70. in C et D, videtur sub ecliptica, carens latitudine, duo haec illius loca per calculum inveniantur cum Sole A in eadem recta linea CAD: ut si ACM veniret in 17° Tauri, temporis intervallum, usque dum planeta rursus in ecliptica visus fuit, conjunctum cum hypothese eccentrici, exhibet lineam ADO, alterius loci eccentrici, in 17° Scorpionis, sc. in opposito 17° Tauri.

Quid hinc colligitur? Idem scilicet, quod supra folio 354. Cum

enim plana omnium sex eccentricorum concurrant in uno communi centro Solis, igitur praeterquam in hoc Solis centro nusquam omnia simul concurrere possunt, quia sectionis linea non est omnibus communis, sed cuilibet propria, lineae vero diversae non pluribus nisi uno puncto concurrunt.

Quia igitur Sol est communis nodus omnium systematum, ergo sive natura moveat planetas virtutibus corporeis, sive mens motibus rationalibus, omnino Sol planetis pro scopo est, ad quem omnes circuitiones respiciunt.

Quas tradis causas motus in latitudinem? Nec Sol planetis causa est, nisi remota, hujus deviationis ab eclipticae plano, nec mente planetis ad hoc opus est, nec supra refutata substructione solidorum orbium, quibus ceu curribus justam invehantur orbitam, multoque ad hoc minus, quam vel ad librationes in altum et profundum, vel ad motum in longum: sed formatio aliqua ipsorum corporum planetariorum sola sufficit ad detorquendas et retorquendas ad eclipticam eorum orbitas.

Cur Sol non sit in causa, cum jam dictum sit, sectionum lineas per ipsum Solis corpus ire? Quia unus et idem Sol una et eadem specie corporis sui, quae uniformi et directissimo finimine sub circulo inter polos convolutionis Solis medio circumit, non potest per diversas alias vias rapere diversos planetas, nisi planetae ipsi causas hujus diversae diacessionis ad latera de suo addant.

Cujusmodi formationem. innuis corporum planetariorum? Ea potest esse vel essentialis, nimirum internae fibrae magneticae rectilinae, vel accidentalis, scilicet convolutio globi planetarii circa suum axem, sic comparata, ut fibrae vel axis gyrationis toto circuitu corporis retineant altum parallelum sicque dirigatur, ut cum planeta est sub ecliptica, tangat orbitam et deflectat altero termino nonnihil in plagam boream, altero in austrum.

Habes exemplum populare hujus deflexionis? Exemplum quaecumque suppediant remi navium. Nam si navis agatur ventis prorsum, sit vero remus oblique religatus ad puppim, tunc navis, contra quam fert linea venti, paulatim ad latus detruditur.

Remus, temo vel gubernaculum navem semper in unam solam plagam dirigit; quomodo igitur planetae nunc ad latera eclipticae exeunt, nunc inde ad eclipticam revertuntur? Si remus navis convertatur, navis quoque deflectit ad latus alterum. Planetae etsi fibras tenent directas parallelo situ et inconversas, transportantur tamen ad partes circuitus sui oppositas, in quibus fibrae pristino situ habent oppositam inclinationem ad orbitam suam; quare etiam planetae per alterum semicirculum aguntur in oppositas plagas.

Ut melius intelligam hunc motum, dic, in circumactu planetae circa Solem quam creet superficiem una talis vel fibra vel axis. Ponamus, cum planeta est in ecliptica, ut hic in C, E, tunc fibram latitudinis AB ad Solem non inclinari (etsi etiam aliter esse potest eodem effecto, si situs sit aequipollens), ad eclipticae vero planum sic inclinari, ut medietas EA, CA mersa sit intelligenda infra papyrum, quae repraesentat planum eclipticae, reliqua medietas EB, CB exstet supra papyrum; inclinationis angulus sit tantus, quanta solet fieri latitudo in limitibus, F supra papyrum intellecto, D infra.

FIG. 71.



(Finge litteras D, E, F in centrâ circuituum.)

Sit etiam motus speciei Solaris veluti fluminis aut venti cujusdam, ex E versus F, C, D.

Cum igitur hic motus in E sit incursum in adversam fibrae medietatem AE mersam, in C vero similiter incursum in adversam BC extantem, quae ipsi AC est opposita: proinde in E quidem planetam sursum expellet a papyro, quorsum tendit antecedens terminus B, in C vero deorsum, infra papyrum pellet, quorsum tendit A terminus illo loco antecedens. In temone fit contrarium, quia is truditur a vi fluminis, non agitur ab insita aptitudine. Cum autem interim fibra AB maneat in situ sibi ipsi parallelo per omnem ambitum, hinc fit, ut in F borealissimi planetae, et in D mersi et australissimi, nenter terminus nec A nec B antecedit, sed fibra AB velut in profundum hujus fluminis, id est versus Solem porrecta et impetum latere recta objecto excipiens, causam nullam praebet ejectionis ulterioris in nilam plagam, quoad in his punctis permutatio fiat; ut cum ante punctum F terminus B antecessisset, jam post F terminus A antecedit eoque planeta rursus ad ellipticam accedere incipiat, profectu primum insensibili.

Hinc jam patet, qualis figura gignatur. Nam quia fibra AB ex E movetur versus illam ipsam plagam, in quam tendit terminus B antecedens, superficies igitur, quae ab AB creatur, in E puncto attenuata est in meram lineam, quae tamen paulatim fit superficies, oraeque ex E puncto, acquirit in F latitudinem maximam, aequalem longitudini fibrae AB, inde rursus attenuatur haec superficies, usque in partes circuitionis C, quae ipsis E primo dictis sunt oppositae, ubi superficies ista rursus in lineam vanescit. Eadem intelligantur de opposito semicirculo CDE. Delata vero sic inclinate in F et D semperque suum ductum sequens, creabit planum perfectum, in quantum sc. situm parallelum retinet: quod planum si continuetur, per centrum Solis transibit, quia fibra AB in Solem spectat, in F quidem termino A, in D vero termino B.

Sed remota hac plani continuatione, si quod a fibra creatur solitarium consideretur, species erit talis, qualem exhibent duae lunulae inter ellipses duas, exteriorem CBAE, et interiorem EACB, se mutuo tangentes in C, E, ut eadem linea CE sit diameter, minoris quidem EACB longior seu recta, majoris vero CBAE transversa.

Centrum etiam corporis planetae circumlibit in plano perfecto, quod in hac figura circulare factum est, sc. CDEF; quamvis etiam ipsum, ut ex superius dictis patet, parumper a circuli perfectione ad ellipticam laterum castigationem deflectat.

Remus vel temo navis porrigitur a navi prorsum in undas aut in ventum, fibrae intae latent intus in rotundo planetae corpore: non est igitur is eadem vis, quae temonibus. Non est necesse, omnia respondere in aliqua similitudine: succedit autem loco facultatis remorum vis alia fibrarum multo convenientior, quod sicut supra fibrae naturalem habebant inertiam contra inclinationem sui, seu potius potentiam ad retinendum situm parallelum in transportatione corporis, sic nunc etiam insit fibris latitudinis praeter similem viam retinendi situm parallelum etiam naturalis potentia agilitatis, seu tenendi lineam plane eandem et secundum eam derivandi motum sibi illatum, in quantum quidem tendit motus in eandem plagam cum altero fibrae extremo.

Compara formam hanc motus latitudinis cum astronomia veteri exemplo populari. Nos hic planetam flumini committimus cum obliquo temone, ejus beneficio planeta ipse inter defluendum trajiciat ab una ripa ad oppositam.

Vetus astronomia solidum pontem (solidos orbes) super hoc flumen (zodiaci latitudinem) aedificat et planetam velut in curru exanimem per eum transvehit. Verum perlustrata tota machina apparet, hunc pontem nullas habere subillas, quibus suffulciatur, aut Telluri, quam coelorum basin crediderunt, innitatur.

Est tamen difficilior haec speculatio motus latitudinis, quam si quis solidos orbes sibi imaginetur. Atqui meminisse debes lector, nos hic versari in speculatione physica causarum, ob quas quaelibet hypothesis adhibetur, ut oclamus, quid veri subsit tali hypothese seu fictioni astronomicae. At infra libro V. et VI. integros circulos eorumque inclinationes ad eclipticam non repudiabimus, intellectus causa, quia acquipollent illi protectionibus hisce fibrarum ad eclipticae latera.

Si et prior illa libratio planetae in altum, et hic excursus in latum haberent eandem sub ecliptica metas fibrisque corporis perficerentur iisdem, verisimiles essent causae, quas tradis. Imo quid impedit, unum et eundem globum duplices habere fibras rectilineas, totum corpus attinentes, ut alteris in altum et profundum libretur, alteris rursus prorsumque remiget? Sic in fluminis superficie triplex cernitur motus partium, quilibet suam observans plagam: primus est decursus aquae, secundus fluctuum, quos decursus illi continua serie transversim ad ripas eiecit, tertius est a vento, qui si ex obliquo contrarius flet, asperat undarum superficiem aliamque minorum fluctuum seriem in plagam etiam suam ciet, qui prioribus imperturbatis supercurrunt. Sic supra lib. I. fuit allegata substantia ventriculi, quae trilecem quandam repraesentat, obtinens tria genera fibrarum plagis distincta, sedes trium facultatum, attractricis, retentricis, expultricis: quauquam non unius, sed trium omnino tunicarum textura est.

Num iisdem zodiaci locis perpetuo sunt excursus errantium longissimi, an etiam hi loca sua mutant? Obscurior adhuc, quam apudum, est limitum progressionis observatio; videntur tamen paulatim repere in antecedentia fixarum sphaerae, et tardius quidem quam progrediuntur apices, utrumque exemplo motuum Lynae.

Si limites retrocedunt, apsides progrediuntur, non haerebunt intextae fibrae, latitudinis administratae, fibris longitudinis, quas utraque eidem globo dediti. Receptus hic nobis patet ad internam globorum substantiam, in quas angustias jam antea coacti sumus in comparatione revolutionis Telluris diurnae cum ejus fibris libratoriis. Possumus igitur etiam hic quaerere in exteriori crusta separatim globum velut in ovi albamine vitellum, fibris suam instructum et ad earum leges convertibilem, distincta etiam fortitudine virium ab exteriori crusta, si opus est; ut inflecti possint ambo ab eadem externa causa, distinctis celeritatis mensuris, si etiam hac re sit opus. Sic enim etiam in jam introducto ventriculi exemplo sunt tres tunicae, externa, interna, media, quarum una pati potest illacsis aliis, haec agere vacuibus illis, quamvis haec re dissimiles, quod ab invicem non separantur.

Vetus astronomia solidos et plane adamantinos orbes alios aliis superinduit, qua nullum nobis corpus est conspicuum, tota regio sic perspicua, ac si vacua esset. Non indignabitur igitur, nos in globis, qui sunt corpora conspicua et palpabilia, simile quid fabricari.

Nonne ille ipse, cujus jam fecisti mentionem, axis turbinationis exterioris crustae corporum planetariorum munus hoc sustinere posset, declinandum motum planetarum ad latera? Magna sane verisimilitudine nititur

ista causa, ut libris VI. et VII. in explicatione theoriae Solis et sphaerae octavae dicendum erit: certi tamen nihil potest afferri de omnibus; quia etal credibile diximus, etiam reliquos primarios turbinari circa suos axes corporum, plagae tamen, in quas vergunt seu declinant hi axes, nobis sunt incognitae: quare in sola Tellure habemus exemplum. Et Luna, secundarius, non turbatur, cum tamen cusciet suas latitudines.

Quomodo praestari hoc potest, ut limites excursuum recedant in antecedentia? Pars aliqua hujus apparentiae lib. VII. excusabitur ut accidentaria, non ut physica vel realia. Quod vero de hoc motu residuum et reale est, id praestatur nutu fibrarum latitudinis succedaneo in antecedentia, ut maneat quidem in plano uno et eodem in toto suo circuito exactissime, ipsae vero super corporis sui globosi centro (h. c. globus ipse) latenter secundum has fibras inclinentur retrorsum.

Quibus ex causis oritur haec reclinatio? Hactenus quidem causarum plerarumque allatarum evidens erat verisimilitudo, in hoc ultimo agmine rerum astronomicarum aegre succedunt causae laboratque cum mens, tum maxime fides eorum, quae quis comminisci possit. Dicamus tamen quantum invenire possumus. Fibrarum latitudinis naturam consistere diximus in aptitudine ad motum prorsum, in plagam directionis suae parallelo; diximus etiam, dum ex ioco, qui planetam habet sub ecliptica, sc. (Fig. 71.) ex C, E, transferuntur in locum excursus longissimi in boream vel austrum, in D et F, inter illas manere parallelas eaque ratione fieri, ut cum illic in C, E tangerent orbitam, hio jam in D, F in profundum versus Solem demergantur, quorsum motus ille non tenditur, ad quem inclinatae sunt: quin potius tunc flumen motorium ex Sole, ut sic dicam, in transversas AB angulis rectis incurrit, celerius inferius (sc. apud A in situ F et apud B in situ D), quam superius et exterius. Si ergo sunt inclinatae ad motum, quid mirum, si haec inclinatio, parte inferiori plagam motus appetens, derogat nonnihil parallelitati, idque in utroque limite. Ita sequetur retrocessus limitum, quippe nulla existente compensatione. Nam apud F protrudetur A viam EAC, apud D protrudetur B viam eandem CBE: ita utrinque B inclinetur in papyro deorsum.

Quodsi haec causa non admittitur, ergo anima motrix accessatur, quae nucleum internum in crusta exteriori suis legibus torquat, hoc consilio opificis, ut innexione mutua orbitarum unius ex alia crebraque earum multiplicatione et condensatione successu saeculorum soliditas aliqua orbicularis permearetur a planeta.

Quare tardior est retrocessio limitum, quam progressio apsidum? Etsi res ipsa circa Mercurium in dubio est etiamque circa Jovem nonnihil, sequamur tamen probabilitatem, propter exemplum Lunae evidens, dicamusque causam hanc, quia magni motus sensibilior necessario fit turbula, si qua sit, quam parvi, ab eadem extranea causa: Jam transpositio apsidum oritur ex motu magno, qui est inclinatio et reclinatio fibrarum in quolibet semicirculo tanta, quanta est aequalio optica, fieretque major et omnino totalis, si non praeveniretur circumductione globi planetarii. At transpositio limitum fit per motum parvum excursus ad iatera paucorum graduum et qui suo hoc modulo non est major, ut incusare nihil possit, quo impediatur. Quare iidem Solis radii, motum utrumque impellentes legibus jam explicatis, evidentes illic habent effectus quam hic. Accedit, quod illic majori cum discrimine agunt radii Solis quam hic, ceteris paribus. Illic enim radiorum Solis ad

fibras obliquitas, quae in latum tendit, seu angulus latitudinis, quo debilitatur ipsorum opus, sensibilis erat, hic discrimen inter partes globi planetaril' et sic inter terminos fibrarum latitudinis, proximum Soli et remotissimum ab eo, cui discrimini transcripsimus motum limitum, valde exile est: jure igitur etiam opus hoc ipsum minus est illo.


V. De duplicatis Lunae inaequalitatibus earumque causis.

Num ea, quae hactenus disputata sunt de causis, quibus primariorum motus veri tripliciter inaequales reddantur, etiam de Luna, secundo plañeta, sunt intelligenda? 1. Omnino quidem Luna circa Terram eandem in genere formam motus acculatur, quam observant primarii circa Solem, eoque etiam easdem in ejus corpore causas statuere debemus, fibras nempe magneticas tractumque earum rectilineum et plagas hujus tractus contrarias, unam plagam Terrae amicam, adversam inimicam; tractum denique huic fibrarum sibi ipsi per totum Lunae circuitum propemodum parallelum; ut translata Luna in locum oppositum fiat permutatio plagarum et secundum amicam attrahatur Luna a specie corporis Telluris, secundum inimicam vero repellatur, eaque ratione motus ejus etiam in longum vel incitetur vel remittatur; itemque alias fibras corporis oportet concipere, quibus Lunae efficiantur digressiones ab ecliptica.

In praesenti schemate sunt expressi situs aliquot Terrae cum circumjecto coelo Lunae, circa Solem euntis; et in coelo Lunae situs aliquot ipsius Lunae, circa Terram euntis. Imago vero lingulae magneticae significat fibras in globo Lunae magneticas, quibus Luna circa Terram fit eccentrica. Nam numero A, B, C, D, E, F, G significat plagam Terrae amicam et vergit in longitudinem mediam secundam. Itaque Luna ad A, G sita est medio loco inter perigaeum et apogaeum, ad B, R, D est paulo ante apogaeum, ad C paulo post apogaeum, ad E, F paulo ante perigaeum.

2. At eum hic Lunae motus circa Terram, ut supra est explicatum, a duobus veluti fontibus derivetur, videlicet a volutione diurna Terrae, quae est medietullum coeli parvi Lunae, et a volutione Solis circa suum axem, qui Sol medietullum est orbis magni, communis Telluri et coelo Lunae: rationabile equidem erit, ut verus et realis Lunae motus circa Terram (etiam in quantum mente removetur ab ipso communis illa et toti coelo Lunae accidentaria circumlatio circa Solem) duos veluti fontes habeat patiaturque omnes affectiones illas duplices, quas habent motus primariorum singulas. Atque id egregie consonat experientiae et scitis artificum et vocabulis ipsis, ex hac duplicatione ortis. Non tantum enim in superioribus, pro eo, quod erat in primariorum aliquo, motus medius solitarius in Luna fuit et medius et variatio semimenstrua hujus medii, sed etiam hoc loco, cum agitur de motus hujus inaequalitate periodica, quae non est semimenstrua ut variatio, sed menstrua seu potius semestralis, deprehendimus pro simplici alicujus primarii duplicem Lunae intensionem et remissio-

Fig. 72.



nem motus medii in contrariis periodi momentis, denique pro simplici primariorum digressionem ad latera etiam duplicem.

Quam causam habet Lunae eccentricitas suae quantitatis? In Harmonicis demonstro, varietatem motuum Lunae determinare praecise diatesaron, quod affinitatem habere videtur cum quadris et copulis Lunae; ut igitur hoc intervallum repraesentari posset composito motu, tanta est facta eccentricitas.

Quodnam discrimenprehenditur inter communes illas Lunae cum planetis et inter has Lunae proprias inaequalitates? 1. Quemadmodum motus Lunae circa Terram in superioribus duo veluti elementa fuerunt, alterum ex Tellure, voluta circum axem, alterum ex applicatione luminis Solaris ad hanc Telluris speciem motricem, quorum illud liberum erat a Lunae phasibus, hoc alligatum ad phases: sic nunc etiam duarum inaequalitatum, prior quidem illa prioris elementi seu motus medii accidens, metas suas proprias habereprehenditur, quas apogaeum Lunae dicemus; habet et prima forma digressionis ad latera suas easque distinctas ab apogaei metis, quas limites et nodos appellant, posterior vero inaequalitas posterioris elementi, seu copularis incitationis accidens, Ptolemaeo annutus epicycli dicta, communes cum mense Lunari phasibusque metas habet, ut et secunda forma digressionis ad latera.

2. Prior illa, tam longitudinis quam latitudinis, semper constans est per omnes periodos, quantitatis sc. perpetuo ejusdem; posteriorum utraque in uno tantum uniuscujusque semestris mense fit maxima, in reliquis minor, in quibusdam, qui annum in duas partes dirivunt, pene nulla, nimirum ubi affectiones oppositae hujus secundae accelerationis et retardationis, item borealis et australis latitudinis, incipiunt migrare in semisses lunationum contrarios.

3. Itaque priores illae inaequalitates et quantitatem et distributionis leges a suis propriis causis habent, secundae vero suas accipiunt quantitates et affectiones a praesentia primarum in unoquoque lunationis semicirculo; solas distributionis leges separatas adque lunationum circuitus accommodatas prioribus tamen similes habent.

4. Cognatum et hoc est, quodprehendimus in Luna motum apsidum in consequentia limitumque in antecedentia multo celeriore quam in primariis, non tantum in proportionem celerioris reditus Lunae, sed plane sensibilibiter, et limitum quidem retrocessionem amplius quam duplo tardiore progressu apsidum.

Luna non cernitur alternis nunc hanc nunc oppositam corporis partem ad Terram convertere: semper enim easdem faciei Lunae maculas conspicimus. Quare hinc non poterunt peti causae accessus et recessus Lunae a Terra? 1. Non est necesse, ut fibrae magneticae Lunares in duobus oppositis periodi temporibus recta dirigantur versus Terram: sufficit ut his momentis saltem inclinatae sint alternis plagis versus Terram isque fibrae situs toto Lunae circuitu maneat parallelus. Nam etiam sic fieri potest, ut nunc una fibrae plaga propius ad Terram annuat, nunc opposita. Haec vero inclinatio si parva sit, jam visus noster non est tam accuratus, ut in disco Lunae exactissime possit observare, nunquamne in marginibus globi Lunaris, qui spectant versus polos eclipticae, particulae aliquae minutae sese conspiciendas exhibeant, quas alio tempore non videantur. Nam et devexae sunt illae partes globi et

tenueslimae apparentiae, et deficiet crebro marginis nunc hujus, nunc illius illuminatio, propter vultus Lunaris inconstantiam.

2. Jam dudum reliquimus in incerto, annon est globus intra globum, ut nucleus intra corticem, diversae ab illo conversionis; quod cum exempla Telluris, tum etiam ipsius latitudinis motus suggerunt. Itaque posset talis interior globus conversas alternis plagas ad Terram tendere, non obstante quod exterior crusta maculas semper easdem ad Terram vertit. Inter haec enim et similia incertum, quis omnino modus sit hujus motionis, solum illud est certissimum, quicumque modus est, accommodatum esse ad causas physicas et magneticas, hoc est corporeas et sic geometricas, qualium exempla hic utrobique proposuimus.

Num igitur secunda ista longitudinis inaequalitas vere est a secunda aliqua eccentricitate seu digressione Lunae a Terrae, non minus quam prima suam a mutatione intervalli causam habet? Non: repugnat observatio parallaxium Lunae, juncta, contemplatione eclipsum; et conspirant rationes proportionis corporum a priori, prima hujus quarti libri parte propositae. Sed et hoc arguere possit, plane nullam fieri mutationem intervalli ad phases alligatam, quod, dum artifices alii alios circa hanc hypothesin corrigunt, semper minor minorque quantitas est effecta hujus mutationis. Ptolemaeus enormem statuebat, quam redarguit Regiomontanus; dimidiavit Copernicus exque forma eccentrici in formam epicycli secundi transposuit; hanc rursus corripuit Tycho Braheus, parte aequanti circulo vindicata, quem ipse cum Copernico per epicyclum duplicati motus excusare est solitus; ego intervalla copularia permutavi cum quadrariis, circuitus ex mense in annum transposui; posterioribus vero temporibus his inventionibus inuixus tandem deprehendi, mutationem intervalli, per phasium quidem circuitiones, omnino nullam fieri.

Unde igitur est secunda illa et ad phases alligata acceleratio et retardatio? Ex diversa habitudine eccentrici Lunae ad phases. Dum enim simpliciter et perpetuo uniformi eccentricitatis lege circumit Terram, motorem suum, quo modo quilibet primariorum Solem circumit, sit per accidens, ut ab altero sui motus promotore, qui accelerat illam in copula, distet alias aliter. Nam si longius ejus intervallum a Terra incidit in copulas, ubi maxima est acceleratio, tunc species Telluris diffusiori orbe explicata in una copularum debilitatur, non tantum in nativo suo et archetypico vigore, sed etiam in aequalitate illa sui confortatione ex Sole. Vicissim, si longius hoc intervallum Lunae et Terrae competit in quadras, ubi nulla est acceleratio, tunc nullius vigoris aequalitatem nullum etiam est damnum, nullum in brevi intervallo perigaeo lucrum.

In schem. 72. sunt in globis Terrae et Lunae circuli illuminationis, dividentes partem illuminatam ab obscura. Cum autem apogaeum Lunae per totum annum et sic per omnes situs coeli Lunae haereat in eodem signo, hoc est fibrae WF maneant fere parallelae sibi ipsis toto circuitu, Terra vero cum coelo Lunae transsit de signo in signum, fit ut fibrae ad circulos illuminationis (qui sunt extensi secundum circulum Solis concentricum, representantem incis densitatem in longum) applicentur alias aliter, ut vides in arcibus DT, EV, FW, GX, AO, BP. Idem igitur fit etiam punctis apogaei et perigaei Lunae, ut quae semper vergunt in loca, quadrante distantia a loco vel plaga mucronis A, B, R etc.

Quid si longius intervallum versus Solem tendatur, num etiam sic debilitabitur motus? Atqui tunc Luna in densiori luce decurrit. Nimium hoc est, quod supra cavimus. Lumen enim Solis non movet se ipso, sed per

vincula duo ista, 1) modus incitationis copularis, 2) modus eccentricitatis, eccentricitas tamen præcise debeat incitationem in copula apogaea, dupliciter in perigaea, id inquam adhucdum non potui investigare.

Quam tradis causam probabilem tantas celeritatis apsidum limitumque Lunae, si primariorum planetarum apsides et limites sunt incomparabiliter tardiores? Nimirum hic quoque conspicuus redditur effectus compositionis virtutum motoriarum Lunae. Sicut enim in superioribus vim simplicem Telluris attemperatam esse diximus ad numeros harmonicos, in revolvendo quidem corpore Terrae circum axem ad 360 dies perfectos, in circumagenda vero Luna circa Terram ad 12 præcise menses in uno anno, seu reversione centri Terrae circa Solem: sic nunc etiam dicamus in inclinatione et restitutione fibrarum Lunae, et quibus libratio et quibus latitudinis deflexiones perficiuntur, proportionem eadem attemperatas esse vires earum simplices ad prolixitatem temporis Lunae periodici, quae observata fuit in planetis ceteris. Sicut vero supra propter accessiorem adjuventi ex Sole tam ad globum Terrae turbinaudum, quam ad Lunam circumagendam, turbati fuerunt in effectu ultimo numeri archetypici (ut pro 360 fierent 365 cum quadrante, et pro 12 lunationibus in anno 12 cum triente circiter), sic nunc etiam propter ejusdem accelerationis Lunae auctarium hoc ex illuminatione Solari fit, ut prius Luna veniat ad latera media circuitus sui, quam fibrae justo modulo inclinatae sunt, itaque loco profundiori, quam quanta est quarta pars ab apside, fibra in Solem spectet; quo facto transpositionem apsidum fieri supra inculcavimus. Sensibilem vero admodum par est esse transpositionem hanc apsidum, quia sensibile est illud auctarium, sc. fere 11 graduum, minorem tamen hanc, id est trium graduum, paulo plus, in mense: 1) quia illi gradus potissima parte accumulatur in copula, fibrae vero sine copularum respectu plurimum inclinantur et reclinantur in longitudinibus mediis, itaque ut plurimum ab invicem aberrant aequalium numeratione graduum affectationes (quo in nodo verisimile est adhuc aliquid additum haerere, cujus ignorantia fiat, ut Lunae motus nondum ad scrupulum exacti sint, ne in Tychonis quidem calculo); 2) quia inclinatio fibrarum non tantum praevenitur loco et tempore, sed etiam quantitate ob id ipsum multatur. Si enim tardius incesisset Luna, vel si tanta fieret etiamnum fibrarum inclinatio in Luna accelerata, quanta futura fuisset in tarda, longius etiam apsides transponerentur. At fit acceleratione Lunae, ut fibra obviet Soli prius, quam ad justum inclinationis modulum, originaliter sibi tributum, pertingat; quarum rorum permixtione fit, ut inter nihil vel insensibile, quod esset sine acceleratione Lunae, et inter 11°, quos causatur acceleratio, medium aliquid, scil. $3\frac{1}{4}^{\circ}$ in apsidum motum redndet. Eadem dicta sunt de fibrarum latitudinis impulsione seu reclamatione: debuit enim ea esse insensibilis, ut in planetis primariis, si Luna ut primarii simplici vi incesitura fuisset. At quia acceleratoria vis, superveniens Lunae, aestimata est 11° fere longitudinis effecta, quae, si toto ambitu fibrae latitudinis incamberet, illas ut contra se non munias totis 11° reclinaret, illa fibras nacta tantum in limitibus sibi obnoxias, uno tamen gradu cum semisse reclinat in una periodo, quam reclamationem sequitur praecessio limitum.

Verutamen cum de quantitativis et proportionibus binorum istorum motuum, altero apsidum, altero limitum Lunae, constet exacte ex observatione tot jam seculorum, superest etiamnum locus ingenio. Nam qui causas harum rerum tales attulerit, ut ex his sequatur haec ipsa quantitas, is curram circa metam agat. Id tanto magis anniti debent philosophi, quod Luna praeter

tot ista experimenta etiam in hac quaestione nostra magistra est ad cognitionem coelestium acquirendam, praefectaque exemplo suo naturae plauctarum omnium.

Qua ratione fit, ut Luna praeter consuetas latitudines periodicas excursus etiam synodicos in boream et austrum faciat? Vis illa luminis, confortans speciem Telluris, Lunae motricem, sicut plagam motus et proportionem operis sui mutatur ab ipsa quam confortat, sicut etiam transit in ipsius orbitae ingenium causa longitudinis, pro mutuae appellationis modulo, sic idem etiam facere statuenda est causa latitudinis. Facilitabat motum in longum, quia extenditur ipsa in longum, facilitabit igitur etiam motum in latum, quia et alteram latitudinis extensionem habet, hoc est quia lux superficiei est, densitatis particeps, ut saepe ex optice allegavimus. In copulis igitur fibra latitudinis orbitam tangente et inclinata secundum latitudinem speciei Telluris, luminis ista latitudo sese speciei Telluris applicans faciliat excursus, ut fiant angulo majori, quam quantum fibra cum plano eclipticae facit, eaque ratione sidus perveniat in quadris ad limites remotiores in boream et austrum, quam quos monstrabat fibra ex copulis. Vicissim alio anni quadrante fibra latitudinis, orbitam tangens in quadris, non accommodat se ad extensionem speciei lucis in latum, sed tenditur obvia Soli fere, quemadmodum et ipsa orbita Lunae. Sicut igitur ibi loci nihil facilitatur motus longitudinis a lumine, sed quasi asperatur, sic idem etiam redundat in excursum latitudinis, ut is non fiat major, quam quo angulo fibra latitudinis inclinatur ad eclipticam; ita non pervenit Luna in copulis ad limites remotiores, quam quos monstrabat fibra e quadris. In limitibus vero versanti Lunae quid accidat, aut quo vultu illam lumen Solis adspiciat, quando sc. fibra latitudinis in Terram tenditur, nihil interest latitudinis. Nam nulla tunc est actio fibrarum latitudinis in permutatione excursus cum recursu, nulla igitur neque confortatio ejus a lumine, ut quod leges sui objecti sequi diximus.

Cum omnia in fibras globorum corporeas inque species immaterialitas Solis et Terrae corporum turbinatorum, denique in lumen Solis, ut confortantem causam, conferas, animalibus facultatibus nihil relinquas: perinde videris philosophari, ac si quis contenderet, sufficere ventriculo fibras suas triplices ad munia sua, nec opus esse facultate animali. Imo in corpore Solis admitto animam, praefectam turbinationi Solis totiusque motus mundi dispensatricem, nec simpliciter libro I. negavi ne de corporibus quidem planetarum animas singulas, turbationi quidem corporum praefectas. At quemadmodum necesse non est, animam peculiarem inducere in fibras ventriculi (sufficit enim, unam communem animam ex corde vel epate per speciem sui vel per calorem excurrere in ventriculum ejusque fibrarum facultatibus uti), sic etiam in mundo sufficere videtur species ista (ut lucis, ut caloris, sic etiam, si placet) animae Solaris, una eum luce et calore emissa et penetrans eo etiam, nude lux et calor excluduntur, sc. in fibras corporum internas: ut sicut anima in corpore sine ventriculi organo, sic etiam mundi anima sine his legibus et dispositione corporum geometrica nihil possit.

Observetur igitur status controversiae: longe namque est aliud, omnem motus coelestis dispensandi rationem, quamvis contradictiones involventem eoque impossibilem, revocare simpliciter ad vires occultas alicujus animae, repudiatis instrumentis corporeis et modis omnibus, quos humana mens possit committere, quod est omnis ignorantiae *ηγορευτορ*, mors mera omnis philosophiae, plerisque tamen, qui de astronomicis scribunt vel loquuntur, usitatis-

simum, partim etiam in ipso Ptolemaeo supra notatum, aliud etiam, prius omnia dispicere in corporibus aptata ad motum, ut appareat possibilitas motuum exemplis etiam popularibus, postea demum istis omnibus, veluti humano corpori ex omnibus suis musculis et nervis compaginato, superfundere motricem animam; quae si quā munia corporeis instrumentis expedire potest, ad ea non opus habebit consilio et discursu, operibus intelligentis animae propriis: quemadmodum e contrario, si omnia consilio et discursu perficeret, corporeis istis instrumentis non indigeret.

Breviter, philosophi commenti sunt intelligentias, quae motus coelorum ex se ipsis, velut ex commentario depromant, quae consensu, voluntate, amore, intellectione sui, denique Jussu utantur; mihi anima vel animae motrices sunt ex inferiori genere, quae solum impetum (veluti quandam motus materiam) afferant uniformi contentione virium, sine mentis ope, leges vero (seu formam) motuum in ipsis inveniant corporibus, mente quidem, at ea non sua sed Creatoris, in ipso mundi principio semel conformatis et ad tales motus efficiendos attemperatis.

**LIBRI QUARTI, DOCTRINAE THEORICAE PRIMI, SEU PHYSICAE
COELESTIS FINIS.**



EPITOMES

ASTRONOMIAE COPERNICANAE,

Usitata forma Quaestionum et Responsionum conscriptae,

LIBRI QUINTUS, SEXTUS, SEPTIMUS,

quibus proprie

DOCTRINA THEORICA

(post principia libro IV. praemissa) comprehenditur.

AUCTORE

Joanne Keplero.

Cum Privilegio Caesareo ad Annos XV.



FRANCOFURTI,
Sumtibus Godefridi Tampachii.
Anno MDCXXI.



Admodum Reverendis, Illustribus, Generosis, Nobilissimis, Strenuis
etc. Dominis, Archiducatus Austriae Suprauisanae Ordinibus etc.

Dominis meis gratiosissimis.

Post quadriennium ab editione primae partis Astronomiae Copernicanae, quae doctrinam sphaericam libris tribus explicatam continet, post annum ab edito libro quarto, quo physicam coelestem, seu principia doctrinae theoricæ de motibus planetarum tradidi, sequitur tandem aliquando pars theoricæ, speculativa, sic dicta a theoris, hoc est instrumentis manualis, in quibus cum speculis motus singulorum planetarum repræsentantur.

Si temporis circumstantias respicio, sera est oppido pro dolor editio ista, postquam bello coorto perniciosissimo coetus discentium, quibus ista scribuntur, vel dissipati sunt turbis bellicis, vel attenuati emactatique belli expectatione; postquam Austria, hactenus altrix et benefactrix mea, durissimum in scopiū illisa, a decorum istorum tutela ad seriam salutis suae eura[m] avocari videtur; postquam ipse quoque privati meorum hostis atrocitate domicilio meo Linciano exitus, annum pene totum foris discursito.⁶⁹

Si causae tantarum morarum sunt dicendae, non ego curatoris supinitatem, quae lude ab editione sphaericæ doctrinae tenet hucusque, non belli vel locumbentis incommoda vel imminentiæ metas allegabo; beneficium est, non culpa, quod hactenus impedita fuit hæc editio. Quid igitur causæ dicam, quo tuear existimationem meam crimenque negligentiae diluam? *Nosti mores mulierum*, inquit Comicus, *dum moliantur, dum comuntur, annus est*. Atqui si cui noti sunt mores astronomiae, dicere is poterit, nullam se unquam novisse neque cunctantio[re]m neque scrupulosiore[m] feminam. Quod nisi hoc temporis fuisset interpositum, quo consilia mea maturitatem suam consequuta essent, in periculo res versabatur, ne delicatula illa, fastidito omni mundo, novos sumtus, novum ornatum efflagitaret. Multa scilicet me monuit computatio Ephemeridum, multa editio librorum Harmonicorum, intermedii temporis opera, ut quamvis pieraque, quæ ad sex planetas pertinent, jam ante annos duodecim in Commentariis Martis vel constituta vel saltem affecta essent, quamvis lude transumpta inque formam institutionis composita jam a septem annis haerent in scrinii meis, operas expectantia curatoris et chalcographi: quotiescunque tamen illa relegeram, vel augmentationibus, vel dilucidationibus, vel transpositionibus textus necessitas imponeretur novæ descriptionis. Ita factum, ut de primo exemplari ne vestigium quidem supereset in eo, quod exhibitum est chalcographo. Jam quod Lunam, planetarum ultimum, attinet, quando primum ego animum ad editionem hujus Epitomes adjeci, nulla illius singulari cura tenebar, propterea quod jam exstarent Tycho[n]is Brahe[i] suppositiones de Luna; quæ vero in genere poterant inveniri æquipollentia[e], quibus etiam hujus planetae motus adeo multiplices ad causas

meas physicas traducerentur, illa quoque exstabant adumbrata in Commentariis Martis et perculsa ulterius in Hipparcho meo. Erant autem ejusmodi, ut duplicem in Lunae circulum, eccentricum ntrumque, supponerent, rem physicis speciationibus inimicissimam adeoque intolerabilem. His fundamentis innixa est computatio Ephemeridum, e quarum praelequitis apparet, semel atque iterum mutata esse formam calculi, quippe fluctante passimque impingente assensu.

Hac cruce denique liberavit astronomiam praecipua speculationum mearum felicitas mense Aprili anni 1620 (cfr. III. 661 ss.), cum consideratis attentius causis physicis appareret, supervacuum esse alterum Lunae eccentricum, adeo ut ne quidem imaginatione illius, quantum ad longitudinis motus, opus esset amplius. Jamque tempus erat, ultimum colophonem imponendi libro quarto Epitomes, qui est de principiis doctrinae theoricæ; quo facto ad editionem illius operam transtuli media inter arma Bavarica crebrosque morbos et mortes tam militum quam civium. Quin etiam Ephemeris in annum 1621. computata statim fuit ex hoc simplici Lunae eccentrico, jussusque prologus, more ceterarum mearum Ephemeridum, significare gaudium meum publice super triumphato altero Lunae eccentrico. Verum itineris mei necessitate prohibitus Ephemeridem illam hactenus edere non potui.

Jam quod hanc ultimam Epitomes partem, tribus libris comprehensam, attinet: etsi post editum librum IV. domo absum, neo parum temporis itineribus curisque forensibus insumo, potiori tamen temporis parte mihi licuit interquiescere, atque illam omnem ego in curam hujus editionis impendi. Tübingam ut veni exeunte anno 1620, novam hypothesium Lunarum rationem expositurus Maestlino, coepi quaestiones, ut de ceteris planetis, sic etiam de Luna ex hypothesi physica tandem inventa conscribere.

Mox ut Ratishonam ad familiam rediit, easdem revidi describendasque dedi. Interim libri VI. partem ultimam, hactenus dilatam (quod speraretur facilis interque correctiones typi concinnari posse videretur) nunc aggressus et ipsam deprehendi laboriosam, non tam difficultate, quam multitudine et varietate quaestionum et cura methodi. Monachii breve mihi tempus constitutione antiquarum epocharum et computatione eclipsium intercessit. Statimque ut Tübingam rediit etiam partem libri VI. quartam, de Luna, repetito labore interpolandam vidi, propterea quod definitiones verbis conceptae vim hypotheseos meae physicae nondum exacte repraesentarent.

Postremis mensibus Majo et Junio Stuccardia postremum libellum dedit, qui quidem etiam in postrema curarum parte habebatur hactenus, propterea quod parum astronomis liqueret de motibus octavae sphaerae, quae vero dici de hac materia possent, pleraque in Commentariis Martis, in Epitomes libro III. dudum edito, inque chartis altis essent a me concepta. Multa tamen occasione conversationis cum Maestlino, veteri duce meo ad capessendum hoc iter astronomiae Copernicanae, multa per lectionem librorum, quos hactenus in Austria nancisci non poteram, inciderunt, quae, nisi hucusque dilata fuisset editio, necessario praetermittenda fuerunt.

Interim et litore conspecto navigationis hujus, sine scilicet operis, et submissa Lincol pecunia recreatus, tuae Ad. Reverende D. D. Antoni, Praesul in Kremsmünster, benignitatis et fidei argumento, et denique induciis fori magno quidem meo dolore interpositis, Junium itineri Francofurtano et curae typi dedi. Atque hic rursum dum moliantur operae, dum comuntur pagellae, diagrammata, formae, mensis est, et haec sidera matrona, quam hactenus vultu

et nutibus morositatem est testata, eam nunc demum, postquam ad typum ventum, iurgis et probris verborum et tantum non manibus telisque sancit exercetque. Hanc igitur vobis Ad. Reverendi, Illustres, Generosi Domini, advocatam sisto causae, quae mihi ex dilationibus editionis hujus tam diuturnis nasci posset; cum hac transigite, hujus dicacitatem si vos experti fueritis audiendo, non facile ab eo, qui rem sibi cum illa probat esse, temporis rationes scrupulosius exigitis, praesertim si temporis et operae pretium demonstrare possit.

Atque ipse quoque, vestigia divinae providentiae, cui equidem artes istas (divinorum scilicet operum praeconia) curae esse credo, indefessa prosecutus indagine, postquam quid utilitatis hauserit libellus ex mora ista temporis ad mentem revoco, non terreor adversitatis vestris, Proceres, quae interea vos et provinciam miseram vel sunt adortae vel imminere porro videntur, quo minus et pensum meum absolvam et promissum vobis in dedicatione sphaerici libelli impleam et debitum reddam, quippe de vestro salario hactenus vicilians: spero namque, superesse tantum de misericordiae divinae thesauris, ut sedata hac horribili procella, dissipatis nubibus, Solem serio poenitentibus iterum luere, pacem reducere locumque aliquem his pacis artibus, ut quarum elaborationem procurare non desinit, in Austria quoque superesse et in illa numerum aliquem eorum, qui ex his artibus laudes Dei Creatoris sui addiscant, colligi porro quoque velit, quibus libellum hunc profuturum spero; continet enim primam velut adumbrationem Tabularum Rudolphi numerosque vero propinquos, in quibus pro veris suppositis disciplinae hujus amantes sese luterim exerceant, dum Rudolphinae ipsae, limatis omnibus inque abaeum conjunctis et ad usum promptis, instructae prodeant. Quia etiam ad externos si qua ex meis libris redibit utilitas, uti sunt quidem non in Germania tantum, sed etiam in regnis et provinciis circumjacentibus plurimi, qui eos Francofurto petunt, illos par est ex hac mea dedicatione intelligere, se quicquid hujus est vestrae quoque Proceres liberalitati, qua non interrupta me per haec difficillima tempora fovistis, acceptum ferre debere, quo intellecto, ut quisque est in mathematicas artes propensissimus, in Deum devotissimus, in gratitudinem, virtutum coronam, studiosissimus: ita frequentissime vota sua ad Deum misericordissimum cum meis conjunget, ut sedatis bellorum tumultibus, resarcita vastitate, extinctis odiis, pax aurea revera, Serenissimi Potentissimique D. Ferdinandi II. Roman. Imperatoris Augusti, Domini nostri, Imperium serenet, provincias Majest. S. omnes, imprimis Austriam Supranisanam, foecundo gratiae suae imbre refocillet; vobis denique Ad. Reverendi, Illustres, Generosi, Nobiles, Strenui Proceres, incolumitatem, valetudinem, opes, dignitates ad suam gloriam, ad ecclesiae conservationem, ad Imperatoris gloriosissimi imperium exornandum, ad patriae salutem, ad artium denique, quibus divini Nominis bonos continetur, culturam necessariam in multos annos proferat atque firmet. Valete, Proceres vestrumque clientulum, corpore diutiuscule absentem, aulmo ad quaevis obsequia praesentissimum, commendatum habete. Francofurti Calendis Julii Anno MDCXXI.

Rev. et Ill. DD. VV.

devotissimus Mathematicus

JOANNES KEPLERUS.

EPITOMES ASTRONOMIAE COPERNICANAE

LIBER QUINTUS.

Theoricae Doctrinae secundus.

DE CIRCULIS ECCENTRICIS, SEU THEORIIS PLANETARUM.

Si nullos statuis in caelo solidos orbes, et si omnes planetarum motus administrantur facultatibus naturalibus, quas sunt ipsis planetarum corporibus insitae: quaero igitur, quae futura sit astronomiae ratio? videtur enim illa circularum et orbium imaginatione carere non posse. Fictorum illa circularum et orbium inutili spellectili carere facile potest, at verarum figurarum, in quas ordinantur itinera planetarum, imaginatione tantum abest, ut privemus astronomiam, ut veri astronomi praecipuum opus et labor sit, demonstrare ex observationibus, quas figuras obtineant orbitae planetariae, talesque comminisci hypotheses seu principia physica, ut ex iis figurae demonstrari possint, consentientes cum deductis ex observationibus. Semel igitur stabilita figura orbitae planetariae, in posterum secunda jam et magis popularis erit astronomi exercitatio, calculum astronomicum per hanc genuinam figuram informare et regere, vel etiam illa figura in materialibus instrumentis expressa non secus quam solidis antiquorum orbibus uti planetarumque cursus per has figuras oculis subijcere.

Quam igitur tradis materiam libri quinti, seu theoricae doctrinae secundi, et quo discrimine illam separas a praecedentis quarti et sequentis sexti materiis? Hactenus libro quarto principia physica motuum (inter cetera) sunt demonstrata rationibus et experimentis, quibus ex hisce principiis physicis formabitur figuras orbitarum planetarum earumque figurarum potestates explicabit; ubi erunt excutiendi reconditissimi geometriae penus. Sextus vero usum harum figurarum in theoriis singulorum planetarum docebit et in opus producet. Quartus igitur theoriam habet, quintus organum, sextus praxin; quartus physicus erat, quintus est geometricus, sextus erit proprie astronomicus.

Quot sunt partes libri V? Duae: in prima eccentricus cum suo plano connectuntur cum causalibus physicis; in secunda traduntur definitiones terminorum astronomicorum, qui occurrunt communiter in omnibus planetis circa eccentricum hunc, et explicatur ratio calculi quoad hanc partem.

Qualis igitur formatur figura orbitae planetariae ex principiis quarti libri physici? Si planetae corpus non haberet fibras magneticas, ut secundum plagam illarum unam in boream eliceretur, secundum alteram in austrum, secundum unam plagam traheretur versus Solem, secundum reliquam expelleretur: tunc Sol, gyratione corporis sui circa suam axem circumferens speciem sui corporis immateriatam per amplissima mundi spatia, planetam illam apprehensum una circumferret et 1) siquidem ille initio constitisset sub ecliptica, totum ejus iter exactissime in planum eclipticae ordinaret; 2) eoque in id ipsum punctum, unde factum est initium, semper restitueret; 3) idem esset et corporis Solis et orbitae planetariae centrum; 4) ipsa figura orbitae circulus esset absolutissimus; 5) planeta in aequalibus hujus circuli portionibus omnibus aequalissima celeritate vereretur.

Sed quia posuimus, in cujuscunque planetae corpore duplices fuisse fibras, sit igitur permixtione facultatum corporis planetarii et virtutis motricis Solaris, ut 1) planeta describat orbitam ad eclipticam obliquam; et quia fibrae latitudinalis fere quidem in parallelo situ manent toto circuitu, non tamen omnino, quin potius paulatim post multas gyrationes inflectuntur, ideo 2) planum, comprehensum orbita planetae, proxime quidem est planum perfectum, non tamen omnino; quin potius peracto uno reditu centrum planetarii globi non exacte restituitur ad suum initium, sed novum circulum decurso et absoluto priore connectit in modum circulorum dierum naturalium, de quibus libro tertio fol. 253, vel in modum filii, quod vermis sericus fundit, domunculam sibi circumjiciens et struens ex plurimorum circulorum connexorum implexione, qua etiam ratione efficitur, ut longissimi excursus ad latera non omnibus saeculis sub iisdem locis zodiaci fiant. Et quia fibrae libratoriae planetam faciunt alitrinsecus a Sole trahi, e regione vero pelli, ideo planeta 3) describit orbitam circa Solem quidem, at non ut circa suum centrum, hoc est a Sole eccentricam, efficitur, quae hae ratione 4) non perfectus circulus, sed a lateribus paulo angustior et compressior, nimirum figurae ellipticae. 5) Ob eandem causam et quia species corporis Solaris, motum planetae concilians, in ampliori circulo tenetur et imbecillior est, planeta neque ejusdem celeritatis esse potest in omnibus orbitae partibus; sed tardus in longa distantia a Sole, velox in parva. Denique quia etiam fibrae libratoriae situ suo parallelo plurimarum revolutionum successionebus emoveantur, ideo etiam loca sub zodiaco, quibus planetae sunt altissimi tardissimique, non semper manent, sed paulatim succedunt in consequentia.

Perplexam descripsisti figuram itineris planetarii, nec aptam, quae oculis, praesertim in plano, subjiciatur. Etsi hoc verum est, non novum tamen est in astronomia aut privatum Copernici, nec opus est omnia simul in eodem plano repraesentari, sed possunt perplexiones illae, ortae a tardissima translatione metarum latitudinis et altitudinis, eadem dexteritate secerni, qua vel sunt veteres astronomi, minori tamen apparatu.

Quomodo veteres seceverunt istas translationes latitudinum et altitudinum? Commentum sunt pro latitudinibus orbem unum, deferentem nodos, extremum totius theoriae planetariae; pro altitudinibus vero orbem duos,

inaequalis crassitudinis utrumque, quibus nomen dederunt deferentium auge.

Quare iis utendum non censes? Quia magis ad physicas rationes motuum imaginationi subjiendae comparati fuerunt, quam ad astronomicas. Itaque eorum usurpatione stabilirentur illae physicae opiniones falsae de soliditate orbium, vicissim obscurarentur iis sententiae verae de causis libro IV. demonstratis harum inaequalitatum earumque transpositionis tardissimae.

Quid ergo tu his tribus veterum orbibus substituis ad subjiendae imaginationi rationes astronomicas? Sufficit, ut duas lineas rectas ex centro Solis educamus, alteram per sectiones orbitae planetae cum ecliptica, reliquam per centrum orbitae planetae proprium, utramque utrinque usque sub fixas, et illius motum sub ecliptica in antecedentia signa, hujus sub circulo, qui in sphaera fixarum superat orbitae, motum in consequentia doceamus, aequalissimum utrumque, illum ab aequinoctiali puncto medio, hunc a linea illa intersectionum. Nisi hic excipiendum fuerit aliquid libro VII. ex eo fundamento, quod etiam ecliptica laxatilis est, nec semper per eandem omnino fixas tenditur.

Separatione hac facta, quid remanet imaginationi nostrae de figura itineris planetae? Remanet orbita perfecte elliptica, plano mero regularissimo, ad eclipticae planum constantibus angulis inclinato, a quo eclipticae plano haec orbita secatur linea per centrum corporis Solaris ducta, ut sol. 382 s. libro IV. praemisum. In hac orbita planeta vehitur inaequali per partes celeritate, restituitur vero ad sectiones adeoque etiam ad aequinoctialia puncta, quin etiam ad fixas adque lineam per centra aequalissimis temporum periodorum mensuris, quantum in se.

Nihilne peccat haec imaginatio in causas et mensuras motuum unius periodi physicas? Nihil penitus, dummodo memoria tenemus, ea, quae a reali implexione et connexione plurimum orbitarum sunt ablata per dictas duas lineas, physice non per illas ipsas, sed per inclinationem fibrarum realium corporis planetarii praestari.

Quo jure hanc quoque partem facis Copernicanae astronomiae, cum tamen is auctor manserit in sententia veterum de perfectis circulis? Fateor, formam hanc hypothesium non esse Copernicanam. At quia pars ista de eccentrico servit hypothesei universali, quae motu Telluris annuo et quiete Solis utitur, sit igitur a potiori denominatio. Adde quod ista particula hypotheseos necessarii argumentis physicis ex illa quiete Solis et motu Terrae, dogmatibus Copernicanis, necitur, itaque bono titulo etiam haec ad Copernicum referri possunt.

Qua methodo incedendum, ut demonstretur, ex causis physicis, libro IV. stabilitis, oriri talem figuram orbitae tantamque per partes ejus celeritatem planetae? Incipiendum nobis est ab accessu et recessu planetae a Sole primumque constituenda est mensura geometrica fortitudinis virium, quae exseritur in planetam librandum in quolibet situ fibrarum. Secundo expedienda est etiam mensura geometrica compendiosa effectus attractionis vel expulsionis, qui toto aliquo arcu orbitae per omnia virium incrementa fuit accumulatus. Tertio demonstrandum est, ex tali libratione, inter circumeundum peracta, oriri figuram orbitae ellipticam. Quarto ostendendum est, planum ellipsis exhibere mensuras temporis et morarum, quas planeta consumit in quolibet arcu figurae suae ellipticae. Quinto docenda est aequipollentia inter planum circuli et planum ellipsis, quoad hanc temporis mensurationem. Ultimo denique de-

monstrandum erit, circumscriptione sibrarum latitudinis sic comparata, ut libro IV. positum est, inniti aequalitatem plani orbitae. Quibus demonstratis securus redditur curiosus astronomus (popularibus enim non est opus libro nec IV. nec prima hac parte quinti) de hac parte calenti motuum, quam pars altera libri V. expedire et liber VI. applicationo hujus orbitae ellipticae ejusque plani ad orbem magnum in usum proferre docebit.

I. De incremento librationis.

Incipe a primo et dic, quibus principiis formetur seu determinetur modus incrementi librationis in omni situ planetae? Duae causae concurrunt ad formationem hujus incrementi, activa et passiva. Activa est modulus virium librationarum, respectu sui ipsarum, quantus is invenitur in una qualibet particularum aequalium orbitae eccentricae. Passiva est dispositio corporis planetarii ad Solem alia atque alia, quae non omnis recipit sen admittit totum illum modulum virium, sed quaelibet sustu propriam portionem.

Quid metitur igitur modulum ipsum virium ad librandum planetam? Tria ista: primo distantia arcus orbitae a Sole, secundo quantitas hujus arcus, tertio tempus, quod planeta consumit, dum versatur in illa particula.

Quid confert viribus librationis distantia arcus et in eo planetae a Sole? Quae est proportio distantiarum, contraria est proportio tenuitatis speciei Solis, quae una et eadem et circumfert et librat planetam, tunc attrahens illum nunc repellens, ut lib. IV. dictum fol. 348. Itaque quanto longius distat particula a Sole, tanto imbecillius quovis temporis momento planeta in ea versans libratur. Hoc nomine solo Sol absumeret in diversos interque se aequales arcus eccentrici vires inaequales.

Quid efficit quantitas particulae seu arcus orbitae? Quia in longum arcum profunditur multum virium, parum in brevem: aequalibus igitur arcibus positis, hoc quidem solo respectu vires debentur aequales.

Quid praestat tempus ad augmentum virium seorsim, et quid omnes tres causae junctim? Cum planeta, ut lib. IV. fol. 349. 351. ostensum, quo longius a Sole distat, hoc diutius moretur in aequalibus orbitae particulis, hoc diutius etiam sentiat vim motricem Solis, quanta est in illius particulae distantia, et vero jam dictum sit, quo longius a Sole distet una quaelibet particularum aequalium orbitae, hoc imbecillius etiam in illa planetam librari: quare quo imbecillius libratur in uno momento temporis in quavis aequalium orbitae particularum, tanto diutius etiam et versatur et libratur in illa. Cum ergo compenset virium imbecillitatem prolixitas temporis, quo planeta vires illas in se experitur idque in eadem utrinque proportionem, earundem scilicet distantiarum a Sole, hinc tandem efficitur, ut in particulis eccentrici aequales modulus etiam virium librationarum exeratur a Sole quidem et respectu ipsius, ut agentis, aequalis penitus. Vide fol. 349. 374 schemata. (Cfr. epistolam Kepleri fol. 74. ss.)

Jam igitur dic mensuram portionis, quam de modulo Solarium virium admittit in se planeta in quovis situ suo ad Solem. Attendendus est angulus, quem Solis radii faciunt cum sibris globi planetarii magneticis. Hujus enim anguli sinus complementi metitur hanc virium portionem admissam. Cum enim causae librationis effectrices sint Solis radius et fibrae magneticae corporis planetarii, duae lineae physicae, mensuram quoque fortitudinis librationis ab angulo inter has lineas ejusque sinu peti par est.

Ut si sit A Sol, I, E centrum corporis planetae, RP linea ducta per A Solem

Fig. 74.



et centrum orbitae B, erunt EG, IH fibrae magneticae in RP propemodum perpendiculares (saltem compensatione semicirculorum considerata) et H, G termini solipetae. Positum est enim libro quarto folio 375, fibras in circulatione corporis manere sibi ipsae propemodum parallelas et in P, R nullam occasiorem exhibere tractas vel repulsa, quia ibi loci utrisque terminis, et solipetis et solifugis, aequaliter ab Sole distant; in locis vero intermediis, ubi termini solipetae vel solifugae recta in Solem spectant, librationis vigorem esse omnium maximum. AE et AI sunt Solis radii. Ducantur ED et IO lineae ipsi RP parallelae et in illas perpendiculares ex F et C punctis, in quibus radii Solis secant circulos globi planetarii medios, sintque CL et FK. Hic anguli radiorum Solis cum fibris sunt AEG, AIH, angulorum complementa CED, FIO, seu arcsus CD, FO, et horum sinus LC, FK, qualium IH vel EG est sinus totus 100000. Statuitur igitur, sicut so habent EG, IH ad LC, KF, sic esse totum modulum virium, ex Sole in I vel E praesentium, ad portionem, quam admittit planeta in sitibus fibrarum EG et IH. (Transparet in figura 74 punctum K in lineam IO, punctum H ad sagittae arcum.)

Quare sinum potius mensuram status, quam anguli vel arcus complementum ipsum? Quia fibra quaelibet magnetica quamvis in globoso corpore iussit, non est tamen circulus, sed recta linea physica, quae fortissime operatur (vel ad patiendum tractum seu ad vires radii Solis in se admittendas fortissime est disposita), cum recta in Solem dirigitur, vel quod idem est, cum est in planum illuminationis circuli (quo finitur pars globi Soli obversa) perpendicularis: cum vero in illud planum est obliqua, aequipollet perpendiculari a suo termino in illud ductae, ut breviori. Sic Solis radius, secundum calefactionis opus consideratus, quando recto angulo ferit plantitem, fortissimo calefacit, quando vero obliquis, jam calefacit minus in ea mensura, quanto quam obliquus radius minor est ducta ex Sole perpendiculari in idem planum (continuum).

Pulchrior erit consideratio ista: si perpendas, totum globum ex meris fibris constare, quarum longissimae sunt, quae insunt in circulo globi maximo, breviores, quae in lateralibus, hoc pacto non tantum EG vel IH fibra erit, sed etiam, quos tetigimus sinus LC et KF, signatos a radio Solis AE et AI in terminis suis C, F, ii sunt fibrae laterales. Quanto ergo minores sunt CL, FK quam GE, HI, tanto minus virium ex radio Solari admittit in se unaquaelibet fibra totius corporis, ob hanc ipsam obliquitatem radii Solis in se. Ita radius ipse Solis, designando fibrarum lateralem, designat sinum, qui est mensura portiones suae virtutis in eas receptae.

Praeterea omnis motus naturalis vel artificialis, in quem vel eadem vel analogae concurrunt principia, dispensatur per sinus angulorum, praecipue vero et evidentissime motus vel natus brachiorum in libra et statera. Cum igitur etiam haec libratio sit inter motus naturales latiori significatu (quippe potentia librans speciei Solaris est dimensionum particeps et quodammodo, sine tamen materia, corporalis; dispositio vero fibrarum in planeta rursus est corporalis), non est absurdum, etiam hanc librationem accipere leges eandem cum libra et statera. Id tanto magis verisimile de libratione versus Solem, quod ipsa etiam promotio planetae in longum suae orbitae, causa intensiois et remissionis, velocitatis scilicet et tarditatis, ejusdem librae vel staterae leges imitatur, ut libro IV. dictum folio 351. et 374. infraque pluribus fiet evidens.

Compara hanc librationis velocitatem cum rationibus librae. Linea ex

non maneret parallela horizonti: in statera vero ponderum linea manet horizonti parallela, sed jugum dividit longitudinem brachiorum non in medio, sed propius graviori ponderi, sic ut brachia permutata habeant proportionem ponderum.

Ut si manubrium librae DA sit aequale brachiis BA, AC, statera sic formabitur, pondera ista, ex B, C dependentia, suspendura ad aequilibrium horizontis. Ex D perpendicularis in BC ducta, quae sit DK, erit manubrium, et brachia BK, KC; et ut DF prius ad FE, sic hic BK ad KC. Tunc ut BK minus brachium ad KC majus, sic pondus H minus ex C suspendendum ad pondus I majus ex B suspendendum.

Monendus est lector, difficilem esse experimentationem mechanicam, quia mechanice cavere non potest pondus et crassitudo ipsorum brachiorum: debebant autem geometriae constituere meram lineam sine pondere et latitudine. Cui impedimento quomodo ex parte occurrendum, videatur in Archimede. (De Aequiponderantibus libri II.)

Teneo mensuram fortitudinis seu incrementi librationis in quolibet situ fibrarum corporis planetae, petendam a complemento anguli fibrae cum radio Solis; quia vero difficulter patescere videtur hic angulus, eo quod non tantum corpus continue transfertur de loco in locum, sed etiam ejus fibrae inclinantur, mensura haec incerta eoque inepta videtur ad usum. Imo propter hanc ipsam inclinationem fibrarum angulus iste in arcum orbitae potest converti, ut ex hoc arcu prodeat idem sinus, eadem scilicet mensura, qua ratione ad usum illa fit accommodatissima.

Docet et demonstra hanc conversionem anguli dicti in orbitam. Memineris initio, cum planeta est in apsidibus, hoc est in principio orbitae, angulum inter radium Solis et fibram esse rectum. Rursus libro IV. fol. 379. ostensum est, fibram NQ illius signae in ipsum Solem A dirigi, seu cum radio Solis NA uniri, consumpto hoc angulo, cum est peractus quadrans orbitae PN ab apside P, ut ita arcus orbitae ab apside metiatur complementum hujus anguli. Restat igitur hoc demonstrandum, etiam angulos intermedios fibrae cum Sole, ut HIA, inter rectum et nullum, a mediis arcibus orbitae, ut PI, inter nullum et quadrantem, sic compleri, ut juncti faciant 90°.

Demonstraturque sic: fol. 380. est dictum, sicut est IS ad NB, sic esse sinum anguli HIS ad sinum anguli QNB fere. Id captus causa sic usurpatum fuit de IS et NB, quamvis vi speculationis physicae verum sit potius de sinibus angulorum IAP, NAP. Jam vero etiam sinus AIB est ad sinum ANB anguli, sicut sinus anguli IAP ad sinum anguli NAP. (Ut enim BI ad BA, sic sinus BAI ad sinum BIA, et ut eadem BI vel BN ad BA, sic sinus BAN ad sinum BNA; ut igitur sinus BAI vel IAP ad sinum BAN vel NAP, sic sinus AIB ad sinum ANB.) Ergo comparatis inter se membris praemissis, invenietur HIS aequalis angulo AIB, et QNB angulo ANB, detractisque aequalibus, erit SIB aequalis angulo HIA (sicut analogice BNB angulo ANA). Sed ipsius SIB mensura est IN, quia ipsius SBI mensura est PI, ergo etiam ipsius HIA mensura erit IN, complementum arcus PI. Dato igitur arcu orbitae PI, statim datur et SI sinus illius arcus, mensura scilicet incrementi librationis.

II. De summa librationis peractae.

Teneo mensuram incrementi vel vigoris librationis ad quodvis momentum: velim vero scire mensuram partis de libratione peractae a principio usque ad illud momentum. Ea habetur ex ejusdem arcus de orbita confecti sinus verso. Nam sicut se habet tota longior diameter ellipsis ad librationem totam, seu quod eodem redit, semidiameter orbitae ad eccentricitatem, sic etiam se habet sinus versus ejusque arcus, de orbita ab apside incipientis,

ad partem librationis, quae interim conficitur, dum planeta percurrit arcum illum.

Quo medio demonstratur hoc? Mediante illa ipsa mensura incrementorum librationis, jam modo sua demonstratione munita.

Sit enim circulus perfectus PD, cujus centrum B, sitque A Sol, linea apsidum PBAR, et P, R summa et ima apsis, et AB eccentricitas, ejusque duplum PB sit libratio tota. Dividatur jam circulus in partes aequales minimas, initio a P facto, sintque PK, KG, GD, DN, NS, SR, et a divisionibus hae ducantur ipsi PR perpendiculares KX, GF, DB, NA, SY.

Igitur per praemissa, ut sinus KX ad GF, DB, NA, SY. RR (punctum vice lineae), sic sunt inter se librationis incrementa, ipsi arcus PK, KG etc. respondentia, pnta PM ad MI, IF, FQ, QV, VB, quod verum est eo respectu, quo respectu intelligitur fieri divisio in infinita, quando KX et RR aequales intelliguntur esse. Cum igitur puncta P, M, I, F, Q, V, E ponantur discriminare dicta librationis incrementa, transponantur ea in suas quaeque distantias planetae a Sole A. Centro scilicet A, intervallis AM, AI, AF, AQ, AV scribantur arcus ML, IH, FE, QO, VT, ut sic orbita planetae elliptica descendere intelligatur ex P per L, H, E, O, T in R, erunt distantiae planetae a Sole AP, AL, AH, AE, AO, AT, AR, arcuum vero dictorum PK, PG etc. sinus versi erunt PX, PF, PB, PA, PY, PR. Dico totam diametrum PR, ut sagittam arcus PDR, se habere ad totam librationem PR, sicut sagittae singulorum arcuum se habent ad incrementa librationis singula. scilicet PX ad PM, sic PF ad PI, sic PB ad PF, sic PA ad PQ, sic PY ad PV.

Nam positum est, librationis partes PM, PI etc. esse in proportionem sinuum KX, GF etc. Jam vero etiam totius sagittae PR partes PX, PF etc. sunt in eadem proportionem sinuum KX, GF etc. et cum eadem conditione divisionis infinitae: ubi (non minus quam prius) punctum R sustinet vicem lineae RR.


Ergo permutatis partes librationis in eadem proportionem respondent partibus sagittae, et per consequens quaelibet portio librationis tota a principio P respondet sagittae suae toti in eadem proportionem.

Unde scimus, partes PX, XF diametri PR, ut sagittae consideratae, esse in proportionem sinuum KX, GF, qui eas determinant? Demonstravit Pappus, Mathematicarum collectionum libro V. prop. 36: si sphaericum, quod intelligatur sub PGZ, planis parallelis quocunque, ut KW, GZ etc. secetur, superficiem sphaerici et axem sectionum, ut PR, secari in proportionem semper eadem: ut sicut est superficies sphaerica KPW ad proportionem axis PX, sic etiam sit superficies KWZG ad portionem XF, et sic de ceteris.

Atqui si sphaerica superficies intelligatur divisa in zonas infinitas aequales, erit quaelibet zona, puta KW vel GZ, ut circulus aliquis latitudine carens. Sed circuli KXW, GFZ sunt inter se, causa longitudinis, ut eorum semidiametri KX, GF etc. quare etiam portiones axis PR respondentes, pnta PX, XF. tenebuntur proportionem sinuum KX, GF, quibus determinantur.

Demonstrationem ejusdem theorematism per numeros et anatomiam circuli vide tentam in Comment. Martii, capite LVII. Ibi loci videbatur haec proportio nonnihil deficere, quia Pappum nondum legeram. Sed causa fuit, quia primam sagittam sumsi arcus non satis parvi, quod perinde est, ac si in Pappo divideres superficiem sphaericam in partes non minores, quam unius

Fig. 76.



tervallum aequale ipsi BP ex A extendatur in DB, sitque terminus ejus E. Planetas igitur orbita secabit DB in E. Rursum assumatur arcus circuli PG ejusque sinus seu ordinatim applicata GFZ et sinus versus PF. Fac igitur ut BP ad PF, sic BA, dimidium librationem, ad partem ipsi PG competentem, qua abiata ab AP, residuum ex A in GF extendatur iucidatque terminus in H. Dico, ut DB est ad BE, sic etiam esse GF ad FH. Scribantur enim quadrata, super GF quidem GIOF, super HF vero HK, ut sit gnomon HIK; deinde G cum A et cum B connectatur, et ex A perpendicularis in GB continuata extat, quae sit AC.

Dico initio, quadratum ab AC aequale esse gnomoni HIK.

Nam quia factum est, ut BP ad PF, sic BA ad differentiam linearum AP, AH, quare etiam ut PB ad BF, sic BA ad excessum, quo AH adhuc superat BP. At etiam ut PB seu GB ad BF, sic AB ad BC, quia GFB et ACB rectangula aequales habent angulos GBF et ABC ad verticem. Ergo BC aequat portionem, qua AH superat BP; at et CG superat BP, hoc est BG, eadem portione BC, quare aequales sunt GC et HA. Sed quadratum rectae GC una cum quadrato perpendicularis AC juncta aequant quadratum rectae GA. Ex altera vero parte quadratum ab AF cum quadrato ab FG junctim aequant quadratum ejusdem GA. Ergo aequalia sunt duo quadrata a GF et ab FA juncta junctis quadratis a GC et a CA. Aequalia igitur auferantur, hinc quadratum ab GC, inde quadratum ab aequali linea AH. id est duo quadrata et ab AF et ab FH, scilicet HK: restat hic quadratum ab AC, illic gnomon HIK. ⁶⁹)

Hinc jam facile pertexitur reliquum demonstrationis propositae.

Nam ut unus sinus GF ad suam perpendicularem AC, sic omnes alii ad suas ex A. Ut igitur quadratum sinus GO ad quadratum ab AC, id est ad gnomonem HIK, ita omnium sinusum quadrata ad suos gnomones: quare etiam ablatis gnomonibus, ut unus sinus GF quadratum GO ad quadratum HK ipsius FH, a distantia HA planetae a Sole determinatae, ita sinuscujusque sinus quadratum ad minoris a sua distantia determinatae quadratum. Quorum vero quadrata sunt inter se proportionalia, illa ipsa ut latera sunt proportionalia inter se. Ut igitur GF ad FH, portionem ab AH terminatam, sic quilibet sinus, ut DB ad BE, portionem a sua AE determinatam: quae ratio est genuina ellipsos.

Altera proprietas ellipsis per se patet.

Ad praescriptum enim legum librationis (quia scilicet in quadrante orbitae PE consummi debet dimidia libratio ipsi BA aequalis) residuae BP aequalem ex A in DB extendimus, scilicet AE. Nam quia A focus unus, si ipsi BA statuatur aequalis in BP ex B extensa, designabitur focus alter, cujus ab E distantia erit aequalis ipsi AE, et junctae aequabunt diametrum: quod fit in ellipsi.

*Quae est proportio DE, latitudinis lunulae ab ellipsi de circulo re-
sectae, ad eccentricitatem BA?* Eccentricitas BA est medio loco proportionalis inter DE et ET. Eodem modo etiam omnis perpendicularis, ut AC, est medium proportionale inter GH et HZ residuum subtensae.

Nam rectangulum sub GH et HZ aequale est gnomoni HIK. Sed hic gnomon est aequalis quadrato AC, ergo et rectangulum GHZ est eidem AC quadrato aequale. Sunt ergo continue proportionales GH, AC, HZ.

De longitudine hujus orbitae ellipticae ejusque partium quid tenebo? Sectio figuris circuli et ellipsis per infinitas GF, DB ordinatim applicatas, primae portiones in P desinentes (ut GP ad PH) erunt ut GF ad FH, ultimae in D, E desinentes (ut GD ad HE) erunt inter se aequales, ita proportio DB ad BE, incepta a P, paulatim obliteratur, Inque D, E in meram aequalitatis proportionem vauescit. Integri vero arcus a P incepti proportionem inter se habent compositam ex omnium minimarum particularum proportionibus omnibus, eoque nunquam penitus exuunt totam proportionem DB ad BE. Nam quadrantes DP ad PE et sic etiam tota circularis linea ad totam ellipti-

eam est ut DB ad medium arithmeticum inter DB, BE, quod est paulo longius quam medium proportionale.

Quia etiam plani elliptici unus erit, quaero, in qua proportionem sit planum ellipsis ad planum circuli, adeoque planum segmenti cuiusque de semicirculo ad planum segmenti de semiellipsi, ab eadem ordinatim applicata facti? Demonstrat Apollonius in Conicis, ubique obtinere proportionem diametri longioris ad breviorum. Ut si eint ordinatim applicatae DB, GF: ut est DB ad BE, sic est area semicirculi PDR ad aream semiellipseos PER, et sicut GF ad FH, hoc est DB ad BE, sic esse et segmentum semicirculi GPF ad segmentum semiellipseos HPF, sic etiam majus semicirculi segmentum GRF ad majus semiellipseos segmentum HRF.

Secetur jam semicirculus per rectam GA, semiellipsis vero per rectam HA: erunt trianguula HAF, GAF ejusdem altitudinis FA, quare ut basis GF ad FH basin, sic area GAF ad aream FAH. Atqui ut GF ad FH, sic etiam area GPF ad aream FPH, quare ut GF ad FH vel ut DB ad BE, sic etiam composita area PGA ad compositam PHA.

Velim denique scire etiam proportionem linearum ex centro figurae in circumferentiam ellipticam ad semidiametrum circuli. Brevissima quidem, ut BE, minor est semidiametro BD latitudine tota lunulae DE. At reliquae omnes, ut BH, minus a BG semidiametro absunt, quam est quovis loco latitudo lunulae, ut GH.

Trianguli enim GHB duo latera GH, BH juncta oportet superare tertium GB. Major est igitur proportio defectus in E ad defectum in H, quam DE ad GH; haec vero est sinus DB ad GF. Major igitur est proportio defectus in E ad defectum in H, quam sinus DB ad GF.

Vicissim quadratorum GF et HF proportio est dupla ipsarum GF ad HF. Aditis vero BF quadratis ad quadrata GF et HF, summae quadratorum constituunt proportionem minorem: quare et eorum latera GB, BH minorem constituent proportionem, quam GF, FH. Quo major igitur BF, hoc magis minuitur proportio GB ad BH, ut non aequet GF ad FH. Et vicissim, quo magis crescit PF, hoc magis etiam crescit proportio GB, BH, appropinquans proportioni GF, FH. Sed PF crescit a P tarde, prope DE velociter. Ergo si GH oblique maneret ejusdem quantitatis, tarde variaret defectum HB circa P, velociter circa D. At non manet GH, sed crescit circa P velociter, circa E tarde, scilicet cum ipsis sinibus GF, DE. Rursum igitur defectus HB crescit circa P velociter, circa E tarde. Minor igitur est proportio defectus EB ad defectum HB, quam sagittae PB ad PF sagittam. Atqui etiam arcus DP ad PG proportio major quidem est, quam sinus DB ad sinus GF, minor vero, quam sagittae BP ad sagittam FP. Ergo proportio defectus linearum BH appropinquat proportioni graduum PG. Vergit tamen versus D quidem ad proportionem sinus DB ad GF, at versus P ad proportionem sagittarum BP ad FP. (Cfr. p. 77.)

IV. De mensura temporis, seu morae planetae in quolibet arcu orbitae.

Qua ratione planum elliptici segmenti sit optimum ad mensurandam planetae moram in illius segmenti arcu? Non aliter, quam si divisione circuli in partes aequales constituentur arcus ellipsos inaequales, et parvi circa apsidas, majusculi circa longitudines medias, in hunc modum.

Centro B intervallo BP scribatur circulus PDRT, cujus diameter PBR, et in eo, ut in linea apsidi, A Sol, fons motus versus E, AB eccentricitas, eique aequalis BV versus P, ut P, R sint apsides.

Jam punctis A, V focus existentibus, scribatur ellipsis, tangens circulum in P, R,

sunt inter se re vera inaequales, aequipollent tamen aequalibus in partiendo tempore periodico.

Dictum quidem est in superioribus, divisa orbita in particulas minutissimas aequales, accrescere illas moras planetae per eas in proportionem intervallo-
rum inter eas et Solem. Id vero intelligendum est non de omnimoda portionum aequalitate, sed de illis potissimum, quae recta obijciuntur Soli, ut de PC, RG, ubi recti sunt anguli APC, ARG; in ceteris vero oblique objectis intelligendum est hoc de eo solum, quod de qualibet illarum portionum competit motui circa Solem. Nam quia orbita planetae est eccentrica, miscentur igitur ad eam efformandam duo motus elementa, ut haecenus fuit demonstratum, alterum est circumlationis circa Solem virtute Solis una, reliquum librationis versus Solem virtute Solis alia, distincta a priori. Ut in IL termini I et L inaequales habent distantias ab A fonte motus, continuata igitur AL in Q, ut AQ sit quantitate media inter AL et AI, et centro A, intervallo AQ scripto arcu QS, secante longiorem AI in S, arcus quidem QS est de priore motus compositi elemento, differentia vero inter AL, AI seu LQ et SI junctae portiones sunt de posteriore motus elemento, quod jam mente separandum est: nihil enim ei debetur de tempore periodico, eum jam in superioribus suam portionem acceperit, ubi de libratione agebatur, legibus aliis. Atqui non alia via separari potest hoc alterum motus elementum, quam sectione illa orbitae in partes inaequales, quam supra tradidimus. Quantum enim excedit junctas KE, LI junctas PC, RG, totum id est de posteriori motus elemento, et illo excessu separato, relinquatur de priori elemento aliquid, quod est aequale junctis PC, RG, quod sic demonstro.

Quia enim AE, AI per superius demonstrata sunt aequales ipsis BP, BR, quare scriptis arcibus per E, I signis, quorum ille de area AEK tantundem abscat et excludit versus K, quantum iste ad AIL adsciscit supra L, ut ita triangu- (sectores verius) novas has bases rectas nanciscantur loco basium obliquarum KE, LI, fiet ut area, junctis PCB, RGB aequali, ad AE, AI applicata, bases etiam seu arcus per E, I scripti fiant aequales basibus per P, R scriptis. Atqui prius est demonstratum, junctas areas KEA, LIA esse aequales junctis PCB, RGB. Quod igitur de obliquis basibus KE, LI pertinet ad circumlationem circa Solem, id aequale est arcibus PC, RG junctis, ubi nulla fere misceatur et libratio versus Solem, quia AP, AC sunt in differentia insensibili, sic et AR, AG.

Eadem demonstrabuntur etiam de aliis particulis orbitae: ut si sumatur CF et continuatis CB, FB in G et H, adjungatur respondens ei GH punctaque quatuor cum A fonte motus connectantur. Nam demonstratum est in superioribus, junctas CA, AG, nec non et junctas FA, AH aequales esse junctis PA, AR seu PR diametro longiori; quare etiam ut prius, areae ACF, AGH junctae erunt aequales junctis BCF, BGH et per has junctas APC, ARG, quamvis CF per institutam sectionis rationem evaserit paulo longior quam PC et GH longior quam RG. Arcus enim novi, centro A, intervallis AC, AG scripti et secantes ipsas AF, AH, juncti aequabunt arcus PC, RG, quia quanto ille majoris circuli arcus est quam iste, tanto minorem ille angulum CAF metitur, tanto hic majorem GAH, ut sic semper juncti anguli CAF, GAH maneant aequales junctis PAC, RAG.

Cum igitur aequalitas alterius elementi in motu planetae, scilicet promotionis circa Solem, consistat in aequalitate angularum circa A Solem, binorum puta junctorum invicem, sit vero inter arcus, qui subtendunt hos angulos, distributa ellipsoeos area aequaliter, binae scilicet areae binis aliis semper sint aequales: recte igitur (haecenus quidem et in quantum de bigis arcuum agimus) area pro mensura temporis constituitur; quippe etiam morae temporis

aequalibus, non omnimodis arcibus, sed eorum promotionibus circa Solem, in eadem a Sole distantia, debentur aequales.

Sit igitur hoc pacto recte distributa area ellipsoe inter bigas oppositorum arcuum: demonstra nunc, singula triangula seorsim singularum morarum esse mensuras justissimas. Demonstratio facilis est ex praemissis.

Nam quia secundum axioma nostrum mora planetae in arcu PC est ad moram in arcu aequali RG, sicut distantia illius a fonte motus AP ad distantiam hujus AR, est vero etiam area trianguli PCA ad aream trianguli RGA (quod basiu RG habet aequalem basi prioris PC) ut altitudo illius PA ad altitudinem hujus RA: quare mora planetae in arcu PC est ad moram in aequali arcu RG, sicut area trianguli PCA ad aream trianguli RGA.

Eodem modo demonstrabitur etiam mora planeta in CF, potestate aequali ipsi CP, esse ad moram ejusdem in GH, sicut est area ACF ad aream AGH, ubi summa utriusque areae aequalis est summae priorum et sic consequenter. Tota igitur area ellipsoe, secta ex A in triangula, eadem proportione distribuitur inter arcus, qua etiam totum periodicum tempus inter eos est distributum. Triangula igitur singula justissimae sunt in proportionem mensurae singulorum suorum arcuum.

Demonstratio hujus plenariae aequipollentiae traditur in Commentariis Martis cap. LIX. fol. 291. (III. 404), cujus folii linea 13. a fine unica vocula erit obscuritatem magnam induxit; quam si mutaveris in *computeretur*, omnia erunt planiora. Quamquam fateor, obscurius ibi traditam plusque operae natum ex eo, quod distantiae ibi non ut triangula consideratae sunt, sed ut numeri et lineae.

V. De aequipollentia plani circularis et plani elliptici in mensurandis moris arcuum.

Durum et insolens, quin etiam intricatum esse videtur negotium, ut calculator in computatione temporis redigatur ad planitiem figurae ellipticae. Imo usurpatione plani circularis loco elliptici sit omnium opulione facilius, adeo ut vetus calculus huic novo in facilitate nequaquam comparandus sit. (v. s. p. 39.)

Demonstra planorum aequipollentiam, causa mensurandi temporis. Repetatur igitur figura 77. pag. 408, qua generationem plani elliptici demonstravimus.

Et quia haec hactenus hoc est demonstratum, quod sicut se habet semisis temporis periodici, quo planeta peragrat semissem orbitae PER, ad tempus, quod planeta consumit in PH vel in PE, sic etiam se habeat ad unguem area PER ad aream PHA vel PEA, supra vero hoc etiam est demonstratum, quod area PDR sit ad PER ut PGA ad PHA et ut PDA ad PEA, omnium enim erat proportio eadem, quae DB ad BE, eoque etiam permutatim: sicut se habet area PER ad PHA vel PEA, sic etiam se habeat area PDR ad PGA vel PDA, sicut igitur se habet semisis temporis periodici arcus PER ad tempora arcus PH vel PE, sic se habet area PDR ad PGA vel PDA. Quare in his segmentis plani semicircularis inest exactissima mensura morarum, quas planeta nocit in unoquoque arcu ellipsis.

Ostende nunc etiam commoditatem hujus mensurationis. Assumpto segmento PGA, ducatur ex G recta in centrum B. Datur igitur proportio sectoris GBP ad totum circuli planum ex quantitate areae PG data, ut non sit opus computatione. Totum enim tempus periodicum totumque planum circuli dividitur in 360 partes more astronomico. Restat igitur altera pars segmenti GBA. Atqui hujus computatio facilis est. Ut enim DB sinus totus

ad GF sicut arena PG dati, sic est DBA ad aream GBA. Semei itaque constituta arca trianguli DBA maximi, multiplicata scilicet dimidia eccentricitate in sicut totum et facto in denominationes astronomicas converso, postea semper erit utilis.

Num insuper etiam alius usus est plani circularis? Est in theoria Lunae peculiaris ejus usus ad demonstrandam ejus inaequalitatem unam, quam illa singulariter habet prae ceteris planetis. Sed quia hic liber V. datus est his tantum proprietatibus, quae communiter insunt planetis omnibus, igitur, quod restat apparatus geometrici ad absolvendam hujus singularis usus demonstrationem, id differtur recte in libri VI. partem 4, scilicet in ipsam theoriæ Lunae.

Qua ratione vetus Ptolemaica astronomia metitur moras planetae in quolibet arcu sui eccentrici, seu quid habet illa loco plani circularis? Utitur ad hoc circulo peculiari, cui aequantis nomen est positum, cujus centrum esset in figuris nostris alter focorum, in proximo schemate V, in antepenultimo F, quia tantum distat a centro eccentrici B versus summam apsidem P, quantum A Sol ab eodem centro eccentrici distat versus imam R. Nam ejecta linea ex centro aequantis V per corpus planetae, arcus hujus aequantis, interceptus inter hanc lineam et inter VP, lineam apsidum, statuitur mensura temporis, quod planeta consumit in arcu suae orbitae.

Videtur hypothesis ista commodior esse ad manuarum extensiones per instrumenta, theoriae dicta: cur istam non retines, cum jam bis adhibueris et ipse vicarias quantitates loco verarum? 1. Quia aequans nunquam perfecte verum dicit, nisi velimus centrum ejus inaequali motu librati facere, qua ratione recederemus a simplicitate hypothesis multoque perplexiorem et operosiorum constitueremus astronomiam in usu, quam illa est his duobus libris, quarto et quinto, in causarum explicatione: cum hisce causis semel perceptis, imo etiam non creditis, sed saltem positis, usus postea parte altera libri V. et libro VI. facilis sit. 2. Quia aequantis hujus ratio penes Ptolemaicum alia est in planetis superioribus, alia in inferioribus duobus, alia in Luna, essetque nunc etiam alia in Sole; at planum circuli eccentrici penes nos in omnibus planetis eidem usui servit eodem modo. 3. Quia circulus aequans a causis genuinis motuum recedit longissime, quas planum circuli de propinquo repraesentat, quippe quod est cum plano ellipsis sub eodem genere.


Eadem intelligantur dicta etiam contra alias aequipollentias, quas miris humani ingenii proferre solet, ut quod David Fabricius unica (quantum duorum aequalium circulorum contrariis motionibus indigente) libratione centri eccentrici in ellipsis nostrae breviori diametro et salvat ingressus planetae a lateribus nostri eccentrici circuli immobilis, et simul librat apsidem, sic ut jam ipse circulus eccentricus numeratione ab apside librati usque ad corpus planetae continuata praestet nobis mensuram temporis. Nec enim mera aequabilitas motuum, nec praecisio omnimoda obtinetur, nec operae compendium fit, et causae motuum occultantur abneganturque.⁵¹⁾

Omnibus vero modis repudiatur Copernicana machinatio, qui duos epicyclos proportionem motuum dupla circumfert in concentrico: cum enim observationes testentur, ingredi planetam ad latera locis mediis inter apsidem, haec Copernicana hypothesis facit ipsum contraria potius ratione evagari extrorsum: Haec particula hypothesis Copernici emendanda omnino est, salva tamen ejus universali hypothese motus Telluris annui, unde huic doctrinae nomen est.

VI. De regularitate excursuum ad latera.

Num etiam latitudinis calculus certus est, si nulli sunt solidi orbes, et si etiam hoc praestant peculiariter in corpore planetae filamenta? Positis, quae libro IV. fol. 383 s. sunt posita aequaeque sunt omnino et possibilia et consequentanea: necesse est omnino, nasci planum ellipsoid. perfectum.

Sit enim in praesenti schemate TZX circulus per polos eclipticae, A vel Sol sit, it TZX est planum, vel al TAX hemisphaerium, sit A locus primum inferioris in cavo sectionis eclipticae TX cum EG orbita planetae, ut ejus poli sint sub Z, W. Dirigantur fibrae latitudinis secundum GA habeantque facultatem deflectendi motum XVT, a Sole illatum, angulo GAX; et maneant fibrae toto ambitu parallelae. Manifestum est, planeta in A, sectione inferiore, versaute, fibras tenas secundum GA directuras planetam angulo toto et planetam in plano perfecto venturum usque in G, ascendendo usque in planum per polos ductum. Et quia jam fibra ex G in ipsum Solem A dirigitur, non in transversum eclipticae, ideo usque hic amplius excurrat planeta, sed erit G limis; inde paulatim elevatus supra planum ZXW, dirigit fibram in lineam ductam ex A sectione per A Solem, donec veniat in A; sectionem jam superiorem convexae superficiei. Quemadmodum igitur in A maximus est angulus inclinationis fibrae ad eclipticam TX, qui decrevit celeriter, at in G, E nullus est angulus inclinationis fibrae ad eclipticam longitudinem dique consistit haec inclinationis parvitas: sic etiam si ex circuitu EAG fiat integrum planum, partes ejus apud A inclinationisinae sunt ad eclipticam TX citoque decrevit inclinatio. At circa G, E plani margo deorsum in sphaerae profundum vel sursum porrigi intellectus, decurrit diu propemodum parallelus eclipticae plano. Ergo si pro fibrae operatione usurpemus ipsum, scilicet EAG, ut planum perfectum, calculus erit principis omnino consentaneus.



Conclusio primae partis de libro V.

Haec igitur hactenus scripta aulo geometris acri ingenio praeditis, qui nihil in calculum recipere dignantur, quod non sit demonstratione accuratissima multum exque ipsis principiis motuum naturalibus deductum.

LIBRI QUINTI

PARS ALTERA.

DE TERMINIS ASTRONOMICIS EX CALCULO ET ORBITA ECCENTRICA ORIENTIBUS.

Quomodo appellatur orbita cujusque planetae? Appellatur veteri voce eccentricus, subaudi circulus. Et si enim orbitae sunt ellipticae, ut hic PERI, quae habent duo quasi centra A, L, quae physice focus dieimus, et in eorum altero A Sol ipse, ut centrum mundi, inest: tamen etiam punctum inter focus medium, ut B, a scriptoribus concisè centrum figurae peculiari jure dicitur; et praeterea ipsi figurae circulus perfectus PDR motiendi causa circumscribitur, centro B diverso a centro mundi A.

Quod nomen habet in astronomia diameter ellipseos longior PR? Dicitur linea apsidum, quia, cum ducatur per centra A mundi et B orbitae, sectionibus eum orbita monstrat P summam apsidem et R imam.

Unde dicuntur summa et ima apsis, et quod aliud habent nomen? Vox apsis est a rotis ducta, sunt enim puncta eccentrici, illud P remotissimum ab A Sole, hoc R proximum illi. Sed in geometria ratio significationis fit evidentior. Vox enim apsis a tangendo est nuncupata, et vero in P, R punctis circulus mensur tangit orbitam ellipticam. Graecam vocem apsis, apsides, latinae versiones arabieorum librorum exprimunt per voces aux, auges; quasi Arabes graecum Psi in Xi convertissent. Affirmavit tamen mihi quidam arabicae linguae cognitionem jactans, voce augh significari altitudinem.³³)

Libro sexto puncta ista in planetis primariis aphelium dicuntur et perihelium, in Luna apogaeum et perigaeum.

Quae necessitas nos cogit, pro circulari itinere planetae, a veteribus credito, supponere ellipticum, id est deficiens a circulo, et in eo longiorem diametrum inque illa ipsa Solem statuere? Utrumque horum demonstratum est observationibus et demonstratione certissima in Comm. de motibus stellae Martis, usurpatumque libro IV. in schematicis 51, 52 et fol. 354, 372, etiamque libro hoc quinto parte prima. Nisi ergo supponeremus ista, nunquam repraesentaremus observationes.

Quibus nominibus inter se distinguuntur semisses eccentrici, ab hac

arcus orbitae subteudit. Ut sine arcu PK noto, ignorata AC, nequit inveniri angulus CAP.

I. De nominatione.

Quomodo circulus denominat et discernit arcus ellipseos, et quibus modis et quare? Cum elliptica circumferentia se ipsa geometricè nequeat in partes aequales dividi, partesque constitutae a numero denominari: circulus igitur ellipsis loco dividitur in partes aequales, ab apsidibus initio facto, et a divisionum punctis ducuntur perpendiculares in lineam apsidum, secantes ellipsin. Arcus igitur circuli aphelium inter et unamquamque perpendicularem nomen dat arcui elliptico, inter eosdem terminos intercepto, accommodans illi suum numerum graduum et minutorum.

Sit PK $50^{\circ} 0'$, KL perpendicularis in PR, secans ellipsin in C: ergo et arcus ellipseos PC dicitur esse $50^{\circ} 0'$.

Atqui falsum est nomen, cum non sit tantus arcus ellipseos, neque respectu circuli, neque respectu suae totius orbitae ellipticae. Nihil hoc turbat; nihil est enim, in praesentia quidem, nisi nomen, et nomen quidem non mensurae apparentis, sed determinationis et resectionis geometricae; nec opus est scribi genuinam longitudinem ipsius arcus elliptici, veluti ad mensuram ad decempedam, dummodo postea sciamus, hic ipse arcus ellipseos, sic determinatus, quantum angulum faciat apud centrum Solis et quamdiu planeta commoretur in eo. Quid? quod prima huius libri V. parte demonstro, arcum hunc ellipseos, si non longitudine, at saltem potestate tantum esse.

Quomodo perpendiculares istae sectrices ellipseos appellantur? In circulo dicuntur sinus arcuum circuli, inceptorum ab aphelio; in ellipsi generis voce dicuntur ordinatim applicatae, puta ad axem. Ut hic KL est sinus arcus KP, CL est ordinatim applicata.

In specie vero illa, quae per centrum figurae ducitur, ut EBI, diameter brevior seu figurae latus rectum dicitur. Possumus uti graeca voce diacentros. Quae denique per centrum Solis trajicitur, ut MAN, nomine caret, licet sit inter praecipuas. Dicatur novo vocabulo dihelios.

Quodnam est officium illarum perpendicularem, diacentri et dihelii? Dividunt orbitam in partes, superiorem et inferiorem, illa quidem in aequales, sed temporis et apparentiae inaequalis, haec in partes quidem inaequales et tempore et longitudine, sed quae tamen, velut ex Sole, apparent aequales.

Ut EPI, quae constituitur ab EBI est quidem 180 graduum, sed apparet angulo EAI minore quam 180° . At MPN, segmentum majus, absectum linea MAN, et MRN, segmentum minus, utrumque apparet aequalis quantitate 180 graduum.

II. De libratione.

Doce metiri et computare librationes et determinare intervalla. Sit PK arcus eccentrici minor quadrante, verbi causa $46^{\circ} 18' 51''$, ejus ergo complementum KD erit $43^{\circ} 41' 9''$ ejusque sinus BL 69070, et sit eccentricitas AB seu dimidia libratio PH 9265, qualium BP est 100000. Multiplicatis igitur 69070 in 9265 et abscissis 5 ultimis, prodit libratio OH 6399, addenda ad BP vel AH in superiori semicirculo EPI, eritque AO, vel ei aequalis AC, distantia scilicet planetae a Sole 106399, competens arcui PK vel PC, qualium quidem semidiameter est 100000.

Si arcus eccentrici fuerit $313^{\circ} 41' 9''$, excessus super tres quadrantes seu 270° erit etiam $43^{\circ} 41' 9''$, dans sinum eundem multiplicandum; quo cum extrahitur libratio 6399, itidem addenda, quippe in superiori semicirculo, sed ascendenti.

Quodsi semidiameter BP acceperit aliam dimensionem, verbi causa 152342, mul-

tiplicabimus et hanc in AC 106399 absectis 5 ultimis, et prodibit AC in hac dimensione 162090.

Artificio Neperiano conficitur tota haec operatio expeditissime per unicam additionem. Nam sinus arcus KD logarithmus additur logarithmis eccentricitatis 9265 et dimensionis propositae 152342: summa quaesita ut logarithmus exhibet librationem 9748 addendam ad dimensionem 152342⁶³.

Sit deinde arcus PW major quadrante, scilicet $133^{\circ} 39' 7''$. Excessus super quadrantem DW $43^{\circ} 39' 7''$ ejusque vel sinus vel logarithmus cum dictis duobus principiis prodit librationem 9777, subtrahendam ab 152342, quippe in inferiori dia-centri semicirculo, ut prodeat intervallum respondens AS 14256⁶⁴.

Idem erit, si arcus eccentrici habuerit $226^{\circ} 20' 53''$. Nam complementum ejus ad tres quadrantes erit $43^{\circ} 39' 7''$, tantus in ascendenti, quantus DW in descendenti semicirculo.

Recense praecipuos librationis casus. 1. Quando planeta incipit discedere ab apside, tunc simul libratio incipit, planeta scilicet incipit descendere versus Solem, qui discessum a Sole paulo prius finiverat. 2. Quando planeta habet gradus 60 ab apside, tunc libratio aequat semissem eccentricitatis. 3. Quando planeta quadrantem orbitae conficit ab apside, tunc librationis dimidium est peractum, sic ut planeta distet a Sole semidiametro eccentrici. Ut si PD est 90, tunc AE aequat BD. 4. Quando planeta conficit gradus 120 ab apside, tres quadrantes librationis sunt peracti. 5. Quando planeta est in ima apside, tunc proximus Soli factus totam librationem absolvit. Contrarius est ordo per semissem ascendentem. 6. Binae quaeque distantiae a Sole, planeta aequalibus eccentrici arcibus, illae ab apbelio, hae a perihelio remoto, junctae aequant diametrum. Ut si ex C ducatur recta per B in Q, CA et AQ junctae aequant RP.

III. De mora planetae in arcu quolibet.

Quid sonat vox anomalia? Etsi proprie anomalia (Inaequalitas) est affectio motus planetae, astronomi tamen sumunt hanc vocem pro motu ipso, cui inest haec Inaequalitas. Cumque ad motum haec tria mensurabilia concurrant: spatium trajiciendum, mora temporis in spatio, et apparens magnitudo spatii, vox anomalia omnibus tribus est accommodanda. Et causa quidem temporis rursus duplex usus est vocis. Nam primo Ptolemaeus ea utitur pro tempore toto, quod planeta consumit interim, dum restituitur omnis ejus Inaequalitas ad suum principium, totidem numerans anomalias, quoties hoc fit. Secundo, partes hujus temporis totius vulgariter anomaliae dicuntur, pro eo quod Ptolemaeus dixit motum anomaliae, subintellige integrae partem confectam.

Quot sunt igitur anomaliae sumtae ut pars totius? Tres nuncupantur anomaliae in unoquolibet situ planetae: 1) Anomalia media, 2) Anomalia eccentrici, et 3) Anomalia coaequata.⁶⁴

Quid est anomalia media? Est spatium temporis, quod planeta consumit in quolibet arcu suae orbitae, ab apside incepto, redactum in partes et minuta, qualium anomalia tota valet 360° , numerationis logisticae vel astronomicae.

Unde dicitur media? Non ab eo, quasi sit quantitate media inter socias, ut paulo post cavebitur: sed media dicitur limitatione veteris astronomiae, quae anomaliam mediam nuncupare solet pro motu anomaliae medio, id est aequabili, quia tempus sic redactum in denominationem logisticam in-
deat cum suo graduum et scrupulorum numero, quantum arcum circuli pla-

neta confecturus fuisset, si toto isto tempore, quod dicimus anomaliam mediam, inaccessisset motu aequabili et medio inter tardissimum et velocissimum.

Quomodo definienda vel mensuranda esset anomalia media in his schematibus secundum astronomiam veterem? Constituta linea BL (Fig. 80), quae sit ipsi AB eccentricitati aequalis, in linea apsidum BP, ut prima hujus V. libri parte dictum, anomalia media more veteris astronomiae esset arcus circuli aequantis ex L descripti in signorum consequentia, comprehensus inter duas lineas ex L, alteram per apsidem P, reliquam per corpus planetae C traductas. Vel esset illarum linearum angulus ad L ejusve complementum ad 4 rectos. Ut hic si C esset planeta, PLC angulus esse posset loco anomaliae mediae fere.

Defini lineam medii motus et locum medium planetae secundum hanc veterem aequantis hypothesin. Esset linea ex centro Solis in sphaeram fixarum educta, parallela lineae, quae ex centro aequantis seu ex altero foco ellipsis per corpus planetae ducta est, et harum utraque sub fixis monstraret locum planetae medium. In schemate, si C planeta, et AM parallela ipsi LC, AM esset linea motus ejus medii.

Si ergo in hac astronomiae forma nova nullus exprimitur circulus aequans, qua igitur in alia quantitate numerabitur seu mensurabitur anomalia media? In area comprehensa inter arcum circuli, qui denominat et determinat arcum orbitae propositum, et inter duas rectas, quae terminos arcus cum centro Solis connectunt. Ut si propositus sit locus planetae C, ducta ex C ipsi PR perpendiculari, quae secet circulum PD in K, et connexis P, K cum A, area PKA est mensura anomaliae mediae, qualium area totius circuli valet 360° .

Docet computare anomaliam mediam, seu temporis moram, quam planeta consumit in arcu proposito. Sit rursus AB eccentricitas 9265, qualium semidiameter BP est 100000. Aut omnia quaerenda est area trianguli maximi, quod habet angulum ad B rectum, altitudinem BD, multiplicata hac in ipsius AB dimidium, prodit igitur 463250000. Hujus areae DAB valor est exprimendus numero secundorum scrupulorum, qualium area tota circuli PDT est partium gr. 360, vel primorum 21600, vel secundorum 1296000.

Quia igitur, existente BP 100000, area circuli a geometria prodit 31415926536, fiet area DAB 19110 secundorum. Detur jam arcus PC per denominatorem suum PK, qui sit $46^\circ 18' 51''$. Sinus igitur ipsius PK, scilicet KL, altitudo trianguli BKA, multiplicatus in valorem trianguli maximi, rejectis in sine a facto quinque figuris, conficiet valorem trianguli AKB 13819, quae sunt $3^\circ 50' 19''$. Et vero sector KBP valet gradus totidem, quot dati sunt in arcu PK, scilicet $46^\circ 18' 51''$, additis igitur arcis, fit PKA $50^\circ 9' 10''$; tanta est anomalia media.⁶³⁾

Hoc pacto addenda est area trianguli aequatorii, quam diu sector vel arcus est minor semicirculo; qui si superet semicirculum, subtrahenda est illa.

Dic regulam de affectione horum triangulorum inter se. Bina quaeque trianguia, aequaliter remota verticibus, alterum a summa apside, alterum ab ima, magnitudine sunt aequali. Ut si arcus PK et RW aequales, areae BKA, BWA erunt etiam aequales.

Quid est anomalia eccentrici? Est arcus circuli eccentrici, in consequentia numeratus interceptusque inter lineam apsidum et inter perpendicularem illi per corpus planetae, sive per punctum quodcumque orbitae propositum eductam. Ut proposito puncto orbitae C aut planeta in illo versante, si per C ducatur in PAR perpendicularis KCL, secans circulum in K, PK arcus erit anomalia eccentrici.

Quo sensu dicitur anomalia eccentrici? Subintelligitur et hic vocula motus. Nam etsi in arcu ipso circuli PK secundum figuram nulla apparet inaequalitas vel anomalia, motus tamen planetae in orbita PC vero est anomalos, inaequalis, tribus nominibus: primo ratione suae figurae ellipticae, quae secundum diversas aul partes flectitur inaequali curvitate distatque a centro figurae inaequaliter; deinde ratione sceleritatis, quae non est eadem in omnibus orbitae particulis; tertio ratione apparentiae tanquam ex Sole, quia partes orbitae aequales subtendunt apud Solem angulos inaequales. Cum igitur arcus PK ad omnia ista determinanda concurrat, ut prius dictum, quare quo iuro vetus astronomia circulum aequantem introduxit inque eo numeravit anomaliam mediam, non deteriori iuro nos orbitae reali PC circumscribimus circulum eccentricum PK inque eo numeramus anomaliam eccentrici, usurpantes aequabile aliquid ad mensurandum id, quod est inaequabile.

Et in veteri quidem astronomia circulus aequans seduxit physicos, ut imaginarentur sibi realem vel circulum vel certe motum; at hic seduci nemo potest, cum appareat ad oculus, veram planetae orbitam PC in solis duobus apsidum punctis P, R cum hoc technico circulo PK concurrere, toto reliquo tractu sese intra illius complexum versus centrum figurae recipere.

Quid est anomalia coaequata? Est arcus circuli magni in latitudine zodiaci per continuationem plani orbitae planetariae designati, in consequentia signorum numeratus a loco apsidis usque ad locum ipsum planetae vel cuiuscunque puncti orbitae apparentem; vel, quod eodem redit, est angulus, quem arcus quilibet verae orbitae planetariae subtendit aut dictae duae lineae formant apud centrum Solis, eiusve anguli complementum ad 4 rectos.

Ut si planeta in C, coaequata anomalia est angulus PAC; et si planeta in Q, tunc anomalia coaequata constat his partibus: PAM, MAR duobus rectis, et insuper angulo RAQ. Quodsi centro A scribatur circulus quantuscunque, et sic etiam circulus in sphaera fixarum, circuli huius arcus, numeratus ab AP in signorum consequentiam usque ad AC vel AQ continuatas, dicitur etiam anomalia coaequata.

Quare coaequata dicitur? Motum anomaliae coaequatum (vel simpliciter anomaliam coaequatam) dicere consueverunt auctores, non quasi ex proposito motu inaequali fuerit elicitus motus aequalis, sed ratione plane contraria, quod, cum proponatur luitio tempus seu portio temporis periodici et cum hoc tempus (reductum in denominationem astronomicam) indicet, quantum arcum circuli planeta, si successisset motu aequabili, fuerit confecturus intra hoc temporis spatium, iam porro munus sit astronomi ostendere, quantum de motu planetae vere inaequali apparenti respondeat huic tempori fictoque motui aequabili. Sonat igitur motus coaequatus idem, quod motus aequatione affectus et conversus in apparentem, indutus scilicet illam inaequalitatem, quam ei couciulat apparentia, a qua inaequalitate tota periodus anomalia dicitur.

Cum igitur anomalias hasce tres et distinzeris et formaveris per fictitium circulum eccentricum orbitae circumscriptum: quaero, an non possit eidem usui esse vera planetae orbita. Etsi non est opus, potest tamen per aequipollentiam. Nam ut prima huius V. libri parte dictum, tempus et sic anomaliam mediam metitur etiam area PCA, et anomaliam eccentrici potest, qui vult, intelligere etiam per arcum PC. Angulus vero PAC etiam prius dictus fuit anomalia coaequata.

Quomodo quantitate discernuntur tres hae sociae anomaliae? Numerus graduum et minorum anomaliae eccentrici semper est modius inter ceteros. Quao vero media dicitur, ea autequam impleat semicirculum, semper est maxima

de tribus, coaequata minima; post semicirculum vero media dicta est quantitate minima, coaequata maxima.

IV. De angulo ad Solem.

Doce computare anomaliam coaequantam seu angulum ad Solem. Varit sunt modi, sed compendiosissimus est, qui nititur intervallo planetae et Solis. Nam illo etiam ad alios usus indigemus.

Sunt autem hujus modi casus tres; aut enim est planeta supra diacentron, aut infra dihelion, aut inter diacentron et dihelion.

1. Sit igitur initio planeta supra diacentron DBT, pnta in C, et anomalia eccentrici PK $47^{\circ} 42' 20''$ et sit per ejus complementi KD sinum LB 67277 investigata planetae libratio 6233, eaque addita ad BP, sit constitutum AC, intervallum planetae et Solis justum, 106233, in dimensione, qualium BP est 100000. Idem igitur LB sinus complementi apponatur ad BA eccentricitatem 9265, ut habeatur trianguli CAL rectanguli latus alterum LA 76542. Divisa igitur LA, appositis 5 cyphris, per CA, quotiens 72061 ut sinus ostendit arcum $46^{\circ} 5' 48''$, qui est angulus LCA, cujus complementum $43^{\circ} 54' 12''$ est angulus quaesitus LAC vel PAC.⁶⁶ Si logarithmum dimidiatu divisoris abstraheris a logarithmo dimidiatu dividendi, relinquitur logarithmus ejusdem sive sinus, sive arcus.

2. Sit secundo planeta infra dihelion MAN, pnta in S, et anomalia eccentrici PW ejusque excessus supra quadrantem DW. Quomodo igitur supra libratio, per BZ sinum illius areus quaesita, fuit a radio subtrahenda, ut existeret intervallum iustum AS, sic etiam eccentricitas BA subtrahenda nunc est a BZ sinu, ut relinqueretur AZ, latus trianguli rectanguli alterum. Rursum igitur diviso numero lateris AZ, per 5 cyphras prolongato, per latus AS, prodit sinus anguli ASZ, cui aequalis est MAS, excessus ipsius quaesiti PAS super rectum PAM seu quadrantem.

3. Sit tertio planeta inter DBT et MAN, ut si sit anomalia eccentrici FX ejusque excessus supra quadrantem DX sinus BY, quo libratio quidem subtractoria computatur, cum sit tensus infra B, at cum ipse sit minor eccentricitate LA, ipse jam ab hac auferendus est, ut restet YA. Cum hoc igitur et cum intervallo justo agendum, ut in primo casu.

Quid appellas locum planetae eccentricum? Punctum illud in zodiaco, in quod ineidit recta ex centro Solis per corpus planetaeeducta.

Quid est aequatio vel prosthaphaeresis, et quae causa nominis? Est differentia numeri graduum et minutorum anomalinae mediae a gradibus et minutis anomaliae coaequatae, vel secundum astronomiae formam veterem est angulus in centro Solis ejusque mensura, arcus circuli magni sub fixis, interceptus inter lineas medii et lineas eccentrici motus planetae. Hic cum sit auferendus in uno semicirculo, addendus in altero ad mediani, ut fiat coaequata, ex eo composita voce *προσθαφαιρσις* est dicta; aequatio vero inde, quia ejus additione vel subtractione ex anomalia coaequata, quae inaequales sortitur areus et tempora in portiones aequales, fit anomalia media aequabilis.

Quod appellas nomen vel titulum aequationis? Duo vocabula vel eorum indices syllabas vel literas A (Add.) S (Subt.).

Quot sunt partes aequationis, et quae cujusque mensura? Duae sunt partes, altera physica, altera optica dictae. Illa enim est ob inaequalitatem, quae vero planetario motui accidit ob causas physicas, haec vero ob inaequalitatem tantummodo apparentem vel quasi apparentem, hoc est propter majorem vel minorem remotionem arcus verae orbitae a Sole. Utraque quodammodo in eodem triangulo discernitur, quod hinc aequatorium dicitur.

laris, ex B centro ducta in rectam per A, esset longissima, est vero illa sinus anguli BMA, partis opticae, qualium BM est sinus totus. Nam in EA superiorem jam cedit ex B brevior perpendicularis, quam est BA. Sed quia orbita planetarum est elliptica, maxima igitur pars aequationis opticae est inter M et D, sic inter N et T. Primum enim ipse angulus BMA major est angulo ADB, quia triangulum utrumque est rectangulum basi eadem, et vero DB altitudo major est altitudine MA, brevior scilicet diameter quacunque ordinatim applicata. Deinde factis E, I siguis in medio arcuum DM et TN vel circiter, anguli AEB, AIB sunt iterum majores ipsis AMB, ANB. Est enim omnium ex centro B in orbitam brevissima BD, ceterae quo remotiores, hoc longiores, longior igitur BM quam BE sensibilibiter; at non sensibilibiter longior perpendicularis ex B in AM, quam quae ex B in AE. Major igitur est proportio MB ad BA quam EB ad perpendicularem suam. Itaque major etiam angulus BEA quam BMA. Ergo bisecta BA in G ductaque perpendiculari EGI, erit maxima optica aequatio circa E, I. Sed maxima physica fuit circa D, T, maxima igitur composita cadet medio loco inter DE et TI.

Docuisti computare ex proposita anomalia eccentrici anomaliā mediam et anomaliā coaequatam; at crebrior usus exigit, data media, quippe ex dato tempore, invenire reliquas; doce et hoc. Hic via directa nulla est, sed adhibenda est ei, qui sine tabulis hoc vult computare, regula positionum; ponendo scilicet anomaliā eccentrici (in schemate penultimo) PK tantam vel tantam, eique sic sumtae computando suam anomaliā mediam PKA. Nam si ea tanta prodit, quanta proposita fuit, bene erit posita anomalia eccentrici PK. At si non tanta prodit, ex eo quod prodit emendanda erit positio laborque repetendus.

Posses exemplo docere methodum commodam, ne inassuetus nimium erret vagis positionibus? Resumatur igitur superius exemplum et sit jam data anomalia media seu area PKA $50^{\circ} 9' 10''$, manifestum est, si sciretur area trianguli KBA, residuam aream KBP habituram eundem numerum graduum cum arcu suo PK, ac proinde ablato valore ipsius KBA a PKA, relictum iri anomaliā eccentrici PK. Cum igitur PKA major sit quam PKB, erit arcus PK sinus minor quam sinus $50^{\circ} 9' 10''$, minor igitur quam 76775. Sit hic sinus in prima positione 70000, propter facilitatem multiplicationis.

Ductus igitur hic in valorem DBA trianguli, qui fuit in superiori exemplo 11910'', abjectis 5 creat BKA 8337'' sen $2^{\circ} 18' 57''$, quae adde ad sinus 70000 arcum $44^{\circ} 25'$, fiet area PKA $46^{\circ} 44'$; haec nimio parva est, deficit enim per $3^{\circ} 25'$, cum debuerit prodire $50^{\circ} 9'$, quanta est data. Major igitur ponatur sinus in positione secunda, addito defectu $3^{\circ} 25'$ ad arcum prius positum $44^{\circ} 25'$, ut fiat PC circiter $47^{\circ} 50'$, cuius sinus est proxime 74000, quem rursus eligo propter facilitatem calculi. Hic in 11910 multiplicatus facit BKA jam per $7^{\circ} 56'$ actius, scilicet $2^{\circ} 26' 53''$, quod adde ad PK secundo positum, scilicet ad PKB $47^{\circ} 44' 6''$, creatur PKA $50^{\circ} 10' 59''$ et abundamus supra debitam $50^{\circ} 9' 10''$ per $1' 49''$. Itaque intelligimus, hunc excessum parvulum auferendum a secunda positione ipsius PK fietque anomalia eccentrici quaesita sen PK $47^{\circ} 42' 17''$. Id licet comprobare. Est enim sinus hujus arcus 73979, qui de 11910'' vindicat $2^{\circ} 26' 50''$ pro KBA, itaque hoc addito creatur $50^{\circ} 9' 7''$, quod insensibilibiter abest a debito $50^{\circ} 9' 10''$.

De deflexione planetarum ab elliptica.

Quid igitur intelligitur sub nomine orbitae? Proprie quidem illa linea, quam planeta vere circa Solem describit centro sui corporis. Ut in schemate 82.

si ECGD sit pars plani eclipticae, HCFD erit orbita. Secundario vero intelligitur etiam circulus ille maximus, quo planum orbitae continuatum secat sphaeram fixarum. Ut hic MN sectio, tacta a plano CAK continuata.

Quid appellas inclinationem planetae vel cuiusque puncti in orbita ejus, et quid circulum inclinationis? Inclinatione proprie competit non planetis vel punctis, sed lineis vel planis inter se; at quia plana illa circumscribuntur orbitis planetarum et quia in planis lineae motus planetarum intelliguntur descriptae, usu receptum est, ut hac voces simpliciter ad planetas ipsos transferantur, causa brevitatis in loquendo.

Cum igitur id, quod infra libro VI. latitudo dicitur, participet etiam de adventitia seu optica inaequalitate, quam secundam indigetamus, quare, ut res diversae nominibus etiam distinguantur, evagatio planetae vera ab ecliptica dicatur non latitudo, sed inclinatio; desinitur autem sic, quod sit arcus circuli in fixarum sphaera maximi, ex centro Solis descripti, ad eclipticam recti, qui circulus inclinationis dicatur, interceptus inter eclipticam et locum planetae eccentricum. Vel est angulus ad Solem, quem hic arcus metitur.

In schemate si A Sol, FKDHG orbita, MLO ecliptica, puncti K inclinatio erit angulus KAI vel NAL, vel ejus arcus NL ex A Sole descriptus.


Quid appellas nodos, quid limites? Nodi sunt duo puncta eclipticae, in quibus illa secatur ab orbitae continuatae plano. Graece *συνδευκός*, quod his itinera diversa, Solis apparens et planetae, connexa sint; ascendens alter, in quo planeta deserto hemisphaerio australi deflectit in boream, alter descendens, qui planetam in austrum transponit; vocibus ascendens et descendens ad nostrum hemisphaerium accommodatis, ut in quo primi vixerunt inventores astronomiae. Ut si planum orbitae et planum eclipticae concurrant linea CAD, sectionem monstrante, continuata illa sub eclipticam monstrabit M. O nodos.

Limites vero appellantur puncta eclipticae, quae quadrantibus a nodis distant; boreus, a quo planeta distat in boream, australis, a quo in austrum. Dicuntur limites ex eo, quia planeta, deveniens ad illa puncta, non evagetur ulterius in plagas, sed inde sese convertens incipiat ad eclipticam reverti. Ut in schemate E, G puncta eclipticae dicuntur limites. Sed et H, F puncta verae orbitae, et puncta his superstantia in sphaera fixarum, veniant eodem nomine et hoc crebrum.

Quid appellas argumentum inclinationis? Est arcus orbitae planetae sub fixis, interceptus inter nodum ascendentem et locum eccentricum planetae, numeratus in consequentia. Ut si O nodus ascendens, N locus planetae eccentricus, OMN erit argumentum inclinationis LN. Copernicus pro nodo ascendente sumit limitem boreum.

Nam eadem est omnibus seculis inclinatio maxima limitis in quovis planeta? Secundum principia physica libro IV. usurpata per se quidem immutabilis est, at propter ipsius eclipticae inclinationem, de qua libro VII, per accedens potest mutari.

Quomodo computatur inclinatio planetae? Non aliter, quam libro III.



declinatio puncti eclipticae, multiplicato sinu inclinationis maximae in sinum argumenti inclinationis et a facto resectis 5 ultimis, apparet sinus inclinationis. Vide processum fol. 230. et seqq. Si pro sinibus arcuum utaris eorum logarithmis, multiplicatio convertetur in simplicem additionem.

Quid est locus planetae eccentricus in ecliptica? Punctum illud eclipticae, in quo secatur illa a circulo inclinationis, per locum eccentricum simpliciter dictum traducto. Ut si planeta in K, locus ejus eccentricus (sic simpliciter dictus) sit N et NL circulus inclinationis, angulis NLM, NLO rectis, erit L locus planetae eccentricus in ecliptica. Non dicitur locus eclipticus simpliciter, quia hic involvit etiam inaequalitatem secundam, libri VI. materiam; sed additur vox eccentricus, ut intelligamus, de illo loco agi, qui determinatur sub ecliptica per solum eccentricum, remoto jam concursu orbis magni, de quo libro VI.

Quae censetur planetae longitudo eccentrica? Arcus eclipticae in consequentia numeratus a principio Arietis usque ad circulum inclinationis planetae, seu locum eccentricum in ecliptica. Dicitur eccentrica, non quod numeretur in eccentrico, sed quia eccentricus causatur illam.

Quae dicitur reductio ad eclipticam? Arcus parvus, quo differunt inter se binus arcus, alter orbitae, alter eclipticae, a communi nodo incepti et ad circulum inclinationis terminati. Ut hic differentia inter MN et ML.

Quomodo computatur? Non aliter quam libro III. fol. 234 aa. differentia ascensionis rectae et arcus eclipticae respondentis. Multiplicatur sinus complementi inclinationis maximae in tangentem argumenti inclinationis, et abscissis a facto 5 postremis, apparet tangens argumenti reducti. Vel inclinationis maximae antilogarithmus additur mesologarithmo argumenti acervaturque hoc modo mesologarithmus arg. reducti.²⁷⁾

Compendium utilis, etiam pro ascensione, sit hoc. Maxima reductio circa gradum 45° a nodo ducta in sinum arcus cujusque duplicati, abscissis 5 ultimis, constituit reductionem arcui proposito simplo debitam.

Quomodo utendum hac reductione et ad quid? Quando planeta pergit a nodis ad limites, auferenda est reductio ab inclinationis argumento, addenda, cum a limitibus ad nodos; quodque hoc pacto conficitur, additum loco nodi ascendentis constituit longitudinem loci planetae eccentricam.

Quid appellatur curtationem? Est portiuncula distantiae planetae a centro Solis, respondens sagittae inclinationis planetae, in ea proportionem, in qua totum intervallum respondet sinui toto.


Sit A Sol, P, Q poli eclipticae, TAX repraesentet planum eclipticae, EAG planum orbitae; sit planeta jam in E vel G, et centro A intervallis AE, AG scribantur arcus HE, GF, et ex E, G demittantur perpendiculares in TX, quae sint ER, GS, erunt HR et SF curtationes.

Quid est distantia curtata? Est recta in plano eclipticae inter centrum Solis et perpendicularem ex centro corporis planetae. In hoc schemate, planeta in E vel G versante, est AR vel AS distantia curtata.

Quomodo computatur distantia curtata?

Distantia proposita, expressa numeris dimensionis cuique planetae propriae,

Fig. 83.



multiplicatur in sinum complementi inclinationis distantiae propositae competentis, et abjiciuntur a facto 5 postremae. Seu logarithmus distantiae additur autilogarithmis inclinationis competentis et fit logarithmus curtatae distantiae index.

Ubi plurimum curtatur distantia? Circa limites et plus circa illum, qui vicinior est aphelio. Ut si V, Y sint limites, itaque Z, W poli orbitae, et V vicinior aphelio quam Y, erit HR longior quam FS et longissima omnium.

De motu apsidum et nodorum.

Quomodo definia motum apsidis in planetis primariis? Est arcus orbitae sub fixis, interceptus inter id ejus punctum, quod cum certo eclipticae puncto (puta cum principio Arietis vel etiam eum prima stella Arietis) acquiliter a nodo evehente distat, et inter locum summam apsidis, numeratus in consequentia signorum.

Qualis est iste motus apsidis? Statuitur aequabilis 1) propter inexpectabilem tarditatem, quae impediuntur astronomi, ut motum hunc per partes singulas exactius considerare non possint, 2) quia habemus exemplum aequalitatis in uno, in quo brevis est apsidis periodus, scilicet in Luna. Itaque principia hujus motus physica, quae libro IV. fol. 382. delibavimus, ut meris innixa conjecturis, nihil huic aequalitati praejudicare possunt, quamvis per ea motus iste videatur inaequalis effici posse. Sed de hoc plura lib. VI. penes planetas singulos.

Quid intelligendum est per motum nodorum in primariis, seu quid est nodi longitudo? Motus nodi est arcus eclipticae, numeratus in antecedentia signorum a certo ejus puncto (puta vel a principio Arietis, vel a loco primae stellae Arietis) usque ad locum nodi ascendentis. Quod si fiat numeratio in consequentia, tunc arcus hic etiam longitudo nodi dici potest.

Qualis est hic nodorum motus? Etsi rationabile est, etiam hujus puncti motum in se ipso aequabilem esse, videtur ei tamen inaequalitas inesse nonnulla ex accidenti, propter luxationem eclipticae, de qua lib. VII.

Quas figuras describunt nodi et limites motibus suis? Nodi quidem sub circuli magno eclipticae incedunt, limites vero orbitae, in quantum eorum inclinatio permanere ponitur immutabilis, incedunt in circulis parallelis eclipticae, vel ei circulo, respectu cujus inclinatio est immutabilis.

Ad caput juvenandum potest eorum motus imaginatione non inepta polorum proponi, dummodo teneamus hoc, physice loquendo polis hand opus esse. Ut in schemate proximo sit orbita VY (continuatione plani transposita sub fixas), ejus poli Z, W moveantur in parvis circellis circa eclipticae TX polos P, Q. In quam igitur plagam Z vergit a P quovis tempore, in eandem et limes V verget ab eclipticae parte T et limes Y ab eclipticae parte X, et ad circuitum ipsius Z in parvo circello. qui sit ipsi TX parallelus, in eandem plagam sequetur etiam limes V in parallelo septentrionali, tanto majori, quanto propior est ipsi TX, et sic Y in parallelo australi. Semper enim erunt in eodem circulo magno inclinationis puncta ista sex: poli orbitae Z, W, poli eclipticae P, Q, et limites orbitae V, Y.

Haec tenus igitur de definitionibus terminorum orbitae planetariae eique circumscripti circuli eccentrici, quae quia communia sunt omnibus planetis, libro hoc V. praemittenda fuerunt. Ceterum usum horum in planetis singulis trademus libro sequenti VI.

FINIS LIBRI QUINTI, THEORICAE DOCTRINAE SECUNDI.

EPITOMES ASTRONOMIAE COPERNICANAE

LIBER SEXTUS.

THEORICAE DOCTRINAE TERTIUS, DE APPARENTIBUS MOTIBUS PLANETARUM, SEU IPSA DOCTRINA THEORICA.

Quot partibus absolvitur liber sextus? Quinque: primae quatuor de singulorum planetarum motibus agunt, quinta speculationem totam ad varios usus aptat. Prima enim Solis, secunda trium superiorum, tertia duorum inferiorum, quarta secundarii planetae, scilicet Lunae, motuum leges explicant; quinta situs planetarum apparentes inter se comparat et situm accidentia persequitur.

LIBRI SEXTI

PARS PRIMA.

DE SOLIS THEORIA.

Quare fit initium a theoria Solis? Primum, quia motus Solis apparens secundum placita Copernici non inest ipsi Soli, sed inest Terrae, nostro domicilio: aequum igitur est, ut a nobis ipsis noscendis exordio sumto, postea demum ad ceteros plauetas noscendos progrediamur; secundo, quia hic Solis motus apparens est multo simplicior et aequabilior, quam motus reliquorum plauetarum. Nam et latitudinis motu caret, quoad motus Solis apparentias

solitarias, ut libro II. fol. 193. dictum; et motus longitudinis una sola constat inaequalitate, cum in ceteris duae, in Luna plures apparentes inter se permisceantur, itaque ad Solis motus demonstrandos unico circulo contenti sumus. Tertio, ceterorum planetarum motus nequeunt explicari siue apparente motu Solis exactissime cognito. Nam secunda illa inaequalitas, quae se immiscet primae in planetis ceteris, non tantum initium habet ab illo temporis puncto, cum Tellus et planeta veris suis motibus juncti apparent, sed etiam in quique primaris tota originem et causas suas habet ex eo Telluris circulo, quo Solis motus demonstrantur. Quia etiam ipsae digressiones planetarum in latum, quae fiunt ratione ipsorum primae inaequalitatis, ad circum illum referuntur, quem Sol conscire videtur sub fixis.

Cujusmodi apparentias motus Solis deprehendunt diligentes astronomi et quomodo? 1. Quando explorant altitudines Solis meridianas quadrantibus per omnes anni dies (de quibus etiam lib. I. fol. 125 et lib. III. fol. 262), deprehendunt, Solem a die brumae paulatim fieri altiores in meridebus sequentibus usque ad diem solstitii; idque initio circa brumalem, et in fine circa solstitialem diem plane insensibiliter, in medio, praesertim circa aequinoctia, satis evidenter. Eadem ratione etiam a die solstitii ad diem brumae fit humilior in meridebus.

2. Interim vero dum Sol ab imo ad summum solstitium venit, dimidia etiam pars astrorum ex Solis radiis emergit, et vicissim, dum Sol in meridebus ex altissimo rursum fit humillimus, reliquus etiam astrorum semicirculus evanescit. Itaque hinc collegerunt astronomi, diversitatem illam altitudinum Solis meridianarum spargi per totum fixarum ambitum, ac incedere Solem sub fixis in circulo perfecto ad aequatorem obliquo, qui elliptica dicitur: non scilicet moveri illum velut in uno aliquo declinationis circulo, ad sphaeram fixarum immobiliter affixo, recta sursum deorsum motu proprio, velut in libra, sed simul et sursum et ad sinistram, nobis in septentrionali hemisphaerio versantibus.

Atqui putabam ego, fixas ex Solis radiis emergere et sub eos conditi motu suo, non motu alieno Solis vel Terrae. Est et haec una ex apparentiis fallacibus, de quibus astronomi cum vulgo quidem loquantur, visum vero deceptionis arguunt, detectis causis. Non enim astra ex Solis radiis (seu e loco, quem claritas circa Solem diffusa occupat) motu emergunt, sed Sol discedens, ut Ptolemaeus vult, vel discedere visus, ut Copernicus, illa immota detegit: nec se ipsa condant astra sub Solis radios, sed Sol adventans seu adventare visus illa operit. Quod cum ita habeat circa ortus et occasus siderum heliacos, omnibus astronomis fatentibus, mirum, cur turbent illi, si ad eundem modum etiam de primo motu (qui multo celerior est multoque incredibilis astris ipsis tribuitur) disputamus, quod non emergant astra ex montibus seu horizonte, sed quod montes deflexione seu discessu suo detegant astra.

Proba ex opticis, motu Terrae id praestari posse, ut sidera fixa videantur ex Solis radiis exire. Demonstrat Euclides, Opticorum propositione 57 et 58: oculo translato quiescentium illa, quae longius spectantur προσησθαι, praecedere videri, quae propius, ὑπολειπσθαι, destitui, relinqui. Sic enim est integranda haec propositio in editione Campani.⁶⁶⁾ Jam vero subsumit Copernicus: atqui Tellure circa Solem lata motu annuo, transferuntur oculus noster motu eodem; et fixae, quae spectantur, longius a Terra absunt, Sol propius, quorum et illas et hunc Copernicus facit quiescere. Quare his positis,

Solis meridianas respondere digressionibus ejus ab aliqua stella fixa, ex lege perfecti circuli ad aequatorem obliqui.

Deprehenditur igitur Sol circum hunc sub fixis perfectum motu inaequaliter celeri absolvere. Omnino inaequali; quippe non respondent aequales hujus circuli arcus temporibus aequalibus.

Quibus argumentis hoc patescit? 1. Cum enim bisecetur hic circulus ab aequatore, ut libro II. dictum est, Sol tamen in illo semicirculo, qui nobis superior, moratur diebus $186\frac{3}{4}$, in inferiori diebus $178\frac{1}{2}$; quod certum habemus ex diebus et horis, in quibus observamus aequinoctium utrumque, attento temporis intervallo, quod labitur a vernali ad autumnale et vicissim.

2) Sic cum puncta solstitialia dividant semicirculos in duo aequalia segmenta, diutius tamen in uno moratur Sol, quam in altero. Idem etiam patescit quibuscumque aliis Solis digressionibus a fixa quacunque, ut plus proficiat in itinere suo in una anni parte, quam in aequali altera.

Quae causa efficit, ut Sol perfectum circum, eclipticam, inaequali celeritate videatur decurrere? Quia Tellus, cum non sub fixis ipsis, sed longissime inferius et proxime circa Solem incedat, verum circum suum FPG decurrit a Sole O eccentricum, sic ut linea per centrum Solis, perpendicularis ad lineam FG, apsidum Telluris (esto jam ED), dividat orbitam Telluris in partes inaequales, cum dividat eclipticam in partes aequales. Ergo secundum doctrinam libri quinti Tellus duobus nominibus diutius versatur sub uno eclipticae semicirculo $\frac{\pi}{2}$ \propto γ ; uno, quia EGD pars orbitae suae est major semicirculo, altero, quia remotior ab O Sole, fonte motus, itaque et tardior est Tellus vere, per illam incedens. Quare etiam Sol sub opposito eclipticae semicirculo γ \odot $\frac{\pi}{2}$ videtur diutius morari, scilicet tam diu, quam diu Terra moratur in parte suae orbitae EGD majori.

Quid est in astronomia Copernici orbis magnus? Sic appellat Copernicus hanc ipsam orbitam veram Telluris circa Solem, altam medio loco inter orbitas Martis exteriorem et Veneris interiorem, et magnum appellat, non ob quantitatem, cum superiorum orbitae circulares sint multo ampliores, sed propter usum eximium, quem habet in salvandis motibus apparentibus non Solis tantum, sed omnium planetarum primariorum.

Quae est hujus orbis proportio ad sphaeram fixarum? Copernicus ponit eam plane insensibilem ob planetas reliquos. Itaque supra lib. IV. fol. 331. proportio probabiliter introducta, quia et ipsa insensibilis et inobservabilis est, cum Copernici positione bene stat.

Habes aliquod evidens argumentum, verissimam esse hypothesein eccentrici, seu variabilis distantiae Terrae a Sole? Omnino hoc ad oculum potest ostendi, Solis diametrum aestate apparere minorem quam hieme, si utroque tempore idem instrumentum usurpemus. Ex hoc enim certum est, distantiam Terrae a Sole OG circa solstitium esse majorem, quam OF circa brumam. Sic enim sonat in Euclidis Opticis propositio 56: oculo prope spectatum accedente, id augeri putabitur.

Cur non statuis motum Telluris in sua orbita vere aequabilem causamque inaequalitatis apparentis in solam eccentricitatem, simpliciter et primo modo consideratam, conficis, ut veteres fecerunt in theoria Solis? 1. Quia eccentricitatis OC quantitas, quae elicitur ex apparenti augmentatione et diminutione diametri Solis, non sufficit ad exprimendam quantitatem apparentis inaequalitatis in motu, nisi saltem ex dimidio. 2. Quia etiam planetae ceteri seu eorum secundae inaequalitates non ferunt tantam Telluris eccentricitatem,

quanta (scilicet OQ) requireretur ad Solis inaequalitatem, more veterum salvandam, sed ferunt tantum ejus dimidium OC, nisi velimus frustra orbis multiplicare et in singulis planetis novos circellos statuere, qui excessum hunc ex unica Telluris eccentricitate nimia usurpata alio pullulantem compensat. 3. Quia est contra causas physicas, libro IV. explicatas, cursum Telluris eccentricum a Sole in ipsa sua orbita aequalem statuere, cum tamen inaequaliter partes orbitae distent a Sole, fonte motus. At nunc, bisecta Brahe eccentricitate Solis vel Telluris OQ secundum Copernicum, Tellus ad unguem isdem movetur legibus a Sole, quibus ab eodem moventur et ceteri primarii, et sic omnia omnibus consentiunt. Vide Comment. Martis, parte III. 4. Quia postulanti etiam eclipses Lunae, ut umbra Telluris varietur minus, quam apud veteres, de quo infra parte 4.

At cur motum annum potius Telluri tribuis, cum veteres ipsi, Soli hunc motum transcribentes, idem effecerint circa apparentias Solis? 1. Quia Copernicus in motibus Solis apparentibus salvandis non tantum ad Solem respicit, sed etiam ad planetas reliquos, quibus idem motus Telluris utilis fit ad demonstrandas eorum secundas inaequalitates. Nisi ergo Tellurem dicemus moveri loco Solis, oporteret singulos planetas praeter suos proprios motus etiam hunc ipsum Solis motum vel similem re vera moveri, ut fit in astronomia veteri, quam orbium superfluitatem Copernicus nititur rescare. 2. Quia repugnat censis motuum physicis, lib. IV. explicatis, ut Sol moveatur (praesertim motu re vera inaequali) pro ratione distantiae suae a Terra. Nam cur alligaretur celeritas motus solaris ad distantiam Solis a Terra, cum tamen Tellus Soli non possit esse causa motus? At si Telluri tribuamus hunc motum annum, ut eo motu feratur circa Solem, tunc idem contingit Telluri, quod planetis ceteris primariis, ut Sol omnium illorum et sic etiam Telluris motor existat, singulos et sic etiam Tellurem incitet celerius vel tardius, pro ratione distantiae illorum a centro sui corporis, quae est quovis loco.

In quam plagam movetur centrum Telluris circa Solem? In eandem plagam, in quam et ceteri planetae, inter quos Tellus medio loco suam designat orbitam; in medio cursus constituta, inquit Aristarchus apud Archimede^m); in eandem plagam sub una parte aodiaci, in quam plagam Sol videtur moveri sub parte zodiaci opposita: denique in eandem plagam movetur Telluris centrum, in quam etiam volvitur motu diurno superficies Telluris parte a Sole aversa, sc. in plagam, quae respectu motus diurni orientis plaga dicitur.

Quanta est centri Telluris periodus sub fixis, quanta promotio ejus in una die, seu motus diurnus medius? Una periodus habet dies 365 horas 6. 9' 26" 43 1/2" sub fixis, secundum Tychonem; hinc diurnus centri fit 0° 59' 8" 11" 27" 14". Sed sub ecliptica, cujus principium seu sectio cum aequatore obviat Telluri (ob causas libro VII. dicendas), periodus media est dierum 365. h. 5. 49' 15" 46"; hinc diurnus 0° 59' 8" 19" 37" 24". Vide lib. III. fol. 246 et 274.

Cave hic ambiguitatem; alius est motus seu promotio diurna centri Telluris in circulo circa Solem, alius motus seu integra revolutio diurna corporis circa axem suum, veluti si is axis esset immobilis, de qua in doctrina sphaerica actum. Centri motum diurnum exquirimus hic mensurandi causa, corporis diurnus circa suum axem erat integra revolutio, ipse sui mensura.

Vide libro VII. de anno tam tropico quam sidero plura, deque ejus incepti a positivo principio inaequalitate.

Quomodo appellantur apsides in hoc planeta et ubi sunt? Si de vero Telluris motu agimus, dicuntur aphelium et perihelium, ut in planetis ceteris primariis, et tunc aphelium Telluris hodie est in $6^\circ \text{ } \overline{\text{O}}$; sin autem ut de Solis apparenti motu loquimur, manent haec eadem nomina, quae in astronomia veteri, dicunturque apogaeum et perigaeum, et tunc apogaeum Solis est in $6^\circ \text{ } \odot$.

In schemate G est sphelium Telluris, ejus locus sub fixis B, et A est locus apogaei Solis.

Quomodo hic ducuntur lineae motuum? Si de vero Telluris motu agimus, ducuntur lineae ut in ceteris primariis ex centro Solis per centrum Terrae in fixas; sin de apparente motu Solis, quod usus loquendi etiam apud Copernicum obtinuit, ducuntur e contrario ex Terra per centrum Solis in puncta fixarum, locis Terrae sub fixis opposita.

Fig. 54.



Haec in schemate OPI est linea veri motus Telluris in P constituta, POM linea respondens apparentis motus Solis. Et quoniam C est centrum eccentrici Terrae, O, Q duo foci ellipticos FG, ideo ipsius QF per planetam ducatur parallela OH proxime linea medii motus Telluris; sed OK, ipsi OH ad eandem rectam, est linea medii motus Solis, fere inquam et ad formam astronomiae veteris. At in hac astronomiae reformatione secundum causas physicas non indigemus motus medii linea HOK, sed pro angulo POH, minus accurately, exquirimus et aream OCP et angulum OPC, quae duo aequipoient juncta angulo POH.

Quanta est Telluris eccentricitas? Tycho Braheus, veteres solos imitatus, constituit eam (scilicet OQ) 3586, qualium CF semidiameter orbitae est 100000; igitur secundum doctrinam libri V. vera eccentricitas OC erit illius dimidia, scilicet 1793, pro quo in appendice Progymnasmatum Braheii ponitur rotundus numerus 1800.⁷⁰⁾

Sed rationes harmonicae, quae motibus Telluris vindicant semitonium, motibus Veneris diesin, neutram tamen puram, jubent a proportionem 5 : 8 auferre proportionem 243 : 250, residuum in proportionem 3 : 5, ut restet proportio 2916 : 3125 motuum extremorum, quorum radices 54 et 56 fere sunt intervalia extrema, medium 55, eccentricitas 1, quae valet paulo plus quam 1800.⁷¹⁾

Quomodo invenitur haec eccentricitas? 1. Braheus, qui incessum planetarum per orbitas suas physice inaequalem esse nondum agnovit, methodum Ptolemaei et Regiomontani secutus, solus adhibuit observationes Solis et longitudes quadrantum anni. Nam si hodie aestas habet dies 186 cum duodecim, sic ut Tellus tot diebus in EGD moretur, in DFE vero (cum biemis est) 178 cum semisse, eccentricitas OQ prodit proxime 3600; sin aestas sit dierum $186\frac{1}{4}$, hiems dierum 179, eccentricitas prodibit 3200. Ergo vera eccentricitas OC erit dimidium bujus, scilicet 1800 vel 1600.

2. Subtilior coque in minimis non satis fida est ratio per Solis diametrum, quae bieme fit $31'$, aestate $30'$, et sic tempore intermedio $30\frac{1}{2}'$, erit

igitur ut $30\frac{1}{2}'$ ad $31'$ vel ut 61 ad 62, sic semidiameter 100000 ad distantiam apogaeam 101640: ut sit eccentricitas 1640, his quidem datis.

3. Ex ternis observationibus planetae Martis (vel etiam Veneris vel Mercurii), planeta omnibus tribus vicibus in eodem eccentrici loco constituto, computantur primo tres distantiae Terrae a Sole in tribus distinctis circuli sui locis: ex iis vere, verbi causa FO, EO, PO et ex FOE, EOP angulis ad Solem interceptis (quos scimus ex tempore interjecte et computatis locis Solis) elicitur eccentricitas. Vide Comm. Martis parte III. cap. 25. et seqq. Nam tribus punctis F, E, P seu in eadem recta factis, geometrae decent circulum formare, qui per omnia tria puncta transeat. Et Terrae orbita ob parvam eccentricitatem OC est proxime circulus.

Semperne constans est tanta eccentricitas? Constantem esse valde probabile est: 1. quia causae eccentricitatis sunt internae, in corpore planetarii globi sitae, ut libre IV. disputatum. 2. Quia Luna retinet eandem eccentricitatem bodie, quae fuit olim. Idem de aliis etiam planetis dici potest. Cur ergo sola Terra suam mutaret? 3. Quia etsi Hipparchus eumque imitatus Ptolemaeus produnt sua aetate maiorem, scilicet 4200, quod esset secundum physicas hypothesi 2100, non 1800, menent tamen ipsi, suas aequinoctiorum observationes intra 6 horas non esse certas. At si observationes intra 6 horas sunt incertae, etiam eccentricitas inter 1800 et 2100 prodibit incerta. Nihil igitur observationes veterum habent, quod opponatur quantitati eccentricitatis constantiae.

Quomodo movetur aphelium Telluris G, vel apogaeum Solis A, et cum eo centrum eccentrici Solis? Causae translationis dictae sunt libre IV. Plaga translationis est sub fixis in consequentia signorum; qualitate aequabilissima statuitur eorum motus, quantitate tardissimus est, ut lude ab Hipparcho non ultra unum signum promoverit, itaque motus annuus apogaei Solis ab aequinoctio est circiter $1' 3''$ et absolvitur sub ecliptica annis circiter viginti millibus et 572 amplius: quippe ei principium eclipticae obviat. At sub fixis vix redit apogaeum Solis post 108 millia annorum, quantum ex brevi observationum aevi de tota periodo ratiocinari datur. Hec igitur temporis spatio lentissimo centrum orbitae Telluris describit circellum parvum circa corpus Solis, semidiametro ad solaris corporis semidiametrum quadrupla paulo plus; qualem circellum etiam a Luna circa Terram describi in annis $8\frac{1}{2}$ suo loco dicemus. At nisi correxissemus hypothesi Copernici, qui centrum orbis magni ponit in centro mundi, eperteret Solem ipsum in tali circello circa centrum mundi torqueri tam prolixo reditu. Et hoc illud est, unde in libre IV. fol. 355 argumentum pro motu Telluris unum desumimus.

Non inaequalis est motus apogaei Solis, ut Copernicus statuit? Si observationes Arabum, qui vixerunt inter nostra et Hipparchi tempora, emnine iustae essent, eporteret hunc motum inaequalem statui. At vel minus illarum errorculus, qui facile admitti petuit, omnem hanc inaequalitatem praestat. Et pugnat apogaei Lunae similitudo pro motus constantia.

Quanta est aequatio Solis maxima, quanta diurni? Eccentricitas CO 1600 dat aequationem maximam (compositam ex OPC angulo et valore aresc OCP, hoc est angulo POH vel OPQ fere $2^{\circ} 3' 45''$, diurnam in apogaeo $57' 3''$, in perigaeo $1^{\circ} 1' 20''$, cum $57' 14''$ ad $1^{\circ} 1' 3'$ contineat intervallum semitotum, scilicet proportionem 15 ad 16.

Quanta hinc fit aestas, quanta hiems? Cum semicirculus superior consticiatur diebus 187 minus h. 4. 38, lentissima omulium aestas potest fieri

d. 187 minus h. 4. 38', hiems brevissima dierum 178 h. 10. 27'. Id factum, quo tempore Solis apogaeum in 0° ♄ fuit, circa annum 1260 a Christo. At in principio mundi apogaeum erat eum puncto aequinoctiali: tunc igitur aequales aestas et hiems. Libro VII. explicabitur, quae hinc nascatur inaequalitas annorum.

Quomodo discimus aequationem Solis? Ex anomalia Solis annua, methodo supra libro V. tradita.

Quid est anomalia annua? Idem in Sole quod in omnibus est anomalia media, eccentrici, vel coaequata fere. Ergo secundum doctrinam libri quinti definienda est anomalia Terrae media per arcum GOP, anomalia eccentrici per arcum orbitae GP, anomalia coaequata per angulum GOP ad \odot Solem, comprehensum inter lineas OG, OP, ex Solis centro O per aphelium Terrae G et per centrum corporis Terrae P eductas; sed ad praescriptum veterum definitur anomalia Solis annua, media et coaequata; quod sit arcus eclipticae inter locum apogaei Solis et lineas medii et veri motus Solis. Ut Terra in P versante, anomalia Solis media est AOK, quia OK parallela ipsi PQ est linea motus medii Solis. At AOM est anomalia coaequata; utraque in Sole denominatur annua.

Quae ratio est nominis annua? Copernicus annum denominavit ad distinctionem anomaliae secularis, qua penes ipsum variabatur eccentricitas et motus apogaei. Nobis illa varietate non est opus, annum tamen dicimus pro solari, quia Solis reditus annum conficit; et vero anomaliae Solis periodus non plus 5 minutis horariis longior est anno sidereo.

Quid cohaeret huic loco? Primum huc referendus est motus corporis Telluris diurnus circa suam axem velut immobilem, de quo in doctrina sphaerica fuit actum libris I. II. III. praecipue fol. 248. Deinde inclinatio axis hujus convolutionis diurnae ad eclipticam, de qua fol. 229. 269. 272. et infra libro VII. Tertio: quomodo hinc dependeat declinationum eclipticae partium successio per annum, explicatum est libris II. III. praesertim fol. 229. 231. Quarto: quomodo ex inclinatione et circumactu hujus axis sequatur praecessio aequinoctiorum, dictum est libro III: folio 273. et infra libro VII. pluribus explicabitur. Denique huc etiam pertinent aequationis temporis seu dierum partes duae ex tribus, quarum altera pendet ab aequatione Solis, altera a distantia Telluris a Sole. Vide libro III. a fol. 250. in 251.

Explica priorem ex his, quae propria est doctrinae theoricarum. Dies aequalis tunc incipit, cum locus Solis medius in meridiano consistit, dies apparet, cum verus Solis locus. Quodsi Solis aequatio fuerit subtractoria, verus Solis locus, quippe praecedens, ante medium appellet ad meridianum, et observabitur merides ante quam erit modo aequabilis. Quare adjiendum erit aliquid tempori aequali, ut fiat apparet. In adjectoria aequatione subtrahendum est aliquid tempori aequali, ut fiat apparet. Sin autem vicissim tempora apparentia fuerint aequanda, contrarium utrobique faciendum erit. Quantitatem additionis vel subtractionis ostendet ipsa quantitas aequationis, ut ejus unus gradus valet 4 minuta horaria paulo minus, ob additamentum. Maxima igitur erit minorum horariorum. 8' 15" ex maxima aequatione 2° 3' 45". 72)

Explica et posterioris causae aequandi temporis rationes et quantitatem. Dictum est libro IV, virtutem motricem, quae est insita Telluris visceribus quaeque Terram circa axem volvitur, sic esse intensam et contemperatam, ut si sola moveret Tellurem, interim dum centrum ejus semel circa So-

lem fertur, tercenties sexagies praecise circa suum axem volutura sit, parte eadem Telluris reversa ad eandem lineam, quae centra Solis et Terrae connectit, et hanc Telluri inestam virtutem respectu sui ipsius ut solitariae semper agere aequabiliter. At jam fortificatur haec virtus a praesentia Solis alias aliter, estque totus et consummatus effectus hujus fortificationis in una periodo Telluris circa Solem seu in uno anno dies 5 cum quadrante supernumerarii. Illi vero dies seu revolutiones Telluris circa suum axem $5\frac{1}{4}$ efficiuntur ab omnibus omnium-orbitae telluriae partium distantis a Sole junctis, sic ut minus fortifceat illae distantiae, quae longiores, plus quae breviores, seu quod est plane idem, ut longiores temporis aequabilis existimati moras faciant illas Telluris diurnae revolutiones, quae contingunt circa aphellum, breviores, quae circa perihellum.

Cum autem planum segmenti eccentrici Telluris, verbi causa PGO, valeat omnes aequalium ejus arcuum distantias, ut demonstratum libro V, planum vero trianguli aequatorii PCO (quod est in Telluris eccentrico 180000000, ubi maximum) arguat excessum plani segmenti eccentrici (PGO, per PO lineam ex Sole facti) super PGC, planum sectoris: idem igitur planum arguet etiam temporis aequationem hanc, de qua nunc agimus. Nam si totius eccentrici area 31415926586 valet $5\frac{1}{4}$ revolutiones Telluris, pars ejus, scilicet hoc aequatorium triangulum, valebit $21' 40''$ horaria, cum plurimum. Itaque revolutiones aestivas ab apogaeo Solis ad longitudinem mediam seu dies apparentes valent ultra medios aequali numero totidem minuta plus. Et quam diu aequatio Solis est subtractoria, semper additur haec aequatio ad apparens tempus, ut fiat medium, ubi vero aequatio est adjectoria, subtrahitur; ex medio vero tempore fit apparens contraria utrobique ratione. Ita rationes hujus aequationis sunt rationibus prioris contrariae.

Quo experimento scitur, adhibendam esse hanc partem aequationis?

1. Tycho Braheus observata sua in Luna conciliare aliter non potuit, nisi abjiceret aequationis temporis illam partem, quae est propter aequationes Solis. Cum igitur haec praesens aequatio sit illi e diametro contraria illamque perimat, stant igitur observationes Brahei ab hujus partibus. 2. At ne sic quidem Braheus omnia observata tueretur, quoniam potius optasset, ut multo majus esset id, quod abjicit: et ecce haec nostra praesens aequatio superat illam amplius quam duplo. Nolim tamen cum quoquam contendere pertinacius super hae tertia causa aequationis. Nam si quis observationes Brahei in Luna conciliaverit propriis per usitatum temporis aequationem, ei lubens ego palmam cedam evasae hujus partis aequationis temporis.

Discerne jam dies apparentes a mediis seu aequalibus, secundum omnes tres causas aequandi temporis in unum confusas. A $2^{\circ} 24' \odot$ addendum est apparentibus temporibus, additio maxima est in $26\frac{1}{2}^{\circ} \odot$: $19' 27''$. In 18°M incipit exigua subtractio, quae maxima est in 3°J : $1' 1''$; in 19° rursum incipit additio parvula et fit maxima in 25°J : $3' 31''$; subtractio incipit in 22°M , quae maxima est in 6°J : $21' 1''$, consumiturque paulatim in $2^{\circ} \odot$. Igitur a 6°J in $26\frac{1}{2}^{\circ} \odot$ crescent apparentes dies, inde decrescunt usque in 3°J , crescent iterum usque in 25°J , et decrescunt usque in 6°J . Ita fit, ut in $2^{\circ} 24' \odot$ dies naturalis sit longissimus, in 18°M brevissimus; et rursum proxime talis in 12°M , at in $27^{\circ} \odot$, 3°J , 25°J , 6°J medioeris: ut sic per integrum quadrantem, in ejus medio solstitium hiemale, scilicet ab 18°M usque in 22°M perpetuo tenore maneant fere medioeris. Denique particula anni a 6°J per solstitium aesti-

vum usque in 27° \mathcal{Q} (quod est paulo plus uno quadrante anni) melior est in sua proportione hora una cum triente, quam residuum anni a 27° \mathcal{Q} per \mathcal{S} in 6° \mathcal{S} . Haec anno 1616. completo. Haec quidem sic habebunt, posito casu, quod retinenda sit tertia etiam causa aequandi temporis.

Num Tellus etiam in latitudine movetur? Si latitudo coeli, ut libro tertio, censetur ab ecliptica in septentrionem vel austrum, Tellus in latam evagari non potest, cum, quocunque evagatur, secum ferat eclipticam, utpote quae describitur sub fixis per lineam ex centro Solis per centrum Telluris eductam, et ad eam referuntur motus planetarum et loca fixarum. At si comparetur ecliptica ista (id est orbita Telluris sub fixis) secum ipsa, secundum diversa secula deprehendit sane Braheus ex mutatis fixarum latitudinibus, eclipticam hodiernam concessisse ad latera eclipticae pristinae: ut sic etiam in hoc negotio inclinationis et transiationis nodorum sit integra analogia motuum Telluris ad motus ceterorum planetarum. Haec tamen consideratio nec ad collectiones motuum Solis, nec ad enucleandas apparentias planetarum ceterorum hoc loco necessaria est, quare differatur in librum VII.

Nullane inaequalitas apparet inesse motibus. Solis occasione distantiae centri Telluris ab ejus superficie? Existit hinc aliqua sane perexigua varietas, parallaxis diurna dicta; sed enim ea nullius plane sit momenti respectu motuum Solis ipsius, nec ob illam fere rem exquiratur, nisi propter eclipses luminarium, differenda igitur est deorsum in theoriam Lunae et doctrinam eclipsium.

Quid rerum extra metas astronomiae se proferentium pertinet ad doctrinam de motu Solis? Doctrina de annis et mensibus solaribus politicis.

Quid est tempus politicum? Quod integrorum diernum numero constituitur, neglectis aut arte compensatis minutis horariis.

Quot sunt praecipui anni solares politici seu civiles? Tres. 1) Aegyptius, diernum 365 perpetuo, quantus colligitur etiam annus diluvii fuisse. 2) Julianus, quatuor annis in unam periodum computatis, quorum tres primi singuli constant diebus 365, quartus diebus 366; repetitur enim mense Februario nomen idem et litera eadem. diei 24 et bis pronuntiatur sexto: Calendas Martias, unde haec quarto anno nomen est bissexto aut bissextili, teutonice *Schalt-Jar*, quasi luxatilem dicas: hinc et dies ille bissextilis, intercalaris, graece embolimus, insititius, *Schalt-Tag*, dicitur. Horum Julianorum 1460 aequant 1461 Aegyptios. Nam et illi et Persae veteres observabant diem intercalarem, quarto quoque anno per unum diem descendente ortu Canicinae; unde apud Persas nata fuit periodus annorum 120, intra quos hoc initium anni siderei descendit per omnia triginta natus mensis uoluna, quae illi diebus a suis heroibus imponerant. Itaque tunc intercalabatur natus mensis. 3) Gregorianus, quadringentis annis in unam periodum computatis, in qua ceteri quaternarii sunt diernum 366; soli centenarii tres priores sunt simplices, diernum 365. Vide lib. III. fol. 247. et infra de civilibus lunaribus, nec non etiam lib. VII.

Num etiam inaequalitas motus Solis observata fuit in mensibus politicis? In aegypto inque diluviano non observatur; computabantur enim 30 dies in mensem toto anno, ultimi vero et supernumerarii 5 diebantur epagomenae, appendix, et pro nullo habebantur; transigebantur enim per comensationes. In Juliano obscura inaequalitatis solaris observatio in hoc cernitur, quod sex mensibus, initio facto a Martio (ut in quorum medio Sol tardissimus incederet), tributi sunt dies 184, reliquis tantum 181. In anno Dionysii mathematici menses a signis coeli denominati sunt; de numero tamen dierum cujusque non constat plane.

LIBRI SEXTI

DOCTRINAE THEORICAE TERTII

PARS SECUNDA.

DE TRIBUS SUPERIORIBUS: SATURNO, JOVE, MARTE, ET ALIQUA COMMUNIA ETIAM DUOBUS INFERIORIBUS.

Quare post explicationem Solis apparentium (hoc est Telluris propriorum) motuum jam statim subjicitur trium superiorum, deinde duorum inferiorum primariorum theoria? Quia, cum duae in primariis deprehendantur inaequalitates motuum, earum altera quidem, quae ipsis re vera inest, libro V. plene explicata, Telluri sunt similissimi; reliqua, quae non re vera ipsis inest, sed ex visus fallaciis oritur, ex ipso Telluris motu dependet, quia hac veluti navi visus noster in mundo circumfertur. Cum ergo in his planetis usus orbis magni praecipue patescat, omnino theoria superiorum, deinde inferiorum, quantum de eis restat supra libro V. nondum explicatum, velut appendix quaedam seu auctarium doctrinae de orbe magno proxime Solis theoriae succedere debuit; prior tamen theoria superiorum, quia in his amplior, evidentior sensulque magis obvia est visus deceptio, ex orbe magno orta.

Quot orbibus est opus ad theoriam cujusque planetae et primariis? Duobus solummodo praeter eclipticam, altero eccentrico, ipsius planetae proprio, altero Telluris seu orbe magno, omnibus communi. Horum natura, leges motuum et termini astronomici communes explicati sunt libro V. Orbis vero magni etiam quantitates propriae parte prima hujus VI. libri jam praemissae sunt; vetus astronomia multis hic epicyclis indiget alioque apparatu.


Cur autem, cum tres sint superiores, una tantum theoria proponitur, et inferius etiam una sola duorum inferiorum? 1. Quia eandem orbitam Telluris tres ex aequo suis orbitis cingunt, quippe superiores, duo vero ex aequo intra hanc orbitam Telluris inclusos cursus habent, quippe inferiores. 2. Quia planetae motibus realibus in orbitis eccentricis sunt invicem simillimi, ut dictum est, visus vero fallaciae, quae in eorum uno quolibet contingunt, ex uno quidem solo orbe magno omnibus communi oriuntur, at hoc duobus modis, uno omnibus tribus superioribus, altero duobus inferioribus communi.

3. Est et causa mechanica, theoriis (quae instrumenta sunt ocularium demonstrationum) propria. Nam delineata Saturni theoria et accommodato orbe magno, tantum interest spatii, ut in eo etiam Jovis et Martis eccentrici describi idemque omnibus tribus orbis, nomine et usu magnus, quantitate minimus, servire possit; sic, scripto eccentrico Mercurii circa Solem et accommodato ei orbe magno (qui respectu inferiorum etiam re ipsa magnus cluet, quippe major utriusque orbitis), restat etiam commodus locus eccentrici Veneris inter utrumque describendo. Hac de causa potest etiam pro omnibus sex primariis fieri una sola theoria, constans sex orbitis, minus quidem commode, quoad mechanicam, magis tamen proprie ad genulum exemplar ipsius mundi mobilis.

Recense, quas motuum apparentias faciant tres superiores. 1. Motus eccentricos trium superiorum in longum, quales descripti sunt libro quinto, inveniant astronomi concordare cum observationibus seu apparentiis tantummodo in punctis verarum oppositionum cujusque cum Sole, dispersis per zodiacum.

In schemate, posito planeta in Q, locus ejus eccentricus sub fixis erit D, etsi vero saepius planeta veniat in Q, nunquam tamen ex Terra apparet sub D, nisi tantum, si Terra simul sit in T, puncto lineae SQ; sic ut ex T Terra spectetur S Sol et Q planeta in locis oppositis C, D.

Fig. 85.



2. Motus vero visibiles seu apparentes trium superiorum extra oppositionum articulos diversissimi sunt ab illis, qui sunt libro V. traditi. Nam si capiamus instrumentis distantias planetarum a fixis prope zodiacum continuis noctibus, explorantes, quantum quilibet promoveat quovis tempore ab una nocte ad aliam, tunc invenimus eos tanto fere velociore ad oculum, quanto sunt propiores Soli versus vespertinas occultationes, aut quanto minus exierunt a radiis Solis post matutinas emersiones, tanto vicissim tardiores, quanto remotiores a Sole, adeo ut tandem fiant plane stationarii ad visum, Saturnus quidem inter quadrantem et trientem circuli ante et post Solem, Jupiter triente a Sole praecisc, Mars ultra trientem, scilicet tribus octavis et duabus quintis partibus circuli ante et post Solem. Inter illa puncta versus oppositionem cum Sole sunt plane retrogradi, et in hoc motu retrogrado velocissimi sunt in medio, circa ipsam oppositionem in acronycho situ. Et Saturnus quidem, planeta altissimus et tardissimus, in eccentrico plures stationes habet, Mars humillimus et velocissimus pauciores, Jupiter, pro sua mediocritate, mediocres. Vicissim, ut quisque altior et a Sole remotior vel se ipso vel alio inferiore, sic diutius deprehenditur manere retrogradus; Saturnus retrogradationem in quatuor menses protrahit, Jupiter quatuor menses occupat, Mars tres vel duos, cum tamen e contrario minimum arcum eclipticae pererrat trium altissimus retrocessu suo, maximum humillimus, at diversissima ratione unus et idem, altior quidem maximum, sed humilior factus minimum, Saturnus paulo plus 7°, Jupiter 10°, Mars altus pene 20°, humilis factus minus quam 12°. Ut ita secunda haec inaequalitas plurimum a prima libri quinti differat et re ipsa plurimum habeat inaequalitatis.

3. Quod attinet motus in altum, inveniuntur quidem planetae, collocati

in situ acronycho, semper majores; quo vero propiores fuerint Soli, hoc sensibilius imminuant corporum apparentem magnitudinem.

Ubi si Terra sit in T, planeta in Q magnus apparebit, circa A vero parvus.

4. Denique ratione motus in latum semper major est apparens latitudo planetae, cum opponitur Soli, quam si peracto reditu, in eodem eccentrici loco consistens, Soli jam propior fuerit, et tanto semper est minor, quanto in exactis reditibus Soli propior; cum tamen vera inclinatio cujusque loci in eccentrico per omnes planetae reditus sit eadem et constans, ut libro V. ostensum.

I. De motibus eccentricis.

Ut a primo capite incipiamus, dic quomodo se habeant reales motus eccentrici trium superiorum, ut et duorum inferiorum. Sunt ad unguem similes motui eccentrico Telluris, prima hujus VI. libri parte explicato, legesque observant libro V. traditas, ut dubium sit nullum, quin causae physicae, libro IV. confirmatae (ut ex quibus leges illae nascuntur), in singulis locum habeant, Sol scilicet, in omnium circuituum meditullio, planetas lege statera moveat. Ordinantur enim singulae orbitae sub singulis circulis magnis fixarum, inclinantur ad eclipticam, alius alibi; suntque figurae ellipticae, quarum longiores diametri per centrum Solis communiter transeunt, sive ut in eo sese omnes secant; distant orbitarum partes inaequaliter a Sole, et in partibus quidem a Sole remotioribus planetae fiunt duplo se ipsis tardiores, quam remotiores, in propinquis Soli duplo se ipsis velociores, quam propinquiores, et hoc quoad apparentiam velut ex Sole seu angulos in centro Solis stantes, quos angulos itinera planetarum diurna subtendunt.

Quanta sunt singulorum periodi temporariae, quique diurni mediocres?

Absolvunt cursus suos sub fixis

Annis Aegyptiis. Diebus.	Horis.	Diurni medi.
♂ 29. 174.	4. 58' 25" 30'''	2' 0" 36'''
♂ 11. 317.	14. 49. 31. 56.	4. 58. 26.
♂ 1. 321.	23. 31. 56. 49.	31. 26. 39.

Ad apsidem quilibet suam revertitur paulo tardius, ut mox patebit; ad idem vero punctum eclipticae paulo velocius, quia haec puncta ipsis obviant, ut libro VII. docebitur.

Quae est orbium trium superiorum et quarti, orbis magni seu Telluris, inter se mutuo proportio, quae item eccentricitatum intervallorumque? Hic caeca laborat ignorantia vetus astronomia, ut quae solas eccentricitatum proportionem ad diametros suorum orbium detegit, at proportionem inter se eccentricorum nullam certam tradit, nisi quae ex superstructione materiali orbium oritur, quam vide lib. IV. f. 316. et f. 333. Nam quia epicyclos singulis suis tribuit, commune dimensionum vinculum solvit. Igitur in Copernici forma sic habent intervalla.

	Aphellium.	Medium.	Perihelium.	Eccentricitates, qualium semidiameter est 10000:
Saturni	1006207.	951000.	896793.	—5700
Jovis	544708.	519650.	494592.	—4822
Martis	166465.	152350.	138235.	—3263
Orbis magni	101800.	100000.	982000.	—1800

Haec intervalla sunt extracta ex observatione parallaxim orbis, de quibus infra; causas vero eorum archetypicas explicavi libro IV. fol. 317. ex Mysterio Cosmographico et fol. 323. ex Harmonicorum libro V.

Quibus eclipticae locis haerent eccentricorum aphelia, et quantus illorum

est motus? Ptolemaeus, cum motus eccentricorum ad Tellurem retinisset, apogaeum Saturni reposuit sine actate in 23° ♍, Jovis in 11° ♏, Martis in $25^{\circ} 30'$ ♎. Posito igitur, quod centrum eccentrici Telluris etiam olim particulis 1800 distiterit a centro Solis, ut in theoria Solis dictum, et quod lineae ex centro orbis magni per centra eccentricorum aequidistare debeant lineis apsidum Ptolemaicis (de qua aequipollentia vide Comm. Martis Cap. VI.) eoque incident in loca eclipticae jam indicata: eerte lineae verarum apsidum, scilicet aphelii et perihelii, ex Sole per centra eccentricorumeductae, ceciderunt in alia loca eclipticae, Saturni in $23^{\circ} 34'$ ♍, Jovis in $15^{\circ} 7'$ ♏, Martis in $0^{\circ} 42'$ ♎. Vide Comment. Martis cap. XVII. ejusque correctionem cap. LIX.

At hodie aphelium Saturni est in $25^{\circ} 48'$ ♎, Jovis in 7° ♏, Martis in $29^{\circ} 20'$ ♎. Quodsi verae sunt observationes Ptolemaei, Saturni aphelium esset velocissimum, Martis tardius, cum tamen illius periodus habeat annos 30, huius non duos, ubi causa nulla apparet tantopere turbatae analogiae. Jovis vero aphelium esset adeo tardum, ut non assequeretur praecessionem aequinoctiorum, sed sub fixis fieret retrogradum, quod causis physicis libro IV. explicatis repugnare videtur, nec si vel consisteret sub fixis immobile, ceterorum exemplis congruit. Igitur suspectae sunt etiam hoc nomine observationes Ptolemaei, praesertim circa Jovem.

Num etiam veteres observarunt, *eccentrici partes duplo celeriores fieri, quam Soli propiores, duplo tardiores, quam a Sole remotiores, et quo argumento?* Omnino observarunt; primum ea re, quod si omnem inaequalitatem motus eccentrici transcripserint soli eccentricitati seu diversitati distantiarum epicycli (quos illi singulos in singulis planetis loco unius orbis magni statuebant), tunc major efficeretur varietas apparentis magnitudinis epicyclorum, quam ferebant observationes. Deinde quod in ipsis epicyclis suppositis planetae, altissimi facti, celeriores esso inveniebantur, quam pro ratione distantiae totius epicycli a centro mundi. Itaque cogebantur aequantis centrum luduocere, cuius officium hoc erat, ut solidos illos (uti credebant) orbes, eccentricum et epicyclum redderet re vera motu inconstantes et inaequales. Nam si epicyclus incederet altissimo loco eccentrici, tunc totus eccentricus secundum omnes partes reddebatur ab aequante re vera tardus; et si planeta esset summo loco epicycli, epicyclus totus re vera reddebatur velox secundum omnes partes, sicut nobis ipsum centrum planetarum corporis alti tardius efficitur, humilis velocius, ex causis physicis et ratione statera, quale nihil ex veteri astronomia potuit erui, quod causam hujus apparentiae polliceretur.

II. De directione, statione, retrogradatione.

Cum igitur tales eccentrici tantum in oppositione et conjunctione planetarum cum Sole salvent observata, dic igitur, quae sunt reliquarum ex dictis apparentiarum irregularium causae? Praecipua hic virtus entescit astronomiae Copernicanae, quod, veteri astronomia tacente et tantum admiranda, ipsa loquitur et causas rerum explicat; cumque vetus astronomia epicyclos multiplicet, Copernicana simplicior omnia ista salvat solo et unico motu Telluris circa Solem ad eccentricos addito, qui jam antea ad salvandum motum apparentem Solis introductus est hujus libri VI. parte prima. Et ob hunc usum amplissimum orbita Telluris circa Solem summo jure dicta est orbis magnus parte prima hujus libri VI.

Ut aggrediamur demonstrationem, dic initio, quid sit linea motus visi seu apparentis planetae, et qui locus ejus visus? Technice loquendo et vo-


cibus ad theorias manuarum accommodatis, in quibus non potest exprimi proportio orbis planetarum ad orbem fixarum immenso similem, linea haec definitur, quod sit rectaeducta ex centro Solis usque sub fixas, aequidistantes rectae ex centro Telluris per corpus planetae deductae. At secundum rei ipsius conditionem (quia orbis magnus, collatus ad fixas, est insensibilis) est recta ipsa ex centro Telluris per corpora planetae centrum usque sub fixas deducta; quae ubi in fixas incidit, ibi signat visum sideris locum.

In schemate praemisso, sit Sol, centrum fixarum, in S, circa quem sit orbis magnus BT et Terra in eo; et sit circa hunc orbita alicujus ex superioribus AQR. Sit locus Terrae T, planetae R. Connexis igitur T, R signis per rectam TR continuatam usque sub fixas N, elique ducta parallela ex S Sole, quae sit SL, erit quidem haec SL in theoriis manuarum linea apparentis motus planetae in R siti, at in rei veritate ipsa TRN erit linea visiva planetae R. Et quia TS, intervallum Solis et Terrae, non est sensibile collatum ad SL vel TN, distantiam fixarum, ideo tam TRN quam SL continuatae cadunt in locum sphaerae fixarum ad sensum eundem; nam distantia punctorum N, L, in quae incidunt hae parallelae, non est in Terra sensibilis, sed habetur pro uno puncto.

Quo indicio scimus in hypothese Copernici, planetam aliquem esse directum, stationarium vel retrogradum? Planeta, superiorum et Tellure tardiorum unus, tunc videtur esse directus, quando proximorum dierum linea visivae seu lineae apparentis motus planetae sese mutuo secant intra Terram et planetam, vel in centro Terrae, vel retro Terram, in plagam a planeta diversam; tunc vero videtur stationarius, quando lineae duae dictae sunt parallelae; tunc denique retrogradus, quando sectio cadit ultra planetam. De inferioribus suo loco agetur; habent enim plerasque rationes contrarias.

In apposito schemate sit E Sol, ABC orbis magnus seu orbita Telluris, divisa in arcus diurnos, OPK orbita unius ex superioribus, Terrae orbitam includens, divisa

Fig. 86.



in arcus planetae diurnos, plures numero quam Terrae orbita, etiamque minores secundum doctrinam libri IV. fol. 346. Et sint simul Terra in A et planeta in O indeque numeratis diurnis numero utrinque aequali, sit denique simul et Terra in G et planeta in K. Et connectantur divisiones diurnorum hujus cum respondentibus divisionibus illius. Fiet igitur apud lineam primam visivam AO et vicinam suam, ut secant se mutuo in F, puncto intermedio inter A Terram et O planetam; sic etiam Terra in C, planeta in Q versante, sectio erit in H, loco rursum intermedio inter C et Q. At Terra in H transgressa, erit una visiviarum ex vicinia ipsius H exeuntium, quae Telluris orbitam tangat vel tangenti aequidistet, ipsa secans eam et per duas vicinas divisiones orbitae Terrae transiens, cito

HI, et tunc sequentis diei visoria priorem secabit in ipso centro Terrae. Sequentes visoriae productae sese secabunt in plaga, quae a planeta, versus T eunte, ultra situm Terrae inter D, H, vergit in partem oppositam, quasi versus O. Omnibus his conditionibus dico apparere planetam directam, id est in Q, in Q et circa I. At

jam planeta in T veniente, Terra vero in D, binæ lineæ DT incipiunt fieri parallelae: per has igitur visorias dico apparere planetam stationarium. Denique ultra D, T, versus G, K ex parallelis fiunt rursum concurrentes, sed ultra planetae curriculum TK, versus N, siquidem continentur, hoc ergo dico arguere, planetam K per visorias GK apparere retrogradum.

Proba nunc, necesse esse ut, Terra circa Solem eunte motu annuo, superiores, tardius redeuntes, in conjunctione Solis videantur esse directi, ultra quadratum a Sole locum stationarii, in opposito Solis retrogradi; idque respectu motuum secundorum ab occasu in ortum tendentium? Pro retrogradatione sit primo popularis demonstratio ista. Demonstrat Euclides Opticorum propositione 54: si aliqua ferantur inaequali celeritate interque illa etiam oculus, ea quae cum oculo ferantur aequali celeritate, videri stare, quae tardius oculo, in contrarium ferri, quae celerius, praecurrere oculo. Haec ille ad verbum. Quae etiam sunt accommodata rebus popularibus, verbi causa navibus in mari currentibus (ubi illae, quae uni uia eunti stare videntur; propterea sic videntur, quia comparari possunt ad celeriores et tardiores una euntes, quarum illae videntur praecurrere, istae retro moveri), non male tamen accommodari possunt etiam ad retrogradationes in astronomia. Nam hic etiam Terra cum planetis superioribus currit eandem viam; cumque dispares huius et illis sint dati reditus et orbitae ejusque in se ipsas redeant, sit ut Terram planeta nunc ex eadem plagâ currat, nunc ex opposita.


Cum igitur ex eadem plagâ currunt, ut Terra in G, planeta in K, Sol E est utrique in plagâ eadem, et sic Terra G media inter E Solem et K planetam, hoc est planeta K opponitur Soli E, vobis scilicet in G versantibus. Hic igitur oculus in G celerior est planeta in K, non tam ideo, quia diurni Telluris in G majores sunt diurnis planetae in K, quam quia hi diurni G et K penè invicem sunt paralleli hoc loco: unde fit, ut visoriae lineae, quae terminus inaequalium connectunt, ad se mutuo inclineantur, concursurae supra planetam. Hoc vero est indicium retrogradationis. Vide Astronomiae partem Opt. a fol. 324 in 334. (II. 383 ss.)

Quoad stationes et directionem axioma hoc opticum incommodius applicabitur ad cursus circulares. Posita enim Terra in A, planeta in O, jam non eunt viam eandem planeta et oculus, ut in axioma supponendum erat, sed ex oppositis partibus circularum sibi mutuo obviant, Terra per viam AB, planeta per viam OP, nec unquam aequaliter moventur planeta et Terra, sed semper ille tardius. Quare in hac parte, missa demonstratione populari, transamus ad astronomicam, Copernicani hypothesis propriam. Quantum igitur ad stationes, est una suppositionum Copernici libro IV. fol. 331 et seq. confirmata, diametrum orbis magni collatum ad fixarum sphaerae diametrum insensibilem esse. Multo minus igitur sensibilis erit distantia parallelarum, circa D, T, quae saltem particulam orbis magni, scilicet diurnos arcus eccentricos, Telluris ad D et planetae ad T includunt. Ergo parallelae illae edoctae usque in fixas in idem illarum veluti punctum videbuntur incidere, atque sic planeta per utramque visoriarum illarum, hoc est tam in principio quam in fine suscepti temporis 24 horarum videbitur eodem loco fixarum haerere, quod est stare vel stationem peragere. Cum igitur necesse sit, bis fieri parallelas visorias, propter conjunctionem et separationem omnifariam currentium corporum planetae et Telluris, necesse et hoc erit, ut planeta duobus locis appareat stationarius, quae loca ultra quadratum Solis removeri jam demonstrabitur.

De directione et retrogradatione sic. Primum necesse est, positis inaequalis temporis reversionibus corporum Telluris et planetae, utriusque in consequentia euntis, sectiones visoriarum contingere omnifarias.

Sint enim initio in oppositis circularum partibus Terra in A, planeta in O, et sint itinera in contrarium tensa AB et OP, contrariis igitur arcuum terminis connexis, verbi causa lineis AO et BP, necesse est fieri sectionem earum mutua[m] apud F, loco inter arcus intermedio. Oppositae vero partes orbium habent Solem E intermedium, quia Sol est Copernico cor et velut communis axis orbium, ut confirmatum est Libro IV. fol. 313. Ergo sequitur, ut in aliqua dierum, quibus sectio F est inter A Terram

Fig. 96.



et O planetam, Soli E et planeta O ex A Terra videantur sub eodem loco fixarum conjuncti per visoriam AEO productam in fixas. Ex eo, quia semper sectio appropinquat Terrae, remotissima enim est ab A, propter ipsi B magisque ipsi C, probatum vero est, visorias tandem fieri parallelas, necesse est, sectionem intermedio loco incidere tandem in ipsam Terram indeque post Terram excurrere in infinitum, id est sectionem tandem nullam fieri; ut Terra in D, planeta in T veniente. Atqui si sectio incidit in Terram (esto in H), centrum igitur Terrae in posteriori situ incidit in visoriam diei prioris; visoria igitur illa (esto HI) absecat ab orbe magno unum diurnum apud H, aequidistat igitur rectae, tangenti orbem magnam in medio illius arcus diurni. Sed quae ex centro, cui videtur est Sol, ut EH, ducta in contactum, qui sit H, facit cum tangente HI angulum rectum EHI. Si igitur HE est visoria per Solem, HI visoria per corpus planetae I ducta tendit in locum quadratum Solis. Cum igitur sectio fit in centro Terrae, planeta apparet in quadrato Solis circiter; at si videatur plus quam 90° circiter elongatus a Sole, sectio est post Terram versus O, donec in parallelas degeneret. Ita sequitur stationes fieri ultra quadratum Solis. Rursum visorias post DT versus GK ordinatas concurrere productas et secari ab invicem supra planetam circa Solis oppositum, prius est demonstratum in usu axiomaticis optici.

Jam igitur demonstratum est, sectiones visoriarum tempore conjunctionis planetae cum Sole fieri inter planetam et Terram, tempore quadrati Solis in ipso Terrae centro, post retro Terram, ulterius nullas fieri; at verane oppositum Solis supra planetam contingere. Atqui si visoriae se eecant supra planetam, necesse est planetam videri retrogradum, si infra versus Terram vel in Terra vel retro Terram, planeta, superiorum unus, necessario directus videbitur incedere.

Nam sit OPQ signorum consequentia, in quam planetae veris motibus circa E Solem tendunt. Cum igitur etiam sectio quaelibet repraesentet quodammodo centrum fixarum sitque media inter Terram et planetam per ABC usque in H, sectio quaelibet discriminabit plagas motuum oppositas, ut Sol. Et quia Terra per ABCH cis sectiones in directum movetur sub fixis, in plagam FA, FB etc. superstantibus, etiam partes illae visoriarum, quae sunt ultra sectiones, erunt in directum dispositae. Sic cum sectio fit in centro Terrae circa H, duae igitur visoriae exeunt ex eodem H loco centri, una prioris diei, altera praesentis, exeunt vero in partes orbitae planetae ordine signorum sequentes, prior in locum ipsi Q propiorem, posterior in locum I, quia versus planetae motus est A Q versus I. Ergo et hae visoriae succedunt in signorum consequentiam. Sic cum sectio fit post Terram H versus D, Terra igitur et planeta sunt

ex eadem plaga respectu sectionis, et in hisdem secantium partibus, quas tenent rursus ordinem punctorum tam orbitae QIT, quam orbitae HD. Adhuc igitur visoriae succedunt in signorum consequentiam. At vero cum sectio est ultra planetam Soli oppositum, versus R vel K, tunc rursus quidem eandem sectionis respectu plagam easdemque sectarum partes TD, KG obtinent, Terra in D, G, et planeta in T, K. At quia sectio est in plagam planetae Soli oppositi, opponuntur igitur, hinc E Sol, inde sectio versus R vel N, interponuntur vero itinera corporum DG et IK. Sunt vero directa respectu Sois E, quin circa Solem flectantur, sunt igitur retrograda respectu sectionum supra R, N. Igitur visivarum DT, GK partes illae, quae sunt supra sectiones, erunt et ipsae dispositae contra signorum ordinem; quare necesse est planetam Soli oppositum videri retrogradum.

Hanc inaequalitatem stationum et retrogradationum absurdissimam vetus astronomia planetis ipsis singulis seorsim tribuit eorumque veris motibus, ut subjectis, inesse statuit.

Quid appellas puncta stationum? Puneta vel singula eclipticae, sub quibus planeta per aliquod tempus haerere videtur immobilis, vel bina orbitae planetae, aut etiam orbitae Telluris, arcus illos terminantia, per quos dum incedunt planeta et Tellus, apparens statio durat.

Quot numerantur cuiusque planetae stationes? Duae, una ante oppositionem cum Sole, quae *στρογμος*, statio prima dicitur; altera post oppositionem, secunda denominata.

Qua re designantur puncta stationum sub ecliptica? Duabus lineis, duorum proximorum dierum visivis, inter se parallelis usque sub fixas eductis.

Quomodo possunt fieri parallelae, si diurni arcus eccentricorum planetae et Telluris sunt inaequales? Quanto major est arcus diurnus Telluris arcu diurno planetae, tanto obliquius lineae visivae secare debent orbitam Telluris.

Quomodo determinantur eminus puncta orbis magni, stationes repraesentantia? Ductis rectis ex planetae quolibet loco suscepto, tangentibus orbem magnum ab utroque latere; puncta, in quibus Terra constituta planetam illo eccentrici loco versantem repraesentat stationarium, recipiunt se intra contactuum puncta versus planetam; plurimum in Marte, minimum in Saturno, mediocriter in Jove.

Ut si queratur de loco eccentrici planetae S, ex illo eductae rectae, tangentes orbem magnum SB, SC, ut sint B, C puncta contactuum, puncta stationum duarum sunt in arcu BC propiora planetae in S, quam ipsa B, C.

Quem appellas arcum retrogradationis? 1. Vel arcum eclipticae, comprehensum inter duas vicinas planetae stationes apparentes, 2. vel arcum orbis magni, comprehensum inter bina parallelarum paria, stationes determinantia. 3. Posset etiam de arcu eccentrici planetae usurpari, quem planeta decurrit ab una statione ad proximam et hinc eadem bina parallelarum paria determinant.

Quae fuit opinio veterum de causis, cur fiant planetae stationarii, quisque in peculiari elongatione a Sole? Veteres, quos inter Apollonius Pergaeus et eos secutus Ptolemaeus, causas deducunt ex proportionem motuum epicycli ad eccentricum; sed magnitudinis epicyclorum, praepostero ordine singulis attributae, eorumque motuum proportionis causas dicere non potuerunt.⁷⁹⁾ Latini philosophi, mathematicae disciplinas insuper habentes, vim retardandi motus planetarum et plane inhibendi contulerunt in aspectus Solis, et Saturno dixerunt nocere quadratum Solis, Jovi trinum, Marti aliquid amplius; ignari, aspectus hos, uti quidem fieri possunt efficaces in haec inferiora, esse potius

entia torrestria, quam coelestia. Noc enim sunt aspectus in ipsis planotis, sed hic tantum in Terra. Nec perpenderunt, aspectus esse rationis entia formalliter, quibus uisi in facultatem, rationis quodammodo participem, vis et efficacia nulla inesse potest.

Quae est igitur causa vera, cur Saturnus inter quadratum et trinum Solis, Jupiter in trino fere, Mars ultra trinum a Sole tam ante quam retro fiant stationarii? Quia, si planeta nihil plano proficeret motu proprio sui eccentrici, loca stationum apparentium in orbe maguo essent eadem cum punctis contactuum, hoc est planeta stationarius appareret in ipso quadrato Solis circiter. Posita enim Terra in C, eunte planeta in S, stante re vera, et CS tangente Terrae orbitam, videretur Sol per CE, planeta per CS, quare 90° circiter a Sole, quia ECS fere rectus. Sed quia planeta non quiescit in S, quo ergo maior est cujusque planetae versus arcus diurnus in eccentrico, hoc longius a punctis contactus C oportet duas visivas discedere, ut parallelo fiant perque hoc stare planeta videatur.

Vicissim si planetae arcus diurnus aequo longus esset arcui Telluris, statio nulla posset apparere, nisi in ipso Solis opposito. Jam vero breviores sunt diurni superiorum, et brevissimus Saturni, Jovis modicius, Martis lougissimus. Quaro ad stationem Saturni repraesentandam parva recessione a puncto contactus versus oppositionem opus est Terrae, ad Jovis majore, ad Martis maxima. Quo plus vero Terra distat ab hoc puncto, hoc major fit angulus inter visivas planetae et Solis. Conficitur igitur, Saturni stationem paulo plus 90 gradibus a loco Solis abesso, Jovis multo plus, hoc est circitor 120°, Martis plurimum.

Quam causam assignas, quod tardissimus planeta saepius stationarius retrogradusque fiat, velocissimus rarius et tardius? Quia tardissimum, Saturnum, Terra in orbe magno citius et sic saepius assequitur, Martem velocissimum tardius et sic rarius, quoties autem quemque assequitur, toties illo retrogradus apparet, anto et post stationarius. Hic vetus astronomia muta est.

Cur in universum, quo altior est planeta vel alio planeta vel se ipso, hoc diutius manet retrogradus? Duae sunt causae. 1. Si planeta, superiorum unus, uno eccentrici loco, ut in S, staret immotus, tunc quo is bumillior esset, hoc minor arcus orbis annui cadoret inter binas contingentes ex planeta, scilicet inter SC, SB; et quo ille superior, hoc iste major. Et quia diximus, hoc posito visum hri planetam S stationarium ex B, C punctis contingentiae, quare major arcus BC superiori planetae vindicatus longiori tempore permearetur a Tellure.

Quod vero, quate planetae supposita, sequitur in arcum inter puncta bina contingentiae, idem jam, concesso planetae suo motu diurno, sequitur in arcum inter bina parallelarum visivarum paria. Accedit jam secunda causa, quod planeta, quo superior est, hoc et tardior, sive hoc minorem habet arcum diurnum orbitae suae. Quo vero minor hic planetae arcus, ut in T, hoc minus otiam diurnos Telluris, ut in D, a punctis contactus, versus G, oppositionis punctum recedere necesse est, ut visoriae utrosque determinantes ofhelantur parallelo; quod jam supra stabilitum est. Si parum haec puncta stationum recedunt introrsum a punctis contingentiae, parum etiam minuitur arcus contingentiae pro superioris statione; quare et tempus inter stationes apparentes, quas ipse vore immotus sortiturus erat (per se longius, quam inferiores), tanto minus dimiunetur.

Atqui planeta, prima statione jam peracta, dum apparet retrogradus,

toto illo intervallo pergens in suo eccentrico, videtur transponere secundam stationem magis in consequentia. Si hoc, quare, qui pergit velocius, is magis prolongat hanc portionem orbis annui? pergit autem velocius, qui est inferior, non qui superior. Id quidem verum est; at hæc prolongatio arcus orbis magni non potest æque valere illi abbreviationi ejusdem ob propinquitatem inferioris ad orbem magnam; efficit vero hoc solummodo, ut hæc prolixitas temporis retrogradationum non tueatur proportionem exactam, quæ nascitur ex diversorum intervallis. Nam Saturnus est fere duplo altior quam Jupiter, et hic triplo altior Mars, et tamen exiguo longius est tempus retrogradationis Saturniæ, nec longius Jovialis tempus, quam sequitium Martialis circiter.

Unde hoc est, quod Saturnus minimum arcum eclipticæ pererrat retrocessu suo, Jupiter mediocre, Mars maximum? Hujus rei causam rursum solus Copernicus ex suis hypothesibus detegere potest, missante astronomia veteri et epicyclos inæquales introducente, nulla magnitudinis indicata causa. Fit igitur hoc, quia Saturnus longissime abest a circulo Telluris annuo seu orbe magno, Jupiter propior, Mars proximus illi incedit.

Illic enim sequitur, si quis orbem Telluris, ut BC, ex planeta, ut ex S, intueretur, ei hunc visum iri parvum ex Saturno, majorem ex Jove, maximum ex Marte. Videretur autem per duas visivas, SC et SB, illum utridque contingentes; quibus appproximare diximus bina parallelarum paria, quæ stationes definiunt. Itaque si vel plane immetus hæreret planeta, tunc eodem angulo, quæ videretur orbita Telluris ex S, planeta in unam zodiaci plagam, a qua E Sol stat (angule scilicet CSB, ejus mensura feret arcus zodiaci, comprehensus inter predictas SC, SB), eodem inquam angule, vel qui ei ad verticem, continuatis sensum CS, BS, videretur ex Terra B, C in opposita zodiaci plaga arcus apparentis retrogradationis, minimus altissimi, maximus humillimi. Nec enim minus jam S pro centro fixarum haberi potest, cum etiam ES intervallum sit inensibile. Quod vero verum esset, posita quiete planetæ in S, id non multo habet aliter, postquam constat, planetam neu quiescere, sed prorsum moveri. Nam si quid hec turbat et si minuit apparentiam epicycli, minuit certe eam in omnibus; omnes enim planetæ veris suis motibus eunt in consequentia.

At cur non sunt hi arcus proportionem paulo propiore proportioni intervallorum Solis et singulorum planetarum? Ut quia Mars plus quam sextuplo propior est Soli quam Saturnus, videtur igitur ob primam causam dictam sextuplo majorem arcum retrogradationis habere debere quam Saturnus. Etsi non licet colligere proportionem angulorum ex proportionem intervallorum, ut demonstrat Euclides in Opticis, sunt tamen hic idoneæ causæ aliæ, quæ quancunque ab intervallis deductam proportionem turbant. 1) Quia planetis progredientibus, et velocius illo, qui est inferior, bina paria parallelarum visionum longius recedunt a punctis contactuum. Quare arcus orbis magni inter puncta stationum, minor redditur, minor etiam apparebit ex S loco planetæ. 2) Quia quo quisque progreditur velocius, hoc longius transponit locum eclipticum stationis secundæ, in quem CS dirigitur producta versus locum eclipticum stationis primæ manentem, per BS signatum sub fixis, cum ille in antecedentibus sit, hic in consequentibus zodiaci locis. Coenitibus igitur locis eclipticis stationum, minuitur iterum velociori planetæ eoque inferiori arcus eclipticus retrogradationis, quem is valde magnum erat sortitus.

At contrarium tamen dixisti fieri in uno aliquo planeta, respectu sui ipsius altioris vel humilioris. Ut si Mars est altus a centro mundi, longiorem conficit arcum retrogradationis, si humilis, brevior. Quæ hæc

causa diversitatis? Quia duae jam modo dictae causae arcum in humili abbreviantes, in comparatione diversorum planetarum non aequant vim primae, arcum ei humili longum dantis; at in uno aliquo secum ipso comparato, primae effectum superant. Cum enim ambae pendeant a velocitate, haec velocitas inferioris ex duobus est solummodo sesquiplo majori in proportionem, quam propinquitas intervalli, ut libro IV. fol. 350. demonstratum; at in uno et eodem planeta, inferiori facto, velocitas circa centrum Solis est plane duplo majoris proportionis quam propinquitas; quod demonstratur libro item IV. fol. 351. 373. usurpaturque libro V.

Quid hinc sequitur in planetas superiores conjunctos? Saturno quidem directo ceteri jungi non possunt, nisi et ipsi directi, et Marti retrogrado ceteri non nisi et ipsi retrogradi. At Saturno retrogrado contingit etiam jungi Jovem et Martem directos, sic etiam Jovi retrogrado Martem directum.

Quare luminaria, Sol et Luna, non etiam sunt retrograda? Non ideo, quia luminaria sunt, sed quodquo suam ob causam; Sol quidem, quia Terra illum quiescentem circumit, omnes igitur visivae res secant in ipso Sole et sic semper in eadem Solis plaga, nunquam in contraria; Luna vero ideo, quia ipsa Terram eundem circumit, semper velocior circa Terram, quam Terra circa Solem, ubi minimum undecuplo.

Nullane alia ex hypothesi possunt causae reddi harum apparentiarum? Omnia haec et singula sequuntur sano otium ex hypothesi Brahei, in qua relinquitur quidem eodem disposito mundi mobilis et in ejus medio corpus Solis, in quo orbis omnes veluti communi clavo sint connexi, at pro motu Terrae annuo circa Solem Sol vicissim circa Terram eat, gestans et luxans totum systema planetarium; qualem luxationis motum depictum habes lib. IV. fol. 354. Qua Tychonis Brahei hypothesi sic correctae satisfi astronomiae; at quid ex physica possit opponi, praesertim de penetratione regionum Martis et Solis, de hoc vide dicto loco, praesertim fol. 356.

Quid est anomalia commutationis, quid elongatio a Sole et quis utriusque angulus? Sunt arcus eclipticae a vero loco Solis in ea numerati in consequentia, illo usque ad planetae locum eccentricum in ecliptica, iste usque ad apparentem seu visum planetae locum. Angulus vero utriusque numeratur vel in consequentia a loco Solis, vel in antecedentia, ut sit semper minor gradibus 180. Dicuntur quoque a rebus ipsis, ille angulus ad Solem, iste angulus ad Terram. In schemate 85. TC est linea veri loci Solis, Sole in S, planeta vero in P posito, SPL est linea loci eccentrici planetae in ecliptica, in veteri forma esset TN, ipsius SL parallela, et TPV est linea visi loci planetae; quare CSL est angulus commutationis, CTV angulus elongationis.

Quomodo invenitur angulus anomaliae commutationis? Subtracto loco viso Solis a loco eccentrico planetae ad eclipticam reducto; vel bujus ab illo, ut scilicet minus semicirculo relinquitur.

Quid est parallaxis orbis? ⁷⁴⁾ Est differentia angulorum commutationis et elongationis, appellaturque etiam angulus ad planetam, in schemate TPS vel PTN. Cumque parallaxis graece sit idem, quod latine commutatio, cavenda est ambiguitas; utrumque est angulus, ille anomaliae commutationis, hic commutationis ipsius. Orbis vero cum dicitur, subintellige magni vel anni Telluris, quia hic orbis illam apparentis loci commutationem seu translationem ex L in V causatur. Quanquam hac parallaxi in Tabulis Rudolphinis seorsim non utimur.

Quanta est maxima parallaxis orbis in singulis? In Saturno est minima,

in Jove mediocris, in Marte maxima; in singulis minor in aphelio, major in perihelio, et (concessa inaequali translatione apsidum) non omnibus seculis eadem.

Quid est index in Copernicana forma astronomiae et calculo motus planetarum? Quia non potest fieri, ut parallaxes orbis ad semidiametrum orbis referamus, ut fit in astronomia veteri, quaro loco scrupulorum proportionalium duplicium excessusque parallaxes orbis, seu diversitatis diametri in astronomia veteri, introductus est numerus indicans, quae sit intervallorum Solis et planetarum Tellurisque (in schemate 85. TS, TP) summae proportio ad differentiam.

Quomodo invenitur? Differentia distantiarum planetae et Telluris a Sole, prolongata quinque cyphris, dividitur in earum summam. Sed pro quotiente commodè potest usurpari logarithmus ejus, ut fit quidem in Tabulis Rudolphi.

Doce invenire angulum elongationis a Sole visibiles locumque visibilem sub ecliptica. Tangens semissis anguli anomaliae commutationis multiplicatus in indicem facit tangentem arcus addendi ad illum semissem in superioribus, subtrahendi in inferioribus, ut constituatur angulus elongationis a Sole. ²⁵⁾ Si pro tangente adhibeatur semissis illius mesologarithmus, additione simplicis hujus ad logarithmum indicis prodit mesologarithmus arcus ejusdem, illic addendi, hic subtrahendi.

Quodsi locus planetae eccentricus fuit abstractus a loco Solis vero, jam etiam angulus elongationis ab eodem est subtrahendus; si vero Solis locus fuit ab eccentrico planetae loco subtractus, hic jam angulus elongationis loco Solis erit addendus, ut visibilis planetae locus in ecliptica prodeat.

III. De magnitudinis planetarum incrementis.

Proba, Terra circa Solem eunte, necessarium esse, ut planetae in Solis opposito ceteris paribus videantur majores, versus conjunctionem Solis minores. Demonstrat Euclides Opticorum prop. 56: oculo prope spectatum accedente, id augeri putari. Jam vero accedit oculus ad planetam, quamdiu Tellus, oculi domicilium, contendit ad locum interpositionis inter Solem et planetam. Ergo planeta interim videbitur augeri et vicissim, Terra locum praetergressa, rursus diminui. In schemate 85. Q planeta, T Terra, interposita inter Q et S Solem, erit intervallum planetae et Terrae TQ. Movenatur corpora in consequentia, planeta ex Q in P, Terra per majorem partem circuli ex T in B, ut S Sol et P planeta videantur conjuncti, eritque intervallum planetae et Terrae BP. Ut igitur TQ ad BP, sic vicissim diameter planetae in P ad eandem in Q. Quantae vero appareant diametri superiorum per tubum dioptricum, dictum est libro IV. fol. 329.

IV. De latitudine.

Ubi sunt nodi, ubi limites superiorum, et quis eorum motus? Ptolemaeus invenit boreum limitem eccentrici Saturni in 3° $\frac{1}{2}$, Jovis in 1° $\frac{1}{2}$, Martis in fine \odot ; hodie limes Saturni venit in 21° $\frac{1}{2}$, Jovis in 7° $\frac{1}{2}$, Martis in 19° \odot . Igitur etsi limites respectu verni aequinoctii, quod principium habetur eclipticae, moveantur in consequentia, respectu tamen fixarum omnes moventur in antecedentia; quemadmodum et limites Lunae. Nodi sunt in locis eclipticae praecise quadratis, ascendens quidem in quadrato priore.

Quomodo et quantum inclinantur eccentrici ad eclipticam? Cum nodi

inveniantur in locis eclipticae diametraliter oppositis, ergo plana eccentricorum et eclipticae se mutuo secant in lineis rectis, per centrum Solis communiter traductis. Omnium ergo planetarum sectiones istae (non minus quam superius lineae apsidum) in centro Solis sese mutuo intersecant. Angulus, quo limites ad eclipticam inclinantur, est in Saturno $2^{\circ} 32'$, in Jove $1^{\circ} 20'$, in Marte $1^{\circ} 50' 30''$ idque hodie. Ptolemaeus etiam praedit in Saturno $2^{\circ} 30'$ in Jove $1^{\circ} 30'$, in Marte $1^{\circ} 0'$.

Manetne hic angulus invariabilis? In una quidem periodo invariabilis manet, at nec inde a Ptolemaeo multum mutatus esse potest; non possumus enim a Ptolemaeis numeris hoc petere, ut veritatem ad unum scrupulum prodant, cum observationes crassae fuerint. Nihilominus tamen suspicio est, mutata ecliptica temporanea, etiam has ad illam expensas inclinationes eccentricorum mutari limitesque ad solam eclipticam regulam mediam constanter inclinari et parallelas soli regiae describere, verisimile fit, ut ita poli orbitarum a poli orbis magni seu Telluris orbitae non omnibus seculis aequaliter distent, ob utroque motus distinctos. Vide libro VII. causam probabilem, ob quam inclinatio maxima Martis olim fuerit minor.

Quid est latitudo planetarum? Est arcus circuli latitudinum, sub fixis descripti, interceptus inter eclipticam et visum locum planetarum.

Quae est cognatio, quae comparatio latitudinis et inclinationis, libro V. traditae? 1) In oppositionibus et conjunctionibus planetarum cum Sole est idem circulus, tam latitudinis quam inclinationis cuiusque loci. 2) Latitudo semper est cum aliqua inclinatione et vicissim; et ubi nulla inclinatio, ibi nulla latitudo. 3) Quoties inter planetam M et Terram B est eadem distantia, quae inter planetam M et Solem E, seu triangulum EMB isosceles (Fig. 86), inclinatio aequalis est latitudini. Id autem contingit tunc, cum inter visa loca planetarum BM et Solis BE est minus quam quarta pars circuli; qui arcus in Marte minimus est, in Jove major, in Saturno proximus quadranti. Cum igitur hoc angulo major est elongatio planetarum a Sole, seu minor distantia planetarum a Terra, latitudo superat inclinationem; cum illa minor, haec major, superatur ab ea.

Proba, necesse esse, ut circumeunte Terra et sic planetae appropinquante, planetae latitudo augeatur et superet inclinationem. Demonstratio est eadem de inclinatione, quae supra de incremento apparentis magnitudinis corporum, ex prop. 56. Opt. Euclidis. Vetns astronomia hic infinitam epicyclorum, diametrorum, et inclinationum, reflexionum, obliqnationum inspektionem eamque intricatissimam et comprehensu difficillimam est commenta, neque tamen satisfecit observationibus.

Ubi est latitudo maxima? Etsi plerumque latitudo vice una maxima est in media retrogradatione, circa oppositionem cum Sole, aut in inferioribus circa conjunctionem inferiorem: non veniunt tamen ipsi articuli in ipsas oppositiones et conjunctiones cum Sole, sed fit latitudo maxima, praesertim in Marte, interdum ante vel post copulas cum Sole, tunc nimirum, quando distantia planetarum et Terrae crescit vel decrescit in eadem proportionem, in qua et inclinatio.

Quomodo invenitur latitudo planetarum? Ut sinus anguli elongationis se habet ad sinum anguli commutationis, ita tangens complementi inclinationis se habet ad tangentem complementi latitudinis. Igitur dividatur sinus commutationis, auctus 5 cypris, a sinu elongationis, quotiens ducatur in tangen-

tem complementi inclinationis et abjectis. Item 5 ultimis prodit tangens complementi latitudinis.⁷⁶⁾ Vel compendiosissima ratione, a logarithmo computationis auferatur logarithmus elongationis, residuum addatur mesologarithmo complementi inclinationis: summa est mesologarithmus complementi latitudinis.

Quanta possunt fieri latitudines? Si omnes situs limitum planetae cum omnibus apheliorum tam ipsius planetae, quam Telluris permutentur, multa secula erant expectanda, nec tamen Saturni maxima 2° cum decenne assequetur, neque Jovis 1° cum decunco, at Martis maxima poterit 7° excedere, quanta fere fit hodie maxima australis. De parallaxi planetarum respectu motus diurni agatur infra in doctrina eclipsium.

LIBRI SEXTI

PARS TERTIA.

DE DUOBUS INFERIORIBUS EX PRIMARIIS, VENERE ET MERCURIO.

Quae causa est, cur separentur hi duo planetae a tribus superioribus, cum in numero et forma inaequalitatum cum iis convenient? 1. Quia situs hos ab illis separat, denominatione ipsa indicatus; illi tres enim cursibus suis orbitam Terrae circumeunt exterius, hi duo intra Telluris orbitam cursus suos exercent. 2. Telluris annuus circuitus apparentias haece duobus conciliat, nec adeo evidentes et certis respectibus oppositas apparentias superiorum. 3. Aliter circa superiores differt Copernicana astronomia ab antiqua, aliter circa inferiores. 4. Accedit causa mechanica et theopiarum commoditas. Etsi enim posset fieri communis theoria pro omnibus quinque et pro Sole seu Tellure sexto, quae demum genuina mundi mobilis et intrinseca esset effigies: at quia orbis, dictus ab usu magnus, Saturno parvus admodum est accommodandus, is eadem quantitate manens eccentricos Veneris et Mercurii requirit multo se minores minusque tractabiles. Praestat igitur peculiarem pro inferioribus eumque satis amplum fieri orbem magnum, ut etiam eccentrici inferiorum aliquam justam quantitatem nancisci possint.

Recense, quas motuum apparentias faciant duo inferiores, Venus et Mercurius. 1. Anomalia seu inaequalitas prior, orta ab eccentrico, in inferioribus nequaquam ita promtis occasionibus innotescit, ut in tribus superioribus, sed longa demum ratlociuatione est indaganda. Evolvitur autem vera ipsorum, praesertim Mercurii, anomalia a phantasia, quam orbis magnus causatur, difficillime, quia nunquam apparent nisi hac secunda inaequalitate implicati: quoties enim in lineam ex Terra per Solem incidunt, carentes inaequalitate secunda, semper sunt sub radios Solis absconditi. Itaque vetus astronomia primam et genuinam illorum inaequalitatem ne quidem opinata est, etsi illa sese nonnihil, sed sub specie longissime alia, prodidit.

Verum detractis oculorum fallacis, quae causam ab annuo circuitu orbis Terrae trahunt, deprehendimus, etiam hos planetas ad normam ceterorum circumire Solem motibus eccentricis a Sole, velocesque esse, cum sunt Soli propinqui, tardos, cum ab eo remoti, in proportionem dupla angulorum in centro Solis, quos ipsorum diurni eccentrici subtendunt.

2. Motu vero composito ex utraque inaequalitate, qui compositus motus prior incurrit in oculos, apparent velocissimi, cum matutinis horis lucipiant et condere sub Solis radios, aut cum horis vespertinis exeunt ex iis; quibus plausibus tres superiores carent. Cum vero vel vesperi occultantur vel mane emergunt (quo, casu tres superiores erant velocissimi), inferiores contra sunt stationarii, scilicet post elongationes maximas vespertinas et ante matutinas; intermedio tempore sunt retrogradi, rursus in conjunctione cum Sole, quae est his inferioribus loco oppositio cum Sole, qua ipsi carent; semper quippe currunt vicini Soli, quem certis spatii nunc antecedunt, nunc sequuntur, subinde ad ipsum redeunt. Veneris quidem longissime a Sole progreditur et pauciores stationes conficit totiesque et Soli copulatur; Mercurii breves excursus habet et crebro stationarius fit, crebro Soli jungitur eoque raro apparet.

3. Quod attinet motus in altum, etsi non difficile est, illos animadvertere descendere versus Terram aut fugere in altum, Venerem quidem arguente incremento corporis in certis locis, Mercurium vero celeritate vel tarditate apparitionum occultationumque, quam oportet esse ex augmento apparenti corporis, ut fit in superioribus: tamen et haec observatio multo est perplexior quam in superioribus, diu enim torsit astronomos apparens magnitudo corporis Veneris, cum Terrae incedit proxima, quia haec magnitudo non respondere videbatur appropinquationis minimo intervallo, ex aliis argumentis elucens, donec telescopio invento causa patuit.

4. Causa latitudinis hoc fuit annotatum, septentrionales in Venere latitudines, ceteris paribus, esse majores, in Mercurio meridionales, in utroque illas semper majores, in quibus, linea ex Sole per planetam in eundem zodiaci locum incidente, post exactas periodos Tellus propter facit planetae.

Quomodo determinantur elongationes maximae horum planetarum? Per lineas visivas, quae ex Tellureeductae eccentricos illorum contingunt. Nam planetae, in puncta contactuum incidentes, sunt in maximis elongationibus fere.

Quomodo moventur hi duo planetae re vera in suis eccentricis? Veneris

diurnus medioeris circa Solem in consequentia est $1^{\circ} 36' 7'' 39'''$ (sub fixis), redit circa Solem diebus 224 h. 17. 53' 2" 14''; sub ecliptica h. 17. 44' 55" 14'', Mercurii diurnus medioeris circa Solem est $4^{\circ} 6' 32'' 25'''$, redit sub fixis diebus 87 h. 23. 15' 36'', sub ecliptica h. 23. 14' 24''.

Qua ratione possunt hi planetae exui inaequalitate secunda, ex orbe magno proveniente, si non opponuntur Soli? Subsidio nobis veniunt elongationes ipsae maximae, in quibus planetae constituti et corni et observari possunt, quantum omnino a Sole distent. Tunc enim linea ex centro eccentrici, ut hic ex B in planetam seu punctum contactus M ducta, secatur visivam TM angulis rectis inciditque in locum zodiaci quadratum loci planetae visi-




Fig. 87.

bilis, per TM productam signati, quia BMT rectus est; ipsa vero AM, ex A Sole per planetam Meducta, quam praecipue quaerimus, nusquam longius a BM in zodiacum incidit, quam quanta est quovis loco pars aequationis optica seu angulus AMB. Quanta vero sit haec pars optica, facile est praevidere ex dimensione linearum ex Sole A in planetam, constitutum in P, R apsidibus, scilicet ex AP, AR, quarum linearum inter se comparatio prodest eccentricitatem AB, quare et angulum AMB quovis loco.

Quid appellas eccentricum in inferioribus, et quomodo in veteri astronomia fuit dictus? In tribus superioribus, quos astronomia vetus dicebat eccentricos, iidem et nobis erant eccentrici; in inferioribus, qui veteribus et Tychoni Brahe dicebantur epicycli, nobis eccentrici statuendi sunt. Qui vero a veteribus sunt adscripti Veneri et Mercurio eccentrici, illorum jam penitus nobis est obliviscendum. Nam orbis idem magnus in astronomia veteri et superioribus tribus tres ademit epicyclos, et Soli inferioribusque duobus tres vetustati creditos eccentricos; quos omnes sex Copernicus in unum orbem magnum seu orbitam Telluris conflavit.

Habes aliquod evidens argumentum, quo probes, inferiores non toto circuitu infra Solem manere, sed circa Solem in gyrum ire, nunc superiores Sole, respectu nostri, nunc inferiores? Id. supra libro IV, fol. 352. allatum proprium quidem est hujus loci. Venus enim illuminatur ut Luna, omnes enim Lunae phases subit; id vero non posset fieri, nisi Venus, quae nunquam longius a Sole digreditur, jam supra Solem incederet, jam infra eum. Demonstratio infra sequetur. De Mercurio quatenus idem dici possit, vide locum, allegatum.

Quodsi Solis corpus e centro eorum duorum eccentricorum, veluti cor e corpore eximas, quod facit is, qui motus illorum ad aliud punctum quam ad centrum Solis regulares facit, secutus vel Copernici vel Tychonis hypotheses incorrectas: tunc causae nullae patent, cur moveantur hi duo planetae in gyrum circa vacuum centrum, nisi ad deos Aristotelicos revertamur, per omnem amplitudinem conavorum orbium diffusos. Vide libro IV, fol. 354. 355.

Quantae sunt horum siderum elongationes a Sole maximae? Superiorum quidem trium elongationes communiter in semicirculum potuerunt excrecere, at non sic inferiorum. Nam Veneris quidem elongationes a Solis apparente loco sub zodiaco ad summam $47\frac{1}{4}^{\circ}$ videntur excurrere, Mercurii elongationes, apogaea quidem intra 29° coercetur, perigaea infra 18° .

Quibus argumentis deprehenduntur elongationes ipsorum maximae? 1) Si motus ipsorum diurni aequant motum Solis diurnum, 2) In maximis elongationibus, quippe linea visiva contingente orbitam, Venus apparet retrogrados, ut Luna; quod idem et in Mercurio locum haberet, si a claritate crepusculi et exilitate corporis id non impediretur. Demonstratio sequetur infra parte V.

Quibus zodiaci locis consistunt aphelia horum eccentricorum et quorum est motus? Hodie aphelium Veneris est in 2° ♊, Mercurii in 15° ♈. Veteris temporibus ubi Veneris aphelium fuerit, nonnisi eminus ostendi potest, inter scilicet Libram et Pisces, perihelium inter Geminos et Leonem. Mercurii tamen aphelium fuit circa 4° ♊. Cum igitur Mercurii aphelium, ut ceterorum omnium, succedat in consequentia signorum et fixarum, probabile idem est et de Venereo; oportet igitur vetustis illis temporibus in Capricorno fuisse.

Quae causa incertitudinis in Venere majoris, quam in Mercurio?

1) Quia Venus parvam admodum et per crassas veterum observationes in-

sensibilem obtinet eccentricitatem, Mercurius omnium maximam et evidentissimam. 2) Quia Venerem circa aphelli locum (seu in \angle , δ , ∞ incidente linea ex Sole per sidus) observatam non adscripserunt veteres, in Mercurio plures et commodiores relictæ sunt observationes. 3) Quia theoria Solis in astronomia veteri non caret erroris suspitione circa apogaei locum et eccentricitatis quantitatem; at vero vetustas Veneris et Mercurii elongationes maximæ sine cognitione veri loci Solis ad illa tempora mensurari exacte non possunt, vitium vero hinc ortum nocet parvæ Veneris eccentricitati; non ita nocet magnæ Mercurii.

Num tamen et veteres subolfecerunt loca aphelliorum horum planetarum et qua re? Cum veteres illos, quos hic appellamus eccentricos, epicyclos appellatos aequaliter circa puncta, medio Solis loco respondentia, ordinaverint, qui tamen et circa illa puncta et circa ipsum verum locum Solis ordinandi fuerint inaequalibus intervallis, ex orbe vero magno unleo, qui etiam eccentricus est a Sole, duos fecerint eccentricos inferiorum: factum est, ut utraque eccentricitas, tam orbis magni, quam eccentrici planetæ (nobis dicti) confunderentur in astronomia veteri in unam, cujus respectu Ptolemaeus apogaeum Veneris in 25° γ prodidit, Mercurii in 10° ω ; in his igitur locis latent vestigia aphelliorum nostrorum. Nam quia eccentricitas orbis magni multo major est eccentricitate Veneris, ideo veteres apogaeum Veneris invenerunt multo propius apogæo Solis, tunc in 10° Π versanti, quam aphelio Veneris, in δ versanti, inter utrumque tamen, quia, ut dixi, confusæ fuerant in unam duæ eccentricitates. Vleissim quia eccentricitas Mercurii multo major est eccentricitate orbis magni, ideo Mercurii apogaeum, veteris astronomie intentione constitutum, multo propius inventum est aphelio Mercurii in 4° \mathcal{M} existenti, quam apogæo Solis in 10° Π versanti, rursum tamen inter utrumque propter confusas eccentricitates. Alterum argumentum, quo Ptolemaeus convincitur, observasse epicyclos suos a suscepto mediocritatis puncto eccentricos, vide infra in latitudine.

Quanta est eccentricitas inferiorum, et quæ orbium dimensio, communis cum orbe magno? Hanc quoque vetus ignorat astronomia, adeo ut cum trium superiorum orbes et epicyclos tantos faciat, quantum poseit ratio mechanica, contiguas theorias struens (quippe sursum illi nihil obstante, sed libero, quousque lubet, æthere patente), jam infra Solem locus hunc inter et Lunam non sufficiat recipiendis, quos vetus astronomia his inferioribus affingit, orbibus; stante quidem dimensione orbium Solis, quam illi tradiderunt. At Copernicana astronomia proportionem has prodiit:

Orbis magni ut supra dist. aphelia	101800	Eccentricitas, qualium semidiameter	100000
Mediocris	100000		1800
Perihelia	98200		
Veneris aphelia	72900		
Mediocris	72400		694
Perihelia	71900		
Mercurii aphelia	46955		
Mediocris	38806		21000
Perihelia	30637		

Copernicus tamen ipse etiam plures orbes in inferioribus statuit, adjecto etiam eccentrico eccentrici. Id illi accidit propter ignoratam veram orbis magni eccentricitatem, quod esset saltem dimidia ejus, quam ipse cum veteribus credidit, reliquum persequeretur æquans. Quanto igitur ultra debitum

ipso per suam hypothesein variabat distantias Telluris a Sole et sic etiam ab orbitis Veneris Mercuriique, tantum vicissim compenseandum ipsi fuit per eccentricos eccentricorum.

Quibus argumentis probas, hanc superfluum ejus circularum fuisse causam et hanc nimiam Telluris eccentricitatem sic illi innotuisse? 1. Quia eccentro eccentri hoc dedit officium, ut centrum eccentri Veneris libraret spatio tanto, quantum est hoc dimidium superfluum in orbo magno; centrum eccentri Mercurii spatio paulo minori, eo quod Veneris linea apsimum proxime cum Solis apsimum linea coincideret, Mercurii longius discederet ab ea. 2. Quia motus libratorius centri orbitae Veneris contrarius est statutus motui centri Mercurii, et uterque analogus rei, quam arguimus: ut Venere quidem in apsibus constituta, centrum orbitae esset humile, Mercurio in apsibus, centrum orbitae esset altum. Nam apogaeum Veneris erat ipsi proxime apogaeum Solis nimiumque elevabatur per nimiam orbis magni eccentricitatem; apogaeum Mercurii contra erat versus perigaeum Solis nimiumque deprimebatur propter eandem causam. 3. Tycho Brahe idem etiam in Marte animadvertenter eratque epicyclum aut eccentricum eccentri introducturus, qualem Copernicus in Veneris theoriam, nisi ei bisectio eccentricitatis orbis magni subvenisset. Nam etiam Martis apogaeum vicinum inveniatur apogaeo Solis.

Quid praecipue observandum in inferioribus inter se comparatis circa eorum orbitas eccentricas? 1. Causa eccentricitatis habent se ad invicem modis contrariis: Venus minimam eccentricitatem habet, minor enim illa est eccentricitate Telluris, minor differentilis eccentricitatum omnium; Mercurius contra maximam habet eccentricitatem, adeo ut inferiorum duorum junctae aequent eccentricitatem quatuor superiorum, causa quidem proportionis illorum ad radios suos. 2. Illuc sequitur, diurnos motus eccentricos Veneris in minima esse varietate, Mercurii in maxima, sic ut diurnus perihelium Mercurii amplius quam duplus sit diurni aphelii. Vide libro IV. causas a fol. 373. Quare vetus astronomia, motum hunc aequabilem ponens, in Veneris loco praedicendo vel computando parum admodum errare poteit, in Mercurio plurimum erraverit necesse est. 3. Illinc etiam sequitur, lunulas eccentrici Mercurii (de quibus libro V.) esse in Mercurio notabili admodum latitudine, et diametrum apsimum seu rectam sensibilibiter valde longiorem diametro transversa ellipsos.

Num etiam de hac elliptica figura orbitae Mercurii aliquid innotuit veteribus? Sane hoc illud est, quod Ptolemaeus duo perigaea statuere censuit fuit in Mercurio; nam in Libra quidem minimus apparuit ejus epicyclus (qui nobis est eccentricus), in Ariete vero non maximus, sed major in Aquario itemque in Geminis et proxime utrinque aequalis. Quia nimirum, Sole versante in Libra, Terra in Ariete, ut fig. 87. in T, obvertebatur ipsi sane brevissima pars lineae apsimum, scilicet perihelium Mercurii R, quippe in 40° exporrectum, itaque eccentricum (qui ipsi epicyclus) a lateribus M, N intuebatur, qua is castigatus est abscissis lunulis; igitur oppido parvus eoque elevatur censebatur, ob duas laminationis causas concurrentes, brevitatem scilicet ipsarum BM, BN et longitudinem TB. Terram enim veteres in interiori circulo T ponebant, propter eccentricitatis verae duplum usurpatum, cum vere esset in T exteriori. At in Arietem transiro viso Sole, Terra in Libram transgressa, ut in D, magnus quidem vicissim factus esse videbatur epicyclus, ob appropinquationem seu brevitatem lineae BD, at quia a macilentis lateribus C, K rursus inspiciebatur, quippe P aphelio Mercurii tendente versus

Terram D, in $\frac{1}{2}$ positam (ut cuius locus proximus in 4° M), ideo causa una apparentis parvitatis epleyeli in apogaeo constituti mansit etiam hic in perigaeo, brevis scilicet diametri ellipseos transversae et ipsarum BC, BK; contra Sole in $\frac{1}{2}$ vel II apparcnte, quando Terra in X, Q vel Q, $\frac{1}{2}$, diameter recta seu apsidum PR, quae est multo longior diametro transversa, obijciebatur visui in X vel Q rectius, quasi epleyelus major fuisset factus. Etsi vero altrobique numeri non exaete consentiunt, at facie apparet, observationes Mercurii, a Ptolemaeo conquisitas et quasi emendicatas a veteribus, cum crasse essent annotatae, sic fuisse assumtas, ut quod in uno triente ab spogaeo fiebat, idem etiam in altero triente repraesentari ab hypothese posset.

Quae est causa, cur inferiores duo fiant stationarii et denique retrogradi? Eadem fere, quam asserit vetus astronomia, mutatis mutandis. Cui enim eccentrici eorum sint additi intra Telluris orbitam et velocius percurrant planetae suas orbitas, quam Tellus suam, sit primum in parte eccentrici remotiori a Terra, ut ire videantur in consequentia; viderentur enim id, etiam si quiescerent ut Sol, propterea quia Terra ex opposito it in consequentia, cuius motus per visus deceptionem ipsis inesse putaretur. Jam vero etiam superant celeritate motum Telluris, igitur unito magis videntur ibi in consequentia ire. Hic igitur causa militat eadem in inferioribus, quae prius in superioribus. At vero in parte eccentrici Terrae propiori retrogradi videntur ideo, quia oppositae circulorum partes, extrinsecus inspectae, motus oppositos habere videntur. Etsi enim tunc etiam Terra fertur una cum ipsis in partes easdem, at illi, quippe inferiores planetae, celeriores sunt Terra; adeo ut majores in suis orbitis arcus diurnos faciant, quam Tellus in sua; quare visionum lineae, quae terminos diurnorum respondentes invicem connectunt, reflectuntur in antecedentia secantque se mutuo post Terram in plaga a Sole aversa. Cum autem hic jam Tellus sit illo situ, quo supra erat superiorum unus, et hic jam planeta inferior illo situ, quo supra Tellus, conficitur igitur lisdem principiis apparentia motus retrogradi. Consequens est igitur, ut sint aliqua loca eccentricorum Veneris et Mercurii, in quibus constanti desinant videri directi et incipiant apparere retrogradi, hoc est fiant stationarii, etsi re vera semper in directum et in consequentia moventur; id autem fit visivis parallelis, ut in superioribus planetis.

In schemate superiori (86) stationum sit jam orbis Telluris OP et motus in eo Telluris ex O in P, Q, T, K eodem tempore; quo planeta inferior ex A movetur in B, C, D, G, sintque planetae arcus diurni in eccentrico AB longiores, quam arcus diurni Telluris in orbita sua OP. Ergo Tellure in O versante, planeta in A, parte circuli remotiore, directus apparet et velox, et velocior quidem Sole, quia visivae OA, PB se mutuo secant circa F, eis centrum orbis magni.

Contra, Tellure in K, planeta in G, parte circuli propiore, majores gradus quam Terra faciens, facit visivas TD, KG, quas intelligo versus partes D, G continuatas usque sub fixas, Inclinari ad dextram in antecedentia loci Solis E apparentis. Planeta vero, antea in H, Terra in I versante, circa IH contingentem, planeta ex H in D motus recta versus Terram I descendit aequiparaturque stanti, cum Terra interim in I eat; quare sectione visivarum HI supra II cadente, adhuc planeta directus videbitur. At circa T, D lineae visivae TD incedunt parallelae, igitur planeta apparet stationarius.

Ubi sunt puncta stationum in eccentricis? Dnetis ex S Terra duabus rectis, SB, SC, contingentibus eccentricos inferiorum in B, C, puncta vel arcus stationum semper sunt intra BC, in Venere quidem remotiores a punctis

contactuum B, C, quam in Mercurio. Causae valent hic eadem, quae in superioribus planetis.

Unde hoc est, quod dixisti, stationes esse Soli propiores, quam elongationes maximas? Ex hoc ipso, quod maxime quidem elongantur, quando incidunt in contingentes SB, SC, at stationarii sunt nonnisi in punctis interioribus. (Fig. 86. linea SB ale ducatur, ut circulum ABC tangat.)

Quomodo nominibus distinguuntur stationes? Prima statio post directionem vespertina dicitur, secunda vero post retrogradationem, eoa; quemadmodum etiam elongationes maximae, quae sunt in punctis contactuum.

Mars, superiorum velocissimus, pauciores reliquis stationes faciebat; cur jam Venus, inferiorum tardissimo, pauciores habet? Vetus astronomia causam in epicycli tarditatem conjecit, sed causam tarditatis illius non indicat; veram causam Copernicus hanc tradit: quia sicuti supra Tellus Martem adeo velocem tardius assequabatur et superabat, sic etiam hic Venus tardior quam Mercurius Terram rarius et tardius assequitur superatque.

Quam causam assignas, quod magnitudo apparens Veneris non proportionatur ejus appropinquationi ad Terram per omnia? Quia Venus, progressa vespri ex Solis radiis, pleno orbe lucens eoque speciem diu retinens et descensu augescere visa, tandem statione vespertina peracta, paulatim ut Luna deminuitur in cornu exiguum, ut tanta nequaquam appareat, quanta, si pleno vultu luceret, apparitura fuisset in hac propinquitate.

Ubi sunt nodi et limites inferiorum, et quis eorum motus? Veneris quidem nodos Ptolemaeus posuit in apsidibus a se dictis, scilicet in 25° ♄ ascendentem, in 25° ♀ descendentem, ut fuerit boreus limes (linea ex Sole per illumeducta) in 25° ♄; Mercurii nodos similiter in apsidibus, ascendentem in 10° ♊, descendentem in 10° ♎, ut limes boreus fuerit in 10° ♊. Haec enim vis est duplicis illius inclinationis, quam alt epicyclum facere, qui nobis hic eccentricus. Quomodo vero ista ex observationibus deduxerit et a quibus, non indicat. Hodie nodus ascendens Veneris est in $12\frac{1}{2}^{\circ}$ ♊, Mercurii in $13\frac{1}{2}^{\circ}$ ♊, oppositi in locis ex Sole praecise oppositis; limes igitur boreus illi quidem in $12\frac{1}{2}^{\circ}$ ♎, huc in $13\frac{1}{2}^{\circ}$ ♎, ex Soleeductis lineis.

Quantum igitur ad Venerem, congruit et illa cum ceteris, quod nodum habet sub fixis tardissimo motu retrogradum, sub ecliptica vero in consequentia euntem. At Mercurii nodi sunt hoc pacto etiam sub fixis in consequentia. Itaque jure suspecta est traditio Ptolemaei, quoad ipsissimum locum nodi in apsidibus, videturque observationibus per se crassis vim fecisse contemplatione apsidum et exempli Veneris et studio conclusae oppositionis, sic ut nodi Mercurii non in prima, sed in ultima medietate Librae fuerint Ptolemaei tempore. Nisi tamen hic nobis subveniat liber VII.

Quanta et qualis est eccentricorum horum inclinatio, et quantae latitudines? In Venere inclinatio est $3^{\circ} 22'$, in Mercurio $6^{\circ} 54'$, eaque semper constans et fixa, nisi si quid sera secula ob transpositionem eclipticae mutant. Itaque ex accessu et recessu Telluris latitudo Veneris sept. apparens, in Piscibus retrogradae, excurrit ad 9 fere gradus in Virgine, quanquam aliis saeculis non multo erit minor etiam in austrum.

Mercurii vero retrogradi maxima lat. australis ad 5° pervenit, minor adhuc inclinatione, borealis prope dimidium illius consistit. Ita rationes hi duo inclinationum cum rationibus latitudinum permutatas habent; Venus

latitudinem magnam habet, inclinationem parvam; Mercurius inclinationem habet magnam, latitudinem minorem.

Unde igitur est, quod Ptolemaeus epicyclum hunc a se dictum duplici nomine libratilem fecit, si fixa est inclinatio? Causa est in ignorato motu Telluris annuo. Nam ipse quidem eandem planetae orbitam est intuitus, quam et nos veluti intuemur, cujus limites cum porrigatur versus certos fixarum partes, constanter ab eclipticae plano declinantes, sit, Terra ipsam undique circumeunte, ut ipsa nunc boreum suum limitem porrigat Telluri, nunc nodos, nunc austrinum. At vero Ptolemaeus hunc nostrum circuitum Telluris transcripserat centro hujus a se dicti epicycli, quod scilicet Terra quiescat, epicyclus vero totus zodiacum annuatim emetiatur centro suo; et in hoc apicyclo punctum illud dixit perigaean, quod quovis tempore fuit porrectum versus Terram, quasi esset unum, cum re vera omnes ordine partes hujus a se dicti epicycli, nobis eccentrici, successive per accidens perigaean fiant. Ita factum est, ut Ptolemaeo hoc a se nominatum perigaean epicycli nunc in borea esset; nunc in ecliptica, nunc in austro.

In schemate Nr. 87. finge eccentrici veri Mercurii PMR limitem boreum esse in B constanter, nodum in K, limitem austrinum in P; circumeat Terra viam TXD. Si igitur Terra est in T, partes ipsi B vicinae reputabuntur perigaean, cum sint boreales. Si Terra transit in X, partes K circa nodum reputabuntur perigaean; denique si Terra in D venerit, partes ipsi P vicinae, cum sint australes, censentur perigaean. Qui ergo persuasus est, perigaean semper esse realiter idem, qui sc. Terrae motum annum in TXD nescit, is persuadebitur, perigaean epicycli sui PMR librari a borea in austrum et vicissim.

Et ecce argumentum pro motu Telluris annuo circa Solem evidentissimum, supra promissum libro V. fol. 366. Cum enim superiorum eccentrici fixas habeant inclinationes ad eclipticam, cur soli inferiorum eccentrici librátiles statucentur libratione duplici, cum per se omnis libratio orbitarum absurda sit, quia gignit tortuosum planetae iter pro circulari. Quantum igitur probabilitatis habet fixa inclinatio, tantum et motus Telluris inde nascitur; quantum vero absurditatis duplex libratio, tantum etiam labascit Telluris immobilitas.

Num etiam veteres observarunt, borealem Veneris latitudinem esse maximam, australem Mercurii? Omnino notavit hoc Ptolemaeus eoque tertium in hos planetas introduxit latitudinis elementum, quod appellavit inclinationem eccentrici a se dicti et ipsam quoque libratilem; contra superiorum trium etiamque Lunae exemplum, cujus effectus in Mercurio quidem solus et unicus hic fuit, ut Mercurii australes latitudines augetet. Quodsi epicyclos suos posuisset inaequaliter circumjectos esse circa punctum, respondens medio Solis loco, ut nos bodie, quos ille epicyclos dicit, eos eccentricos a Sole esse docemus, non opus habuisset illo tertio librationis apparatu. Mercurii enim limes australis est vicinior ejus aphelio P, qui quo longius a Sole exit quam borealis circa R, hoc propius Terram in D venit, cum planeta est retrogradus, quam limes boreus circa R prope Terram in T, planeta similiter retrogrado: hoc igitur et major apparet latitudo australis quam borealis.

Cur igitur etiam Veneris boreales latitudines majores sunt, cum ejus limes boreus sit in Virgine, vicinus perihelio? Causa hujus rei in Venere est a superiori diversissima; nimirum si latitudo penderet a sola inclinatione, minor borealis futura fuisset, quia Venus in limite boreo, scilicet in Virgine, minus exit a Sole versus Terram, quam in australi et in Piscibus, vicina ipsi aphelio.

Verum accedit jam eccentrica Telluris orbita: Tellus enim in Virgine, quando Sol et limes boreus Veneris apparent in Piscibus, minus a Sole distat, quam si Tellus sub Piscibus spectet Solem et litem Veneris australem in Virgine (vere existentem etiam sub Piscibus). Ita non tantum compensatur Veneris litem inaequalis a Sole distantia, sed etiam superatur, cum eccentricitas Telluris sit multo maior Venerea.

Sit A Sol et vergant AE Telluris et AG limitis austrini Veneris longae distan-

Fig. 88.



F videatur ex C in X, sed G ex B in η . Erunt igitur sic reliqua.

AB	100674.
AG	72787.
Index	182700.
	352716. Mesolog.
	169956. Mesolog.
	79° 38' 30"
	88 19. 0.
	8. 40. 30. GBA
	latitudo appa-
	rens in η .

AC	99268.
AF	72036.
Index	183800.
	352716. Mesolog.
	168826. Mesolog.
	79° 31' 0"
	Arcus auferendi
	88. 19. 0. Superior dimidius.
	8. 48. FCA latitudo apprens in X η

tiae in 13° X, contra AC Telluris et AF limitis borei Veneris breviores vergant in 13° η , ut sit eadem proportio EG ad DF, quas AG ad AF, et

Complementum anguli BAG vel CAF ad semicirculum Gr. 176: 38. dimidii Gr. 88. 19.

Num alius etiam in Venere usus est illius eccentrici libratis Ptolemaici? Sane perexiguus est excessus latitudinis Veneris borealis supra australem. Videtur itaque Ptolemaeus propterea exiguum aliquam inclinationem eccentrico Veneris, perpetuam quidem, conciliasse, ut ea re caveret, ne Venna unquam sub Solem incideret. Nam veteres hos duos supra Solem ponebant, argumento hoc nisi, quia nunquam sub Solem, ut Luna, incurrerent. Ptolemaeus respondit, quod non sub Solem incurrant, causam esse posse motum latitudinis. Quia igitur ipse hos infra Solis circulum collocavit, hoc etiam praecavere debuit, ne interponerentur Solem inter et Terram, quod obtinuit per dictam inclinationem libratilem.

Compara latitudines inferiorum cum inclinationibus. Venus non minus quam superiores latitudinem nunc minorem habet inclinatione, nunc ea maiorem, legibus etiam similibus, non tamen plane iisdem; minorem quidem a superiore conjunctione cum Sole usque dum arcus anomaliae commutationis a Sole, prorsum vel retrorsum numeratus, cum arcu elongationis a Sole, quae est illo die, semicirculum facit; maiorem vero inferius. Et in elongatione quidem maxima jam superat inclinationem latitudo idque usque ad inferiorem conjunctionem Veneris cum Sole, ubi maxima est haec superatio.

At in Mercurio, secus quam in ceteris, nunquam aequatur latitudo inclinationi, sed semper est minor. Mercurius enim, etiam cum est remotissimus a Sole, semper illi propior est quam Telluri.

LIBRI SEXTI

PARS QUARTA.

DE LUNA.

Quae est dispositio, quae proportio orbis Lunae ad orbis ceteros, et quae ratio motus est? Coelum Lunae, si concipias animo solidos orbis, insertum est orbi magno instar stellae seu potius epicycli alicujus tenetque corpus Telluris in sui mediotulio, et circumfertur uno communi motu cum Tellure circa Solem, locum ex loco mutans. Vide schema Nro. 72. et exemplum indubitatum in Jovialibus. Ipsa vero Luna Tellurem iuterim circumit spatio menstruo, orbitam designans eccentricam a Terrae centro, idque super piano, quod per centrum Terrae usque sub zodiacum fugitur eductum esse, sic ut illud sit affixum lineae per centrum Terrae et per aliquod punctum zodiaci tractae. Distantia Lunae a Tellure longissima pars est 59. de distantia Solis ab eadem Tellure longissima, continetque totidem, sc. 59 semidiametros globi Telluris. Vide libro IV. a fol. 327. in 328. Globi Lunae diameter apparens est pars 720. de illo circulo, in quo circumit Luna circa Tellurem, aequatque visionis angulo diametrum corporis Solis, longissime a Terra distantia. Haec supra libro IV. a fol. 325. sunt stabilita, et consentiunt iis observationes. Vide Astronomiae partem Opticam Cap. XI. (II. 340 ss.)

Quomodo quove numero respondent inaequalitates Lunae ceterorum inaequalitatibus? Cum planetae primarii duabus inter se permixtis inaequalitatibus incedere videantur, quarum prior est in ipsis singulis propria et realis, secunda communiter omnibus quinque extrinsecus ex conditionibus visus, hoc est propter orbem magnum, accidit: in Luna vicissim prior illa et realis motuum inaequalitas non una, sed tergemina est, secunda vero et accidentaria seu apparens ei est nulla. Etsi enim cum orbis magni circuito, qui planetis quinque sit causa inaequalitatis secundae, totum etiam coelum Lunae communicat, ut dictum est, at vehuntur una coelum hoc Lunae et Tellus, oculorum domicilium: itaque nihil diversitatis ex hoc motu, licet verissimo, in observationes Lunae redundat; semper illa cernitur incedere directe, nunquam comistere, nunquam retro abire, ut explicatum est hujus libri VI. parte II, eoque hic Lunae motus (astronomiae Lunaris causa) pro mera quiete reputatur. Compensant tamen hunc defectum accidentariae inaequalitatis primum triplix jam dicta inaequalitatis verae, secundo temporis aequatio, explicata in doctrina

sphaerica folio 251. 252. et libri hujus VI. parte prima; tertio parallaxis diurna (de qua in doctrina de eclipsibus agitur), quae etiam visus est accidens. Haec enim cum in ceteris planetis ob intervalla immensa sentiri non possit, in Luna jam, ut vicina, facile est censibilis.

De inaequalitate Lunae soluta. ⁷⁸⁾

Quibus inter se nominibus et quo rerum discrimine distinguuntur tres dictae reales Lunae inaequalitates? Ratione primae illarum similis est motus Lunae motibus primariorum, explicatis libro V, ratione secundae et tertiae dissimilis. Prima sui quodammodo juris est, suam propriam observans periodum, reliquae duae sunt alligatae ad configurationem trium corporum, Solis, Lunae et Terrae, seu ad congressus apparentes Solis et Lunae. Prima igitur periodica, reliquae synodicae; prima soluta, hae menstruae, hoc est ad mensium phases alligatae dici possunt.

Quibus occasionibus motus Lunae in longum tripliciter inaequalis est effectus? Luna duabus vehitur virtutibus circa Terram, 1) specie, quo emanat e corpore Telluris in rotatione constituto, 2) vi luminis Solaris, ut libro IV. fol. 359. disputatum; quarum causarum posterior etsi degenerat in conditiones prioris, cum sit nihil aliud, quam illius fortificatio, ut est fol. 360, 365, distinguitur tamen ejus effectus expressa quantitate a priori: quoties enim Luna quartam orbitae partem a copula seu 90° absolvit, toties disperdendi sunt hi 90° longitudinis inter dictas duas causas moventes, et Telluri quidem $87^\circ 51'$, lumini vero Solis residui $2^\circ 9'$ sunt accepti ferendi, ut infra in explicatione variationis audiemus. Sed Telluris quidem species, quantum in se, vim suam exerit aequaliter, luminis vero effectus ob causas fol. 364. dictas dispensatur inaequaliter. Haec igitur una est inaequalitas, ex ipsa causa movente in longum, quae infra tractabitur ultimo loco diciturque variatio. Supervenit jam utrique causae moventi eccentricitas Lunae, faciens utriusque causae motricis effectus ex se ipsa etiam inaequales. Et ecce tres inaequalitates, quae ex hoc loco jam suo quaelibet ordine explicabuntur.

Quomodo potuerunt inter se discerni observando tot inaequalitates reales earumque circuitiones? Inaequalitates menstruae sunt alligatae ad Solem ejusque oppositum vel loca quadrata, sic ut ab his punctis incipiant et in haec terminentur; facile igitur possunt astronomi solutae inaequalitati insidiari, cum est solitaria, in ipsis articulis conjunctionum, oppositionum et quadraturarum. Soluta vero inaequalitate jam explorata, computatur locus Lunae secundum eam ad quodvis momentum mensis intermedium et comparatur cum observato; sic ex differentia utriusque patescit quantitas etiam menstruarum.

Quomodo soluta inaequalitas animadverti potest etiam in conjunctione Lunae cum Sole, cum Luna tunc lateat sub radiis Solis? Etsi plerumque Luna sub Sole latet, at cum Solem tegit, tunc vel maxime et aptissime cernitur, in ipso scilicet disco corporis solaris.

Qua in re convenit soluta inaequalitas motus Lunae cum primariorum planetarum inaequalitate prima dicta, et qua in re discrepat? 1. Idem tractus, zodiacal scilicet in sphaera fixarum, superiminetur tam orbitae Lunae quam ceteris sex orbitis primariorum planetarum. 2. Sicut primarii et Tellus ipsa circumeunt corpus Solis orbitis a Sole eccentricis et celeritate accommodata ad intervalla Solis variabilia, sic Luna privatim suo proprio motu circumit Terrae globum, orbita a Terra eccentrica et celeritate accommodata ad intervalla Lunae et Terrae variabilia.

Quibus circulis opus est ad docendam inaequalitatem Lunae solutam? Unica eccentrica orbita, figurae quam proxime circularis, hoc est ellipticae, ad ellipticae planum inclinata super lineam, quae per centrum Terrae transit, quilibet orbitis usi sunt etiam planetae primarii.

Quomodo describendae sunt secundum Copernicum lineae apsidum, limitum, nodorum motusque Lunae et loca singulorum ipsa? Copernicus non statuit sensibilem distantiam centri Terrae et centri zodiaci, collatam ad immensam fixarum altitudinem, ideo lineae hae simpliciter intelliguntur educi ex centro Terrae per puncta apsidum, limitis, nodi, vel puncta quaecunque in orbita Lunae usque sub fixas, ibique signare loca dictorum punctorum vel Lunae. At quia in instrumentis manuariis theoriarum exprimi nequit immensitas illa zodiaci, definiendae igitur sunt istae lineae (non minus in Luna, quam parte hujus libri VI. secunda in planetis ceteris) sic technice, quod ducantur ex centro solaris corporis, ut centro fixarum, et incedant parallelae lineis jam descriptis. Hac enim parallelitate fit, ut quavis elliptica seu zodiacus in theoria manuarum non fiat multo major, quam orbis Saturni, nihilominus hae lineae ex Sole ductae coincident cum prius definitis in eadem loca zodiaci.

Quanta est periodus temporis, intra quod Luna solutam inaequalitatem orbitae suae conficit et absolvit? Centrum corporis Lunae fertur circa centrum corporis Telluris motu per partes re vera inaequali in consequentia signorum, digressumque a linea apsidum revertitur ad eandem circuitu peracto diebus 27 horis 13. 18' 35" spatio medio: nam si vera momenta respiciamus, quibus Luna incedit in apsidam, tempus hoc propter inaequalitates menstruas non plane invariatur permanet in omnibus periodis.

Diurnus ergo mediocris anomaliae solutae seu periodicae motus est $13^{\circ} 3' 54''$, horarius $32' 40''$, numeraturque vel in circulo aequante, ac si is ex F (Fig. 77) esset descriptus, vel magis proprie in segmentis PAH, PAE plani PRE, quod ab orbita PHER eingitur, ut explicatum est libro V.

Quanta est eccentricitas hujus orbitae, quanta aequatio maxima, quanta varietas horariorum? Lunae eccentricitas AB est 4362, qualium BP semidiameter est 100000, quare latitudo ED lunulae ellipticae ad normam ceterorum est particularum 190. Igitur aequatio maxima, composita (ut libro V. declaratum) ex duobus suis elementis, physico areae EBA (vel aequipollente DBA) et optico anguli BEA, est $5^{\circ} 0'$, tanta scilicet est tunc, cum quadraturae sunt in apsidibus, ut vixissimae aequatio maxima fiat in copulis. Hinc igitur horarius efficitur, minimus quidem $29' 58''$, maximus vero $35' 42''$, siquidem haec inaequalitas sola esset usquam in ullo die lunationis, Luna simul existente vel remotissima vel proxima Terrae.

Num igitur inconstans est haec magnitudo diurnorum, maximi et minimi? In copulis fere in universum major et auctior seu celerior est, in quadris minor vel tardior, in octavis partibus mensis turbatur etiam quantitas aequatione menstrua, ut posterius docebitur.

Quae sequitur inaequalitas partium periodi ex hac simplici aequatione? Coniunctio et oppositio inter se proximae, cum utraque est elliptica, animadvertuntur inaequaliter inter se distare; possunt enim interesse dies ultra $15\frac{1}{2}$, possunt etiam non plus 14.

Quod nomen est apsidibus eccentrici Lunae summas P et imae R? Quod in primariis, qui circa Solem vehuntur, aphellum et perihellum diximus, id in Luna, quae circa Terram gyratur, apogaeum et perigaeum est dicendum.

Quomodo movetur apogaeum hujus orbitae Lunae eccentricae et quanta ejus est periodus temporis? Movetur in signorum consequentia motu aequabili restituiturque ad idem punctum longitudinis zodiaci in annis Aegyptiis 8 diebus 311 horis 6. Hoc motu B, centrum eccentrici Lunae, super plano orbitae Lunae (si id cogitemus affixum ad lineam ex centro Terrae in aliquam fixarum ductam) describit curvam longitudinis circellum BERY (Fig. 89), concentricum circa centrum Telluris A. Diurnus apogaei sub zodiaco est 6' 41", horarius 12".

Quomodo se habent latitudines punctorum hujus orbitae ad inclinationes? Cum in Luna non habeat locum parallaxis orbis, quae accedit primariis, iidem igitur sunt anguli ad eentrum Terrae inclinationis punctorum eccentrici, qui sunt et anguli latitudinis apparentis Lunae in his punctis constitutae. In Luna igitur vox inclinationis tantummodo de limitibus, nunquam de punctis intermediis usurpatur.

Quanta est haec seu inclinatio eccentricae orbitae, seu latitudo maxima Lunae, in ejus limitibus constitutae? Tanta est inclinatio maxima limitum, quanta et aequatio maxima, ex optica et physica partibus composita, periodicae seu solutae inaequalitatis modo praemissae, scilicet 5 graduum; id vero tunc solummodo, cum et limes et longitudo media in copulis consistunt. Nam extra copulas utraque fit major, tam latitudo limitis maxima, quam aequatio maxima; sed tunc quaeque sua quantitate, ut sic extra copulas consideratae non amplius inter se mancant aequales.

Si non semper est eadem latitudo seu inclinatio limitum ad planum eclipticae, annon tortuosus fiet circulus superstans orbitae Lunae sub fixis? Toto illo mense, in quo limites manent in copulis (in quantum quidem manent), omnes Lunae latitudines ordinantur sub eundem proxime circulum maximum: ut sic angulus, quo planum orbitae ad planum eclipticae inclinatur, toto illo mense maneat quam proxime constans. At cum digressu limitum e copulis augetur hic angulus inclinationis, et tunc latitudines Lunae per aliquem mensem totum minus minusque quadrant sub unum circulum sphaerae maximum, donec limites appropinquent quadris. Tunc si limites in ipsis quadris et sic nodi in copulis fuerint, orbita Lunae rursus proxime quadrat sub circulum maximum, sed inclinatiorem. Ita libratio haec tarda et semestralis efficitur, de qua infra; in uno vero menstruo circuitu Lunae prope non sentitur.

Quomodo peculiariter appellantur Lunae nodi limitesque? Nomina his Ptolemaeus eadem fecit in Luna, quae in planetis ceteris primariis. Arabes vero *anḍaḡḡon* Lunae, ascendentem quidem seu *arabḡaḡḡra* caput draconis appellant, descendentem seu *karabḡaḡḡra* caudam, limitem vero ventrem draconis; videntur dicere voluisse serpentis, propter speciem seu figuram spatii in superficie sphaerae fixarum, intercepti inter eclipticam et circulum orbitae Lunari superstantem; hoc enim spatium incipit ab acumine, velut a rostro serpentis nec latius fit in medio quam 5°, cum sit longum 180°, desinitque in aliud acumen, veluti in caudam serpentis. Inspice schema libro IV. N. 71. sed finge id esse in superficie sphaerica.

Quomodo siti sunt nodi in Luna? Sicut in planetis ceteris primariis siti sunt nodi ambo cum centro Solis in eadem linea recta, sic iidem in Lunae theoria cum centro Terrae in eandem rectam competunt.

Qualis et quantus est motus nodorum vel limitum? Moventur lineae nodorum sub ecliptica, vel limitum sub eclipticae parallelis in signorum ante-

cedentia restituanturque ad punctum Idem longitudinis zodiaci in annis Aegyptiis 18 d. 228 h. 3. 50'; in totidem fere annis, quot gradus in singulis annis nodus conficit, quia 19 in 19 efficiunt 361. Diurnus igitur medioeris est 3' 10" 38''' sub ecliptica retrorsum numerandus. Hic motus aequalibus temporum interstitiis venit in copulas et quadras, at locis inter copulas et quadras intermediis miscetur ei motus alius, per quam mixturam ille sit inaequalis, de quo infra.

Quid est argumentum vel anomalia motus latitudinis Lunae et quanta ejus periodus? Anomalia haec est arcus eclipticae, interceptus inter locum nodi ascendentis (vel limitis etiam borei locum, Copernico) et inter centri corporis Lunae verum locum eccentricum, ad eclipticam reductum. Completur diebus 27 horis 5. 5' 36''. Diurnus igitur medioeris motus anomaliae latitudinis est 13° 13', horarius 33' 3''.

Cur isti motus, eccentricitas et inclinationes ita seorsim traduntur, cum his misceantur alii motus, quorum circuitus est menstruus? Quia prope modum sufficiunt ista ad doctrinam de mensibus deque eclipsibus, luminarium revolutionis accidente praecipuo et valde conspicuo, de quo infra parte V.

Quotuplicem agnoscunt astronomi mensem? Duplicem, periodicum et synodicum; illa vox circuitum significat, puta sub-fixis vel zodiaco, haec coitum seu congressum, puta cum Sole.

Quid est mensis periodicus et quod aliud illi nomen? Est spatium temporis, quo linea motus Lunae ab eodem circulo latitudinis, immobiliter ad certum eclipticae punctum affixo, digressa, reditu peracto revertitur ad eundem. Dici potest mensis medicorum criticus. Est enim dierum 27 h. 7. 43' 5'' 8''' mensura aequali, paulo brevior periodo anomaliae solutae. Diurnus est 13° 10' 35'', horarius medius 32' 56'' 30'''. Sed per anomaliā solutam solitariam tardissimus est 30' 15'', velocissimus 36' 0''.

Quod nomen est his horariis et quis usus? Appellantur in tabulis e re ipsa ficti, et utimur his, cum vero horario Solis comparatis, ad indaganda momenta copularum et quadrarum compendiose.

Quid est mensis synodicus et quantus? Est spatium temporis, intra quod linea motus Lunae a circulo latitudinis, in quo linea motus Solis (vel ejus puncti oppositi), digressa, circuitu peracto revertitur ad eundem. Dicitur etiam lunatio, quia intra hoc tempus Lunae orbis et impletur successive immine, et vicissim evacuat. Periodus una medioeris absolvitur diebus 29 horis 12. 44' 3'' 11''', separatur Luna a Sole dextra angulo 12° 11' 27'', in hora 30' 26'' 37½''' ratione media. Itaque in anno existunt lunationes 12 et ultra 132° 45' de tredecima.

Quid facit inaequales menses synodicos et quantum? Inaequalitas motus utriusque sideris, tam Solis quam Lunae. Nam causa Solis aetate, cum est tardus ejus motus circa suum apogaeum, menses proveniunt breviores, quia Luna Solem citius assequitur; hieme circa Solis perigaeum menses sunt longiores, quia tardius Luna Solem velocem assequitur. Rursum causa Lunae, tarda cum sit in apogaeo suo, velox in perigaeo, tardius igitur illic quam hic ceteris paribus conficit residuum illud, quod illi superest ad Solem supra confectum reditum anomalicum. Compositis igitur in novum causis, cum Sol est perigaeus, Luna apogaea, mensis est fere 30 solidorum dierum, deficient enim horae tantum 4. 23'. Vicissim cum Sol apogaeus, Luna perigaea, mensis habet dies tantum 29 horas 6. 42'. Quodsi a quadra numeremus ad quadram, major esse poterit mensium inaequalitas. Apogaea vero lumi-

maria faciunt mensem d. 29 h. 15. 7' longum, perigaea d. 29 h. 10. 24' longum.

De inaequalitatibus mensuris.⁷⁹⁾

Quibus nominibus distinguas duas residuas menstruas inaequalitates? Prior dicatur temporanea, posterior perpetua. Prior enim non ideo menstrua dicitur, quod singulis mensibus redet, sed ideo, quia nonnisi causa illuminationis, quae mensem facit, oritur; non manet igitur ejusdem quantitatis in omnibus lunationibus, sed paulatim in sequentibus mensibus evanescit; altera quantitatem obtinet eandem, per omnes lunationes cōstans, et sic dupliet nomine menstrua dicitur, et quia est ab illuminatione, quae mensem facit, et quia singulis mensibus redit eadem.

Quo ordine sunt tradendae? Etsi, ut libro IV. fol. 364. disputavimus, perpetua natura prior est et cognata motui Lunae medio et causa temporaneae, eaque de re causas ejus naturales priori loco explicavimus a fol. 364. in fol. 368. causas verò temporaneae posterius, a folio 388 in 393. tamen jam in praxi astronomica incipiendum est a temporanea, quia haec, in quantum quidem habet quolibet mense dimensionem suam certam, simillima est anomalias solutae attinetque, ut illa, tam longitudinem quam latitudinem. At perpetua est generis alterius et solam longitudinem variat; itaque etiam calculus Brabeii ultimam addibet.

Quomodo dividitur mensis synodicus propter inaequalitates menstruas? Dividitur in duos semisses, unum Lunae crescentis, GKC (Fig. 66), alterum senescentis CFG, quorum media tenent quadrae IK, EF, fines copulae CD, GH. Amplius quadrantes hos quatuor aliae phases L, M, N, O biseccant, Brabeus octantes dixit, quod mensis hic in octo partes dividatur.

Numquid hoc loco mensis vel lunationis vocabulum induit aliquam technicam significationem, et quae illa? Omnino: nam etsi apsides et nodi emigrant et copulae et quadrantis motu continuo, sic ut nulla pars mensis alii parti similis sit in dispositione apogaei vel nodi ad phases, fingimus tamen, dispositionem hanc toto mense manere talem, qualis invenitur ad momentum illud, ad quod Lunae loci est dispendiendus.

Quid igitur appellas octantes, quid quadras et quid copulas? Generaliter et technice quovis proposito momento locove Lunae sunt puncta illa orbitae, in quibus si tunc esset Luna, Soli vel octili vel quadrato vel triocilli aspectu configuraretur, vel copularetur eidem ex eadem vel opposita plaga.

Ut in schemate 89, in quo A Terra, B centrum eccentrici D, si Sol sit in linea AH at Luna in D vel N vel in quovis alio puncto orbitae, tunc illa vice puncta II et G vicem gerunt copularum, I et K vicem quadrarum, L vicem octantis.

Specialiter et rarius ipsa loca verarum phasium Lunae, quarum unaquaque sua apparet momento, his nominibus veniunt: Nam Luna in copula a Sole remotiori apparet plena, in octantibus illi proximis gibba, in quadris bifida, in octantibus Soli propioribus falcata seu cornuta, graeco *μνησίδης*; in copula ceteriori exstinguitur. Tunc vero nonnisi abusive quadrantes, octantes vel semicirculi dici possunt arcus interjecti, quippe in ecliptica paulo minores sunt eue hisce nominibus, in orbita vero eccentrica Lunae majores parte circiter duodecima, ut ex sequentibus patebit.

De inaequalitate temporanea.

Quo in situ Lunae patet inaequalitas temporanea et cujusmodi facit

apparentias quoque ordine? In omni quidem situ extra copulas, praecipue tamen in quadris patescit inque octantibus. Nam cum apogaeum vel nodus est in quadris, aequationes vel latitudines proveniunt simplices toto mense, ut in soluta inaequalitate dictum. Posset hic mensis respectu hoc menstruae vel aequationis vel latitudinis dici vacuum. Proximo mense, cum Solis quadratura deseruit apogaeum vel nodum Lunae, sic ut illa puncta jam sint versus octantem, jam proveniunt aequationes vel latitudines aliquantulae etiam menstruae, et hoc nihilominus, etiamsi Luna fuerit in ipso suo apogaeo motu aequabili vel in ipso nodo, ubi legibus solutae carere debnerat omni aequatione vel latitudine. Rursum succedentibus mensibus inaequalitates hae proveniunt majores, usque dum copulae fuerint assecutae apogaeum vel nodum; in tali mense contingunt aequationes vel latitudines menstruae maximae associantque sese illis ex soluta inaequalitate, sic ut utraque iisdem momentis fiant maximae: itaque toto quasi mense aequatio vel latitudo ex utraque parte cumulata provenit regularis legibusque usitatis. Posset hic dici mensis plenus, et hoc duplici nomine, si coinciderent in mensem unum affectiones istae tam longitudinis quam latitudinis. Sequentibus mensibus haec inaequalitas menstrua rursus iisdem gradibus decrescit, donec penitus extinguatur, ex quo tempore oritur per contrarias Solis configurationes nova. Et in contrariis quidem quadris vel copulis affectiones etiam aequationum vel latitudinum sunt contrariae. Nam si semissis Lunae senescentis longitudinem median anómaliæ solutae interceperit illam, cujus est aequatio subtractoria, vel limitem illum, qui Lunam in boream longissime sustollit, tunc etiam menstruae aequationes per totum illum semissem senescentis sunt subtractoriae, vel tunc latitudines menstruae per totum illum semissem sunt boreae, etiam in illis semicirculi punctis, in quibus aequatio solutae est adjectoria, vel latitudo solutae australis, obtinetque oppositum in semicirculo crescentis. Post aliquot vero menses, ubi solutae longitudo media prior vel limes boreus emigraverint e senescentis semisse coeperitque alter crescentis hae solutae puncta vel utraque vel alterum solum sibi vindicare, subtractoria etiam affectio vel borealitas utraque vel altera transit in hunc alterum semissem, in ejus scilicet totius omnes aequationes vel latitudines, menstruas dietas; affectiones contrariae, adjectoria vel borealitas, in priorem. Haec sic copulate sub unum conspectum posita jam porro evolventur distinctius.

Quo circularum indigemus apparatu ad hanc inaequalitatem menstruam temporaneam demonstrandam oculisque subjiciendam? Etsi nec eccentricitate utendum est nova reali, veluti in eccentro eccentrici, ut cautum libro IV. folio 389, nec omnino nevis circulis, praeter illos, quibus uti sumus in solutae demonstratione inque primariis etiam planetis omnibus, vere tamen et realiter Luna dupliciter acceleratur vel retardatur in illa sua orbita una et eadem; quare etiam duos oportet fontes motus Lunae concipere, a quibus Luna in superioribus orbitae semicirculis, qui copulam apogaeam habent, excurrat longius, in inferioribus brevius, et illorum fontium respectu duplicem etiam eccentricitatem unius et ejusdem centri orbitae Lunae unice, duplex apogaeum, duas lineas apsidum et per consequens duo etiam triacula aequatoria, in quorum arcibus insint mensurae retardationum et accelerationum. Sic etiam causa latitudinis Luna vere dupliciter excurrit ad latera eclipticae, quare eam et eandem orbitam Lunae oportet concipere esse librilem ad planum eclipticae, hoc est inclinationem planorum, quae simplex fuit in soluta obtinet-

que talis in omnibus copulis, oportet concipere variabilem extra copulas, eoque duplices limites nodosque.

Quae est igitur haec altera et menstrua linea apsidum, linea nodorum, quod apogaeum, quis nodus ascendens menstruus, cuius denique generis eorum motus? In primariis quidem planetis, ut et in solutis Lunae anomaliis linea apsidum et linea nodorum separabantur ab invicem motibus contrariis per totos successive quadrantes; at hic, in mensuris Lunae anomaliis, linea apsidum menstruarum et linea nodorum menstruorum perpetuo coincidunt in sectionem plani orbitae Lunae eum piano per centra Solis et Terrae, ad eclipticam planum recto. Apogaeum enim est perpetuo apud unam vel alteram copularum, nodus ascendens alternis vel in eadem copula vel in opposita, nec exeunt inde, motu circulari transeuntia in copulas oppositas, sed in sua quodque copula et oritur et emoritur denuoque, post obitum in una, resurgit in altera. Excitatur autem vel exstinguitur utrumque per solutae apsidum et nodorum emigrationes circulares ex uno semicirculo menstruo in alium, ex crescentis sellect Lunae in senescentis semicirculum, quae emigratio fit in signorum antecedentia, pbasibus Lunae, propter motum communem Terrae et coelo Lunae, transpositis in consequentia; ut, verbi causa, plenilunio in schemate 72. ex B in C transposito, qua transpositione destituuntur (sen derelinquuntur, *involantur*) apogaeum Lunae tardissimum et nodus Lunae, insuper etiam retrogradus: ut sic utriusque loca speciem praebant retrocedentium a pbasibus in antecedentia, qui apparet retrocessus intra unum circiter annum evoluit totum circulum lunationum. Haec hic generaliter indicata in sequentibus explicabuntur clarius per signa geometrica.

Cum igitur ipsa linea copularum fungatur officio tam lineae apsidum, quam lineae nodorum, utriusque menstruae, fit ut ne nominibus quidem semper utamur apogaei menstrui vel nodi menstrui, ut tanto minus sit confusio.

Gerit autem illa copula vicem apogaei menstrui, cui apogaeum solutae propinquat intra quadrantem eclipticae ante vel retro. Ut quia in schemate 89. D apogaeum solutae, HAG linea copularum, HAD minor recto, DAG major recto, ergo copula H, quae est ipsi D apogaeo vicinior, vicem gerit apogaei, G perigaei menstrui. Sic illa copula vicem praebet ascendentis nodi, a qua nodus ascendens solutae minus quadrante distat ante vel retro.

Quo ordine pervenitur ad notitiam aequationis vel latitudinis menstruae et quorum terminorum usu? Summa processus et catalogus terminorum est iste: principio per distantiam Solis ab apogaeo Lunae quaeritur argumentum menstruum et longitudinis scrupula proportionalia cum particula exsorte. Sic cum distantia Solis a nodo evehente quaerantur scrupula latitudinis. Deinde per argumentum menstruum longitudinis vel latitudinis excerpta est illic aequatio, hic latitudo menstrua, tanquam ex mense pleno. Haec vel aequatio vel latitudo, multiplicatae in scrupula sua, dant portiones competentes, latitudinis quidem absolutam, aequationis vero insuper fermentandam particula exsorte, ut fiat justa aequatio menstrua. Horum terminorum definitiones et usus jam porro seorsim singuli tradentur dilucidius.

Quomodo numerantur illae distantiae Solis ab apogaeo vel nodo Lunae? Numerantur in ecliptica, vel etiam in quolibet circulo ex centro Terrae descripto; sunt enim arcus vel eclipticae vel talis circuli, incipientes a linea locove apogaei vel nodi evehenti, et tendunt in consequentia terminanturque in locum Solis verum, vel lineam loci Solis veri. Et quia in schematibus ecliptica commode non potest exprimi, sufficit loco arcuum ostendere angulos

ad Terram, vel complementa angulorum ad quatuor rectos, quos angulos arcus illi metiuntur.

Igitur in adjecto schemate, in quo DBF linea apsidum, D apogaei, F perigaei, HAG linea veri loci Solis ejunctio oppositi, angulus DAG est complementum ad 4 rectos distantiae Solis, per AG lineam notatae, ab apogaeo Lunae D, per AD lineam intellecto. Ita etiam est, si D esset nodus crebrens.

Potest etiam distantia Solis ab apogaeo Lunae numerari in circulo eccentrico Lunae: et tunc sic determinabitur, quod incipiat ab apogaei puncto, numeretur in consequentia et terminetur in rectam, quae ex centro eccentrici parallela lineae veri motus Solis ducitur in plagam eandem, qua Sol stat.

Ut hic, Sole in AG linea versante,
si ei ex B ducatur parallela BQ. tunc
DNQ erit distantia Solis ab apogæo Lunæ.

Doce invenire punctum aequatorium (et una fontem motus) menstruum, ejusque eccentricitatem. A centro orbitae Lunae B in lineam copularum HAG perpendicularis educatur BC, secans lineam copularum AH in C. Ducatur ctiam per A ipsi CB parallelus IAK, secans ipsas HG parallelum per B in puncto Z. Sunt igitur duo fontes motus Lunae punctum A et lineae IAK per circulum illuminationis Terrae. Dnae etiam hac vice eccentricitates centri B, scilicet AB et ZB, illa ordinaria solitae et perpetuae, ZB vero tantummodo in mense vel momento praesenti, per reliquos menses variabilis, eique aequalis AC est eccentricitas menstrua temporanea (potius momentanea) puncti aequatorii mensuris C.

Si centrum orbitae B est in E, in ipsa scilicet linea copularum, tunc illo mense technico punctum E duorum punctorum B et C vicem praestat, et AE bis adhibetur ad accelerandum vel retardandum motum.

Sin perpendicularis BC incidit in ipsum centrum Terrae A, tunc illo (technico) mense nulla est eccentricitas mensurum temporanea, nisi in quantum perpendicularis illa non toto mense naturali in A incidit, cum hoc sit momentaneum. Distet apogaeum Lunae D a Sole opposito H 36° 0'. Antilogarithmus 21193
Eccentricitas AB 4362, considerata ut numerus 43620. Logarithmus 82965

Somma 104t58.

opacita ut logarithmus, ostendit AC eccentricitatem puncti C 3529. ^{no}

Quid sunt scrupula menstrua longitudinis? Sunt nihil aliud, quam valor arcae trianguli aequatorii menstrual super eccentricitate menstrua centri eccentricitatis in quolibet mense technico maximi, in numeris quallum omnium maximum scilicet in mense pleuo est 60'.

In schemate continuata BC in puncta orbitae O, N, et ipsi CA parallela et aequalis BZ desinens, et punctis N, O cum Z connexis, valor areae ZBN vel ZBO dat scrupula longitudinis, quae valent, quotiescunque occurrit in aliquo mense dispositio ista punctorum A, C, B vel angulus iste DAH inter lineam apsidum AD et lineam loci Solis AH, quocunque in puncto suae orbitae Luna inveniamur.

Docet hoc triangulum et ex eo scrupula menstrua computare. Computandi ratio manet eadem, quae fuit libro V. partis de aequatione maxima

physicae, nisi quod area producta convertitur in scrupula, qualium in mense pleno ipsa facit 60'.

Ut si centri B eccentricitas BZ menstrua sit 3529, hujus dimidium $1764\frac{1}{2}$ ductum in semidiametrum BO creat aream BZO 176450000. In mense vero pleno, cum B est in E et menstrua eccentricitas AE 4362, fit area isthac 218100000. Si ergo 218100000 valet scrupula 60', area praesens 176450000 valebit $48' 33''$ scrupula menstrua pro hoc mense technico.

Notandum hic, si accuratissime insistamus figurae ipsius orbitae, considerantes, illum ad exemplum ceterorum planetarum esse ellipticam, tunc semidiametros BO, BN paulo esse breviores semidiametris BD, BP, idque tanto magis, quanto rectior est DBO, circa longitudines medias. Nec desunt fundamenta computandi has abbreviatas semidiametros ex libro V. sive geometricae schemate, sive compendioso et prope verum ex regula ibi tradita. At cum tanta subtilitate non sit opus, praestat eam omittere; quam captum novatae aequationum formae adhuc difficiliorem reddere. Maxima quidem omnium curvatio seu latitudo lunulae in totalem eccentricitatem ducta inque denominationem astronomicam conversa, non efficit 7 secunda, quae ducta in $2^{\circ} 30'$, aequationem maximam menstruam, efficit $17''$ nihil ultra. Hoc fit tunc, quando B in E incidit. At quo longius B ab E discedit, hoc minor semper est hic errorculus, duplici nomine, et quia curvatio minor et quia eccentricitas menstrua minor.

Quid est argumentum longitudinis menstruum? Est arcus eccentrici Lunae, inceptus a parallela linea apogaei menstrui (hoc est vel loci Solis vel ejus oppositi) in eandem partes educta et numeratus in consequentia usque ad lineam loci Lunae primo aequati, seu aequatione solitaria solutae affecti.

Quomodo invenitur argumentum menstruum? Distantia apogaei menstrui (hoc est vel loci Solis vel ejus oppositi) ab apogaeo Lunae normaliae solutae subtrahenda est ab anomalia eccentrici, adjecto ei circulo integro si opus est; sic remanet argumentum menstruum.

In schemate 88. sit AH linea loci Solis, AD linea apogaei solutae, HAD minor recto, eoque AH linea apogaei menstrui, eique parallela BP in eandem partes HP, et HAD distantia Solis ut apogaei menstrui ab apogaeo Lunae. Sit etiam AL linea motus Lunae primo aequati, et DL vel DBL anomalia eccentrici. Aufer HAD, hoc est PBD ab LBD, restabit LBP, argumentum menstruum. Sit AM linea motus Lunae, DBM anomalia eccentrici, erit PBM argumentum menstruum.

Qua re repraesentantur et mensurantur aequationes Lunae menstruae, competentes locis Lunae propositis? Areis triangulorum super basi; eccentricitate puncti menstrui, stantium, vertice in puncto orbitae Lunae proposito. Rediguntur autem areae, istae hae vice in gradus et minuta, qualium area totius orbitae valet gr. 360.

Ut quia C est punctum menstruum, CA ejus eccentricitas a Terrae centro A; si ergo fuerit in aliquo momento talis dispositio, Luna versante in L; tunc area trianguli CLA metitur aequationem menstruam. Quodsi alio tempore reversa fuerit eadem dispositio, idem scilicet mensis technicus, Luna tunc in M versante, rursum area CAM prodit mensuram aequationis menstruae.

Quomodo computatur area trianguli, cujus basis est eccentricitas CA puncti C menstrui? Quodlibet horum triangulorum habet socium, cujus vertex idem, basis vero BZ eccentricitas menstrua centri eccentrici B, differentia inter utrumque est particula exsors. Prius igitur sunt computanda triangula haec socia et particula exsors, tunc addita haec illis constituit areas triangu-

lorum aequatoriorum in semicirculo menstruo illo, qui habet apogaeum solutae; ablata vero exsors particula a triangulis sociis, relinquit quantitatem areae triangulorum aequatoriorum in altero semicirculo menstruo stantium, qui scilicet perigaeum interceptit. Ubi semicirculi determinandi sunt per parallelam lineae copularum, per centrum eccentrici ductam.

Ut si sit inquirenda quantitas areae CLA in semicirculo PLQ, qui F perigaeum interceptit, prius igitur computandum est soeium triangulum BLZ, quod majus est quam CLA particula exsorte, sic ut hac particula ablata ab area BLZ relinquatur area CLA. Vicissim si sit inquirenda quantitas areae CMA in semicirculo QMP, qui habet D apogaeum, prius quaeritur BMZ eique additur particula exsors; ita conficitur quantitas areae CMA.

Doce ergo computare aream trianguli cujusque, stantis super eccentricitate menstrua centri eccentrici. Geometrica methodus est eadem, qua libro V. docti sumus computare partem aequationis physicam. Nam sinus argumenti menstrui ducitur in valorem areae trianguli, quovis mense proposito maximi, redactum in secunda graduum, et abjectis cyphris, relinquatur valor areae trianguli, de quo quaeritur.

Quomodo vero computandum sit maximum quovis mense technico triangulum, jam praemisimus.

Ut si scire velimus aream trianguli BLZ, quod sociatur triangulo CLA, tunc maximi hoc mense trianguli BNZ area ducitur in TL, sinus argumenti PL, et facta per totum BN diviso, prodit area BLZ. Logistice sumitur valor areae BLZ ex mense pleuo, perinde ac si basis BZ aequaret EA; hic valor multiplicatur in scrupula menstrua, proditque valor verus areae BLZ; ita res eodem redit.

Hic tamen compendium est observandum. Nam quia maxima aequatio menstrua non superat $2^{\circ} 30'$, tractari ergo potest ut recta linea. Et quia in unoquoque mense area BLZ inde a P usque in N crescit in proportionem sinuum LT etc., eorum vero eadem est sequela, quae scrupulorum menstruorum (cum et illa sint ex sinibus; ordine tamen contrario extracta), potest igitur fieri multiplicatio scrupulorum menstruorum in scrupula ordinis contrarii, ad argumentum menstruum accommodata: additis scilicet duobus logarithmis, aggregatum igitur statim monstrabit valorem areae hic quaesitae ex separata tabella huc accommodata.

Sint scrupula menstrua $48^{\circ} 33''$ Logar. 21193.

sit argumentum graduum $45. 42' 24''$ Logar. 34700.

Somma 55893 ex peculiari tabella mon-

strat $1^{\circ} 25' 45''$ aream trianguli socii seu aequationis partem competentem et particula exsorte fermentandam.^(*)

Qua re mensuratur particula exsors? Exsortem particulam metitur et repraesentat areola trianguli, cujus basis est eccentricitas puncti menstrui, vertex vero centrum eccentrici. Hujus areolae duplum alias dicitur rectangulum quadrantis. Et reducitur areola in scrupula gradus, qualium area totius eccentrici est 360° .

In schemate praemisso si C punctum menstruum et CA ejus eccentricitas, tunc in omnibus momentis, quibus invenitur haec dispositio punctorum C, B, A, et haec anguli CAB quantitas, semper areola CBA (dimidium scilicet de rectangulo quadrantis CBZA) est particula exsors, quocumque in puncto orbitae Luna fuerit inventa. Haec igitur areola si adducitur ad aream BMZ, constituit aream CMA. Eadem areola CBA si auferatur ab area BLZ, relinquit aream CLA. Id sic patet: nam CA et BZ sunt aequales, quare triangula super CA et BZ sunt ut eorum altitudines super cujusque basi, et ut VL ad TL, sic CLA ad BLZ. Utque TL, altitudo trianguli BLZ, ad CB

vel VT, altitudinem trianguli CBA, sic area illius ad aream hujus. Sed TV est differentia altitudinum VL et LT, ergo et area CBA est differentia arearum CLA et BLZ.

Doce computare particulam exsortem. Eadem est ratio computandi, quae fuit supra libro V. rectanguli quadrantis. Ducitur scilicet altitudo CB illie in totam basin CA, hic in dimidiam. Ut autem compendiose sciamus valorem cujusque areolae, prodeuntis in gradibus et scrupulis, quailum tota eccentrici area valet 360° , oportet computare omnium maximum, scilicet ad augmentum CAB 45° ejusque valorem.

Ducta igitur AE eccentricitate 4362 in se ipsam, creator duplum rectanguli maximi, scilicet 19027044, ergo rectangulum CBZA, cum est maximum, est 9513522. Quodsi area circuli valet 360° , haec areola valebit $0^\circ 6' 49''$, exors vero particula dimidium hujus, scilicet $3' 25''$ vel $205''$. Jam libro V. inventa est proportio rectangulorum quadrantis (et sic etiam horum triangulorum) inter se motuo in numeris, quailum maximum est 1000. Si ergo 1000 valet $205''$, facile computatur, quantum valeat quodlibet minorum.

Propter banc exilitatem particula exors vel negligi potest in solidum, vel etiam inter variationes, de quibus infra, excerpti: est enim fere uucia variationis respondeutis.

Quare nomen ei dedisti particulae exsortis? et quae ratio utendi, ut aequatio menstrua prodeat? Quia cum ipsissimum triangulum aequatorium, verbi causa CLA, constituatur per socium BLZ et per hanc particulam seu areolam CBA, illud quidem BLZ sinui suo LT cedit in sortem debitam de maximo hujus mensis BNZ, haec vero areola CBA extra sortem in uno semicirculo menstruo decedit triangulo BLZ, extra sortem in altero ei accedit, eadem sc. quantitate per totos PFQ, QDP semicirculos, sive parvus fuerit sinus sortiens LT sive magnus. Quodsi fuerit punctum orbitae Lunae propositum in semicirculo, qui perigaeum intercipit, cujus triangulum super BZ, puta BIZ, fuerit minus ipso CBA subtrahendo, tunc ipsum BIZ subtrahitur vicissim a CBA, et residuum est area trianguli aequatorii quaesiti accipitque denominationem ex semicirculo GDH, habente apogaeum D.

Quibus aliis nominibus nuncupatur haec aequatio menstrua temporanea? Tycho Brahe appellavit prostaphaeresin eccentricitatis, Copernicus prostaphaeresin secundi epicycli, Ptolemaeus *προσθενειν* epicycli, quasi annutum, Arabes ex illo diversitatem aspectus epicycli: quilibet voce utitur accommodata ad suam formam hypotheseos, qua supponit geometricum et opticum aliquid, cum mihi sit ex causis mere physica.

Quanta est haec aequatio menstrua, cum est maxima vel plena? Tycho Brahe statuit eam aequalem semissi aequationis maximae in copulis, quod est secundum me parti aequationis physicae in soluta, sc. $2^\circ 30'$, quod valde commodum accedit schematibus, ut sit utrique eadem basis trianguli AE, sicut antea in ejus definitione supposuimus. Ptolemaeus vero facit eam paulo majorem, scilicet $2^\circ 41'$, ut dictum libro IV. fol. 390, quae quantitas admodum servit connexioni speculativae hujus aequationis cum sequenti variationis negotio: hoc igitur in dubio maneat, donec observationes sufficienter decident. In usu sequamur Tychonem interim.

Quodnam est discrimen harum aequationum menstruorum a prioribus anomaliae solutae? In primariis planetis et in anomalia soluta partes aequationum physicae in aequali distantia punctorum orbitae ab apogaeo tam ante quam retro sunt aequales. In anomalia vero menstrua, praeterquam in mense pleno, semper alias, duorum punctorum orbitae, aequalibus angulis ad Terram

ab apogaeo menstruo, hoc est a Sole vel ejus opposito elongatorum in partes contrarias, aequationes menstruae sunt inaequales, et illud habet majorem aequationem menstruam, quod est apogaeo solutae propius; differentiam ostendit particula exsors duplicata.

Qua in proportionibus sunt ad invicem binae tales aequationes, aequalibus angulis a Sole in plagas contrarias elongatae? Sunt inter se in proportionibus intervallorum Lunae et Terrae. Ut si DAH, HAL anguli aequales, area CDA erit ad aream CLA ut DA ad LA.

Quomodo utimur hac aequatione menstrua, seu quid est anomalia primo vel secundo aequata, quid item anomalia media, respectu adhibitae aequationis menstruae temporariae? Proposito certo loco Lunae in sua orbita certa quae linea loci Lunae veri sub ecliptica, verbi causa AL, area sola LDA, constans sectore LDB et triangulo LBA, est illius loci et anomaliae eccentrici DL et anomaliae primo coaequatae DAL respondens anomalia media. Quodsi jam in semicirculo HNG, ab H apogaeo menstruo incepto, et in hoc situ punctorum B, C, A, aream trianguli menstrui CLA adjeerimus ad aream DLA, tunc angulus DAL respectu hujus augmenti est anomalia secundo aequata et respondet ei jam anomalia media anetior, composita scilicet ex DAL et LCA, intellige rursum, qualium area simplex circuli est 360°. Idem locum habet in semicirculo posteriori GOH, a perigaeo menstruo G incepto, si subtraxerimus, verbi causa in M, aream CAM ab area HAMGN. Nam area HAMGNH est anomalia media, respondens et anomaliae eccentrici DNGM, et coaequatae primo, scilicet complemento anguli DAM; et area HAMGNH, diminuta area CAM, est anomalia media, respondens eidem anomaliae DAM secundo aequatae: sic enim appellat Tycho Braheus, quando ad anomaliam mediam duae sunt adhibitae aequationes, prior ex soluta, posterior menstrua temporaria. Ille quidem cum astronomis ceteris unum mediae anomaliae duas aptat coaequatas, subtrahendo aequationes in primo semicirculo et loca visa mutando; hic vero unum coaequatas et uni viso loco duae aptantur mediae, addendo aequationes in primo semicirculo, ut temporis morae intuentur, quia causae tot aequationum sunt physicae, necdum omnes explicatae sunt.

In hujus vero semicirculi partibus inter D, H apogaea, vel F, G perigaea, cautio est haec. Sit P punctum intermedium locus orbitae, et AP linea veri loci Lunae, et DP anomalia eccentrici, et DAP angulus anomalia coaequata; siquidem igitur intelligitur haec esse primo coaequata, tunc respondet ei anomalia media, area DPA, constans sectore DPR et triangulo PBA simplicii; sin autem DAP sit anomalia secundo coaequata, tunc ei respondebit anomaliae mediae mensura, area DAP, diminuta areola PAC. Nam hic area quidem PAB est in solutae descendente semicirculo DPF, at area PAC est in menstruae ascendente semicirculo GPH.

Doces igitur anomaliae secundo aequatae propositae invenire suam anomaliam mediam: ut fit frequentius, ut proponatur ex temporis notitia anomalia media, velim huc suam secundo coaequatam invenire. Rursum ad hoc non minus quam supra libro V. via nulla est a priori, sed oportet uti regula falsi, aut tabulis in hunc usum confectis.

Attamen si non scrupulosissime sit agendum, tunc inventa aequatio menstrua temporaria, considerata ut angulus, poterit etiam contraria via subtrahi in primo semicirculo, addi in secundo ad ipsam anomaliam primo coaequatam, ut fiat secundo coaequata, propositae mediae invariantae manenti respondens; vel potest etiam angulus trianguli CLA loco valoris areae CAL subtrahi ab

angulo DAL, angulus vero CMA vel CPA addi ad compositum ex DAF, FAM et ad DAP, ut anomalia secundo eaequata repraesentetur in angulis sic correctis, a quibus tamen schematis ratio non leviter abhorret, nisi ex C secantes ipsas CA, CM, CP eduxeris, indices loci Lunae sic secundo aequati, quod videtur intricatius (vide librum V.). Et hujus posterioris usus respectu, cum is congruat ad normam usitatum aequationum in planetis, prior semicirculus, a copula apogaea inceptus ad normam usitatae astronomiae, censetur habere affectionem subtractoriam, secundus, inceptus a copula perigaea, affectionem adjectoriam.

Quomodo appellatur locus Lunae duabus praemissis aequationibus affectus? Respectu secutariae tertiae aequationum dicitur locus Lunae prope verus in Tychoonis Progymnasmatibus.

Quibus jam legibus utriusque generis et solutae et menstruae temporanae anomaliae aequationes inter se permiscentur in unam compositam?

1. Semper majori parte semicirculorum accumuluntur. Id ex eo sequitur, quia dictum est: quo tempore semicirculi, in soluta quidem ascendens et descendens, in menstrua vero ista crescentis et senescentis Lunae, se mutuo quasi bisecant applicatione terminorum, aequationem menstruam esse plane nullam. Quamprimum igitur est aliqua inaequalitas menstrua, jam plus quadrante est in semicirculo crescentis, communicans ei suam affectionem.

2. In residua parte semicirculorum, ubi sunt affectiones inter se contrariae, fit subtractio minoris aequationis a majori, et stat jus denominationis seu affectionis ab elemento majori.

3. Quando ergo sunt in copulis apsides, tunc Luna in quadras veniente non menstrua tantum aequatio, sed etiam composita ex duobus elementis fit maxima: sc. $7^{\circ} 30'$.

4. Quando apsides in quadras incidunt, tunc toto mense tecnico (et in quantum hoc toto mense naturali verum est) aequationes proveniunt simpliciae, lege solutae; nec est aliqua menstrua aequatio, qua cum illa permisceatur.

5. Quando apsides sunt locis intermediis, seu in octantibus, eo mense Luna in copulis quidem habet aequationem simplicem, legibus anomaliae solutae, at in quadris existens, ultra id, quod ei competit legibus solutae, sortitur etiam particulam de aequatione menstrua, quanta potest illa fieri toto illo mensis technici semisse; denique in apsidas incidens gibba vel corniculata, quibus in punctis carere debuit aequatione ex legibus solutae, habet tamen aliquam aequationem menstruam; vicissim in medias longitudes gibba vel corniculata veniens, ubi maximam acquirit aequationem lege solutae, non adjicit tamen maximam menstruam.

Quae hinc sequitur inaequalitas partium mensis? Potest semissis mensis a quadra ad quadram excurrere proxime ad dies sedecim, semissis alter contrahi ad dies tredecim cum dimidio, paulo plus.

De tertia inaequalitate motus Lunae in longum, seu de Variatione.

Quomodo differunt inter se in forma inaequalitates menstruae, temporanae haecenus explicata, et stata seu perpetua jam sequens? 1. Temporana, ut dictum, junctim deprendet tam ab apogaeo, quam a linea copularum; perpetua dependet a sola linea copularum. 2. Illa oritur ex comparatione eccentricitatis Lunae cum plano circuli illuminationis, haec existit per eundem circulum illuminationis, sed citra respectum eccentricitatis. 3. Illa

aequatio dispergitur per semicirculos totos, ut sit in quadris maxima, leta per quadrantes dispergitur, evanescit tam in quadris, quam in copulis, maxima est circa octantes. 4. Itaque propter illam temporaneam Lunæ sit semel in mense tarda, semel velox, at propter hanc bis sit tarda, scilicet in utraque quadra, bis velox, in utraque scilicet copula; et tanto velocior quovis loco, quanto vicinior is est copulis.

Quod nomen habet aequatiumcula, quae per hanc anomaliam oritur? Tycho Brahe inventor variationem dixit. Id nomen illa retineto, ut ex ipsa nominis praerogativa admoneamur, illam aliter oriri quam aequationes hactenus dictas, esso scilicet accidens motus medii, quem variet etiam sine eccentricitatis opéra.

Quid est variatio? Est angulus comprehensus inter duas lineas ex centro Terrae, loci Lunae prope veri et veri absolutique indices: sed, quia viandae confusionis causa non pinguntur istae lineae in schemate, rectius igitur definitur variatio ex causa sua, quod sit promotionis, quae sit a lumine, inaequalis et realis excessus super aequalem seu fictam. Ubi voce *promotionis* intelligimus effectum in gradibus et scrupulis elongationis Lunae a Sole prope verae.

Docere invenire variationem geometricæ, secundum principia physica libro IV. fol. 364 et seqq. tradita. Si ex centro Terrae, intervallo quocunque, describatur quadrans, ineptus a linea copularum et traductus per lineam loci Lunae prope veri, et in eo quadrante rectangulum, circa lineae dicti loci Lunae particulam resectam, ut circa diagonion: area rectanguli bujus, redacta in scrupula, qualium rectangulum maximum valet 40' 30" secundum Tychonem (vel 51' secundum rationes libri IV.), prodeit valorem variationis, competentis proposito loco Lunae prope vero.

In schemate 89. sit centro Terrae A descriptus quadrans EY a linea copularum HA per lineam loci Lunae AL, quae debet secare quadrantem in R, sit circa AR, ut diagonion, rectangulum CX, erit area CX mensura variationis, quae competit loco Lunae prope vero, per lineam AL indicato.

Hoc pacto circellus, qui a centro eccentrici B circa centrum Terrae A describitur, aream suam, quae prius serviebat aequationi menstruae fermentandae, nunc etiam variationi expediendae accommodat, ut non opus habeamus apparatu majori. At secundum Tychonem Brahe ex loco Lunae in ecliptica prope vero scribendus est in superficie fixarum circellus, semidiametro 40' 30"; ejus sub ecliptica tensae particula, respondens sinui duplicatae elongationis prope verae Lunae a Sole, erit variatio competens.

Quia libro V. suspensa fuit demonstratio aequipollentiae plani hujus cum causis physicis, libro IV. introductis, expedi illam hic. Memento igitur, hoc esse positum libro IV, quod lumen Solis adjuvet speciem Telluris motricem in proportionem duplicata ejus, quam tenent sinus complementi angulorum, quibus applicantur invicem species inminis Solis, ut superficies sphaerica luminosa circa Solem tensa, et species sphaerica corporis Telluris circa Tellurem tensa.

Ut quia in H copia angulus est nullus, merus scilicet contactus specierum momentum, anguli vero 0° complementum est 90°, quare sinus EA arcus EY, 90°, est mensura adjumenti a lumine in H. Vicissim in I quadratura specierum superficies secant se ad rectos, recti vero seu 90° complementum est 0°, eoque et sinus bujus est nihil: nullam igitur motus adjumentum a lumine Solis sentit Luna in I posita. Et in L, posito quod elongatio HAL vel EAR (quia AL et AR debent esse una linea

recta) sit 30° , complementi RY 60° sinus RX metietur adjumentum motus Lunae, in L positae. Metientur hoc, inquam, sinus isti non se ipsi, sed quadratis suis, ut quorum proportio est dupla proportionis ipsorum sinuum. Atqui si quadrantem EY seces in partes plurimas aequales per RX , parallelas ipsi EA , quae partes sint jam ER , RY , sicut se habet EA ad RX , sinum proximae divisionis, sic quam proxime se habet sinum distantis AX ad proximorum distantiam, ut XY ; hoc tanto semper est verius, quanto concisior est divisio quadrantis. Usurpatum hoc est libro V. et demonstratum. Quare in area quadrantis segmenta sunt constituta (ut $EAXR$) laterum omnia proportionalium. Ut enim EA longitudo ad AX latitudinem, ita etiam RX longitudo ad XY latitudinem, vi divisionis infinitae. Segmenta igitur sunt similia potestate, quia in divisione infinita dissimulamus superiores curvaturas ER , RY , segmenta vero, quippe minima, pro perfectis parallelogrammis usurpamus. Si segmenta inter binos sinus sunt inter se similia, proportio igitur illorum est dupla proportionis sinuum ipsorum, ad quos terminantur. Sed et lumen Solis, promovens motum Lunae, nititur ad hoc proportione dupla sinuum horum. Luminis igitur ista promotio dispensatur in proportionem segmentorum istorum. et per consequens, sicut crescit, successively quadrantis truncus $AERX$, donec quadrans fiat integer in Y , sic etiam crescit, in eadem se. mensura, promotio ista luminis, incipiensque ab E fit in Y $2^\circ 3'$ secundum Tychonis quantitatem, vel $2^\circ 41'$ secundum quantitatem a priori erutam.

Atqui si haec luminis promotio esset aequabilis, tunc cresceret cum ipso arcu ER ejusque sectoris EAR ; sed quia crescit cum truncus $AERX$, excessum igitur ipsius $AERX$ super EAR , hoc est triangulum RAX metitur excessum promotionis a lumine, metitur igitur variationem. Sed area rectanguli CX est dupla areae trianguli RAX , et duplura est eadem proportio, quae simpliciorum inter sese, ergo et areae rectangulorum quadrantis metiuntur variationem.

Demonstra etiam aequipollentiam cum circello Tychonis. Tycho sinum arcus, qui duplum habet ipsius HAL , statuit mensuram variationis. Atqui rectangula quadrantis, ut $CRXA$, crescut etiam in proportionem sinuum arcus, qui duplum habet ipsius ER seu HAL singuli. Duplicatur enim arcus minor ER ejusque sinus dimidiatur, et appositis quinque cyphris prodit rectangulum CX . Demonstratur hic processum, ex artificis trigonometriae compendiosae, terminis tribus, sinu toto, sinu arcus et sinu complementi, applicatis ad rectangulum sphaericum. Dimidiorum vero proportio est eadem quae totorum: est igitur aequipollentis perfectissima.

Da exemplum methodi computandi variationem. Sit elongatio Lunae prope vera 30° . Ergo arcus dupli 60° sinus 86603 redigitur ad scrupula, quantum 100000 sunt $40\frac{1}{2}$ vel $51'$, qui valor multiplicatus in 86603 (potest per logarithmos) ostendit variationem 30° vel $35' 5''$ vel $44' 10''$

$40^\circ 50'$ logarith. 59504 26 .

Numeri 86603 logarith. 14383 57 .

Summa est logarithmus 55687 . 83 . | sc. $35' 5''$ quaesitorum.

Vel in altera demonstrativa quantitate $51' 0''$ logarith. 16251 90 .

Numeri 86603 logarith. 14383 57 .

Summa est logarithmus 30635 . 47 . | sc. $44' 10''$ quaesitorum.

Quomodo usurpatur variatio, seu quid est locus Lunae verus et absolutus? Variatio in quadrantibus a linea copularum inceptis additur, in reliquis auferitur a loco Lunae prope vero: ita conficitur tandem tertia opera locus Lunae verus et exactus seu absolutus, scil. per aequationem solutae, aequationem menstruum et variationem.

Dic, quae hinc existat varietas horariorum? Horarius motus Lunae ab aequinoctio per Tychonicam variationem efficitur in copulis quidem apogaeus $29^\circ 41'$, perigaeus $38^\circ 32''$; in quadris vero apogaeus $29^\circ 35'$, perigaeus $35^\circ 11''$. Sed per variationem auctam erunt isti: in copulis apogaeus $29^\circ 50''$, perigaeus $38^\circ 45''$; in quadris apogaeus $29^\circ 26''$, perigaeus $34^\circ 39''$ et ablato motu Solis horario medio $2^\circ 27''$, venit motus Lunae a Sole perigaeus

in copula $36' 5''$, apogaeus in quadra $27' 8''$, quos inter praecise est diatessarum seu proportio 3:4. Sic apogaeus Lunae a Sole in copula fit $27' 14''$ perigaeus in quadra $32' 44''$, quos inter est praecise tertia mollis, seu proportio 5:6; sic etiam inter pure copulares est diatessarum, inter pure quadrarios est ditonus minor, differentia copularum a quadris dat tonum minore.

Quomodo sciri potuit valor maximae variationis in gradu 45, quod is sit $40' 30''$ vel $51'$? Tycho suam quantitatem $40' 30''$ deduxit ex comparatione observatorum Lunae locorum in octantibus cum iis Lunae locis ad observationum momenta, qui ex praescripto duarum priorum aequationum computabantur. Nam differentia, quae inter hos et illos inveniebatur, variationis hoc nomen est adeptae. Etsi vero observationes non omnes eandem variationis deprehensae quantitatem prodiderunt, sed dissentire ab invicem sunt deprehensae neque ad 10 minuta, Braheus tamen censuit sibi illam quantitatem esse retinendam, quae media esset inter dissentientes; erat autem $40' 30''$.

At quantitas altera $51'$ libro IV. fol. 367. et 390. fuit deducta a probabili dogmate, quo ascrebatur, quicquid ultra 12 lunationes accrescit motui Lunae in anno siderico (sunt autem $132^{\circ} 45'$ de revolutione tredecima) id acceptum ferendum esse lumini Solis; sic ut 12 lunationes purae maneant conficiendae speciei corporis Telluris. Hoc posito facile inquirebamus, quid tunc de quolibet quadrante elongationis Lunae a Sole transcribendum esset lumini. Nam si de revolutionibus 12 cum fragmento lumen Solis sibi vindicat illud fragmentum, scilicet $132^{\circ} 45'$, ergo de uno revolutionis quadrante seu de 90° lumen Solis sibi vindicabit in eadem proportionem $2^{\circ} 41'$.

Constituta sic quantitate effectus promotionis ex lumine in uno toto quadrante, jam etiam habetur maxima variatio, quae resultat ex hac promotione in octantes.

Nam quia lumen hos suos $2^{\circ} 41'$ non disperditur aequaliter, non inquam proportionem sectorum EAR, sed inaequaliter in proportionem truncorum seu parallelogrammorum AERX, quae arca excedit sectorem EAR, plurimum in 45° (ubi RX, XA aequales), excessu areae RAX, quare sicut area totius quadrantis YEA est ad aream RAX, sic etiam est $2^{\circ} 41'$, effectus per unum totum quadrantem, ad excessum illum effectus huius inaequabilis et veri asper aequabilem et imaginarium in octante: quae definitio erat variationis. Et quia aream quadrantis geometrae invenerunt 7853981634, area vero rectanguli quadrantis RCAX, cum id maximum, est 5000000000, cuius dimidium 2500000000 est excessus trianguli RAX: si igitur 78540 valet $2^{\circ} 41'$, tunc 25000 valebit $51'$.

Et quia pro appendice lunationum 12, quae est $132^{\circ} 45'$, effulcus folio 367 (rursum a priori) $127^{\circ} 10'$, quod est 24. fere parte minus: si igitur etiam hinc orsi variationem maximam constituamus, illa prodibit 49 circiter et sic adhuc vicinior Tychoicae.

Si aequatio menstrua et variatio consentent in unam, quodnam habebit illa nomen? Cum utraque ex eadem Solis illuminatione, licet modis diversis, oritur, composita igitur ex utraque rectissime dicetur aequatio luminis.

De latitudine Lunae menstrua.⁸²⁾

Quibus positionibus geometricis demonstratur latitudo Lunae menstrua?

De physica quidem et quid in re ipsa insit, dictum est libro IV. fol. 392. In praesens non da apparatu reali agitur, sed imaginatio adjuvatur.

In schemate praemisso fingatur planum aliquod, per A, C puncta ductum, obliquum esse ad planum eclipticae, super linea per nodorum loca et per A centrum Terrae ducta, angulo constanti 5° . In hoc plano sit linea HCAG copularum, designata per sectionem plani, per centra Solis et Terrae transeuntis, ad planum eclipticae recti. Super hac linea HCAG ipse eccentricus Lunae DLFM inclinatur ad planum prius dictum, non quidem semper, sed legibus sequentibus. Sint I, K loca quadraturarum sub fixis exeantque ex his punctis sphaerae fixarum duo arcus, recti ad planum primo dictum, uterque centro A descripti, quilibet non longior 18 minutis in utramque plagam. Quando ergo limites anomaliae solutae sunt in linea HCAG, tunc planum eccentrici DLFM uniatur plano priori, sic ut aulia illorum sit inclinatio mutua, sed solummodo communis utrique inclinatio ad planum eclipticae. At cum limes solutae, verbi causa boreus, incipit ab H oppositione discedere versus K quadram, ut si veniat in D, sicut se habet sinus anguli HAD ad sinum anguli recti HAK, sic etiam se habeat portio librationis in boream ipsius limitis menstrui K ad librationem seu inclinationem planorum totalem, quae est 18 minutorum, quae totalis inclinatio fit eo mense, quo limes solutae boreus venit in K, locum quadræ seu limitem menstruum. Hoc pacto fit, ut limes solutae boreus assurgat a plano priori in boream tantisper, dum in K quadram incidat, inde paulatim iterum annuit ad planum prius, tandemque in G veniens in ipsum planum recidit. Ubi primum hic limes solutae boreus fuerit transgressus punctum G versus I, jam semicirculus HKG fit respectu latitudinis menstruae australis, GHI borealis, et limes solutae boreus rursus in boream attollitur, quippe totum planum eccentrici GHI in arcu per I ducto tollitur in boream totumque HKG in arcu per K mergitur in austrum.⁸³⁾

Quae est methodus computandi librationem seu inclinationem limitis menstrui?

Distat Sol a nodo . . .	30° ————	vel 60°
Sinus complementi . . .	86603. ————	vel 50000.
Aufer decimam . . .	86603. ————	vel 50000.
Restat	779127.	450000.
Hujus deplum	1558854.	900000.
(absceſſe 5 ultimis) $15' 35''$		vel $9' 0''$ est inclinatio limitis

menstrui.

Quid appellas scrupula latitudinis? Sunt sinus complementorum ad unum vel tres quadrantes vel excessuum super unum vel tres quadrantes distantiae Solis a nodo Lunae erebente, redacti in scrupula astronomica, qualem sinus totus valet $60'$, seu sunt tripla sesquitertia anguli inclinationis limitum menstruorum, in quolibet mense technico constantis.

Quid est argumentum menstruum latitudinis? Est nihil aliud, quam distantia veri et absoluti loci Lunae a vero loco Solis.

Quid est latitudo Lunae menstrua? Est arcus circuli magni sub ecliptica descripti, cujus planum transiens per centra Telluris et Lunae sit ad rectos erectum super planum, constanti angulo 5° inclinatum ad planum eclipticae, interceptus inter hoc planum continuatum et inter locum centri corporis.

Quomodo computatur? Multiplicatione scrupulorum latitudinis menstruorum in inclinationem limitis, argumento latitudinis menstruo excepto ex mense pleno.

Quid consequitur hanc suppositionem geminatae latitudinis in motum nodorum? Verus nodus seu intersectio ipsius orbitae cum ecliptica sortitur

motum inaequalem, tardum quidem, Sole per nodos incedente, velocem, si Sol per limites eat; estque maxima prosthaphaeresis nodorum, Sole in octantibus versante, $1^{\circ} 39'$, qua tamen ad indagandas latitudines non indigemus.

Quomodo differunt istae hypotheses inaequalitatis Lunae menstruae ab hypothesis Tychonis Brahei? In effectu calculi longitudinis et latitudinis Lunae nihil, vel certe minus, quam quod observatoris quantacunque diligentia possit argui; in intervallis Lunae modice, in forma motuum plurimum differunt. 1) Braheo enim, ut et Copernico apogaea distantia Lunae a Terra sit parva in copulis, magna in quadris, plus huius quam illi; mihi utrinque est aequalis. 2) Braheo eccentricitatis mutatio (vel quod ei in Copernico et Ptolemaeo aequipollet) est menstrua; mihi realis eccentricitas invariata manet, puncti vero aequatorii, menstrui dieti, eccentricitas nutationem subit annuam. 3) Latitudinis augmentum Copernicus ignoravit, Braheus inventor sic dispensat, ut tam initio, cum maximum est, quam fine, cum evanescit, lentescat, in medio sit praecipuus, at hic solum, cum maxima sunt incrementa, tarda est illorum mutatio, velocissima, cum evanescunt. 4) Limites circumducit Braheus in circelli circumferentia, turbans ea re motum eccentrici, quam tamenurbationem ipsi Lunae remittit, perinde ac si illa non esset ad eccentricum affixa, sed illum teneret, huc illuc nutando (loquor ad mentem veterum, nam Tycho solidos orbes rejectit), mihi limites librantur in arenam vel lineam erectam super plano eclipticam. 5) Nodi apud Tychonem reciprocantur bis in uno mense fiuntque ex retrogradis directi; hic nodorum motus inaequalitatem habet semestrali, seu bis in anno redeuntem, nec unquam sunt directi, sed bene stationariis similes, bis in anno.

Quas dicis communes planetarum affectiones? Quae accidunt vel omnibus et singulis propter causas tamen diversas, vel planetis sex seorsim, non propter motum, sed propter situm eorum ad Solem, vel denique comparatis inter sese binis et binis quibuscunque.

Quod nomen his affectionibus est positum? Veniunt et istae et superius traditarum ipsius motus affectionum nonnullae sub nomine passionum planetarum, qua voce latina redditur graeca, *παθῆναι*, paulo aptior. Nam est fictio astrologica, quasi planetae ipsi vere afficerentur omnibus his, quae visus sibi de illis imaginatur, quod tamen de paucissimis accidentibus verum est.

Quae sunt illa, quae communiter omnibus accidunt, propter causas tamen diversas? Quod tardi vel veloces, aucti vel minuti numero fiunt.

Quando tardus dicitur planeta, quando velox? Sumuntur haec accidentia secundum respectum ad motum cuiusque medium, tanquam ab acquisitione consideratum, sive propria cuique sit causa tarditatis vel velocitatis ex eccentrico, sive adventitia ex orbe magno. Ubi retrogradatio et stationes accensentur etiam sub accidens, tarditatis. Etsi hae affectiones retrogradationis et stationum etiam seorsim privato jure inter *παθῆναι* vel passionum planetarum referuntur, sed cum non sint omnium planetarum et sint unius orbis planetarii, magni dicti, effectus, ideo tanquam ad ipsam veluti essentiam motuum apparentium compositorum pertinentes, jam supra apud theorias eorum, quos attinent, sunt explicatae.

Quando vero dicuntur aucti numero, quando diminuti? Cum in pluribus vel paucioribus gradibus eclipticae deprehenduntur, quam fert calculus motus medii, hoc est cum vel prostaphaereses ambae eccentrici et orbis magni (vel in Luna solutae et menstruarum sive luminis) vel saltem major illarum, ille adjectoria fuerit, hic subtractoria, id quod promiscue tardis vel velocibus, vel etiam stationariis et retrogradis accidere potest.

Quenam accidunt planetis sex propter situm eorum ad Solem? Planetarum sunt a Sole 1) vel orientales vel occidentales, 2) et pro diversitate situs horum aliis vel aliis vultibus conspiciuntur, 3) denique propter haec omnia diversos ortus occasusque sortiuntur et in apparitionibus vel aucti vel minuti lumine censentur, non vero apparentes, bypangi, sub radiis.

I.

Quando planetae censentur orientales esse a Sole vel occidentales? Orientales appellantur, non quod a Sole distent in ortum et consequentia signorum, sed e contrario, quando antecedunt eum in ordine signorum, graece ideo dicti *προσηγομενοι*, quia tunc ortum habent supra horizontem de nocte, seu inter occasum Solis et ortum ejus, occasum vero illorum dies tegit. Cum enim mane, nondum orto Sole, plerumque possint conspici, graece *ἑσπεροι* vel *ἑσπεροι*, latine matutini appellantur. Sic e contrario, qui a Sole distant in consequentia minus semicirculo, graece *ἑσπεροι*, occidentales dicuntur, quia tunc de nocte occidunt, cum ortum eorum dies abscondat, qui quia vespere sub Solis occubitu supra horizontem et plerumque in conspectu sunt, ex eo graece *ἑσπεροι*, latine vespertini dicuntur.

Quo vicium ordine succedunt invicem affectiones istae? Tres superiores et stellae fixae in articulo conjunctionis cum Sole fiunt ex occidentalibus orientales; contrarium in articulo oppositionis. Luna vicissim conjuncta Soli ex orientali fit occidentalis, opposita illi contrarium tenet. Inferiores duo, Venus et Mercurius, hic associant se vel superioribus, cum ipsi Soli conjun-

guntur infra et retrogradi, vel Lunae infimae, cum ipsi supra et directi Soli conjunguntur.

II. De Illuminatione Lunae.

Quae causa est, cur Luna Venusque facies mutant? Causa est composita ex illuminatione globorum et situ eorum ad Terram et Solem.

Ut hanc causam recte intelligam, dic, unde stellis sua lumina? De fixis difficile est respondere, num iusita illis sint lumina; tanto enim altitudinis gradu consistunt, ut Solis conspectu fruuntur sub exilitate partis sexcentiesimae de uno minuto; quare decies octies mille vicibus minor illis Sol apparet, quam nobis hic in Terris. An igitur nihilominus polleat Sol tanta potestate illuminandi fixas stellas, ut illae vicissim communicatam sibi a Sole lucem ad nos usque per eandem intervalli prolixitatem demittere possint, hic video dubitare Galilaeum, nec ego quidquam affirmo. Si tamen propria stellae habent lumina, nihil hoc est insolens, quia etiam hic in Terris certorum quorundam animalium partibus sua insunt lumina, et arte chymica lumen gemmis nonnullis non fluctuans, ut lucernarum et ignium, sed plane constans et quietum conciliatur. Utcumque sit, sive propria fixarum lumina spargant, sive acceptum a Sole lumen repercutiant, illos certe colores varios illamque scintillationem de uno addunt. Simplicis enim causae (ut si Sol esset) simplex est effectus et uniformis.

De planetis vero certa est res, omne illorum lumen a Sole esse. 1) Luna enim et Venus pro ratione configurationis suae cum Sole facies mutant. 2) Luna, Terra et Jupiter umbras projiciunt, objecti Soli, sic ut Terrae partes certae a Lunae umbra, Luna tota a Terrae, planetae Joviales a Jovis umbris lumine priventur et inconspicua aut obscurata corpora fiant, quae extra lineam oppositionis clarissime cernebantur. 3) Semper Mars, Jupiter, Saturnus ab ea parte clariore apparent, unde Solem propius aspiciunt, ab opposita obscuriores aut colorati. Mercurius etiam clariore lumine cernitur, cum est altior Sole partemque eandem corporis ostendit, quae et Solis lumine fruitur. Nec interim tamen negandum est, Saturni globi superficiem esse colore cineream, Jovis rufam vel flavam, Martialis nigram, sicut terrae et forte et lunaris est lutea, Veneris vero globi superficiem candidissimam, Mercurii caeruleam esse, non obstante hoc, quod ipsae globorum corpulentiae causa densitatis, supra libro IV. inventae, fossilibus colorum non plane eorundem assimilabantur.

Unde igitur stellis est illa scintillatio? Vel ab aliqua corporum, ut pellucidorum, alteratione perpetua et continenti, quam quasi paroxysmos dixeris, vel ab externa corporum angulosorum vel maculosorum convolutione angularumque vel macularum aliarum post alias explicatione.

Unde scimus, Lunam penitus carere proprio lumine? Quia interdum subito tota penitus amittitur, ut ne vestigium quidem ejus appareat, cum tamen proxime locum ejus cerni possint fixae quartae vel quintae magnitudinis; quare tunc locum non habet suspicio caliginosi nimium aëris. Sic factum est anno 1620. $\frac{5}{13}$. Junii.

Unde igitur Lunae suum est lumen? Iudidem, unde et Telluris superficibus, a corporibus scilicet luminosis, in quorum illa lumine versatur, nullo intercedente opaco, et potissimum quidem a Sole, fonte omnis in mundo lucis.

Si Lunae lumen esset a Sole, videremus in illa, ut in speculo, Solis imaginem semper rotundam. Siquidem Luna superficiem haberet politam instar speculi; quo negato non sequitur illatio. Conspicimus enim in

Terra quoque parietes longinuos integros beneficio luminis Solis, quos Sole nubibus tecto non conspiciamus, et tamen in illis parietibus non videmus Solis imaginem.

Quae figura est illuminationis Lunae a Sole? Cum globosa uterque figura sit, minori tamen Luna diametro, ut quae lib. IV. fol. 328. nonam et quinquagesimam demum partem occupat de Solis diametro, igitur paulo plus hemisphaerio lunaris corporis illuminatur a Sole quovis momento; terminat vero illuminationem circulus, qui hinc circulus illuminationis dicitur, distatque a circulo maximo sibi parallelo in novilunio quidem apogaeo minutis 15 de uno gradu circuli maximi in Luna, in plenilunio vero vix dimidio scrupulo minus.

Si semper hemisphaerium eoque amplius de globo Lunae et cujuscunque planetae illuminatur a Sole, quomodo igitur Luna faciem suam mutare potest? Quia, etsi semper dimidia circiter pars globi illuminatur, ea tamen non semper ad nos convertitur tota. Quod vero non de ea ad nos spectat, hoc neque videri potest, sed latet post globum in parte aversa.


Quantum igitur de globo Lunae vel sideris spectat deorsum ad oculum? Rursum dimidia globi pars, paulo tamen minus. Et in Luna quidem apogaea, quando diameter corporis apparet 30 minutorum, si tunc etiam Sol sit in apogaeo, habens itidem 30 minuta in diametro visibili, tunc quanto plus hemisphaerio illuminatur, tanto minus hemisphaerio cernitur praecise; quo vero propior sit Luna, hoc minor ejus pars cernitur, sed apparet major.

Explica nunc, quomodo existant diversae phases Lunae? 1. Quando Luna Soli conjungitur centraliter, ut si B Terra, A Sol, et Luna PO in linea: tunc est Luna penitus exstincta, quia A Sol supra PO Lunam est: itaque pars globi Lunae illuminata LOK a Terra B praecise sursum vertitur versus A Solem latetque tota post globum opacum, et sic pars NPM, quae deorsum spectat ad B oculum, eodem circulo visionis NM terminatur, qui est et circulus illuminationis LK: dicitur Luna silens, nova, vacuum, graece *νομήνη*, dicitur Neomenia.

2. Quando Luna exit e linea ex Terra in Solem, ut si sit in E, tunc circulus visionis MN inelipit secare circulum illuminationis KL, et tunc vindicatur aliqua pars hemisphaerii illuminati, ut LN, in hemisphaerium aspectabile MPN, eaque semper tanto major, quanto longius Luna digreditur a Sole. Hoc igitur accidit in Luna nascente et crescente dicta, graece *αὐξήμενη*, germ. dicitur Junge Mond, ubi primum corniculata, falcata, *μυροειδής*, post bifida *διχοτομος*, denique gibba seu *αὐροειδής* efficitur.

3. Quando Luna toto semicirculo, ut CEG, distat a Sole, sic ut illa B, oculum in Terra, et A Solem ultra illam habeat a plaga eadem GBA, tunc eadem Lunae medietas LOK (non tota tamen) venit Terrae B in conspectum, quae et illuminatur a Sole; suntque vel pa-

Fig. 90.



ralleli vel tangentes se mutuo altrinsecus circulus visionis NM ceterior et circulus illuminationis LK ulterior, post Lunam sursum a Terra receptus: ita ut circulus totus visionis comprehendatur in parte illuminata; diciturque Luna plenus, plenilunium, *πικρολήπτος*.

4. Quando Luna superavit oppositum Solis, sic ut in altero semicirculo rursum approploquet Soli, tunc eisdem de causis, ordinis tamen contrario, phases existunt eadem, gibba in F, post bifida, ultimo falcata in D. Diciturque senescens seu decrescens Luna, graeco *αδυνατα* et *αδυναται*; ber alte Mond. Itaque etiam aetatem Lunae usurpamus pro numero dierum a novilunio, in quo nasci Luna censetur.

Si phases omnes binorum circulorum binis terminantur semisibus, altero visionis, altero illuminationis: quae igitur causa est, quod non utraque phaseos terminatio circularis appareat, sed interdum altera linea sit recta, ac si bisecta esset Luna? Circulus quidem visionis MN semper apparet ut circulus, quia semper ad rectos angulos obijcitur lineae, ex centro suo C, E, G, F, D in oculum B ductae, at circulus illuminationis LK cum diacessu Lunae a Sole vel ejus opposito, id est cum angulo ABE, ABF necessario inflectitur et oblique magis magisque obijcitur visui, donec linea ex ejus centro in oculum, ut EB, applicetur plano illius circuli KL. Jam vero demonstratur in opticis, quod globus in longinquo appareat ut discus plenus, et in globo circulus oblique objectus, ut angulo BFL, BDL, non appareat ut circulus, sed ut ellipsis; et si obliquissime anguloque BEL nullo, ut linea recta.

Ubi sit linea recta? In quadrato Solis, vel in senescente paulo ultra, in crescente paulo ante locum Solis quadratum: ubi scilicet angulus inter Solem, Lunam et Terram rectus est ad Lunam. Vel magis geometrice: ubi axes conorum umbrae et visionis rectum angulum faciunt.

Ut hic ABM rectus est, eoque M locus Solis quadratus. Ergo si Luna sit ante M, ut in E, angulus scilicet AEB rectus eoque EBM tantus, quantus BAE: tunc plenum circuli KL, incidens in lineam visionis EB, apparet ut linea. Cum igitur libro IV. comprobata sit proportio AB ad BE quae 59 ad 1, erit angulus EBM grad. 0. 53 pr. 20 sec.

Quomodo computatur latitudo phaseos quovis momento? Sicut diameter circuli se habet ad sagittam anguli axium, sic est diameter disci Lunae ad latitudinem phaseis, fere. Nam dictum est, plus medio globi illuminari. Quare ubi angulus rectus et circulus illuminationis ut recta apparet, ibi paulo plus medio disci illuminatur.

•Cujus phaseos momentum facilius dignoscitur, cujus difficilius? Lunae bifidae phaseis intra paucas horas discernitur, quibus ex cava sit gibba; plenilunium vero exactum vix intra triduum mutari ceritur, partes enim aequales accessionibus vel decessionibus superficiei illuminatae in medio quidem disci obijciuntur visui magnae, ut sinus, in margine vero disci parvae, ut sagittae, ut jam dictum. Itaque etsi tantum abissimus ab ipsissima oppositione, ut circulus visionis secet circulum illuminationis in parte minima, habetur tamen pro tangente illum et phaseis pro plenilunio.

Quomodo arguitur Luna crescens et decrescens? Matutina seu orientalis, et cornibus vel gibbo occasum monstrans, sic ut in nostris zolis in eam obviam dextra manus adversa inseri posse videatur: tunc decrescit. Vespertina vero seu occidua, et cornibus vel gibbo ortum monstrans, et cum occur-

rere videtur sinistrae manus cavitati gibbus vel cavitas ojus: tunc crescit. In Venere sit contrarium.⁸¹⁾

Quid praeterea colligunt astronomi ex cornibus Lunae? 1) Cornua spectant semper in eam plagam, in quam tenditur zodiacus. 2) Circulus per cornuum extremitates ductus tendit versus polum eclipticae. 3) Quando hic circulus est ad perpendicularum erectus, tunc Luna est in eclipticae gradu nonagesimo ab ortu.

Quid sunt maculae in Luna? Etsi impossibile est, certum quid de corporibus adeo remotis pronunciare, tribus tamen proprietatibus maculosas partes Lunae conveniant cum aequoribus et lacubus, qui sunt in globo Terrae; partes vero in Luna clarae et lucidae cum montibus, rupibus, promontoriis et litoribus contiguendis nostrae. Nam maculae Lunae et profundae sunt ut nostri lacus et maria, et acquabili superficie ut humor, et denique obscurae, ut omnia penes nos bumecta sunt nigriora se ipsis, cum sicca sunt. At partes lucidae in Luna sunt altae et eminentes et asperae, ut montes nostri vallibus interscisi, et candidiores, ut sicca.

Quomodo demonstras has proprietates diversarum Lunae partium? Ex phasibus Lunae: nam linea, quae phasin terminat intus, si perspicillo Belgico lustras, nec perfecta ellipsis est in Luna cava vel gibba, nec perfecta recta in bifida. Nam per partes maculosas brevior est latitudo phasis, per partes claras longior et species totius quasi dentata aut serrata. Haec sunt argumenta diversae altitudinis maculosarum et clararum partium. Sic in parte a Sole aversa, in vicina $\pi\eta\zeta$ $\tau\cdot\mu\eta\zeta$, sunt puncta lucida, quasi vertex montium primum a Sole illustrati, quae puncta pertinent non ad maculosas, sed ad claras Lunae partes, ut apparet expectanti, donec illae penitus illuminatae et latitudini phasis adjunctae fuerint; sunt vicissim in parte illuminata lucidiore, rursum in confuio $\pi\eta\zeta$ $\tau\cdot\mu\eta\zeta$, puncta atra, quasi valles umbrosae aut cavernae. Haec vero sunt argumenta asperitatis. His autem punctis lucidis vel insigniter tenebrosis carent partes maculosae, quod est argumentum superficiei aequabilis. Denique in lucidis partibus est singularis umbo claritatis immensae, quasi mons ingens nive tectus: ut id sit argumentum candoris in partibus altis, et nigredo et obscuritas, humiditatis comes penes nos, maneat partibus Lunae profundis et in aequor fasis.

Cernitur in parte Lunae corniculata, a Sole aversa, lumen tenue juxta cornu lucidum: quaero, sitne illud Lunae proprium, aut unde sit? Causam oportet effectui respondere. Si lumen id esset Lunae proprium, perpetuum esset. At fortissimum est circa noviluniam, vincit enim crepusculi claritatem, vincit horizontalium vaporum densitatem; contra debilissimum fit in quadris, ut nonnisi a visu acutissimo tunc animadvertatur, nec nisi nocte adulta; Luna alta et a vaporibus libera. Causa igitur talis est quaerenda, quae sit fortissima circa noviluniam, debilis circa quadras. Talis est autem facies Telluris, illustrata a Sole. Nam quo tempore terricolae habent novilunium, Luna vicissim habet pleniterrium (alibi plenivolum appello⁸²⁾, quia Luna, sita inter Solem et Terram, parte sui, quae est aversa a Sole, fruitur conspectu totius hemisphaerii Telluris, illuminati a Sole. In quadris vero sicut terricolae Lunam, sic Luna Terram videt dimidiato tantum vultu lucentem. Nec absurdum est, quod sicut Luna plena illuminat noctes nostras pingitque suo lumine Terrae partem a Sole aversam, sic etiam Terra plena vicissim quindecuplo fortius illuminet noctem illam, quae est in parte Lunae a Sole aversa; quippe apparens disens Telluris in Luna est quindecuplus circiter apparentis disci

Lunae in Terra, quod ex libro IV. fol. 328. constat, semidiametris corporum Terrae 389 et Lunae 100 quadrate multiplicatis. Sic etiam pedes nos terri-
colas parietes albi fortissime a Sole illustrati lumen vibrant in antra et car-
ceres obscurissimos diemque his inferunt.

Quibus de causis existunt eandem phasem in Venere, cum illa non toto semicirculo discedat a Sole? Pro eo, quod Luna Terram circumit semper humilior Sole, Venus vicissim circumit Solem, nunc humilior illo, nunc altior. Cum igitur humilior Sole est et vicina illi, ut in occultationibus vespertinis et apparitionibus matutinis, tunc et causis et legibus huiusmodi, quibus et Luna, corniculata seu falcata comparet. At cum evadit Sole altior, ut circa matutinas occultationes et vespertinas emersiones, tunc eandem partem seu hemisphaerium illuminatum porrigens et versus Solem deorsum et versus oculum in eadem plaga inferius adhuc stantem, pleno vultu appareat necesse est, oppositionem, qua opus erat Lunae ad hanc phasim, pensante situ supra Solem, quæm nancisci Luna non potuit. Consequens igitur est, ut sint etiam intermedia duo loca, in quibus etiam globus Veneris appareat bisectus seu *διχοτομος* ad instar Lunae. Id vero fit in elongationibus a Sole maximis, quia supra huius libri VI. parte tertia dictum, ibi tangi Veneris orbitam a linea visiva; atqui etiam circulus illuminationis semper sese applicat orbitae, cum corpus illuminans in centro quasi orbitae consistat, coincidunt igitur hoc altu visiva linea et circuli illuminationis planum; quare ibi phasim bifidam existere etiam in Venere necesse est.

Num etiam in superioribus planetis locum habent istae phasem? Cum hi ex ipso nomine supra Solem esse intelligantur, semper igitur seu juncti Soli, seu oppositi, partem eandem ad oculum seu Terram convertunt, quae et ad Solem convertitur. Coniuncti igitur Soli (vel vicini Soli, ut in occultationibus vespertinis et emersionibus matutinis) eadem de causa pleno lucent vultu, qua prius inferiores, ut Venus; at oppositi Soli eadem de causa, qua Luna. Relinquitur igitur huiusmodi et phasim gibba, cum sunt locis intermedia. At bisecti seu dichotomi apparere non possunt, quia nulla linearum tangentium ipsorum orbitas incurrunt in orbem magnum, in quo Tellus. Tangentes enim cadunt extra, Telluris orbis est intra.

Mars tamen hanc phasim *διχοτομος* quam proxime assequitur, cum peribellus in quadratum incidit Solis. Tunc enim omnium angulorum inter Solem, Terram et Martem maximus rectoque proximus est angulus ad Martem, quia brevissima tunc est linea contingens orbem magnum ex Marte ducta, in recititudine vero anguli ad planetam sita est perfectio phasim dichotomae.

III.

Quae species ortuum et occasuum respectu Solis quibus planetis competunt, et quo ordine, quaeque his inde nomina? Tres superiores post conjunctionem cum Sole oriuntur mane heliacae, seu emergunt, *ἐπιπλέοντες*, ex Solis radijs; ita orientales et matutini facti, tandem in opposito Solis oriuntur et occidunt *ἀντιορικοί*, lucent scilicet pernoctes seu *παιρνικοί*; ex eo sunt occidentales et vespertini tandemque occidunt heliacae, seu eoduntur, *καταρτοί*, sub Solis radijs; emersiones vespertinas et occultationes matutinas non habent, uti neque fixae. Luna vicissim post conjunctionem cum Sole emergit vespere crescens, lucidensque occidentalis et vespertina usque ad oppositionem seu plenilunium, fit pernox et *ἀντιορικός* oriuntur occiduntque ut superiores. Inde vero facta orientalis et matutina, tandem mane occidit heliacae, quamquam in

horizonto ortivo, caretquo emersione matutina et occultatione vespertina. Inferiores vero, Venus et Mercurius, cum pernoctes fieri non possint, nec *ἀντορῆς* ortus occasusque habeant, ut superiores et Luna, vicissim omnes quatuor emersionum et occultationum species cumulant, cum eorum bias solas superiores, bias solas et Luna habuerit. Inferiores enim rursus a prius, cum supra Solem sunt, primum occultantur mane oriunturque vesperi, ut Luna, ex orientalibus occidentales facti. Et tunc quidem Venus ex Lucifero (*φωσφόρος*) fit Vesperus (*ἑσπερος*), retinetque hoc nomen, donec ut superiores, ut et Mercurius, occidat vespere heliace; inde oriuntur mone heliace, in medio orientales facti; et sic Venus, jam conspicua, fit Lucifer. Interdum tamen in Marte itemque Venero retrograda permutatur ordo apparitionum.

Quomodo planetae hypaugi, seu sub radiis esse dicuntur? Tempore inter occultationes et emersiones intermedio, quia tunc radii (*αἷμα*) seu claritas oris a Solis flet nondum orti radiis illustrati occupant oculos, ut illi stellas ipsas non sentiant. Sic et Luna, sic Venus, sic Jupiter praesentia sua praestringunt oculos, ut illi non cernant fixas propinquas minores.

Quo sensu dicuntur planetae aucti vel minuti lumine? Non a phasibus illo lumine reali crescentio vel diminuto: nam planetarum, qui supra Solem stant, vultus conspiciunt circa exortus et occultationes pleno illuminantur, sed ab accidentali visione vultus huius illuminati. Aucti enim lumine dicuntur, quando magis magisque sunt conspicui, vel discessu Solis ab ipsis, ut fit post superiorum et fixarum apparitiones matutinos; vel discessu ipsorum a Sole, ut fit post exortus vespertinos Lunae et inferiorum, vel utroque junctim, ut post exortus matutinos inferiorum; lumine minuti, quando ad Solem recurrunt, ut Luna et inferiores versus occultationes matutinas, vel quando Sol illas appropinquat, ut fit versus superiorum occultationes vespertinas, vel quando obviant sibi mutuo, ut inferiores versus easdem occultationes vespertinas, ubi fit per accidens, ut Luna Venusque lumine minutae tunc dicantur, quando vero etiam carum facies minuuntur, auctae, quando vere augentur. Forto igitur a Luna iste modus loquendi primam traxit originem.

Quantum distant emersiones supra dictae ab occultationibus vicinis, vel utraque a conjunctione Solis? Magna est varietas, et differunt non solum diversorum planetarum inter se, sed etiam unius ejusdemque planetae diversae vices, quia etiam ipsa omnismodi distantia a conjunctione et distantia occultationis ab eadem inter se differunt frequenter.

Dic causas hujus varietatis? Causae potissimum sunt sex, quarum duae, quae et potissimae, pertinent ad librum tertium et doctrinam sphaericam. Prima est obliquitas zodiaci, unde sunt obliquo ascensiones et descensiones variae diversorum signorum zodiaci, in quibus Sol et planetae versantur. Nam stella cadens in aequali remotione a Sole lumineque etiam aequali, si mane oriatur ante Solem in signis recte ascendentibus, multo altius supra horizontem vel supra circulum positionis Solis eminere potest, quam si hoc fuerit in signis obliquis. Idem intelligatur de vespertinis apparitionibus et descensionibus rectis vel obliquis. Secundo haec omnia redduntur evidentiora per diversas obliquitates horizontum. Nam ubi major ista obliquitas, ibi major est etiam varietas ejus effectus. Et accedunt causae magis physicae, diversa scilicet aëris crassities, de qua vide fol. 285. et libro I. fol. 146.

Tertia consistit in propriorum motuum longitudinis diversitate. Nam fixarum occultationes et emersiones ceteris paribus (de quibus vide fol. 286.) brevius distant ab eorum conjunctione cum Sole, quam planetarum; quorum

ut quisque inferior, ita longior est occultationis vespertinae vel emersionis matutinae mora, ceteris paribus. Adeoque Veneris et magis Mercurii morae brevitate superant ipsas fixarum circa has apparitionum species. Vicissim ex radiis Solis vesperi Luna se celerrime expedit, post Mercurius, tardissime Venus, vicissimque vesperi (ceteris paribus) prima se condit Venus, inde Mercurius, Luna tardissime et proxime conjunctionis momento. Nee nihil hic valet unius ejusdemque planetae diversitas motuum, praesertim Mercurii, in apparitione matutina et occultatione vespertina; quibus adde ipsius etiam Solis motuum inaequalitatem.

Quarta est diversa diversorum, diversa etiam unius et ejusdem planetae latitudo. Nam per eam causae prima et secunda variantur evidenter admodum, aucta quippe declinationum varietate.

Quinta consistit in diversa stellarum magnitudine apparenti, unde factum, ut fixis pro ratione rerum ordinum magnitudinis diversi etiam arcus emersionum occultationumque attribuerentur (supra libro III. fol. 285.). Idem igitur obtinet etiam in planetis quodammodo, qui prout Soli junguntur in alia atque alia parte sui eccentrici, majores etiam vel minores apparent, quippe alites atque aliter distantes a centro Terrae, praesertim Mars, cujus inter superiores eccentricitas est maxima. Sed majorem haec causa vim habet penes inferiores in comparatione occultationis vespertinae, quando propinqui sunt Terrae, cum matutina, quando remoti; praesertim Venus, ut quae septies hic fit altior a Terra quam illic. Adde hic diversam claritatem luminis in diversis planetis, quam in Luna quandoque adjuvat vis illuminationis Terrarum, ut supra dictum.

Sexta denique causa consistit in faciei diversitate. Nam Luna et Venus, si non mutarent facies, illa magnitudine, ista claritate luminis subnixae, cernerentur multo diutius.

Die evidentes aliquos effectus harum tot causarum in planetarum apparitionibus. 1. Mars quandoque bis oritur matutinus ex radiis, intermedio tempore, scilicet post conjunctionem cum Sole, rursum ad tempus conditus. Sic etiam bis quandoque conditur radiis ante conjunctionem cum Sole, medio tempore exortu facto irregulari.

2. Venus, quae saepe latet diutissime, aliis vicibus, scilicet in Piscibus retrograda, non occidit vespere usque post conjunctionem cum Sole secundum longitudinem, oriturque mane ante conjunctionem, et sic prius mane emergit, quam vesperi occultetur: ut eodem die vesperi et mane sit conspicua, non obstante hoc, quod in cornu est attenuata.

3. Mercurius in nostro hemisphaerio matutinus in Tauro, vespertinus in Scorpione, quanquam longissime a Sole progressus, non tamen emergit ex radiis et sic rarius in conspectum venit, cum tamen in australibus climatibus tunc clarissime exoritur.

4. Luna aliquando eodem die vetus et nova cernitur, unde illi Graeci nomen posuerunt *ἐρη καὶ νέα*, quod nomen ad diem primum mensis transit, quem nos Calendas dicimus, nonnunquam vicissim quarto demum die a conjunctione emergit vesperi, quando jam integrum a Sole signum et praeterea unum decanum de secundo est emensa. Idem tene de occultatione vice versa.

5. Quin etiam relatum est in monumenta historica, quandoque visam esse Lunam stantem juxta Solem in ipso coeli medio; id factum Hispali anno ni fallor 1553. mense Martio d. 13. Sole in 3° Υ , Luna in 23° Υ . (Conf. vol. II. p. 84, 699). Oportet igitur, ut ista concurrerint: 1) distantia a Sole

in circulo magno fuit 10 vel 11 gradus, quae distantia a Sole dat cornu apparens 19" latum, quae est pars 109. diametri Lunae; 2) ut fuerit aetheris substantia circa Solem pura, ut in eclipsibus Solis, in quibus apparent stellae; 3) ut Terra iis in locis, quibus Sol verticalis est (utl tunc erant montes dicti Lunae in Africa) nive vestita fuerit vel saltem cana nebula; 4) ut vicissim in loco spectaculi coelum purissimum et sudum fuerit et brevia crepuscula. Hisce datis Luna, si non ipsius cornu linea tenuissima, at saltem luce, quam a Terra magnam habebat, enitere visumque movere claro meridie potuit.

Quomodo scimus, quot horas Luna de nocte luceat? Etsi hoc quoque magnam habet varietatem ob causarum supra recensitarum primas quatuor, Plinius tamen omnem hanc varietatem regula generali complectitur, quae medium inter enormia tenet. *Lucet, dodrantes semiuncias horarum adjiciens ab secunda usque ad plenum orbem, detrahensque in diminutionem.* Sensus est: quot dies sunt in aetate Lunae, tot dodrantes totque semiuncias horarum (qualium nox quaelibet habet duodecim) illam lucere usque dum occidit, et hoc quidem a nova ad plenam seu aetatem Lunae 15 dierum. Inde vero quot accedunt dies aetati Lunae supra 15, totidem dodrantes totidemque semiuncias rorsum detrahendas a numero horarum 12 cum aetate dierum 15 collecto: dodrans borae est 45 minuta, semiuncia $2\frac{1}{2}$ minuta, summa $47\frac{1}{2}$, quae sumta quindecies efficiunt fere boras 12. (cf. vol. II. 277.)

IV. De configurationibus planetarum inter sese.

Quid accidit consideratione dignum planetis binis quibuscunque inter se comparatis? Duo valde insignia, unum respectu radiorum, alterum respectu celeritatis vel tarditatis motuum apparentium. Ex illo respectu nascuntur aspectus, vox astrologica, ex ista harmoniae.

Quid est aspectus? Est angulus, formatus a radiis luminosis binorum planetarum apud Terram, efficax ad stimulandam naturam sublunarem.

Quid conciliat his radiorum angulis in Terra suam in illam efficacitatem? Perfectio proportionis inter talem angulum et inter quatuor rectos, unum punctum Terrae circumstantes.

In qua re consistit proportionum perfectio hic considerata? In duabus rebus, 1) ut termini proportionum sint commensurabiles, id est ut angulus, qui facit aspectum, sit pars vel partes aliquotae de quatuor rectis, sic ut talis pars summam rectorum emetatur, 2) ut arcus, qui est mensura hujus anguli, determinetur seu resecetur de suo circulo geometrico, per rectam scilicet vel effabilem vel saltem scibilem.

Quae est ratio nominis aspectus et quomodo aliter dicti? Graece schematismi sunt dicti propterea, quia latus hoc arcum interstinguens est latus schematis seu figurae regularis in circulo; aspectus vero sunt dicti per prosopopeiam poeticeam seu astrologicam; quasi planetae omnes essent in ipsa superficie fixarum sphaerae seque mutuo intuerentur sive vel sic, cum tamen non propter arcus zodiaci, sed propter angulos radiorum in Terra sint efficaces. Et in hoc genere affectionis situs planetarum praecipue valet supradicta fictio poetica penes astrologos, cum planetam unum ab alterius radiis affligi, percuti, oppuguari, opprimi, aut vicissim juvari, foveri, sublevari et mille alias passiones comminiscantur.

Quot sunt figurae regulares scibiles? Sunt quidem infinitae per continuum duplicationem iterum, at radicales tantum sunt tres: trigonus, tetragonus, pentagonus. Ad trigonum referuntur hexagonus, dodecagonus etc., ad tetra-

gonum octogonus etc., ad pentagonum decagonus, icosigonus etc., ad pentadecagonum tricontagonus etc.

Quot sunt igitur aspectus? Vetus astrologia agnoscit tantum quinque: conjunctionem (\odot), cum radii planetarum binorum in Terram descendentes in unam conjunguntur lineam; quod est velut principium aspectuum omnium. 2) Oppositionem (\odot), cum binī radii sunt ejusdem rectae partes, seu cum duae quartae partes circuli a binis radiis interceptae sunt, id est unus semicirculus. 3) Tetragonum seu quadratum (\square), cum una quarta. 4) Trigonum seu trinum (\triangle), cum una tertia seu duae sextae. 5) Hexagonum seu sextilem (\star), cum una sexta. Sed observationes meteorologicae addiderunt semisextum et quincuncem ex dodecagono, cum scilicet una vel quinque unciae, hoc est duodecimae circuli, signa dictae, interceptantur, ut ita omnes partes divisionis duodenariae circuli suos praebeant aspectus.

His vero accedunt alii quatuor ex decagono: decilis, qui interceptat unam decimam circuli, quintilis, qui duas seu unam quintam, tridecilis, qui tres decimas, biquintilis, qui quatuor decimas seu duas quintas, quibus se itidem associant conjunctio et oppositio, quippe quae quinque decimas, id est semicirculum interceptit.

Solent et medicorum illi, qui ad curam aegrorum aut ad crises adsciunt astrologiam, solent inquam octogonum considerare, in quo rursum occurrunt conjunctio, octilis, semiquadrus seu sequadrus, qui octavam partem circuli interceptit, quadratus, qui duas octavas, triocilis seu sesquadrus, qui tres octavas, oppositio, quae quatuor.

Quinam ex iis sunt praecipui, et qui ceterorum gradus? Conjunctio, ut principium omnium, oppositio, ut quae occurrit in omnibus tribus divisionibus circuli, quadratus, ut qui occurrit in duobus, aerea figurae existente effabili, sextilis, ut cujus latus est effabile, semisextus, ut cujus latus perfectioris ordinis inter ineffabilia, et quod duodecies repetitum ambit planum effabile; et trinus, ut cujus latus est effabile potentia.

Secundi ordinis sunt: quintilis et biquintilis, quia, etsi latera eorum ineffabilia deterioris conditionis, participant tamen inter se proportione divina et figurae ipsae praestant congruentia in figuras solidas, quibus accedit quincunx, quia figura ejus secunda est in congruentia planorum, latus socium semisextilis. Decilis vero et tridecilis jam in congruentia deficiunt. Villissimi sunt octilis et sesquadrus, quia formantur lateribus nec effabilibus, nec proportione divina usis, nec vicissim sublevantur insigni congruentia figurae. Ceterae figurae demonstrabiles jam tantum recesserunt a perfectione utriusque generis, ut efficaciae earum evanescent in formandis aspectibus. De his vide librum IV. Harmonicorum meorum.

Compara praecipuos aspectus cum phasibus Lunae. Luna in conjunctione cum Sole est nova vel alens, in sextili Solis est corniculata, in quadrato Solis est biaceta, in trino Solis est gibba, *apogeeos*, in Solis oppositione est plena. Vide schema 66.

Quot gradus vel signa habet quilibet aspectus et quomodo numerantur?

Signa	habet	Grads
0	Conjunctio	0
1	Semisextus	30
	Decilis	36
	Octilis	45
2	Sextilis	60
	Quintilis	72

(Numerantur in circulo magno, qui per loca binorum planetarum configuratorum in sphaera fixarum tractus intelligitur, qui est ad eclipticam plerumque obliquus.)

Signa	habet	Grados
3	Quadratus	90
	Tridecilis	108
4	Trinus	120
	Sesquadrus	135
	Biquintilis	144
5	Quincunx	150
6	Oppositus	180 180 180

Qui aspectus quibus inter se planetis conveniunt? Soli cum Mercurio praeter conjunctionem nullus convenit, quia hic ab illo nequit excurrere usque ad 30° , quae est mensura aspectus minimi, id est semisexti. Soli cum Venere possunt intercedere conjunctio, semisextus, decilis et octilis, praeterea nullus; Veneri vero cum Mercurio praeter hos quatuor etiam sextilis et quintilis. Ceteri planetae bini quique omnes promiscue faciunt aspectus.

Quomodo scimus, quando bini planetae faciunt aliquem ex his aspectibus? Si prius per planetarum latitudines, quas habent ad diem aspectui vicium, quantitas cujusque aspectus jam expressa reducatur ad eclipticam.

Dic regulas de hac reductione generales. 1) Quadratus aspectus planetarum cujuscunque cum Sole vel cum alio, qui caret latitudine, non habet opus reductione, quantumcumque ipse habent latitudinem. 2) Aspectui quadrante minori, si diversae fuerint configuratorum latitudines in plaga vel etiam in quantitate evidenter, minor arcus eclipticae respondet, majori major. 3) Si latitudines propemodum aequales fuerint et plagae ejusdem, tunc omnibus aspectibus promiscue respondent arcus eclipticae majores.

Doce methodum aspectus computandi, quando latitudinem habent planetae. Casus sunt tres: aut enim unus solus habet latitudinem, et tunc, si aspectus est minor quadrante, antilogarithmo ejus, sin major quadrante, complementi ad semicirculum antilogarithmo admittitur antilogarithmus latitudinis; residuum, quaesitum ut antilogarithmus, ostendit arcum eclipticae respondentem illi aspectui, hic ejus complemento ad semicirculum.

Ut si aspectus sit minor quadrante, ut aspectus 30° , antilogarithmus 14384

Unius latitud. 10° , antilogarithmus 1531

Residuum 12853, quaesitum

ut antilogarithmus, ostendit respondentem arcum eclipticae $28^\circ 26'$.

Ita si aspectus sit major quadrante, ut aspectus 144°

Complementi 86° , antilogarithmus 21193

Unius latitudo 10° , antilogarithmus 1531

Residuum 19662, quaesitum

ut antilogarithmus, ostendit respondentem complemento arcum eclipticae $34^\circ 46'$, qui ablatas de 180° relinquit arcum $145^\circ 14'$ respondentem ipsi aspectui 144° .

Ergo cum planetae distant in ecliptica, illic quidem per $28^\circ 26'$, hic per $145^\circ 14'$, tunc in suo peculiari circulo faciunt aspectum, illic semisextum 30° , hic biquintilem 144° .

Aut ambo habent latitudines aequales inter se easque vel diversarum plagarum vel ejusdem: tunc bisecto aspectu quaeritur, ut in primo casu, reductio competens dimidio, si plagae latitudinum diversae, vel complemento dimidii, si plaga eadem.

Sit aspectus 72° , latitudines unius 5° bor., alterius 5° austr. Ergo dimidii 36° , antilogarithmus 20193 diminuat antilogarithmo latitudinis 5° , 381. Residuum 19812 ut antilogarithmus ostendit $34^\circ 53'$, cujus duplum $69^\circ 46'$ est distantia ecliptica planetarum, facientium quintilem. Sicut vero plagae ejusdem utraque latitudo, ergo dimidii aspectus 36° complementum 54° , antilogarithmus 53139, hinc aufer ut prius

ant. 381, residuum erit 52758, ejus arcus $53^{\circ} 50'$, complementum reductionis dimidii $36^{\circ} 10'$, tota ergo $72^{\circ} 20'$.

Haec erit distantia ecliptica facientium quintilem, si aequales et ejusdem plagae latitudines, utriusque 5 graduum.

Aut differunt latitudines quantitate, et processus fit operosior; cujus ecce typum.

Primum si plaga eadem. Sit latitudo Saturni $2^{\circ} 20'$ merid., Veneris $4^{\circ} 35'$ merid., et debeant facere aspectum 60° .

Ergo compl. lat. maj.	$85^{\circ} 25'$	Logarithmus	320
Minoris	$87. 40.$	Logarithmus	88 (83)
Differentia	$2 15.$	Summa	408
Aspectus	$60.$		
Differentia $57. 45.$ Dimid. $28. 52\frac{1}{2}.$		Logarithmus	72795
Summa $82. 15.$ Dimid. $31. 7\frac{1}{2}.$		Logarithmus	65989
		Summa	138784
		Summarum differentia	138376
		Arcus $30. 2\frac{1}{2}.$ Logarithmi dimidium	69188
		Duplium $60. 5.$ Hae est reductio quaesita.	

Rursum si plagae diversae. Sit latitudo ζ $4^{\circ} 0$ bor. ζ , $10^{\circ} 0$ austr., debeant facere aspectum 72° .

Ergo compl. lat. maj.	$80. 0$	Logarithmus	1531
Dist. ζ ab illo polu	$94. 0.$	Logarithmus	244
Differentia	$14. 0.$	Summa	1775
Aspectus	$72. 0.$		
Differentia	$58. 0.$ Dimid. $29. 0.$ Log.		72400
Summa	$86. 0$ Dimid. $43. 0.$ Log.		38273
		Summa	110673
		Summarum differentia	108898
		$35. 28.$ Logarithmi dimidium	54449

$70. 56.$ Haec est distantia ecliptica quaesita, quam si asequuntur planetae, his latit faciant quintilem gr. $72.$ ⁸⁶⁾

Quinam ex aspectibus est observationis praecipuae? Conjunctio, ut quae magna parte incurrit in oculos, planetis eodem zodiaci loco invicem appropinquantibus.

Quid consequitur conjunctiones? Revolutiones seu ἀποκαταστάσεις temporum variae.

Qua re definitur aliqua temporum ἀποκατάστασις? Concursu duarum vel plurium conditionum, ad conjunctionem accedentium: verbi causa, si non tantum Sol et Luna rursus coeant, sed coitus etiam ineidat in eundem locum zodiaci cum priori, vel si non tantum duo coeant, sed etiam tertius iterum accedat, vel si Luna non tantum latitudinis anomalias eolverit, reversa ad eundem nodum, sed etiam simul in conjunctionem vel oppositionem Solis, aut in eundem locum zodiaci ineidat in isto reditu ad nodum.

Quot sunt potissima genera apocatastasium? Duo: vel enim singuli planetae et ad Solem et ad locum eundem zodiaci referuntur, ubi tempus quaeritur, intra quod planeta stationes et retrogradationes suas, vel Luna phases suas per totum zodiacum circumfert, vel planetae ad se mutuo adque zodiaci loca referuntur.

Recense apocatastases singulorum cum Sole? Saturnus et Sol restituntur simul ad eundem zodiaci locum proxime intra annos 59, ita ut Saturnus bis, Sol 59^{ies} zodiacum emetiat. Jupiter intra 83 Solis reditus conficit septem suos. Mars valde magnis interstitiis distribuit suas cum Sole conjunctiones. Igitur apocatastases ejus, quo longiores sumuntur, hoc sunt accuratiores.

Brevissima habetur solarium annorum 15, quos intra ipse revertitur octies; proxima annorum 17, quibus ipse conficit novem periodos; accuratior est annorum 32, quibus 17 sunt revolutiones Martis per zodiacum; sequitur periodus annorum 47, in qua sunt 25 reditus Martis. Adhuc accuratior annorum 79 solarium, habens 42 revolutiones Martis, et haec prae ceteris in exactimatione est apud astrologos. - Venus intra 8 annos solares revertitur quinque satis accurate, et sic Soli superius jungitur quinque locis, binis inter se distantibus spatulo 72°, quibus quique locis sequentes copulae lento admodum passu et brevibus spatiis per octonos annos excedunt, ut sic interfecti 72° vix intra duo semis secula consumantur totosque zodiacus copulis istis frequentatur. Mercurius contra intra 13 solares 54 circuitus absolvit, quare copulas sui cum Sole liberaliter per totum zodiacum spargit, interstitio non majori quam 6 vel 7 grad. ratione media. Luna denique duodecim reditus ad Solem absolvit aliquanto breviori tempore, quam Sol ad initium cursus revertatur, itaque ut accuratior fiat apocatastasis, opus est longiori tempore: hinc natae sunt observatione gentium trieteris, complexa menses lunares 37, nec tamen hoc accuratissime, octaëteris, mensium 99, ita ut centesimus initium faciat octaëteridis sequentis, hendecaëteris, mensium 136; et omnibus his accuratior composita ex utraque, ennekaedecaëteris, mensium 235, cumque adhuc quadrantis unus dies differentia supersit, quo minus novilunium revertatur in locum pristinum, Calippus quadruplicavit numerum, constituta periodo annorum 76, mensium 940:

V. De annis politicis lunaribus.

Quis est usus apocatastasium Solis et Lunae? Cum Luna phasium permutatione moveat atque in se convertat omnium hominum oculos, factum est, ut signa temporum a Luna petentes exordia suorum annorum ab exordio phasium, id est a novilunio petierint gentes plurimae, praesertim illae, penes quas discrimina aestatis et hiemis non admodum sunt evidenter, cum reditus Solis ad loca pristina, qui annum definit, non facile nec aliunde cognosci posset.

Quotuplex est lunaris annus? Duplex; solutus et ligatus. Solutus duodenum perpetuo mensium, quorum pars dimidia paulo plus tricennum dierum est, pars reliqua 29. Talis anni primus mensis successu annorum excurrit in hiemem, inde in autumnum, post in aestatem, et denique, tricesimo anno exaeto, rursum in ver transit. Tali utuntur Turcae ex disciplina Arabum. Ligatus (intellige ad solem annum) mensibus utitur intercalariis habetque quartus vel tertius quisque menses tredecim, ut ita primus mensis semper circa eandem tempestatem anni solaris oberret, nunc antecedens aliquot diebus, nunc sequens. Horum est usus apud Iudaeos et apud Christianos ecclesiasticos.

Quanta est longitudo horum annorum? Quidam dicuntur simplices suntque dierum solidorum 354 vel 355, quidam embolismel, intercalarii, solidorum dierum 384 vel 385 et prout artis ingenium fuerit, quidam etiam dierum 353, 383, qui dies, quia more iudaico a vespera, Luna oriente incipiunt, ex eo Lunae dicuntur, et prima Luna, quae prima et post novilunium, reliquae suo quaque numero.

Quot modis alligantur anni lunares ad solem, et quae hinc nascuntur apocatastases? Duobus modis alligantur, vel ad naturalem quantitatem anni solaris, vel ad politicam ejus ordinationem, qualis est periodus Juliana; et cum ad naturalem alligantur, apocatastasis vel circulus brevior quidem est

enneakaedecaëteris, Arato celebrata, longior 76 annorum, quae fuit Calippi periodus; longissima et accuratissima Hipparchi quatuor Calippicas complectitur, est enim annorum 304, quos intra dies una de rationibus Calippi demittit.

Cum vero enneakaedecaëteris seu periodus Calippica 76 annorum accommodatur ordinationi anni Juliani et observationi Judaici cycli, dierum septemnum perpetui, equidem Juliana ratio per se continet cyclum annorum quatuor, quos intra, ut supra in theoria Solis et libro III. est dictum, unus bissextus intercalatur, qui quatuor summi septics, ut una et bissextus et feria septimanae seu litera dominicalis redeat, conficiunt Solis cyclum dictum annorum 28. In hanc igitur summam ductus numerus annorum novemdecim, cyclus Lunae dictus, conficit periodum annorum 532 politicum, a Dionysio Abbate auctore denominatum; post exactos totidem annos omnes et bissexti et feriae et intercalares menses eodem ordine redeunt, quanquam hic cyclus vitiosus est, quia rationes Calippicas tenet, neglecta correctione Hipparchi, unde plus quam sesquidie rationes Lunae excedit, rationes vero Solis quadriduo.

Quid potissimum observandum est circa hunc cyclum magnum 532 annorum? Hujus vitiosi cycli observatione factum est, ut intra 1600 annos ab aequinoctio vero aberrarit aedes ipsi destinata in calendario per dies 12, Lunaque calendarii a Luna coeli per dies 5. Quod cum, qua dabatur, emendariut regna et provinciae plurimae, iude sit, ut inter illos et reliquos, qui tenent, rationes antiquas, crebro discrimen paschatis intercedat, unus, quatuor vel 5 septimanarum, quia pascha nonnisi domiica post Lunam decimanquintam, proximam post aequinoctium, celebrari potest.

Quid est aureus numerus? Cyclus Lunae, seu numeri novemdecim, adscripti arte singulari ad dies calendarii Juliani literis aureis; hoc nomen accepit ab ipso primi auctoris facto. Sunt autem ii numeri indices Lunae primae non semper verissimae, sed usalis seu artificialis, quilibet in illo anno cycli, quem ipse indicat ordine suo.

Quae ratio fuit, unum annum prae alio primum in decemnovennati cyclo constituendi? Propinquitas novilunii ad aequinoctium illius temporis, quo haec ordinatio fuit facta, scilicet ante tempora Constantini Magni et ante annum Christi 300, tunc enim aequinoctium fuit in 22. Martii Juliani; ergo quo anno coincidit novilunium in vespera diei 22. Martii, eo anno dies 23. Martii dictus fuit Luna prima isque annus fuit habitus pro primo, ideoque ad 23. Martii stat aureus numerus I.

Cum autem 28 cycli decemnovennales constituent unum cyclum magnum, quo delectu primus est sumtus, cum quilibet potuisset esse primus? Is cyclus decemnovennalis fuit primus sumtus, qui ad annum 42. Imperii Augusti propius accessit cum suo initio: quia cum Christus anno 15. Tiberii fuerit quasi 30 annorum, ergo demtis his 15 primis Tiberii et ultimis 15 de 57 Imperii Augusti venit ad 42. annum Imperii Augusti pro nativitate Christi praeter propter. Annus autem, qui die 23. Martii novilunium haberet, proximus huic termino, fuit 45. Julianus seu 44. Augusti. Hic igitur factus est caput cycli magni Dionysiani annorum 532, acciditque pulchro casu, ut ipse esset etiam (vel esse debnerit) bissextilis: ut ita proximo mense post diem intercalatum inciperet annus lunaris, scilicet ab aequinoctio.

Pro cyclo Lunae sciendo jubent ad annos Christi usuales addere unitatem, a summa abicere omnes cyclos Lunares; quaero, unde constet, Christum natum anno 2. cycli, Juliano 46. et quae circa hoc observanda? Annus

iste non congruit historiae, sed congruit cyclo illi artificiali secundum posita haec duo: primo quod Christus sit natus in solstitio brumali, die 25. Decembris, quae traditio est antiqua, secundo quod Zacharias, pater Joannis Baptistae, vel ipso pontifex maximus Judaeorum vel pontificis vicarius, viderit angelum annunciantem conceptionem Joannis Baptistae, cum ipso ingressus esset sanctum sanctorum die expiationis, quae solebat esse decima mensis septimi, Tisri dicti. Hanc hypothesein de Zacharia, qui fuit ex sorte Abia, relinquo examinandam theologis, rerum Judaicarum illius temporis peritis. Jam si Christus in solstitio brumali natus, est igitur annunciatum novem mensibus aut in aequinoctio verno. Id vero angelus affirmavit fuisse sex mensibus post conceptionem Joannis. Joannes ergo annunciatum et conceptus fuit in aequinoctio autumnali, circa 25. Septembris. At annunciatum est X. Tisri seu Luna X. mensis septimi a vernali, secundum hypothesein secundam. Nullus vero annus cycli habet Lunam X. die 25. Septembris, seu Lunam I. 16. Septembris, praeter annum cycli primum, quia aureus I. stat ad 16. Septembris: ergo anno primo cycli conceptus Joannes, anno ergo secundo cycli conceptus et natus est Christus, positus veris illis, quae dixi. Ita nostra aera non est historica, sed artificialis et hypothetica, a vero non nimium remota. Et notandum, quod hodie nos illam aliter intelligamus, quam ab ejus auctore sumus docti. Ille ponebat Christum conceptum in principio anni aconidi cycli incipientis, quippe ab aequinoctiali novilunio, natum in bruma sequenti, finiente anno 46. Juliano, ideoque dicti sunt olim anni non nativitate, sed incarnationis Christi; at nos hodie opinamur Christum natum bruma antecedente, currente adhuc primo anno cycli, et jam finiente anno 45. Juliano, nobis ergo sunt anni a nativitate. Id propius, quidem est veritatis historicae, aberrat tamen adhuc et ab illa et simili a rationibus hujus cycli.

VI. De conjunctionibus magnis et maximis.

Quid praecipue notatu dignum occurrit circa conjunctiones planetarum inter se promiscue? Conjunctiones trium superiorum, magnae et maximae dictae.

Quid magnam conjunctionem appellant? Conjunctionem Saturni et Jovis, quae plerumque tam diu durat, donec accedat et Mars, superiorum tertius, quod vel maxime conspiciendum est spectaculum, tres magnae stellae, fulgentes, sine scintillatione, uno coeli loco.

Quid est conjunctio maxima? Quando talis conjunctio contingit circa praeincipium zodiaci, quo est in nostris zonis principium Arietis.

Quantum ab invicem distant binae et binae? Conjunctio una Saturni et Jovis media, seu linearum motus cujusque medii, distat ab alia annis 20 fere, in zodiaco vero triente circuli retro, paulo minus. Ita fit ut quarta conjunctio post annos 60 superet locum initialem per gradus 9 ciroiter. Maxima igitur fit post annos paulo minus 800, id est post 794.

Quomodo dividitur una periodus octingentorum annorum? In quatuor triplicitates seu trigonos: igneam, terreum, aërium, aërium, aërium, singulos 200 annorum. Nam primae 10 conjunctiones fiunt in signis igneae triplicitatis, Ariete, Sagittario, Leone, ut anno 1584, 1604, 1623 etc. Sequentes 10 conjunctiones in terreis signis, Tauro, Capricorno, Virgine. Tertius denarius conjunctionum transfertur in signa contigua trigoni aërii, Geminis, Aquario, Libram. Ultimae decem conjunctiones disperguntur per signa triplicitatis aqueae, Cancrum, Pisces, Scorpionem. Sic ager iste zodiaci ab hoc veluti jugo superio-

rum planetarum contiguis suleis successive totus aratur, seu magis appositae, a conellis planetarum ex omni parte frequentatur. Vide huc aptum schema. Vol. II. p. 637.

Distingue aetates per mundi conjunctiones maximas, accommodatis historiis notis. Etsi mundus sub ipsissimam conjunctionem magnam Saturni et Jovis fortasse non est conditus, alia enim est libertas harum rerum in archetypo, aliud item genus rerum, quod hic in Terris inque uno mundi angulo, post institutos jam ex archetypo motus, necessitate geometriae consequitur, quod, quippe sensibus obvium, nos homines, quasi singulariter in constitutione archetypi quaesitum suspicimus et celebramus: tamen primae conjunctiones magnae, quae post mundi ortum esse potuerunt, Indiae chronologia contigerunt circa principium triplietatis igneae et finem aquaeae. Sit igitur prima conjunctio maxima in ortu mundi vel eirea lapsum Adam. Secunda, dum Henoch vitam in Terris divinam ageret, cujus abavus Eoos, superstitionibus omnibus patriarehls, cultum divinum solennem seu invocationem divini nominis instituit, cum Cainitae urbes munirent, artes inveirent. Tertia diluvium novamque propagationem generis humani assequitur. Quarta incidit in exitum Israelitarum ex Aegypto datamque legem. Quinta principia habet servitutis Israelitarum in Media, extincto regno decem tribuum sub Esaa, qui clarissima de Christo vaticinia prodidit, quando et Olympiades institutae et Nabonassaris anni principium habent et Roma condita fuit. Sexta habet Messiae promissi ortum ex virgine, anno mundi 3970 secundum quosdam; qui est praeceius modus quinque maximarum conjunctionum. Nam 794 anni quinquies sumti sunt 3970. Septima Carolum Magnum assequitur. Octava, quae fuit insignita stella nova, nostra haec tempora. (Cfr. Vol. II. p. 636.)

VII. De eclipsibus seu deliquiis luminarium, primo Lunae.

Quodnam insigne est accidens commune tam conjunctionibus et oppositionibus Solis et Lunae, quam illuminationi corporum Lunae et Terrae, quae est a Sole? Privatio luminis, graece *ἐκλειψς*, latine deliquium vel defectus dicta, praecipuum eorum, quae Graeci *παθη*, Latini passiones dixerunt; sic enim loqui consuevimus, Solem et Lunam pati deliquium, et poetae Solis Lunaeque labores canunt, videnturque ceterae omnes motuum affectiones propter similitudinem cum his passiones dici. Privatur autem Sol luminis nonnisi in conjunctione cum Luna, vicissim Luna nonnisi in oppositione cum Sole.

Ergone vere patiuntur hanc luminis diminutionem luminaria? Luna quidem vere spoliatur lumine, quod habet a Sole; Sol vero etsi tegitur oculis nostris, non ipse tamen amittit lumen, sed ejus loco Telluris partes aliquae certae spoliantur lumine Solis, non aliter quam prius ipsa Luna.

Unde hoc evenit Lunae, ut quo tempore plena debuit esse, subito lumine vel tota priceatur vel in parte corporis? Ex interposito globi terreni Soli inter et Lunam, quod hinc scimus, quia constat nobis, Terrae corpus esse opacum nec transmittere radios Solis, sed projicere umbras in oppositum Solis. 2) Quia dictum in superioribus, Lunae lumen a Sole esse, et legibus opticeis per rectas lineas Lunae infundi. 3) Quia nunquam Luna damnum hoc luminis extraordinarium incurrat, nisi in oppositione sui cum Sole, hoc est cum Sol, Terra et Luna fuerint in eadem linea recta et Terra interposita inter luminaria, sic ut Luna stet a plaga, in quam porrigitur umbra Terrae.

Atqui si haec oppositio Lunae causa est defectus, qui fit, quod non in

deris? Ex intervallis, libro IV. fol. 326, 328. stabilitis, Solis quidem 3469, Lunae 59 semidiametrorum Terrae, sequitur parallaxis, Solis quidem 59 secundorum, seu minus uno scrupulo in apogaeo, in perigaeo tanto plus uno scrupulo; Lunae apogaeae 58' 22", perigaeae 63' 41".

Doce metiri angulum in vertice coni umbrae seu mucronem ejus. Si ab angulo semidiametri Solis apparentis in Terra demseris parallaxin Solis, relinquetur dimidium anguli mucronis hujus.

Ut si Solis semidiameter ABS sit 15', BSV vel BSC parallaxis Solis 1', erit semis- sis mucronis 14' sc. SCB vel VCB.

Doce et longitudinem umbrae Terrae metiri. Semidiametrum Terrae duc in distantiam Solis et Terrae, factum divide per excessum semidiametri Solis super semidiametrum Terrae.

Ut quia libro IV. folio 326. proportio diametrorum fuit quindecupla paulo major, intervallum vero Solis et Terrae 3469 semidiametrorum Terrae: aufer 1' semidiametrum Terrae a 15' plus, semidiametro Solis, cum residuo 44' plus divide factum ex 1 et 3469, id est 3469, proveniunt longitudini umbrae Telluris semidiametri Telluris 247 plus. 29)

Est igitur umbra amplius quam quadruplo longior intervallo Lunae et Terrae, ut quod non fit majus 59 semidiametris, ex quo apparet, necessario Lunam interdum per umbram trajicere.

In schemate sit BC longitudo umbrae 247 semidiametrorum Terrae BE, at BG altitudo Lunae in apogaeo 59 semidiametrorum Terrae BE.

Quid appellant astronomi semidiametros Solis, Lunae vel umbrae, et quantae sunt eae? Sic dicuntur anguli, quibus Solis, Lunae vel circuli umbrae in loco transitus Lunae semidiametri cernuntur in Terra, seu quos in centro Terrae formant lineae, in terminos illarum semidiametrorum recta ob- jectarum eductae.

ABD Solis semidiameter in apogaeo est 15', in perigaeo 15' 33", Lunae IBL in apogaeo item 15' 0", in perigaeo 16' 22".

Unde habetur semidiameter umbrae in quolibet loco transitus Lunae? Conjiungantur in unam summam parallaxes horizontales Solis et Lunae, ab hac summa abjiciatur semidiameter Solis apparens, relinquitur semidiameter umbrae in illo loco transitus Lunae, cui summa parallaxis competit. 28)

Ut si semidiameter Solis sit 15' 30", parallaxis Solis 1' 1", Lunae 62' 15", summa utrinque 63' 16". Ergo abjatis scrupulis 15' 30", restant 47' 46" pro semidiametro umbrae Terrae GBF in loco transitus Lunae FGQ.

Quae varietas occurrit hujus semidiametri umbrae? Quo altior est Luna, hoc brevior est semidiameter umbrae, quo humilior illa, hoc ista longior. In apogaeo igitur Solis et perigaeo Lunae omnium est longissima 49' 40", in perigaeo Solis et apogaeo Lunae omnium brevissima 43' 50".

In schematibus 92, 93. AG vel AF est semidiameter circuli GONMF, quo umbra intelligitur secta in loco transitus Lunae.

Quot sunt eclipsium lunarium formae? Tres: partialis, totalis sine mora in tenebris et totalis cum mora.

In schemate priore (92.) pinguntur partiales; si puncta V Lunae et N umbrae coirent, totalis esset sine mora. In altero eclipsis est cum mora totalis.

Quis dicitur arcus inter centra seu latitudinarius? Est arcus ex centro umbrae in viam seu orbitam Lunae perpendicularis, proxime minor latitudine Lunae peneque cum ea coincideus.

Ut si A centrum umbrae, FAG ecliptica, eique ad rectos QTA, circulus latitu-

dinis, BCE via centri Lunae, obliqua ad FAG eclipticam, ex A in BE perpendicularis AC, (corrigitur schema 92, ut AC sit perp. BE) tunc AT quidem esset latitudo Lunae, si centrum ejus esset in T in vera oppositione; at AC, vicinissima ipsi AT, dicitur arcus inter centra.

Quantus requiritur hic arcus ad unam quamlibet formam eclipses? In totali sine mora arcus iste additus semidiametro Lunae summam facit aequalem semidiametro umbrae; in totali cum mora minorem semidiametro umbrae; in partiali majorem quidem semidiametro umbrae, minorem tamen summa ex semidiametris umbrae et Lunae confecta.

Ut AE est summa AO, OE semidiametrorum, AV vero in schemate priore est illa quidem minor, major tamen quam AN, semidiameter umbrae; non igitur totalis, sed partialis est eclipsis. In altero schemate AC minor est quam AD, AK, differentia semidiametrorum, Itaque AV minor est quam AN, totalis igitur eclipsis.

Quid sunt scrupula 1) durationis dimidia, 2) incidentiae seu casus, 3) emersionis, 4) morae dimidia? Sunt arcus viae Lunae, in quibus existente centro Lunae, vel 1) deficit aliqua pars Lunae, Lunae 2) vel incidente in umbram, 3) vel emergente, 4) vel etiam Luna tota obscuratur.

Ut BC, CE sunt scrupula durationis dimidia, BK incidentiae, DE emersionis, KC vel CD morae dimidia. Et si vero incidentia seu casus et emersio proprie tantum de totalibus usurpatur, tamen etiam in partiali prioris schematis BC incidentia dici potest, CE emersio.

Quomodo differunt duratio et mora? Duratio est de omnifario defectu intelligenda deque omnibus eclipsibus; mora tantum de quarundam defectibus plenariis, subintelligitur enim: in tenebris vel umbru.

Quod est medium eclipsis seu summa obscuratio? Quando centrum Lunae est vel junctum centro umbrae, vel in perpendiculari illa ex centro umbrae in viam Lunae. Ut fig. 93, quando C centrum in AN incidit.


Quare non uteris circulo latitudinis AQ, ad eclipticam potius recto, ut in astronomia veteri? 1. Quia, proprie loquendo, Luna in hunc circulum incidens non profundissime venit in umbram. 2. Quia tempora et scrupula incidentiae BT et emersionis TE redderentur inaequalia, collata ad hunc circulum ATQ. 3) Quia alie compendiosius computantur duratio et mora in tenebris.

Quomodo computanda sunt scrupula durationis dimidia, mora dimidia, incidentiae, emersionis? Ab antilogarithmis summae et differentiae semidiametrorum Lunae et umbrae aufertur unilogarithmus arcus inter centra seu latitudinarii, residuum quaesita inter antilogarithmos ostendunt inter arcus scrupula illic durationis dimidia, hic morae dimidia: his vero morae ab illis durationis ablatis, relinquuntur scrupula incidentiae et emersionis.

Ut BC computatur ex AB summa et AC, quia BCA rectus, sic KC ex AK differentia semidiametrorum et ex AC; ablato vero KC a BC, manet BK.


Qua re differunt loca verae conjunctionis et obscuracionis maximae?

Fig. 92.



Differunt in aren minimo, duplo reductionis Lunae loci ad eclipticam, ejus

Fig. 13.



arcu Luna in obscuracione maxima semper est vicinior nodo, quam centrum umbrae.

Ut si T esset locus conjunctionis, C est locus obscuracionis maxime, TC duplum reductionis ad eclipticam.

Quantus est angulus latitudinis, seu intersectionis viarum Solis seu umbrae FG et Lunae BE in eclipsis? Paulo supra dictum est, in copulis hunc angulum esse maximum, $5^{\circ} 18'$. Vetus astronomia usurpat minutum $5^{\circ} 0'$ damno calculi.

Unde discimus quantitatem AC arcus inter centra seu latitudinari? Ex distantia A centri umbrae a loco nodi, seu arcu eclipticae interjecto, qui sola reductione ad eclipticam dimidio ipsius TC differt ab argumento latitudinis, seu ejus complemento ad semicirculum.

Quid sunt termini ecliptici Lunae et quanti ii? Terminal ecliptici sunt arcus eclipticae, incepti a nodo, in quibus arcubus versante arcu inter centra, eclipsari potest saltem aliqua particula corporis; desinunt autem in illa puncta ante et post nodum, in quibus versante arcu inter centra, Luna in oppositione cum Sole umbram tangit, nec delibat; minimus est $10^{\circ} 40'$ in apogaeo Lunae, maximus $12^{\circ} 0'$ in perigaeo Lunae.

Si umbra in perigaeo Lunae profundior seu crassior est et longior Lunae trajectus, anne igitur tunc duratio eclipsis longissima? Imo breviori tunc spatio temporis Luna laborat ceteris paribus, et vicissim in apogaeo, breviori transitu, moratur diutius. Perigaeae namque Lunae horarius motus ad horarium apogaeae in majori proportionem est, quam trajectus perigaeus ad apogaeum.

Quot elementis constat verus Lunae horarius, in eclipsis utilis? Quinque his: primo est horarius Lunae aequabilis seu medius periodicus, deinde ejus aequatio simplex ex soluta anomalia, tertio sub ipsam horam syzygiae accedit aequatio menstrua, quibus duobus elementis medius ille minuitur in apogaeo, augetur in perigaeo; quarto variatio accelerat utrumque omnesque intermedios, quemque in sua proportionem, quinto denique auferendus est ab horario Lunae sic formato horarius Solis, qui pro tempore fuerit, ut habeatur vera superatio horaria.

Quanta est igitur varietas verorum horariorum in eclipsis? Horarius ab aequinoctio, minimus in apogaeo, prodit per variationem Tyconicam $29^{\circ} 46''$, maximus in perigaeo $38^{\circ} 30''$, sed per variationem auctam ille $29^{\circ} 56''$, iste $38^{\circ} 43''$, hinc ablati medius Solis motus horarius, relinquit $27^{\circ} 18''$ vel $27^{\circ} 28''$, et $36^{\circ} 2''$ vel $36^{\circ} 15''$. Ubi notandum, rectius auferri horarium Solis, qui est quovis tempore.

Quanta hinc efficitur duratio maxima eclipsium Lunarum, quanta et mora maxima totalium, et quomodo computanda? Divisa summa vel dif-

ferentia semidiametrorum Lunae et umbrae in horarium, proveniunt horae et minuta durationis vel morae longissimae. Per logarithmos logistice sic: ⁽⁶⁰⁾

In perigaeo Solis et apogaeo Luonae.		Summae semidd. 58' 53"	
Horarius ☉	2' 33"		
Horarius ☾	29. 46. vel 29' 66"		
Horarius ☾ a ☉	27. 13. vel 27. 23.	Ergo horarum 2. --	54' 26" vel 54' 46".
Logarithmi	79080. 78100.	Scrupula resid. 4. 27. vel 4. 7.	
Logar. resid.	260000. 267600.		
Logarithmi	180922. 189200.	Illi ostendunt	
minuta 9' 50" vel 9' 3" supra 2 horas.			
Tota igitur duratio horarum 4. 19' 40" vel hor. 4. 18' 6".			

Hoc modo si procedamus etiam in apogaeo Solis et apogaeo Lunae, duratio maxima prodibit h. 4. 20' 4" vel 4. 18' 18". In apogaeo Solis et perigaeo Lunae maxima duratio h. 3. 39. 22. vel 3. 38. 46. In perigaeo Solis et perigaeo Lunae maxima duratio hor. 3. 38' 40" vel 3. 37' 26".

Morarum vero differentia minor est, quam durationum omnimodarum, quia minorem habet Luna perigaea proportionem ad transitum suum, quam apogaea ad suum: quippe semidiameter Lunae apparens propter unam solam causam augetur in perigaeo, at semidiameter umbrae propter duas.

Ergo mora longissima in perig. ☉, apog. ☾ hor. 2. 7' 20" vel h. 2. 6' 58"	
In apog. ☉, apog. ☾	2. 8. 36. vel 2. 7. 58.
In apog. ☉, perig. ☾	1. 50. 38. vel 1. 50. 46.
In perig. ☉, perig. ☾	1. 49. 24. vel 1. 48. 48.

Quomodo scitur tempus incidentiae vel emersionis? Subtractione dimidia morae a dimidia duratione: remanet tempus vel incidentiae vel emersionis, sunt enim aequalla ista.

Unde habentur scrupula defectus in partiali eclipsi vel quacunque non centrali? Subtractione areus latitudinarii a summa semidiametrorum Lunae et umbrae habentur scrupula defectus.

Quid sunt digiti ediptici et quomodo computantur? Sunt unciae de semidiametro Lunae. Multiplicanturque scrupula defectus in 12, summa dividitur per semidiametrum Lunae. Seu a logarithmo logistico semissis scrupulorum defectus aufertur logarithmus semidiametri Lunae: quod relinquitur, id ostendit in sua columna digitos deficientes.

Quot digitis Luna potest deficere? Proprie loquendo non pluribus, quam ipsa habet in sua diametro, sed astronomi, abusi voce digiti, convertunt etiam residua scrupula in eclipsi totali cum mora in digitos, expendentes, quantum Luna deficere posset, si etiam maior esset ejus semidiameter in illam piagam extensa, quam centrum Lunae obtinet.

Igitur addita semidiametro Lunae perigaeae 16' 22" ad semidiametrum umbrae perigaeae 38' 40", accrevit scrupula 65' 2", cujus dimidii 32' 31" logarithmus est 61249. Hinc aufert logarithmum 32' 44" diametri Lunae 60600.
Residuum 649
ut logarithmus ostendit in sua columna digitos 23. 39.

Quae causa est, cur Lunae lumen jamjam defecturum prius habeatur et palliat, praesertim in parte, quae vicina est umbrae? Causa non inest in ipsa plenaria amba Terrae, quasi haec de se ipsa radiet nigrorem aliquem eoque afflet Lunam propinquantem, ut incaute nonnulli vel ipsi scribunt vel a lecoribus intelliguntur; sed fit hoc ideo, quia priusquam totus Sol tegatur alicui particulae Lunae, hoc est priusquam Luna totalem umbram delibare incipiat, major atque major pars Solis ipsa a Terra interceptitur. Totus autem

Sol clarius Lunam illuminat, quam pars, et haec major clarius, quam minor. Vide Astr. Part. Opt. fol. 239. (II. 280.)

Num omnes eclipses Lunae quadrant ad has rationes? Crebro fit, ut substantia lucida circa Solem flammata ex contactu Solis irradiet extimos umbrae terminos, coque Luna, quanquam tota in umbram immersa, margino tamen extremo hos radios excipiat: quae falsa lux, cum ad veram ex Sole aliapsam comparari non possit (quippe Luna reliqua penitus extincta), ipsa pro vera habetur, ita ut Luna non tota in umbram ingressa censeatur. Hac ratione fit, ut morae multo breviores aestimentur eclipsium totalium. Quin etiam illae, quae totales sine mora sunt aut cum mora brevissima, censeantur ob hanc causam non totales, sed partiales, quasi a septentrione vel meridie aliquid supersit. Vide Astr. Part. Opt. fol. 302 (II. 319). Et sic censet etiam Galilaeus.

Unde constat, hanc excusationem esse legitimam? Quid si namque causas rubrint, astronomiae nondum satis cognitae? 1) Imo tam evidens est hic effectus, ut si ad causas astronomicas referatur, contradictiones apertissimas involvat totamque rationem dimensionum umbrarum legesque opticas certissimas evertat. 2) Testimonium vero huic causae physicae perhibent etiam solares eclipses nonnullae, de quibus infra. 3) Cum diametrum Solis obervamus radio, per angustissimum foramen immisso, fimbria haec fusi coloris, quando praesto est in coelo, pingit se ipsam clarissime super tabella circa Solis discum, adeo ut luter discum Solis et hanc fimbriam discriminans terminus non appareat, coque Solis diameter certo major justo tunc colligatur.

Quae causa est, cur Luna in totalibus eclipsibus tanta varietate appareat, interdum penitus amittatur, interdum evidentissimo rubore vel tota vel in parte corporis emiteat, nec semper ea aequaliter ad umbrae marginem proximum versa, sed alitrinsecus latius excurrente? Nec proprium Lunae lumen in causa est, esset enim perpetuum, saltem in eadem parte corporis, nec illa substantia lucida circa Solem in ipso aethere, illuminaret enim ordinate vel totam vel solas extremitates marginis, umbrae proximas. Sed oportet ut Luna parte illa corporis, quae rubet, lucidat in radios Solis secundarios, hoc est in aëre nostro circa Terram fuso bis refractos, semel in ingressu, iterum in egressu: quibus ipsa radiis semel in ingressu refractis nos Solem videmus, cum is adhuc infra nostrum horizontem est, et videmus quidem et ipsum tunc rubentem. Cum enim hi radii semel refracti sint adhuc tam clari, ut diem penes nos (quanquam non clarissimam, ut a nudo et sudo Sole) efficiant, poterunt etiam secundo in exitu versus Lunam refracti claritatem in ea causari non multo miorem. Haec causa est idonea ad repraesentandam effectus illius varietatem. Nam circulus ille Telluris seu globi elementaris, ex quo umbra Terrae quovis momento assurgit, tenditur per omnes zonas, excurrentes ab uno polari ad oppositum, aëris vero constitutio per diversas zonas est diversa, quare etiam refractiones quantitatis non unius causabitur. De his vide plura in Astr. Parte Opt. fol. 271. et praesertim fol. 279. schema. (II. 300. 304.) Item in Dissertatione cum Nucleo Sidereo fol. 20. (II. 498.)

Si nequit Luna privari lumine Solis extra lineam oppositionis, per Solem, visum et Lunam traductam, qui fit igitur, quod interdum Sol et Luna eclipsata simul supra horizontem et sic non in una linea recta compareant? Hujus rei culpam sustinet aër, quo Terra, domicilium oculorum, vestitur. Nam radii hinc Solis inde Lunae, utriusque sub horizonte versantis, ubi superficiem aëris tetigerint, ut mediis densioris, refringuntur deorsum ad oculum in pro-

fundo aëris latitantem. A quibus igitur plagis allabuntur ultimi radii Solis et Lunae, scilicet ab altitudine utrinque nonnulla supra horizontem versus eas plagas, in illas scilicet altitudines luminaria reponit oculus deceptus, quia de refractione radiorum facta nihil illi constat; opinatur igitur, lineam esse unicam ab oculo usque ad luminare. Vide supra, libro I. fol. 148. schema et explicationem.

Num etiam aliae stellae sic obscurantur, ut Luna? Ab umbra quidem Terrae nihil patiuntur planetae proximi, Venus et Mars; illa quia, etsi bonior, esset quam est, Soli tamen non opponitur, iste, quia superior est ultimo microno umbræ terræ, etiam cum omnium proxima accedit. Multo minus igitur stellae superiores Marte tegi poterunt ab umbra. At ab umbra, quam de se globus Jovis in altum projicit, obscurari et extinguí quatuor Joviales, planetae scilicet secundarios, non irritis documentis probant Galilaeus Italus et Marius Gormanus.

VIII. De Eclipsi Solis.

Quotupliciter considerari possunt eclipses Solis? Duobus modis: vel enim respectu illius, quod durante occultatione Solis patitur Terra, vel respectu illius, quod pati videtur Sol. Illo modo consideratur eclipsi Solis universaliter, respectu omnium locorum Telluris, in quibus videri potest, isto modo particularis sit consideratio adque unum certum locum Telluris est alligata.

Quid igitur patitur Terra in eclipsi Solis? Luna nova inter Solem et aliquas disci Terrae partes interposita, privat illas vel toto Solis lumine, vel aliqua solaris luminis parte.

Quid appellas discum Terrae? Est planum de circulo illuminationis Terrae, quantum illud apparet ex aliquo puncto in corpore Lunae novae, Terram obumbrantis. Discus dicitur, quia fingimus, superficiem Telluris illuminatam projectam esse in planum hujus circuli.


In schemate 94. intelligitur sub VE.

Quanta est semidiameter hujus disci Terrae apparentis velut ex Luna? Si a parallaxi Lunae horizontali abstuleris aequiplum parallaxeos Solis horizontalis, relinquitur semidiameter disci Telluris, seu angulus hujus apparentis semidiametri in mensura, qualem rectus est gradus 90. Demonstratio in Hipparcho meo.⁹⁰)

Quid intelligitur sub vocibus umbræ et penumbrae Lunae? Umbræ Innaris vocabulo intelligitur omne illud spatium circulare disci Terrae vel respondens sphaericum superficiem in discum projectae, cui totus Sol a Luna tegitur. Penumbra vero est omne illud spatium disci vel superficiem Terrae, cui aliqua particula de corpore solari tegitur illo momento.

Ut si VE discus Terrae, NO umbra, MN, OP penumbra: quanquam illa respectu disci Terrae nimia est picta, cum sit penumbra minor disco Terrae, ut in schemate proximo sequenti,

Quanta est semidiameter umbræ Lunae et quomodo invenitur? Si a semidiametro Lunae apparente abstuleris semidiametrum Solis apparentem, relinquitur semidiameter apparentis umbræ Lunae fere.



In schemate sit IBL semidiameter Lunae, ABD vel ARD semidiameter Solis (parum enim differunt), erit BLR, id est BLO semidiameter umbræ Lunae.


Si non potest fieri subtractio, tunc umbra Lunae plena nulla est.

Quanta est semidiameter penumbræ Lunae, cujus cor sit umbra, et quomodo invenitur? Si conjeceris in unam summam semidiametros Solis et Lunae apparentes et parallaxes Solis dimidium circiter, accervabitur semidiameter penumbræ Lunae, a centro scilicet umbræ plenariæ, si qua est, usque ad extremitatem penumbræ.

Ut si ABD sit $15' 10''$ et IBL $16' 20''$ et parallaxis Solis BDE $1' 0''$, dimidium $0' 30''$, erit BLP semidiameter umbræ et penumbræ junctarum $31' 50''$. Demonstratio hujus et adhaerentium est in Hipparcho meo. (Vol. III, p. 525.)

Quomodo sunt intelligendi in hac generali consideratione elliptica seu Telluris eclipsatae termini hi: motus horarius, et latitudinarius arcus? Sunt intelligendi de rectis in disco Terræ. Est enim hac vice elliptica nihil aliud, quam sectio plani ellipticæ cum plano disci Terræ, per ejus centrum facta. Est horarius hac vice recta in plano disci Terræ, continuato si opus est, a centro umbræ vel penumbræ Lunae motu designata, ad ellipticam disci inclinata angulo constanti $5^\circ 18'$. Denique arcus latitudinarius est recta ex centro umbræ vel penumbræ perpendiculariter ipsi viæ centri erecta inque ellipticam disci continuata.

Fig. 83.



In schemate eclipsa Solis anni 1621. A est centrum disci Terræ HQK, ellipticam representat FAG, BE viam centri umbræ vel penumbræ, BL vel EP, AC, arcum latitudinarius, AT latitudinem ipsam Lunae (vel hic umbræ) in ipsa vera copula.

Quomodo quantitas harum rectorum invenitur? Quanta quaelibet earum apparet in ipsa sphaera Lunae, inspecta ex Terra, tanta fere censetur jam in disco Terræ; nisi quod, si accuratissime agimus, adjicienda est

uniquique portio sui ipsius tanta, quanta portio parallaxes Lunae a Sole est ipsa parallaxis Solis.

Quandæ censetur esse maxima Telluris obscuratio? Tunc, cum ex centro disci Terræ ducta perpendicularis in viam umbræ incidit in centrum penumbræ vel umbræ, quod fit proximæ articulum conjunctionis veræ Lunae et Solis.

In schemate, centro umbræ in T versante, quod est punctum ipsius AT, ad ellipticam recti arcus, conjunctio censetur exacta. At centro umbræ transgresso in lineam AC, perpendicularem viæ Lunae, fit obscuratio maxima; tunc cum sunt centra disci et umbræ propinquissima.

Si facies Telluris illuminata a Sole projicitur in planum disci, quænam igitur loca Terræ representantur a centro disci? Non unus semper et idem locus per totam durationem, sed quolibet durationis momẽto Terræ locus ille representatur a centro disci A, qui tunc Solem habet in vertice.

Quid appellas durationem totalis, et quid durationem omnimodae eclipsationis? Omnia id tempus, quo punctum aliquod umbræ Lunæ, præcipue centrum ejus, versatur in disco Terræ, attribuitur durationi totalis eclipsationis. Id enim est indicio, partem aliquam superficiæ Terræ, quæcunque ea sit, Solis conspectu in solidum tunc esse privatam diurno tempore. At omnimodæ eclipsationi accensetur etiam illud tempus, cum etiam non ipsissimæ umbræ, sed saltem penumbræ aliquod punctum in disco Terræ invenitur. Indicatur enim hæc re, esse locum aliquem superficiæ Telluris, cui saltem aliqua Solis particula tegatur.

Quinam locus Telluris indicatur a puncto contactus disci et penumbræ vel umbræ? Locus ille, cui tunc Sol, hic quidem totus eclipsatus, oritur occiditve, illic vero exorients incipit extremo margine deficere, aut occidens desinit eclipsari.

In schemate puncta contactus umbræ sunt R, S, penumbræ M, O.

Quare puncta ista sunt indices locorum Terræ, quibus Sol oritur vel occidit in principio et fine eclipsationis utriusque. At si contactus umbræ vel penumbræ fieret in puncto N, id locum indicat, cui polus eclipticæ, seu potius orbitæ Lunæ est in vertice, et Sol in ipso meridie est in horizonte; illic quidem totus eclipsatus, hic vero extremo margine Lunæ oram delibans.

Quæ partes Terræ prius, quæ posterius sentiunt obscurari Solem, vel totum vel ex parte? Semper umbra Lunæ Terram invadit ab occidentalioribus partibus, deorietur ab orientalioribus. Itaque si per fictionem oculus in sphaera Lunæ seu in Luna collocetur, et septentriones sint sursum, facie ad Terras conversa: eclipsis ista Terræ videbitur incipere a sinistris, finire a dextris, et sic etiam pingitur in schematibus nostris.

Eat igitur hic ordo apparitionis: prior tempore eclipsatio omnimoda occupat illas Terræ partes M, quæ respectu quidem Hiarum, quæ nitissimæ defectum sentiunt, ut O, sunt occidentales, at respectu earum, quæ paulo post Solem totum tectum videbunt, ut R, sunt orientales. Posterior enim totalis obscuratio (si totalis fieri potest) partes Telluris attingit occidentalliores R, quæ se inde a principio durationis omnimodæ in discum interim insinuaverunt. Vicissim totalis obscuratio via continua in orientales Terræ partes S excurrit longissimæ; sed dum omnimoda eclipsatio ratione temporis tenditur ulterius, partes Terræ O, jam dictis S occidentalliores, nactæ spatium insequendi plenariam umbram, in penumbram incidunt, elapsi jam e disco illuminato orientatibus S et in alterum noctis hemisphaerium receptis. Ita totalis duratio RS brevioris temporis per longissimos Terræ tractus excurrit ab occidente R in orientem Telluris S; at omnimodæ durationis BE, quæ longioris est temporis, terminl Terrarum extremi M, O intra breviora spatia coarctantur.

Quare dividitur semidiameter utraq; penumbræ, tam quæ cis umbram eminet, quam quæ ultra illam, in partes quælibet duodenas, ductis bis duodenis viæ Lunæ vel umbræ parallelis per totum discum? Quia diameter Solis, ut as, in duodecim uncias seu digitos dividi solet: quare ductis viæ lunaris umbræ parallelis per puncta divisionis semidiametrorum penumbræ, quæcunque loca Terræ quovis momento in unam illarum parallelarum incidunt, illis in locis Sol totidem digitis deficere cernetur, quata est parallela ab extrema penumbram tangente exclusive. Ut in locis Terræ, quæ in MO incidunt tempore durationis, Solis defectus pervenit ad digitos 7, quia MO est septima ab HIK. Nam extrema HIK, tangens penumbram, nullius defectus est index, sed terminus potius est, a quo defectus incipit sentiri. Et septen-

trionales quidem parallelas defectum in Sole arguunt australem, e contrario australes septentrionalem. Evidentius sic erit: quæta est quævis parallelarum a via umbræ pleariæ RS, inter parallelas media, in plagam alterutram, totidem ex illa corporis solaris plaga residui sunt lucidi digiti. Ut quia M est quinta post RS versus austrum, ergo quinque digiti in Sole residui manent ab austro in omnibus locis a M signatis.

Defini terminos eclipsium Solis seu potius Telluris, tam totalium, quam partialium. Sint luminaria apogaea. Cum ergo semidiametri disci et penumbrae aequent parallaxin Lunae a Sole et semidiametros luminarium juncta: erit summa semidiametrorum disci et penumbrae $87' 23''$. Ut vero parallaxis $\odot 58' 22''$ ad parallaxin $\odot a \odot 57' 23''$, sic iste arcus latitudinarius inter centra disci et umbræ Lunae $87' 23''$ ad arcum latitudinarium centri Lunae $86' 5''$. Huic latitudini (nam insensibili differt) respondet distantia a nodo $15^\circ 43'$ pro termino partialium. In perigæo Solis 6 scrupula accedat. Et cum semidiameter disci sit hoc in situ luminarium $56' 54''$, cui respondet arcus latitudinarius Lunae $56' 0''$, et huc igitur distantia a nodo respondet $10^\circ 0'$ pro termino totalium Solis eclipsionum per universam Terram. In perigæo Solis pene nihil est differentia.

Sit vero Luna perigæa, Sol apogæus, erit prima summa $94' 4''$, quæ in orbe Lunae fiet $92' 37''$, quam repræsentat distantia a nodo $16^\circ 57'$ pro termino partialium; in perigæo Solis $17^\circ 3'$.

Et cum hoc situ semidiameter disci sit $62' 12''$, cui respondet arcus latitudinarius Lunae $61' 14''$, et huc igitur respondet distantia a nodo $11^\circ 7'$ pro termino totalium Solis eclipsium. Nec multo aliter in perigæo Solis.

Quid ex comparatione terminorum solarium cum terminis lunarium eclipsium sequitur circa numerum utrarumque eclipsium? In Terris partiales quidem Solis eclipses plures, totales vero pauciores sunt quam lunares omnifariae. At si totales Lunae compares, saepius Luna Solem totum eripit Terris, quam Terra totum eripiat Lunae. Terræ namque corpus, latius corpore Lunae, plures ab umbra Lunae excipit ictus, quam Luna ab umbra Terræ. Denique totalium Solis per Terram universam, omnimodarum vero Lunae minorum propemodum est idem.

Dic regulas de numero eclipsium in anno, tam Solis, per universam Terram, quam Lunae. 1. Quando pleilunium est centrall seu node proximum, hoc est quando centrum Lunae per centrum umbræ Terræ vel proxime transit, novilunia proxime circumstantia interdum utraque sunt defectiva, defectu minime, rarissime ac forte nunquam æentrum; si scilicet Sol autem et post perigæam et Luna in pleilunio apogæa.

2. At quando novilunium est centrale fere, hoc est quando centrum penumbrae Lunae per centrum disci Terræ vel proxime transit, pleilunia circumstantia transeunt sine eclipsi et vicissim.

3. Fieri potest, ut duo novilunia centralia vel quasi contingant unius semestris interstitio, unum ante Solis apogæum, alterum post illud, quo casu toto anno lunari nullum continget pleilunium eclipticæ.

4. Omne pleilunium eclipticæ una proxime centrale vicinum habet novilunium eclipticæ.

5. Si in uno semisse anni contingat eclipsi Lunæ centralis vel quasi, non poterit oppositus anni semisse carere sua Lunæ eclipsi.

6. Omnibus fere semestribus contingunt eclipses Solis, saepius duæ deinceps, rarissime ac forte nunquam nulla.

7. Omnibus fere annis lunaribus simplicibus (dierum scilicet 354) contingunt vel duae vel tres Solis eclipses, Lunae vero vel nulla vel una vel duae, et sic in univsum vel duae, vel tres, vel quatuor, vel quinque eclipses.

8. Interdum aecedit sexta, sed anno non lunari, sed solari dierum 365, quando scilicet eclipses circa principium anni contingunt.

Atqui multo pauciores cernuntur eclipses, et Solis quidem multo pauciores, quam Lunae. Quod uno aliquo certo Terrae loco pauciores Lunae, quam jam est dictum, et multo pauciores Solis contingunt eclipses, causae sunt in Innaribus quidem una, in solaribus vero duae. Nam primo horizon ejusque loci bisecat coelum, itaque dimidiam partem eclipsium tam lunarium quam solarium occultat, ut quae lunares sunt horis diurnis, solares nocturnis, eae cerni nequeant. Deinde quod solares attinet, multae earum, quae etiam diurnis unius loci horis contingunt, in aliis tamen accidunt eliminatibus, eo quod parallaxis Lunae aliis eliminatibus fit alia, seu quod eodem redit, quia discus Terrae AN major est circulo penumbrae CV, nec unquam totus a penumbra Lunae tegitur. Nulla quippe cernitur eclipsis Solis extra metas penumbrae, at eclipsis Lunae quovis momento cernitur a toto Telluris hemisphaerio.

Si jam eclipsis Solis consideretur respectu unius alicujus loci Terrae, quid novi praeter ea, quae hactenus, venit considerandum? Haec tria: 1) differentia inter veram et visibilem conjunctionem, 2) reductio copulae ad circulum ipsum latitudinis, rectum ad eclipticam, 3) deductio parallaxeos horizontalis Lunae a Sole in longum, latum et altum.


Quid appellas veram, quid visibilem copulam luminarium, seu locum Lunae? Hactenus quidem erat idem locus sideris verus et locus apparens, hoc est visibilis. Verus enim locus dicebatur respectu medi, qui fingitur, apparens vero, quia linea veri motus ex centro Terrae educabatur, a quo visus in superficie Terrae respectu immensi planetarum intervalli non distabat aliquo intervallo sensibili. Non igitur sensibiliter alius apparebat locus sideris visui in superficie constituto, quam erat verus lineae ex centro Terrae educatae. At jam porro tanta est Lunae propinquitas ad Terram, ut contemnere non possimus visum in Terrae superficie constituti distantiam a Terrae centro. Verum itaque locum ostendit, ut hactenus, recta ex centro Telluris per centrum sideris in sphaeram fixarumeducta, apparentem vero seu visibilem recta ex proposito superficiei loco per centrum sideris in superficiem fixarumeducta. Differentia utriusque loci, veri scilicet et apparentis seu visibilis, dicitur parallaxis altitudinis. Quando igitur vero loco Solis occurrit linea veri loci Lunae, copula vera erit, quando linea visi loci Lunae, copula visibilis.

Quid est igitur parallaxis altitudinis? Est arcus circuli verticalis per locum verum centri corporis Lunae ducti, interceptus inter hunc et locum visibilem.

In schemate 96 sit V vertex, VO verticalis seu azimuthalis, et in eo R locus Lunae verus, S visibilis: erit RS parallaxis altitudinis.

Quid sunt parallaxis longitudinis et parallaxis latitudinis? Sunt arcus, illa paralleli eclipticae per visibilem locum ducti, haec circuli latitudinis, intercepti ille inter circulos latitudinis veri et visi seu appa-

Fig. 96.



rentis loci, hic inter verum Lunae locum et parallelum eclipticae per visibilem locum ductum.

Ut si polus eclipticae sit P, et SI parallelus eclipticae, proximus III, vel etiam ipsa ecliptica, per S visum locum transiens, PR, PS circuli latitudinum, ille per verum locum R, iste per visibilem S, erit SI parallaxis longitudinis inter PR et SI, at RI erit parallaxis latitudinis inter R et SI.

Quomodo computatur utraque? Ex cognita parallaxi maxima altitudinis in horizonte, cujus definitio praemissa est in explicatione eclipsium lunarium. Tunc enim secundum doctrinam primi mobilis, traditam libro III. fol. 240, acquiritur punctum eclipticae oriens et nonagesimus ab eo gradus seu altissimus totius eclipticae ad propositum momentum et distantia dati veri loci sideris ab illo; quaeritur et angulus illius puncti orientis, seu altitudo hujus nonagesimi. His datis si conieciantur in unam summam tres logarithmi 1) anguli orientis, 2) elongationis sideris a nonagesimo, 3) parallaxeos horizontalis, accrevabitur logarithmus parallaxeos longitudinis. Ita si conjeceris in unam summam 1) antilogarithmum anguli orientis, 2) logarithmum parallaxeos horizontalis, conficies logarithmum parallaxeos latitudinis. Fundamenta hujus computationis sunt in Astr. Parte Optica, a fol. 312 in 320. (Vol. II. p. 326—331.)

Ubi nulla est longitudinis parallaxis, ubi vicinissima maxima? In nonagesimo quidem est longitudinis nulla, at non semper in horizonte est longitudinis maxima. Nam si oriatur Sagittarius vel Capricornus, decreseente angulo orientis, crescit ejus logarithmus idque sensibilibus; si autem tunc simul etiam Luna versus occasum eat, augens elongationem a nonagesimo, logarithmus hujus elongationis minuitur pene nihilo, superat igitur prius illud augmentum redundatque in logarithmum parallaxeos longitudinis, itaque minuitur haec, Luna versus horizontem descendente in signis septentrionalibus. Vicinissima igitur in iisdem Luna versante et ab horizonte assurgente, augetur initio ex causis contrariis. Maxima igitur longitudinis parallaxis in signis meridionalibus est sub horizonte, in punctis aequinoctialibus in ipso horizonte, at in septentrionalibus supra horizontem, et tunc demum, ubi distantiae sideris a nonagesimo logarithmorum differentia aequaverit differentiam logarithmorum anguli orientis.

Quid observandum circa Solis parallaxes? Etsi ea negligi non debet, non obstante, quod non superet unum minutum, non est tamen seorsim tractanda; sufficit enim maximam Solis horizontalem subtrahere a maxima Lunae horizontali, ut constituitur excessus lunaris, quem dicimus parallaxin Lunae a Sole. Nihil enim refert ad eclipsium Solis cognitionem, quo coeli loco intra unum minutum videatur Sol, sed quantum de Sole tegat Luna.

Nunquid etiam ad planetas pertinet consideratio parallaxium diurnarum? Nihil admodum: Saturnus enim, deemplo fere altior Sole, parallaxin facit vix 8 secundorum, Jupiter fortasse 15 secundorum, quando plurimum. Mercurius et Venus, quando Terrae plurimum appropinquant, sunt vicini Solis radiis eoque non observabiles, nec addit Mercurius assem alterum solidum ad parallaxin Solis, Venus vero, cum proxime accedit, 4 scrupula, quadruplum scilicet solaris circiter acquirit in parallaxin, idque in ipsa conjunctione cum Sole. Restat solus planeta Mars, qui interdum Soli oppositus circiter duas quintas intervalli solaris a Terra abest; tunc igitur parallaxin facere potest majorem solari, scilicet 2' 30" circiter, vix observabilem ob radiorum explicationem.

Quas partes in eclipticae semicirculo apparente facit nonagesimus?

Duos in eo distinguit quadrantes ab invicem, orientalem scilicet ab occidentali.

Quomodo utimur parallaxibus Lunae a Sole longitudinis et latitudinis? Longitudinis parallaxis, Luna versante in quadrante orientali, additur loco Lunae vero ad eclipticam redacto, in occidentali auferitur, et sic constituitur appatens seu visa longitudo. Latitudinis parallaxis in hemisphaerio nostro auferitur a septentrionali Lunae latitudine, si haec major, residuum est latitudo visa septentrionalis; sin fuerit minor vera septentrionalis latitudo, tunc ipsa auferitur vicissim a parallaxi latitudinis eritque residuum latitudo visa australis. Quodsi etiam latitudo vera fuerit australis, additur ei parallaxis proditque rursum australis visa latitudo, intellige, ut supra, respectu Solis, ac si ipse plane nullam parallaxin faceret.

Quantus hoc pacto conficitur horarius visibilis seu apparens Lunae a Sole? Semper fere horarius longitudinis visibilis redditur brevior vero, magis tamen id circa nonagesimum; nam prope horizontem non differunt sensibiliter, adeoque fit etiam quandoque contrarium, sed et hoc insensibiliter. Rursum discrimen hoc evidentius est in magna nonagesimi altitudine, sive signi sive climatis causa, minus evidens in parva.

Quo ordine succedunt invicem vera et visibilis conjunctio? In occiduo quadrante sequitur visibilis copula, in ortivo praecedit. Quantitas hujus discriminis est a parallaxium varietate petenda.

Quid efficit parallaxis in motu visibili latitudinis? Luna quocunque in signo incesserit, orientibus septentrionalibus signis in septentriones attolli videtur; australibus vero orientibus, ipsa seu oriens seu occidens deprimi videtur in austrum; utrumque tanto celerius, quanto viciniore tropicis punctis gradus oriantur.

Quam acquirit speciem via visibilis centri Lunae in disco Solis, quae ejus inclinatio ad eclipticam? Non plane recta linea apparet, nec inclinatur ad eclipticam angulo constanti $5^{\circ} 18'$, sed interdum ei parallela incedit, aut etiam in contrarium viam veracem inclinari videtur, quod fit, Luna quidem ante vel post nodum ascendentem vero motu assurgente in boream, orientibus vero signis brumali solstitio vicinis; aut vicissim, Luna quidem ante vel post nodum descendentem versante, orientibus vero signis solstitio aestivo vicinis.

In schemate 97. sit S Sol, ESQ ecliptica, KN via Lunae vera, CLD via visibilis in contrarium inclinata.

Interdum vero angulus inclinationis valde magnus est, et plus quam duplus, triplus aut quadruplus ordinarij, graduum $5. 18'$, ut si circa nodum ascendentem Luna versante, oriantur partes vicinae solstitio aestivo, aut si circa nodum descendentem illa incedente, Sagittarius vel Capricornus etc. sint in ortu. Vide Opt. Astr. Partem a fol. 408. et fol. 410. schema eum exemplis. (Vol. II. p. 382 ss.)

Quodnam igitur est medium eclipsis, quae maxima obscuratio? Non semper coincidunt ista, sed est maxima obscuratio, quando centra luminarium videntur invicem propinquissima. Hoc vero fit interdum proxime circulum latitudinis, per centrum Solis ductum, tunc nihilum, cum vel magna est obscuratio, vel visibilis via Lunae CD pene parallela fuerit eclipticae EQ. Sin angulus inclinationis valde magnus, eclipsis vero parva, tunc appropinquo proxima centrorum quaerenda est in circulo, qui est a centro Solis versus nodum visibilem inclinatus. Nec bene fert ista varietas plures regulas.


In schemate si ex S , centro Solis, agatur perpendicularis in CD , visibilem viam Lunae, quae sit SL , tunc in L erit obscuratio maxima.

Quid circa initium et finem eclipsium seu scrupula incidentiae et emersionis observandum? Si centralis est futura visibilis copula, initium et finis fere requirunt summam semidiametrorum in distantiam visibilem locorum longitudinis Solis et Lunae; at si magna in medio fuerit latitudo Lunae visibilis, loca longitudinis in principio et fine distabunt minus summa semidiametrorum. Itaque computetur latitudo visa ad susceptum certum intervallum temporis, aut vel post copulam visibilem. Hujus latitudinis antilogarithmus, ablatus ab antilogarithmo summae semidiametrorum, relinquit antilogarithmum differentiae locorum longitudinis circiter, quam requirit initium vel finis eclipsis. Debet autem huius differentiae aequalis esse motus Lunae visibilis, per susceptum temporis intervallum collectus, aut si non aequat, corrigi intervallum, ut aequet.

In schemate sit CH visa latitudo initialis circiter, CS summa semidiametrorum, dabitur igitur HS visibilis distantia centrorum pro initio, seu scrupula incidentiae; sic ex DF visa latitudo finali et ex SD ut prius inveniuntur SF , scrupula emersionis.

Quam diu durat aliqua Solis eclipsis in certo Terrae loco? Non facile regulis comprehendendi potest exactum durationis tempus, propter magnam

Fig. 97.



parallaxium varietatem per diversas tam poli quam Solis altitudines. Primum tamen durationis elementum est summa semidiametrorum Solis et Lunae, visibili motu conficienda, tam pro incidentiae quam pro emersionis temporibus. Cum igitur haec summa fere aequet horarium Lunae a Sole, in apogaeo Lunae paulo major, in perigaeo minor, duas igitur horas impenderet Luna motu vero in transitu per discum Solis. Sed quia visibilis motus minor et tardior est vero, tertiae igitur horae semissis varietatem morarum, si de centralibus, omnium maximis, agimus, fere consummat.

Qui exacte vult agere, is computet scrupula incidentiae HS et emersionis SF methodo praemissa; nam intervallum temporis una computari et corrigi debere, jam est dictum.

Quid praeterea spectatur in eclipsi Solis? Plaga, a qua stat defectus in margine Solis tam initio, quam fine, item et in medio, et quando eoruna sursum, quando deorsum, denique quando ad latus alterutrum spectent; haec non minus propter usus astronomicos et astrologicos, quam ad praedictionis commendationem.

Quo medio discimus has plagas? Investigatione angulorum RSE , CSE , quos eam ecliptica EQ faciunt circuli duo, alter verticalis RV , per centrum Solis S , alter CS , LS , DS , per centra Solis et Lunae visibilia ducti: sic colim conficitur et angulus CSR , LSR , DSR , sectionis horum ipsorum mutuae in centro Solis, et vero circulus verticalis summum et imum Solis marginem monstrat, quippe per Solis centrum ductus. Porro, quae sit observanda varietas additionis vel subtractionis horum angulorum aut complementorum secundum

diversos Solis situs in quarta orthiva vel occidua, circulo meridiano distincta, praestat ex schematibus aut sphaerae seu globi contuitu, quam regulis discernere. Ea exstat schema idoneum apud Tychonem Brabe Progymnasmatum fol. 136.

Doce computare angulum RSE eclipticae cum verticali per certum ejus punctum, utpote per centrum Solis S tractucto. Modi hujus computandi sunt quatuor. 1. Si habetur altitudo Solis et altitudo nonagesimi seu angulus orientis, ex iis computabitur angulus secundum doctrinam fol. 241. libri III. vel additione antilogarithmorum utriusque, ut fiat logarithmus quaesiti. 2. Si habetur azimuth Solis et altitudo nonagesimi seu angulus orientis et distantia ejus a nonagesimo: aufer hujus logarithmum ex logarithmo illius, residuum adde ad antilogarithmum altitudinis nonagesimi, fiet logarithmus anguli quaesiti. 3. Si habetur RVA angulus verticalis RV eum AV aequinoctiali (de cujus computatione varia vide libro III. fol. 224.), adhibe illi angulum circuli declinationis eum ecliptica, cum quo proeede vel addendo vel subtrahendo, prout te docuerit inspectio sphaerae vel globi. Ille modus etsi plura habet requisita et operosior est, suum tamen usum habet, ubi plura momenta simul sunt computanda. 4. Si habetur angulus orientis seu altitudo nonagesimi et distantia Solis ab eo, quae duo plerumque prius dantur, tunc ab illius complementi mesologarithmo aufer hujus logarithmum, relinquatur mesologarithmus quaesiti anguli. Verum hic plurima cautio est circa signa abundantiae vel defectus, nsitata consistis.

Doce et computare angulum CSE eclipticae cum circulo per centra. Logarithmum logistico distantiae centrorum CS, LS, DS, quae invenitur quovis momento, aufer a logarithmo logistico latitudinis visibilis illius momenti, ut CH, LS, DF, remanet logarithmus anguli CSH, LSL (seu recti) et DSF.

Quot sunt genera solarium eclipsium? Tria: vel enim totus Sol tegitur, vel circulus integer residuus lucet, vel pars residua in cornu exit, quae proprie partialis dicitur eclipsis.

Si Luna tanto minor est Sole, quantum libro IV. fol. 328. dictum est, quomodo totum Solem tegere potest? Quanto est minor ejus diameter diametro Solis, tanto propinquior est Terris quam ipse Sol, ut ibidem habetur; propinqua vero majore diametro videntur, quam si eadem essent remota.

Quando potest esse circulus residuus? Quando Luna apogaea est, Sol infra suum apogaeum, maxime eum in perigaeo. Nam tunc Solis diameter est 31' 6", Lunae 30' 0".

Nunquamne hoc fit, nisi Luna in apogaeo constituta? Imo anno 1567. 7. Aprilis visa est Romae talis eclipsis eum circulo Solis residuo, quando et Sol et Luna longitudines obtinebant medias et sic diameter Lunae major apparebat diametro Solis. (cfr. Vol. II. p. 316.)

Quae igitur hujus phaenomeni causa fuit? Non equidem astronomica, valeret enim in consimili luminarium dispositione perpetuo. At anno 1605. die 22. Sept. 2. Oct. Luna altior seu apogaeo vicinior totum Solem in eodem remotione ab apogaeo suo positum texit Neapoli in Italia. (cfr. Vol. II. p. 696.)

Ergo causam oportet quaerere physicam, in sublimi tamen aethere; quarum duae occurrunt, supra etiam in eclipsibus Lunae conspicuae. Prima est, si substantia aetherea, in ipsa sede corporis solaris circa corpus Solis fusa, interdum crassiuscula sit flammaturque contactu corporis solaris: tunc tecto Sole prominet splendor flammatus, non sineis altam vimiamque fieri umbram,

ut Plutarchus loquitur. Haec causa tacta est etiam libro I. fol. 147. pluribusque experimentis roborata.

Sed quia splendor talis non ideo statim apparet ut exilis circulus, accersatur igitur altera causa, circa globum Lunae fusus aër pellucidus, in cuius tam ingressu desuper, quam egressu deorsum frangantur Solis radii, refractique accedant visui nostro eum in modum, quo in aëre nostro circa Terram fuso refringuntur iidem Solis radii. Quo pacto fiet, ut Solis quidem circulus exilis, at non directe, sed per Lunae aërem interpositum, radios infringentem, eoque Lunae potius circulus luce Solis illuminatus videatur.

A qua plaga fit initium eclipsis Solis? Ordinarie a plaga occidentis, in nostro quidem hemisphaerio a dextris, finiturque eclipsis seu impletur Sol a plaga orientis ad sinistram; contra quam fit ordinarie in eclipsi Lunae.

Ergone hoc non fit semper et quibus de causis quovo ordine? In parvis eclipsibus Solis ob magnam inclinationem visibilis viae Lunae ad eclipticam fit frequenter, praesertim circa horizontem ortivum, in signis rectorum ascensionum, Luna ad caudam draconis delabente, ut Sol vel in ipso vertice vel etiam paulum versus sinistram incipiat eclipsari impleaturque ab eadem plaga inferius; aut e contrario circa horizontem occidentum in signis rectorum descensionum, Luna fugiente a capite draconis in septentriones, vel in imo margine vel paulo superius ad sinistram incipiat finiturque ab eadem plaga superius.

Quin imo etiam circa ipsum nonagesimum possunt his affinia contingere, propter magnam parallaxium latitudinis varietatem. Orientibus enim Geminis vel Canero parallaxes latitudinis celerrime decrescunt, orientibus Sagittario vel Capricorno crescunt; si ergo simul etiam Luna illic ascendat in septentrionem circa nodum evehente, hic descendat in austrum, fit accumulatione verae et viae variationis angulus viae visibilis valde magnus, et potest eclipsis satis magna ab eadem plaga tam incipere quam finire. Sic anno 1598. eclipsis valde magna fuit in Piscibus et apud nodum ascendentem coepitque Gratii Styriac a dextris praecise in ipso quasi nonagesimo, desiit a sinistris quidem, sed pene in ipso vertice, ut si vel parum minor fuisset, a dextris desitura fuisset, non delibato vertice. (cfr. Vol. II. p. 16 ss.) Contra anno 1614. eclipsis in Libra apud nodum descendentem circa meridiem coepit a dextris Monachii desiitque infra. Vide Opt. Astr. Partem fol. 411. et seqq. (II. 383.)

Quae causa est, cur non omnes totales Solis eclipses adeo profundarum tenebrarum causa sint, ut pro die nox existat? Confirmatur hoc experimento procul dubio causarum jam modo dictarum altera, substantia scilicet crassa circa Solem, non hic in nostro aëre, sed in ipsa sede Solis interdum circumfusa, quae resplendet radiis Solis apparetque etiam tecto Sole, ut flamma circulariter emicans tantumque luminis praefereens, ut mera vox esse nequeat. Haec materia non semper est Soli circumfusa; quando ergo aether circa Solem est limpidus et purus, tunc absente hoc etiam splendore necesse est, cum extincto Sole diem etiam extinguere penitus.

Produnt aliqui, Lunam in eclipsi totali rubore sat claro conspicuam esse: unde hic Lunae rubor? Non a proprio Lunae lumine perennante, nam amitti Luna non posset e conspectu in suis totalibus deliquis; nec a radiis Solis, per corpus Lunae transmissis, tanquam id sit pellucidum, ut quibusdam videtur, cum sit re vera opacum, ut Terra; sed a claritate Telluris a Sole illuminatae, ad Lunam repercussa, ejus claritatis minimam particulam umbra Lunae tegit.

Estne aliqua deliquiorum apocatastasis? Propter multa principia concurrentia ad eclipsu aliquam non potest esse illius exactus ordo redeuntium. Nam posterior quaeque earum series novi quid avertit, quod cum in primo reditu non sit valde conspicuum, in secundo tamen jam duplicatur. Illic reditus in lunaribus eclipsibus, ut quae simpliciores sunt, praecipue notabilla est deficiaturque ducentis viginti tribus mensibus, id est annis 18 lunaribus exactis, sic ut ad unum cyclum decemnovennalem sit residuus unus lunaris simplex, atque frequenter, ut eadem nec multum differentes post hoc tempus exactum recurrant et compareant delipses, denis tamen zodiaci gradibus loco anteriori. Interdum tamen duae Solis eclipses pulchra conspiratione etiam cyclum decemnovennalem definiunt, Sole post exactos 19 annos rursum eodem zodiaci loco lumen amittente. Sic factum annis 1579. et 1598. utrinque die 25. Februarii; utroque enim die Solis eclipsis magna fuit. Verum hoc sit ob concursum causarum singularem, nec expectandum fuit simile aut vicinum quid a sequenti cyclo.

Solane Luna causa est tenebrarum diurnarum prodigiosarum? Nequaquam; crebra enim exempla nobis occurrunt in historis tenebrarum plus quam cineriarum non sub tempus interitum; quarum causas necesse est esse physicas, tanto altiores a Terra, quanto latius animadvertitur huiusmodi caligo. Prima causa nobis proxima eoque singularibus tantummodo locis acciens sunt nubes, praeserim imbre decumano praegnantis, aut nubium copiosum nivium effundentes; quibus adde nubem avium aut cicadarum, rariores eventus nec tamen adeo ignotos; haec enim omnia Solem tegunt certis quibusdam locis dieique noctem inferunt.

Altera causa paulo altior, e Terris tamen orta, est vis ingens cinerum, ex crateribus montium ardentium explosa; unde causa haec plerumque conjunctum habet terrae motum aut imbrem lapidum, ut qui ex angustis Terrae meatibus, seu canalibus una cum cineribus eieciuntur in altum. Tale quid anno 1562. in Lusitania contigisse scribit Cornelius Gemma, talem Solis observationem a cineribus exhibet Dion sub Domitiano: nam Romae visa est haec prodigiosa caligo, cum Neapoli vicinus mons Vesuvius cineres eructasset atque illi usque in Palaestinam decidendo spurgerentur. Confer etiam illas tenebras, quae tempore passionis Domini nostri Solem obnuperunt, nam et illae fuerunt cum terrae motu, etsi Dionysius Areopagita apud Suidam has tenebras motui Lunae prodigioso transseribit.

Tertia causa cognata est illi, jam ter in scenam protractae crassae consistenter circa Solem in ipsa sede sua, de qua libro I. fol. 155. Quae si paulo sit densior, Solem offuscabit toti mundo, non tamen penitus exstinguet. Id factum toto anno caedis Caesaris, et anno 1547. quadriduo per totam fere Europam. Nec interest, proximae Solem tale quid existat, an in ipsa Solis superficie.

Numquid etiam alia coelestia corpora subter Solem currunt, ut Luna, illum obscurantia? Possunt equidem sub Solem incurrere et Venus et Mercurius, videlicet in eo ut maculae minutissimae, cum sint opaca corpora, ut supra probatum est argumento phasium Veneris. Veruntamen incursus hi sunt rarissimi, ob causas tamen diversas. Nam Veneris quidem nodi, ut supra dictum, sunt in Geminis et Sagittario. Jam vero binae copulae Veneris cum Sole inferius distant 72°. Si ergo una copula contingat in nodo, expectandi sunt anni 248 circiter, donec illa post octonorum annorum reversiones 72 gradibus aberrat a nodo succedatque illi in hunc locum copula proxima. Itaque

nostro saeculo Venus Solem eclipsare aut subtereurrere non potest. Mercurius vero, etai crebro circa nodos suos Soli jungitur inferius, raro tamen ad tantam propinquitatem venit, ut sub Solem incurrat, ob motus inaequalitatem inclinationisque suae orbitae magnitudinem.

Quid censet esse maculas illas in Sole, quarum aliquae pro Mercurio in Sole perperam sunt venditae? Rursum hic de rebus solaribus tanto minus habemus, quod assereremus, quam de lunaribus, quanto Sol Luna sublimior est aequae nobis remotior. Sunt tamen aliqua maculis hisce communia cum nostris nubibus. Primum senti si quis Terram intueri posset ex aliquo fixo loco aetheris versus Solem, ille videret nubes in illius disco intra dimidium diem naturalem converti ab ora orientali in occidentalem, sic tamen ut nubium aliquae paululum praecurrerent, aliae, quarum motus super Terram in ortum est, in hoc jam universali motu relinquerentur nonnihil: sive etiam est cum maculis Solis. Plerumque namque manent in disco Solis per dies 12 aut 13, aliquae tamen diutiuscule, aliae breviuscule, et ingrediuntur quidem ab ortu, videri desinunt ab occasu. Deinde sicut, qui Telluris rotationem specularetur, illo sive nubes sive maculosas superficiei partes videret circa extremas oras tardas et figuras earum compressas propter convexitatem globi a visu reductam sursum, in medio disco veloces et figuras explicatas, sic idem etiam contingit videri in maculis Solis. Hoc experimentum refutat illos, qui communiiscentur nescio quam superficiem sphaericam, quae in incorem loriceo pellucidao opacis corpuseulis sit contexta incedatquo sub Solo iustar, sphaerae planetariae tardissimo motu. Nam si hoc esset, maculae semper aequales diurnos haberent in disco Solis tam circa oras, quam in medio. Tertio sicut nubes oriuntur, dividuntur, dissipantur, vanescunt, sic etiam videmus macularum aliquas incipere apparere in medio disci Solis minutissimas successuquo dierum grandescere, alias rarescere et evanescere antequam ad marginem extremum veniant, aliquas etiam dividi in duas aut tres. Quarto, sicut superficies Telluris imbribus humecta etiam post discussas nubes fuscis, magis est coloris, inde virescit, sive etiam ex adverso partes Solis, in quibus maculae videntur, discuti, post eas discussas lucescunt apparentque quasi flammulae in disco hinc inde sparsae, siquidem bono telescopio species Solis super papyro pingatur. Vide etiam libro IV. fol. 343.

Num vero etiam alia sidera sic a Luna occultantur ut Sol, aut etiam a se ipsis? Stellae tam fixas quam erraticas a Luna occultari, pene quotidianum est. Fixas vero a planetis aut horum superiores ab inferioribus tegi subtereurrentibus, identidem quidem observamus, non tamen ita crebro, ut a Luna, quia corpora eorum sunt exilia, motus tardi, lumina etiam quarundam adeo clara, ut vicinas stellas hebetioris luminis facili opprimant. Vide utriusque generis exempla in Astronomiae Parte Optica, fol. 304. (It. 320)

Quae ratio est, computandi stellae alicujus occultationem a Luna factam? Utendum est loco Lunae vero, ex ephemeridibus excerpto aut ex tabulis computato, nec non et parallaxi Lunae integra, non diminuta per subtractionem parallaxis Solis, ut prius in eclipsibus Solis. Cetera ut in eclipsi ☉.

Quis est praecipuus usus tam eclipsium Lunae, quam occultationum Solis stellarumque per interpositionem corporis Lunae? 1. Est hoc unicuique fore adiuventum inquirendi locorum longitudines seu differentias meridianorum, de qua methodo vide librum III. fol. 300. Ac proinde ad hydrographiam et rem nauticam totamque adeo geographiam est apprime utilis haec

eclipseium in variis locis observatio: exque observationibus computatio veri loci Lunae ad tempus uniuscujusque loci.

2. In genere eclipses lunarium sunt paedagogi ad discendum motum et altitudinem Lunae a Terra. Vicissim in theoria Lunae astronomi rudimenta edunt totius cognitionis astronomiae. Nam motus Lunae passim nobis praeclucit ad veritatem doctrinae de motibus ceterorum etiam planetarum.

3. Est etiam Luna veluti primus gradus in scala mundana, quia orbis Lunae est medium proportionale inter globum Terrae et orbem Solis seu orbem magnum, ut demonstratum est libro Epitomes, IV. fol. 327. Orbis vero magnus est medium proportionale inter proximas superficies inferiorum et superiorum mobilium. De quo vide Harmonices Mundi librum V. sub finem. Orbis denique ultimus mobilium seu Saturni est medium proportionale inter corpus Solis et sphaeram fixarum, vide Epit. libro IV. fol. 332 s.

4. Denique sine cognitione astronomiae seu machinae mundanae secundum omnes partes manca est omnis cognitio physica, nulla est cognitio metaphysica. Ita per haec horrida luminarium $\mu\alpha\theta\eta$ laboresque initio ascensus facto, tandem pervenimus ad sublimissima, Deum creatorem cognoscentes ex libro naturae operibusque manuum ejus.

IX. De harmonicis motuum proportionibus. ⁶¹⁾

Unde cognoscitur celeritas vel tarditas motus apparentis? Ex quantitate arcus, quem planeta conficit in una die vel hora temporis propositi, hoc est ex comparatione diurnorum vel horariorum.

Quotupliciter considerari possunt proportionibus diurnorum? Dupliciter, ut sunt duae planetarum inaequalitates. Aut igitur considerantur diurni secundum primam solum inaequalitatem, quanti scilicet appareant oculo per fictiorem in centro Solis collocato, aut considerantur secundum utramque inaequalitatem, quanti appareant hic in Terris.

Quod est discrimen harum duarum considerationum respectu contemplationis harmonicæ? In priori certis planetis harmonicae proportionibus certae sunt attributae, in posteriori, cum planetae fiant stationarii, perdentes omnem motum apparentem, omnes igitur harmonicae omnibus conveniunt sine discrimine. Veruntamen prior illa aut nos terricolas nihil attinet, cum sit solaris, aut certe intellectualis tantummodo est, ista vero ex Terra spectata potest etiam esse sensualis in Terra, intellige sic, quod astrologi possint attendere, quo tempore contingit, motus planetarum per harmoniam contemperari, num ejus contemperationis aliquis sit effectus in meteoris, sicuti diligentia sunt hoc consecuti, ut sciant, quo tempore planetae configurantur harmonice ratione situs, tunc potissimum incitari naturam.

Quot sunt proportionibus harmonicae? Compositae quidem sunt infinitae, simplices vero sunt octo: unisoni inter arcus aequales, tertiae molles inter arcus, qui habent proportionem ad se mutuo, quae est inter numeros 6 et 5, tertiae durae inter 5 et 4, diatessaron inter 4 et 3, diapente inter 3 et 2, sextae molles inter 8 et 5, sextae durae inter 5 et 3, diapason inter 2 et 1. Causas et ortum earum vide libro III. Harmoniae.

Quae ratio est compositionis harmoniarum? Etsi harum octo quatuor possint etiam dici compositae (quippe diapason solvitur in tertiam et sextam, vel in diapente et diatessaron, sexta in tertiam et diatessaron, diapente in tertiam), proprie tamen compositae dicuntur, quando cum una simplicium coniungitur una vel plures diapason: ut est diapason epidiapente inter 3 et 1.

Componitur enim diapense inter 3 et 2, diapason inter 2 et 1. Sic tridiapason inter 1 et 8 componitur ex diapason inter 1 et 2 et duobus aliis diapason inter 2 et 4 et inter 4 et 8.

Quotupliciter planetis harmoniae conveniunt in prima consideratione, quae locum habet in Sole? Tripleiter. 1) Vel enim singulis suae sunt attributae harmoniae respectu diversorum unius motuum. Hae sunt mero intellectuales et archetypicae, puta terminali bini unius harmoniae non sunt iuncti eodem tempore. Sic Saturni motuum varietas assequitur terminos: tertiae durae, Jovis tertiae mollis, Martis quam proxime diapente, Mercurii diapason eum tertia molli fere, Lunae diatessaron et hoc relatione ad Terram. At Terra ipsa hic exultat eum Venere; nam Terrae motus se continent intra semitonium $10/15$, Veneris intra comma $81/60$, quae sunt intervalla non harmonica.

2) Vel considerantur harmoniae attributae binis inter se proximis, ubi attendimus, quot cuique bigae harmoniae convenire possint a motibus divergentibus (id est altioris altissimo et humilioris humillimo), usque ad convergentes (id est altioris humillimum et humilioris altissimum). Et hae harmoniae sunt temporales, id est contingere aliquando possunt inter motus eodem tempore existentes, eoque et sensiles eos dicere possumus, eo sensus genere, quo hic in Terris pereipiuntur aspectus. Itaque Saturno et Jovi conveniunt omnes harmoniae, quae sunt a diapente epidiapason usque ad diapason simplex, Jovi et Marti omnes a tridiapason usque ad compositam ex diadiapason et tertia minore usque ad diapente. Telluri et Veneri non plures quam sextae duae, major et minor, quarum duarum differentia eum sit diesis, eadem quae et differentia cantus duri et mollis, penes hos igitur duos planetas est distinctio generum harmonicorum. Veneri et Mercurio conveniunt omnes, a diadiapason usque ad sextam majorem.

3) Vel binis quibuscunque, ratioelatione ex prioribus duabus formata, quae tandem in inquisitionem universalis harmoniae omnium sex, in unum concentum conspirant, desinit, ejus per temporis satis longam prolixitatem contingere possunt formae quatuor. De his earumque causis et defectibus vide Harmonicorum librum IV.

Doce computare, qualis sit harmonia inter diurnos sive ex Sole eccentricos sive apparentes in Terra. Minorem ex diurnis apparentibus sive ex Sole (illie), sive (hic) ex Terra due in 240, factum divide per majorem, quod prodit, compara cum hae tabella.

Diapason	Simplex 120	Compositae cum Diapason					
		60	30	15	$7\frac{1}{2}$	$3\frac{3}{4}$	$1\frac{7}{8}$
Sexta dura	144	72	36	18	9	$4\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{4}$
Sexta mollis	150	75	$37\frac{1}{2}$	$18\frac{3}{4}$	$9\frac{3}{4}$	$4\frac{11}{16}$	$2\frac{11}{32}$
Diapente	160	80	40	20	10	5	$2\frac{1}{2}$
Diatessaron	180	90	45	$22\frac{1}{2}$	$11\frac{1}{4}$	$5\frac{5}{8}$	$2\frac{13}{16}$
Tertia dura	192	96	48	24	12	6	3
Tertia mollis	200	100	50	25	$12\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{4}$	$3\frac{1}{8}$
Unisonus	240						

Sit diurnus Solis 60, Martis 48, duc 48 in 240, factum 11520 divide per 60: quotiens 192 est argumentum tertiae durae.

Sit diurnus $24\ 13, 2\ 1^{\circ}\ 42'$ seu 102'; duc 13 in 240, factum 3120 divide per 102, quotiens 30 (paulo plus) ostendit, interesse fere harmoniam compositam ex diapason et diadiapason, id est tridiapason. Nam si motus Veneris esset 104, perfecta esset haec harmonia.

Reliqua suppleantur ex lectione operis Harmonices Mundi.*

LIBRI SEXTI, DOCTRINAE THEORICAE TERTII

F I N I S.

EPITOMES ASTRONOMIAE COPERNICANAE

LIBER SEPTIMUS.

AD SPHAERICAM SIMUL ET THEORICAM DOCTRINAM PERTINENS.

Quae erit materia libri VII? Disputatio illa veterum de motu nonae et octavae sphaerae seu fixarum, et quae hinc dependet, differenti magnitudinis anni sideris et anni tropici; de praecessione aequinoctiorum; de mutabili obliquitate eclipticae et connexis quaestionibus.

Quot sphaeras habet astronomia vetus? Decem. Prima est Lunae, secunda Mercurii, tertia Veneris, quarta Solis, quinta Martis, sexta Jovis, septima Saturni (harum semidiametros ex sententia veterum vide libro IV. fol. 333), octava fixarum, nona et decima sunt *aræççoi*. Recentiores undecimam, quidam et duodecimam audent addere.

Quam causam habuerunt, sphaerae fixarum superponendi sphaeras alias sine stellis? Fuit tempus, cum ignoraretur, fixas in consequentia signorum promoveri, et tunc sphaera fixarum octava fuit habita pro ultima, ut quidem vere est; eique fuit tributus motus ab ortu in occasum circa polos mundi immobiles, hoc est fisdem perpetuo Terrae locis imminentes, qui libro II. fol. 190. designati sunt. In hac octava sphaera fingebant descriptum esse aequinoctialem et zodiacum cum polis suis, et sub polis zodiaci supposuerunt infibulatum velut esse concentricum systematis Saturnii, sic ut circumvoluta sphaera fixarum spatio 24 horarum, necesse esset una circumduci et polos et totam sphaeram concentricam Saturni, demto arcu minimo, quoniam sphaera Saturni sub octava quasi reptando conficere iussa est diem in contrarium ab occasu in ortum.

Postquam vero deprehensum est, fixas quoque signis zodiaci paulatim excedere in consequentia, priusquam sciretur, continuè id facerent, anne revertèrentur olim per eadem vestigia, contemplatores istud potius crediderunt, ducti hac verisimilitudine, quod videre sibi viderentur, motum hunc fixarum ex tardo velocem fieri. Itaque novam sphaeram octavae circumjecerunt, in quam motum diurnum aequinoctialemque et zodiacum ejusque

polos transtulerunt, ut sub hujus polis eclipticae affibulati essent poli octavae fixarum sphaerae, quae sum etiam zodiacum ut prius haberet, atque hic octavae zodiacus sub illo nonae rursus prorsumque nutaret spatio aliquot graduum. Hunc motum accessus et recessus appellarunt, seu motum trepidationis.

Succedentibus vero seculis experientia docuit, fixas, transitis omnibus tenuis, antiquorum opinione praescriptis, pergere continue nec reverti in vestigia priora. Necessarium itaque censuerunt, etiam huic nonae sphaerae motum proprium dare eique decimam circumdare, quae, quod primi octavae, secundi nonae motus (primi motus) assignassent, ipsa administraret eirenosque aequatorem et zodiacum ejusque polos diurno motu mobiles haberet, poli vero eclipticae nonae sphaerae polis eclipticae decimae adhaererent, ut et poli octavae polis nonae. Itaque circumibat decima ab ortu in occasum spatio diurno circa polos mundi immobiles, totam torquens machinam, repebat eclipticae notae sub ecliptica decimae in contrarium ab occasu in ortum circa polos proprios, absolvens aequabili motu unam periodum secundum Alphonsinos spatio unius jubilai millenariorum seu 49000 annis, trepidabat ecliptica octavae sub ecliptica nonae motu reciproco, ut prius, si trepidatio dici poterat, quae spatio 7000 annorum vicem peragit unam; qua trepidatione motus nonae vel accelerabatur vel retardabatur.

Hanc imaginationem trium eclipticarum in uno et eodem plano potio numeris astronomiae veteris convenientiorem esse. Nam qui deflexiones capitis Arietis et Librae ad latera mundi in circellis introduxerunt, ii se ipsos et lectores una secum misere perturbarunt, primorum aucterum intentum et vim numerorum non expresserunt. Fateor, circellos lis in animo fuisse movendis capitibus, id est initiis Arietis et Librae, sed id in diametris circellorum, secundum longitudinem eclipticarum extensis, non in circumferentiis, ad latera mundi excurrentibus. Nam mutationem obliquitatis eclipticae per hanc hypothesin non repraesentaverunt, certe non quoad quantitatem, nec fuit, qui hoc vel leviter tentaret ante Copernicum.

Quid sit de motibus his octavae, nonae decimaeque sphaerae deque ipsis adeo sphaeris in astronomia Copernici? Deiecit illa supervacuas et vacuas stellis novam et decimam, octavam seu fixarum sphaeram mundo pro pariete extimo relinquit penitus immobilem; motus vero omnes tres et quicquid insuper ex eo tempore novi deprehensus est, in unicum globum Telluris confert. Vide librum IV. fol. 356. 358.

Primus enim seu diurnus motus, quem nos ire putamus ab ortu in occasum, non inest toti machinae mundi, sed unico globulo exilissimo Telluris super polis suis propriis, qui poli mundi appellantur, eo quod veteres decimam sphaeram et cum ea totam mundi machinam circa eundem axem continuatam ejusque polos volvi erediderint, ut libro primo copiose disputatum est. Fixarum vero imaginaria transpositio in gradus signorum sequentes non est vera et physica motio, cum gradus illi non sint locus physicus alius, sed re vera iidem permanentes, aliter tantum numerentur; nec accrescunt fixis spatiis, sed spatiis accrescit numerus. Vide librum III. fol. 273.

Quae causa est, cur fixarum locis cum successione seculorum augeatur numeratio? Quia zodiaci partium numerationis initium fit a sectione eclipticae et aequatoris, ut libro II. fol. 203. indicatum est. Jam vero sectionum puncta retrocedant ab ortu in occasum, qua ratione fit, ut eadem fixa, ma-

centrum et axem quasi immobiles, de quo libro I. Omnium trium luter se permixtorum exempla sunt in turbine libro I. fol. 173.

Quam huic inclinationi axis causam assignas, seu quem motorem? Potest esse illa facultas animalis, quae globum circa suum axem torquet, sed quae haecenus quidem instrumentis corporeis et dispositione fibrarum contenta, nunc mente utatur insuper: et de hac causa mentio fuit injecta libro I. fol. 178. Talem etiam concessimus motui apsidum libro IV. fol. 381, talem motui latitudinis administrando fol. 386.

Potest vero etiam esse concursus causarum physice moventium, extraneae, quae est species Solis movens, et internae, quae est dispositio fibrarum, et impedimentum a concursu, ut hic motus tardissimus vere non sit motus, sed sit quaedam veluti aberratio diurni corporis ab annuo centri, qualia multa concipi possunt, ut apparet exemplis dictorum locorum fol. 381. et fol. 385. 386; et hanc etiam inclinationis axis Terrae causam insinuavi libro I. fol. 174. Ita essent reales motus tantum duo.

Quo minus autem laborandum sit ingeniumque fatigandum, ut modus hujus concursus eruatur, rationes vide dictis locis; militant enim hic multo magis, quam in negotio translationis apsidum et latitudinum.

Quid novi deprehensum ais circa motum fixarum et eclipticae? Non tantum in longum fixas discedere constat a sectione verna zodiaci, sed etiam in latitudinem; septentrionales fixae circa punctum solstitiale aestivum inveniuntur hodie viciniores polo eclipticae septentrionali, meridionales vero circa hunc eclipticae partem appropinquant ipsi eclipticae. Circa solstitiale punctum hibernum analogice fit idem, circa vero Arietem et Libram non sensibilis deprehenditur differentia. Vide libro II. fol. 193. et 229. et Progym. Tychonis Brahe Tomum I. a fol. 233. in 246.

Sic etiam hoc novum accidit Albategnio ante annos 750, quod minorem invenit declinationem eclipticae, quam Eratostheues et Ptolemaeus tradidere, duravitque haec imminutio ad nos usque, ut hodie nova nobis non sit.

Quas hypotheses confinxerunt antecessores, ad haec nova phaenomena salvanda? Diminutioni quidem declinationis maximae eclipticae ab aequatore causam suam assignare neglexerunt antecessores usque ad Copernicum. Illo vero polum Telluris hujus phaenomeni causa libratilem fecit in diametro celli, quae in planum coluri solstitiorum lucidit. Cui librationi in transversum velut stannini subtemen intexit librationem aliam, duplo celeriore, ad salvandam praecessoris inaequalitatem, ut sic ex utraque composita species existeret corollae contortae; vide Narrationem Rhetici, adjunctam Mysterio meo Cosmographico. (Editioni primae.) Alii motuum Telluris tam multiplicium absurditate offensi, maluerunt undecimam sphaeram mundo circumspicere. At Tycho Brahe, qui primus animadverit, etiam latitudines esse mutatas fixarum, non omnium simul, sed tantum vicinarum partibus eclipticae maxime declinantibus, ex eo intellexit, non polos mundi vel aequatoris moveandos, ut aequator accedat ad eclipticam, sed contra polos eclipticae, sedibus pristinis inter fixas desertis, ad polos aequatoris et sic eclipticam ad aequatorem accedere; quod secuti sumus libro III. fol. 292. Id vero quam ratione fieret, Tycho Braheus non reliquit explicatam.

Quid ergo polos eclipticae ipsamque adeo eclipticam sedibus suis movet? Rursus idem Terrae motus annuus circa Solem, si nimirum ille fiat per omnia similis motibus ceterorum planetarum, ut monui libro VI. parte I, hoc

est si etiam suos ille limites latitudinum habent suosque nodos, et eos quidem, ut ceterorum, mobiles. Vide librum IV. fol. 354.

Atqui ceteris planetis limites et nodi potuerunt assignari respectu eclipticae, a qua excurrebant illi in limites suos et quam secabant in nodis: Terrae vero centrum ipsum suo motu circa Solem describit sub fixa eclipticam, non circurrit illa igitur ab hac, ut quae eundem sequitur, ut umbra corpus. Equidem suam ipsius viam Terra nec secat nec deserit, ideo ut limites et nodos habere possit, oportet aliam quandam fixam eclipticam esse viam regiam statuere, ad quam et Telluris orbita eique superatans ecliptica temporaria et reliquorum omnium itinera varie inclinentur.

Unde existit illa via regia ejusque poli, et quid est? Ab axe, circa quem corpus Solis turbinatur, utrinque continuato usque sub fixas, signantur duo poli, quos inter circulus parallelorum medius et maximus est via regia.

Ut in schemate praemisso, si polus regiae sit A et circa illum in QOP circello moveatur polus eclipticae temporariae P. sitque circa hoc aevum inter Ptolemaeum et nos in circulo AC, recto fere ad eolorum solstitiorum usuaem PF, accedet igitur polus eclipticae P ad stellas fixas in PF usque ad eclipticam ipsam sitas, discedet ab eadem ecliptica ipsa circa \square , \boxplus , quippe semper distans quadrante a polo suo mobili.

Investiga situm eclipticae regiae respectu temporariae, seu potius hujus respectu illius. Primum, quia nodi Lunae et ceterorum fere planetarum retrocedunt, retrocedant et Telluris orbitae sectiones cum regia, moventur sc. polus eclipticae in plagas QOP. Sit autem polus mundi hodiernus P. Quia igitur fixae circa et infra F hodie minus distant a polo eclipticae, descendit igitur P polus eclipticae versus fixas F. Nodi igitur seu sectiones eclipticarum contingunt circa eolorum PE, circa \odot , \oslash vel paulo antierius versus plagam AM, ubi scilicet PF et AF aequales, limites igitur erunt in locis quadratis, scilicet in γ , ω circiter; ut si FAD sit pene rectus, erunt nodi orbitae Telluris in circulo CAD utrinque producto, et boreus quidem limex erit in plagam AD, quia polus eclipticae temporariae est in contraria plagam AC, sc. in P.

Propter hanc dispositionem, quae obtinet hoc aeulo, propter scil. rectitudinem anguli APF, supra libro IV. fol. 385. verisimile esse diximus, inclinationem planetae administrari per axem turbinationis corporis. Nam sub F est ille axis, circa quem turbinatur Terra, et PF porrigitur versus nodos Terrae. At si non maneat omnibus saeculis idem situs punctorum A, P, F, turbatur haec verisimilitudo.

Est itaque nodus Telluris ascendens hodie circa \oslash , limex boreus circa γ , nodus descendens circa \odot , et contra via regia, quam quacimus, a \odot assurgit in boream a nostra ecliptica usque in \oslash , appropinquans apheliis: Martis in 29° \odot , Jovis in 7° ω , Mercurii in 15° \oslash , Saturni in 25° \oslash , omnibus borealibus. A \oslash sit australis a nostra ecliptica, appropinquans aphelio Veneris in 2° ω australi; quippe hujus limex austrinus est in γ . Ita ipsa loca apheliorum omnium planetarum cum plagis suis quam proxime designant hanc viam regiam, declinant tamen etiam ab hac novitum, alia aliter.

Quomodo ex hac hypothese sequitur obliquitatis eclipticae variatio? Nondum sufficit hae hypothesis, posset enim aliquis dicere, axem Telluris retinere constantem inclinationem ad planum suae eclipticae temporariae semperque manere aevum distantiae polorum PP eundem. Oportet igitur haec insuper addere: 1) quod axis turbinationis Telluris constanti angulo inclinetur

ad axem turbinationis Solis seu polum regionum A (id quod per se verisimile, cum hæc sint duo principia prima motuum mundanorum omnium, ut libro IV. demonstratum est) et hoc secuti sumus libro III. fol. 229. seu quod circulus LCM, sub quo polus mundi per fixas incedit, sit ex A polo regio descriptas, 2) quod polus eclipticæ temporariæ P sit celerior circa A in antecedentia, quam polus mundi E. (cfr. annot. 37.)

Quanta est latitudo seu inclinatio maxima limitis, seu quanta distantia polorum PA eclipticæ et regiae? et quanta poli mundi F distantia a polo regio A, et unde deducitur? Varia posset sumi quantitas horum arcuum. Valeant igitur conjecturae, quibus nec Alphonsini nec Copernicus abstinuerunt. Illi namque mille jubilæis et mille hebdomadibus annorum defleuerunt reditus fixarum et circellorum, Copernicus vero commensurabilem fecit eclipticæ obliquationem et æquinoctiorum præcessionem ratione temporis: uterque probabilitatem secutus est, ultra necessitatem demonstrativam.

Dicamus itaque et nos, polum eclipticæ initio mundi fuisse in Q, quando polus mundi in C, ut QAC esset rectus, et tunc AC vel QC fuisse $24^{\circ} 17' 40''$, ut ita superficies zonarum temperatarum æquarent superficies intemperatarum (vide libro III. fol. 272.).

Dicamus secundo, AQ, AP, AB esse $1^{\circ} 47' 40''$, ut sic residua QL vel PC vel BD sit $22^{\circ} 30'$, pars octava circuli colorum, qui zonarum latitudines metitur, rursumque existente distantia polorum BD, QL vel PC, tantundem de hoc colore intercipiatur a temperatis zonis, quantum ab intemperatis, quæ concinnitas est explicata fol. 271.

Nam si inclinatio axis, media inter nihil et 90° , media rursum inter nihil et dimidium de 90° , sc. 45° , certo causam habuit hanc finalem, ut essent zonæ temperatæ inter intemperatas, hinc frigidas lude torridam, interpositas, quod quidem dicto libro III. a fol. 268 prolixè est ostensum: nihil eadem concinnius videtur excogitari posse, quam ut etiam exacta quantitas inclinationis ab exacta æqualitate duplici zonarum derivetur, quarum una sit superficies, altera mediae latitudinis seu dimittentium, qui sunt arcus maximi circuli, colorum solstitiorum dicti.

Porro et illud principio rerum videtur competere, ut æqualiter a polo mundi C distent poli tam eclipticæ temporariæ Q, quam regiae A, ut quod AC inclinatio poli mundi ad regionem pollicebatur, id in principio motuum eclipticæ ipsa temporaria seu inclinatio QC re ipsa præstet.

Comparet lector ea, quæ in Commentariis Martis Cap. LXVIII. fol. 322. (III. 426) de situ circellorum horum disputavi, quamque inveniet differentiam, rei ipsius difficultati et penurie observationum opportunam tribuat. ³²⁾

Quanta igitur est varietas latitudinis stellarum et obliquitatis eclipticæ, qui responsus inter utramque et quæ perihodus? Minima obliquitas, ut dictum, esset $22^{\circ} 30'$ seu arcus ab octogoni latere in colore solstitiorum interstinctus, maxima excreceret usque ad $26^{\circ} 5' 20''$, sed hoc plus quam 36 milibus annorum postquam fuerit minima. Nec semper ut hodie solstitiales fixæ mutarent suas latitudines; alio namque ævo deprehenderetur id in æquinoctialibus, tunc nimirum, quando obliquitas eclipticæ consisteret immobilis. Nam hodie, seu inter Ptolemæum et nos, celerissima fuisse obliquitatis mutatio. Et summa latitudinum differentia excreceret in $8^{\circ} 35' 20''$.

Quid est in hac hypothesis media præcessio æquinoctiorum? Est arcus viæ regiae, numeratus a circulo per polum regionum et primam Arietis ducto,

usque ad sectionem aequinoctialis et viae regiae, idque in antecedentia signorum. Eisi ad tempora illa, cum prima Arietis sectionem antecessit, compendii causa etiam in consequentia numerari potest.

Quid observandum circa hoc fixarum principium? Tycho Brahe numerat a lucida Arietis, quae non est prima; Copernicus a puncto, quod $115^{\circ} 50'$ distat a corde, vel etiam quod $170^{\circ} 0'$ a spica Virginis retro distat, quia putavit, primam Arietis vere tantum distare a fixis retro. Vide Progym. Tych. Tom. I. fol. 42.

Quid est anomalia obliquitatis eclipticae, vel etiam praecessionis aequinoctiorum? Est arcus circelli, quem polus Terrae vel mundi circa polum regium describit, a circulo per polos, regium et mundanum, usque ad circulum latitudinis per polos eclipticae et regiae, numeratus in antecedentia.

Ut si F polus mundi, A regias, P eclipticae temporariae, erit FAP angulus vel NP arcus anomaliae obliquitatis vel etiam praecessionis.

Quas proportio est hujus motus poli eclipticae ad motum poli mundi seu aequinoctiorum praecessionis? Videtur ille esse ad hunc ut 4 ad 3 sat praecise.

Quid est obliquitas eclipticae media, quid vera, et quid prosthaphaeresis obliquitatis? Media est arcus circuli magni inter polos, regium et mundanum, ut AC, AE, AF etc. Vera est arcus coluri solstitiorum, inter polos eclipticae et mundi, ut CQ, EO, FP. Prosthaphaeresis est utriusque differentia.

Quid ex hac variatione obliquitatis sequitur in praecessionem aequinoctiorum? Redditur illa inaequalis, sed tardissima inaequalitate, quaeque cum ipsius etiam obliquitatis anomalia restituitur. Itaque etiam motus fixarum, etsi per se aequabilis a medio aequinoctio fuerit, per accidens a vero scilicet aequinoctio invenietur novum inaequalis.

Quid est in hac hypothesis prosthaphaeresis aequinoctiorum? Est arcus vel regiae viae vel eclipticae, interceptus inter duos circulos magnos, per illarum polos et sectiones cum aequinoctiali traductos.

Quid vera praecessio? Est arcus eclipticae, numeratus a circulo latitudinis per primam Arietis in antecedentia usque ad colurum aequinoctiorum. Vel etiam in consequentia numerari potest, ut media praecessio.

Quanta est maxima haec prosthaphaeresis et quomodo computanda? In schemate sit AC $24^{\circ} 17' 40''$, AQ $1^{\circ} 47' 40''$, erit ergo QUA $4^{\circ} 22'$ et continuati QC, AC in eclipticam intercipient paulo minorem arcum, scilicet $3^{\circ} 58' 45''$. Tanta est omnium maxima prosthaphaeresis, sed quae in brevi seculorum numero minima sui parte comparet, nec facile sentiantur.

AQ $1^{\circ} 47' 40''$ Log. 346370

AC $21. 17. 40.$ Log. 88813

Differentia 257557 dat $4^{\circ} 22'$

AC antilogarithmus 9277

Summa 266834 dat $3^{\circ} 58' 45''$. *)

Nullane major est inaequalitas praecessionis punctorum aequinoctialium? Ex hypothesis quidem nulla praeterea sequitur punctorum ipsarum, seu sectionum prosthaphaeresis. At nec ex observationibus certi quicquam depromi potest, nisi vel miraculosum vel penitus irregulare et casui physico simile. Nam a Proclo ad nos usque per 11 vel 12 secula puncta aequinoctialia certo processerunt aequabili passu, in quam regulam etiam quadrant Hipparchi et Timocharis observata ab 18 seculis, si unum Ptolemaeum dist-

miles. Quare si quid accidit huic axi Telluris, quo ille suo situ enormiter emoveretur, id fuit inter Hipparchum et Ptolemaeum, breviori quam 800-annorum spatio, restitutumque est inter Ptolemaeum et Proclum, trimis rursus seculorum intercapedine. Quare non injuria de Ptolemaei observationibus aequinoctiorum dubitari potest. Vide Tych. Brahei Progymnasmatum Tom. I. fol. 254. et Comm. Martii cap. LXIX.

Estne possibile, Ptolemaeum errasse circa observationem certae diei aequinoctiorum, et quomodo? Nec in altitudinis poli erravit, ut quae pluribus documentis est confirmata, nec in altitudine Solis, ut quae dependet a poli altitudine. Forsitan igitur hoc illi accidit, ut cum sub Augusto esset abolita observatio anni Aegyptiaci, Ptolemaeus dies anni Aegyptiaci per Lunam, et de Luna ageretur, vel per Solem ejusque calculum ab Hipparcho relictum, et de Solis observatione ageretur, quoeslverit, neglecto tunc consensu observationum Lunae nimiumque confusus calculo Hipparchi, existimavit, sibi de hora solummodo ingressus in γ laborandum esse. Nam calendario Romano, quod in Aegypto, necesse erat observari, fidere Ptolemaeus non potuit, quia etiam post Augusti correctionem quandoque dies unus ad pontificum arbitrium fuit in uno anno exemptus inque sequenti restitutus. Vide exemplum in Diono et causam: ne Idus in nundinas incurrerent.⁹⁴)

Quid si Solem aequinoctii diebus orientem observasset, eligens locum horizontis justo borealiorem pro ortu aequinoctiali? Tunc sane omnibus anni vernali aequinoctium tardius justo, at vicissim autumnale justo velocius collegisset, Sole eodem ex loco horizontis oriente. Atqui hoc non est factum. Ptolemaeus enim intra unius anni spatium utrumque aequinoctium justo diebus interstitio consignavit. Aut si locus orientis Solis in vernali aequinoctio fuisset justo borealior, locus eundem orientis Solis in autumnali post justum interstitium non fuisset idem, sed australior.

Concedo locum justum in horizonte ortuum aequinoctialium amborum: annon refractione Ptolemaeo neglecta turbare quid potuit? Sustinisset illa Solem in boream in utroque aequinoctio, itaque Sol velocius in aequatore visus esset tempore verno, tardius in autumnali, aestas fuisset aucta nimium. Contrarium evenisset, si fingas observatos esse occasus aequinoctiales utrosque.

Quid de seculo Ptolemaei fiet, si astronomia haec aliud illi praescribit initium zodiaci, quam ipse secutus est; an etiam ipsius observatis ceteris gaudere poterimus? Quemadmodum insolitus et praeter morem ceterorum seculorum fuit ejus tempore annotatus vel etiam observatus ingressus Solis in signa aequinoctialia, sic etiam extra regulam ad fidem ipsius observatorum in antecedentia reponendum erit ad ejus tempora principium zodiaci: quo facto cetera omnia recte habebunt.

Quodnam est hujus fiduciae fundamentum? Quia doctrina theoretica conjunctionesque siderum inter se doceri et computari possent etiam sine omni cognitione dodecentuoriorum zodiaci eorumque principii, utpote quod solina occasione motus Terrae diurni constituitur. Itaque Copernicus et veterum nonnulli computare docent loca planetarum, initio capto a prima Arietis; tunc deinceps jubent addere praecessionem aequinoctiorum, ut locus cujusque sideris in zodiaco patescat.

Quid vocat Copernicus motum Solis simplicem, quid motum compositum? Simplex is dicitur, cujus initium sumitur a puncto fixo, scilicet a prima stella Arietis, a qua figura olim primum zodiaci dodecentuoriorum fuit insignit-

tum et ejus figurae nomen etiamnum hodie retinet dodecatemorum illud, postquam sidus ipsum, quod nomen luitio dederat, potissima parte in vicinum dodecatemorum emigravit. Compositus motus est, qui constat ex duabus partibus, 1) ex motu a fixo puncto in consequentia, 2) ex motu medio principii Arietis dodecatemorii seu sectionis vernalis in antecedentia, hoc est qui numeratur a puncto non fixo, sed mobili, scilicet ab aequinoctiali.

Quantus est vel motus fixarum medius in consequentia, vel praecessio aequinoctiorum media a prima Arietis in antecedentia? Hipparchus et Ptolemaeus existimaverunt, cum inde a Timocharide in 100 annis unum gradum et in 36000 annis totum circulum absolvere. At Tycho Braheus, comparatione suarum observationum cum Hipparchicis et Albategnianis, in annis 70 paulo plus gradum unum confici statuit. Vide Progym. Tomo I. fol. 253. et seqq. Quare periodus una habebit annos 25410, motus annuus fixarum est $0' 51''$.

Qua via fuit investigatus iste motus? Simplicissima ratio fuit ista, quod cognita fixae eclipticae vicinae latitudines, observavit ejus declinationem, latitudinem enim supposuerunt constantem, at declinationem invenerunt variari per secula, vide libro III. fol. 281. Ex declinatione locum ab intersectione collegerunt. Operosior viam per ☉ et ♀ et ☊ vide libro III. fol. 274 et 276.

Quid ex praecessione punctorum aequinoctialium redundat in motum Solis rationesque anni? 1. Cum Sol progrediatur sub fixis, aequinoctialia et tropica puncta retrocedant a fixis, obviando Soli jam appropinquanti: hinc est, quod Sol citius ad tropica veniat, quam ad fixas, cum quibus erant tropica in principio anni. Itaque tropicus annus hinc fit brevior quam sidereus, et per consequens sidera ipsa cum suis emersionibus et occultationibus temporales anni pristinas deserunt deque aetate in autumnum etc. transeunt. De hac materia est pars ultima libri III.

2. Cumque praecessio tropicorum sit inaequalis, seu parum, secundum hypothesin, seu multum, secundum observata Ptolemaica: hinc etiam anni tropici sunt nonnihil inaequales, cum sideri sint aequales.

Nihilne accedit ex motu Solis, quod inaequalitatem annorum adjacet? Equidem et sidereus et tropicus annus variantur ob progressum apogaei Solis in consequentia, unde fit, ut aliae atque aliae Solis aequationes incidant in puncta aequinoctialia et tropica, et sic sidereus uno, tropicus duobus nominibus fit inaequalis. Verum haec posterior inaequalitas obtinet tantummodo respectu certi annorum initii compensaturque per oppositum initium sumtum. Verbi causa a Ptolemaeo ad nos breviusculus quidem fuit annus tropicus ceteris paribus, vel etiam sidereus, ille ab aequinoctio verno, hic a prima Arietis incipiens, quia prosthaphaeresis adjectoria in principio Arietis haecenus fuit aucta; vicissim vero tanto fuit longior annus ab autumnali aequinoctio ceteris paribus vel a Spicae Virginis conjunctione incipiens, quia in illa parte coeli prosthaphaeresis subtractoria similiter fuit aucta: itaque aetatis longitudo interea erevit, saltem usque ad annum 1260 eireiter. Deinde tardissima est periodus hujus anomaliae, excurrit enim ultra 25 millia annorum, quare parum censitur intra unum millenarium.

Quomodo differt haec inaequalitas annorum ab aequationis temporis illa parte, quae est ab eadem causa libro III. fol. 251. et Libri VI. parte 1? Differt ab illa, ut annus a die. Illic enim ostensum est, aequatio Solis quantam longitudinis 24 horarum inaequalitatem emendaretur, hic quaeritur, quot

inde dies accedant ad aliquam magnam summam annorum mediocrius, quotve alias decedant.

Quid discriminis ponis inter praecessionem aequinoctiorum et anticipationem aequinoctiorum? Si accurate agimus, praecesso de motu vel quasi motu est intelligenda, ut hactenus anticipatio, graece *προσπρῶτος*, de tempore civili. Et enim praecessionem dico, vox aequinoctiorum sonat puncta certa eclipticae, hactenus definita, cum vero anticipationem nomino, vox aequinoctiorum subijuncta significat Solis praesentiam in illis sectionibus seu punctis aequinoctialibus, seu clarius, diem anni civilis, quo die Sol lucet aequat noctibus.

Anticipant igitur aequinoctia in anno civili seu Juliano, quando deserunt diem certam mensis, et post aliquot. secula inveniuntur in diebus antecedentibus.

Quid facit anticipare aequinoctia et soletitia? Quantitas anni civilis paulo longior anno tropico: sit enim hinc, ut desinat nostra numeratio dierum anni, postquam Sol jam transgressus est susceptum initiale punctum eclipticae. Ita verissime loquendo non anticipat tempus aequinoctii, veluti motu aliquo, sed postvenit nostra numeratio.

Et quid vicissim postponit in eodem anno civili ortus siderum? Eandem quantitatem anni civilis paulo brevior anno sidero, prius enim desinunt dies anni nostri, quam Sol ad eandem fixam fuerit reversus. Dicitur *μεταπρῶτος*. Ita noster civilis annus Julianus est quantitate medius inter tropicam et siderum, quo nomine supra libro III. fol. 246. commendatus fuit ab astronomia.

Cur autem numeramus nos, quod nimium et vitiosum est? Quia numeri unitates debent esse discretae, hoc est dies integri ab ortu Solis usque in proximum ortum, anni vero quantitas in minutias quasdam horarum explicatur, quas non solemus usu quotidiano numerare, contenti diebus integris. Quare necessario cogimur expectare tam diu, quoad minutiae residuae supra annum tropicum ad finem anni civilis (sunt autem minuta horae 10. 50" 33" per accumulationem de pluribus annis excrecant in unam diem.

Etsi vero hoc factum fuerit, quia tamen tempus hoc excedit aetatem hominis estque incommodum, omittere tam raro diem extra ordinem, ideo maluerunt homines illibatum retinere civilem annum Julianum inque eo anticipantia futuris temporibus assignare aequinoctia et soletitia; quod etiam astronomis ad speculationem aequinoctiorum percommodum est, consignata habere in anno Juliano, veluti indiculo, omnium aetatum aequinoctia, ut appareat, aequaliter illa anticipent per aequalia tempora an. seculis.

Quot annos requirit haec anticipatio, quoad diem unum conficiat? Primus Hipparchus spatium definivit trecentorum annorum, ductus conjectura cycli sui seu anni civilis lunaris, quam periodum Calippicam supra nominavimus, utpote in qua vidit etiam lunares motus in 304 annis unum diem anticipare. Credidit itaque, si in 304 annis civilibus solaribus etiam una dies eximatur, tunc illos solares exacte adaequari totidem lunaribus. Hanc Hipparchi opinionem Ptolemaeus retinuit nimis secure, ut Tycho Brahe visum, sed ipse Ptolemaeus visus est eam comprobare suis etiam observationibus; de quarum fide supra. Statim enim post Ptolemaeum est deprehensum, longe celerius unum perire diem. Itaque si dissimulemus unum Ptolemaeum, constabit sibi ratio aequalis ab Hipparcho per Proclum, Albategnium, Persas, Arabas, Hebraeos, Germanos, usque ad nostra tempora, quo in 134

annis unam diem, in 400 tres dies aequinoctia anticipat; quod quam proxime exprimit ordinatio civilis annis Gregoriani, ut est libro III. fol. 247.

Unde accersita est Romam anni Juliani ratio? Quantitas ejus dierum 365. cum quadrante, qui quatuor exactis annis consuebat unam diem supernumerarium, ab antiquissimis temporibus fuit observata a Graecis, forma tamen alia. Julius itaque Caesar Romanum ei togam induit.

Quam rationem secutus est Julius Caesar in constituendis mensium suorum initiis? Calendas Julias, mensis a se dicti, voluit diem illum, quo die omnes graecae nationes ex antiquissimo ritu ludorum Olympicorum putabant solstitium consueci, quamquam illud usque ad Hipparchi tempora jam per dies octo in calendario Graecorum civili anticipaverat, quod primus Hipparchus docuit: solstitia et aequinoctia (intelligo, praesae observationis) in octavis partibus signorum consueci asserens. Dictum hoc fuit solstitium Chaldaicum. Itaque Julius Caesar vera Hipparchi solstitia et aequinoctia, quae in principis signorum confingebant quaequo ipse putabat otianum suo tempore valere, adscripsit ad VIII. Cal. mensium.

Quid igitur est, quod Plinius alicubi, necnon et Columella suis adhuc temporibus transcribunt illa etiam ad XV. Cal.? Certum est, hallucinationem illis ex confusione diversarum traditionum obrepisse, cujus duae possunt ostendi verisimiles occasiones. Prima sit ista: cum enim hauserent ex Hipparcho, solstitia, puta Chaldaica, consueci in octavis partibus signorum eoque emendato utendum observatione solstitiorum, ipsi transferentes hoc dogma ad solstitia Hipparchica, jam dudum a Caesare emendata, scilicet ad VIII. Cal. adscripta, perinde ac si illa adhuc emendatione egerent octavisque signorum partibus accommodata essent, ad primas illa partes signorum seu octavas retro transferenda et sic ab VIII. Cal. ad XV. Cal. ascendendum sibi censuerunt.

Altera errandi occasio fit ex Eudoxi sphaera rudi, ut in qua coluri per media signa Cancri et Capricorni, Arctici et Librae transibant. Et id quidem, si asterismos spectes, fuerit aliquando, talemque sphaeram, plurimis retro seculis accommodatam, Eudoxus fortasse nactus erat. Sed esto, transiverint coluri per media non asterismorum sed moderatiorum zodiaci. Fieri itaque potuit, ut Columella, Solem Calendis in coluro versari solstitiumque ibi, sed Chaldaicum et obsoletum vetustate consueci reputans, censuerit sibi vorum sui temporis solstitium apud initium Cancri, quod 15 gradibus antecederat in Eudoxi sphaera, quaerendum eaque ratione numerum a Cal. ad XV. Cal. extenderit.

Quid sequitur ex hoc circuitu limitum orbitae Telluris in planetas ceteros? 1. Si limites orbitae Telluris in parallelo vine regiae, hoc est si poli orbitae in circellis parvis circa polos viae regiae circumueant, equidem etiam omnia reliquorum primariorum planetarum poli orbitarum polos illos regios circumstabant. Quare si vo quiescant illi sub fixis, si vo moveantur, dummodo tardius eant polis eclipticae, necesse est hos ab illis nunc discedere, nunc ad illos accedere. Illic igitur augebuntur inclinationes maximae limitum ad eclipticam temporariam, hic minuentur.

Martis quidem limes in γ est circa Cordis stellam, polus igitur ejus orbitae declinat versus γ , circa R (Fig. 98), ut si PP in γ vergit, PR vergat in γ , quodsi polus iste orbitae Martis in antecedentia movetur, ascendit igitur versus Q, ascendat tardius, quam polus eclipticae ex O in P descendat, ut sic olim OR minus conicirculo fuerit, brevior igitur fuit olim RO quam

hodie RP. Variata quantitate inclinationis seu distantiae polorum RP, variabitur et quantitas latitudinis maximae in limite boreo. Et sic etiam invenimus, si Ptolemaei observationibus fides est adhibenda. Nam haec maxima latitudo circa Cor \varnothing hodie est $4^{\circ} 32'$, ut Ptolemaeus prodit illam $4^{\circ} 20'$, per $12'$ minorem, cum etiam Cordis Leonis latitudinem sept. prodat $16'$, per $16'$ minorem, quam illa est hodie. Et fieri potest, ut epicyclus Ptolemaicus obsistat, quo minus haec latitudo illi fieri poterit adhuc multo minor: nam inclinationem Martis ille prodit $1^{\circ} 0'$, quae hodie est $1^{\circ} 50\frac{1}{2}'$, etsi tantum efficere nequit mutatio ista latitudinis fixarum.

Similo quid monet Tycho Braheus etiam de Luna (Progymnasm. Tomo I. fol. 27. insectorum Lunarium), sed ex quo non capias conjecturam mutatae maximae Lunae latitudinis: non deest enim, ut Luna, planeta secundarius et terreus, aliorum quam ad Terrae orbitam temporariam constanter respiceret, quocunque illa situ sub fixis quovis tempore esset, quin potius inde quantitas obliquitatis eclipticae, ab Eratosthene et Ptolemaeo prodita, in dubium vocari deberet, si latitudinem Lunae difficillimis observationibus liceret argumentari contra observationes obliquitatis eclipticae longe facilliores.

2. Quin etiam hinc sequetur, limites nodosque Saturni, Jovis, Martis, Veneris retrocedere videri, etiamsi sub fixis haerent immobiles. Esto enim, ut poli eclipticae versentur inter Q, P circa lineam AC, in Libram porrectam. Est vero hodie limes Martis in \varnothing , Veneris in Π , quare poli erunt ex P versus \varnothing et χ . Sint in R, erit ergo PR circulus latitudinis per limites Martis vel Veneris. Descendente ergo P ex O in antecedentia, sive quiescant poli R, sive et ipsi versus lineam AL in antecedentia eant, sive etiam in consequentia ferantur versus lineam AD, dummodo tardius hoc, quam est OP in antecedentia: omnibus tribus casibus partes lineae PR, quae sunt ultra R, ascendent versus AL in antecedentia. Sic cum Saturni et Jovis limites sint in Libra, poli orbitarum erunt a polo eclipticae temporariae versus Arietem in linea parallela ipsi CA vel quasi, ut circa B, rursumque huiusmodi de causis, sunt P, ex O videbuntur retrocedere. Mercurii limes in \varnothing est, polus igitur a P versus \varnothing , scilicet circa S (pene S in lineam AE inter A et E), habet enim inclinationem valde magnam. In hoc igitur planeta continget contrarium, ut polo eclipticae ex O versus P descendente, polus Mercurii S sive quiescat, sive tardius in antecedentia eat, videatur in consequentia progredi, linea PS versus PC inclinata. Quae omnia cum sint consentanea observatis, libro VI. partibus II. et III. propositis, praesertim circa Mercurium, parum abest, quin ex tanta timiditate, dictis locis usurpata, victoriam exclamem ante numeros et mensuras cognitatas.

3. Sive quiescant poli planetarum sub fixis, sive moveantur et ipsi, sequitur ex motu poli eclipticae OP, videri polorum planetariorum eoque et limitum et nodorum motus sub fixis inaequales. Nisi enim alicujus planetae polus cum ipsissimo polo regio A, centro scilicet orbiculi OP, colucidat, aut

Fig. 94. (repet.)



aequalissimum cum polo P motum circa A in partes easdem habeat, semper mutabitur ejus distantia a polo eclipticae P; quoscunque igitur arcus hic vel ille quovis tempore faciat, ii apud P polum eclipticae majorem e propinquo, minorem e remoto facient angulum, quare crura anguli producta etiam inaequales arcus apud limites intercipient, quare etiam inaequales respondebunt arcus apud nodos, quadraute semper distantes.

Quid hinc est colligendum? Cum quantitas circelli OP circa A polum regium non sit ex observatione, magnitudo motus OP ignota, plaga motus non certissima, in antecedentia apud OP, an in consequentia apud B, quare secula viginti vel quod minus, a quibus astronomiae cultae memoria durat, nequaquam sufficiunt ad universalem astronomiam condendam: sed temporaria saltem (per temporariam scilicet eclipticam) ab hominibus aevo quolibet exerceatur astronomia. Verissimae igitur plauetorum inclinationes ad regiam viam causaeque et quantitates et plagae motuum, limitum et nodorum, haec inquam et cetera hujusmodi latent in pandectis aevi sequentis, non antea discenda, quam librum hunc Deus, arbiter seculorum, recluserit mortalibus, immortalis ipse, cui sit laus, honor et gloria in secula seculorum. Amen.

LIBRI VII. ET CUM EO TOTIUS EPITOMES ASTRONOMIAE
COPERNICANAE FINIS.

IN EPITOMEN

NOTAE EDITORIS.

CUM EXCERPTIS EX TABULIS RUDOLPHINIS.

1) p. 30. Tabularum Rudolphinarum „praecepta“ 76 et 181 loca planetarum ad annum a. Cb. 3998. computata proponunt saepe infra sequentur. Hic monemus, in praeceptis Tab. Rud. magna ex parte eadem tractare Keplerum, quae in Epitome, ibique saepius ad historiam astronomiae et inventionum astronomicarum respicere. Quare passim in sequentibus annotationibus excerptimus Rudolphinarum praecepta, quae sine tabulis ipsis, quas nostrae editioni non addendas esse in prospectu diximus, comprehendendi possunt; reliqua reservantes ad finem hujus voluminis. Quum hoc modo hoc volumen sextum in opere priusculi, Epitome, et in addita parte Rudolphinarum summam continens astronomiae Keplerianae, non abs re visum est, tabulam huic volumini praemittere, quam Keplerus aeri lucisam Rudolphinis praefixit. Quae Keplerus tabula illa spectavit, his illustratur.

Templum, decem columnis fundatum, representat Astronomiae domicilium; culmi superaedat Urania, alis tecta aquilae Romani Imperii, ex cujus ore monetae in interiora templi decidunt. Columnae, quibus tectum innititur, biase aequales vel similes constructae sunt, auticae, quarum alteri, elegantiori, Tycho Braheus adstat, ad alteram Copernicus sedet, omuluae sunt perfectissimae. Verbis, manus Tychonis unum porrectae adscriptis, quid si sic, significare, voluit Keplerus, Tychonem comparare suam hypothesein cum Copernici hypothese, quae cum Tycheonica in tecto adumbrata est. (Nota, ad pedes Tycheonis majorem partem unumorum decidisse, quo forte Keplerus illius res cum suis ipsis comparat, cui, sedenti inter libros suos ad latas fundamenti, duo tantum summi contigerint.) Columnae quatuor, quae primas sequuntur ad dextram et sinistram, minus perfectae, nominibus astronomorum Ptolemaei et Hipparchi, Metonis et Arati insignitae sunt; duae sequentes columnae rudibus constant lapidibus, ultimae, apud quas Chaldaee metitur digitis suis, sunt rudes arborum trunci. Crepidinon tecti occupant sex status humani, representantes phycas (cum magnete), mechanicam (cum statera), geometriam (cum circino, norme et tabula, cui inscripta est ellipsis), arithmetica (cum Neperi virgulis, et numero circa caput, quasi radiatum, qui est logarithmus numeri 50000), dioptricam (cum telescopio) et optica (Solem representantem, in manu Terram tenentem, quae aere circumfusa umbram projicit.)

Jam redeunt ad Tabulas Rudolphinas, ea proponimus, quae huc pertinent.

„Praeceptum“ 76. docet usum „tabularum motuum mediorum ad indagandos motus planetarum super integris revolutiones a principio Arietis ad datum tempus“. Pro „exemplo“ eligitur annus ante Christum 3998. 21. Julii h. o. 33° 26' p. meridiem Uraniburgi cum aequabilem, et loca ad hoc tempus eliduntur haec: ☉ in aequinoctio 0° 0' 0" ♊, apogaeum ☉ 0° 0' 1" ♊; ♄ locus medius 5° 29' 56" ♊, aphelii 28° 24' 6" ♊, nodi 0° 0' 0" ♊; ♀ locus medius 7° 3' 21" ♋, aphelii 23° 34' 18" ♋, nodi 0° 0' 0" ♋; ☿ locus medius 10° 43' 53" ♌, aphelii 15° 8' ♌, nodi 15° X; ♁ locus medius 0° 0" ♌, aphelii 0° ♌, nodi 0° ♊; ♃ locus medius 0° 0' 1" ♊, aphelii 0° ♊, nodi 0° ♋; ♄ locus medius 22° 57' 3" ♏, apogaei 0° ♌, ☽ 0° 0' 1" ♋; pro prima Arietis 8° 23' 25" ♈, pro argumento obliquitatis 0° ♌.

Super hoc situ et dispositione carcerum, unde motus omnes prosilire, locus

esset amplissimus philosophandi, si materia instituta poteretur. Sed rejicienda est haec speculatio in tractatum alium, ubi rationes et fundamenta explicabuntur, ex quibus epochae Ptolemaei temporis erutae sunt. (cfr. p. 66)

Praecepto 189: *de varia quantitate anni tropici*, monet Keplerus: Hanc variant in calculo causae duae, prior certa et in re inest, diversa per annum initia tropicorum, seu ut astrologi, diversae radices revolutionum. Est enim brevissimus annus tropicus, qui incipit ab apogaeo Solis, longissimus, qui a perigaeo, medioctris, qui a longitudinibus mediis, quae hodie sunt in 6° V vel \odot . Altera causa, prosthaphaeresis aequinoctiorum, et incerta est et in brevi annorum numero insensibilis. Nam si aequales inter se sunt prosthaphaeresis aequinoctiorum et pensatio motus stellarum, et contrariarum affectionum, causa haec nihil variat tropicum; secus, si ejusdem affectionis aut si contrariarum quidem, sed inaequales. Illic enim summa utriusque, hic differentia mutat anul tropici longitudinem.

Pro revolutionibus igitur negligatur causa altera, et si quidem radix indocetur seu locus Solis in eclipctica, ad quem revolvī debebat Sol post annos aliquot, tempus investigatur ex tabulis etc. His ad marginem adscripsit Keplerus: Longimontanus non tantum errasse Ptolemaem dixit observando (aequinoctiorum locum) sed plane fluxisse observatum, quod ex Hipparcho computaverat. Capite XXXIII. docet Keplerus, quo modo inveniantur reversiones plurium siderum ad idem caput, et „praecepto 181.“ calculi exemplum in Luna exhibet atque sic concludit: Quaeerat calculator hoc tempus. Qui si diem monstravit ullam intra 1700 annos, quae tres Lunae motus (nihil enim de ceteris erroneis dicam) ad quartas, non dico easdem, sed promiscuas; restituat tolerabili cum dissidio: tunc ego convulsam ab illo probabilitatem diel creationis a me propositae (praec. 76.) fatebor, ubi solum apellum Martis ex omnibus incertum et loco quidem praecise intermedio constitit.

2) p. 66. Tab. Rud. capite 32. haec habent: *De postrema et menstrua temporis aequatione in eclipsibus*. Post consumpta omnium artificum consilia (et curas, in manus), post tot inaequalitates Lunae prolatae in lucem, adhuc continuas sidus legesque respiciens, passim exorbitat miuntule, comprimis vero, ratione multis exemplis comprobata, circa punctum aequinoctii verū serius sub Solem vel in umbram succedere deprehenditur, circa autumnale maturius, quam indicat calculus baccens explicatus. Sed experimenta suppeditarunt hactenus solae eclipses; quid acciderat Lunae, cum absente Sole puncta aequinoctialia trajecit, nemo quod sciam attendit. Causas igitur inquirere immaturum est nec hujus libri.

In manuscr. Pulkoviensium vol. XX., quod continet Tabularum Rud. adversaria, haec libri typis excusi verbis inseruntur, quae Keplerus relictis adversariis priusquam typis traderentur, obliteravit: Causa in obscuro est, effectus latitudo inexplorata, quia neglecta baccens in curis majoribus, ut nescias, solae eclipses hoc habeant, an omnes copulae, an denique omnis Lunae phasis. Suspicio causae auctoris, sitne obliquitas ipsa eclipcticae, an quia hodie Solis aequationes bis locis sunt maximae et Sol in Ariete promotor, in Libra retractor, quam est motus medius. Et describitur ab observatis illius temporis, quando haec erant ab invicem sejuncta. Si Solis apogaeum aequationesque moderantur hanc inaequalitatem, non sit id per quantitates aequationum. Si enim planum aliquid, ut cum mechanicis loquar, ad lineam veri motus Solis affigeremus, super quo Lunae medius totus incederet, retardatio haec et acceleratio ultra 4 horas excreceret. Atqui omnis ea intra semissem horae restringitur. Quidnam igitur est illud, quod \odot facit a \odot per \odot in V tardam incedere, ab V per \odot in \odot velocius? Si obliquitas eclipcticae la causa esset, eadem est hujus quantitas, australis in \odot et borealis in \odot ; Luna vero illic tarda, hic velox. Si Solis motus la causa, quae erit antipathiae ratio, ut Luna illic sit tarda, ubi iste velox, ibi vero velox, ubi iste tardus, et id modulo diverso? Eadem in re ipsa, quod memoriae juvandae causa fixi, ipsius primi mobilis rotationem diurnam menstrua vicissitudine intendi et remitti, ut Luna per \odot incedente, quo loco \odot centrum velox est, proveniant rotationes veloces et sic plus temporis apparentis, quippe accelerati, obrudatur motui Lunae in illis signis, ceteris paribus; at Luna in \odot existentē, diurna revolutio tarditatem illam centri Solis, per id signum euntis, ipsa

quoque affectet; ut de apparenti tempore, quippe retardato, parum huic incessal competat, itaque Luna ibi paucis tempore versari, velociter se. trajicere videatur? Mensura tamen hujus tarditatis et velocitatis non fit ex Sole, ut qui suo incessu non regit hanc anomaliam, sed ex Luna, quae signum huic intensional et remissioni praefert; itaque, sicut \odot in anomalia media facit aequationem 5° , sic etiam volutio diurna summam praevencionis vel remissionis faciat in V , $\pm 5^{\circ}$, quae sunt minuta temporis 20.

Jam pergit Keplerus in textu: Interim ergo, dum dicas illas (causas) proferat, sequemur regulam a mediocri experientia conformatam.

Praeceptum 171: Computato tempore \odot eclipticae et in apparenso converso, subtrahere locum apogaei \odot a loco \odot sequente, aut vicissim hunc, si praecedat, ab illo; intervallum in tab. aequationum Lunae quonere inter gradus integros anomaliae eccentrici et in eadem cella subscriptam characteribus minusculis aequationem physicam octuplica; conficies minuta horae, quae hujus aequationis menstruae nomine in primo casu sunt auferenda amplius a tempore, in apparenso converso, in secundo casu addenda. At si tempus alicujus eclipsis est observatum, et ad id computandus est locus Lunae ex tabulis, id tempus ut apparenso convertendum prius est in aequale, sicut per ntitatas aequationes annuas, sic etiam per hanc menstruam, via utroque casu contraria. In primis autem in Solis eclipsibus adhibenda est haec menstrua aequatio, ut cujus effectus in parallaxibus Lunae non est contemnendus. Orientibus enim \odot vel \times in climate nostro, intra trientem unius horae mutatur angulus orientis 2 gradibus et parallaxis lat. sesquiscrupulo, in meridionalioribus majori, quod digitum fere unum in disca Solis efficit; quae varietas multum ad hoc pollet, dies an nox futura sit in Terra.

Exemplo sit eclipsis illa Solis anni 1598 (Vol. II. p. 863 ss.). Nam si ntar aequationa Tychonicis sola, tempus assumtum ad computandum locum Lunae apparensem, h. 10. a. m. aequali, fiet apparena h. 10. 13'. Gratil, distantiam centrorum habens $26^{\circ} 48'$, itaque jam ante 13' debuisset initium eclipsis videri, sc. ipsa h. 10. apparenit. At quavis horologium urbis ex alitnd. Solis deprehensam sit tardum, tamen etiam in illo coepit eclipsis h. 10. 14' circ., quod vere erat h. 10 $\frac{1}{2}$ '. Tardius igitur Luna ad Solem venit, quam fert aequatio Tychonica temporis. At si menstrua etiam aequatione ntar, ablato $17^{\circ} \times$ (loco Lunae) n $6^{\circ} \odot$ (apogaeo Solis), fit distantia 109° (in mea. ab apog. Solis $5^{\circ} 42'$, restat distantia $108^{\circ} 42'$); et anom. ecc. Lunae 109 subscripta est aeq. pars physica $3^{\circ} 22'$, quae ducta in 8 efficit $19'$. Quibus addita ad h. 10. 13', tempus a Tychone apparenso factum, fit apparena vere 10. 32' Gratil. Supra vero (praec. 170), cum locum Lunae verum computarem ex h. 10. aequali, inveni sane distantiam centrorum tantam, ut initium eclipsis h. 10. 26' app. esse potuerit, id quod observationi congruit.

In mea. sic pergit Keplerus: Et quia ibidem prodit finis eclipsis Gratil h. 0. 46' app., quod esset Uraniburgi h. 0. 14' aequali, computavi de novo ad hoc momentum proditane \odot in $16^{\circ} 49' 4'' \times$, \odot in $17^{\circ} 14\frac{1}{2}' \times$ visibiliter, lat. visib. $1^{\circ} 52'$ sept. Per hanc igitur et per distantiam centrorum $26^{\circ} 30'$ in ecliptica conficitur distantia visibilis centrorum $32'$, quanta fere est semidiametrorum summa, et sic finis iterum eclipsis, hunc vero finem rursum confirmat mediocriter observatio distantiae Solis a vertice, minor quam $54''$ paulo ante finem eclipsis observata. Nam $53^{\circ} 40'$ dat tempus b. 0. 54', unus autem gradus in dist. a vertice efficit hac vice 21' temporis. Satis igitur praecisus est iste consensus et ejus confirmatio per angulos hyperbolicas viae radii in plano. (Vol. II. p. 361 ss.)

Monendus est autem astronomiae studiosus, in descriptione observationis illius libro allegato durationem perpetram prolongatam fuisse in h. 2. 36', cum non poterit esse longior quam h. 2. 26', si parvi tabularum istarum diameter Lunae retineatur, vel si augeatur illa scrupulo, ob causas opticas, summum h. 2. 28'. Facile autem apparet, quae causa mihi fuerit tantae prolongationis. Eclipsatio ultimi digiti durat longius quam primi, quia in fine Luna magnum habet latitudinem visibilem, in principio nullam. Ille ego ultimo digito tribui per se meram plus quam $12''$, omnino usum, et jam ad modulum hunc etiam primae observationis digito (qui tamen, an dignus esset, an vero minimam aliquid, passim per librum illum in dubio ponitur), longum

tempus sum admeus. Praeterea fidendum fuit inconstantiae horologii urbei, quam ipsam tamen folio 390 (II. 371.) in dubio reliquit.

Fuit textus: Si loco Tychonicae usurpetur astronomica aequatio, illa plus quam Tycho jubet subtrahere, ita major adhuc fieret menstrua. Sed neque tertia, physica temporis aequatio sufficit; adderet u. tantum 8', restarent adhuc $9\frac{1}{2}$, addenda pro menstrua. Sed de aliam Solis et Lunae eclipsium testimonis plura in Hipparcho (III. p. 510 ss.) agam, ut et de iis, quae dissentire deprehenduntur a regula.

3) p. 66. «A. C. 1355. R. Levi librum composuit, quem *Bella Dei seu defensionem Dei* inscripsit, cujus tractatu 5. astronomicas observationes memorat. Ait nempe, suo tempore Spicam et Regulam ea loca in coelo tenuisse, quas secundum Albatregium illis debebantur, uti narrat Riccius in tractatu de motu octavae sphaerae cap. 43. et Ricciolus Chron. Astron. p. 44.» (Weidleri hist. Astron.)

Quem paulo ante dicit Remus, Prophanus, Hispanus (c. a. 1300), «observationibus coelestibus operam dedit et maximam Solis declinationem indagavit, quam reperit $23^{\circ} 32'$. Aucter etiam est tract. de eclipsibus, ita, almanach et tabularum astronomicarum, quas edere voluit Ed. Bernardus.» (W.)

4) p. 68. Spectat his Keplerus, quibus fuisse Real mutatae fidei formulam (cfr. p. 71), verba jocosa, quae in epistolis anni 1619 deprehendimus. Keplerus epistolam d. 31. Aug. 1619, cujus partem supra p. 61. exhibuimus, his incipit verbis: Nobilis et Clarissime Domine Doctor, amico honorandè. Responsorias tuas 13. Aug. datas ante octiduum accepi. Quo minus responderem, fuit impedimento editio Ephemeridis, quae plus mihi typographicorum exhibet laborum, quam typographis ipsis, quamvis typos proprios habeam domi meae. Alter labor extrusio exemplarium Francofurtum, cujus causa et praemisi tres paginae in classe funaria (tu mihi dicito aliud vocabulum, quo exprimam cine herbe stant) et postridie summi quartam, ut primum a proelio siccata fuit; et cum in navem venissem duobus abbiac (Lincio) miliaribus invenissemque baptisata mea exemplaria a nocturno Jove, triduum siccando iusereundisque paginis insumsi, dum interim Aschavium ventum. Et denique, ut habeam quod rideas, tertius dies Aschavii consumtus exterminandis aliquot centuriis pedienlorum, qui me per noctem in navi invaserant.

Ad haec respondit Rasmus: De pediculis risum mihi non inavem movisti: ego ipse in Inquisitione Romana aliquando tot interfeci, quot habet solius ordinarius 5 cypris figuras.

5) p. 91. Vol. XIV. Mas. Pulkov. totum Marti dicatum, majorem partem fellorum signatum habet manu Kepleri numeris ordine se explentibus (immediatis vero haec paucis sine ulla signatione). Numeri hi continentur usque ad 539, et folia illis signata exhibent studia Kepleri ad Comment. Martis pertinentia. Paulo post novam incipit numerorum seriem, quam verbis supra positis dicit. Fol. 51. haec occurrunt, quae, quamvis parum dilucida sint, tamen non plaus rejicienda censuimus.

A. 1624. 29. Febr.

Post finem harum paginarum sequuntur duae paginae, in quibus observationes veterum summa cura tractantur. Apparuit autem, si longitudinem veram eccentrici ☿ in creatione statim in 0° ☿, me incedere medium inter observationem Dionysii et observata Ptolemaei. Illic aliud consilium occurrit: an, si libertatem retineamus, aphelium ad tempora veterum locandi, nec id assensum ex acronychia Ptolemaei triga, possumus tenere simul et Dionysianam et Ptolemaicam illam, ubi observatus ☿ in ☿ ☿?

Primo perpendantur observationum circumstantiae. In Dionysiana anomalia media ☿ est circiter 71° , aequatio pene ad 11° excurrit, nec valde mutatur luxatione parva aphelli. In Ptolemaica est anomalia media 133° circiter, aequatio iterum valde magna, nec multo minor priori; utraque in semicirculo descendenti, sed illa in quadrante superiori, haec in inferiori. Ergo si retroagam aphellum auctis anomalis, tunc prioris loci prosthaphaeresis augetur, posterioris minuitur, cumque sint subtrahenda ibi, retroagitur ☿, hic promovetur. Compensata vero hic promotione per subtractionem de motu medio, duobus ille nominibus retroagitur, hic manet suo loco. Inter-

valli mutationem puto parum efficere, sed tamen et illud est curandum. Cum igitur sub Dionysio abundemus 2°, promoveatur, aphelium 20°.

Annot. in margine: Hoc non est retroagere, sed promovere. Repete totum processum infra. Calculus Kepleri prodit anomaliam consequentem 40° 23' et mediam 47° 39'. Addito aphelio 133° 28', prodit longitudo media anno 272. 18. Jan. hora 6: 181° 7'; anno 1601: 316° 43', diff. 135° 56'; ex Prutenicis 132° 11', augmentum 3° 25'.

Si ergo, pergit Keplerus, in annis 1672 adduntur motui, subtrahuntur ab eo medio 3° 25', id est 205', quid subtrahetur in annis 1460? Resp. 160'. Correctio. Et si 1672 addunt aphelio 20°, quid 1460?

Resp. 15. 32. Corr. aphelii

$$\begin{array}{r} 4. 1. 14. 31 \\ 16. 37. 7 \text{ Q} \\ \hline 17. 51. 38 \end{array}$$

Quia ergo Prutenicae in tertia acronychia habent motum medium

$$\begin{array}{r} 8. 11. 39. 14 \\ \text{adde tridui minus hora} \quad 1. 33. 1. \\ \hline 8. 18. 12. 15 \end{array}$$

aufer correctionem

$$\begin{array}{r} 2. 40. \\ \hline 8. 10. 32. 15 \\ 4. 16. 37. 7. \\ \hline 8. 25. 55. 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 113. 55. 8 \\ \hline 114. 1. 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 103. 53. 47 \\ \hline 6. 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. 51. 38 \\ \hline 147800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. 3. 35. \\ \hline 103. 47. 27 \end{array}$$

Sit aphel. 13° 28' ☿, prodit correctio 1° 46'.
Motus med. Ptolem. 8. 13. 12. 15 Erst aph. 4. 1. 14. 31.
aufer correct. 1. 46 aufer 7. 46
8. 11. 26. 15 aph. 3. 25. 28. 31
8. 23. 28. 31
4. 17. 57. 44
137. 57. 44 9. 48
137. 49. 6 — 130. 2. 52
8. 38 130. 12. 40
113. 28. 31

5. 41. 11 ☿; nondum est promotus.

Apparet, diminutionem motus medii, factam per Dionysianism, multo superare promotionem in Ptolemaica.

Retroagat aphelium per sola scrupula 100, id est 1° 46': erat in Dionysiana 3. 23. 27. 57, erit igitur 3. 21. 47. 57. Et quia prosth. orbis fuit 36° 16', ne sic quidem erit multo alia; sit tanta, aufer igitur

$$\begin{array}{r} a 1. 5. 13 \text{ M} \\ \text{ergo ecc. } \odot 5. 22. 49. 13 \\ 3. 21. 47. 57 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{conseq. } 61. 1. 16 \\ \text{sed } 61. 13. 59 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{dat mediam } 70. 50. 58, \text{ dist. } 158090 \\ 12. 43 \\ 55. 22 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 70. 50. 58, \text{ dist. } 158090 \\ 11. 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 70. 39. 14 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 158135 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{log. } 45826 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1690 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 47516 \text{ dat} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{correctam prosthaph. orbis } 38. 27. \end{array}$$

Si ergo prosthaph. orb. 38. 27, remanebit eccentrico loco per 11 minus et conequata etiam

quanto minor sc.	60. 50. 16	
	61. 13. 59 — 70. 50. 58	
	23. 43	22. 9
		70. 28. 49
		111. 47. 57.
long. med.	2. 16. 46	Haec longitudo prius fuit relata in
	4. 25. 45	quia tunc ζ in 3. 2. η fuit, jam in
1. 5 η , ergo A.	272 — 182 16. 46	
	1601. 316. 32. 43	
intervall.	184. 15. 57	
Prutenicae	182. 10. 41	
correctio	2. 5. 16.	
In Ptolemaica: Prutenicae ut prius	8. 13. 12. 15	
aufer cerr.	1. 37. 42	
Long. med.	8. 11. 34. 33	
Aph.	8. 29. 56. 31	
an. med.	4. 11. 38. 2	
sed	131. 14. 22 dat	122. 37. 56
		26. 31
		123. 4. 27
		Aph. 119. 56. 31
sec. ζ	3. 0. 58	‡
deb.	3. 34. 36	
prius	3. 41.	

Cum ergo auferrem aphelio 10° seu $600'$, profeci per 40 plus, quam cum auferrem tantummodo 100 . Itaque $8^\circ 20'$ dant 40 . Si 40 postulant 500 , quid 154 ? Ecce procreari gradus circiter 30 retrahendi aphelii.

Conclusum igitur est, circa maximum luxationem aphelii, quae duabus acronychiis noceret plurimum, conciliari has duas observationes non posse. Haec igitur adjecta censeto duabus paginis sequentibus.

Folio sequenti singulari conclusi, aphelium a 15° γ deducendum, addendum aliquid medio, deserendam Ptolemaei secundum, retinendas tres reliquas et Dionysianam. Ibidem simul de latitudine. Nam si ζ texisset fixam, quo casu oportuit Ptolemaeum uti voce $\pi\alpha\rho\sigma\tau\epsilon\theta\eta\kappa\epsilon\nu\alpha\iota$, non simpliciter $\pi\rho\sigma\tau\epsilon\theta\eta\kappa\epsilon\nu\alpha\iota$. Illud ab $\epsilon\pi\alpha\rho\sigma\tau\epsilon\theta\eta\kappa\epsilon\nu$, hoc a $\pi\rho\sigma\tau\epsilon\theta\eta\kappa\epsilon\nu$. Miror tamen, cur dicat: visus est apponisse, non appositus esse. Esto igitur, scripserit perperam $\pi\rho\sigma\tau\epsilon\theta\eta\kappa\epsilon\nu\alpha\iota$ pro $\pi\rho\sigma\tau\epsilon\theta\eta\kappa\epsilon\nu\alpha\iota$, accurrens, aut sit vera lectio $\pi\rho\sigma\tau\epsilon\theta\eta\kappa\epsilon\nu\alpha\iota$, sed sensu hoc, appositionem fecisse.

Haec omnia fieri possunt, etiam si Mars borealior transiverit. Latitudo quidem 1. 5 reponit ζ γ in $24^\circ 18'$ \triangle , sed latitudo Ptolemaica stellae $1^\circ 20'$ in 5° η . Videamus, cur Ptolemaeus in finem \triangle reposerit? Provocat ad acronychios sui temporis, in quibus latitudo borei fiat $4^\circ 20'$, austrina $7^\circ 0$. Consideremus, quatenam potuerint fieri tempore Ptolemaei et an non ex ϕ sit Ptol. ratiocinatus de limite eccentrici, limitem ibi statuens, ubi ϕ .

Fuit una A.	124 in 22° ζ	respondet hodie	1576.
	126 in 8 \vee	" "	1578.
	128 in 8 \square	" "	1580.
	130 in 21 \square	" "	18 \triangle 1582.
	133 in 26 \triangle	in ipse apog. Ptol.	23 \vee 1585.
	135 in 29 ζ	respondet hodie	27 η 1587.
	137	" "	5 η 1589.
	139 in 2 ζ	" "	27 ζ 1591.
	141 in 15 \equiv	" "	9 \times 1593.
	143	" "	16 γ 1595.
	145	" "	3 \triangle 1597.
	147	" "	10 η 1600.

Jam nulla exstat observatio post 141. 4. Antonini. Mirum igitur, unde habeat 7° lat. max. austrinae ζ , si non in 7° ζ et 15° \equiv observavit acronychias annis 124

et 141. Hodie iatitudo australis non ad 7° pervenit, maxima nempe fieri potest 6° 52'.

20. Jun. 1624. Esto tamen maxima lat. in 30° 3 7°, quanta potest esse acronychia in 2° 3 et in 15° =, distantia a limite 27 et 16. Nam ut totus ad 7, ita 63 et 74 ad latitudines 6. 14, 6. 43 1/2.

Si ergo Ptolemaeus anno 124. deprehendit iatitudinem dimidio gradu minorem quam 141, haec res ipsum direxit ad 29° 25 cum limite. At quia 10' non discernit nec instrumentum Ptolemaei nec abacus fixarum ejus: si ibi dicamus observata 6. 4, hic 6. 53, omnino veniet limes proxime 15° =. Id etiam inde, quia videmus, in distantia 16 a limite non ultra 8' variari seu minui iatitudinem a maxima. Atqui hoc non discernit Ptolemaei instrumentum.

Restat ut dicamus de lat. maxima anni 133. in 16° 25. Ant enim hanc ipsam observavit, ant, quid esse possit, collegit ex circumstantibus in 130, 135. Nam si haec erant inter se aequales, potuit Ptolemaeus pronunciare, in 26° 25, in ipso sc. apogaeo fuisse maximam et sic limitem. Et suspicor omnino, ex his duabus argumentatnm esse Ptolemaeura, non ex 124, 141. Vidit proci dubio, hanc in 29° 25 esse paulo majorem altera in 21° 11. Agamus ut prius.

	38.	30°
	52	60
	23824	14384
4. 20'	258284	258284
	282108	272668
	3. 25.	3. 45.

Ecce trientis excessus docere potuit de limite in 29° 25. Si vero nodus fuisset in 22° 2, ut Dionysio et hodie, distantiae a 6, 3 fuissent istae:

1072400 — 8. 3	748
258284	258284
330684	259032
2. 6.	4. 18.

Hic esset differentia graduum 2 1/2 in duabus observationibus acronychis.

Ex hac ultima periclitatione numerorum et ex pensione circumstantiarum omnium concludendum videtur ex Dionysiana *apogaea*, fixarum latitudinem olim fuisse eandem, quae hodie est.

Sed illud obiter et quidem diligenter notandum, si ecliptica fuit olim inclinatio, minor igitur fuit limitis 3 ab ecliptica inclinatio, minor igitur et iatitudo. Sic eandem iatitudinem, quae hodie, eandem igitur et inclinatio, idem igitur situs eclipticae. Nisi quis monstrum dogmatis inducat, Martis orbes nna cum orbita Terrae inclinari.

6) p. 117. Novae quaestiones Sphaerae, hoc est de circulis coelestibus et primo mobilis, in gratiam studiosae juventutis scriptae a. M. Sebastiano Theodorico Winsheimio, mathematico Professore. Vitebergae 1568. Epistola dedicatoria, quam dedit Keplerus, data est (anno 1561) ad Sigismundum, Ludovicum et Sigfridum Barones a Peltheim etc. ut observantiam et gratitudinem, pro eximia erga auctorem benevolentia et favore, declararet. Hofenfelderus fratres diximus vol. I. p. 188.

7) p. 123. Ricciolus in Almagesto varias veterum de Terrae figura sententias his pascis comparat: Terram columnae similem censuit Anaximander; cylindro seu tympano bellico Lencippus; cono seu turbini Cleantes; scaphio Heraclitus; disco cavo Democritus; mensae planae Anaximenes et Empedocles; insula vero radice dorsum niti Xenophanes Colophonius. At esse ad sonum sphaericam hanc molem, primus demonstravit Parmenides Eleas teste Aristotele. Thalem secuti sunt Stoici et Peripatetici.

Aristoteles (de Coelo II. 13.) refert: Quidam super aquam jacere dicunt; hanc enim sententiam vetustissimam accepimus, quam Thalem Milesium dixisse ferunt, Terram ideo quiescere, perinde atque lignum aut quippiam tale natet. Seneca (Nat. Quaest. VI. 6) scribit: Thales Milesius totam Terram subiecto iudicat humore portari et innatare: sive illud oceanum vocas, sive magnam mare, sive alterius naturae simplicem adhuc aquam et humidum elementum. Hec, inquit, unda sustinetur orbis, velut aliquod grande navigium et grave his aquis, quas premit.

8) p. 134. Errorum hic commisit Keplerus calculi, cum $\frac{5105.7}{22}$ non acquet 1615, sed 1624; quare semidiameter non 807, sed 812 mil. prodit.

9) p. 137. Kaestnerus in collectione Dissertationum etc. „quas Societati Regiae scientiarum Göttingensi annis 1756—1766 exhibuit“ (Altenbargi 1771) hunc Kepleri locum examinat dissertatione IX. (4. Dec. 1769); quam inscripsit: De quaestione, quot sphaerae aequales circa datam mediam poni possint, ut omnes illam et circumpositarum sibi vicinae se mutuo tangant. Huic inquisitioni haec praemittit, quibus Kepleri verba illustrantur: Systema planetarium, cui Sol noster praesent, globi ad modum, cujus medium Sol occupet, potest concipi, b. e. cogitari potest sphaera Soli fere concentrica, ambitu suo planetarum et cometarum omnium orbitas continens. Jam si fixae Solis sint et planetae regant, potest circa quamvis fixam similis illi, quam dixi, sphaera cogitari. Igitur, quae proxime circum systema nostrum jacent fixarum systemata, globi velut erunt nostri globum tangentes; illos, qui tangunt, aequales ponemus, omnes autem se mutuo tangere existimabimus, quoniam quibus interstitiis alter ab altero starent et cui sui hoc vacuum inter se relinquere, nulla divinatione possumus adaequi, tangendum vero se mutuo ordinem optime animo compiectimur. Quaestio igitur eo pertinet: quot possint fixarum systemata proxime circa nostrum collocari?

In sequentibus demonstrat Kaestnerus, circa datum globum poni posse solum et se mutuo tangentes ad summum 12, medio, quem omnes tangunt, paulo majores, inter se aequales; b. e. circa systema nostrum solare 12 ad summum systemata poni posse. Hos globos omnes simul cum medio complectetur major sphaera, circa quam alias 12 ponentur, illa paulo majores: in ea ratione, in qua tangentes priores media sua erant majores. Et sic sine fine pergit posse, aequidem nostrum systema solare in medio reliquorum omnium statuamus.

In demonstratione sua progressus ostendit Kaestnerus, medias sphaeras tangentes inter se aequales sphaeras circumponi posse nonnisi 4 aut 8 aut ad summum 12 et in sphaera media formari triangula sphaerica 4 vel 8 vel 20, quae in sphaera efficiantur planis laterilibus solidorum regularium tetraedri, octaedri et icosaedri. Ad ea, quae Keplerus paulo infra respondit ad quaestionem: cur hic uteris icosaedri figura? haec annotat Kaestnerus: Ex his patet, quod viderit Keplerus icosaedri vim quandam esse ad confirmanda ea, quae de fixarum per spatia coelestia dispersione dixerat, et quod magnis iugentis, inter quae eminet Kepleri, saepius accidit, partem veri suspicatus sit, sed alio paululum modo icosaedrum adhibeat quam ego, dum in angulis ejus centra sphaerarum collocat, non puncta contactus, contentos, proxime saltem aequales esse angulorum mutuos et a centro distantias. Quod autem geometricum est in quaestione solimque aciri potest, id omne reliquit investigandum.

10) p. 150. In priori exemplo dantur in triangulo AOD: AO = 860, DAO = 90°, ADO = 88° 1', quare OD = $\frac{AO \cdot \sin. OAD}{\sin. ADO}$; $\log. AO = 2.9344985$
 $\log. \sin. ADO = 9.9997398$

$$\log. OD = 2.9347587 = \log. 860.51.$$

Quare DM = 0.51. Ad secundum exemplum haec monenda sunt. In Optica (Vol. II. p. 290 ss.) Keplerus ostendit, refractiones rationes habere ex inclinationibus et earum secantibus compositas. Quare data inclinatione radii 89° 20', ejusque refractione 40°, invenitur refractio radii, cujus inclinatio est 60°, hac proportionem: 89½ . sec. 89½ : 60. sec. 60 = 40 : x, hinc x = $\frac{40 \cdot 60 \cdot \sec. 60^\circ}{89\frac{1}{2} \cdot \sec. 89^\circ 20'}$ = $\frac{40 \cdot 180 \cdot \cos. 89^\circ 20'}{268 \cdot \cos. 60^\circ}$; $\log. 40 = 1.6020600$
 $\log. 180 = 2.2552725$
 $\log. \cos. 89^\circ 20' = 8.0657763 - 10$

$$\begin{array}{r} \log. 268 = 1.9231088 \\ \log. \cos. 60^\circ = 2.4281348 \\ \hline \log. 2.1271048 \\ \log. 1.9231088 \\ \hline 0.7960040 = 1 \end{array}$$

$$x = 0.62518 \left(= \frac{48}{76778} \right)$$

Respicientes Kepleri calculum, notamus, secantem 8594561 (ita in 89° 20' multiplicatam esse, ut pro hac quantitate assumti sint 90° et a facto $\frac{1}{2}$ de 8594561 subtractum.

11) p. 151. Posito angulo ADO = 89° 30', DAO = 90° et OA = 1, erit OD = $\frac{1}{\sin. 89^\circ 30'}$ = 1.000038, quare DM = 0.000038. (Cum sit AO = 860 miliaribus = 860 × 32 stadia, erit DM paulo plus uno stadio.)

$$\text{In triangulo KAO: } \sin. AKO = \frac{AO \sin. OAK}{OK} = \frac{\sin. 91^\circ}{1,000038} \log. \sin. 89^\circ = 9,9999358$$

$$AKO = 88^\circ 53' \quad \log. \sin. AKO = 9,9999173$$

$$89\frac{1}{2} \cdot \cos. 88^\circ 53' : 88\frac{32}{60} \cdot \cos. 89^\circ 30' = 30 : x \text{ (vid. annot. praeced.)}$$

$$x = \frac{5353 \cdot 60 \cdot \cos. 89^\circ 30' \cdot 2}{60 \cdot \cos. 88^\circ 53' \cdot 179} \log. 5353 = 3,7269716$$

$$\log. 179 = 2,2528530$$

$$\log. \cos. 88^\circ 53' = 8,2897734$$

$$x = 13,341' = 13' 20,46'' \quad \log. x = 1,1251871$$

Ad Kepleri calculum notamus, illam multiplicationem $88\frac{32}{60}$ in sec. 5131290 similiter ratione perfectasse cum ea, quam annot. praemissa indicavimus, dum primo multiplicat per 90, deinde a facto subtrahit 1, 513 etc. (pro 1''), tum pro 6' a residuo iterum subtrahit partem decimam de 513 etc., denique pro 1' iidem partem sexagesimam. Quotiens prodit ipse 13682584800 $\frac{13682}{1000} = 13,682$ „circiter“. (Ad figuram 20. notamus, sculptorem omisisse lineas AK, AD et KD.)

$$12) \text{ p. 152. } 89 \cdot \sec. 89^\circ : 60 = x \cdot \sec. x : 30;$$

$$\text{hinc } x \cdot \sec. x = \frac{89 \cdot \sec. 89^\circ \cdot 30}{60}$$

$$\log. 89 = 1,9493900$$

$$\log. \cos. 89^\circ = 0,2418553 - 2$$

$$\log. 2 = 0,3010300$$

$$3,4065047$$

$$(x \cdot \sec. x) \text{ vel } \frac{x}{\cos. x} = 2549,3$$

$$\sin. AKO = \frac{\sin. 89^\circ}{1,0006} \log. \sin. 89^\circ = 9,9999358$$

$$\log. 1,0006 = 0,0002605$$

$$AKO = 87^\circ 46' 40'' \quad \log. \sin. AKO = 9,9996733$$

$$87^\circ 46' 40'' : 89 = x : 60;$$

$$\sec. 87^\circ 46' 40'' : \sec. 89^\circ$$

$$x = \frac{87^\circ 46' 40'' \cdot \sec. 87^\circ 46' 40'' \cdot 60}{89 \cdot \sec. 89^\circ} \log. \cos. 89 = 8,2418553 - 10$$

$$\log. 790 = 2,8976271$$

$$\log. 20 = 1,3010300$$

$$= \frac{790 \cdot 60 \cdot \cos. 89^\circ}{790 \cdot 20 \cdot \cos. 89^\circ} \log. 20 = 2,4405124$$

$$= \frac{89 \cdot 9 \cdot \cos. 87^\circ 46' 40''}{89 \cdot 3 \cdot \cos. 87^\circ 46' 40''} \log. 3 = 0,4771213$$

$$= 26,634 = 26' 38'' \quad \log. \cos. 87^\circ 46' 40'' = 8,5885560 - 10$$

$$\log. 89 = 1,9493900$$

$$1,0150673$$

$$2,4405124$$

$$1,4254451$$

Iterum Keplerus utitur curta multiplicatione, pro $87^\circ 46' 40''$ ponens 88° (11. 8) indeque subtrahens deinceps factum 12 minutorum, 1' et 30''. Hoc insuper notandum est, secantem $87^\circ 46' 40''$ tabulas exhibere majorem Kepleriana, quare ipse prodit justo minus per 8''. Divisor Kepleri 509958351 prodit duplicato supra posito valore $\frac{x}{\cos. x}$.

$$13) \text{ p. 153. In } \triangle EBC \text{ ad E rectangulo est } \frac{EB}{EC} = \text{tg. ECB}$$

$$\text{In } \triangle EAC \text{ iidem rectangulo } \frac{EA}{EC} = \text{tg. ECA}$$

$$\frac{EB - EA}{EC} = \text{tg. ECB} - \text{tg. ECA}$$

$$EB - EA = AB, \text{ quare}$$

$$\frac{AB}{EC} = \text{tg. ECB} - \text{tg. ECA.}$$

Numeris, quos Keplerus ponit, adhibitis, prodit

$$EC = \frac{1000}{\text{tg. } 45^\circ - \text{tg. } 21^\circ 48'} = \frac{1000}{1 - 0,3999715} = \frac{1000}{0,6000285} = 1666.$$

14) p. 154. Keplerus in Tabulis Rodolphinis catalogo stellarum subiunxit tabellam refractionum triplicem Tychois, quam nos Officinas addidimus (Vol. II. p. 403.), et eamdem affert hanc: „quia idem et Grubergerus fecit in sua stellarum editione“ (cfr. II. p. 783 s.) Deinde pergit: Uuae tabellae non praecipue refertur ad calculum harum Tabularum, ut quae non proficiuntur id, quod sidera patiuntur in aëre inconstanti, sed unicus est in applicandis ad calculum observationibus. Nam si est observata sideris altitudo refracte, per altitudinem quaesitam in margine excerpte refractionem ex quo filo placuerit eamque aufer ab altitudine observata, ut fiat vera (sicut auferres parallaxin ad alt. computata, ut fiat apparens), et si jam est computata long. et lat. sideris observati in refractione, eam altitudinem excerpta refractione per angulum verticalis et eclipticae diducenda est in longum et latum et quodque ad suum eongenerem sic applicandum. ut id refractione liberetur, ea vis, qua applicatur parallaxis, ut ex vero loco fiat visibilis. Sed cave praesumas, processum, qui horizontalem parallaxin adhibet, etiam in refractione experiri. Non est enim eadem utrobique horizontalium proportio ad ceteras.

Multa de hac tabella monere commode possem, nisi modus operis obstaret. Haec pauca non fuerunt omittenda. In Solis et Lunae refractionibus, usque ad alt. 45° continendis, Tycho dedit aliquid disputationibus super ea re cum Landgravio ejusque mathematico (Rothmanno; in „Epistolis.“); non enim consequitur observatio tam subtilia. Diversas autem quod vides in Sole, Luna, fixis refractiones, diversam incrementorum seriem, ex eo fidem Tychois perspicies, qui processum eundem distinctis temporibus et in distinctis mobilibus exsecutus est observando diducendoque, non respectans ad prioris processus effectum, si forte, quod frustra tamen suspicatus est, altitudo siderum a centro Terrae varia causam pareret varietatis. Ego refractiones Solis ideo majores factas puto, quia in iis computandis Tycho adhibuit parallaxin Solis nimiam, quae nimio ipsum depressit eoque refractione, cum etiam id nimium tollere inasper putaretur, censita fuit major vera. In Lunae excusationem ab aëre ipso peto, ut et in Sole. Nem et Luna plena et de die ob lumen Solis praesens aër dilatur, at fixae ut plurimum in interlunniis et profunda nocte et coelo serenissimo observantur. Praeterea sat fidam esso tabulam pro locis, si non omnibus, ealtem pluribus (et aëre quieto, non imminentibus tempestatibus), ex eo perspicio, quod in Bohemia pene eandem observatae, quae in Dania.

15) p. 169. Miranda est Maestlini inconstantia in assumendis de motu vel quiete Terrae rationibus. In praefatione ad „Narrationem“ Rheticam, quam Kepleri Prodrogo addidit (cfr. vol. I. p. 25 s.) defendit astronomiam Copernicanam verbis, quae supra Keplerus citat. In „Epitome“ vero sua eaque anno 1610. tertio edita haec legimus: Si Terra quocunque circulari motu celeretur, nubes semper et taotum in oppositam partem volare viderentur: gravis sursum projecta nunquam relaberetur in eundem locum: animalia et aedificia quassata hac motus vehementia colleberentur, partes insuper Terrae omnes dispergerentur et tota Terra dissipata jam dudum coelo (quod ridiculum esset) excidisset. . . . Terra ergo jam eno loco, qui est centrum mundi, collocata quiescit immobilis.

16) p. 170. Hoc Guillelmi Haastiae Landgravi (non Tychois) experimentum, quod Tycho refert in Epistolis collectione (Francof. 1610. p. 189), Keplerus pluribus inquiri in epistola ad Davidem Fabricium data, quam proposuimus vol. III. p. 458 ss. Verba Tychois haec sunt: e maxima bomba, quam duplicem cartosum vocant, globus ferreus ad obliquum emissus intra 2 minuta temporis vix motu fecit Terram pertingit, quibus 20000 passuum majorem motu diurno in parallelo Germaniae convolvit deberet, si motui diurno obnoxia esset Tellus. Sic enim ipsemet Rothmannus principem suum in explosione globi aliquando periculum fecisse mihi indicat.

17) p. 180. Defensionem motus Terrae diurni instituit Origanus in prooemio operis, tribus voluminibus comprehensi, quod inscripsit: Novae motuum coelestium Ephemerides Brandenburgicae annorum 60 (1595–1605) calculo duplici lunnarum, Tychoico et Coperniceo, reliquorum planetarum posteriore elaboratae. Cum introductione hac pleniore, in qua Chronologica, Astronomica et Astrologica ex fundamentis ipsis tractantur. Auctore Davidis Origano, Glacensi Silesio, Germano, Mathematico Electoralis academiae Brandenburgicae Frankofurti ad Viadrum ordinario professore. Frankof. 1609.

18) p. 192. „Praecepta“ in partem secundam Tabularum Rodolphinarum: *De tabulis*

*epocharum et motuum mediorum, et quomodo colligendi sint motus mediæ ex his tabulis, et loca singulorum mobilium media assignanda, ad hunc modum instituit Keplerus: Omnis hujus doctrinæ ratio consistit in descriptione partium singularum in tabulis. Notet igitur initio calculator, aliud esse motus, aliud epochas motuum. Nam cum omnis motus et locum, seu spatii longitudinem, et tempus requirat, nec sit motus unquam sine tempore, sequitur, ut initia quoque utriusque rei sint consociata et ut ne perceptio quidem motuum ulla possit esse, nisi hac initiorum utriusque rei copulatione ob oculos adducta inque clara luce posita. Quod igitur punctum cursum seu lineæ circularis quovis temporis momento (cujus a præsentis tempore nota est distantia) obtinuit uniuscujusque mobilis lineæ motus mediæ, id punctum græcè dici solet temporis illius seu momenti epocha, quod latine sonat locum, quia mobilium linearum quaelibet in assignato temporis momento locum illum circuli sui dicitur *ingere, occupare*.*

Etsi vero differentes sunt mobilium circuli, nec habet circulus initium nec finem, astronomis tamen opus fuit positione communis alienius omnium circularum principii; utque motus omnium inter se comparari possent, ad unum aliquem circulum communem ceteri omnes canas communis principii et divisionis referendi fuerunt. Porro quem alium circularum ad hoc opus eligerent, nisi circulum solemem, qui quodammodo dux est et formator motuum omnium, qui etiam signatur a circulo Lunæ vago, sic ut Luna hunc Solis circulum fixum excursionibus suis ad ejus utrumque latus successione annorum 19 circumcirca stipet. Denique hunc circulum Solis reliquorum planetarum omnium circuli in sui medium recipiunt, ut ipsi multo majoribus ad se ipsos invicem, quam ad hunc medium inclinentur angulis.

Utque constet omnibus argumentis, astronomos hac in electione supremum illum motuum omnium contemporatorem et architectum imitari, ecce ut in principio motuum (de quo nobis constat ex divinis oraculis inde a Mose propheta per omnium successiones actuum ad nos usque in ecclesia Catholica conservatis), ut in hoc, inquam, principio motuum nequaquam in unum circuli solaris latine motum 5 excursus in septentrionem deduxerint, sed plane usque in oppositas circuli partes dispositi fuerint, Saturni in ♄, Jovis in ♃, Mercurii in oppositum ♀: necesse igitur est, ipsius consilio Creatoris huius Solis apparenti circulo non secessionem aliquam ad latus, sed omnino medietatem situs inter ceteros, etiam in latitudinem, tributam esse.

Ad circulum igitur Solis apparentem sub fixis, qui per medium signorum, *zodiaci*, ductus *eclipticæ* nomen ab officio quodam suo sortitus est, ad hunc, inquam, cum essent referendi planetarum omnium circuli sub fixis apparentes: non equidem aliud omnium circularum principium fuit ponendum, quam quod ipsius eclipticæ principio in singulis responderet, quod sc. implexione motus primi et secundorum, illius communis, horum propriorum, veluti naturaliter constitueretur, sc. punctum æquinoctii.

Etsi vero Copernicus propter conceptam opinionem inæqualis præcessionis æquinoctiorum principium circularum sequitur aliud, quod sc. primæ stellæ Arietis in quolibet circulo respondet, ratus, convenientius esse, ut principium circuli observemus fixam, a quo ut motus plerique prorsum, sic motus ipse punctorum æquinoctialium fieret retrorsum: at tabulem istorum primus auctor, Tycho Braheus, cum inæqualitatem præcessionis tantum aut commentitiam esse deprehendisset, aut saltem incertam, redeundum sibi censuit ad morem Ptolemæicum magisque compendio calculi practico, quam contemplationi astruæ motuum studendum, ut, dum motus ab hoc puncto initiali eclipticæ retrogrado (quod æquinoctialis puncti, seu principii Arietis nomen obtinet) deducimus, una et eadem opera motum ætræque, tam puncti retrogradum, quam planetæ directum, velut a fixo puncto colligamus. Per principium igitur Arietis, punctum æquinoctiale seu æquinoctium, quando mediæ colliguntur motus, intelligitur in unoquoque circulo planetario, sub fixis imaginato, punctum id, quod cum puncto eclipticæ sic denominato erque a communi binorum horum intersectione in eandem plagem remotum est. Et ab hoc puncto, sic juxta ipsam verum principium

Arietis eclipticum stante, numerantur in singulis planetarum circulis sub fixis sua 12 signa seu 360 gradus, non minus quam in ecliptica.

Jam cum liberum sit, in constituendis epochis omnium primis vel unum et idem punctum, puta principium Arietis, omnibus praefixum motibus, applicare distinctis temporibus, quibus singuli in id incidunt motu medio, vel unum idemque temporis principium eligere et in eo distincta circuli loca, sive sc. cuique planetae, assignare: temporis quidem identitatem veteres pro arbitrio quisque suo elegerunt, me prima omnium in astronomia cura exercuit, si possem identitatem principii circularis cum identitate temporis coniungere. Cum vero vidcrem, tale principium ultra omnem mundi aetatem longissimis excursorum spatiis, dimissa hac inutili cura, reliquorum artificum et in iis Tychonis Brabii potissimum ad morem me composui, quod equidem in his Tabulis jure illius, ut primi auctoris, summo fecisse censi debet.

Exhibuit ille epochas ☉ et ♃ (Progymn. Tom. I.) primum in aera incarnationis et forma anni Juliana veteri; secundo ad annorum centurias quatuor et ad unius annos singulos, ceterarum vicinis; tertio meridianum illi praefixit insulae Hvennae in fretis Cimbrico arctique in ea Uraniburgi; quarto horam illi praestituit meridianam, quae post annum epochae completum et exactum in meridie proxime ineuntis 1. Januarii sequitur. Omnia quatuor capita in his tabulis limitatus sum.

I. Annum v. Julianum veterem ab Inc. aera numeratum et ipse retinui, ceteras temporum ordinationes ipsamque adeo Gregorianam, novi Cal. dictam, quae nunc est in usu, ad Julianam formam singulas reducere docui. II. Etsi potui ut in fixarum catalogo epocha unica contentus esse, tamen epochas motuum omnium exhibeo et ipse ad centenarios p. Chr. 21, a. Ch. 10; has praecedunt epochae ad milleenarios solos usque ad annum a. Ch. 4000, qui modus est aetatis mundanae apud plerosque chronographorum hodiernorum asequiturque situm aliquem planetarum in suis eccentricis consentaneum initio motuum, nulli alii per plurima secula deinceps comparandum. Spero autem, oeris hujus paucarum linearum superfluarum non pertaesum iri calculatorem, si viderit, se per eas magna aliqua molestia calculi liberari. Ad annos vero singulos centenarii unius proximi supervacuum erat epochas exscribere seorsim, ne per diversa secula major existeret calculi dissimilitudo, quod, ubicunque potui, fugiendum censei. III. Sed et meridianum Uraniburgicum tanto libentius retinui, quanto melioribus notis la supra mihi fuit commendatus. IV. Quod horam attinet, ea similiter intellegitur meridianum aequabilis diei 1. Jan. tam ante quam post Christum, hoc tamen discrimine, quod post Ch. quidem anni sumuntur vere completi, ut apud Tychonem, sic ut hic primus Januarii meridies sit extra et ultra complexum illum, assignatum in margine, ante Christum vero anni assignati margine per hunc primum Januarii meridiem jam incidunt. Calculi tamen difficultas hinc oritur nulla. Haec vero de illis tantum epochis dicta sunt, quibus hora nulla est apposita.

Sequitur, ut dicamus etiam de tabulis motuum. Prius enim loca cursum annis assignabantur momenti, termini spatorum terminis temporum; jam motus, id est circulorum spatia confecta suis assignantur tractibus temporum. Est autem in unoquoque planeta tabula annorum 100 expansorum, pro eo, quod Tycho totidem annorum nobis proximorum exhibuit epochas singulares (Progymn. I. p. 57. 107); quos sequuntur centenarii 10 et millearii 12. In hac tabula dissimulantur circuli exacti integri poniturque planetae motus medius in principio annorum solutorum in quocunque puncto circuli; in fine vero singulorum annorum, vel centuriarum vel millenariorum, exprimitur, quot signis, gradibus, scrupulis et secundis motus ille superaverit vel initium vel revolutiones integras circuli, ab initio illo quocunque incepit. Et quia taedium erat, figuram eandem in tardis motibus per omnes fere lineas revertentem ubique exprimere, meminerit igitur calculator, ubi loca figurarum plane vacant, intelligi figuram, quae locum illum in linea proxime superiori plene implet. Tabollas vero mensium 12 anni Jul. simplicis et dierum 31 in mense longissimo, itemque horarum etc. adjuncti epochis ipsis in eadem facie. Sed in argumento obliquitatis eclipticae ob tarditatem motus sufficere visus est saltus per annos quaternos, omissis etiam mensibus et temporibus minutioribus.

Ergo si detur tempus posterius nostra Incarnationis aera, sume centenarium proxime antiquiorem dato anno corrente ejusque epochas motuum ex eadem linea exscribe: deinde subijce completos annos supra centenarium illum exeurrentes motusque cum his excerptis epochis membratim subscribe; tertio cum diebus currentis mensis completis idem facito (nisi nbi Februarii inter completos menses bissextilis fuit: tunc utendum die corrente pro completo); denique idem cum horis, minutis et secundis, etsi praeterquam ad Lunae motuum collectionem per secunda non est opus excerpto. Lineis his sic excerptis fiat collectio logistica omnium, ut restet denique in summa, quantum motus quilibet super integras revolutiones a principio V confeeerit.

Si vero detur tempus annorum ante locum currentium, subtrahere illos ab annis epochae proxime majoris et antiquioris; remanebunt anni completi, quorum motus excerpti ex tabula subijciendi sunt numeris cum epocha illa antiquiore excerptis; cetera ut prius.

Hic vero excipe loca fixarum, quarum epochae in catalogo sunt unicae, ad annum sc. 1600 p. Chr. Igitur si tempus proponitur posterius anno 1600, ratio collectionis non differt ab haecenus tradita; sin prius, exquirendum erit intervallum id inter et annum 1600. Summa ex centenariis et singulis infra 100 collecta auferatur ab epocha, quam fixa proposita habet in catalogo. Aliter etiam sic: collige locum primae V, ut nnius ex planetis, eique loco adde arcum distantiae fixae propositae a primâ V, quam illa habet in catalogo.

Excipe secundo nodum Lunae. Nam quia is est retrogradus, pro epocha ejus scribe compl ad circulum eoque utere loco epochae: facta vero additione pro summa rursus scribe ejus compl ad circulum, sen, quod eodem recidit, motus nodi Lunae excerptos cum millenariis ab epocha elapsis cumque centenariis et singulis infra centum, hos inquam motus conjice in ndam summam, quam anfer a numeris ipsis epochae excerptis. («Exemplum» hoc pertineat vide annot. 1. p. 531.)

19) p. 195. Qua ratione Keplerus, ad questionem Herwarti respondens, Lucani Pharsalia commentatus sit, Vol. IV. p. 73 es. proposuimus. Quem dicit Sulpitium, Joannes Sulpicius Verulanus Romae Inclaruit scriptorum latinorum accurata cognitione editisque operibus Vegetii et Vitruvii. Sententiam de solstitiis, quam adest Keplerus, deprehendes in Sulpicii Commentariis in Lucanum.

20) p. 195. In Ptolemaei Geographiae edita a Magino describitur Idumaea his verbis: «Idumaea regio incipit a Caesio monte vel secundum alios a Sirbonis lacu et versus ortum ducitur usque ad Judaeam. Haec autem in sacris literis Edom dicitur et referenda Nigro olim Boza, deinde Nabathea dicta fuit.» — Sic Josephus (Antiq. XII.): Hi (Hii Ismaeli) terram omnem ab Euphrate ad mare rubrum pertingentem habitabant, regionem Nabatëam (Ναβαττην); appellant. Unde Keplerus pro voce Arabia Felix Nabatëam acceperit, nescimus.

21) p. 219. In triangulo sphaerico rectangulo dantur altera cathetorum = 70° et angulus acutus illi adjacens = 60° , quaeritur altera cathetus. Tg. $x = \sin. 70^\circ : \text{tg. } 60^\circ$. Calculum absolvit Keplerus curtata multiplicatione (in sequenti exemplo divisione curtata), quali hodie nitimur in multiplicatione fractionum decimalium, quod etiam in sequentibus calculis notetur.

22) p. 220. Mariam, quem hic Joannem dicit Keplerus, in Optica (vol. II. p. 220) Antonium nominavit. In annotatione ad hunc locum (II. p. 415), testem Weldlerum alioque secuti, verum praenomen Dominicum pronuciavimus. Annotationem illam supponentes haec ex Rhetici «Narratione» addimus, quas vero maxima ex parte Copernicum attinent: «Cum D. Doctor meus (Copernicus) Bononiae non tam discipulus, quem adjutor et testis observationum doctissimi viri Domini Mariæ, Romae autem e. a. D. 1500, natus annos plus minus 27, professor mathematicum in magna scholasticorum frequentia et coram magnorum virorum et artificum in hoc doctrinae genere, deinde hic Varmiae suis vacans studiis summa cura observationes annotasset, ex observationibus stellarum fixarum elegit eam, quam a. 1525 de Spica Virginis habuit.» Montucla (Hist. des Math.) nominat illum: Dominique Maria Novara de Bologna.

23) p. 222. Utitur hic Keplerus „regula prosthaphaeretica“, quam vol. II. p. 444 explicavimus. Forma hodie saltata adhibita sic absolvitur calculus: In triangulo VSP ex datis lateribus VP, VS et angulo SVP computatur SP formula:

$\cos. SP = \cos. V \cdot \sin. VP \cdot \sin. VS + \cos. VP \cdot \cos. VS$
 vel, adhibita reductione, qua l. c. litera (A) signata est, et adhibitis angulis et lateribus,
 quibus Keplerus in „exemplo“ suo usus est:

$$\begin{array}{rcl} \sin. SP = \cos. 100^\circ \sin. 42^\circ \sin. 30^\circ + \cos. 42^\circ \cos. 30^\circ & & \\ \log. \cos. 100^\circ = 9,2396702 & \log. \cos. 42^\circ = 9,8710735 & \\ \log. \sin. 42^\circ = 9,8255109 & \log. \cos. 30^\circ = 9,9377306 & \\ \log. \sin. 30^\circ = 9,6989700 & & \end{array}$$

$$N. 0,8086041 - 1 = 0,64358$$

$N. 0,7641511 - 2 = 0,05809$
 $0,64358 - 0,05809 = 0,58549 = \sin. 35^\circ 50'.$ (0,05809 subtrahendum, quia $\cos. 100^\circ$
 negativus est.)

24) p. 223. Continuans hic „regulam prosthaphaereticam“, quam in priori exemplo
 inchoaverat, data puit Keplerus latera $PS = 35^\circ 50'$, $VP = 42^\circ$ et $VS = 30^\circ$. Cal-
 culus hic redit ad formulam:

$$\begin{array}{rcl} \cos. SVP = \frac{\sin. 35^\circ 50' + \cos. 42^\circ \cos. 30^\circ}{\sin. 42^\circ \sin. 30^\circ} & \sin. 35^\circ 50' = 0,58549 & \\ & \cos. 42^\circ \cos. 30^\circ = 0,64358 & \\ \angle SVP = 100^\circ \text{ (quia denominator fractionis negativus).} & & \\ & \log. 0,058097 = 0,7641511 - 2 & \\ & \log. (\sin. 42^\circ \sin. 30^\circ) = 0,5244809 - 1 & \\ & \log. \cos. 80^\circ = 0,2396702 - 1 & \end{array}$$

25) p. 223. Duobus exemplis hic explicatur modus procedendi, ut datis altitudina
 stellae, ejus declinatione et altitudine aequatoris, computetur angulus ad polum, primo data
 decl. australi, secundo eadem septentrionali.

Ut ratio Kepleri melius appareat, propeimus eam utroque exemplo.

1) Sit (fig. 36) QS declinatio stellae $= 7^\circ 30' 17''$, erit $PS = 90^\circ + 7^\circ 30' 17''$
 $= 97^\circ 30' 17''$, $AH = 38^\circ 28' = VP$, GS alt. stellae $= 25^\circ 45'$, quare $VS = VQ$
 $- GS = 90^\circ - 25^\circ 45' = 64^\circ 15'$: quaeritur in $\triangle VPS$ quantitas anguli VPS .

Calculus „prosthaphaereticus“, quo Keplerus utitur, ad hanc redit formam:

$$\cos. VPS = \frac{\cos. 64^\circ 15' - \frac{1}{2} [\cos. (97^\circ 30' 17'' + 38^\circ 28') + \cos. (97^\circ 30' 17'' - 38^\circ 28')]}{\cos. (97^\circ 30' 17'' - 38^\circ 28') - \frac{1}{2} [\cos. (97^\circ 30' 17'' + 38^\circ 28') + \cos. (97^\circ 30' 17'' - 38^\circ 28')]}$$

Hoc tantum notamus, pro voce cosinus semper uti Keplerum voce sinus complementi
 angularum. Hanc formam in hodie usitatas commutantes et logarithmis usi, sic pro-

$$\text{cedimus; } \cos. VPS = \frac{\cos. 64^\circ 15' - \cos. 38^\circ 28' \cdot \cos. 97^\circ 30' 17''}{\sin. 38^\circ 28' \sin. 97^\circ 30' 17''}; \cos. 64^\circ 15' = 0,40275$$

$$\log. \cos. 38^\circ 28' = 9,8937452 \quad \log. \sin. 38^\circ 28' = 9,7988317 \quad 0,10226$$

$$\log. \cos. 97^\circ 30' 17'' = 9,1159695 \quad \log. \sin. 97^\circ 30' 17'' = 9,9962638 \quad 0,50501$$

$$\text{Summa} = 0,0097147 - 1 \quad \text{Summa} = 0,7900955 - 1 \quad \text{(addendum,}$$

$$\text{Numerus} = 0,10226 \quad \log. 0,50501 = 0,7033000 - 1 \quad \text{quia } \cos. 97^\circ$$

$$0,9132045 - 1 = \log. \cos. 35^\circ 2'. \quad \text{Diff. } 0,9132045 - 1 \quad \text{negativus)}$$

2) Sit $VP = 36^\circ 22'$, $VS = VG - SG = 90^\circ - 46^\circ 25' = 43^\circ 35'$, $SP = PE$
 $- SE = 90^\circ - 21^\circ 15' = 68^\circ 45'$

$$\cos. VPS = \frac{\cos. 43^\circ 35' - \cos. 68^\circ 45' \cdot \cos. 36^\circ 22'}{\sin. 68^\circ 45' \sin. 36^\circ 22'} \quad \cos. 43^\circ 35' = 0,72437$$

$$\log. \cos. 68^\circ 45' = 9,5592338 \quad \log. \sin. 68^\circ 45' = 9,9691196 \quad 0,29185$$

$$\log. \cos. 36^\circ 22' = 9,9059247 \quad \log. \sin. 36^\circ 22' = 9,7780185 \quad 0,43252$$

$$0,1651585 - 1 \quad 0,7424381 - 1$$

$$\text{Numerus } 0,29185 \quad \log. 0,43252 = 0,6360062 - 1$$

$$\text{Diff. } 0,8935681 - 1 = \log. \cos. 38^\circ 30'.$$

26) p. 224. Datis $PR = 51^\circ 32'$, $SV = 82^\circ 30'$ et $GS = 25^\circ 45'$, prodit VP
 $= 90^\circ - 51^\circ 32' = 38^\circ 28'$, $PS = 90^\circ + 25^\circ 45' = 115^\circ 45'$.

$$\begin{array}{rcl} \cos. VSP = \cos. 38^\circ 28' - \cos. 115^\circ 45' \cdot \cos. 82^\circ 30' & & \\ & \sin. 115^\circ 45' \sin. 82^\circ 30' & \\ \text{VSP} = 22^\circ 58'. & & \end{array}$$

27) p. 224. Ad inveniendum angulum, quem formant verticalis et declinationis chr-
 culi ad stellam, per azimuth, sic operandum est. Datur azimuth (GR, GH. angulus GVH)

$= 80^{\circ} 20'$, quare angulus SVP $= 9^{\circ} 40'$, alt. poli complementum (VP) $= 35^{\circ} 48'$ et declinatio stellae (SE) $= 7^{\circ} 27'$, hinc PS $= 90^{\circ} - 7^{\circ} 27' = 82^{\circ} 33'$. Quare

$$\sin. anguli VSP = \frac{\sin. 9^{\circ} 40' \cdot \sin. 35^{\circ} 48'}{\sin. 82^{\circ} 33'} = \sin. 6^{\circ} 6'$$

Hanc formulam in Keplerianam commutamus observantes, $\sin. a. \sin. b$ aequare $\frac{1}{2} [\cos. (a - b) - \cos. (a + b)]$; quare $\frac{1}{2} [\cos. (80. 20 - 51. 12) - \cos. (80. 20 + 51. 12)]$: $\sin. 82^{\circ} 33'$, vel $\frac{1}{2} (\cos. 29^{\circ} 8' - \cos. 48^{\circ} 28')$: $\sin. 82^{\circ} 33' = \sin. VSP$.

$$\sin. VSP = \frac{0.10522}{0.99156} = 10816.$$

28) p. 225. Stella (S) oriente, arcus VS erit $= 96^{\circ}$; jam datæ in $\triangle VSP$

$$\begin{aligned} VP &= 42^{\circ}, SP = 40^{\circ}, \text{prodit } \sin. VSP = \frac{\sin. 40^{\circ} \cdot \log. \sin. 40^{\circ} = 9.8080675}{\sin. 42^{\circ}; \log. \sin. 42^{\circ} = 9.8255109} \\ \angle SVP &= 73^{\circ} 52' \dots \dots \dots 0.9825566 - 1 \end{aligned}$$

29) p. 229. Compara cum his, quae de mutatione obliquitatis eclipticae Keplerus agit cum Remo et Crigero (v. s. p. 36, 55 s.). Verba: «itemque alia ratione $23^{\circ} 30' \frac{1}{2}$ », explicantur in «Praeceptis» Tabularum Rudolphinarum, p. 27, ubi Keplerus dicit: Quod attinet mensuram obliquitatis, norunt astronomi, eam a Reinholdo in tabulis directionum usurpari $23^{\circ} 28'$ ex Copernico, Tychonem vero, detecto vitio a refractionibus oblato, eam correxisse, ut aetate sua fuerit $23^{\circ} 31' 30''$. Neminem fore puto, me tacente, qui mihi exprobrare voluerit, quod hanc Tychonicam declinationem in opere Tabularum Rudolphi inter fundamenta receperim, cum constet, Tychonem ipsum hujus tabularum nominis auctorem esse. Veruntamen admonendos duxi studiosos artis, vitandas perplexitatis causas, Tychonem in constituenda obliquitate maxima eclipticae rationem habuisse parallaxes Solis, eam vero parallaxin a veteribus mutuatam, ut quantitas ejus in horizonte esset $8'$. Atqui et dudum in Comment. de motibus Martis et nunc in his Tab. Rud. parallaxis Solis, a me fuit attentata ad partem tertiam, ut non sit mihi major i scrupulo. Tentula vero parallaxi Solis si Tychonus esset, obliquitatem eclipticae, manentibus ceteris principiis, constituisset $1'$ minorem, sc. $23^{\circ} 30' 30''$, quanta fere est in Tab. Direct. Regiomontani.

$$\begin{aligned} 30) p. 280. \text{ In } \triangle ABC \text{ ad } C \text{ rectangulo dantur } AB &= 47^{\circ}, \angle BAC = 23^{\circ} 31' 30'' \\ \text{Hinc: } \sin. BC &= \sin. 47^{\circ} \cdot \sin. 23^{\circ} 31' 30''; \log. \sin. 47^{\circ} = 9.8641275 \\ BC &= 16^{\circ} 58' 22'' \dots \dots \dots \log. \sin. 23^{\circ} 31' 30'' = 9.6011352 \\ &\dots \dots \dots 9.4652627 \end{aligned}$$

Ut multiplicatio supersedeat Keplerus in hoc quoque simplici exemplo utilis calculo prosthaphaereticus, qui transformat superiorem formam in hanc: $\sin. BC = \frac{1}{2} [\cos. (AB - BAC) - \cos. (AB + BAC)]$. Idem ad sequens exemplum notandum.

31) p. 233. Tabulae Regiomontani prodierunt Norimbergae 1475 inscriptae: Tabula magna primi mobilis, cum usu multiplici rationibusque certis. Reinholdi tabulae primi mobilis separatae nullae prodierunt: quas dicit Keplerus, insunt Tabulae Prutenicae. Magna Tabulae primi mobilis, quas directionum vulgo dicuntur typis excusae sunt Venedis 1604. Eaedem tabulae insunt libro, quem inscripsit: Primum mobile etc. Bononiae 1609.

$$\begin{aligned} 32) p. 236. \text{ In } \triangle ABC \text{ (Fig. 38) dantur } AB &= 30^{\circ}, \angle BAC = 23^{\circ} 31' 30'', \\ \angle ACB &= 90^{\circ}, \text{quare} \\ \cot. ABC &= \cos. 30^{\circ} \cdot \tan. 23^{\circ} 31' 30''; \log. \cos. 30^{\circ} = 9.9375306 \\ &\dots \dots \dots \log. \tan. 23^{\circ} 31' 30'' = 9.6388199 \\ \angle ABC &= 69^{\circ} 20' 25'' \dots \dots \dots 9.5763505 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 33) p. 237. \text{ Fig. 40. sit } CH \text{ arcus horizontis, } QH \text{ aequatoris, } CQ \text{ circuli declinationis; angulus } CQH \text{ erit rectus, et dantur } PI \text{ (alt. poli), angulus } QHC = (\text{compl. alt. poli}) = 41^{\circ} 30', \text{ declinatio } CQ = 20^{\circ} 13' 22'', \text{ quaeritur } QH. \\ \sin. QH &= \tan. 20^{\circ} 13' 22'' \cdot \cot. 41^{\circ} 30' = \tan. 20^{\circ} 13' 22'' \cdot \tan. 48^{\circ} 30' \\ \log. \tan. 20^{\circ} 13' 22'' &= 9.5662958 \\ \log. \tan. 48^{\circ} 30' &= 10.0531916 \\ 9.6194874 &= \log. \sin. 24^{\circ} 36' 22'' \end{aligned}$$

34) p. 240. Tabulam ascensionum obliqvarum etc. videbis fol. 244. subijunctam. In Tab. Rudolphinis illa tabula omissa est, tabula vero anguli orientis, ad altitudines poli 90 (a 1° in 90°) computata, satis proluxa existat. Cur emisit tabulam asc. obliq., haec dicit causam Keplerus: In doctrina sphaerica de primo motu per dati puncti eclipticae vel stellae declinationem computari solet differentia ascensionalis, ut ea cum asc. recta ejus puncti composita constituat asc. obliquam. Solent autem asc. obliquae describi per singulos gradus alt. poli, ut, dato puncto aequatoris oriente, possit excerpti punctum eclipticae coarctans.

Etsi vero non tantum stellarum fixarum ortus, occasus, emersiones occultationesque, sed etiam calculus eclipsium Solis totam hanc partem doctrinae sphaericae varie usurpant, nec loca terrarum, quibus obvenit quaelibet phasis eclipsios, sine asc. obliquis, nec parallaxes sine notione gradus orientis computari possunt. non fuerunt tamen tabulae directionum Regiomontani, non, qui eas continuavit, Reinholdi, in hoc etiam opus transscribendae, cum eas dandum Maginus in suo „Primo Mobili“ repetierit existentque vulgo exemplaria, quae quis ad calculum eclipsium secundum tabularum istarum praeceptiones adhibeat.

Hic addit Keplerus ex hic defectus ex nonnulla parte compensantur, „praecepta“: 1) Dato puncto sphaerae quocunque, ejusque declinatione ab aequatore, indagare ejus amplitudinem ertivam (cfr. p. 225.). 2) Datis iisdem, indagare differentiam ascensionalem (cfr. p. 236.). 3) Data alt. poli, per dati loci Solis differentiam ascensionalem indagare tempus semidiurnum et seminocturnum adeoque diei artificialis longitudinem. 4) Data longitudine diei aestivae longissimae, invenire altitudinem poli. Solvit problemata 1 et 2, eadem ratione qua in Epitome locis citatis, hoc solummodo mutato, ut pro numeris eorum logarithmos adhibeat. Jam describens tabulam eam anguli orientis, haec affert Keplerus historica: Haec pars doctrinae sphaericae desideratur in Tabulis Directionum Regiomontani et Reinholdi, cum tamen summe nobis necessaria sit ad doctrinam parallactum, ut cum ego in Parte Astronomiae Optica ante annos jam 21 tradidit demonstrationibusque roboravi. Copernicus quidem breve hujus tabulae rudimentum in opere Revolutionum exhibuit, quod miror non transsumit a Reinholdo in suas Prutenicas excultumque ut cetera fuisse. Partem igitur Rudolphinarum non parvam constituit horum angulorum tabula, ad omnes gradus alt. poli borei computata.

In Epitomes Astr. Cop. frontispicio (tabulae in editione priori insertae sunt inter epistolam dedicatorem et indicem) specimen exhibui asc. obliqvae et anguli orientis conjunctionum, multo sane concinnius, ut in qua conjunctione conformitas aliqua est cum tab. asc. rectae, declinationis et angulorum eclipticae cum meridiano, simul et arcum contrapositionum asc. junctae implent circulum. Poterit haec conjunctio, ad quando recedentur tabulae primi motus, continuari per omnes gradus alt. poli, poterit interseri et amplitudo ortiva vice declinationum; poterunt denique anguli ipsi in arcu numeris exprimi nitatis scrupulosius, ut illos habeo computatos in chartis. In hoc opere sufficere visa est forma haec qualiscunque compendio servitura.

Hic subjungit Keplerus „praecepta“, adhibita sua tabula anguli orientis: 1) dato puncto eclipticae oriente et altitudine poli, 2) data asc. obliqva eclipticae et alt. aequatoris, angulum inquirere. 3) Dato puncto eclipticae oriente, per ejus cum horizonte constitutum angulum indagare asc. obliquam. 4) Punctum eclipticae oriens per angulum et asc. obliquam inquirere.

5) Per solos logarithmos, sine ullis aliis tabulis computare et angulum orientis et una ipsum punctum oriens, ex data asc. obliqva, universaliter et exacte:

Primum observa casus, alterutrum ex punctis aequinoctialibus, quod est supra horizontem, in quo coeli quadrante sit. Nam si id est in orientali, gradus oriens est querendus seu arcus ab aequinoctio sublimi ad ortum usque; si in occidento, gradus occidentis quaeritur seu arcus eclipticae a puncto decedente usque ad aequinoctium sublimi; utroque casu arcus aequatoris respondens adhibetur. Hujus enim log. additis log. alt. aequatoris constituit log. altitudinis illius aequinoctialis puncti. Et hujus antilogarithmus (log. cos.) ablatus ab antilog. aequatoris relinquit log. anguli inter aequatorem et verticalem, qui per aequinoctium ducitur. Huic angulo obliquitas eclipticae additur, si 0° ∇ est ad ortum vel 0° △ ad occasum; auferitur, si 0° △ est ad ortum

vel $0^\circ V$ ad occasum: ita constitutus erit angulus verticalis cum ecliptica. Hujus log. additus antilog. altitudinis puncti aequinoctialis jam elicito, dat antilog. anguli orientis, qui una cum ejusdem logarithmo utilis est ad parallaxes. Illic vero log. anguli orientis ablatus a log. altitudinis puncti aequinoctialis, relinquit log. lateris eclipticae requisiti, quod simul cum angulo eclipticae et verticalis, prius addito, vel excedit quadrantem vel ab eo deficit. Prodest autem, adnascere certis typis, quorum unum tradam in exemplo.

Sit asc. obliqua $346^\circ 48'$, ergo $0^\circ \triangle$ est supra horizontem et ad occasum, quaerendumque est latus eclipticae ab occasu usque in $0^\circ \triangle$. El vern respondet latus aequatoris $13^\circ 12'$, quantum sc. est ab $166^\circ 48'$ (descensione obliqua) ad 180° seu $0^\circ \triangle$ (Kepleri calculum hoc tantum mutavimus, ut pro snis logarithmis illos, Briggsii posuerimus).

Latus aequatoris $13^\circ 12'$ (a); log. sin. $13^\circ 12' = 9.3586027$ (c)
Alt. aequatoris $39^\circ 6'$ (b); log sin $39^\circ 6' = 9.7998062$ (d), log. cos. 9.8808677 (e)

log. sin. alt. puncti aequin. = 9.1584089 (f); log. cos $f = 9.9954486$ (g)

Angulus verticalis per $0^\circ \triangle$ cum aequat $51^\circ 39'$ (i) 9.8911391 (h)
 $23. 31\frac{1}{2}$ (k) adde, quia $0^\circ \triangle$ ad occasum.

Angulus verticalis cum ecliptica $75. 10\frac{1}{2}$ (l); log. sin. $75^\circ 10' 30'' = 9.9852970$ (m)
 9.9954486 (g)

log. sin. aug. orientis $16. 56.$ (o); 9.1612790 9.9807156 (n)

Latus eclipticae $29^\circ 38'$ (q) 9.6911299 (p)

Ergo occidit $0^\circ 22'$ ap. oritur $0^\circ 22'$ X.

Datur a per asc. obliquam, cum quo excerpitur c; datur et b, cum quo excerpitur d et c; jam e et d additi faciunt f. Illic vero per suum arcum dat et g. In canone Neperi vel Ursiai (Briggsii) non est opus arcu, stat enim g e regione ipsius f. At in his (Rudolph.) tabulis excerptio utriusque, tam logarithmi, quam antilog. (cos.), non est multo difficilior. Quilibet enim logarithmus ostendit arcum suum quadrante minorem in fronte et sinistro margine, et is translatus in calcem et dextrum marginem ostendit respondentem antilogarithmum; id fit crebro in eadem apertura libri, aut iterum 3 foliis replicatis. Porro subtracto g ab e relinquitur h; per hunc excerpitur i. Datur vero k perpetuo idem, et additi hae vice i et k, dant l, cum quo excerpitur m: quod ad g additum facit n, qui vel per suum arcum, vel in Neperi et Ursiai canonibus per se ipsum e regione, dat o. Ex hujus abstractione ab f remanet p, cum quo excerpitur q quaesitus. O vero servit parallaxi longitudinis, n parallaxi latitudinis indagandae, ut patet suo loco.

Huc pertinent et sequentia praeccepta, quae infra servient indagandis articulis apparitionum et occultationum tam planetarum, quam stellarum fixarum: 1) Data stellae longitudine et latitudine sub data elevatione poli, invenire punctum eclipticae ei coherens, mediante angulo orientis. (Si lat. sept., cooritur aliquod antecedens locum longitudinis, sin meridionalis, aliquod sequens. Fjus anguli log. ablatus a log. latitudinis relinquit log. arcus horizontis; ab hujus arcus antilog. aufer antilog latitudinis, restabit antilog. arcus eclipticae, qui in primo casu ablatus a loco longitudinis, in secundo additus, dat punctum coherens praeter praeter.) 2) Data profunditate loci Solis sub horizonte, inquirere distantiam ejus loci ecliptici a puncto orientis vel occidentis, mediante angulo orientis. (A log. profunditatis Solis datae aufer log. anguli or. vel occ. puncti eclipticae dati: relinquetur log. distantiae Solis a puncto oriente vel occidentis.)

3) p. 242. Caput XII. Tabularum Rudolphinarum. De ascensionibus rectis, mediationibus coeli, declinationibus et angulis eclipticae cum meridiano,* haec afferit, ad has Epitomes tabulas pertinentia: Haec tria jam dudum in Epitoma Astr. Cop. sic junctim in una tabula exhibere coepi, quod haec conjunctio in doctrina primi motus magnum usum habeat. Et vero ad doctrinam eclipsium omnibus istis opus habemus, non minus quam in ascensionibus ad aequandis temporibus, declinationibus ad obliquitatem eclipticae. Ut nihil dicam de fixarum ortu et occasu, quae materia partem unam doctrinae sphaericae complectitur.

De his igitur rebus necessaria est admonitio, me usum esse obliquitate eclip-

ticae et constanti et Tythonica. Causas habeo utriusque facti idoneas. Nam primo, quod attinet variationem obliquitatis, scio, Reinholdum in Prutenicis excessum adieciisse tam declinationibus quam asc. rectis pro obliquitate maxima, et docuisse venari partem proportionalem per scrupula secularia. Verum Tycho Brabeus, primus istarum tabularum auctor, jam dudum formam illam Copernicanam motus obliquitatis refutavit ab experientia, itaque convulsa est illa politia scrupulorum, sine quibus excessus dicti sunt inutilis. Etsi vero Tycho non negavit omnino, majorem fuisse sub Ptolemaeo et Hipparcho obliquitatem, illud tamen deprehendit, fixas stellas hanc variationem non unâ subire: non enim fixam esse sub fixis stellis eclipticam, ut unâ cum illis ab aequinoctiali discedat accedatque, sed solem eclipticam et a fixis stellis et ab aequinoctiali abuere vel annuere. Hoc vero si sic est, jam penitus inutilis et supervacua fit ad pragmatiam quidem fixarum illa declinationum et ascensionum variatio Prutenica. Quanta enim conficitur declinatio et ascensio alijus fixae per obliquitatem eclipticae vetustam latitudinemque fixae ab illa vetustam, tanta omnino fit utraque etiam per utrasque modernas. Restat igitur unicus Sol, qui centro suo describit eclipticam ejusque aevi. Solis vero ascensiones et declinationes, quaeso, cui usui exquiruntur? Per declinationes Solis latitudo locorum exploratur bodie, olim per diel-aestivae longitudinem quaerebatur. Quicunque modus fuerit adhibitus, omnes veteris geographiae latitudines locorum vitiosissimae sunt et crassae admodum et plena quasi vola, *ὀλοσφες*, admensae. Ascensiones spectant ad aequationem temporis, ubi 15' conficiunt unum horae minutum. Atqui maxima ascensionum differentia in 17° Tauri est 5' 16", quae sunt in tempore 21", triens unius minuti, res plane insensibilis; cum in observationibus veterum plerumque trientes horarum sint in dubio.

Sed caput rei nudum attigi; ipsam sc. obliquitatem eclipticae olim fuisse majorem, res non tantum est dubia, sed validis argumentis ex ipsis veterum observationibus a me convulsa et procul dubio plane falsa. Si tamen olim major est futura obliquitas quam bodie, ejus quidem rei praevidendae facillime caremus, nec regulam igitur confingere possumus. Prospiciat itaque sibi aetas quaelibet ipsa in constituenda sua obliquitate, et nos pro omni aevo astronomico exacto contenti erimus obliquitate hodierna.

Jam causas affert Keplerus, quibus motus Tychois obliquitatem eclipticae assumserit et quid in hac corrigendum censeat, quem locum annotatione 29. praemissa proposuimus, et sic pergit.

Hoc ubi jam praemouit artis studiosi intellexerint, existimabunt, etiam hanc Tythonicam declinationem eclipticae fuisse corrigendam adque meam Solis parallaxin accommodandam. Verum si sciant, unicum scrupulum in altitudine Solis meridiana aestiva tantae subtilitatis observationem esse, ut rarissime duo observandi actus intra mensuram unius scrupuli consentiant. In dubio igitur valuerunt apud me praedicta pro obliquitate majuscula, valuit metus, ne nodum in scirpo quaesivisse aut omnem Tythonicam astronomiam a fundamentis studio inhonesto convellere voluisse viderer, nulla ad hoc necessitate compulsus, nulla liquidae veritatis cura sollicitatus.

Haec praefari oportuit, nunc modum excerpti docebo. Observet igitur calculator, tabulae partes esse tres, sicuti 3 signa quadrantem constituunt. Earum duae arctius inter se sunt junctae, communes habentes titulos frontis et calca, praeterquam signorum ipsorum, quae ibi sunt inserta, ubi ejusque ordo graduum incipit; tertia pars (signi tertii) excrevit in sequens folium eoque sola ibi suos titulos frontis et calca est nacta.

Conjuncti autem semicirculos, a punctis aequinoctialibus inceptos, signa sc. opo posita primorum quadrantem superposita singulis tabulae partibus, cum ordine graduum ad sinistram descendente et signa pitimorum quadrantum superposita cum ordine graduum ad dextram ascendente, sic ut gradus antiscii occurrant in eadem linea, alter in dextro, alter in sinistro margine. In cujuslibet junctorum signorum columella ordinantur ascensionum rectarum tempora saltem integra, quibus ad latus adstat columella, communes exhibens utriusque semicirculi temporum integrorum appendices in scrupulis primis et secundis. In medio utrorumque quadrantum interjeci columellas

duas, unam declinationum communium, alteram angulorum eclipticae cum meridiano; et declinationes quidem in signis borealibus septentrionales intelligendae sunt, in australibus meridianae; anguli vero ex latere eclipticae, polum boreum spectante, propter certum usum distinguuntur ipsius eclipticae arcibus: formantur enim in semicirculo eclipticae ascendente ab arcibus sequentibus sinistris, intuenti meridiem, in descendente ab arcibus antecedentibus dextris, tanquam polo boreo utrobique magis propinquius.

Est igitur regula excerptendi haec: si sit excerptenda puncti eclipticae dati ascensio recta et cetera, quare signum datum in aliqua trium frontium vel calcium, gradus vero in illo margine, in quem a signo invento patet ingressus, a dextris in dextrum sursum, a sinistris in sinistrum deorsum, et in concursu lineae gradus inventi cum columella signi invenies asc. rectae tempora integra, in columella vero laterali scrupulorum communium appendicem primorum et secundorum: ita habetur asc. recta graduum eclipticae integrorum. In eadem vero linea occurrit declinatio et angulus, quodque in sua columna integrum in partibus primis et secundis.

Si vero gradibus integris eclipticae adhaeserint scrupula, per illa sumenda est de differentiis asc. rectarum pars proportionalis adminiculo praeceptorum heptacosidis (b. e. tabulae, quae ad modum «*Chiladis Logarithmorum*» computata in Tab. Rud. complectitur 740 logarithmos, ad computum astronomicum episc. Confer vol. III. p. 719 *). Sed pro iis, qui sunt assueti logisticae veteri, apposita est ad latus cuiusque columellae in intercolumnio peculiari differentia binarum vicinarum ascensionum, declinationum vel angulorum minusculis characteribus titulo superiori *incrementi in 10'*. Haec igitur intercolumnii differentia multiplicata in scrupula, gradibus integris eclipticae arcum adhaerentia, et a facto absecta cyphra ultima, prodit numerus secundorum, quae (reducta ad prima, si excurrerint) addenda sunt ad asc. rectam, per integros gradus excerptam. Et in declinationem et anguli intercolumniis, cum signum in calce quaerendum est, ex *incrementis decrementa* sunt et subtrahenda sunt.

Sed in asc. rectis praestat, ut ii, quos piget ad logisticae logarithmos confugere, hoc utantur compendio: scrupula sc. gradibus integris adhaerentia multiplicent non in *incrementa ipsa*, sed in eorum vel defectum a 600' vel excessum supra 600' et a facto absecta figura ultima, quod formatur illic subtrahant, hic addant scrupulis multiplicatis; residuum denique illud, vel hoc compositum, tanquam partem proportionalem justam addant ad integrorum graduum ascensionem rectam.

Tabula, cujus formam et usum in praemis explicat Keplerus, eandem fere formam habet cum tabula, quam Epitomes addidit, hoc tantum excepto quod in columna, quae inscripta est «*Scrupula communia*», minutis addita sunt secunda, etc. etiam declinationes ad secunda extensae sunt, quae in tabula Epitomes desiderantur: iidem omnes sunt *incrementa in 10'*. Loco tabulae Epitomes addidimus illam ex Rudolphinis, tabulam vero ascensionis obliquae, quae in prima editione Epitomes sequitur Halm, cum horis occasus vel ortus Solis et angulo totae eclipticae et horizontem (Linziensem) in editionem nostram transtulimus.

In tab. Rud. hoc subijunctum est praemis *exemplum*: Querenda sit asc. recta, declinatio et angulus, respondens puncto eclipticae $0^{\circ} 7' 12''$ X. Cum 0° X. excerptur asc. rectae 332° ex columella, cui subjectum est signum X, nunc ex ascendenti semicirculo; ex columella vero scrup. comm. excerptur $6' 17''$, ex intercolumnio incrementum $572''$. Si id multiplicetur in $7' 12''$, conscribantur 4118; deleta vero figura ultima sunt 412, h. e. $6' 52''$ pars proportionalis. (Eadem compendiosius habetur sic: incremento desunt $28''$ ad implenda $60''$, haec in $7\frac{1}{2}'$ multiplicata sunt 201, unde absecta ultima, sunt $20''$, quae aufer a $7' 12''$, restat $6' 52''$ pars prop. quae prius.) Adde igitur illam ad $332^{\circ} 6' 17''$, fit quaesita asc. recta $332^{\circ} 13' 9''$.

Cum eodem 0° X. excerptur declinatio $11^{\circ} 30' 43''$; intercolumnii decrementum est $212''$, quo in $7' 12''$ multiplicato, sunt 1526, et rejecta ultima 153, h. e. $2' 33''$ subtrahenda, ut sit justa decl. $11^{\circ} 28' 10''$, estque meridionalis, ut signum.

Sic angulus ad 0° X. $69^{\circ} 20' 36''$, decem. 113, quod ductum in $7' 12''$ dat 813, et absecta ultima 81, h. e. $1^{\circ} 21''$, ut sit angulus justus $69^{\circ} 19' 15''$ et in ad sinistram, quippe formatus ab arcu sequenti semicirculi ascendens.

Si punctum eclipticae fuisset oppositum 0° η , omnia mansissent eadem, solum asc. rectae gradus seu tempora pro 332 fuissent 152; ex columella sc., cui signum η suppositum; et declinatio fuisset intelligenda septentrionalis, ut signum η . Denique angulus fuisset ad dextram meridiana, in signo quippe descendente, formatus ab arcu antecedenti.

Sed usa venit etiam, ut data asc. recta sit excerpendus arcus eclipticae oriens in sphaera recta, seu coelum una medians, ejusque declinatio etc. Tunc quere dati arcus aequatorii seu asc. rectae tempora integra (v. c. detur asc. recta $332^{\circ} 13' 9''$, in margine dextro respondet 0° in aliqua columellarum, ejusque signum superstans (in primo semicirculo), seu substans (in secundo) exscribe (hic X), nec non gradum integrum (0°) in ejusdem lineae margine competenti. Deinde compara scrupula datae ascensionis adhaerentia ($13' 9''$) cum appendice scrupularia temporum integrorum in columella communi ($6' 17''$), minusque a majori aufer, differentiam ($6' 52''$) in secunda converte et apposita cyphra divide per laterale tabulae incrementum vel decrementum ($4120 : 572$), prodibunt scrupula prima ($7'$), residua sunt 116, quae sunt nd 572 ut 12 ad $60'$; est ergo $7' 12''$ appendix, apponenda ad excerptum gradum integrum, si major fuit appendix data ($0^{\circ} 7' 12''$ X); subtrahenda, si minor. De scrupulosiori secundarum collectione superfluum est verbosius agere.

36) p. 250. Maestlius, quamvis in Epitome sua negi Terrae motum (cfr. annot. 15), ex tamen, quae ad probandos coelestes motus faciebant, libenter e Copernico et Tabulis Prutenicis desumit. Locos quem spectat Keplerus exstat in Epitomes editioe anni 1610. pag. 265.

37) p. 272. In Tab. Rud. praeceptorum cap. 34. haec deprehendimus: Cum res dubia sit, an omnino mutetur obliquitas eclipticae successu seculorum, et si mutatur, quo igitur id fiat modo, qua quantitate: sciat igitur astronomus, ad calculum motus planetarum accessurus, nullum illi objectum iri remoram, nullum impedimentum, si maxime totum hunc locum praeterant intactum, unus obliquitate eclipticae tanta; quantum hodierno tempore, dimensi sunt artifices praestantissimi, $23^{\circ} 31' 30''$, vel per nostram diminutam Solis parallaxis $23^{\circ} 30' 30''$; quasi haec quantitas sit perpetua. Haec causa est, cur locum hanc in finem totius operis rejecerim, qui in Copernico et Prutenicis occupat ipsam vestibulum, tanquam praecipuum totius operis emblema et gloriatio.

Si cui fumen lubet etiam hunc tentare calculum, sciat igitur, quinque ejus formas in his tabulis proponi, quarum prima sequitur fidem observationum Eratosthenis, quem secutus est Hipparchus, confirmavit observando Ptolemaeus, ut ipse quidem affirmat. In ea confirmanda minimum oliquid indultum a me fuit electioni epochae creationis. Secunda forma e contrario assumit omnia ex speculationibus a priori, quibus tamen lucem praetulerunt cernius observationes Eratosthenis et Ptolemaei. Tertia, quarta et quinta sunt mixtae; quae cum omnes partes speculationis tueri non possent, retentis igitur aliquibus partibus, quae majorem in speculando verisimilitudinem habere videbantur, ceteras partes ex veterum observationibus, cum archetypica speculatione conjunctis, necessitate demonstrationum eliciunt.

Circa has igitur 5 formas diligenter est attendendum computatori, quoniam initio sibi proposuerit sequelam: ejus enim tramite pergere debet ad finem usque calculi. In omnibus 5 formis commune hoc est, quod supponitur circa polum viae regiae seu eclipticae, mediae circellus aliquis, in quo polus eclipticae temporariae circumbeat aequaliter contra signorum ordinem, vel saltem in ejus circelli diametro, quae coloris solstitiorum particula est, libretur rursus prorsumque. Dividitur autem circellus iste more reliquorum in 360° etc. Principium numerationis fit a puncto, quod est ab aequatoris polo remotissimum, et progreditur numerotio in antecedentia signorum, et in hoc sic diviso circello numeratur argumentum obliquitatis in omnibus 5 formis. (Quae sequuntur, leguntur quot. 91.)

38) p. 277. 1. Sit stellarum (I et D) distantia 41° , IC et DL $30'$, $40'$ earum declinationes, quare $PI = 90^{\circ} - 30^{\circ} = 60^{\circ}$, $PD = 90^{\circ} - 40^{\circ} = 50^{\circ}$, erit

$$\cos. IPD = \frac{\cos. 41^\circ - \cos. 60^\circ \cos. 50^\circ}{\sin. 60^\circ \sin. 50^\circ}; \log. \cos. 60^\circ = 9,6989700$$

$$\log. \cos. 50^\circ = 9,8080675$$

$$N. 0,5070375 - 1 = 0,32139$$

$$\cos. 41^\circ = 0,75471$$

$$0,43332$$

$$\log. \sin. 60^\circ = 9,9375306$$

$$\log. \sin. 50^\circ = 9,8842540$$

$$0,8217846 - 1$$

$$\log. 0,43332 = 0,6368087 - 1$$

$$\angle IPD = 49^\circ 13'$$

$$\text{Diff. } 9,8150241 - 10 = \log. \cos. IPD.$$

2. Assumpta stellarum (S et I) distantia 130° , PS = $90^\circ + 42^\circ = 132^\circ$, PI = 32°

$$\text{erit } \cos. SPD = \frac{\cos. 130^\circ - \cos. 132^\circ \cos. 32^\circ}{\sin. 132^\circ \sin. 32^\circ}; \log. \cos. 132^\circ = 9,8255109$$

$$\log. \cos. 32^\circ = 9,9284205$$

$$- 0,76604 + 0,56746 = - 0,19858$$

$$\sin. 132^\circ \sin. 32^\circ = 0,3938068$$

$$- 0,50425 = \cos. 120^\circ 17'$$

3. Ultimam hoc exemplum elegit Keplerus, ut ostendat, qua ratione operandum sit, si quotiens major prodest radio, quo casu ille ostendit sinum verum anguli obtusi. In nostra calculi ratione res sic se habet:

$$\cos. SPD = \frac{- 0,34202 + 0,56746}{0,39381} = \frac{0,22544}{0,39381} = \cos. 55^\circ 5'$$

39) p. 279. Ut ostendat, qua ratione longitudo et latitudo stellae computetur sine

tabula, quam proposuit pag. 242 ss., hoc prioribus addit Keplerus exemplum: dentur in $\triangle PSE$

totus PE (distantia polorum aequatoris et eclipticae) = $23^\circ 31' 30''$, SP complementum

declinationis = $51^\circ 32'$, angulus SPE (quem metitur arcus aequatoris QN, inter circulum

declinationis et colurum solstitiorum; assumpta stellae asc. recta = $275^\circ 52'$ = $5^\circ 52'$,

cos. SE = cos. $5^\circ 52'$, sin. $23^\circ 31' 30''$, sin. $51^\circ 32' + \cos. 23^\circ 31' 30'' \cos. 51^\circ 32'$

log. cos. $5^\circ 52' = 9,9977194$

log. sin. $23^\circ 31' 30'' = 9,6011352$

log. sin. $51^\circ 32' = 9,8937452$

$$N. 0,4925998 - 1 = 0,31089$$

log. cos. $23^\circ 31' 30'' = 9,9623153$

log. cos. $51^\circ 32' = 9,7938317$

$$N. 0,7561470 - 1 = 0,57036$$

$$\cos. SE = 0,88125 = \sin. SI \text{ (latitudinis) } 61^\circ 47' 30''$$

Kepleri calculus ex nostro sic prodit: sit PE = a, PS = b, $\angle SPE = \alpha$;

cos. a, cos. b = $\frac{1}{2} [\cos. (a+b) + \cos. (a-b)]$; sin. a, sin. b = $\frac{1}{2} [\cos. (a-b) - \cos. (a+b)]$

cos. a sin. b = $\frac{1}{2} [\cos. (a-b) - \cos. (a+b)]$; cos. a = $1 - \sin.$

vers. a, quare sin. SI = $\frac{1}{2} [\cos. (a-b) - \cos. (a+b)] - \sin. \text{vers. } a \cdot \frac{1}{2}$

$[\cos. (a-b) - \cos. (a+b)] + \frac{1}{2} \cos. [(a+b) + \cos. (a-b)] = \cos. (a-b)$

- sin. vers. a $\cdot \frac{1}{2} [\cos. (a-b) \cos. (a+b)]$

Angulus PES mensuratur sen Ct, longitudine stellae (a $0^\circ \mathcal{Z}$); quare

$$\sin. \angle PES = \sin. \text{long.} = \frac{\sin. 51^\circ 32' \sin. 5^\circ 52'}{\sin. 61^\circ 47' 30''}$$

$$\text{longitudo} = 9^\circ 44' 52'' (45').$$

Quam addit Keplerus „abbreviationem“, ea redit ad formam, ex modo praemissa

desumptam: sin. PES = $\frac{1}{2} [\cos. (a-b) - \cos. (a+b)]$

$$\sin. a.$$

40) p. 279. Verbis Kepleri, quibus transfert priorem operationem (p. 277) in praesentem, ad figuram 45. addibitis, signetur circulo AQ ecliptica ejusque polus puncto P,

circulis PS et PI circuli longitudinum. Sit stellarum S et I distantia SI = $33^\circ 15'$, latitudo austr. stellae S, ST = $6^\circ 31'$, lat. bor. stellae I, CI = 1° : in $\triangle SPI$ dantur tria

latera, quare

$$\cos. SPI = \frac{\cos. 33^\circ 15' - \cos. 89^\circ \cos. 96^\circ 31'}{\sin. 89^\circ \sin. 96^\circ 31'}; SPI = 32^\circ 27'.$$

Hic notamus, correxisse nos textum, in quo profuit diff. long. $32^{\circ} 25'$ assumpto falso sine anguli $81^{\circ} 29' = 99689$ pro 99537. Deinde verba Kepleri addantur ob diceretur lat. etc. non tantum ad ipsius calculi formam, sed etiam ad nostram referenda sunt, quia cos. $96^{\circ} 31'$ negativus est, quare productum totum negativum fit ejusque subtractio per additionem absolvitur.

41) p. 280. Ut probemus Kepleri calculum, repetimus eum ratione unitata: sit stellaris latitudo SI = $61^{\circ} 47' 30''$, ejusdem declinatio SN = $38^{\circ} 28'$. Deinde data est distantis poterim PE = $23^{\circ} 31' 30''$, quare

$$\begin{array}{rcl} \cos. PES = \cos. IC = \frac{\sin. SN - \cos. PE. \sin. SI}{\sin. PE. \cos. SI} & ; & \log. \cos. PE = 9,9623153 \\ & & \log. \sin. SI = 9,9450916 \\ \sin. SN = 0,62206 & & Summa = 0,9074069 - 1 \\ N. 0,9074069 - 1 = 0,90799 & 9,9936481 = \log. \cos. 9^{\circ} 47' & \log. \sin. PE = 9,6011352 \\ - 0,18593 & & \log. \cos. SI = 9,6745662 \\ & & Summa = 0,2757014 - 1 \\ & & \log. 0,18593 = 0,2693495 - 1 \\ & & Diff. = 0,9936481 - 1 \\ & & 180^{\circ} - 9^{\circ} 47' = 170^{\circ} 13'. \end{array}$$

42) p. 283. De „occultatione et emersione ex radiis Solis, quos occasus ortusque heliacos et ab usu frequenti generis voce poetico appellat“ Tab. Rud. haec afferunt: Ptolemaeus singulis planetis (singulisque classibus fixarum stellarum) suas assignavit profunditates Solis sub horizonte in circulo verticali; quam profunditatem si Sol obtineat sub horizonte, stella in ipso horizonte posita videri vel incipit vel desinit. Has metas secutus Reinholdus in Prutenicis, ultimam omnium tabulam dedit arcum later loca Solis et planetarum, qui articulos ipsos repraesentent harum phasium. At cum arcus illi quodammodo viam incedant inter extrema, nullam habentes rationem latitudinis planetarum, sitque tabella accommodata ad unum solum climam et ad ipsa signorum initia (quod non difficiet Reinholdus eoque uberiores brevi tabulas se editurum fuit pollicitus), tabulam illam ipse mihi non censui exprimendam nec in plures tabulas multiplicandam. Nam cui id bene facerem, cum hae metae Ptolemaicae non possint esse per omnia climata eadem? Quo enim altior est polus, hoc major sit amplitudo ortiva, hoc longius ab invicem secundum horizontem distant Sol et planeta emergens vel disparens. At quo longius ad latus secedit planeta a loco horizontis, claritate Solis illustrato, hoc facilius in conspectum venit suapte lumine. Quae eadem objecto et in fixis stellarum declinationum valet, etiam sub eodem climate.

Inprimis in inferioribus, Venere et Mercurio, longe minor Solis profunditas requiritur, ut si vesperti occultentur aut mane appareant, quia tunc tenent partes orbium propiores Terrae apparentque majores, quam si mane occultentur, vesperti emergant. Adeoque Venus crebro emicat etiam interdiu, quando Sol non in profundum horizontis demersus, sed supra eum elevatus est.

His tamen dissimulatis objectionibus et supposita Ptolemaei traditione pro vera, jam tabulas has omittas penso ego usu tabulae anguli orientis, cujus usus in praesenti praecepto necessarius est. Primo per locum long. et lat. stellae vel planetae quaere punctum eclipticae coarctans, aut si de tardiorum occultatione vel velociorum emersione quaeritur, per oppositam long. et oppositam lat. quaere punctum coarctans, cujus oppositum punctum erit stellae cooccurrentis. Deinde deprome ex tabulis cujusque sideris profunditatem Solis, congruentem apparitioni vel occultationi cujusque planetae, per quam computa arcum eclipticae infer Solem et horizontem. Ilunc arcum adde puncto eclipticae, quod coarctatur sideri, pro indaganda apparitione ejus vel occultatione matutina, aufer puncto cooccurrenti pro occultatione vel apparitione ejus vespertina: constituta sic erit meta Soli, quam si is tunc obtineat, sidus apparere vel incipit vel desinit. Sin autem Sol sit extra has metas, ut discernatur, praecesseritne conditio an secutura sit, recurrendum est ad diurnos Solis et planetae. Nam si major fuerit diurnus Solis la consequentia (ut in comparatione fixarum, quae diurno carent. et planetarum superiorum semper, inferiorum vero ab eorum elongatione maxima prima per totum tempus retrogradationis usque ad secundam), tunc valet haec regula: cum

Sol est ante metam emersionis vel occultationis, -emerio latentis matutina vel occultatio apparentis vespertina demum sequitur; cum post metam, jam emerit stella mane, quae latebat, aut jam cedita est vesperi sub radios Solis, quae prius vesperi conspiciebatur ante occumum. Sin autem planetae motus diurnus fuerit maior solari (quod fit in Luna semper, in Venere et Mercurio ab elongatione maxima secunda usque ad primam), tunc, cum Sol est ante metam, emerit jam sidus vesperi, quod prius latebat, aut jam ceditum est mane, quod prius apparuerat; sin autem Sol ultra metam est, sidus latens adhuc emergit demum vesperi, aut apparet adhuc mane ceditur sequentibus diebus; proferet nimirum metas suas in consequentia, ut eae Solem demum assequantur.

43) p. 287. Ad Kepleri problema ejusque solutionem haec notamus. In fig. 50, circulus HO representat horizontem, V verticem, AQ aequatorem, P polum, ES eclipticam, S Solem in 0° ♊, quare ES = 90° , SET = $23^{\circ} 31' 30''$ ejusque mensura arcus ST, arcus complementem arcus LS, «depressio» SoHis est arcus RS isque sit 12° , ejus compl. 78° = arc. NS. Denique data alt. poli $48^{\circ} 16'$, erit VP vel LN = $41^{\circ} 44'$. Jam in LSN cognitis lateribus, prodit

$$\cos. SLN = \frac{\cos. SN - \cos. SL. \cos. LN}{\sin. SL. \sin. LN}, \text{ vel si uti velimus quantitibus arcuum, quae}$$

$$\text{datae sunt: } \cos. 8LN = \frac{\sin. 12^\circ - \sin. 23^\circ 31' 30'' \cdot \sin. 48^\circ 16'}{\cos. 23^\circ 31' 30'' \cdot \cos. 48^\circ 16'}$$

$$\text{SLN} = \text{arc. TI} = 98^{\circ} 28'$$

Asc. recta Solis = 270°

Asc. recta mediæ coeli = $171^{\circ} 32'$ (puncti I aequatoris)

Asc. obliqua horaeopti = $261^{\circ} 52'$ (puncti Q aequatoris, in horizonte constituti)

$$\text{Asc. recta Solis} = 270^{\circ}$$

$$\text{Diff. ascensionalis} = 8^{\circ} 28' \text{ (OT)}$$

In \triangle QBT ad T rectangulo datur \angle BQT (cujus mensura est arcus AH, altitudo aequatoris) = $41^{\circ} 44'$ et QT = $8^{\circ} 28'$, ergo

Tang. TB = tg. $41^{\circ} 44'$, slo. $8^{\circ} 28'$; TB = $7^{\circ} 29'$

Quod sequitur exemplum hoc tantum differt a priori, ut pro Δ LSN considerandum sit Δ VSP, cujus latus VS major quadrante, quo fit ut cos. SV (autem SN) negativus exeat.

44) p. 293. Keplerus utitur ad hunc calculum tabula, pag. 242 ss. inserta, assumens pro longitudinibus asc. rectas, pro latitudinibus declinationes Jovis tabulae. Ut numeros Kepleri probemus, aliam ingredimur viam, vel figure 38, in qua sit AD aequator, AE elliptica, GC circulus latitudinis, quem imaginiter prolongatum in S, locum Strii vel Procyonis, quorum prior habet longit. $70^{\circ} 36'$, alter $82^{\circ} 19'$.

$$\begin{aligned} \text{ct. AD} &= \text{ct } 70^{\circ} 86', \text{cs. } 23^{\circ} 31' 30''; \text{AD} = 72^{\circ} 6'; \text{tg. CB} = \text{sin. } 70^{\circ} 86', \text{tg. } 23^{\circ} 31' 30''; \text{CH} = 22^{\circ} 20' (22.19.34) \\ &= \text{ct } 82^{\circ} 19', \text{cs. } 23^{\circ} 31' 30''; \text{AD} = 82^{\circ} 57'; \quad \text{sin. } 82^{\circ} 19', \text{tg. } 23.31.30 = 23^{\circ} 20'. \end{aligned}$$

Cum elut lat. stellarum australes $39^{\circ} 30'$ et $15^{\circ} 57'$, erit distantia Sirlī ab aequatore $39^{\circ} 30' - 23^{\circ} 20' = 17^{\circ} 10'$ austr., eadem Procyonis = $23^{\circ} 20' - 15^{\circ} 57' = 7^{\circ} 23'$ bor. Jam ducto arcu aequatori parallelo, erunt $17^{\circ} 10'$ vel $7^{\circ} 23'$ hypotenuse triangulorum rectangulorum, quorum anguli acuti (= ABC) invenientur formula: $\cos. ABC = \sin. BAC \cos. AC$, quae sicut $82^{\circ} 23'$ et $86^{\circ} 56'$. (Kepelus, cui tabulae exhibuerunt $86^{\circ} 58'$, falso ponit $82^{\circ} 56'$.) Deinde datis in illis triangulis hypotenusa et altero angulum, deprehendens cathetas formulae:

$$\sin. s = \sin. 17^{\circ} 10', \quad \sin. 82^{\circ} 23': s = 17^{\circ} 0'$$

$$\equiv \text{elev. } 7^{\circ} 23', \text{ azim. } 86^{\circ} 56'; \quad \equiv 7^{\circ} 22'$$

$$\text{tg. } c = \text{tg. } 17^{\circ} 10', \cos. 82^{\circ} 23'; c = 2^{\circ} 20' (41'')$$

$$= \text{tg. } 7^{\circ} 23'. \cos. 86^{\circ} 56'; = 0^{\circ} 23' (50'')$$

$$\text{Asc. recta Skell} = 72^{\circ} 6' + 2^{\circ} 20' = 74^{\circ} 26', \text{ Procyonis} = 82^{\circ} 57' - 0^{\circ} 23' = 82^{\circ} 34'$$

Jam sit datus locus, cujus alt. poli = 36° , demersio Solis pro Sirio = 12° , pro Procyone = 13° , erit in triangulo sphaerico rectangulo alter angulorum acutorum = 54° (qui metitur alt. aequatoris = $90^{\circ} - 36^{\circ}$ et latus 17° (vel $7^{\circ} 22'$).

ergo $\sin. x = \cot. 64^{\circ}$, $\tan. 17^{\circ}$. hoc est arcus differentiae asc. = $12^{\circ} 50'$

$$= \cot. 54^{\circ}. \lg. 7^{\circ} 22' = 5^{\circ} 25'$$

Kepleri numeros ex parte falsos correximus, exceptis tangente aequali $17^{\circ} 0'$, pro quo assumit tangentem $17^{\circ} 10'$, et postea pro tangente $7^{\circ} 22'$ tangentem $7^{\circ} 20'$.

45) p. 296. $14^{\circ} 40' MP = 161^{\circ} 40' = AB$ in triangulo ABC figurae 38.

cot. AD = cot. $161^{\circ} 40'$. cos. $23^{\circ} 31' 30''$, et

tg. BC = sin. $161. 40'$. tg. $23. 31. 30$.

cos. ABC = cos. $164^{\circ} 40'$. sin. $25^{\circ} 31' 30''$.

AD = $163^{\circ} 21'$, BC = $6^{\circ} 34'$, ABC = $67^{\circ} 21'$.

Addatur ad latitudinem Arcturi anno 1600 = $31^{\circ} 3'$ supra inventus arcus $6^{\circ} 34'$, prodit arcus $37^{\circ} 37'$ trianguli rectanguli, in quo insuper cognitus est alter angulorum acutorum = $67^{\circ} 21'$, quare ut annot. praecedente

sin. s = sin. $37^{\circ} 37'$. sin. $67^{\circ} 21' =$ sin. $31^{\circ} 17'$

tang. c = tg. $37^{\circ} 37'$. cos. $67^{\circ} 21' =$ tg. $16^{\circ} 32'$

(Keplero prodeunt pro $31^{\circ} 17'$ falso $31^{\circ} 30'$, quia factum sinuum 61036 et 92287 per lapsum calculi 56610 pro 56330 posuit.)

Asc. recta Arcturi = $163^{\circ} 21' + 16^{\circ} 32' = 179^{\circ} 53'$.

Differentia asc. invenitur, ut supra (annot. 44), per alt. poli (36°) et arcum s ($54^{\circ} 17'$) sic: sin. x = tg. 36° . tg. $34^{\circ} 17'$, diff. asc. = $29^{\circ} 42'$ (K. $29^{\circ} 57'$)

Asc. obliquus = $179^{\circ} 53' - 29^{\circ} 42' = 150^{\circ} 11'$

Desc. obliquus = $179^{\circ} 53' + 29^{\circ} 42' = 209. 35$. Angulos ad puncta eclipticae coorientia et cooccidentia ($5^{\circ} 11' MP$, $14^{\circ} 32' M$) exhibent tabulae $74^{\circ} 58'$ et 35° , demarsio

Arcturi = 12° : hinc $\frac{\text{sin. } 12^{\circ}}{\text{sin. } 74^{\circ} 58'} =$ sin. $12^{\circ} 26'$, neque vero, quells Keplero prodit, $14^{\circ} 39'$. Numerum 21528 falso assumit Keplerus sinum $14^{\circ} 39'$.

46) p. 298. Sit (Fig. 45), P polus Terrae, S et I Lincium et Gratium, SI arcus circuli magni = 2° , SP = $41^{\circ} 44'$, IP = $42^{\circ} 58'$, quaeritur quantitas anguli SPI.

Cos. SPI = $\frac{\cos. 2^{\circ} - \cos. 41^{\circ} 44' \cdot \cos. 42^{\circ} 58'}{\text{sin. } 41^{\circ} 44' \cdot \text{sin. } 42^{\circ} 58'} = \cos. 2^{\circ} 20' 30''$

Keplerus complementum quidem $48^{\circ} 16'$ recte prodit $41^{\circ} 44'$, sed statim initio sui calculi ponit pro 41° falso $46'$, et hinc adhibens falsum hoc angulum, computat SPI = $2^{\circ} 22\frac{1}{2}'$, qui vero, si accuratius sumas sinus, item ut supra $2^{\circ} 20'$ prodit. Calculus sequentis problematis item ad formam, quam modo posuimus, redit.

Capite XVI. Tob. Rod. De reductione temporum in diversis locis numeratorum ad meridianum harum Tabularum et de Catalogo locorum, haec refert Keplerus de causis, quibus motus hunc locum inseruerit, illum omiserit, et qua ratione investigaverit locorum longitudes et latitudes: Ut tanto latius et popularior esse posset usus harum tabularum, catalogum inserere visum est locorum 500 et quod excurrit. In eorum selecta rationes varias sum secutus. Cum enim tabulae denominatae sint a Rudolpho Caesare, familiae Austriacae, cum ipse Gormanns sua natione, Austriae incolatu, plurimum indulsit regibus et provinciis Austriacis reliquaeque Germaniae. Nec Italiam leviter attingi passa est locorum celebritas. Igitur habita ratione divisionis provinciarum, plurimum quidem modernae, nonnulli tamen et antiquae, ex singulis delegi odes et aulas principum, academias, episcopatus, conventus forenses, emporia, mercato frequentiores, mentiones celebres, promontoria, portus, loca eventibus nobilitata; mathematicorum etiam, qui sideribus observandis operam dederunt, habitationes, obscurioris ceteroqui nominis. Si qua in hoc censu sunt a me praeterita jara aut aequi aut potioris, id impulerit vicinis aliis, quae omitti non potuerunt. Fortassis etiam loca quaedam provinciis non suis sed vicinis adscripta invenies, quae memoriae defectui peto condonari. Non equidem hic jura cernuntur territoriorum, sed notiones subvenit exterorum.

Majus mathematicis cura numerorum incumbit, de cujus negotii difficultate documentum unum calci catalogi ad supplendum locum subjectum est *). Duo sunt au-

*) Documentum, quod hic dicit, haec est: Quantum sit incertitudinis, quantum laboris in examinandis locorum longitudinibus, lubet unico exemplo docere, ex media Europa petito. Inter Romam et Noribergam Regiomontani aetate censebantur 36°

merorum ordines, posterior altitudinum poli in gradibus et scrupulis. prior differentiae meridianorum in horis et minutis, cum titulo additionis in orientalibus, subtractionis in occidentis.

Quod igitur poli altitudines attinet, omnis eorum certitudo pendet ab observationibus coelestibus. Cum autem paucis in locis sit observatum, nec id semper accurate, tabularum geographicarum auctores ea loca a mathematicis desumunt, loca vicina unius et ejusdem provinciae pro ratione propinquitatis itinerariae et plagae accommodant; saepe etiam geographiae Ptolemaei fidunt, qui solam fere longitudinem diel aestivae longissimae, ut eam ex relatu aliorum habere potuit, est secutus.

Mappis jam confectis hodie mathematici utuntur tanquam authenticis, versa se rerum serie, pauci attendunt, quam Imbecillibus illae principis sint inuixae. Illic adeo varietas aliqua oritur etiam circa poli altitudines, quod mireris. Lutetiae Parisiorum dat Tycho in catalogo a Longimontano correcto $48^{\circ} 10'$, cum Fernellus et Orontius mathematici posuerint $48^{\circ} 40'$. Vieta recentior $48^{\circ} 49'$, tabulae tamen geographicae Mercatoris et Piscatorii tenent Orontium propius, quas ego secutus, posui $48^{\circ} 39'$.

Quod longitudines attinet locorum, seu differentias meridianorum, hic res fit multo perplexior, cum ab observationibus magis deseramur. Exstant quidem epichremata varia, differentias indagandi meridianorum per observationes, sed ut fieri solet, in plerisque plus est ingenii, quam commoditatis ad opus peragendum. Et de ceteris quidem modis non est hic locus disserendi, de quo, qui observatione Lunae utitur in nonagesimo versantis, dicam infra.

Mihi ad concinnandum hunc catalogum servavit haec unica observandi ratio, per diversos junctis operis administranda, cum in diversis locis observantur phases certae unius et ejusdem eclipsis. Haec observatio est rarissimi casus, sed magno studio in concinnatione hujus catalogi conquisita. Neque tamen de fide observatorum in aliis locis semper certus esse potui, nisi cum diversal inter se consenserunt.

Circa hunc modum illud imprimis est observandum, solares eclipses, praesertim magnas, esse multo aptiores lunariis. Initia enim earum vel fines accurate agnoscuntur, daturque distantia temporaria diversarum phasium ex calculo, sic ut etiam diversae inter se comparari possint diversis locis observatae; et ratio abstrahendi parallaxes est certissima et exculissima in his tabulis. Adde quod sedulus observator quantitates phasium crescentis et decrescents circino potest explorare in tabella, in quam radius Solis incidit.

Cum igitur novum et insolens quippiam me in hoc catalogo ausum deprehenderint mathematici, eos rogatos velim, ut primo omnium fundamentum chartae illius geographicae examinent, cujus indicio se putant luseulentium numerationis meae detegere; deinde ut fundamenta ipsa plura chartarum inter se comparent dissensionisque auctorum, ex quibus illae sua fundamenta petierint, ob oculos ponant reputentque, nullam chartis ab usurpationis diuturnitate majorem auctoritatem accedere, quam erat

(Regiom. Primi Mobilis probl. 45.), Wernerus habet $32'$; ex principio tamen eclipsis anni 1497. 18. Jan utrobique observato (Romae quidem h. 5. $24'$, Noribergae a nescio quo h. 4. $32'$) colliguntur $28'$. Apianus in „Astrolabio“ inter Regiomontanum et Wernerum medium sibi censuit eligendum $34'$. Maestlinus tamen et Everardus et Origanus Wernerum propius tenent, statuentes $33'$. At Stoefferus in Calculario, non attenta Wernerii observatione, statuit $18'$, quem videtur secutus Apianus posterior in „Caesareo“, statuens $19'$. Et Maginus medium elegit inter Apiani priorem et Stoefferi traditionem, statuens $26'$. Schonerus in „Resolutis“ habet tantum $12'$, quod observant Mercator et Houdius in mappis. Stadius in Ephemeridibus habet $13'$, Jansoni in mappa universalis ad $10'$ descendisse videtur. Ego potius observationibus eclipsium Lunae duabus, Romae habitis, ex annis 1616, 1617, quas et ego observavi Lincii, consensu fidens, Lincium Roma orientalius facio $10'$, quantum et Uraniburgo per obs. alias. Ita mihi Roma et Uraniburgum sub eodem veniunt meridianum, qui Noribergensi non plus quam $4'$ est orientior.

observationis, cui unaquaelibet est innixa. Est aliquid sane tribuendum chartis singularum provinciarum singulis, si ab incolis diligentibus sunt confectae: at id ad solam ejusdem provinciae locorum dispositionem pertinet adque vicinarum limites communes, ad provincias longe dissitas inter se coaptandas extendi non potest. Si geographus bene locavit Lutetiam, non male locavit orbes reliquas Galliae, si a Lutetia coepit erravitque dimidio gradu, error idem in totam redundabit Galliam, salvo intervallo particularibus.

Jam igitur ut ad capita novationum mearum accedam, primum supra propositum est, Roma sub Huennae meridianum relata, quam tota sequitur Italia. Fundamentum tetigi in calce catalogi, duas eclipses Lunae, observatas Romae, Tubingae, Lincii. Si quaeras, quid fiat limitibus Germaniae et Italiae? Illos, inquam ego, insident Alpes et Apenninus, partem igitur differentiae demandae ex hoc, partem ex illis exemi. Snellius in Eratosthene Belgico notat abundare gradum inter Belgium et Hamburgum, similia statuit inter Cassellas et Goesam, et consentit tabula Piscatorii, exemi igitur 4'. Nam et itinera consentiunt, Osnabruggam inter et Hamburgum mil. 27, eandem inter et Antwerpiam 40, illa efficiunt 9', ista 15', summa Hamburga Antwerpiam est 24 aut paulo minus, si parva milliaria. Ex eclipsi ☾ anni 1598 plus adhuc eximendum erat: sunt enim inventa inter Alcmariam et Wandesburgum arcem Hamburgo propinquam, ubi tunc Tycho hospitabatur, 18', ego 21 reliqui.

Ex eclipsi anni 1560 Lovanium inter et Viennam Austriae reperio 47', tantumdem fere ex intervallis itinerariis et alt. poli, media Angusta adhibita, cum numerentur mill. 86 et 61. Consentit et observatio eclipsis anno 1605. Pragae et Londini in Anglia habita, ad contrahendum spatium. Sic et eclipsis, anno 1621 Pntzbachii in Welteravia, et Dantiaci et Lincii observata, differentiam indicat 45'. Id congruum est chartis. Nam Piscatorii Danica, Mercatoris Poloniae, locis inter se vicinis per Kaerium connexa, quae inter Grypswaldiam et Stargardiam (quarum illa in Daniae, haec in Poloniae charta visitur) locat 8', hae inquam duae chartae Danticum sic cum Hamburgo connectunt. Pluribus igitur argumentis concurrentibus fide eorum, qui firmamenta argumentorum mihi suppeditarunt, consensi in contractionem, non ignarus, Tychonem Brahe libr. II. Progymnasm: Cassellas Huenna 25' occidentiorem facere. Reputavi enim, rem esse mihi non cum Tychone, sed cum mappis illis antiquioribus, quas ille secutus est.

Fateor equidem mihi non esse satisfactum. Nam cuperem Pragam meridianum Lincensi subdere adeoque omnia loca Boheminae, Silesiae, Poloniae, Hungariae, Austriae inferioris, Styriae, 4 minutis promovere in orientem: sic requirere videntur intervallo Itineraria, siquidem omnibus istis locis 15 milliaria in gradum unum circuli magni continentur. Nam Noribergera Pragam numerantur milliaria 36, Angusta Gratium 60, Lincio Viennam 30, Pragam 26, conspicua inaequalitate, cum plus distet Praga quam Vienna, ut quam navis aucto fluvio assequitur horis 16. Cuperem ex adverso Rostochii meridianum ex sententia Tychonis ab Uraniburgico dimidio gradu in orientem divellere, Noribergensem longius ab eo in occidentem remove. Verum ista qui fecerit, ei negotia nascentur vel cum chartis recentibus vel cum eclipsium observatoriis. Itaque, tanquam in lite perplexa, quod minutula attinet, catalogum hunc habeat lector loco interlocutoriae manumque et ipse admoveat operi, exorsus a loco suo et viciniam omnem aptans per praecepta sequentia.

Eandem libertatem emendandi hunc catalogum et ego mihi reservo, si peritiis artis, hoc jam catalogo invitati, suas intervallorum observationes mecum communicaverint. Quod eo dico, ne quis auctoritate mea in chartis geographicis mutandis praepropere abutatur.

Sed dimissis jam locis nobis vicinis et minutis, quae sunt in dubio, exspatiabimur longius ad meridianos remotos. Pertinet enim ad tabularum harum existimationem, ut intelligat lector, quomodo meridianus Uraniburgicus, harum tabularum proprius, cum Alexandrino ceterisque, sub quibus est ab antiquis observatum, sit connexus. Igitur de connexione Lincii et Gratii cum Uraniburgo ex parte una, Lincii et Tubingae cum Roma ex parte altera, satis mihi videor certus esse meridianumque

Uraniburgo Romam usque perduxisse feliciter. Mirabitur scio geographiae studiosus, hac ratione Venetum fieri Romae occidentalem nonnihil et Anconam Villaco propinquare: at desinet mirari, si contulerit mappas Houdil et Jansonii, qui jam dudum hanc propinquitatem ex parte potiori repraesentarunt. Ac mihi, cum itineraria voivo, non male respondere videtur itineris terrestris ratio, Patavio Romam ducentis.

Jam Romae et Lilybaei meridianum eundem esse, videor tuto credere posse chartis geographicis, cum trajectus ex Hostiensi portu Panormum unilis oblicibus sit impeditus, cum pene quotidianae naves cant Maltam, quibus circumueundum est Lilybaeum. At vero sinus Carthaginiensis in Africa orientale promontorium. quod Hermaceum dicebatur veteribus, adco propinquum est Lilybaeo Siciliae, ut olim lyncens quidam, speculatus ex jugis Lilybaei, navium e portu illo solventium numerum prodiderit. Non est igitur neque Carthaginis meridianus unitum occidentalior; esto Hermaci 4', Carthaginis 9'. Porro Carthagine Alexandriam Aegypti Strabo lib. II. Geographiae summam stadiorum numerat majorem quam tredecim milia, libro vero IV. milliari italico dat stadia 10; germanico igitur competunt 40. Ita 600 stadia faciunt gradum unum circuli magni, ut efficiat illa summa stadiorum 21° 40', quae cum altitudinibus poli borei subtendit angulum ad polum 25° 28'. Et habet quidem Geographia Ptolemaei omnino 25° 40', ut dubium non sit, quin geographus Alexandrinus in constituendo meridiano Carthaginis ex Alexandriae hac ipsa traditione intervalli itinerarii sit usus. Veruntamen alias octo stadia faciunt milliaria. Ita colligretur differentia meridianorum Carthaginis et Alexandrii quarta circiter parte major, scilicet 32'. Expedit igitur etiam alios auctores super hoc intervallo considerare. Plinius ex Eratostheue et Polybio milliaria numerat 1629, ipse accuratius per stativa singula colligit 1792. Atqui ob magnos duarum Syrtium flexus, quos Plinius circumducta numeratione suam, abijcienda erit pars circiter sexta: ita restabunt milliaria 1500. Confirmat hanc summam etiam Itinerarium Antonini mediocriter: hoc culm Carthagine Alexandriam per Tbcuas et Leptin magnam numerat 1541. Si graduli dea milliaria italica 60, colliges 25 gradus circuli magni, qui ad polum angulum subtendunt 29° 22', et hic valet horas 1. 57': unde ablata Carthaginis 9', relinquunt Romam inter et Alexandriam h. 1. 48'. In Commentariis de motu Martia usus sum horis 2 Huennam inter et Alexandriam, ex fide Jansonianae tabulae. Hic Ptolemaeus ipse in applicatione observationis cujusdam n Menelao habitac Romae, usurpat h. 1. 20' solum. Non igitur immerito Wernerus existimat, geographiae auctorem fuisse alium.

Pergo ulterius. Inter Alexandriam et Babyloem Ptolemaei *μυριαλς ορραις* usurpat 50', geographia vero h. 1. 24'. En documentum aliud diversitatis auctorum ntriusquo. Mibi, Babyionicas observationes comptanti, differentia major ista non male reddidit oberrata. Censui tamen, Albategnio potius fidem adhibendam, qui hoc intervalum rursus minuit, quod ipse, locorum illorum incolae, scire melius poterat. Ita factum est, ut pro h. 1. 14' retinuerim 1. 3'. Et conflatur hinc Babyionis a Roma et Uraniburgo differentia b. 2. 51', quod voive erat, consonum sic satis reperire codici antiquo tabularum Arzabellis, ex arabico in latinum verso per Gerardum Cremonensem, ut puto: sic enim ille habet distributas longitudes, ut inter Romam et Alexandriam sint h. 1. 40', inter illam et Baldach b. 2. 18', Babyloem novam h. 2. 36', Babyloem veterem h. 2. 50'. Et quia altitudinem poli veteri Bah. assignat 35° 0', novae 30° 30': an igitur illa Babylo nova, quae hodie Balsora? quippe 4½ gr. meridionalior Babyloem veteri?

Circa Antiochiam et Aractam Albategnii dubia reddunt omnia, homonymia multiplex ex antiquo, intermissa jam diu commercia et numerorum a Ptolemaeo dissonantis. Geographia Ptolemaei septem exhibet Antiochias in totidem provinciis, in Caria, Pisidia, Pamphylia, Cilicia, Comagene, Cassiotide Syriae provincia et Mesopotamia. Et si vero Araca quaedam jungitur Antiochiae Comagenes ad Taurum, numeri tamen cavere nos jubent a ludificatione vocabulorum. Verisimilior igitur est Antiochia illa magna ad Oroutem, quae etsi a Geographia ponitur 34 minutis ultra Alexandriam, 7' ante Aractam, sequor tamen Albategnium, qui summam utriusque eandem fere habens, aliter tamen distribuit, statuens illic 25' hic 15'. Quodnam vero nomen ex Geographia conveniat Aractae Albategni, id novam dubitationem habet. De Araca

Comagenes hactenus, at pugnat altitudo poli $37^{\circ} 40'$, nam Albategnius Aractae suae dat $36^{\circ} 0'$. Edessae Mesopotamiae faret cognomen Hebraicum Erech apud Hieronymum, quod Arabes forte pronuntiant Arach; sed et poli alt. $37^{\circ} 30'$ et intervallum $48'$ dissonant. At Charrac, Hebr. Haran, altitudine poli $36^{\circ} 10'$, consentiunt; videantur periti Arabismi, quomodo ex Hebraeo Haran fiat Arabicum Arach; inspicitur etiam codex Albategnii Arabicus, ut appareat, qua fide interpres reddiderit Aractam, et alius Macbometem Aracensem. Nam etiam longitudo Charrarum ex Geographis, quae est $51'$, non male respondet, si eadem proportionem abbrevietur, qua Babylonium Albategnius abbreviat. Ille enim pro $74'$ retinet $63'$. Et nos igitur pro $51'$ Charrarum eadem fide statuimus $40'$. Sic enim fere et pro $34'$ Antiochiae statuebamus $25'$.

Tyhenes Persidis intervallum a Toletu Hispaniae assumi $72'$, lat. 38° ex fide matbematicorum Persidis, quos ex Isacio Monacho allegat Christmannus, ex Chrysococco Scaliger, etiam principium longitudinum, Gezaer ebalidath, Scaliger ex astrologo Tunisiensi ejusque commentatore Arabico ad verbum interpretatur insulas Fortunatorum et finem occidentis, quod initium numerationis Ptolemaeus secutus est in Geographia. Adduct quippe ex Job. Bapt. Ramusio, praefat. in II. tomum Navigationum, Scrip. Abulfadam Ismaelem, geographum Arabicum, monentem: *Arabas in numeratione longitudinum detraxere gradus 10 Ptolemaeis*, adeoque Georgium Chrysococcon ipsamque Isacium appellationem illam Arabicam applicare Gadibus, quarum et Toleti long. est fere eadem, sc. *ty isazay kai dotay thalassay*, quae a Gadibus initium habet, quasi Arabes finem occidentis cum fine maris occidentalis confuderint. (Vide Scalig. Em. T. lib. VI. fol. 584.) Accessit quippe Gadibus fama ex evenit et successu Arabum. Ex eo Toleti quoque longitudinem Arabes Mahumedani Hispanienses eosque secuti Judaei et Alpbonsini statuant $0'$, initium ab ea numerationis facientes.

Hanc vero Tyhenen Chazariae provinciae Persidis in Geographia Ptolemaei reperire, est volucres persequi peditem. Scaliger de Sogdiana monet, nulla neo numerorum nec nominis ycrisimilitudine. Conjectura de Adiabene videtur melior, quam Ptolemaei Geographia tendit inter Arrapachitum et Garimaeos [Arpaxadi et Arami cognomines] inter 71° et 80° longitudinis, inter 36° et 41° latitudinis. Jam vero dixi, quod 80° a Fortunatis sint 70° a Toletu et Gadibus.

In contrahendis intervallis Europae versus occidentem non solum opinionem Snellii, sed etiam observationes eclipsium sum secutus, consultis crebro intervallis itinerariis ex aestimatione populari libellisque hac de re editis. Etsi inbricis est uterque modus, nec sine suffragiorum aliqua multitudine et adaequatione transigi potest. Diminutio quidem satis est magna; cum Santritterus in editione Tabularum Alphonsi Toletum inter et Noribergam statuat b. i. $24'$, Ego f. $0'$: non male tamen haec diminutio quadrat ad eclipsim anni 1560 Conybrinae totalem faciendam. Nec multum abt Apianus in Caesareo, qui Tolosam Galliae a Noriberga dimovet per $41'$; cui si adjiciam, quod est mihi inter Tolosam et Toletum $22'$, conficitur $1^{\circ} 3'$. Narbonam vero dimovet per $35'$, cui si $24'$ addam, quod est inter Narbonam et Toletum mihi, conficimus h. $0. 59'$. Eclipses Hispanicas plures hactenus frustra quaesivi. Diminutionem autem hanc in litora proportionem distribui, praecipue tamen in sinum Ligusticum et Massiliensem, quod itinerum dimensio per Alpes et Pyrenaeum, desineutes in hoc pelagus, plurimum soleat esse perturbata.

Vicissim in productione Moscoviae et Russiae in orientem, cum destitueret observationibus eclipsium, dimensionibus itinerum, quae exstant in Sigismundo Herberstenio, fidem habui, cum interim Tauricam Chersonnesum et Caspias Jansonio permiserim, dubitante ussensu. Nam et Herbersteus Tauricam a Moscu orientalem facit, et Caspias Strabo videtur Indiae propius admove, cui uni de mediterraneis tantum debetur fidei, quantum nantis nostris de litoribus. Nam quis post Alexandrum, Strabonis hoc loco materiam, terras illas et emensus est, et expeditiones suas literis consignavit, praeter M. Panli Veneti et Lind. Vartomanni peregrinationum privatarum descriptiones obscuras et fidei circa intervalla plerumque incertae? Itinera enim caravanarum per vastas et inhospitas solitudines inter se valde inaequalia esse puto et si ea viribus camelorum metienda sunt, eas nos Europaei vulgo ignoramus.

In meridiano Frueburgi Warmiae, sub quo Copernicus observavit, constituendo, praeter supra dicta consuli etiam intervalla itineraria. Numerantur enim Lubeca Dantiscum milliaria 8, itinere brevissimo secundum litus maris Baltici, quae sunt 31'. Lubeca vero Rostochio abest minutis 8, indice charta, ita manent Dantisco 29' vel 28'. Inde vero Frueburgum indicibus mappis sunt 4'. Invenio in chartis meis alias etiam inter Rostochium et Stargardiam 15' per eclipses, quae hic ex dictis fundamentis focci 11', interim dum de promotione locorum orientalium, de qua paulo prius, amplius delibero.

Sed modus esto hujus *astronomiae*; ad praecepta transeamus. Primus igitur et proprius catalogi usus est in temporis, quo futura computatur eclipsis aliqua aut ☉ ☾ cum stellis, reductione ad meridianum cujusque loci. Et tunc tituli differentiae meridianorum adjuncti debent observari, addendae sc. temporis per calculum invento horae et minuta, quibus addita est litera A, subtrahendae, quas litera S sequitur, quia orientales plus, occidentales minus numerant. Hac ratione fiet interdum, ut numerus horarum addendo super 24 excresecens, iis detractis, in diem sequentem sit conferendus, aut si major numerus subtrahi jubeatur a minore temporis Uraniburgici, diei autecedentis horae 24 adsciscendae sint ipsamque phaenomenon aliis locis aſſi diei mensis adscribendum. Si vero certum loci cujusque tempus offeratur, sub quo sit observata Luna, jubeaturque vel propter hanc observationem, vel ob aliam causam computare locum Lunae planetarumve ex his tabulis ad meridianum loci: priusquam id aggrediaris opus, horas et minuta, loco cuilibet in catalogo apposita, contra quam jubent tituli, subtrahere vel adde a tempore oblato, ut id reducat ad meridianum Uraniburgicum seu Romanum. Praeceptum est facile et tritum, nec eget exemplo peculiari.

Cape vero calculator etiam modum corrigendi has meridianorum differentias, si correctione opus habuerint aut si te cura tangit augendi catalogi. Milliaria Germanicum aestimatur communiter iter, quod duarum horarum intervallo pedes quilibet expeditis conficit. Eorum milliarium 15 insunt in uno gradu circuli magni, per superficiem Terrae ducti. Cum ergo duorum locorum offeratur intervallum in milliariis Germanicis, siquidem ea communia fuerint et via brevissima, non flexuosa longis ambagibus: divide numerum milliarium per 15, ut redigantur in gradus et scrupula circuli magni. Deinde utriusque loci differentiam altitudinum poli alicundo tibi compara. Nam si uterque locus in eadem fuerit mappa particulari, facile differentia haec exquiratur et sine periculo erroris, etiam si altitudines ipsae vitium habuerint. Sin autem loca longius dissita fuerint in ortum vel occiduum, parvum erit momentum etiam ab errorculo aliquo differentiae hujus. Itaque poteris uti alt. poli loci unius etiam ex hoc catalogo desumpta, alterius vero loci longiuscule distantis alt. poli ex quacunque charta vel traditione excerpta. Jam si intervallum non est magnum, expedit compendium sectari, quantumvis inartificiale. Antilog. diff. alt. poli aufer ab antilog. intervalli in gradus reducti, residuum ut antilog. ostendet arcum, a cujus log. aufer antilog. alt. poli majoris, restabit logarithmus, ostendens gradus et scrupula aequatoris, quae per 4 multiplicati dant minuta horaria differentiae locorum.

Exemplum, quod his addit Keplerus, idem est quod in nostro textu. Calculus sic se habet, adhibitis pro Keplerianis Briggsii logarithmibus:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Differentia alt. poli} = 1^{\circ} 14', & \text{distantia locorum} = 2^{\circ}, & \\
 \cos. x = \frac{\cos. 2^{\circ}}{\cos. 1^{\circ} 14'}; & \log. \cos. 2^{\circ} = 9,9997354 & \\
 x = 1^{\circ} 34' 30'' & \log. \cos. 1^{\circ} 14' = 9,9998994 & \\
 \sin. y = \frac{\sin. 1^{\circ} 34' 30''}{\sin. 18^{\circ} 16'}; & \log. \sin. 1^{\circ} 34' 30'' = 9,9998360 & \\
 y = 2^{\circ} 6' 40'' & \log. \sin. 18^{\circ} 16' = 8,4391052 & \\
 & & \log. \sin. 48^{\circ} 16' = 9,8728819 \\
 & & 8,5662183
 \end{array}$$

Keplero prodent 2° 39', cum differentiam «antilogarithmorum» 61 et 23 ponat = 48 indeque eliciat arcum paralleli = 1° 46'.

Ratio hujus modi haec est: quia distantia locorum et alt. diff. parva est, triangulum, quod efficitur ducto arcu parallelo aequatori, quasi rectangulum consideratur, in quo

dantur hypotenusa et altera cathetus; inventa prima operatione altera cathetus (x), dantur in alio triangulo iidem rectangulo hypotenusa et altera cathetus, quaeritur angulus oppositus (y, ad polm), quem metitur arcus aequatoris.

Si locorum intervallum paulo longius est, adhibenda est methodus, quam textus exhibet. Exemplum in Tab. Rud. est diff. merid. Augustae Vind. et Madrid, quae censentur mill. germ. 200 distantes; fides aëstimationis sit pene viatorum. Calculum absolvit logarithmis usus et formula, quae reddit ad hanc:

$$\sin. \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{\sin. (s-b) \cdot \sin. (s-c)}{\sin. b \cdot \sin. c}}, \text{ in qua } A \text{ angulum ad polm, } b \text{ et } c \text{ alt. aequa-}$$

toris et s dimidium summae graduum datorum signat. Prodit $A = 15^\circ 18' = h. 1. 1'$.

Totum Tab. Rud. exemplum hoc est: Strabo libro XV. Geographiae Susia Persepolim numerat stadia 4200. Ut autem sciamus, quot stadia faciant hoc loco gradum circuli magis, notandum, quod idem auctor a promontorio Caramaniae anstrallissimo, quod fretum solum Persici constituit, ad portas Caspiae numeret 14100 stadia. Alt. poli illic est $25^\circ 30'$, hic $43^\circ 30'$, intersunt 18° sub eodem quasi meridiano, quia Strabo longitudinem Persidis ducit a sept. in austrum. Si 18° pateat 14400 stadiis, uni competeat 800 stadia, et si 800 stadia dant unum, 4200 dabunt $5^\circ 15'$: tot sunt gradus Susia Persepolim. Astrubus Kapleri prodit angulum $A = 5^\circ 20'$, b. e temp. $21'$. Ad problema, ex catalogo locorum intervallum eorum itinerarium computandi, haec offert Keplerus exempla: 1) Noribergae est alt. poli $49^\circ 26'$, Jaroslaviae Polon. $49^\circ 45'$; diff. alt. pol. est $0^\circ 19'$, diff. merid. $46'$. Via priori contraria dat mill. germ. communia $111\frac{1}{2}$, numerantur vero 130, itaque dudum huius loci additionem angere cogito. Quamquam viatorum religiosorum aliqui rogati affirmarunt, se communiter horum miliarium in Polonia septena in dies singulos conficere, est ubi octona et novena. 2) Dantisc alt. aeq. $35^\circ 37'$, Ursinburgi $34^\circ 15'$, merid. diff. $28'$. Calculus prodit $64\frac{1}{2}$ miliaria.

47) p. 300. Cognitis in \triangle SIP (Fig. 47) lateribus $SP = 67^\circ$, $IP = 56^\circ$ et angulo $SPI = 94^\circ$ (b. 6 $16' = 6\frac{1}{13}$, 15°), computatur latus SI formula:

$$\begin{aligned} \cos. SI &= \cos. 94^\circ \cdot \sin. 67^\circ \cdot \sin. 56^\circ + \cos. 67^\circ \cdot \cos. 56^\circ \\ &= \cos. 94^\circ \cdot \frac{1}{2} [\cos. (67^\circ - 56^\circ) - \cos. (67^\circ + 56^\circ)] + \frac{1}{2} [\cos. (67^\circ - 56^\circ) + \cos. (67^\circ + 56^\circ)] \\ &= \frac{1}{2} (\cos. 17^\circ - \cos. 117^\circ) (\cos. 94^\circ - 1) + \cos. 17^\circ \\ &= \frac{1}{2} (0.95630 + 0.48599) (-1.06976) + 0.95630 \\ &= -0.75454 + 0.95630 = 0.20176 = \cos. 78^\circ 21' \end{aligned}$$

Sic in posteriori exemplo prodit $\cos. SI = \cos. 61^\circ \cdot \sin. 125^\circ \cdot \sin. 69^\circ + \cos. 125^\circ \cdot \cos. 69^\circ$
 $SI = 80^\circ 30'$

48) p. 314. Confer cum his, quae Mazzilium scripsit Keplo ad theologi Hafneri sententia de Solis loco in medio mundi: Teum inventum atque Copernici hypothesi theologos nostros etiam nonnulli offendunt, auctoritate tamen Principis, cui principale schema dedicatum est (cfr. Vol. I, p. 74.), moti in medio relinquunt. D. D. Hafnerianus semel atque iterum (Iocose quidem, licet foci serie atiam intermixta videantur) me adortos et mecum disputaturum se esse testatus est, quam diu auctoritas Scripturae Sacrae esset perstitura. Idem hand ita pridem in publica vespertina concione, in explicatione cap. I. Genesios inter alia dixit: «Deum summum creatorem non suspendisse Solem in medio mundi, ut internam in medio atris».

49) p. 321. Hinc referenda sunt, ea, quae diximus in praefatione ad Vol. I. huius editionis de computatione radiorum globorum corporibus regularibus inscriptorum et circumscriptorum. Quae hoc loco de rationibus eorum radiorum dicit Keplerus, his illustretur.

Sit semidiameter orbis cubo circumscripti (R) = 1, erit illa cubo inscripti (r) = 0.57735, quare $R^3 : r^3 = 1 : 0.33333 = 1 : \frac{1}{3}$; in tetraëdro $R : r = 1 : \frac{1}{3}$; in dodecaëdro $R : r = 1 : 0.79465$

$$R^3 : r^3 = 1 : 0.63147; 0.63147 > \frac{2}{3} < \frac{3}{4}.$$

50) p. 327. Cfr. Vol. III. 219, 474 ss., ubi Tychoenis errorem Keplerus pluribus inquiri; item praef. ad hoc opus p. 7.

Horreocine recensitis parallaxis omnimodis, quas astronomi Soli tribuunt (Ptolemaeus: $2^\circ 51'$, Albategnius: $3'$, Copernicus: $2^\circ 55'$, Lansbergius: $2^\circ 13'$, Tycho $2^\circ 54'$, Longomontanus: $2^\circ 40'$), illeque refutatis, affirmat, parallaxis Solis esse $0^\circ 15'$ plus minus. De Kapleri parallaxi haec offert: Keplerus e spaciationibus harmonice aliisque argumentis probat, Solis parallaxis non excedere unum minutum. Ad harmonicas contempla-

tiones quod attinet, sunt eas pulchritudinis arbitrariae nec aequae omnibus arrident. Et fa-
teor, me in rationatione Kepleri probabilitatem nullam cernere; respicit enim Terrae unus
verum, non visum semidiametrum. Sed quare solius Terrae ratio habetur, reliqua planetæ
in hac speculatione preteritis? Annon hoc nobis ipsis adulari? Quare etiam in vera, non
in visa semidiametri quantitate pulchritudo hæc quaeritur? Contrarium plane in harmonica pla-
netarum motibus docet idem Keplerus. Longe igitur verisimilior harmonia, ipso Keplero
iudice, omnes omnium planetarum semidiametros visas inter se connectere, quem ego ostendi.
Ceteras Kepleri argumentationes probant, Solis parallaxin esse inobservabilem, pro me ergo
aptius militant. Quod veterum parallaxi trium minorum objicit, majorem hinc fieri Ter-
ram inferiorem Marte superiore, etiam in suam, minus scrupuli, parallaxin valet. Mihi igitur
potius, quam sibi, ex illo disputat.

51) p. 328. In his quas supersunt de «Hipparcho» (cfr. Vol. III, p. 530 ss.) nihil
hujus «demonstrationis» deprehendimus; contra in epistola ad Maestlinum, quem subjunxi-
mus Hipparchi fragmento (ibid. p. 678), similia his, quas hic dicit Keplerus, leguntur, item
in calce «Semini.» ubi ad hunc locum lectorem ablegat.

52) p. 329. Qua ratione hæc explicet Keplerus quaerenti Mülnero, invenies in præf.
nostra p. 74 ss., item Vol. V, p. 68 ss. Disputationem de his inter Keplerum et Remum,
quem paulo infra dicit Keplerus, præmissimus p. 64 s.

Præceptum 110. Tab. Rudolphinarum: „Semidiametros planetarum apparentes in-
dagare“ his incipit verbis: Res est lubrica. Nam visui naturali semper offeruntur corpo-
ra hæc lucida cum dilatatione luminis optica in oculis; instrumento vero dioptrico
adhibito, multis partibus agnoscuntur minores (adhibita sc. et ratiocinatione), et Satur-
nus nunquam major 30'' circiter. Docebo igitur computare, quid appareat per teles-
copium, nam illa ampliatio optica regulam non habet. Distantiæ planetarum (non a
Sole, sed) a Terra logarithmum aufer coassice a triente de log. distantiae ejusdem a
Sole longissimæ, quod relinquitur, ut logarithmus in „heptacosiae“ quesitum, ostendi-
mus in „sexagesimaria“ scrupula, quibus si deprimentur apices, ut valeant tantum par-
tem sexagesimam, formabitur semidiameter plantæ apparens quesita.

Exempla, quas subjungit Keplerus, sunt: 1) Sit elongatio ☿ a ☉ 180° et illa 80''
ab apello; intervalla 72847 et 98200; prodit semid. ☿ = 3' 33". 2) Martis anomaliam
est 0° 0' etc, prodit semidiameter ☿ 3' 15".

His addit: Pono autem in hujus præcepti fundamentis ex Epitome Astr., pla-
netarum omnium corpora esse in proportionibus snorum et Solis intervallorum, diametros
ergo in subtriplici (radice cubica). Judicium et censura sit penes eum, qui probabiliorum
proportionem ostenderit.

Ad hunc in Epitome probatum modum redit Keplerus in «Admonitione ad Astrono-
mos» excerpta ex Ephemeride anni 1631 (Francof. 1631), adhortans astronomos, ut soli-
cite observent Venere incursum sub discum Solis, quem illic prædixerat, ut argumenta sua
de proportionibus distantiarum et magnitudinum planetarum «vel roborentur vel discuti-
entur.»

53) p. 333. Fundamenta hujus tabellæ desumpsit Keplerus ex Maestlini Epitome, ubi
distantiæ planetarum a Sole minimæ et maximæ, relatæ ad «semidiametrum eccentrici
singulorum planetarum partium 60», hæc occurrunt:

«Minima altitudo a Terra» ☿: 28.30. ☿: 15.35. ☉: 57.30. ☿: 14.30. ♃: 45.45. ♄: 50. 5.
«Maxima altitudo a Terra» ♃: 91.30. ♄: 104.25. ☉: 62.30. ☿: 105.30. ♃: 74.15. ♄: 69.55.

Ex his numeris, qui in Venere tantum insigniter discrepant, sed manifesto lapsu ca-
lami, sic computat Keplerus eas distantias:

$28\frac{3}{4} : 91\frac{1}{4} = 65 : x ; x = 209$: Hinc «summo orbi Mercurii»
addit partem 1 «pro corporibus Mercurii et Venere» et pro Venere computat:

$$15\frac{3}{4} : 104\frac{1}{4} = 210 : x ; x = 1407 \text{ etc.}$$

In Saturni distantia vero mutavit Keplerus 50. 5 in 49. 48 et 69. 55 in 70. 12.
Quotientem 25737 elicies ex his numeris, natus certata divisione.

54) p. 336. «Rationes,» quibus innixus Keplerus motum Solis circa axem vel «ci-
clum trimestri spatio,» vel «triduo circiter,» vel ano die adstruere conatur, inest Comment.
Martis rap. 34. (vol. III, p. 306). Respicit ad has rationes in libro contra Roeslinum,
eodem anno, quo Comm. Martis, edito (vol. I, p. 508), et in Tertio Interveniente, post eno-
num ab editis Comm. Martis (ib. p. 590), illic Solis motum comparare aquarum turbul.,

per totum mundum diffuso, hic cum motu globi in rota figuli. Ceterum hanc opinionem longe ante editum librum de Marte pronuntiaverat in libro de Stella Nova (II. p. 673) et in literis ad Fabricium datis anno 1607 (vol. III. p. 108).

$$\begin{array}{l}
 55) \text{ p. 351. Si } SD:SK = SK:SA = SA:SL, \text{ erit } SD:SL = SD^2:SK^2 \text{ et} \\
 \quad SD:SA = SD^2:SK^2 \\
 \quad SD^3:SK^3 = SD^2:SA^2 \\
 \quad SD:SL = SD^2:SA^2
 \end{array}$$

56) p. 352. Hypothesis de mundo, quam hodie dicunt Aegyptiacam, passim in libris auctorum veterum, ut Ciceronis Somnio Scipionis, Vitruvii Architectura, in Plinii, Macrobi et Plutarchi libris memoratur. Mart. Capellam dicit Keplerus in Apologia Tychonis contra Ursam (cfr. vol. I. p. 270. 287). Joannem Campanum Novariensem (c. med. seculi XI., secundum alios seculo XIII.) scripsisse dicunt librus de quadratura circuli, de sphaera, theorias planetarum etc., in quorum uno vel altero hanc, quam dicit Keplerus, sententiam exhibuisse enim verisimile est. Geometriae vero Euclidis studiosius Campani nomen pervigatum est versione et commentario Elementorum Euclidis.

57) p. 357. «Media mensura» h. e. medium geometricum inter 225 et 687, est 393, quare similitudinem tantum rei, non rem ipsam dicit Keplerus. Compara cum his, quae Keplerus in editione secunda Prodomi similia affert (Vol. I. p. 176.).

58) p. 368. Quia ratiouis Keplerus hanc Lunae theoriā perfecterit, studia ejus ex parte quidem ostendit, quae vol. III. p. 655 ss. exhibuimus.

In literis ad Crügerum datis (v. s. p. 43 ss.) eandem theoriā explicat, ibique monet, quaestionem «Si appendix ista» etc. fol. 366 cum responsione referendam esse ad finem partis secundae hujus libri.

Horrocius in literis ad Guillelmum Cserbrium d. 12. Aug. 1637. scriptis haec et priora spectans dicit: Quod diximus, physicam temporis aequationem in Luna mihi non videri necessariam, quia compensatam, quoniam tu petis, ut clarius explicem, sic habet. Lunae motus (aequalem intellige) est ad Terrae revolutionem ut $13^{\circ} 10' 35''$ ad 360° , adeo ut Luna moveatur $13^{\circ} 10' 35''$ unius diei spatio. Jam vero, quoniam Luna motum a Terrae motu accipit (vide Kepleri Astr. Cop. p. 545, 553 [357, 360.]), in aestate igitur, quando Terra plus temporis in una revolutione absolvit, quam diem naturalem, Luna similiter tanto plus temporis absolvit, quam diem naturalem in transigendis $13^{\circ} 10' 35''$. Quo concessio aequatio illa physica compensabitur in tarditate et celeritate motus Lunae. Nam v. g. in aphelio Terrae, quando haec aequatio nulla est, verum et apprensus tempus idem est. Sed quum Terra est in media distantia (quod fit post dies quasi 90 apparentes), aequale tempus ab aphelio est d. 90. h. 0. 21' 40" adeoque, si Terrae tardior revolutio non retardaret Lunae motum, esset Lunae motus medius sexag. 1. $46^{\circ} 4' 26''$, quae responderet aequali tempori d. 90. h. 0. 21' 40". Sed quoniam etiam Lunae motus sicut Terrae tanto tardior est, quanto est ea physica aequatio (quae nihil est quam remissio revolutivis Terrae), hoc est $0^{\circ} 11' 54''$, quae respondet temporis b. 0. 21' 40": ergo aequalis Lunae motus erit eo tempore sexag. 1. $45^{\circ} 52' 32''$, qui respondet diebus 90, quod est tempus apprensus. Adeoque, quanquam tempus app. d. 90 sit ceteris paribus aequali tempore longius 21' 40", Lunae tamen motus eodem tempore aequali major non est, quam foret d. 90, quia tantundem praecise tardior est, quantum illis 21' 40" respondet. Variationem maxime prosthaphaereseos Lunae, prout Terra in aphelio fuerit vel perihelio, non aliter tueor, quam ut conjecturam, ejus certum aliquod fundamentum non habeo. Nam si Terra totam suam virtutem attractivam et repulsivam a Sole acciperet, esset tamen ea differentia minor quam 1', quae observationem fugeret.

.... Impendi etiam nonnulli temporis in excogitando causam physicam, cur planetae ovali forma moveantur. Hujus causam Keplerus conjicit in fibras magneticas; verum ego contra hanc philosophiam non leves objectiones habeo, ipseque Keplerus fateatur, non posse se sibi nequequam satisfacere. Videor autem mihi in causam ejus physicam lucidius posseque id exemplo motuum naturalium apud nos illustrari, quae res Kepleri desideratissima solet esse idque merito. Quippe natum est in toto mundo unum, ipsaque rerum creaturarum harmonia poscit, ut res minores essent majorum specimina, sicut et Lunae circa Terram motus est quasi emblemata seu imitatio motuum planetarum primariorum circa Solem. Verum hac de re plura posthac dicentur, ubi cogitata mea in meliorem formam redegero, quae adhuc immatura sunt. (In literis d. 25. Julii 1638 comparat Horrocius motum planetarum penduli motui, quod filo appensum manum, quae moveatur in circulum, sustineatur. Punctum penduli grave repraesentare planetam, manum motam Solis revolutionem circa axem.)

59) p. 397. Spectat his Keplerus causam matris forensam, quia motus in Württembergiam profectus est mense Augusto anni 1620 («cum 24. Julii Bavarus [dux Maximilianus] occupasset Linclum, ipsa 5. Augusti in custodiam data et plane ad torturam postulata») ibique, maxima ex parte matris causam gerens, morabatur usque in Novembrem anni 1621, interim vero per parvum temporis spatium Linclum revertit et inde Frankfurtum nitit, ut typo Epitomes prospiceret.

60) p. 409. Haec magis perspicua fient hac ratione: Ex constructione apparet, esse $BP : PF = BA : AP - AH$; hinc $BP : BP - PF = BA : BA + AH - AP$ vel $BP : BF = BA : AH - BP$. Deinde quia triangula GBF et ARC sunt similia, erit $GB : BF = BA : BC$. Et quia $BP = GB$, erit $AH - BP = BC$. Sed $CG = BG + BC$ vel $BC = CG - BG = CG - BP$, quare $AH = CG$. In $\triangle ACG$ et AFG ad C et F rectangulis est $AG^2 = CG^2 + AC^2 = GF^2 + AF^2$. Subtractis utrinque aequalibus $CG^2 = AH^2$, restat $AC^2 = GF^2 + AF^2 - AH^2 = HH^2 = HHK (= HZ \cdot GH)$.

61) p. 414. Quia hic Keplerus de Fabricio affert, leguntur introductione nostra ad Comment. Martis vol. III. p. 75 ss. Explicat haec Keplerus Crügero supra p. 41.

62) p. 416. Wih. Schikardus haec dedit. Keplero: Subit et illud montem, quacositum abe te aliquando fuisse, an Arabum aut e graeco *apsis* fieri poterit? Tunc non inveniebam depravationis modum, at jam videor assecutus esse, si nempe pro *aps*, *aps* acceptum fuerit, unum punctum, crassius aut divaricans calamo impressum, pro duobus habitum, quo solo numero *q* a *p* in Arabicis differt: itaque rectissime te divisasse, quod *x* pro *ps* lectum, in eo saltem falsum et tecum me deceptum, quod communis aliqua fualis utrumque praestare quiverit. (Ex epistola d. anno 1624, ergo post editam Epitomen.)

63) p. 419. Folio 409. (vel annot. 60.) demonstratum est, esse $BP : BL = AB : AP - AU = AB : AC - BP$, quare $BP \times (AC - BP) = BL \times AB$, vel, positis $BP = r$, $BL = \cos. KP$, at AB (eccentricitate) = $e : r (AC - r) = e \cdot \cos. KP$. Hinc
$$AC - r = \frac{e \cdot \cos. KP}{r}$$

$$AC = \frac{e \cdot \cos. KP}{r} + r$$

In exemplo, quod Keplerus proponit, dantur $e = 0,09265$, $KP = 46^\circ 18' 51''$, $r = 1$, quare $AC = 0,09265 \times \cos. 46^\circ 18' 51'' + 1 = 1,06399$. Keplerus dicit *e. cos. KP* «libratiouem», $e \cdot \cos. KP + r$ est «distantia planetae a Sole» (radius vector).

Ut modus, quo Keplerus procedit, melius intelligatur, haec praemissis addimus: OH = AO - AH = AC - AE; quia EI minor diameter ellipsoe est ejusque focus alter A, erit AE = BP, quare OH = AC - BP = AC - r.

Hic primum nititur Keplerus logarithmis Neperianis. Neperi «Canon mirificus» prodidit aliquot annis ante editam primam partem Epitomes, anno scilicet 1614, illiusque usum Keplerus Remo (1619. v. s. p. 61.) at Mestlino (1620. cfr. vol. III. 676.) explicaverat. Cum vero utriusque viri dubia de usu logarithmorum cognosceret et hinc facile concludere posset, alios minus in mathematicis versatos multo minus hoc compendium calculi suum in usus versuros esse, melius prospectum his habuit, et usitata via procederet. Jam vero, post exactum septennium a prima editione logarithmorum, non amplius debuit, calculos suos, omnia demonstratione, per logarithmos lectoribus proponere. (Plura de tabulis logarithmicis vide infra ad annot. 67.)

64) p. 419. Haec nomina explicat Keplerus in Tab. Rudolphinarum capite XX, quo agit de tabulis *prosthaphaereseon* et de ratione *exceedendi* ex iis motus anomaliae vel etiam *aequationes eccentrici*. Illis autem haec praemittit:

Cum in praefatione dixerim, abjectos esse a me circulos et orbes eorumque loco introductas causas physicas: nonnulla, quae ad explicationem hujus rei pertinent, descriptioni tabularum aequationum censui praemittenda, ne plane coecus sit calculus, etsi copiose satis egi de hypothesebus illis in Epitome Astronomiae Copernicanae. Serviet autem orationi nostrae schema illud, quod in frontispicio hujus libri prae se fert Geometriae imago.

Primum ergo docebo geometriam hanc exercere circino et regula, postea ad auctorum variantes opiniones abjectas meamque substitutam transibo.

celeriores, quam in oppositis. Statuendum itaque fuit, circulos eorum aliud habere centrum, ut si S sit mundi centrum, C vero eccentrici. Tunc ope geometriae ex modulo tarditatis apparentis indagata fuit quantitas lineae CS, retento scilicet motu planetae per se aequabilissimo, tam in A apogaeo, quam in P perigaeo, et omni culpa retardationis in deceptionem visus et elongationem puncti A ab S collata, accelerationis in appropinquationem puncti P. Duravit haec hypothesis in motibus Solis salvandis apud ceteros ad nostra usque tempora, in planetis vero jam dudum ipse etiam Ptolemaeus ab aequabilitate motus descivit. Animadvertit enim, si ex celeritate et tarditate apparenti quantitatem lineae CS constitueret, non respondere magnitudines apparentes epicyclorum, quos circumfert eccentricus, centris suis apprehensos: hi enim dimidium saltem efficiebant ejus, quod tempora. Ut si, consultis magnitudinibus epicyclorum apparentibus, eliceretur eccentricitas SC, prolixitas temporis, quo morabantur il in semicirculo superiore, collata ad breviterem in inferiore, efficiebat eccentricitatem plane daplam SQ. Hac repugnancia motus Ptolemaeus retinuit quidem centra epicyclorum in perfecto circulo eccentrico, eccentricitatis simplicis SC, sed motum hujus eccentrici totius dixit regularem esse circa non suum centrum C, sed circa alienum Q, quod aequali spatio cum centro mundi S recederet a centro C in partes oppositas. Itaque planeta (seu ejus epicyclo) per A incedente, totus eccentricus omnibus sui partibus incedebat lente; illo in P descendente, iste rursus totus omnibus sui partibus velocissimus fiebat.

Atqui facinus indignum Copernico visum est, tantum probum in purissimam substantiam inque motores naturae simplicissimae conjicere. Cum ergo didicisset ex Ptolemaeo, eccentrico simplici paria facere concentricum cum epicyclo illius circumferentiae affixo, motum aequalium et constantium in plagas contrarias: jam etiam Ptolemaicum hunc eccentricum, motus inconstantis, dissolvit in unum concentricum et duos epicyclos, ut major minorem gestaret, sicut utrumque gestabat concentricus; minor etiam duplo celerior esset majore, constanti motu uterque. Sic probum illud Copernicus a circulis quidem sustulit, in planetas vero ipsos probum, si ita libet, conjecit aliud. Nam Ptolemaeus quidem iter planetarii epicycli centro reliquit ordinatum in circulo, Copernicus vero iter planetae ipsius per tot circulos in multis flexus distorquet. Effectum igitur Ptolemaicum non praestat, ab observatis recedit multo magis. Tycho, quod has particulares attinet hypotheses, in Copernici sententia, dum Linae vias panderet, mansit, quid in planetis ceteris facturus esset, immaturo obitu reliquit incertum. De Solis quidem eccentrico simplici, cum videret, illum non tolerari ab observationibus planetarum ceterorum, desciscere ultimis temporibus coepit eumque parum ceteris planetis concessit, quacunque ea res explicanda esset hypothese.

Apparet jam, quos circulos, quos orbes introduxerit quisque, quos quidem successores Arabes exque iis Gerhardus Cremonensis, ex isto Purbachius; etiam materia vestierunt aut infererunt, sua cuique spissitudine, ut appellant, assignata, puto revolventes illos Aristotelis et hujus in comminiscendis orbitis audaciam imitatos esse.

Restat igitur, ut de meis hypothesis (particularibus) harum Tabb. agam. Retineo ergo redditum planetae in eadem vestigia, sed nego, id fieri per vegetationem in aliquo perfecto circulo. Quemadmodum enim concentricitatem orbitae veteres, aequabilitatem motus Ptolemaeus, sic ego cum utrumque illorum, tum vero maxime figuram motus circularem Ptolemaicum rejicio. Nam (ut ea pandam, quae ex observationibus in planeta Marte habitis demonstrata sunt) etsi planeta iter suum incipit ab A pervenitque in P, non tamen transit per puncta G,B,K, sed flectit introrsum, descendens per F,H,L, vestigia ellipseos: quod idem etiam in ascensu fit per semicirculum alterum. Cum igitur Ptolemaei circulus perfectus AGP locum non habeat, Copernici flexuosus multo minus tolerabitur, ut qui e contrario planetam ab S ultra B,G,K passim emovet, motum ejus compositum praestat buccis deformem. Si queras, an non etiam per compositionem aliquam circulorum confici possit orbita planetae elliptica? Omnino, inquam, qui hoc tentaret, fuit, dum in vivis fuit, Davides Fabricius, mathematicus Frisius, remque quadamtenus est assecutus, apparatus usus Ptolemaico, motu scilicet,

circelli alicujus regulari circa alienum centrum, h. e. re vera inaequali, nec ejus simplicis, sed ex duobus compositi, qui centrum cecentrici C libarent in diametro transversa, quae esset ipsi GC parallela. Ego vero nihil opus esse puto anahagibus hisce ἀνατολογισμοῖς, quae crucem figunt ingenuis, caecitatem imperant oculis rationis: cum causae naturales, quibus ex orbita planetarum fiat ellipsis, in apertum prolatae sint, Sol, planetam logibus vectis et statera pro ratione intervalli in gyrum torquens rotatione corporis sui circum axem, et cum eo etiam speciei laeuentis per totum orbis amplitudinem diffusae, et dispositio magnetica in corpore planetae, cujus ceu remi contentione per totum ambitum mutatur planetae et Solis intervallum. Sed sufficiat digitum intendisse, reliqua petat curiosus lector ex Commentariis Martis exque Epitoma Astronomiae.

Sic igitur ego rejeci circulos et orbis a conformatione naturali orbitae planetariae, ut tamen ad eam describendam in tabula adque moderandum calculum adhibeam perfectum circulum eccentricum ABGKP, in cujus circumferentia planeta nunquam invenitur, praeterquam in A puncto aphelio, i. e. ab S Sole remotissimo, ejusque opposito P perihelio. Sic rejicio epicyclum aequipollentem eccentrico, non tamen ei aequalem circulum QDMNS ex centro eccentrici C describam, in cujus diametro a perpendicularibus divisa expendam augmenta diminutionesque intervalli planetae et Solis. Quin etiam Q punctum aequatorum Ptolemaicum rejicio, non tantum ideo, quia nihil opus est intensioe et remissione motus integrorum circulorum vel solidorum orbium, sed etiam propterea, quia punctum Q, sic immobile retentum, ut est apud Ptolemaeum, non ex toto praestat angulos ASF observationibus consentaneos. Rejicio, inquam, angulos circa Q, quos Ptolemaeus amplectitur, sed substituo areas triangularum CFS, seu earum vicarias CBS, quae vim intervallorum SF sunt complexae in dictorum angulorum conformatione; substituo et lineas ex Q et S, quibus vera et genuina planetae orbita elliptica (quippe veris ejusque temporis intervallis) describi potest. Quae vero partes tabularum aequationum ex bis circulis vicariis eorumque lineis, angulis, arcibus derivantur, jam porro dicam.

Cujusque planetae tabula aequationum sex explicatur columnis, quarum binae in sex planetis singulas occupant papiri facies, in Luna ternae. Columnae subdividuntur in columellas ternas, et unum intercolumnium inter duas sive istimas fuserunt: in prima barum insunt arcus AB, AG, AK, cum arcibus triangularum CBS, quae sunt binae partes arearum ABS, vim complexarum intervallorum arcus AF et Solis S. Trajecto intercol. sequitur columella secunda, in qua sunt anguli ASF etc. respondentes arcibus AB etc. In tertiis denique ad dextram condita sunt intervalla SF etc. ad eodem arcus pertinentia. Modi has res computandi jam initio sunt explicati, exempla petantur ex Epitoma Astronomiae.

Notabit astronomiae studiosus, in tabulis hisce tria nuncupari genera anomaliarum: mediam, eccentrici et coaequantam. Ex iis, quae mediae anomaliae dicuntur, cae non sunt quantitate mediae, sed habent hoc nomen ex astronomia veteri, ubi *medium* sonat idem quod aequabile, quippe etiam hic in nostra forma per nequales partes temporis semper aequales etiam partes anomaliae mediae collectae intelliguntur. At ratione quantitatis quando comparantur tres anomaliae sibi invicem respondentes in eadem linea transversa, tunc ea, quae eccentrici anomaliam dicitur, semper obtinet medium inter eam, quae media, et eam quae coaequata dicitur. Nos igitur, dimissa quantitate, mediae anomaliae voce utimur ex more astronomiae veteris pro motu anomaliae medio, id est aequabili.

Sic etiam vox coaequata non est idem, quod aequabilis reddita, sed e contrario sonat idem, quod aequatione affectum eaque affectione ex aequabili inaequabile, h. e. excedens vel deficiens redditum. Graeci ἀρεθόμενον, accuratum, appellant.

65) p. 420. Trianguli „maximi“ ADB area = $\frac{1}{2}$ AB · BD = $\frac{1}{2}$ e = 0,046325. Circuli PDRT area = 3,1416; 360° = 1296000°, quare 3,1416 : 1296000 = 0,016325 : x; x = 19110°.

$$\begin{aligned} \text{Jam sit } KP &= 46^{\circ} 18' 51'' . \triangle AKB = \frac{1}{2} AB . KL \text{ vel} \\ &= 19110 \text{ s. sin. } 46^{\circ} 18' 51'' \\ &= 13819'' = 3^{\circ} 50' 19'' \\ \text{Sector } KBP &= 46^{\circ} 18' 51'' \\ \text{Sector } KPA &= 50^{\circ} 9' 10'' \text{ (anomalía medía.)} \end{aligned}$$

66) p. 422. Si anomalía eccentrici $x = 47^{\circ} 42' 20''$, erit ex praemisissis

$$\begin{aligned} OH &= \cos. 47^{\circ} 42' 20'' . 0.09265 = 0.062348 \\ \text{Radius vector } AC &= 1.062348 \\ LA &= e + \cos. x = 0.76559 \\ LA &= 0.76559 \\ \cos. CAL &= \frac{CA}{LA} = \frac{1.062348}{0.76559} = \cos. 43^{\circ} 53' 30'' . \text{ (Keplera prodeunt} \\ 54' 12'', \text{ quia ponit } \cos. x &= 0.67277 \text{ pro } 0.67294.) \end{aligned}$$

67) p. 426. Verba «Antilogarithmus» et «Mesologarithmus» Keplerus in Tab. Rud. sic explicat: Breviter indicandum est calculatori, quod aliis in libris docetur prolixius, logarithmum esse numerum formae, non logistico cum titulis seu apicibus, sed simplicis et vulgaris, quo indicatur proportio, quam habet sinus cujusque arcus circuli ad sinum totum seu semidiametrum, antilogarithmum vero exprimere proportionem sinus complementi cujusque arcus, quem Gunterus Anglicus Co-Sinus appellat.

Nomen antilogarithmi desumptum est ex novissima ordinatione canonis sinuum, a G. J. Rheticus, Valentino Othone in Opere Palatino, ab Adriano Romano, Christophoro Clavio, Lonspergio, Pitiseo aliisque usurpata, in qua nunc in conspectum veniunt arcsus quisque et complementum ejus ad quadrantem, ille quidem in fronte et margine sinistro, iste vero in calce et margine dextro. Quia ratione fit, ut in eadem linea exhibeantur sinus arcus ad sinistram et sinus complementi ad dextram, id quod plurimas hactenus commoditates praestitit in computationibus geometricis.

Haec ordinatio canonis faciem praetulit Joanni Nepero, Baroni Mercbistonio, logarithmorum inventori, ut videret, tribus logarithmis in quaque linea 6 omnino canonis numerorum vices obiri posse. Posito enim logarithmo arcus ad sinistram, logarithmo complementi e regione ad dextram, primum idem logarithmi, privativo signo induti, proportionem expriment etiam secantem, quos habent arcus contrapositi, deinde subtractione facta duorum logarithmorum ejusdem lineae, minoris a majori, differentia cum signo positivo proportionem exhibet tangentis arcus sinistri, cum signo privativo, tangentis arcus dextri. Hac de causa Neperus et post eum Ursinus huic medio numero nomen *differentialis* indiderunt. Mihi vocem istam cum *mesologarithmi* voce permutare placuit, ut quae vel prima literis rem suam citra ambiguitatem significat; logarithmo vero, qui est in alterutro latere e regione cujusque arcus scrupulorum, *antilogarithmi* nomen dedi, quippe *contra positi*: ut sic logarithmus unusquislibet arcus cujusque sit idem et antilogarithmus arcus contrapositi, qui cum illo implet quadrantem.

Haec ordinatio logarithmorum legitima est et naturalis in libris geometricis doctorum aeternorum, quam in his nequaquam temerandam aut cum alia permutandam censeo. —

68) p. 429. Euclidis Optica et Catoptrica, graece edita eademque latine reddita per J. Penam, Regium mathematicum, Parisiis 1557, graecum textum hunc habet. Prop. 57: τὸν ὀφθαλμὸν παρασπονέοντα, τὰ κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν κατὰκτεταθῆναι δολεῖ; prop. 58: τὰ ἀνταρροπύρα τὸν μὲν ὀφθαλμὸν ἵππων δυνάμει τὸν ὀφθαλμὸν παρασπονέοντα. Versio Penae haec est: prop. 57: oculo calester motu res spectatae procul posita relinquit videntur; prop. 58: magnitudines auctae propius ad oculum accedere existimantur.

In Editione Euclidis operum Basilensis (1558) haec propositiones sic vertuntur: «oculo translato, quae longius spectantur, destitui videntur. Auctae magnitudines propius oculo produci putantur.» Quare videtur Campani editio, quam non ad nos habemus, similem his versionem habere.

69) p. 432. Archimedes in Rhello de Arenas numero regem Gelonem allocutus dicit: Optime nesci, mandam a plerisque astrologis vocari sphaeram, cujus quidem centrum idem est atque Terrae. Haec atque refellens Aristarchus Samius in positionibus edidit,

quas adversus astrologos scripsit, ex quibus colligitur, mundum eo, quem modo diximus, multo majorem esse. Ponit enim, inerrantes quidem stellas Solemque ipsam immobiles manere; Terram vero circumferri per ambitum circuli circa Solem, qui est in medio curriculo situs; denique sphaeram inerrantium stellarum, cujus idem est etque Solis centrum, magnitudine ejusmodi esse, ut circulus, per quem ponit Terram circumferri, eam habeat rationem ad distantiam inerrantium stellarum, quam sphaerae centrum habet ad ejus superficiem.

70) p. 433. Appendicem hanc Keplerum addidisse editioni Progymnasmatum partis I, itidem curante Keplero typis excusae anno 1602, diximus vol. I. p. 191. Ipsamque hujus rei testem produximus vol. III. p. 495. Appendix haec igitur cum sit Kepleri operibus adnumeranda, inserenda diximus ea, quas Keplerus, haerendum loco locutus, in hac appendice dicit: Postulare videtur candor noster, lector benevole, ut paucula de hoc Prog. I. Tomo admoneamus, quae et ad tuam notitiam, et ad officium nostrum pertinere arbitramur. Etenim certiores te facimus, etsi passim ex ipsa lectione appareat, scriptum esse hunc librum inter annum 1582 et 1592, subinde tamen aliquid fuisse additum, paginas aliquas recusas, adeo ut videri possit parens noster potissimum illius temporis partem, ex quo nova stella, praecipua hujus libri materia, illuxit neque ad extremam vitae diem, praeterquam quod alia sub manibus habuit, hujus quoque libri scriptioe transgisse. Quod alii aliter fortasse, nos ita interpretamur, ut ex eo et summum in ipso veritatis amorem et vim quandam fati agnoscamus, quorum ille palam, haec secreto tantarum morarum causa fuerit. Et de priori quidem initio dicemus, de altero in fine. Cum enim in hac coelesti machina inexhaustas quidam sapientiae divinae thesaurus lateat absconditus ac in eo erundo nunquam cessarint illius curae: factum est, ut inter conscribendum et excidendum hunc librum subinde alia atque alia, partim plane nova, partim a prioribus paulo diversa invenirentur inque licem proferrentur, quae ipsa quoque comprehendenda eodem volumine censuit, ne vel delusisse lectorem vel eidem quippiam invidiasse videretur. Ita factum, ut cum a. 1572. observationes stellae coepisset consignare et a. 1573. libellum de hac in publicum emisisset, non tamen sibi satisfecit ipse, quin hanc laborem post aliquot annos resumeret, postquam jam et sedem astronomiae constitueret et instrumenta exquisitissima restituenda Solis motui fixarumque locis comparasset. Ominino enim hisce fundaments uti statuerat ad tanti aedificii structuram, tanti se. miraculi solidam explicationem. Ubi jam liber pene esset excusus, quia interea ad 800 fixas instrumentis suis ceperat et calculo triangulorum sua illis loca assignarat, iis quoque universis (cum paucae ad institutum sufficere potuissent) hoc opus exornare statuit; itaque cum spatium illic reliquisset duos quaterniones, duplum postea fecit, sic ut singulae litterae *KK*, *LL* singulas haberent octerniones (folia 257—272 singula nos tantum numero signata sunt). Nec dubitamus, quia millenarium interea complevit, reliquis quoque 200 (maxima ex parte informes) adjectarum fuisse, si vixisset; quod nobis hac vice, ne exemplaria inter se discrepant, omittendum esse putavimus. Et in genere moles ipsa et amplitudo materiae coegit ipsam (si modo vellet ut operae typographicae una procederent), quatuor initiis progredi interque ea alphabeta dividere. Eorum primum est cap. I. secundum cap. II, tertium in parte altera libri, quartum in parte tertia. Hinc factum, ut quamvis initio non statneret hoc libro de Luna ex professo agere, tamen, cum absoluta restitutione Solis superessent in alphabeto paginae aliquot intereaque in Luna succederent operae, visa illi est praeclara res, Soli sororem Lunam adungere atque ut spatium esset sat amplum, ex quaternionibus *P*, *Q*, *R* singuli octerniones sunt facti, quaternio annis insuper additus atque ordo cyphrarum per *P* et *Q* interruptus.

Quare lector sequae, si fol. 245, 460, 474, 475 aut alibi non nundiquaque summum contentum fortasse repereris cum cap. II. parte altera, ubi de Lunaris curricula restitutione ex professo agitur (quamvis nobis de discordia aliqua non constet), memineris, haec posterius elaborata et perfectiora, illa alio libri proposito, priori tempore, obiter et perfunctorie dicta esse. nec oportuisse propter unum et alterum verbum non ita magni momenti totam paginam, in plurima exemplaria multiplicatam, tollere, cum tribus verbis ad calcem ea de re moneri lector possit; quod utique fecisset parens noster, si supervixisset, nos jam ipsis loco facimus.

Sed ut praeteramus ista, reliquit ille nobis impressa omnia a primo capite usque ad conclusionem, exceptis Lunaribus; quam pragmatiam non semel de novo a primis repetitam principium tandem a. 1600 et 1601 sic plane, uti jam prodit, absolvit, plurima usus opera Christiani Severini Longomontani, viri ingeniosus et perquam industrius, qui astronomiam Braheanam Uraniburgi et in convictu ipsius per 10 prope continuos annos hausit, cuius honorificam mentionem, quod parens proposuerat, nos merito facimus. Jamque in eo erat, uti reviderentur ista postremum et denique liber, tot jam annos detentus, in lucem prodiret, jamque et figurae excuscriptae erant: cum ecce immatura et inextrema morte praeventus opus posthumum reliquit. Nos tamen omnia, uti erant, bona fide typis mandavimus: illa nempe, quae cap. I. praecedunt, eodem ordine, uti in exemplari primario disposita et manuscripta erant; Lunarium paginas 28; conclusionem denique, qualem in scriñis invenimus. (cfr. vol. III. p. 35.) Scripserat illam a. 1592, hinc in ea 5 solummodo cometarum observatorum meminit, cum posterioribus annis 2 accesserint. Nec dubitamus, quin et hanc revisurus omniaque severiori lima politurus fuisset, si vitam huc usque traxisset; nobis, eo mortuo, religio fuit quicquam vel minimum mutare. Quae causa etiam fuit, cur figuram eclipsos a. 1601. paulo post mortem ipsius visae, nihil mutaverimus, licet aliquantula sese insinavit discrepantia. De qua hoc monendum videtur: non latitudinem Lunae, non parallaxes, non quicquam ex praecipuis illi calculo defuisse, quo minus in quantitate cum coelo exactissime consentiret, sed, solas luminarium diametros in causa versari, quas quo minus expedite metiri possimus, diversae causae opticae in utroque luminari prohibent. Quodsi Lunae diametrum assumas $30\frac{1}{2}$, Solis $31'$, de quo postea, quantitas concordabit, ceteris omnibus manentibus. Haec itaque figura, ut dictum, a nobis relicta fuit, uti erat a parente nostro adornata. Illud tamen nobis summissum, quod ipsum fieri voluisse sciebamus, ut quia liber prolixus est et varias variorum opiniones examinat, indicem rerum et personarum inculentem conscriberemus, quam nostram operam, lector, boni consules.

Sed et aliud est, quod praeterire non possumus intactum: planetas inaequalitatibus suis simplicem Solis respicere motum cum veteribus artificibus asserit. Atqui postmodum (ut supra dictum) Lunares enans motus apprehendit, ut apparet, Lunam inaequalitate mensura ad verum motum Solis alligari, contra quam opinati sunt antecessores. Idque etiam in Marte interea deprehensum est, ut de ceteris nihil dubitetur. Atque haec causa est tantarum morarum in planetis ceteris, dum omnia de novo sunt revidenda. Quare cave lector, ne ex illa pagina (36) sinistram opinionem concipias, quae tibi impedimento sit in planetis ceteris.

Denique prioribus temporibus in eccentricitate Solis quaerenda usus erat ea forma demonstrationis, quam ex Hipparcho et Ptolemaeo nonnihil variatam docuit Regiomontanus, in qua hoc supponitur, aequales arcus circuli Solis ab aequalibus mensurari temporibus. Qua ex suppositione eccentricitatem Solis elicit 3600 fere, qualium semidiameter est 100000. Atqui ex observationibus in Marte habitis certa et exquisita demonstrationis methodo apogaeum quidem Solis idem, eccentricitas vero non major 1800, dimidium se. superioris elicitur; reliquum igitur dimidium sequenti cedet, ut fit apud Ptolemaeum in tribus superioribus. Ita hoc quoque novum contra antecessores erit sequendum, ut Sol, si Ptolemaicam hie suppositionem imitemur, aequalibus temporibus inaequales arcus conficiat suae orbitae, vel si Copernicanam hoc loco formam cum parente sequi malimus, circello aequatorio, cujus centrum in epicyclo vertitur, circumferatur. De quo negotio cum interrogaretur, an mentionem aliquam in Progymnasmatibus facere vellet: cum, inquit, quantitas hujus sequantis nondum exquisita constet, in praesens intermittam; nam hoc quidem negotium tarde procedit, ego vero propro, ut librum vel tandem aliquando edam. Atqui ex eo tempore de quantitate certi facti annus, quod sit sequantis, hoc est vetus illa eccentricitas praecise dupla ad novam hanc eccentricitatem. Nempe hoc illud est, quod tomo I. Epistolarum, fol. 209, et in Mechanicis fol. 4. innotat. Haec ideo monemus, ut illud commodè addamus: etsi paulo alia sequitur ordinatio theoriae Solis, aequationes tamen ejus uspiam $1\frac{1}{4}$ scrupulum variari. (cfr. vol. III. p. 297), ne, si quando de hoc

negotio uberius fueris edoctus, te hactenus vitioso calculo usum esse in Sole existimes. Notabis tamen hoc folio 98. et distantias Solis a Terra illie positas ex praesentibus aestimabis; et f. 471. variatio diametri Solis intra 1' mauet, ut in perigaeo non maior sit 31'; quod quidem negotium nequit observando nisi summa diligentia et peculiari ratione distingui. In variatione vero umbrae si tota coeli eccentricitas non 1' efficit, dimidia jam dimidio scrupulo minus aliquid efficiet. Itaque liber hic quidem per se consistere posset, etsi mentio hujus rei nulla fiat, nos tamen ob causas indicatas te celare volumus.

Ceterum, ut ad alteram orationis vestrae partem veniamus, eundem in portenti loco ponimus, quod parvus eo ipso tempore serio ad astronomiam atque fabricam instrumentorum accesserit, quo haec stella erat apparitura, de ea totos 29 annos scripserit, stellas fixas illi termino adaptaverit, quem paucis mensibus viveo superavit et his quidem jam mortem praesagiens, denique mortuus sit eo tempore, quo jam absolute opere de alla nova stella, parva quidem et vix tertiae magnitudinis, sed iterum in via lactea, quod „conclusioni“ operis eximie congruit (44° 13' circuli magni a loco prioris hoc libro descriptae remota, in 16° 18' = cum lat. 55° 30' s., declinatione 36° 49½', asc. recta 300° 45½', ut hic nostris instrumentis aliquoties observavimus), comparuisse fide dignis argumentis convulcitur.

Au non fuit quidam occultus ordo ipsum in scribendo tantisper impediverit et hoc fatale studiorum ejus curriculum quasi voce elata elamet, effectus hujus stellae propediem summiros initium, prudentioribus considerandum relinquimus. Certo si nihil aliud stella illa, magnum eundem astronomum significavit et progeniit.

Quam ultimo loco dicit Keplerus stellam novam, illa erat, quam in Cygno visam describit peculiari libello, quem vol. II. p. 780 ss. proponimus. Quae in „conclusiones“ Tycho de ortu stellae novae anni 1572 „probabilis verisimilitudine“ affert, leguntur vol. I. p. 652.

71) p. 433. Libro V. cap. 4. Harmoniae comparat Keplerus motus planetarum in aphelio et perihelio diurnos, producatque pro Tellure semitonium = $\frac{1}{12}$ et pro Venere diresia = $\frac{3}{8}$. Motus perihelii \odot est ad motum aphelium \odot ut 2 ad 9; haec ratio cum ratione motuum \odot conjuncta ($\frac{3}{8} \cdot \frac{1}{12}$) prodit $\frac{1}{32}$, et ratio $\frac{3}{32}$ commato. (29) minutum = $\frac{3}{32} : \frac{1}{32} = \frac{3}{1}$. Jam quotiens $\frac{3}{1} : \frac{1}{32} = \frac{96}{1}$ = $\frac{3}{1}$ rationem prodit motus perihelii Martis et motum Veneris; est vero motus perihelii \odot ad aphelium \odot = 3 : 5, quare „motus extremi“ Terrae (ad \odot , \odot et \odot motus redneti) = $\frac{3}{8} : \frac{3}{32} = \frac{32}{8} = 4$. Sunt vero „extremi motus“ uniuscujusque planetae in conversa ratione quadratorum distantiarum, ergo maxima distantia Terrae ad minimam ut $\sqrt{3125} : \sqrt{2916} = 55,86$ (56 „fero“) : 54. Hinc eccentricitas = 1, eaque ad mediam distantiam 1 redacta evadit = $\frac{1}{55} = 0,018$ „pauculo plus“.

72) p. 435. Ad hanc questionem de reductione temporis aequalis ad apparens vel aequandi temporis ob inaequalitatem dierum naturalium, jam libro III. p. 250 ss. institutam, redit Keplerus in Tab. Rud. cap. XV., historica quaedam immiscens de Tychoonis ratione et Longomontani deque aole in hac re studiis, quare totum hoc caput hic inserendum censuimus.

Summa, inquit, artis astronomicae reducitur huc, ut inaequalitate motuum apparentium ejusque causis in lucem prolatis, calculi leges ejusmodi concipiantur, ut, quod apparuit quovis tempore, id ex necessitate suppositionum sic apparuisse demonstraretur, quodve apparitum est, id ex eodem calculo praedicatur. Apparentium vero motuum inaequalitas percipi aestimative aliter nequit, nisi comparatione ejus, quod aequale (in mso. aequabile) est. Porro motuum aequalitas multiplicatione et applicatione mensurae aequabilis definitur; mensura motuum tempus est; temporis elementum postremum, nobis quidem terribilis cognitum, dies est, quae conficitur revolutione Solis ad eundem ejusque loci meridianum, unde digressus erat. Graeci $\pi\epsilon\rho\iota\sigma\sigma\epsilon\iota\varsigma$, quod ex nocte et die constet, latini astronomi *diem naturalem* cognominare consueverunt, ut eam ab alia notione vocis pro illa solum parte, quae Solem supra horizontem habet (in mso.: quae tota in terra transigitur), distinguerent. Etsi igitur inde ab exculta scientia ad Tychoem usque communio ista maxima fuit astronomorum omnium, decursum primi mobilis (quodcunque corporum id nomen mereretur) esse per omnes temporis sui partes aequabilissimum eoque proprie accommodum (in mso. „maxime

datum⁶⁴) ad expromendos motuum aequabilium modulos: tamen quod accederet aliquid revolutionis anni primi mobilis ad diem unam censendam, ad Solem sc. eodem redendum; pertinuit ad solertem astronomi diligentiam excutere, num qua inaequalitas compositi; quod dies est, ex additamentis istis particularum necessitate demonstratio- num resultaret et si qua inveniretur, eam complanare, ne mensura motuum inaequa- lum non esset non aequabilissima.

Post excussos penitus recessus artis sub Tychone Lunaeque motus ad exactius examen vocatos, coepit primum, Tychone ipso adhuc superstiti et appropinquantem, maxi- mum illud astronomorum axioma de aequalitate (aequabilitate) motus primi mobilis nonnihil labascere visumque id corpus, quod primum mobile repraesentat, una cum discessu Solis a centro Terrae nonnihil de celeritate suae revolutionis deperdere, cum accessu vicissim concitari; id tamen non tota revolutionis anni duratione ad hanc ac- cessus et recessus proportionem dispensata, sed exigua saltem ejus partem, perinde ac si Sol omnia sua propinquitate ad Terram per totum anni circuitum vim illam, quae primum motum conficit, ex particula 180^{ma} totius adjuvaret. Itaque Tycho, mo- nente (br S. Longimontano, qui tunc in hac ipsa re erat occupatus, causam unam aequalitatis temporis, necessitate demonstrationum introductam ab antecessoribus, rur- sum valere jussit in motibus Lunae supputandis, perinde quasi causa haec astrono- mica ab illa physica intensiore et remissione motuum exacte pensaretur; idque dictus Longimontanus in sua Astronomia Danica Theoreticorum I. citra exceptionem sequitur.

Cum autem in Progygn. tomo I. (in paginis sc. Lunaribus posterius insertis) res quidem ipsa proposita esset, diversa in Lunae quam in Solis motibus aequatio temporis, causa vero nec esset explicata et tecta insuper ipsa illa diversitate (quippe si causa physica est et in ipso primo mobili, aequaliter illam tam in Sole quam in Luna ob- servari oportebat); ex eo factum est, ut astronomi passim de violata demonstrationum certissimarum existimatione querelas facerent adque meum hic iudicium provocarent. Illis igitur ut gratificarer ansus sum id, quod dudum hoc super negotio meditatus eram, in Epit. Astr. libro III. et VI. et in prolegomenis Ephemeridum publice propo- nere quidque mihi de causis rei videretur, indicare. Et in re quidem ipsa successisse videbatur, in quantitate vero non leviter haesitabam, quippe cum pro 180^{ma} periodi, id est pro 2 diebus fere, qui, ut causa rei pateret, Solis auxilium virtuti erant trans- cribendi, offerrentur mihi potius dies 5¹/₄, appendices sc. ad dies anni 360, numero figurato et archetypico. Hinc adeo aequatio ista physica excrevit mihi ad 21' 40" unius horae, non pensans tantum id, quod Tycho abjecerat de astronomica et demon- strativa temporis aequatione, sed insuper etiam plus illo postulans in contrarium. Etai fateor ingenuè, modulum hunc dierum 5¹/₄, etiam alibi, ubi variationem ex eo deduxi, peccasse mihi excessu partis c. quartae (in mto.: quatae). Sive igitur pugnat verissi- militudo pro causa a me subjecta, ut simul quantitatem relinquat in dubio. Forte posterior dies consensum ejus cum quantitate Tychonica tandem detegit, id quod non semel baeconio mihi contigit et Longimontanus fanatum supra praetulit augurium.

Veruntamen cum, quo plures ex eo tempore eclipses Solis et Lunae examino, hoc magis rem dubiam deprehendam, quatenus ex tribus aequandi temporis ratio se- quenda sit: astronomica veterum, Tychonis empirica, an mea physica et causalis, cum nulla harum sit, quae non ab aliquibus eclipsibus confirmetur, a ceteris redarguatur, minimum tamen Tychonica; cum in dies magis atque magis sese proferat in locum motuum Solis, Lunae et primi mobilis circa minimu nonnulla scrupula multiplex et inpervestigabilis varietas, quae certissimam fidem facit, causas motuum esse physicas (ut incipiam suspectare concursus varios corporum planetariorum in unum locum); consilium ex re ipsa nascitur mihi, ut revertamur ad causas aequandi temporis mere astronomicas et certas, ut, sicut in doctrina deliquiorum Solis, et Lunae doceo com- parare quantitates et apparitiones eclipsium illas, quae conformantur a causa mere astro- nomicis, discernoque physicas et opticas specierum (diametrorum) ampliationes (sen- zas per aëris terrestres lunarisve involucra aetherisque circa corpus Solis splen- dore, sive deceptorias per ea, quae visibus humanis rationis instrumenti sensorii ac- cidunt), sic etiam in aequando tempore doceamus legibus mere astronomicis tale con- formare tempus apparens, ut eo, tanquam regulari, postea ad apparitiones quotidianas

applicato et comparato, certum constitnere possimus, quidnam insuper extra ordinem astronomicum quovis tempore effecerint causae physicae. Nam si quid in his deprehensum est longa observatione, quod ad regulam sese certam et perpetuam aut saltem per potiora exempla propius accommodat, de eo in fine praeceptionum astronomicarum rectius docebitur calculator.

Libertas tamen haec relinquenda fuit astronomis, ut, quia in Tychonis fundo aedifico, vel igitur Tychonica solitaria possint uti (quod facit supradictus Longimontanus), vel astronomica et demonstrativa veterum, ex duobus elementis constante, quorum posterius Tychonica omittit, vel denique Tychonica, ad modum causae physicae per me redacta, prout cuque commodum videbitur. Qua ratione necessario duae tabellae sunt effectae temporis aequationum: prima quidem et Tychonicum modum solitaria repraesentans, accommodatum signis zodiaci, et astronomico scribens pro elemento; secunda geminatis columellis, sinistris quidem, quae majusculos characteres habent, aequationem absolvens ex sententia veterum, dextris vero, minusculos characteres habentibus, ex speculatione mea propria, et delens illud veterum elementum et Tychonicam empiricam in physicam transformans, utroque modo ad asomaliam Solis accommodato.

Igitur tempus aequaturus ex sententia Tychonis Brahe, cum vero loco Solis in zodiaco ingrediatur tabellam Tychonicam dictam, quaesito signo Solis in fronte, gradu in margine sinistro, vel illo in calco, hoc in dextro margine, et exhibebit area communis tempora et scrupula aequationis dierum. Si ergo tempus apparens convertendum est in aequale, haec aequatio redacta in minuta horaria, ab alterutro quidem punctorum aequinoctialium ad solstitia pergente Sole, subtrahatur a tempore apparenti; a solstitiis vero ad aequinoctialia Sole transiente, addatur, quod et tituli indicant. Si vero tempus aequale convertendum est in apparens, contrarium titulus erit faciendum, addendum scilicet tempori aequali, Sole versante in quadrantibus ab aequinoctiali puncto inceptis, subtrahendum in reliquis, qui a solstitiorum alterutro deducuntur; ita fiet tempus apparens. Hoc praeceptum generale est.

At in specie, si non aliam ob rem quaeratur de tempore apparenti, quam ut per id habeatur gradus oriens ejusque angulus cum horizonte constitutus, propter parallaxes in Luna discernendas: tunc pro illo quidem oriente puncto determinando non erit opus conversione temporum aequatoriorum hujus aequationis in minuta horaria, sed illa ipsa tempora et scrupula, ut excerpuntur ex una tabella, possunt statim addi ad ascensionem rectam medii coeli, vel obliquam horoscopi, quae per tempus aequale constituta fuit, aut ab illa subtrahi. Propter hunc usum hujus aequationis pene unicum praestare putavi, ut in temporibus et scrupulis aequatoris, quam ut in minutis horariis aequationum harum quantitates exhiberentur.

Eadem Tychonica dierum aequatio conficitur etiam aliter et sine peculiari tabula, per solam tabulam ascensionum rectarum, ut quae nihil est aliud, quam differentia longitudinis loci Solis veri ab aequinoctio et ejus ascensionis rectae: quod proderit memoria retinere, ubi transieris ad alterum aequationis modum astronomicum, cum hoc comparandum.

Hoc praeceptum valet quovis seculo, nec indiget applicatione alia ad quamlibet aetatem, ut fiat compendiosius, ut aequationes reliquae: sane quia unicam eamque simplicissimam causam temporis aequandi complectitur.

Atque huic ego modo primas dedi, cum ob hanc ipsam ejus simplicitatem, tum quia sequens secundus et astronomicus hunc pro nro snae compositionis elemento habet nec sine eo confici potest. Quod etiam non fuisset, ipsius tamen tabularum harum primi auctoris, qui modum illum amplexus est, respectus hunc ei locum obtinuisset. Denique haec, quamvis empirica tantum temporis aequandi ratio, plura pro se hactenus invenit suffragia eclipsium, nostra aetate accurate observatarum.

Transeo ad secundum modum aequandi dies, de quo, ut composito, plura dicenda sunt. Ac primum repetendum hic est ex astronomia antiqua: duas esse causas aequandi dies naturales, alteram ab inaequalitate ascens. rectarum, alteram ab inaequali motu Solis per zodiacum. Harum illa incipit a punctis aequinoctialibus vel sol-

stitalibus, ista ab apogaeo vel perigaeo Solis. Neque duos solum habemus annos ex omni aëro transacto, cum utriusque causae principia concurrerunt, ante Christi aëram bodiernam anno 3993. 24. Aprilis, cum Sol et apogaeum ☉ in 0° V fuit, et post Christum anno 1466. 14. Junii, cum idem Solis apogaeum et Sol ipse in 0° ☿ fuit.

Eat quidem et tertia causa astronomica, quae tempus aequari postulet, inaequalis scilicet praecessio punctorum aequinoctialium, ex mutatione obliquitatis eclipticae orta; sed haec mutatio et incerta est, vel in re, vel saltem in modo, ut suo loco dicitur; et in tam brevi saeculorum decursu, etiam si diceretur, nullam tamen sensibilem differentiam temporum scervaret. Itaque jure illa vel omittitur, vel si etiam sit, dissimulatur.

Nam altera illa aequinoctiorum inaequalis incidentia, quae est ex transitu aequationum Solis ex solstitalibus punctis in aequinoctialia, non locorum sed punctorum eclipticae est, sed momentorum temporis, quae annum tropicum, ab aequinoctio vernali coeptum, baciens prolongarunt, ab autumnali abbreviarunt. Nulla igitur hinc quidem existit trepidatio principii zodiaci, nulla per eam ascensionum rectarum alteratio, temporis amplius aequandi materia.

Secundo illud ipsius inculcandum est studiosis astronomiae, quamvis secundus iste modus in causis plane conveniat cum eo, quem tradunt Prutenicae, rationem tamen utendi diversam hic necessario debere observari, quam in Prutenicis. Illae namque cum adhibeant epochas non plures quam quinque, omnium illarum tempora per aequationem dierum reduxerunt ad apparentia, motumque mediorum loca his sic sumtis accommodarunt. At quia in his Tabulis epochae plures sunt collocatae, ob causam suo loco explicandas: omnes igitur intelliguntur, ut aequabilibus intervallis centenorum aut milienorum annorum distantes. Molestissimum enim fuisset, nunquamquid epocham saecularem ad annum tempus apparens reducere totidemque ascensiones rectas motus Solis veri calculatori obtrudere, quot sunt epochae, solum aequandi temporis causa; praenertim cum modis aequandi sint plures et res dubiae.

Itaque si locum Lunae quis computare vellet ad ipsam tempus nunc epochae, in his Tabulis posita, ad annum sc. ejus exacte completum: oporteret tempori illi prius adhibere aequationem dierum, quod fit, si quis motus per minuta aequationis dierum collectos aut auferat a loco epochae, si ablativa est aequatio, aut addat, si adjectoria. Illa loca respondebunt anno epochae apparenti completo. Nullum enim temporis momentum dari potest, quod aequatione dierum, ut ea in his tabulis traditur, non indigeat, praeterquam illa, in quibus aut causae temporis aequandi ab uno et eodem puncto cardinali incipiunt, aut altera alteram compensat, quod fit bis quoque libet anno.

Secundi igitur modi aequatio temporis astronomica et demonstrativa proprie quidem non per tabulam excerpitur, sed per computationem loci Solis medii et ascensionis rectae ejusdem Solis loci veri. Harum enim differentia, sive temporibus constans aequatoris, sive in minuta borae, ut prius, conversa, est ipsa temporis aequatio subtrahiturque a tempore apparenti, si loca Solis medius excesserit loci veri ascensionem rectam, additur, si defecerit ab ea, ut fiat tempus aequale; contrarium fit; si medium convertendum est in apparens, ut prius.

Sed tamen, quia non ita crebra occurrit necessitas in his tabulis computandi locum Solis medii (quippe qua sublevamur, si operemur per tabulas Solis subsidarias), parum admodum peccabimus, si etiam sic agamus. Primum exquiratur aequatio Tycheonica, ut prius, in temporibus aequatoris, cum titulo suo. Deinde cum anomalia Solis coaequata in signa redacta (ejusve residuo ad totum circulum) fiat ingressus in tabulam secundam aequationis dierum excerpanturque ex ejus columnis sinistris, quae ab astronomia titulum habent gradus et scrupula aequationis Solis, cum titulo suo, ex fronte vel caele. Tertio duo haec elementa componantur in annum, prout tituli requisiverint. Nam si fuerint similes, adduntur in eam summam cum eodem titulo, sin dissimiles, minor a majori auferitur, residuo titulus erit majoris. Ita constituta erit aequatio haec composita in partibus et scrupulis, quae facile in minuta horaria convertuntur. Additur autem haec aequatio tempori apparenti vel auferitur,

prout jusserit titulus ultimo prodians. At si tempus aequale convertendum est in apparem, fit contrarium titulo aequationis compositae, ut supra.

Tertius modus, quem physicum dicere lubuit, praeepto nullo preliari indiget: peragitur enim ut secundus, subsidio tabulae secundae, tantummodo ut dimissis sinistris columellis tabulae introeatur dextrae, quae excessum exhibent causae physicae a me subjectae super astronomicam seu aequationes Solis; titulis per totum secundae contrariis.

Cum igitur tres fiant aequandi modi, quorum primus solum simplex eoque solius illius tabula perpetua et universalis est ad quodcumque tempus: consentaneum fuit, ut exemplum Prutenicarum secutus, tabulam aliam conderem, et duas in ea columellas pro duobus posterioribus aequandi modis, accommodatas ad annum post Christum 1616, quando coepi scribere ephemeridas, sed quae annis 50 et pluribus ante et post sine incommodo servire possunt. Earum usus est facilior: exhibent enim illae jam confectam, quod in posterioribus duobus modis demum fieri debet, reductam insuper in minuta horaria; titularum vero ratio et usus idem est, qui per praeepta priora exhibetur.

Exemplum triplicis modi aequandi tempus. Sit assignandum tempus apparem corrente anno ante Christum 747, die 25. Februarii horis 22. 12' post meridiem aequalem, quando est motus medius Solis $10^{\circ} 28' 4''$. Apogaeum in $24^{\circ} 34'$ ♀ anomaliae coaequatae, residuum ad circulum $85^{\circ} 26'$ seu sign. 2. 25. 26', locus verus ☉ $0^{\circ} 7' 12''$ X, ejus asc. recta $332^{\circ} 13'$.

Primum igitur aequatio Tychonica ex prima columna excerptitur per locum ☉ verum t. 2. 6', quae sunt minuta horae $8' 24''$, titulo *add*; sed quia jam tempus aequale convertendum est in apparem, subtrahantur, fietque tempus apparem h. 22. 3' 39". Secundo quaeritur aequatio temporis astronomica, quam sine tabula conficio sic. Medius ☉ ab aequinoctio est $328^{\circ} 4'$, ascensio vero recta veri loci Solis est $332^{\circ} 13'$. Differentia $4^{\circ} 9' 28''$, quae valent $16' 38''$. Et quia medius Solis habet minus, abequatio esset addenda ad apparem tempus, ut fieret aequale. Est igitur jam subtrahenda ab aequali, restatque apparem h. 21^o 55' 22" per modum astronomicum et demonstrativum.

Eadem aequatio astronomica quaeritur per tabulam secundam. Est igitur ex tabella prima jam inventum ejus elementum $2^{\circ} 6'$ ad. Et quis anomaliam ☉ coaequata est $9^{\circ} 4' 34''$ quaerenda infra, datur ex secundae tabulae columellis sinistra $2^{\circ} 3' 29''$ addenda, pro secundo elemento. Cum igitur utrumque elementum sit addendum, fac summam, quae est $4^{\circ} 9' 29''$ add., eadem quae prius.

Tertio quaeritur aequatio temporis physica vel quasi. Ergo retroscto priori elemento, jam per eandem anomaliam Solis, ut prius, excerptur ex columella dextra elementum alterum, seu excessus ejus physice instructi super astronomicum, a Tychois rejectum, scil. $3^{\circ} 21'$, subtrahendum ab apparem, hic igitur addendum tempori aequali, si prius in minuta redigatur, ut fiat $13' 24''$. Erit ergo apparem tempus h. 22. 25' 24".

Tempus medium	h. 22. 12. 0 est	
Tychoni empirice	22. 3. 39.	
Astronomis demonstrative	21. 55. 22.	} apparem
Mihi Tychoem interpretanti physice	22. 25. 24.	

Exemplum de noua tabulae temporariae. Anno 1598, die 25. Februarii Juliani vel 7. Martii Gregoriani in merid. aequali Uraniburgico quaeritur aequatio temporis. Cum igitur Sol sit in $16^{\circ} 49'$ X, locus ista ex tabula prima suppeditat aequationem Tychonicam in temporibus $1^{\circ} 3' 30''$, quae sunt minuta horae $4' 14''$, addenda ad apparem (subtrahenda igitur hic ab aequali). Idem locus Solis ex tabula aequationis temporaria, anno 1616 accommodata, exhibet in sinistra quidem columella minuta $12''$, addenda itidem pro aequatione astronomica, in dextra vero columella exhibet $8''$, subtrahenda pro aequatione physica.

73) p. 445. Apollonii problema discutit Keplerus in libello contra Ursium, qui exstat vol. I. p. 215—287 nostrae editionis, idque cap. III fol. 264, ubi commentatur Problema, libro XII, cap. 1. Almagesti hoc problema atque quantum obscurum tractantem.

Tabulae Rudolphinae cap. XXIV. haec habet, quibus caput hoc, quod de stationibus etc. agit, illustratur. In problemate: *cuiuslibet anomaliae planetae suos computationis angulos et prosthaphaeresein orbis, seu inferioribus elongationem assignare, in quibus si fiat stationarius, sudavit quondam Apollonius Pergaeus geometra dixitque quid geometrae facere debeant, ut hic juvent astronomos; at nec ipse fecit, quod*

alios fuisse, nec si fecisset problemamque solvisset, astronomis ea re satisfecisset. Ille enim ex multis causis, quae varietatem inducunt stationum terminis, paucas supposuit, pleraque dimisit intacta. Nos ut Apollonii acumen qua licet aculemur, proxime geometricas ^{quasdam} incedentes sic aemus.

Initio constitienda erit proportio intervallorum seu distantiarum temporanearum Solis et a planeta (curtati intervalli) et a Terra. Secundo constitienda etiam est proportio arcuum diurnorum eccentrici. Planetas quidem arcum diurnum eccentrici secum trahit anomaliam praescripta, Solis vero anomaliam, quae ejus arcum diurnum eccentrici repraesentet, oportet eminus conjectare, quanta praeter propter futura sit, ad formandum commutationis angulum. Tertio ponere oportet, radios ex Sole in planetam atque Terram cum subtensis diurnorum suorum eccentrici arcuum formare angulos exterosum majores recto, quantitate arcuum cujusque semidiurnorum; etiam hoc exacte verum non est, praeterquam in aequalibus.¹⁾

His præparatis et suppositis (cum stationis definitio astronomica sit hæc: quando nimirum linea visionis planetæ post diem exactum in idem zodiaci punctum secundum longitudinem incidit, in quod prædiu incidat, sive id fiat per identitatem visoriae anili, ut apud Tychoem, sive per parallelitatem duarum, ut apud Copernicum) formabitur nobis figura, in qua S Solem representat, O Terram, A planetam unum ex superioribus, vel e contrario A Terram, O planetam unum ex inferioribus. AD est arcus eccentrici diurni superioris, OP inferiori maior, sicutque intercepti inter visorias OA, PC parallelas. Igitur datur proportio AS ad SO, inventa vero est. proportio AD ad OP, minor altera: quare ductis ex A parallelis, AE ipsi SO, AB ipsi OP, erunt AS : SO = CA : AE (æquiam ipsi OI) et sic nota eorum proportio. Sic etiam AB = OP, nota igitur est proportio DA ad AB. Denique quia triangula ASD, OSP possunt esse æquicrura et maior angulus OSP quam ASD, minor igitur angulus SOP quam SAD: maior igitur CAD quam TOP, vel EAB et uterque major recto quantitate arcuum semidiurnorum.

Fig. 400.

Cum igitur angulus commutationis quaeratur, per quem planeta fiat stationarius, ejus equidem complementum est ad duos rectos angulos ASO vel CAE. Quare ex datis quaeratur angulus CAE, initio facto a positione ipsius ACB, ut noti, et processu per positionis correctionem tractato.

Interposito exemplo, quod longiori calculo per
regularum positionum computator, hæc sequuntur præcepta: 1) Quo pacto sint discernendæ stationes, prima et secunda? Angulum communicationis inventum, pro superiorum quidem prima statione indaganda, addemus ad ipsam anomaliam coaequantur planetæ, pro secunda statione inferemus ab illa; pro inferiorum vero statione prima subtrahemus, pro secunda addemus. Contrarium fiet, si complementum anomalie planetæ ad circulum versetur in questione; utrobique adjiciemus apheii planetæ distantiam ab apogæo Solis, ita conficietur anomalía Solis coaequantur justa, exhibens justum et arcum diurnum et intervallum; quibus datis corrigitur utraque proportio et



Fig. 403.

*) In „Notis et animadversionibus“ ad praecepta hoc monet Keplerus: Quod dixi, „tertio ponere oportere“, studens facilitati calculi, id, praeterquam in apsidibus, cum damno sic ponitur; quod hac ratione cavebitur, si, qui hac methodo elincitur tanquam commut. anguli, non vere hoc esse intelligantur, quod dicuntur, non sc. constitui per coaequantur planetæ locum in eccentrico, sed per seminequantur, h. e. ex anomalia eccentrici cum apelli loco commissa, constitutum.

per eas reditur ad opus praecepti prioris. Addita vero illic aphelli planetae, hic apogaei Solis longitudine, prodibit locus Solis.

2) *Quomodo cognoscatur, num planeta sit directus, stationarius, an retrogradus?* Ad tempus quodlibet propositum quaerantur angulus commutationis planetae et proportio intervallorum Terrae et Solis (adeoque, si non vis uti tabella stationum, ipsorum etiam arearum diurnorum). Tunc indagetur angulus commutationis, respondens huic intervallorum proportioni, qui stationem exhibeat. Si igitur minor fuerit ille temporarius commutationis angulus hoc stationario, planeta directus est; si aequalis, planetarum superiorum unus in statione est, in prima quidem, si orientalis, Sole a conjunctione ejus ad oppositum ejus tendente, at si occidentalis, ab opposito ad conjunctionem, in secunda, si major, planeta est retrogradus. In inferioribus distinctio est contraria: vespertini enim sunt, cum primam stationem faciunt, cum secundam, matutini.

3) *Utrum major an minor inclinatione futura sit latitudo planetae?* Ex directorio computandi loca planetarum in longum et latum sequuntur hae regulae: In ♄, ♀, quoties angulus elongationis est semissis anguli commutationis, in ♀ vero, quoties angulus elongationis cum angulo commutationis implet 2 rector, latitudo aequatur inclinationi; quoties minor est hic elongationis angulus, latitudo est minor inclinatione, quoties major, major et latitudo. In ♃ vero latitudo semper est minor inclinatione.

4) *Utrum latitudo planetae crescat an decreseat, anne consistat?* Latitudo in eodem manet, quando intervalla planetae et Terrae, ad dies proximos subducta, fuerint in proportionem inclinationum eversa, h. e. quando, quantum crescit mesolog. inclinationis vel decrescit, tantundem etiam log. commutationis respectu log. elongationis crescit vel decrescit, quod fieri potest varie. Et in ♄ inque ♀ ob tardissimum inclinationis mutationem diurnam jugum ipsum latitudinis, quavis vice maxime, cum oppositionibus planetae cum Sole proxime coincidit, a conjunctionum cum Sole diebus aliquanto plus recedit; in ♃ ob celerissimam separationem orbium propius sese applicat consistentia latitudinis ad accessum planetae (motu eccentrico in orbita) ad inclinationis maximae limites, majori tamen varietate, cum planeta est circa stationes vel retrogradus.

In ♄ et ♀ magnam haec res habet varietatem, etsi ille quidem superiorum sectae sese propius etiam hic applicat, ista vero inferiorum, sc. Mercuri: Ille ob parvitatem inclinationis et tarditatem commutationis, ista ob magnitudinem inclinationis et commutationem paulo breviorum. Utunque tamen haec sic sese habeant, in utroque tamen planeta nihilominus circa stationes et retrogradationes latitudines eorum plurimum habent varietatis, ut praescribi regula alia non possit, nisi haec solum, ut calculus eorum motus deducatur ad binos dies, datum circumstantes, attendendo, quae membra generalis praecepti nihil mutant et quomodo mutantur logarithmi, et an nobis ad formationem prostaphaereseos posterioris subsidio esse possit tabula anguli. Certe haec varietas tanta est, ut cum in Saturno et Jove maxima latitudo, ut dictum, contingat proxime diem oppositionis cum Sole, in Marte ea possit distare ad dies 20, 30, 40 ante vel post oppositionem, pro re nata. — Quae sequuntur in hoc capite leguntur sonot. 42. et 52. Schema praemissum adhibet Keplero capite XI. ad indagandas ope problematis geometrici stationes planetarum, quo simul usus logarithmorum demonstratur.

Problema hoc est: De alio peculiari usu canonis logarithmorum, praecipue in stationum punctis indaganda. De planetarum stationibus artificiose indagandis infra suo loco tradentur praecepta. Per ea vero nobis ingruit necessitas solvendi hoc problema. Si duo trianguula obtusis suis angulis notis et recto proximis in eodem puncto conserta sic fuerint, ut latus alterutris lateribus reliqui intercedat, subtensa vero latera angulis obtusis in eandem lineam rectam coincident, si simul etiam binorum ex eadem parte laterum proportionem fuerint notae: ex his notis indagare quantitates angulorum, et quos latera faciunt cum basi communi, et quos ipsa inter sese.

Hic ne praeceptum sit nimis tenebrosus, praemittenda est geometricorum fontium indicatio.

Sit punctum A, ad id duo anguli obtusiusculi (Fig. 100. p. 575) CAD et EAB, notae uterque quantitatis, et latus prioris AD intercedat inter latera posterioris AB, AE; vicissim latus posterioris AE intercedat inter latera prioris AD, AC; latera vero angulis obtusis subtensa CD et EB constituant unam rectam CB. Sit denique nota proportio binorum laterum a dextra parte, sc. AC, AE, nota et proportio binorum a sinistra, scil. AB, AD. Oportet indagare, quanti sint anguli C, E, D, B, et quanti CAE et reliqui ad A.

Quia igitur CAD, EAB sunt obtusi, ducta ex A perpendicularis in BC cadet intra bina et bina latera, sit haec AF; quae si ponatur esse sinus totus, in ea dimensione quatuor latera circa obtusos totidem crunt secantes angulorum, quos latera faciunt eum AF perpendiculari. Cum autem hi anguli sint complementa angulorum C, E, D, B quaesitorum, illarum igitur linearum logarithmi erunt iidem cum horum quaesitorum angulorum logarithmis; linearum quidem privativum sunt, quippe sinu toto majorem, laterum vero positivum, quia eorum sinus sunt toto minores. Ergo proportio illarum linearum erit differentia logarithmorum, quos habent anguli C, E, D, B. Et cum AF cadat inter bina et bina latera, patet, quod laterum ex una parte breviorum proportio sit minor, ut AB, AD, ex altera parte longiorum proportio major, ut AC, AE. Amplius memineris, quod lineae, quae privativum habet logarithmum, brevioris minor sit logarithmus, longioris major.

Ex his fundamentis praeceptum nascitur tale. Per proportionem minorem (AD, AB), ut logarithmum, excerpere arcum. Cum igitur angulus ACD, quaesitorum unus, sit certo minor complemento hujus arcus ad quadrantem, pone hunc esse notum, pone, inquam, minus aliquid illo complemento. Ablata igitur positione hae summa angulorum C, D (qui enim CAD noto faciunt duos rectos), residuum erit tanquam angulus D. Hujus ergo logarithmum adde ad proportionem minorem, summa, ut logarithmus, exhibebit veluti angulum B. Hoc vero ablato a summa duorum B, E, reliquetur quasi angulus E. Hujus igitur logarithmum adde proportioni majori: summa, ut logarithmus, exhibebit angulum C correctiorem, quam erat initio positus. Ab hoc igitur angulo C, jam correctiori, tanquam a nova positione repetitus processus exhibit in correctionem secundam positionis. Bis vero correctae positione, statim apparebit analogia, quae ducet ad minutissimam emendationem. Correcto angulo C et cum eo etiam E, D, B, per subtractionem C ab E habetur et angulus CAE.

Ita positione unius de quatuor angulis, qui quaerebantur, compendiosissime venit ad certitudinem omnium quatuor. quod citra logarithmorum operam fortassis aut impossibile finisset aut laboris immensi.

Etiam vero nunc praecepti hujus in his tabulis specialis est in stationibus indagandis, ut praefatus sum, censui tamen, proponendum hoc loco generaliter, quia usus ejus etiam in aliis computationibus esse poterit, et quia exemplum ipsam, abutendi logarithmis ad operationes tales inartificiales, de pluribus aliis affinis deque logarithmorum ad eas aptitudine monebit.

74) p. 448. Cap. XXII. Tab. Rod. „De prostaphaeresibus orbis anni“ praecepto 96. docetur: Excerptare vel computare prosth. sen parallaxin orbis, ut in hoc additur: Hanc comminiter parallaxin sen prostaphaeresin orbis magni appellant Copernicus et Prutenicae et brevitatis causa prostaphaeresin orbis simpliciter. Tycho Braheus interdum appellavit prostaphaeresin eccentrici non plane proprie, sed eo respectu, quod eccentricus alicujus concentrici, in quo fertur linea apsidum, cum ipso Sole circumiens in annuo orbe, cantetur hanc prostaphaeresin. Maginus in Suppl. Ephem. appellat aequationem orbis vel argumenti planetae ex Alphonsinis. Ptolemaeus prostaphaeresin epicycli dixit.

Capite X. Tab. Rod. Keplerus, „Tabulam anguli potissimum pro prostaphaeresibus orbis in 5 planetis“ explicans, haec refert: Desideratur a tabulis astronomicis conspectus aliquis varietatum prostaphaeresium orbis, ut prostaphaeresin vero proximam, in quantum hoc patitur mira planetarum varietas, excerptare et tanquam positionem felicem deinceps per logarithmos excolere et limare possint calculatores.

His de causis construxi jam ante multos annos tabulam anguli prolixam ad

singulos gradus semicirculi commutationis adque 24 proportionales laterum trianguli (h. e. intervallorum Solis et Terrae, Solisque et planetae) et interjedi areis differentias tam interlineares quam intercolumnares, ut si quis vellet, more in astronomicis tabulis non infrequenti, partem proportionalem venari posset operatione cruciformi, vere eructe calculatorium. At in editione operis re diligentius expensa sufficere visa est tabulae pars tertia et ea quidem sine differentiis. Incipit igitur ejus margo sinister a commutationis denariis progrediturque usque ad 100° . Abhinc vero, cum prosthaphaeresis orbis in Saturno incipiant decrescere usque ad 140° , ubi Veneris incipiunt decrescere, singulos gradus exhibere visum est. Ah 140° usque ad finem semicirculi sufficere visi sunt saltus per quaternos, cum sine lima per logarithmos nulla plane prolixitas tabulae hujus prosthaphaeresibus Martis et Veneris satisfacere possit. In fronte vero occurrunt ordine proportionales a 30000 ad 240000.

Usus tabulae est iste. Si tam summa quaesitorum angularum (commutatio), quam proportio reperitur exacte in margine et fronte, area quoque exhibebit quaesitum exacte: sin aliter, per summam angularum quaesitorum (h. e. per commutationem) proxime minorem data in margine inventam et per proportionis logarithmi myriades puras in fronte ingredi, et exhibebit area communis quaesitorum angularum minorem (seu prosthaphaeresin orbis) respondentem: elementis, quibus est excerptus. Idem fac cum singulo commutationis proxime majori, quam est datus, et cum proportionis myriade sequenti: per quae prosthaphaeresin elicies etiam majorem. Memineris itaque, veritatem esse plerumque in medio excerptorum. Sume igitur aliquid intermedium et excole illud per proportionem ipsum datam. Id enim fit longe facillius, quam per ullam venationem partis proportionalis.

Inter mss. Pulkoviensis deprehendimus fasciculum, quod maxima ex parte adversaria Tab. Rnd. continet (Vol. XX.). Ex his hoc excerptimus:

Praeceptum: Dato commutationis angulo et distantiarum proportione, invenire prosthaphaeresin orbis et elongationem planetae a Sole.

Etsi perscriptum est in Epit. Astr. p. 751 (448), prosthaphaeresis seu parallaxis orbis non opus esse in calculo Rudolphino, ut qui contentus sit elongatione planetae a Sole, id tamen intelligebam tantum de illo modo investigandi elongationem planetae, quem tuus sequebar. Ex illo vero tempore deprehendi commodiorem calculi formam, in qua prius (in superioribus quidem) innotescit haec orbis prosthaphaeresis. Attende igitur definitiorem vocis: cum de superioribus planetis agimus, vox ista, prosthaphaeresis orbis, intelligitur de orbe magno, qui secundum T. Brähe conceptiones Solem



ipsum et in eo commune centrum totius systematis planetarum circumfert. Et tunc est angulus ad planetam in adjecto schemate (nbi T Terra intra orbem eccentricum PLAN, et S Sol) SLT vel SNT, differens ab elongatione planetae a Sole STL vel STN. At cum de inferioribus agimus, vox orbis multo commodius quam in Prutenicis accipi potest de ipso planetae orbe eccentrico circa Solem, qui veteribus epicyclus dicebatur, et tunc prosth. orbis non aliter ac in Prutenicis est angulus ad Terram seu angulus visionis; in adjecto schemate (nbi R Terram signat, extra orbem inferiorum unius) angulus hic est SRP vel SRA, ipsa sc. elongatio planetae a Sole. Consequens igitur est, cum prosthaphaereses vox sit relativa, ut in superioribus quidem intelligatur referri ad locum planetae eccentricum per lineas SL, SN definitum, in inferioribus vero ad locum verum Solis, per RSO definitum. Itaque in semicirculo commutationis priore OP

prosthaphaeresis haec superiorum, ut SNT, subtrahitur a loco planetae eccentrico SN, inferiorum, ut SRP, additur ad locum Solis RSO; contra in semicirculo commutationis

posteriore OL, prosthaphaeresis haec superiorum, ut SLT, additur ad locum planetae eccentricum SL, inferiorum, ut SRA, auferitur a loco ☉ RSO.

Definitionibus explanatis sequitur praeceptum, quod Biam calculi formam tradit, quam omnium commodissimam deprehendi.

1) Immitte proportionem intervalloꝝ in columnam log. canonis positi; ea monstrabit in fronte et marg. sinum in ♂ et ♀ rarissime in calce et marg. dextro) prosth. orbis, omnium bujus proportionis maximum. 2) Hanc aufer ab angulo commutationis, qui est OTN vel OTL, OSP vel OSA; si remanet 90°, tunc illa ipsa prosthaphaeresis valet tota, sicut eam exhibuit ex canone proportio; si autem remanet vel plus vel minus, ejus quod remanet log. addo proportioni, cum summa rursus ut prius exerce prosth., quo jam erit correctior. Adhuc tamen vel deficiet, si minus quadrante remansit, vel excedet, si plus, idquo tanto magis, quanto illic plus, hic minus remanscrit, praesertim in ♂ et ♀. Quare etiam cum correctis jam prosth. agendum est, sicut prius cum tota. Subtrahenda sc. est ab angulo commutationis initiali, residui log. addendus proportioni initiali, et per summam excerpenda prosthaphaeresis prodibitque adhuc correctior. Semper autem repetendus erit iste processus, quoadusque prodeat eadem prosthaphaeresis, quo prius; ita tandem erit justa.

Etsi vero verba bujus praecepti omnium aliquem laboris nobis ostendant eminus, et tedium ex multiplicatione, subtractione, excerpatione, additione, certum tamen habeat calculator, quantumcumque sit bujus, longo id esse brevius, longe facilius, longe certius, quam est in calculo ceterarum tabularum usitato discursatio per tabulas varias, multiplicatio in scrupula proportionalia, omnium adco trium istorum limitio, quae fit multiplicatione diff. in scrupula, gradibus integris anom. eccentrici et commut. adhaerentia.

Potest tamen evitari superflua et nimio longa series repetitionum in hunc modum: proportioni adde log. commutationis, summa ut log. exhibebit bonum initium. Deinde, cum primum prodierit prosth. semel correctae, compara eam cum antecedenti, exquisita earum diff. praeterpropter, indo respice ad proportionem etc.

75) p. 449. In \triangle STP (Fig. 85) dantur ST, SP et singulus TSP (anomalía commutationis), quare $\text{tg. } \frac{1}{2} (T - P) = \text{tg. } \frac{1}{2} (T + P) \cdot \frac{SP - ST}{SP + ST} ; \frac{1}{2} (T + P) + \frac{1}{2} (T - P) = STP. \left(\frac{SP - ST}{SP + ST} \text{ est „index“} \right)$

76) p. 451. Sit in eadem figura BT planum eclipticae, APQ planum orbis planetae, inclinatum in planum eclipticae quocunque angulo. Jam imaginatur perpendicularis PX demissa ex P in eclipticam planum connexisque punctis S et T (Solis et Terrae centra representantibus) cum puncto X, erit angulus PSX inclinatio et PTX latitudo planetae. In triangulis PSX et TXP ad X rectangulis erit $SX = \cot. PSX \cdot PX$ et $TX = \cot. PTX \cdot PX$. Jam in \triangle STX est $SX : TX = \sin. STX : \sin. TSX$, quare

$$\begin{aligned} \cot. PSX : \cot. PTX &= \sin. STX : \sin. TSX \\ \cot. PTX &= \frac{\cot. PSX \cdot \sin. TSX}{\sin. STX} \end{aligned}$$

77) p. 460. Logarithmis Briggsii calculum hunc absolventes, hanc diligamus formam:

1) In \triangle ABG : $\text{tang. } \frac{1}{2} (G - B) = \text{tg. } \frac{1}{2} (G + B) \cdot \frac{AB - AG}{AB + AG}$. Dantur angulus BAG = 3° 22', AB = 1,00674, AG = 0,72787, ergo AB + AG = 1,73461, AB - AG = 0,27887, $\frac{1}{2} (G + B) = 88^\circ 19'$.

$$\begin{aligned} \log. \text{tg. } 88^\circ 19' &= 11,5318275 - 10 \\ \log. 0,27887 &= 0,4454018 - 1 \\ \log. 1,73461 &= 0,2392018 \\ \log. \text{tg. } \frac{1}{2} (G - B) &= 10,7380275 - 10 \\ \frac{1}{2} (G - B) &= 79^\circ 58' 30'' \\ \frac{1}{2} (G + B) &= 88^\circ 19' \\ B &= 8^\circ 40' 30'' \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 2) \text{ In } \triangle AFC: \operatorname{tg.} \frac{1}{2} (F - C) &= \operatorname{tg.} \frac{1}{2} (F + C) \cdot \frac{AC - AF}{AC + AF} \\
 \frac{1}{2} (F + C) &= 88^\circ 19', AC = 0,99268, AF = 0,79036; AC + AF = 1,71304, \\
 AC - AF &= 0,27232. \\
 \log. \operatorname{tg.} 88^\circ 19' &= 11,5318275 - 10 \\
 \log. 0,27232 &= 0,4350795 - 1 \\
 \log. 1,71304 &= 0,2337675 \\
 \hline
 \log. \operatorname{tg.} \frac{1}{2} (F - C) &= 10,7331395 - 10 \\
 \frac{1}{2} (F - C) &= 79^\circ 31' \\
 \frac{1}{2} (F + C) &= 88. 19 \\
 \hline
 ACF &= 8. 48
 \end{aligned}$$

78) p. 462. Compara cum sequentibus quae Keplerus de lunari theoria Crügero scripsit, explicans textum et schemata, supra p. 35.

In Tab. End. de anomalia Lunae soluta haec occurrunt: Luna respectu eorum locorum eccentrici sui, quos ille solet obtinere in copulis, h. e. in conjunctionibus et oppositionibus cum Sole, prorsus est similis planetis ceteris. Id ut pateat evidentiore et ut tota reliqua doctrina de motibus Lunae clarius explicetur, monendus est initio calculator, duorum quidem generum anomalias deprehendi in Luna, non secus ac in 5 planetis, non tamen iisdem nominibus illas ab invicem distingui, quibus in ceteris. Causa haec est, quia in 5 quidem planetis anomalia prima sola re vera inest motibus ejusque per eccentricum, secunda iis penitus extrinsecus advenit, seu merum ea vias sit accidens, secundum Copernicum, sive totus eccentricus alieno Solis motu, sorte inter omnes quinque communi, situ suo emoveatur, secundum Tychohem. In Luna vero utrumque genus anomaliarum re vera inest ipsis Lunae motibus, ut eae non subjecto, sed tantum causis distinguantur. Igitur in libris hactenus editis, praesertim in Epitome Astronomiae consultum mihi visum est, nomina his anomalias a relatione ad Solem deducere, ut quae in aliis planetis est anomalia motus eccentrici, ea in Luna dicatur anomalia soluta, intellige a Solis respectu; reliqua anomalia cum aequationibus ejus menstruae, id est alligatae ad Solem, qui mensem efficit, hoc est Lunae phases illuminationis ejus. Prutenicae appellant illam periodicam, hanc synodicam. Haec in genere dicta sunt; deinceps de singulis agam.

Jam Keplerus ad „anomallam solutam“ transiens 8 proponit figuras, quasi ex Epitome fig. 89. erutas, in quibus centrum Terrae ponitur primo in PQ infra B, secundo in

Fig. 89 (rep.).



A, tertio in C, quarto supra NO ad sinistram, quinto in QF supra C, sexto supra NO ad dextram, septimo in NO ad dextram puncti B, octavo in IK ad dextram puncti Z. His positis pergit: Sit A (Kepleri figura II.) centrum Terrae, B centrum eccentrici Lunae, AB linea apsidum, quae producta secet eccentricum, huic ad rectos per B centrum ducta sit linea, cujus sectiones cum eccentrico sint longitudines mediae lineares, i. e. ex idiomate Arabico puncta, circa quae Luna a Terrae centro distet mediocri intervallo. Movetur autem Luna circa Terram (ut ceteri quinque circa Solem apud Tychohem) causis aequae naturalibus, circulum non quidem plane perfectum, proxime tamen perfectum efficiuntibus. Nam quae ex Epitoma (fol. 470) contra produci possunt, nullius sunt momenti. Longitudo enim a principio zodiaci per illam diversitatem non ultra 17" vitatur, intervallum vero Lunae et Terrae, etsi non est vere idem, quod computatur ex circulo perfecto,

nuspium tamen ad formandam motus apparentis diversitatem concurrent, uti fit in 5 planetis. Pinxi igitur iter centri corporis Lunae in forma perfecti circuli, et si id proprie loquendo est ellipsis, parumper a circulo deflectens introrsum, ut in ceteris; eoque etiam tabula aequationum ex ellipsi computata est.

Quod attinet motum apogaei Lunae (apogaeum enim in Luna consideramus ut in Sole, quod in ceteris quinque est aphellum), satis is est celer, si tarditatem respiciamus apsidum in ceteris: revertitur enim ad eundem zodiaci locum post annos $8\frac{1}{2}$, ex quo est a quolibet digressus. Manente igitur eccentricitate AB, circellus a centro B describitur circa Terrae centrum, pins quam duplo amplior maximo Terrae circulo, et id secundum ordinem signorum a dextris sursum ad sinistram. Hujusmodi vero circellos describent etiam reliquorum planetarum centra eccentricorum circa Solem, si temporis spatium habitura sunt idoneum.

His praemissis transit Keplerus ad descriptionem tabularum, quae Lunae theoriae inseruiant, et hinc descriptioni haec adjungit: Hic locus admonet, ut quod supra (fol. 568) de planetis omnibus dixi, abjectos a me esse circulos et orbes, regularitatemque motuum circa centra quaedam, situs et intervalli constantis, relicta planetis orbita elliptica, id jam Lunae motibus applicem. Cum enim tabulas aequationum Lunae, anomaliae solutae, computaverim per ellipticam viam et areas triangulorum, ut in planetis ceteris, quaeritur, quid me coegerit a circulari circuitu Lunae recedere, si, ut jam dixi, non sentitur in ea deflexio illa centri globi a circuli perfectione introrsum? Causas igitur duas trado: prima est, quia altera inaequalitas menstrua, de qua posterius agendum, tota causis naturalibus efficitur, sine circulis propriis; magna itaque praesumptio fuit etiam de hac anomalia solita. Altera causa, quia reliquorum planetarum motus exemplum etiam Lunae praeverunt, et quia causae eorum physicae sic sunt comparatae, ut verisimile non sit, aliquid eae regnant in ceterorum motibus, non itidem regnare in lunaribus; praesertim cum aequipollentia diversarum Lunae hypothesis in salvandis hujus primae inaequalitatis apparentis intra omnem sensus observandique subtilitatem consistat. Ptolemaeus quidem epicyclum posuit in concentrico, testatus illum paria facere concentrico simplici, cujus eccentricitas sit aequalis semidiametro epicycli, qualem eccentricum et in Sole posuerat. Copernicus epicyclum eundem retinuit, quod primam hanc Lunae anomaliam attinet. Cum vero Tycho Braheus videret, nimiam esse hanc eccentricitatem, nimiam epicycli diametrum, nec conciliari cum parallaxibus et umbrae diametrorum varietatibus, consilium cepit tale, quale Ptolemaeus in eccentricis planetarum ceterorum. Sed quia in iis Ptolemaeus centrum posuerat aliud eccentricitatis duplicis, circa quod regularis esset incessus planetae, eoque totus eccentricus, ut supra dictum, circa proprium centrum inaequalis per diversa tempora motus sentiebatur, idque incommodum Copernicus in planetis effugerat duplicatione vel epicycli, quem pro eccentrico amplexus erat: hic Tycho, Copernico magis addictus, etiam in Luna duplicavit hujus primae et solutae inaequalitatis epicyclum, quorum in Luna nondum adspiraverat Copernicus. Post Tychohem ego, causas non in epicyclos, sed in rationes vectis et librae naturales referendas statuens, quibus planetae iter ellipticum efficeretur, easdem etiam in Luna statui.


Oritur et quinta hypothesis P. Aiberti Curtii S. J., amici mei Uranici, pulcherrimi ea ingenii; quae cum libram mihi relinquit, ad formandum iter ellipticum, rectem tamen eripit: aream sc. trianguli aequatorum Ptolemaicum, focorum ellipsis alterum, circa quod anomalia media aequalibus ordinetur angulis, sed quae in effectu longitudinalis, quam hic spectamus, cum aequante Ptolemaico penitus coincidit.

En ergo typum omnium et in ejus arearum aequationibus in Luna quidem propinquitatem numerorum inopinabilem:

	In anomalia mediis			Semidiametri epicyclorum sive eccentricitates.
	44° 42' 16"	90° 29' 52"	131° 49' 39"	
Per eccentricum perfectum vel epicyclum simplicem in concentrico.	3. 18. 19.	4. 59. 20.	3. 46. 22.	8724 Ptolemaei et Copernici.
Per vectis et librae rationes.	3. 22. 58.	4. 59. 59.	3. 41. 3.	4362 Mea.
Per eccentricum vel ellipticum et punctum sequatorium.	3. 24. 18.	4. 59. 55.	3. 38. 43.	Ecc. 4362 Ptolemaei in planetis Aeq. 8724 et P. Curtii.
Per duplicationem epicycli.	3. 25. 26.	4. 59. 33.	3. 37. 29.	Maj. 5832 Copernici in planetis Min. 2916 et Tychoonis in Luna.

Longissime scilicet Tycho, Copernicum in planetis imitatus, recessit a Ptolemaeo et Copernico in Luna ad 7 et 9 scr. usque; medium, sed Tycho propterea tenemus Ptolemaeus, a planetis tractus in Lunam, et ego mediusque Curtius. Quos inter cum observatio longitudinis Lunae iudicium ferre nequeat, quippe de 2', quid causae sit, cur non causas naturales vectis, quas requirunt ceteri planetae, probat ratio, nadiam etiam in Luna, sequente facilitate calculi, etsi de hoc cum Curtio jam nominato certamen mihi est aequalitatis. Quia, quod hanc attinet tabulis jam confectis nihil amplius interest ntentis, quanta facilitate sint computatae. Satis itaque de prima Lunae aequalitate, soluta dicta.

Horrocius Kepleri theoriam et ea, quae de Venere fol. 160 digerat, sic explicat: Sit A Sol, FLGK orbis Terrae, cujus centrum C esto, HBME orbis Veneris et ejus centrum D. Sit F perihelium Terrae (vel Solis perigaeum), G ejus aphelium; aphelium Veneris sit E, perihelium B, nodus boreus H, limes boreus M, austrinus O. Ratio jam, cur latitudo Veneris borea BI major est quam austrina NE, ab eo venit, quod orbis Terrae (cujus major est eccentricitas) ad orbem Veneris magis appropinquat, quam hic ab illo recedit.



ratio utrobique sit eadem.

Haec breviter ad explicandam hanc Kepleri hypothesin, cujus sana pulchritudo ex eo conspicua magis est, quod unico orbe contenta totum illud praestet (idque facilius exactissime), quod Ptolemaei nescio quot fragmenta vix possunt, qui tria saltem latitudinis elementa introduxit ad salvanda ea, quae Keplerus uno solummodo perfecit. Quam compendiosa igitur adeoque naturae maxime consonantia est haec de motu Terrae hypothesi, quae non solum minimo apparatu efficit ea, quae a veteribus mille cyclos, epicyclos, eccen-

79) p. 466. In Tab. Rud. Cap. XXVI, agit Keplerus de „*Menstrua Lunae anomalia et aequationibus*“ et haec ad historiam illarum affert: Transamus ad alterum genus anomaliae, menstruum, seu ad copulas et quadraturas Solis alligatum, cujus causa teorism de Luna fuit agendum in his praecipua. In hac anomalia multo patebit evidenter, causas motuum esse physicas ac propterea non injuriam a me factam vicentis et orbibus centrisque, angulos in tempora admettentibus aequabiliter, quod his valedixerim. Ptolemaeus, cui menstruarum inaequalitatum una sola erat nota, cum videret, aequationes Lunae, de quibus haecenus, provenire majores in quadris quam in copulis: ut hoc assequeretur positionibus suis calculumque huius observationi conformaret, epicyclum Lunae, quem prioris solutae inaequalitatis causa introduxerat, docuit, motu vero et reali ad Terram sese demittere his in mense, sc. in utraque quadra.

Hoc ita creditum fuit astronomis neque ad Regiomontanum, qui vidit, si epicycli aequationes ex appropinquatione fierent majores, fore ut et corporis Lunae diameter in quadris repraesentaretur major semisse ejus, quod habet in copulis; hoc vero cum redargueret observationes, falsum igitur apparuit illud tantae appropinquationis dogma. Copernicus, hac causa phaenomeni convulsa, substituit aliam, realem et ipsam, epicyclos duos pro Ptolemaico uno; majorem quidem, qui centrum minoris veberet, minorem, qui Lunam ipsam, in quadris eam praestans remotissimam a centro majorem.

Quid faceret Tycho, totus perfectioni motuum tunc addictus, in circulis perfectis? Copernicum imitari etiam in menstruae inaequalitatis positionibus erat difficile; jam dudum enim propter solutam anomaliam duos receperat epicyclos, quorum jam reponeret tertium, quem Copernicus dedit anomaliae menstruae? Nimirum ex orbe Lunae decerptum Terrae applicuit, centrum ejus locus in linea, quae parallela esset lineae apogaei epicycli. In hujus, jam non epicycli, sed hypocycli circumferentia fixum centrum orbis Lunae, duos priores epicyclos deferentis, sic incedere jussum est, ut in copulis veniret in ipsum centrum Terrae, in quadris ab eo longissime omnia recederet. Et tamen adhuc aliam Tycho variationem deprehendit, inobservatam a veteribus, cujus electricae machinas non est ausus inferre systemati orbium Lunae; transcripsit igitur eos ipsi zodiaco. Oculos aperuit illi tandem haec inaequalitas ultima. ut videre inciperet, non circulis realibus, sed causis naturalibus aliis has inaequalitates effici.

Quid ego, Tychone mortuo? Dicam verbo: nodum Gordium nihil attinebat solvere, secui. Post diutinas enim contempestiones, post transformationem non unam (quales videre licet vol. III. p. 644 ss.), tandem apparuit, anomaliae menstruae causa nihil mutandum nec in figura orbitae Lunae, nec in ejus intervallis; omnem enim eam sequi rationes illuminationis, ad quas motum ejus incitationes refractionesque naturales seu vi lucis ipsius, seu ministerio animi accommodarentur.

Demonstrationes ipsas longum est hic explicare; petat eas, qui desiderat, ex Epitoma Astronomiae. Magis est ex instituto praesentis operis, schematum explanatione fundamenta struere calculi, ut his ignoratis inamoenior fiat calculi labor, per se satis laedens ob miram cautionum varietatem, quas parit haec non posita de novo, sed ultro ex natura oblata hypothesis.

His praemissis Keplerus schemata sua explicat octo, quorum supra (ann. 78) mentionem fecimus, et pergit: Cum antecessores nostri coacti fuerint solius hujus aequationis menstruae causa reales eccentricos et reales motus totius sphaerae Lunae de novo introducere, hic a me solum hoc ponitur, aequationem secundam esse ex hoc accidentario concursu eccentrici cum circulo illuminationis. Et veteribus quidem liberum fuit, eam iustitiae rationem positionum suarum (quaeunque elegissent), ut eae modos etiam placitos reciperent, aut, nisi hoc facerent, eos repudiare; me concursus iste accidentarius, pro causa rei receptus, confestim totum ad leges suas proprias, extrinsecus allatas, alligavit, ut nulla libertas esset, eas fingendi ad exemplar destinati effectus. Quedsi ego causam rei perperam collocassem in hunc concurrum illuminationis accidentarium, quaevis qui fieri potuisset, ut ille in effectum

tot modis exprimendis adeo propinque conveniret cum eccentricis vel epicyclis veterum?

Miramur hactenus, quid causae subesset, quae effecisset, ut aequationem hanc menstruum Tycho praecise dimidiam faceret anomaliae solutae, cum causa non pateret. Verum in tibi causam ex hac physica hypothese, sane quam concinnam: eccentricus Lunae altius a plano circuli illuminationis emoveri non potest, quam fert ejus eccentricitas realis. Triangulum igitur, cujus area metitur aequationem menstruum, hanc longiorem acquirere non potest, quam illud prius, quod aequationis solutae partem physicam metiebatur; pars vero physica semissis est aequationis solutae totius. Cur autem tantumdem faciat Lunae discessio a centro Terrae, quantum a circulo illuminationis, id indaginis est altioris. Et tantum de aequatione menstrua priori, quae Ptolemaeo erat nota.

Restat, ut alteram anomaliae menstruae aequationem explicem, quam Tycho inventor variationem indigetavit, cujus a priori hoc est discrimen, quod prior quidem per diversos anni menses naturales fuit diversae quantitatis, ista per omnes anni menses est eadem. De ejus ortu causisque quantitatis quae subtilia disputavi in Epit. Astr. (fol. 364.) magna probabilitate, hic praetereo, ad fundamenta calculi properans. Tycho igitur calculum rexit suppositione duorum circellorum sub ipso zodiaco, defixo majoris centro in loco Lunae prope vero, ut contraria revolutione circelli minoris in majori Luna per diametrum majoris, orbitae Lunae subordinatae, rursus prorsumque reciprocaret motu librationis, ut apud Copernicum puncta aequinoctialia. Haec hypothesis est apta calculo, a causis rei longius abit. Ut igitur etiam in hac aequatione teneamus institutum, suppositis causis naturalibus, ubi illae potissimum regnant ipsius Tychonis confessione, conjiciemus oculos in planum circelli, quem eccentrici centrum scribit circa Terram. Nam causa variationis est incitatio lunaris motus circa copulas, incitatio vero haec fit in proportionem sinuum complemeuti elongationis loci Lunae prope veri a Sole. . . . Demonstrationem habes in Epit. fol. 476. Sed computatur area REAX additione trianguli RXA ad sectorem RAE. Revertimur igitur ad computationem trianguli, ut in superioribus aequationibus, quae hic omnium est facilissima, quippe ut rectangulorum quadrantis, et aequivalent area RXA excessui incitationis per ER supra mediocrem, i. e. ipsi variationi. Quod vero haec ratio computandi exactissime aequipollat diametro librationis Tychonicae, demonstratum habes dicto loco Epitomes.

Etsi vero minor est circellus iste, quam ut ejus area aequiparari possit effectui huius variationis, quippe quae in priori menstrua aequatione formavit nobis haec rectangula quadrantis, quantitate minima, vix subduodecupla praesentis; at sufficit nobis ad institutum proportio ipsa rectangulorum inter se mutua; quantitatem maximo eorum licet assignare ab experientia Tychonis, ut sit $40' 30''$ (cf. p. 366.), vel etiam a speculatione causarum, ut sit paulo major. Sic igitur triangula, quae in circello per B descripto formantur, duo sustinent officia, unum proprium, in priori menstrua explicatum, metiendae inaequalitatis triangulorum collateralium BNZ, BOZ, ubi quantitatem genuinam determinant ipsa; alterum vicarium, in dispensanda quantitate variationis, extrinsecus recepta. Et ad primum quidem officium administrandum terminabantur illa ad centrum eccentrici, at si jam nobis hanc operam vicariam locare jubeantur, terminari debent ad sectionem circuli a linea motus Lunae prope veri factam. Si vero cui non placet haec in circello opera aliena et vicaria, poterit in pro variatione dispensanda scribere centro A circellum quantitate justa, cujus semidiameter sit ad BA in proportionem semidodecupla, i. e. ut 15800 ad 4362. Satis et de hujus aequationum hypothese.

80) p. 469. In triangulo CAB ad C rectangulo dantur $AB = 0,04362$ et $\angle A = 36^\circ$, hinc $AC = AB \cdot \cos. A$. Keplerus quaerit in tabulis suis logarithmum numeri 43690 summe addit $\log. \cos. 36^\circ$; summa 104158 in tabulis adjecta est numero 35290, quo per 10 divisio praedit eccentricitas 3529 (vel 0,03529).

81) p. 471. Quam dicit Keplerus specularem tabellam inventisse in Tab. Rud. fol. 82, numeros vero quos Keplerus hic nimis concise exponit, illo non disprebendes. In

«praeeptis» 115, processum sine illa tabula explicat, illamque explicationem secuti sic nos rem absolvimus:

Log. 48' 33" = 21193 (ex «Heptacosiadis» columella inscripta sexagesima scrupula), log. 42' 24" = 34700; summa = 55893 ibidem prodit 34' 19". Hujus quantitatis duplum et dimidium addita conficiunt summam 1° 25' 47" (h. e. $\frac{1}{2} \cdot 34' 19"$).

Ex descriptione tabulae scrupulorum menstruorum etc. haec desumimus. Tabula dividitur secundum latitudinem in partes tres. Sinistri limbi sinistimae partis in fronte et calce adscriptum habent titulum argumenti menstrual (0 — 60 et 180 — 240), dextrae partis limbus exterior complectitur argumenti anni quadrantem auctum (270 — 330), interior quadrantem minutum (90 — 30). Pars media habet scrupula menstrua pro calculo usitata et eorum logarithmos pro novo Neperiano, quem in hoc opere trado potissimum omnibusque suadeo. Hujus partis mediae respectu, quae communes praebet ingressus utriusque partium lateralium limbis, numeri in limbis partis sinistrae sunt argumenti menstrual gradus integri, id est arcus eccentrici Lunae, incepti a puncto P (Fig. 89) vel a puncto Q (puncto A in linea IK supra NO elevata ad sinistram, vel in PQ vel ad dextram lineae PQ existente) et terminati in locum Lunae, quem is obtinet in eccentrico, ratione primae aequationis, dissimulata jam variatione. Ex qua descriptione patet, differre argumentum menstruum ab elongatione ☽ a ☉ principio, quod alternis capit nunc a ☉ nunc ab ejus opposito, nec ab ipsissimis eccentrici punctis in linea copulari HAG sitis, sed a respondentibus in ejus parallela PBQ; differt subjecto: elongatio enim est angulus ad visum, mensuratus a zodiaco, hoc argumentum est arcus eccentricae orbitae Lunae; differt et quantitate numerationis crebro, propter utramque causam. Gerit autem quilibet limbus suum titulum, quem tandem aequationis parti competentem, ubi ea fuerit confecta, transmittat.

Huius argumento menstruo respondent in eadem linea et parte media scrupula menstrua, quae sunt $\frac{1}{2}$, de area trianguli super BZ, maxima omnium in mense pleno, stricti. Ut si Luna in D et PD 30°, inveniretur PNQD 330°, in limbo partis sinistrae dextro exteriori. Scrupula igitur 30' in parte media cum log. suo 69320 significant aream trianguli DBZ (puncto A cum Z coincidente). Etsi vero mensis non sit ex plenis, ubi BZ non est maxima et aequalis ipsi AC, nihilominus exhibetur hoc triangulum (vel ejus $\frac{1}{2}$) tanquam in mense pleno.

Argumentum annum est angulus HAD digressionis Solis ab apogaeo Lunae. Et sunt DAI quadrantes diminutae numerationis, quippe infra 90°, qui ipsi dispositi sunt in dextrae partis limbo sinistro. Areolae, limbis bujus dextrae partis interjectae, per solos hos limbos argumenti anni excerpandae, titulo «particulae exsortis», sunt arcae trianguli BAZ . . . Praeter hanc particulam exsortem hoc argumentum annum excerpit etiam ex parte media communi scrupula vel eorum logarithmum; illa vero tunc sunt vere scrupula proportionalia, capiant enim de triangulo BAZ, taquam ex plena eccentricitate computato, partem proportionalem eccentricitati ejusque mensis non pleni.

Sinistrae partis limbis utrinque binis interjecta est variatio, Tychoonicae quantitatis, verum tunc numeri limborum non amplius sunt arcus eccentrici, sed sunt angulus ad visum seu arcus zodiaci a vero loco Solis numerati usque ad locum Lunae, duabus jam aequationibus prope verum redditum. Quia vero majoris paulo variationis magna est verisimilitudo, exhibere eandem visum est in tabella fol. 83, ut sit confusionis tanto minus. Tabula est artificiorum spinis obsita et tactu aspera; fateor, sed hoc est omnino ingenium hypotheseos, a natura lucis suppeditatae, cui erat obsecundandum ad omnes notus. Id si quis poterit praestare opera parviori, laudem is dexteritatis reportato.

Praemissa Kepleri verba ut lector facillius comprehendat, apponendum censuimus specimen tabulae scrupulorum menstruorum etc. ad numeros supra positos pertinentes, nec non lineam supremam et infimam.

Argumentum menstruum.		Variatio Tycheicae Addae.		Argumentum menstruum.		Serapula menstrua.	Logarith- mus communis.	Particula excess.	Argum. notum.
Subtr.	Adde.	Subtr.	Adde.	Subtr.	Adde.				
0.	180.	0' 0"	180.	360.	0' 0"	1000000.	90.	0' 6"	270.
.
.
.
30.	210.	35. 4.	150.	330.	30. 0.	69320.	60.	2. 57.	300.
.
.
.
60.	240.	35. 4.	120.	300.	51. 58.	14380.	30.	2. 57.	330.

82) p. 477. Circa floem capitis XXVI, Tab. Rud. absoluta variatione Keplerus complures addit regulas, ad motum Locae pertinentes, quae maxima ex parte usum tabularum respiciunt. Quia in hac editione operum Kepleri iustas ob causas tabulas numericas Rudolphinarum omisimus, etiam regulas illas, quae sine tabulis nullius sunt momenti, praetermittimus, ablegantes curiosum lectorem ad ipsas Tabulas Rudolphinas, quae passim in bibliothecis exstant. Hic ea tantum inseruimus, quae siue tabulis illis mente completi possunt.

Præceptum 122: Aequationem luminis seu menstruam compositam formare. Primo exquiratur aequationis menstruae pars competens, tanquam elementum unum, eique et fermentatae et reductae ad anguli valorem titulus suus apponatur. Secundo ablato loco Solis vel opposito Solis a loco Lunae ficto, constituatur ejus elongatio, cui aequatio menstrua vel addatur vel dematur, prout titulus ejus voluerit. Tertio cum elongatione sic aequata, ut sit prope vera, ex tabulis mensuris excerpe variationem, vel Tycheicam diminutam vel demonstrativam auctam, prout te libido tulerit vel auctoris sequendi vel fidem alterutrius periclitandi per comparisonem observationum: haec erit elementum alterum; et appone eidem titulum, variationi superpositum vel suppositum. Quarto, si tituli elementorum fuerint similes, redige illa in unam summam, addito communi titulo, si dissimiles, subnecto minori colloca residuum, apposito titulo majoris: ita formata erit composita aequatio luminis.

Cum haec aequatio menstrua, orta simplicissime, tantum crearet molestiae in computando, visum est calculatoribus minus otiosis succurrere computatione tabulae peculiaris, quae omnem hanc varietatem exsequeretur exhiberetque id tantillum quod quaerimus ingressu unico. Habes igitur in ea vicennalium curarum partem non exiguam: toties illa est scripturis, picturis, machinis, calculo multiformi facta atque relecta, donec vim hypotheseos omnem et complecteretur, et quanta potuit brevitate redderet. Secutus hac in parte Hebraeos astronomos, quorum tabulas hebraico characteres vidi, incidentes per senos anomaliae Lunae, singulos elongationis Lunae a Sole gradus; secutus Origanum quadamtenus, qui utramque aequationem, tam solutae quam menstruae anomaliae, conject in unam summam sectique omnem ejus seriem tantum adjectoris, detracta, ut hoc posset, epochae motuum mediorum quantitate idonea. Sed hi nihil dum de variatione vel sciverant vel intexerant. Duce igitur facti profiteor magis accuratum Maginnum, qui in Supplemento Ephemeridum totas 52 facies in texturam hujusmodi tabulae insumsit, cum ille tamen nondum his legibus adstringeretur, ut semicirculos totos dissimiles efficeret interventu particulae exortis, qua ratione duplicatus illi fuisset numerus facierum, futurus 104. Incessit autem per tertios anomaliae, singulos elongationis Lunae a Sole gradus. Mihi etiam haec multitudo foliorum fagienda est visa, cum expertus sim ex replicatione tot foliorum et inquisitione per ea argumentorum laborem et taedium, addere et damnum oculorum nasci, non leviter dissimulandum. Sic igitur egi: 26 apertiones foliorum Magini, vel

etiam, si naturalem ille hypothesin exprimere juberetur, omnino 52 contrari in unam, transcripta menti parte molestiae, quam erant oculi subituri soli, ut ea partem nonnullibi colligeret proportionalem, cum tabulae frontes per quinos solos gradus, margines per ternos saltarent.

Præceptum 124. *Quomodo per viam directam et astronomiae veteri magis accommodatam computandus sit Lunae locus in orbita ex his tabulis?* Initio computetur locus Lunae fictus per primam sc. anomaliae solutae aequationem. Quodsi contingat, ut simul eodem momento Luna Soli exacte conjungatur vel opponatur, fictus iste locus simul etiam verus erit. Etai vero non coincidat copula, tamen utilis erit fictus iste locus tam ad indagandam vicinam copulam sine ulteriori aequatione (cujus usus respectu locus hic fictus dicitur), quam ad computandum veram locum mediante aequatione luminis.

Si vero quaerendus est locus Lunae extra copulas nec propter copulas, gemina via potest pergi. 1) Vel ponendo locum fictum ut verum et correctione anomaliae mediae ut supra; ubi fit saepe, ut videatur quaerendus locus Lunae, sed consultius est, eo vel posito, ut jam noto, quaerere et corrigere ipsam anomaliam mediam. Ut si jubearis ad boram observatae $\odot \bowtie \odot$ quaerere locum Lunae, praestet, posito loco \odot pro vero \bowtie , quaerere anomaliam mediam et sic tempus idque comparare cum tempore tradito, quia hoc facilius est. 2) Vel pergitur cum ficto ad exquirendam aequationem luminis: tunc facillimus quidem est labor per tabulam, ut excerptam ex ea luminis aequationem, prout titulus ejus voluerit, vel addamus loco ficto vel detrahimus, eritque inventus locus Lunae in orbita. At quia luminis aequatio non excerptur satis ad gustum curiosorum exacta, sumant ergo illi sibi laborem hand parum sane molestum, excerpti ex tabula scrupula menstrua, exsortem, et per ea formandi aequationem hanc, eaque utantur eodem modo.

Caput XXVII. *De latitudine Lunae menstrua, ejusque tabulis.* De circuitu nodorum retrogrado, soluto a legibus mensis, et de simplici latitudine Lunae, quam habet illa ex suo eccentrico (nunquam tamen puram, nisi in copulis), vel ipsius Lunae (secundum Tychohem) vel nodi cum Sole ejusve opposito, de hac, inquam, ejusque tabula egi in capite XXV. (ann. 78.). Quidquid illi accedit insuper ratione mensis, totum ex inventionem Tychoenis est, etai vestigia fortitau aliqua licet observare in nonnullis veterum observationibus. Non est autem res adhuc ex omni parte liquida. Tycho enim, cum angulo parvo inclinatam habeat orbitam Lunae in copulis, etiam parvo angulo Lunam emittit e copulis, cum nodis Lunae existentibus. Id vero deprehendi ego valde adversum esse observationibus eclipsium, ut quae omnino testantur de angulo tanto, quanta fit in quadraturis Lunae latitudo; quasi una et eadem inclinatio bujus eccentrici ad eclipticam maneat toto illo mense, quo Sol obambulat loca nodorum, Lunaeque non tantum in magnam tunc latitudinem $5^{\circ} 18'$ evadat in quadris, sed etiam aequali ei angulo incipiat excurrere a Sole. Atqui si constans semper maneret angulus magnus per totum iter Lunae a Sole ad ejus quadratum, non posset Luna, cum nodos invenit in octantibus, latitudinem nihilo minus habere parvulam, quam tamen Tycho observationibus idoneis comprobavit.

Ob hanc perplexitatem diu admodum versatus sum in magnis erroribus, cum altera manu medicinam afferrem eclipsibus, altera eam rursus subtraherem, relapsus in aequipollentiam Tychoenicam, ut jam statim apparebit, si tamen unum hoc monuero, tum demum eandem praestari per has hypothesas, quae per Tychoenicam Progymnasmatum, si eae iisdem etiam quantitativis applicentur. In quibus quid inter utrumque diversitatis intersit, operae pretium est, diligenter observare in præcepto sequenti. Illud commodius hic moneo, me nodi locum ad nostra tempora promovisse ad $25'$.

Quae igitur ex hac promotione diversitas in latitudinem redundat, ea prius detrahenda est de differentia Tychoenici et mei calculi, tunc demum de aequipollentia hypothesium ferri poterit judicium sanum.

Ergo ad opus. Præceptum 125. *Veram Tychoenicam exquirere latitudinem.* Veram dico cum adjecta limitatione, ut intelligas, ex Tychoenis sententia veram hic

quaeri, non tamen absolute veram, cum eclipsium doctrina correctionem ejus aliquam requirat.

Ad hanc igitur Tychonicam inquirendam duas trado vias aequipollentes cum inter se, tum etiam cum via, quam Tycho in Progymn. T. I. docuit, quantum eisdem assumpta patiuntur. Nam ut in Prolegomenis Ephemeridum docui, maximam Tycho latitudinem simplicem assumpsit $4^{\circ} 58' 30''$; aequationi longitudinis aequalem, excessum 19, summam utriusque $5^{\circ} 17' 30''$, ego vero assumo illam quidem $5^{\circ} 0' 0''$, meae itidem aequationi longitudinis aequalem et observationibus Tychonicis convenientem, augmentum vero 18', summam $5^{\circ} 18' 0''$, fero quantum et Tycho.

Prior via est haec, ut primum in parato sit distantia \mathcal{D} a \mathcal{Q} ut praeepto antecedenti; deinde auferatur locus \mathcal{Q} vel \mathcal{Y} a loco \odot vero, ut reatet distantia \odot a \mathcal{Q} vel \mathcal{Y} ; tertio hac quaesita in tabella augmentationis menstruae excerpatur et adservetur augmentum anguli soluti (hanc Tycho excessum appellat, aliter tamen instructum; quippe qui etiam aliter excerpitur apud ipsum), excerpatur etiam prostaphaeresis nodi \mathcal{Q} annua, cui titulus est ab aequipollentia Tychonica, cum suo titulo. Quarto per hanc prostaphaeresin jam corrige distantiam \mathcal{D} a \mathcal{Q} antecedente aequabilis. Neo patitur se hic impediri calculator in Progymn. Tychonis exercitus, quod videt contrarium juberi a Tycho; non enim est vere contrarium, sed requirit sic differentia formae prostaphaereseon, quae Tychoi menstrua est, mihi annua, mira tamen et inopinabilis aequipollentia. Quinto cum distantia \mathcal{D} a \mathcal{Q} vero jam constituta ex tab. lat. simplicis excerpatur latitudo. Sexto, jam sumta hujus latitudinis pars quinta pro scrupulis proportionalibus, multiplicetur in anguli soluti augmentationem excerptam et asservatam; quotiens addatur latitudini, per distantiam \mathcal{D} a \mathcal{Q} vero excerptae: sic absolvetur Lunae latitudo, quae est ex Tychonis sententia vera.

Multiplicationis logisticae taedium evitabit calculator usui logarithmorum.

Praec. 126. Altera via est ista: Primo sint in parato distantia \odot a \mathcal{Q} , \mathcal{D} a \odot et \mathcal{D} a \mathcal{Q} aequabilis et per hanc latitudo simplex cum suo titulo ex tabula, ut prius. Deinde cum distantia \odot a \mathcal{Q} ingressus tabulam augmentationis, excerpere inclinationem limitis, non soluti, sed menstrui. Tertio cum distantia \mathcal{D} a \odot in tab. aequationis menstruae, quaesita sub titulo augmenti menstrui, excerpantur scrupula menstrui vel eorum logarithmus, et vel illa in jam excerptam inclinationem multiplicentur, vel ille log. ad hujus log. addatur: utroque modo invenietur latitudinis portio menstrua. Titulus autem huic portioni accedet ex eo limite soluto, non qui erit vicinior Lunae, sed qui cum Luna versabitur in eodem semicirculo, a Sole incepto. Quarto comparentur tituli tam lat. simplicis, quam portionis menstruae; et siquidem fuerint idem, jungantur portiones fietque latitudo vera Tychonica, partibus cognominis, sin diversi sint tituli, minor portio a majori auferatur, residua erit lat. vera Tychonica, titulo elementi majoris retento.

83) p. 478. Tabulae Rud. ad quaestionem „Veram pro eclipsium etiam necessitate latitudinem quomodo inquiremus?“ respondent: Quantum ad hoc, ut omnes latitudines hypothesis eadem complectatur et inter se consensu connectat, perpendendum est, eclipses fieri non tunc tantum, quando Sol nodis exacte jungitur, sed etiam tunc, quando ab iis abest quantum permittunt termini eclipsium. Si ergo haec magna limitis inclinatio in copulis cum discessu Solis a nodis sic minuitur, ut ex forma imminutionis nascatur libratio nodorum annua, paria faciens cum forma menstrui Tychonis, tradita in Progymnasmatibus, ergo id, quod dederat anguli mei magnitudo latitudinibus eclipsibus, prostaphaeresis annua nodorum rursum eripiet. Atque hoc mihi contigit in Epitoma Astr. (p. 467. 478. 479.), cum librationem limitis menstrual instituissem super axe, qui esset lineae copularum alligatus: cum interim tamen in Ephemeridibus eam librationis limitis rationem secutus essem, quae fit super axe soluto a Sole, sc. super

linea nodos et centrā Terrae connectente; quā ratione, si nulla sit prosthaphaeresis nodorum annua, tollitur latitudo Lunae, in nodis et octantibus versantis, contra observata Tychonis. His de causis mediam viam incedere coactus fui, introducta geminata prosthaphaeresi nodi annua (vel trimestrali), velut a novo et separato principio, ut ea, nodo cum Sole existente, contentae quantitatis esset, in octantibus vero totalis et Tychonicae menstruae par, et mera quidem cum Tychone aequipollentia, tunc, cum nodus asc. vel desc. abest a Sole 45°, ante vel post; cum vero nodus est propē Solem, non mera. Sic cum disgressa quidem Solis a nodo tarde creascunt scrupula, partem de priori prosth. sumentin, et cum appulsa Solis ad nodum asc. tarde rursum implentur: ut sicut ea non ex scmidiametrali sed ex diometrali libratione, qualis est etiam augmentationis ipsius. Hypothesin et causas naturales cognationis aliquid habere crediderim cum negotio variationis. Inquisiturus igitur veram latitudinem, tanquam pro eclipsium exigentia, debet in ceteris uti modo sen via prima inquirendi Tychonicam, tantummodo ne prosthaphaeresses nodi excerpat ex columella Tychoni tributa, sed ex ea, quae ab eclipsibus titulum gerit.

84) p. 483. In Mss. Pulkov. vol. XVIII. hanc deprehendimus demonstrationem, quam ad hunc textus locum referendam censuimus, „*horarum occasus Lunae crescentis vel ortus Lunae decrescens nocturnam indagare.*“ In heptacosiae sub quadrivicenaria (canonis logarithmorum) quae latitudinem Lunae, quam illa habuerit in meridie, et e regione excerpe logarithmum, qui semper est positivus. In tabula signum latitudinis loci Lunae in fronte vel calce, gradum in margine sinistro vel dextro quare et ex communi area excerpe log. cum suo signo positivo vel privativo, secundum quod signum fiat additio logg. cossica. Summa in heptacosiae sub quadrivicenaria exhibet gradus et minuta differentiae coorientis loci Lunae, qui est in ipso meridie. Hanc subtrahat si sept., adde si lat. merid. fuerit ad locum \mathcal{D} in meridie: ita habetur gradus coorientis loco Lunae, quem illa habuerit in meridie.

Pro occasu crescentis. Tunc quare exorientem gradum loco Lunae opposito per lat. oppositam, ut supra.

Continuatio. Ex tabula domorum quaesito sub prima domo gradu coorientis loco \mathcal{D} vel opposito meridiano, excerpe AR. M. C., cui appone AR. loci \odot et factā subtractione huius ab illa apparebit, quanto tempore locus \mathcal{D} meridianus, vel locus \mathcal{D} meridiano oppositus post meridiem oriatur. Hoc si fiat ad 2 dies deinceps, notetur differentia ortus vel occasus loci meridiani, de ea adde partem proportionalem competentem ad horas, quibus locus vel oppositus meridianus post meridiem erat oriurus: sic constituetur hora ortus vel occasus ipsius loci \mathcal{D} , quem illa obtinebit in ipso momento ortus vel occasus.

Exemplum. 1. Jan. 1624. Locus \odot 10° 40' \mathcal{Z} , \mathcal{D} \odot 23° 46' \mathcal{M} ; lat. 2° 57' S.

L. 1. 209620 + A. R. \odot 18. 47.
28100 + 16. 0.

237720 = 2. 13'. 21" 33' \mathcal{M} .

Aliud: Locus \odot 11° 41' \mathcal{Z} , \mathcal{D} \odot 5° 40' \mathcal{Z} , lat. 3° 43'.

186530 + \odot 11. 41 \mathcal{Z} 18. 51

7300 +

193830 = 2. 28 2. 12. \mathcal{Z} 11. 39.

Dato coorientis ipsi loco \mathcal{D} meridiano, horarum indagare ortus Lunae. Arc. R. M. C. in tempus conversum, quae est coorientis in horizonte oriivo posito, aufer ab Asc. R. \odot in seq. meridie, relinquitur distantia horaria a meridie ortus nocturni loci \mathcal{D} , qui futurus est in seq. meridie. Sed ipsa Luna stans adhuc antea, oritur citius. Ut si 6. Jan. 1624 in meridie sit locus \mathcal{D} coorientis (si oreretur) 28° 10' \mathcal{S} , Asc. R. M. C., oriente gradu, h. 0. 22'. Eo meridie Asc. R. \odot h. 19. 8'. Ergo hinc aufer 0. 22, restat 18. 46'. Tot horis ante meridiem illius diei oritur, coorientis. Vel Asc. R. \odot in meridie in tempus conversam aufer ab Asc. R. M. C., quod est coorientis meridiano loco \mathcal{D} , in horizonte posito, similiter in tempus converso, proveniunt horae, quibus ortus loci \mathcal{D} meridiani sequitur ipsum meridiem.

Ut in meridie jam dicto respondeat Asc. R. M. C. h. 0. 22' ortui loci \mathcal{D} , qui erat in eodem meridie, sitque Asc. R. \odot eo meridie h. 19. 8'. Hac ab illa ablata, restant h. 5. 14; tot horis post illum meridiem oritur locus \mathcal{D} , qui erat in meridie. Sed Luna jam 5 1/2, horis ultra hunc locum est mota.

Sic, dato occidente loco \mathcal{D} meridiano, pro indagando occasu nocturno \mathcal{D} , ab Asc. R. MC., quod est occidente in horizonte occiduo posito, vel eoriente oppositi in horizonte ortivo posito, aufer Asc. R. \odot , proveniunt horae numerandae a meridie antecedenti, indicantes, quando locus \mathcal{D} , qui futurus est in meridie sequenti, occidat. Ipse igitur praesens locus \mathcal{D} citius occidit. Ut si a. 1624. 1. Jan. in meridie sit locus aliquis \mathcal{D} eique eocci dens $21^{\circ} 32' \text{ } \mathcal{S}$, oriente sc. $21^{\circ} 32' \text{ } \text{M}$. Huic autem gradui orienti respondeat Asc. R. MC. h. 10. 42'. Eodem autem in meridie sit Asc. R. \odot h. 18. 47'; ergo eo die locus \mathcal{D} , qui est futurus in meridie sequenti, occidit mane, horis 8. 5' ante meridiem. At ipse locus \mathcal{D} sub illam horam occidit prius et sic pluribus horis ante meridiem. Si ergo auferatur Asc. R. \odot ab Asc. R. M. C. dicta, restabant horae 15. 55', quibus a meridie diei 31. Dec. numeratis, occidit locus \mathcal{D} , qui futurus est in meridie 1. Jan. Ipse ergo locus ad horam propositam occidit prius.

Habita hora, quando occidit locus \mathcal{D} , qui futurus est in meridie seq., corrigitur hora occasus veri et praesentis loci \mathcal{D} , si de differentia occasum duorum vicinorum ipsius \mathcal{D} partem proportionalem distantiae horariae aut meridiem abstuleris ab hora occasus meridiani. Sic habita hora, quando oritur locus Lunae, qui fuit in meridie antecedenti, corrigitur hora ortus veri et praesentis loci Lunae, si de differentia ortuum duorum vicinorum ipsius \mathcal{D} partem proportionalem distantiae horariae post meridiem addideris ad horam ortus loci meridiani.

85) p. 485. In *Astronomia Lunari*, opere Kepleri posthumo, in quo non tantum „*planivolea*,” sed etiam similia verba fiuntur: subvolva, privolva, medivolvanum. Imaginatur enim Keplerus in hoc „*Somnio*” incolas Lunae Terram adspicientes, quam vident „*Volvam*.” „Apparet, inquit, populis lunariis globus iste in coelo perpetua cum rotatione circa suum axem immobilem; a volvendo igitur *Volen* dicatur, et Subvolvae vel Subvolvani, qui vident *Volvam*, Privoltae, qui sunt privati conspectu *Volvae*.”

86) p. 492. Probatantes Kepleri calculum adhibeamus logarithmos Briggsii: 1) In triangulo sphaerico rectangulo datis hypotenusa et altera cathetarum erit

$\cos. x = \frac{\cos. 30^{\circ}}{\cos. 10^{\circ}}$	$\log. \cos. 30^{\circ} = 9,9375306$
	$\log. \cos. 10^{\circ} = 9,9933515$
$x = 28^{\circ} 26'$	$9,9441791$
2) $\cos. x = \frac{\cos. 144^{\circ}}{\cos. 10^{\circ}}$	$\log. \cos. 144^{\circ} = 9,9079576$
	$\log. \cos. 10^{\circ} = 9,9933515$
$x = 180^{\circ} - 34^{\circ} 46'' = 145^{\circ} 14'$	$9,9116061$

3) Circulus magnus per planetarum loca tractatus bifariam secat arcum eclipticae inter circulos latitudinis, et ipsum eclipticam bipartit. Quare dimidium arcus eclipticae, latitudo alterutrius planetarum (5°) et dimidium arcus inter planetas (36°) constituunt triangulum rectangulum, in quo

$\cos. \text{dimidit. arcus eclipticae} = \frac{\cos. 36^{\circ}}{\cos. 5^{\circ}}$	$\log. \cos. 36^{\circ} = 9,9079576$
	$\log. \cos. 5^{\circ} = 9,9983442$
$\text{arcus eclipticae} = 35^{\circ} 42'$	$9,9096134$
$\text{cujus duplum} = 71^{\circ} 24'$	

Keplero prodeunt $34^{\circ} 53'$, quia erroneus $\cos. 35^{\circ} 12'$ pro $\cos. 36^{\circ}$ ex tabulis excerpt. (Ex tab. Rud. $\log. \cos. 36^{\circ} = 21198$, $\log. \cos. 5^{\circ} = 381$, differentia 20812 exhibet $\log. \cos. 35^{\circ} 42'$.)

4) Arcus inter planetas = 72° , lat. utrinque borealis = 5° . Arcus 72° basis est trianguli aequilatri, cujus vertex eclipticae polus, crura $90^{\circ} - 5^{\circ}$, anguli ad basin = 90° , angulum ad verticem mittitur arcus eclipticae, quare

$\sin. \text{dimidit. arcus eclipticae} = \frac{\sin. 36^{\circ}}{\cos. 5^{\circ}}$	$\log. \sin. 36^{\circ} = 9,7692187$
	$\log. \cos. 5^{\circ} = 9,9983442$
$\text{dimidit. arcus} = 36^{\circ} 10'$	$= 9,7708745$
$\text{arcus} = 72^{\circ} 20'$	

5) Datis in triangulo sphaerico obliquangulo tribus lateribus (60° , complementum $2^\circ 30'$ et compl. $4^\circ 35'$) quaeritur angulus lateri 60° oppositus, quem metitur arcus eclipticae quaesitus.

$$\begin{array}{rcl} \cos. x = & \frac{\cos. 60^\circ - \sin. 2^\circ 20' \cdot \sin. 4^\circ 35'}{\cos. 2^\circ 20' \cdot \cos. 4^\circ 35'} \\ \log. \sin. 2^\circ 20' = 8,6097341 & \cos. 60^\circ = 0,5 & \log. \cos. 2^\circ 20' = 9,9996308 \\ \log. \sin. 4^\circ 35' = 8,9025955 & & \log. \cos. 4^\circ 35' = 9,9986090 \\ 0,5123296 - 3 = \log. 0,00325 & & 0,9982488 - 1 \\ & \text{diff. } 0,49675 & \log. 0,49675 = 0,6961379 - 1 \\ & & x = 60^\circ 5'. 9,6978891 = \log. \cos. x. \end{array}$$

6) Itidem datis lateribus (72° , complementis 4° et 100°) prior formula, quia 100° major recto, in hanc convertitur:

$$\begin{array}{rcl} \cos. x = & \frac{\cos. 72^\circ + \sin. 4^\circ \cdot \cos. 100^\circ}{\cos. 4^\circ \cdot \sin. 100^\circ} \\ \log. \sin. 4^\circ = 8,8435845 & & \log. \cos. 4^\circ = 9,9989408 \\ \log. \cos. 100^\circ = 9,2396702 & \cos. 72^\circ = 0,309017 & \log. \sin. 100^\circ = 9,9933515 \\ 0,0832547 - 2 = \log. 0,012113 & & 0,9922923 - 1 \\ & 0,321130 & \log. 0,32113 = 0,5066808 - 1 \\ & & x = 70^\circ 56' . . 9,5143886 = \log. \cos. x \end{array}$$

87) p. 498. Cum sit $SA \parallel VB$, est $CA : CB = SA : VB$; hinc

$$\frac{CA - CB}{AB} : SA - VB = CB : VB \text{ et tunc } CB = \frac{AB \cdot VB}{SA - VB}.$$

88) p. 498. Huc „praeeptum“, quod verbum de verbo exprimit Keplerus in Tabulis Rud., in illis haec addit: Haec demonstrativa umbræ semidiameter crebro major invenitur illa, quam Tycho exhibet in Progymnasmatibus, conformatam ex observationibus eclipsium Lunae; sed illae fallaces sunt ne concursum causarum physicarum, quæ instantes sunt. Itaque umbræ latitudo, quam Tycho tradit, si ad demonstrationum diagrammata numerosque contra naturam suam pertrahatur, theoremata illa Hipparchi pulcherrima et aestimationis immensae (ut quæ umbram coelo pro scalis injiciunt) penitus evertit. Fatetur id Longomontanus, Tychois in hac pragmatia minister, ingenue, methodum hanc dicens irritam fieri frustra fuisse veteres. Parcius, inquam ego, haec artificibus obijcienda fuerant. Nam et ego diu multumque versatus in consideratione eclipsium, etsi sum expertus aliqua nocumenta a causis physicis, at ea non tanta fuerunt per omnes eclipses constanter, ut universam astronomiam everterent.

Cum ergo rationes archetypicae confirmationis trium corporum propinque admodum ad potissimas et certiores eclipses alluderent, praecipue ad principia et fines (nam insidiosiores sunt immersiones totales emersionesque), nihil dubitavi, umbram ex parallaxibus diametrica, et archetypicis et observatis, conformare, sepositis enormibus apparitionibus et culpa in causarum physicarum instantiam conjecta.

Herzoceli dictum, quæ maxima laude effert Kepleri theoriæ lunarem, exhibuimus praefatione ad „Hipparchum“, ex quo libro multa huc transtulit Keplerus, quare non superfluum videtur monere, ut comparet lector ea, quæ nostra editio affert vel. III. p. 520 ss.

89) p. 501. Logarithmos logísticos hos dicit Keplerus, qui in „Chiliade“ adscripti sunt columnas quintas, quæ inscripta est: „Partes sexagenariae“ (in Tab. Rud. base columnam inscripsit: Sexagesima scrupula in tabula „Heptagesimas logarithmorum logísticas“ inscripta). Vol. III. p. 719 s. attolimus ea, quæ ad computationem harum „partium“ intelligendum necessaria visa sunt.

Calculus Kepleri, quem in sequentibus proponit, haec illustrat: Herarius Lunæ = $29' 46'' (29' 56'')$; Solis = $2' 33''$, differentia (Herarius Lunæ a Sele) = $27' 13'' (27. 23)$. Distantia eutrerum Lunæ et umbræ iustit deliquit = $58' 53''$; $58' 53'' : 27' 13'' (27. 23) = 2 h$; residuum divisionis = $4' 27'' (4' 17'')$. Arcus $4' 27'' (4' 17'')$ in tem-

pas conversum = $\frac{4,45}{27,216} = 0,1638 \text{ h.} = 9' 50'' (9' 3'')$. Hujus duplum $19' 40'' (18' 6'')$ ad 4 horas additum prodit totam durationem.

90) p. 503. In „praecepto“ 149. Tab. Rud. haec leguntur: Si a parallaxi Lunae horizontali abstercas sesquiplum parallaxeos Solis horizontalis, reliquitur semidiameter disci. Et praec. 158: Pro duratione eclipsationis omnimodae conieciuntur in unam summam semidiametri utriusque luminaris et parallaxis Lunae, a summa vero auferatur parallaxis Solis; hac enim ratione conflatur summa semidiametrorum disci et penumbrae. Ad haec annotat Keplerus in „notis et animadversionibus ad praecepta Tabularum Rudolphi“: Humilis aliquid contigit Hipparcho meo, ut inter ejus (quippe nondum editi, nec cura ultima limitati theorematum esset unum spurium; cui cum sub-junctam viderem quasi demonstrationem, perinde ac si ea esset legitima, usus co- elisi hoc praeceptum (dr. vol. III. p. 525). Reformandum est sic: *parallaxis Lunae horizontalis tota aequat semidiametrum disci*. Eaue de causa etiam praec. 158, sic legendum: . . . *unam summam semidiametri utriusque luminaris, parallaxis Lunae et parallaxeos Solis dimidium; hac enim . . .* Et secundum hanc correctiunculam etiam exemplum ibi sequens erit reformandum, nec non et exempla in Ephemeridibus editis et Epitomes Astr. fol. 874 (503), quod miror ab adversariis meis per totos jam 10 annos mihi non fuisse objectum. Nimirum subtilitatem nuici scrupuli non curat, qui non capit.

91) p. 515. Capite XXIV. Tab. Rud. „de passionibus planetarum“ ait Keplerus: Proportionem indagare arcuum diurnorum eccentrici, Solis et planetae, opus est per se incundum, praesertim ob speculationes harmonicas, ut apparet ex mea Harmonice Mundi; in ipsa tamen astronomia pernecessarium ad stationum doctrinam, hujus scientiae proprium.

Videtur autem prima fronte facilis notitia, verum id paulo secius habet. Primum exhibetur quidem diurni medii ex tabulis mediorum motuum, ut Martis diurnus est $31' 27''$, Solis $59' 8''$; eorum uterque cum sit minor $60''$, facta igitur subtractione logarithmorum logisticorum, majoris arcus a minoris ($64594 - 1454 = 63140$), opus videri possit exactum; nam 63140 est proportio numerorum logisticorum propositorum. Et hoc quidem verum esset, si gradus unus in eccentrico Solis aequalis esset uni gradui in eccentrico Martis. Verum quia hi gradus sunt inaequales et quia rarissime fit, ut motus medii sint inter se comparandi, sidere utroque in longitudine media sui eccentrici versante, extra haec vero loca non tantum diurni apparentes perpetuo variant, nunc majores nunc minores existentes motu medio, sed ipsi etiam diurni veri arcus eccentrici ab apparentibus diurnis differunt, sc. quia hi arcus diurni nunc majores apparent, quam re vera sunt, nunc minores: tot igitur nominibus fit negotium hoc intricatius.

Sciendum est igitur, proportionem arcuum diurnorum, si loquimur accurate, ex 4 componi elementis: 1) ex proportionem amplitudinis orbium seu graduum integrorum, 2) ex proportionem numerorum, quibus medii motus diurni exprimantur, 3) et 4) ex proportionibus amborum arcuum temporaneorum ad suos medios. Verum ex his 4 elementis 2 sunt perpetua facillique negotio conflantur in unum, omnibus diebus totarum periodorum serviens, ut ita res deique ad 3 redeat elementa. Nam proportio numerorum diurnorum mediorum est proportio periodicorum temporum, sed haec est sequialtera proportio orbium vel integrorum graduum coaversae, quia, cujus est parvus numerus, ejus gradus est magnus. Ad constituendam igitur veram proportionem arcuum eccentrici diurnorum causa non tantum numeri, sed etiam quantitates, proportio graduum in compositione debet $\frac{1}{2}$ de proportionem periodorum, ut cujus est coaversa, $\frac{1}{2}$ vero subtractae a $\frac{1}{2}$ relinquunt $\frac{1}{2}$ seu dimidium de proportionem graduum in diversis eccentricis.

92) p. 523. Ex Mes. Pulkov. vol. XVII. (7. Dec. 1621). Investigatio obliquitatis eclipticae ad diversa tempora ex hypotensi Epitomes a fol. 914 ad 917 (522 s.). (Vide argumenta contra mutationem obliq. fol. 99; supra fol. 87 ss.)

Ante Christum annis 3988 secundum aera hodiernam (etsi hic error est, debuit n. 3993; at qui totus hic arbitrius, dissimuletur) positur angulus QAC rectus (Fig. 98). Ex quia, AC est $24^{\circ} 17' 40''$ et AQ $1^{\circ} 47' 40''$, erit QC $24^{\circ} 11' 28''$. Videtur initio corrigenda hypothesis in eo, quod praestat initio mundi ponere perfectam aequalitatem inter AC et AQ. Itaque tunc QAC non erit plane rectus.

AC vel QC antilog. 9273

Dimid. AQ $63^{\circ} 50''$ antil. 12. 25

9260. 75

Perpend. $24^{\circ} 16' 48''$ log. 88869

AC log. 88813

log. 56 anguli AQC, QAC $88^{\circ} 5'$. Ergo in principio mundi posuimus est QAC $88^{\circ} 5'$ (log. 60 daret 88. 1.) Certitudinis causa ex fol. 258 (236) utar alio processu. Sit enim CAQ isocles: AQ 1. 47. 40 log. 346370

AC 24. 17. 40 " 88813

diff. 22. 30. 0 Summa 435183

QC 24. 17. 40

diff. 1. 47. 40.

dim. 0. 53. 50

Summa 46: 47. 40 . . . 415670

dim. 23. 23. 50 . . . 92356

Summa 508026

Summarum differentia 72843 dim. 36422

44. 0. 20.

Si hio angulus est verus, oportet angulum C. prodire majorem quam 3. 58. 40.

24. 17. 40. 88813

1. 47. 40. 346370

88. 0. 40. 60

257617

4. 21 $\frac{1}{2}$. Recte hactenus quidem.

Quia operationes differunt 4', utar etiam tertio processu per sinus ipsos.

AC + AQ = $26^{\circ} 5' 20''$

Compl. 68. 54. 40 — 89812

Compl. LQ 67. 80. — 92388

2576 (: 2) = 1288

sin. 67. 30 = 92388

sin. compl. AQ = 91144

1244 : 1288 = 96584 — $88^{\circ} 2' 30''$ angulus

3416 — 1. 57. 30

3471 daret 1. 59. 20

Hae 55 facile possent in errore esse, quia desumpta

sunt ex figuris continuationis.

Etsi igitur etiam in processus secundi logarithmis magnis potest facile contingere errorculus, stabimus tamen mediae operationi potius, usurpantes angulum $88^{\circ} 1'$.

Hactenus correctio anguli AQC ex fol. 920 (524) ad initium mundi. Adhuc alius modus. Quia CAQ isocles, prius querere angulum C. Nam ut alius AC ad sin. AQ sic totus ad anguli C dimidii sinum. AQ. 0. 53. 50 415670

CA. 24. 17. 40 88813

Ut igitur tota AQ ad 4. 21. 46, ita

2. 10. 53 326857

257617

4. 21. 46 angulus C.

AC ad angulum Q

88813

346430

346370

60 — $88^{\circ} 0' 40''$

Sit jam ad nostra tempora AF $24^{\circ} 17' 40''$, AP 1. 47. 40, et PF $23^{\circ} 30' 30''$, per correctam parallaxin Solis quaeratur FAP. Differentia superior

FA — AP 22. 30 Summae log. : 435183

PF 23. 30 30

1. 0. 30 0. 30. 15 — 473320 summam diff. 132093 —
46. 0. 30 23. 0. 15 — 93956 66047 log. 31" 6' 24" PAF 62. 12. 48
QAC 88. 1.
567276 diff. 25. 48. 12

Antis igitur 3988 et 1600 id est 5588 motus competit 25. 48. 12
= 92892" (i. 5588)
= 16 $\frac{7}{5}$ "

Si in 3 annis sint 50", in 18 annis erunt 5' etc.

Hoc assumpto motu seu anomalia obliquitatis, statuitur obliquitas 23° 30' 30" anno Ch. 1585; opportune, tunc eum etiam observatum apogaeum Solis et epochae.

Jam ex argumento dato (annis 3—50") computare obliquitatem sic possumus, si ex P perpendicularium in AF quaeratur. Initio mundi fuit QAC 88° 1', aufer 17° 52' 15", PAF 70° 8' 45", log. 6128, log. AP = 346370; summa log. perpend. 352498
1° 41' 20", ant. AP 49.

antilog. perpend. 43. 33

QAC 88. 1. 0

5. 27 Segm. 0. 36. 30

PAF 62. 12. 48

24. 17. 40

7. 37

23. 41. 10

69. 49. 48 OAC.

Obliquitas PF paulo major.

Ante Ch. 452. 88. 1.

16. 22. 15

71. 38. 45

log. 5226

346370

351596 — f. 42. 18. — Antil. 44

49' — 34

44

(Haec tunc 24. 17 fuit media et
creationi applicata; 23. 30
minima.)

5 — 34 0.

24. 18

24. 52. obl. ecl.

Cum nimium parva sit haec obliquitas, oportet aliam initio mundi constituere epocham et celeriores reddere hunc motum argumenti. Quid si addamus quadratum, ut initio mundi fuerit in B, ut si QAC sit bodie 62. 12. 48, olim 180, diff. 117. 47. 12, motus annuus esset 1' 16". Circa 128 p. Ch. (temp. Ptol.)

1585 62. 13

1457 31.

93. 13.

Fit sic angulus major recto et perpendicularium cadit intra A sitque major iusto obliquitas, idque valde, major sc. quam 24. 17. 40. Si media obliquitas AC statuitur 24. 17 $\frac{1}{2}$, tunc AQ oportebit assumere valde magnum, ut motus anomaliae fiat celer, et sic tempore Ptolemaei fiat EAL minor recto.

(8. Dec. 1621.) Ad Eratosthenis tempora computandum argumentum ex data obliquitate; tunc constituendus motus argumenti.

Referitur Aratus sub Ol. 124, Eratosthenes sub 127. Sed anni Christi incipiunt Ol. 185. Intervallum Ol. 61 vel 58, i. e. 244 vel 232 anni. Et refert Ptolemaeus de circuli partibus 83 occupatas 11 ab interstitio declinationum.

log. 83 18682. 96 Aliter : $\frac{660 \cdot 360}{83} = 2862 \frac{54}{83} = 47^{\circ} 42' \frac{54}{83}$
72 32850. 39
55 14217. 43 25. 51 $\frac{27}{83}$ vel $\frac{1}{3}$
59783. 71
47,712 74001. 14
47. 42. 40
23. 51. 20

Diff. FA, PA 22. 30 et summa log. 435183 ut supra

23. 54. 20

1. 21. 20 — 0. 40. 40. 443700

46. 21. 20 — 23. 10. 40. 93246

Summa 536946

Summarum differentia 101763, dim. 50882 36. 57. 24

PAF 73. 54. 48 ant. Ch. 232

Hodie 62. 12. 48 p. Ch. 1586

11. 42. (702') 1818

Si ergo Hipparcho sola $51\frac{1}{2}$ tribuo, Ptolemaeus pauciora habebit. At si tempori intermedio a. Ch. annis 60 attribuiam hanc quantitatem, venient Hipparcho paulo plura, Ptolemaeo paulo pauciora. Idem ex temporis intermedii inter Hipp. et Ptol. declinatione $23^{\circ} 51\frac{1}{2}'$. Est pars $\frac{1}{30}$ minor de tota periodo, quae fuit 49320 annorum; quadrans 12330. Adde 60 a. Ch. et 1584 p. Ch. 1644 dant 702 7020

274 " 117. 274 = $25^{\circ} 37''$

annus esset $25^{\circ} 37''$. Est vero praeco. $51'$, ergo sat praecise ratio dupla. Dum igitur aequinoctia per 2 repedant, nodi Terrae per 3 repedabunt sub fixis. At in Epit. lib. VII, fol. 919 (524), numeri proditi sunt ut 3 ad 4, quia ibi epocha mundi servatur neglecta quantitate Eratosthenis, ut cui per 10 minus justo datur.

Sin autem tuemur epocham mundi ut in Epitoma, et Eratosthenis seu Hipparchaeam quantitatem, mutanda erit semidiameter et contemnenda seu remittenda sedecima circuli, quantitas obliquitatis minima, sc. 22. 30.

Datur AC et QC; datur proportio QAO ad OAP ex temporibus; dantur etiam OC (obl. Erat.), PC (obl. nostra): quaeritur AQ, AO, AP et quantitas QAO. Directa via nulla est, utendum regula positionum. Prius, cum AQ poneretur $1^{\circ} 47' 40''$ et PC assumeretur justa, prodit QAP angulus, qui divisus in data proportionem temporum constituit OC nimis brevem. Ponatur igitur secundo AQ longior, sc. $3''$

AC — AQ = $21^{\circ} 17' 40''$ log. AQ = 295000

88813

QC = 24. 17. 40 383813

3. 0. 0 1. 30. 0 364290

45. 35. 20 22. 47. 40 91825

459113

75300

QAC 86. 40. 0 43. 20. 0 37650

21. 17. 40 383813

PC 23. 30. 30

2. 12. 50 1. 6. 25 394400

44. 48. 10 22. 24. 5 96412

490812

107000

53500

PAC 71. 42. 0 35. 51. 0

QAP 14. 58.

OAP 4. 25.

OAC 76. 7. 2965

AQ 3. 295000 antil. 137

Perpendicularum 2. 54. 45 297965 " 130

Segmentum 0. 41' 0" 7

AC 24. 17. 40

23. 36. 40. Ecce res recidit in

contrarium et predit Hipparcho adhuc minor obliquitas, stante media $24. 17\frac{1}{2}$ in

creatione.

3993

1585

5578 Respondet ipsi QAP.

60

1645 " " OAP.

1645

5578 : 14. 58 = 1645 : 265.

$4^{\circ} 25'$

Sit ergo	AQ	1.	0.	0			401800
	AC	24.	17.	40			88815
		23.	17.	40			493613
		24.	17.	40			
		1.	0.	0	0. 80.	0	474100
		47	35.	30	23.	47.	40 — 90770
							564870
	QAC	88.	54.	0	44.	27.	— 35630
							493613
		23.	17.	40			
		23.	30.	30			
		0.	12.	50	0.	6.	25 — 626090
		46.	48.	10	23.	24.	5 — 92338
							718338
							224726
	PAC	37.	56.	0	18.	58.	0 — 112363
	QAP	50.	58.				
	OAP	15.	2.				
	OAC	52.	58.				22529
	AQ						404800
							427329
		0.	36.	8			
		24.	17.	40			
		23.	41.	32			

5578 dat 50, 58, qmid 1641?

Retenta obliquitate media aequali ipsi creationis 24. 17%, et nostra ut est, quaecunque suscepta quantitate semidiametri circelli, semper eandem fere prodiit obliquitas. Nam magna semidiameter parvum motum efficit. Puto vix scopum attactum iri, ne quidem per pluriarium minimam, bodierno temporis accommodatam.

Nam si AC	24.	17.	40
et PC	23	30.	30
erit AP	0.	47.	10
Et PAC	0.	0.	0

23. 51. 20 (?)
26. 20
29. 50

Hic AP 1° 47' 10"

Hic quo magis AP ad AC applicat, hoc magis etiam OC, PC manent aequales, et sic semper minor obliquitas Ptolemaica. Con-

tra, si retardato motu argumenti et divulsa AP ab AC omnia 3 momenta stipes in parvum arcum QO, differentiae QC, OC, PC erunt fere sinna arcuum QO et proportionales fere temporibus. At observa, quod in annis 3333 mutatio est facta per 26. 20, in annis 1615 per 20. 50: longe ergo celerior motus in posteriori tempore. Non potest igitur tempus inter Hipparchum et nos collocari inter Q, S, ubi fit contrarium, nec epocha teneri, ut polus in creatione sit in Q. nisi illi obliquitas maxima accommodetur.

Sit ergo initio mundi obliqu. maxima, et sit media $24^{\circ} 17' 40''$:
ergo Hipparchus et nos sumus versus minimam, sc. in V, F. Quodsi
AS status non majorem quam $47^{\circ} 10''$, tunc F, S, P erunt puncta;
et $24^{\circ} 50''$ diff. inter nos et Hipparchum erunt mera sagitta, et
 $26^{\circ} 20''$ erit sinus.

Oportet majorem statuere AS, ut nos in P simus et illa 20° 50'' occupent minorem arcum, ut tamen QO sit plus quam quadrans.

Sit QO (sen 3933) 100%, qnid 1645? seq. 41, 86. QV 117365, VF 51. 52; deb. 20. 50.
 " " 91, crit OP 26 $\frac{1}{2}$; VF 48. 12, QV 101745.

Non potest igitur esse, ut initio mundi sit in Q et hodie ante S in P, servetur proportio iusta inter QO, OP et prodeant QN, VF iusti et consoni observationibus.

At si epocha sit uno quadrante anterior loco infimo in R, tunc possibilis est casus. Sit RQO plus quam 180° — falsum.

Coagulum. I. Posita quantitate semidiametri seu distantie polorum eclipticae et regiae $1^{\circ} 47' 40''$, et media declinatione eclipticae $24^{\circ} 17' 40''$, et hodie $23^{\circ} 30' 30''$, adhuc decrescente illa, et Hipparchica $23^{\circ} 51' 20''$: epochae mundi obveniet declinatio inter medium et maximam. Ita exstititur nobis verisimilis obliquitas in principio mundi, sed planetarum nodis et latitudinibus servamus.

II. Assumpta vero etiam ad mundi principium mediocri obliquitate, dimittenda est Hipparchica et 10' diminuenda, ut sit 23° 41'.

III. Posita in mundi principio maxima obliquitate, hodie minima, et media ut prius, ponitur alia quantitas distantiae polorum eclipticae et regiae, et sic dimittitur

Fig. 104.



speculativa, tuemurque Hipparchicam quam proxime; et fit velox Hipparcheo mutatio, nobis consistit obliquitas immobilis. (In margine: Hanc excole; non magnum in semidiametro $1^{\circ} 47' 40''$ damnum).

IV. Posita in mundi principio media obliquitate $24^{\circ} 17' 40''$ et quantitate circelli polaris $1^{\circ} 47' 40''$ et crescente bodie $23^{\circ} 30' 30''$, tuemur Hipparchicam; sed motus fit celer et inter Hipparchum et nos prodit minima, quod repugnat obs.

Horum singula quid possint in mutandis fixarum latitudinibus, planetarumque inclinationibus maximis limitum et motu noderom, id vide alio tempore. — Absolvi hucusque 9. Dec. 1621.

D. 14. Dec. 1621: De III. amplius. Si media obliquitas est 24. 17. 40, et minima ante 100 annos, v. e. $23^{\circ} 26' 40''$, maxima igitur fuit $25^{\circ} 8' 40''$, et diameter tota circelli $1^{\circ} 38'$. In annis igitur 5450 a. ponatur fuisse absoluta; in semisse igitur 2725, sub Judicibus, fuisset mediocris. Et quia triens quadrantis habet semissem sinns, tertia pars de 2725, b. e. 908 addita ad 2725, ut fiat 3633, ante Cb. 360 e., habebit semissem de 48, b. e. $24\frac{1}{2}$ infra mediocrem obliquitatem, sc. $23^{\circ} 53' 10''$. Et quia intra hunc trientem augmenta sinns et arcus pene sunt aequalia et 30^e consumentur 908 annis, diminuunt obliquitatem per 24: ergo in 303 annis 10° diminuent per 8 ant per 7; ante Cb. igitur 60 annis esset obliquitas $23^{\circ} 46'$. Ita obveniret Ptolemaeo $23^{\circ} 43'$ e., dicendumque esset, ipsum nimis facilem fuisse in comprobandis ex sua aetate placitis Hipparchi, perinde ac si essent immobilia. Observa igitur, quod in hac forma III. in 300 annis variatur obliquitas per 7 vel 8 e.

Si vero periódus efficiatur major, ut dodrans diametri absolvetur annis 5904, respondeatque bes semicirculi, seu arcus 120° , ergo semicirculus absolvetur post trientem temporis annis 1968, post 300 a nobis adhuc igitur decresceret et Hipparcho fuisset $23^{\circ} 53' 20''$.

Sed ut sit Hipparcho $23^{\circ} 51' 20''$, seu potius Eratostheni ante Cb. 234 in 3760, sic agemus: posita semidiametro 49, ut antea, et $23^{\circ} 53' 10''$ 100 annis ante Eratost. se. in 3660, semissa add. 1830, efficiet 5490; tunc fuisset minima $23^{\circ} 28' 40''$; ex eo rursum cresceret, sed Ptolemaeo parva obveniret, etiamque Hipparcho minor Eratosthenica.

Amplius de IV. 3933 a principio mundi usque ad media tempora inter Eratosthenem et Ptolemaeum hactenus computavi.

Jam computabo ad tempora media inter Eratosthenem et Ptolemaeum.

Eratost. a. Cb. 232. e.	A Creatione ad Cb.	3992
Ptol. p. Cb. 130. e.	" Tych.	1585
		<hr/>
		362
		181
		<hr/>
Medium tempus	50 a. Cb.	Intervallum prius 3943
	1585	
	<hr/>	
	1635	
Intervallum	205	
	<hr/>	
	3270	
	<hr/>	
	8175	
	<hr/>	
	3943 335173 8	
	<hr/>	
	31544	
	<hr/>	
	19735 5	
	<hr/>	
	19715	
	<hr/>	
	20	

10. Nov. 1623. Haecenus id operam dedimus, ut obliquitas ad 24° perveniat ultra $23^{\circ} 51'$, quod Albategius ex Indorum vetustissimorum traditione commemorat, et ut superficies zonarum quandoque possent aequari. Haec si omittimus, facile nobis est conciliare observata Eratosthenis, Ptolemaei, Albategnii, Waltheri, Brabel. Nam a. 50. a. Cb. medio inter Eratosth. et Ptolemaeum polus in jugo hujus circelli fuisset, anno 1494. Walthero in imo. Nobis iterum crederet, Albategnio decresceret, diameter esset major $23'$, dimidia periodus 1544.

Praecognita mediocriter periodo et diametro, datur emendari diametrum. Nam si 1544 evoluit 180°, quid 181 inter Eratosth. et jugum? R. 21° a jugo ad Eratosth., 69° compl. sin. 93358, adde 100000, 193358. Hic valet 23°, quid sinus 200000? — R. 24.

Si ergo a. 1492 fuit in imo, obveniret Albategnio $\frac{1492}{609}$ Anni 772 dant 90°, ergo

609 — 71°, compl. 19°, sin. 32557. Seq. 8½, quae adde ad Waltheri 28. 20, conficiuntur 36. 30.

Praemissis haec interponit Keplerus: Die 8/12/22. Dec. 1626 vesperi consideravi diligenter, quando linea per acumina cornuum γ transiret per φ , quae stabat sub inferiori cornu ad $\frac{3}{4}$ diametri γ , quae lumine Terrae plena videbatur. Erat autem φ paulo longius a fixa (orientaliori et meridionaliori sub quinquangulo Aquarii, quam puto claram seq. in canda ζ), quam a superiori cornu, pnta e. 1 aemid. (diam. puto legendum) γ . Et videbatur φ in lineam incidisse minntis aliquam multis post ortum pedis posterioris Orionis, quia is in ortu inque horizonte liberissimo per fumos Terrae non videbatur, apparere autem coepit ex alt. 2° — 3°. Ipsissimum momentum incidentiae, quantum diligentissima attentione consequi potui, fuit tunc, quando primus egressus in curra sen prima caudae Ursae, proxima eductioni, fuit in verticali polaris; quia cum paulo post converteremur ad arcton, videbatur haec prima caudae jam non-nihil ad dextram et tunc etiam inferius cornu γ erat nonnihil ultra lineam ad ortum, dubitanter tamen. Circa hoc tempus sonuit sextam in horologiis.

Quaeratur AR. M. C. ex fol. 272 (241) Epitomes et adjectis.

Ex Tycho: Polaris 23. 2½ II, 66. 2 B. A.R. 1600. 5. 47. decl. 87. 9½ 3. 59. 34: Prima caudae 3. 10 — 54. 18 B. 189. 1. 58 10 69. 33.


Primum agamus de errore circa polarem. Ejus n. A. R. anno 1700 ponitur Procyon.

f. 276: 9' 46" — 1600 — 25. 2½ II
100 — 1. 25
1700 — 24. 27½ II

lat. 66. 2.

AE est 84° 27½'. Ergo AD 84° 55' 0"
ED 23. 25. 36. ADE 87. 47. 28. log. 74½

(C ponatur in punctum concursus linearum ED et FH)	EC 66. 2.
	CD 89. 27. 36.
Sic habet Tychn	CF 87. 43. 20.
	FD 76. 16. 35.
	AD 84. 55. 0.



8. 38. 25. Tycho 9. 46.

Ergo idem quaeram aliter ex Epit. fol. 357. (280) Prodit asc. recta 8. 39 ut prius. Longimontanus polari a. 1630 assignat mediantionem coeli 6. 42 V, cum sit lat. 66. 2. Queritur, quam ei assignet A. R.? Facile negotium, cum 6. 42 V asc. recta 6. 9. Anno vero 1000 Tycho ponit 5° 47' vel Longimont. 5. 46. Si ergo anni 30 dant 23, quid 100? seq. 1° 16½'. Mihi inter 5. 47. et 8. 39 sunt 2. 52, Tycho vero ponit 3. 59. Sed esto, sit 6. 42 non gradus V commediantis coelum, sed sit ipsa A.R. ergo a. 5. 46 in 6. 42 sunt 56°. Et si 30 dat 56, quid 100? R. 3° 6 ½'. Ergo neque Longimontani locus exactus est. In causa est, quia levissima mutatio declinationis plurimum mutat Asc. rectam, parallelus n. polaris est valde parvus.

Jam ad rem. Sit polaris Asc. R. 6. 30, decl. 87. 18. Candao A.R. 189. 19. decl. 58. 2. Praecedere cauda intelligitur, ut sit ab ea inferius locata versus dextram ad polarem usque in summo semicirculo. Et quia fere opponuntur, fuit igitur polaris in sua summa altitudine et polus parum ad sinistram. Sequitur alia causa aequationis, nondum confirmata sufficientibus observationibus.

Haec, quae prioribus annis 1631 scriptis subjuncta sunt, haud secus atque ea, quae jam sequuntur, eo consilio hic inserimus, ut specimina praeberemus lectoribus confusionis

manuscriptorum, quae excerptimas, et laboris haud exigui, quo res majoris momenti in istis lateant eliciendae fuerunt. Keplerus igitur, omittens priorem, sic ad Terrae Lunaeque motus transit.

Cum revolutio globi Terrae causetur motum diurnum, ipsa vero videatur effectus esse virtutis Solaris per modulum distantiae Solis a Terra, sequitur, variata distantia variari et vigorem huius motus. Cumque sint revolutiones 365 interrim dum Tellus semel circa Solem gyrat, earumque 187 sint tardae, 178 velociore, credibile est, quo excessu superant 187 radii longi alios 178 breves, eodem excessu 187 revolutiones longas superaturas 178 breves: sic ut ipsae quidem revolutiones aequiparentur ipsis radiis, excessus vero temporis excessibus radiorum. Atqui nimum fuerit hoc. Esto n. radia 1000, colligantur excessus

13, qui omnes sunt	18	234
10 " " "	17	170
7 " " "	16	112
6 " " "	15	90
5 " " "	14	70
4 " " "	13	52
4 " " "	12	48
4 " " "	11	44
4 " " "	10	40
3 " " "	9	27
4 " " "	8	32
3 " " "	7	21
3 " " "	6	18
4 " " "	5	20
3 " " "	4	12
4 " " "	3	12
3 " " "	2	6
3 " " "	1	3

1011

cum sint gradus tantum 182. 3. 46.

92. 3. 46.

Si ergo 360 valent rev. 5. h. 6. 9, i. e. h. 126. 9' = 7569', valeant 2° 3' 46" 43' 22". Si ergo quilibet gradus eccentrici aequales portiones capiat, tunc aequatio temporis maxima fit in 6° \pm 21' 41"; tanto sunt longiores revolutiones quadrantis primi, ut et quadrantis quarti, tanto breviores revolutiones quadr. 2. et 3. revolutionibus istis, quae ex communi theoria sunt in illo quadrante. Recte sum operatus, quia per distantias res confit, distantiae vero debentur gradibus aequalibus eccentrici. Vide proportionem 21' 41" ad 1° 1' 53": est pars tertia suae aequationis simplicis.

Oritur vero difficultas. Si Terra movet Lunam motus sui specie; eadem vero Terra causatur hanc tertiam partem aequationis temporis, sic ut gyratio una ratione temporis sit longior altera, videtur illa auctioris temporis gyratione tantundem promota Lunam, quantum gyratione brevioris, ceteris paribus. Gyratione n. movet non tempus, aut tempus hanc, sed proportionatum ad celeritatem. Qualitas n. motus est celeritas. Itaque si species motus movet, movebit etiam species celeritatis celerius vel tardius. Itaque negligenda videtur haec pars aequationis. Dicendumne, quantum remittit gyratio Terrae in celeritate (acquirens in tempore), tantum ejus speciem de virtute motrice seu de effecta in Lunam deperdere? Minime, potius in contrarium tantum etiam acquirere in virtutis fortificatione. At cur Telluris vis, Lunam movens, fortior esset in longa distantia a Sole, cum tamen Sol fortificare illam ponatur?

Idem ad aliam solutionem respondebitur, si de motu Lunae aliquid tribuantur Soli, quod varietur cum distantia; nam sic coelum \mathcal{D} in \mathcal{Z} (Sole apparente in \mathcal{D}) tardius incitaretur, cum observationes celerius velint. Res igitur cedit, ut \mathcal{Z} Lunam moveat, specie non celeritatis, sed motus sui et tempore, quod sic esse potest, si moveret quidem celeritate sua, si totum assem vinceret; sed quia id in Luna fieri non potest, ut sit in Lunae arbitrio, h. e. in ejus materiae densitate et pondere, tempus redius Lunae. Ita gyratio Terrae mensura esset, non causa periodi Lunae.

Incidit de Luna, an sit revolutiones 360 Telluris ad 12 revol. \mathcal{D} , sic $365\frac{1}{4}$, ad $12\frac{1}{2}$? (Nū sequitur.)

93) p. 524. In triangulo sphaerico AQC datis AQ = $1^{\circ} 47' 40''$, AC = $24^{\circ} 17' 40''$ deprehendas angulum C formula: $\sin. C = \frac{\sin. AQ}{\sin. AC}$

$$\log. \sin. AQ = 8,4957554$$

$$\log. \sin. AC = 9,6142917$$

8,8814447, C = $4^{\circ} 22'$. Jam prolongatis arcibus QC, AC in eclipticam, datur angulus ($4^{\circ} 22'$) et latus $24^{\circ} 17' 40''$, quere

$$\sin. x = \sin. 4^{\circ} 22', \cos. 24^{\circ} 17' 40''$$

$$\log. \sin. 4^{\circ} 22' = 8,8814447$$

$$\log. \cos. 24^{\circ} 17' 40'' = 9,9597296$$

$$8,8411743; x = 3^{\circ} 58' 40''$$

Si Kepleri logarithmis uti volueris, deprehendes $\log. 4^{\circ} 22' = 357557$

$$\log. 24^{\circ} 17' 40'' = 9273$$

$$266830 = \log. 3^{\circ} 58' 40''.$$

Tabulae Rudolphinae cap. XXXIV. exhibent praeceptum 186: *Invento argumento obliquitatis, supputare veram eclipticae obliquitatem.* Etiam tabulae exhibent jam computatas obliquitates ipsas, quia tamen formae quinque sunt (cfr. ann. 87), generaliter secundum omnes supputare docebo, quod proponitur, non excerpere. Supervacuum enim existimo, tabulas integras prostaphaerescon obliquitatis condere quintuplices, cum res ipsa sit incerta, ut dictum, et quae vel nullas tabularum talium usus vel rarissimus. Denique negotium hoc sic est comparatum, ut calculator attentus, praeceptum hoc observans, aequè facile computare quaesitum possit sine tabula, ac ex tabula jam constructa per partem proportionalem deprimere.

Igitur exscribe obliquitatem mediam cujusque formae, quam hac elegisti vice, propriam, una cum semidiametro circelli. Invenies autem ista in tabula obliquitatis eclipticae, consignata sub calce formae cuiuscunque. Tunc argumenti obliquitatis antilogarithmum ($\log. \cos.$) adde logarithmo circelli competentis, qui componitur, ut logarithmus in canone quaesitus, exhibet prostaphaeresin obliquitatis, quam obliquitati mediae in primo et ultimo quadrante argumenti adde, in secundo et tertio subtrahere.

Haec obliquitas utroque casu constituta si quidem in prima forma versaris, propter ejus circelli parvitatem citra exceptionem perfecta et absoluta est; at in 4 formis reliquis tunc solum est perfecta, si polus eclipticae libratur in circelli diametro. Si vero circumire polus iste ponitur in circelli circumferentia, tunc ob ejus in 4 posterioribus formis magnitudinem opus erit aliqua correctiuncula, quae sic perficitur: argumenti obliquitatis logarithmum adde ad $\log.$ circelli, qui propria est cujusque formae, summam et serva ad usus sequentis praecepti, et jam quaere in tabella correctionis obliquitatis sub titulo aggregati, et positam in linea correctiunculam adde ad obliquitatem prius utroque casu inventam; ita erit absoluta et secundum quamque formam perfecta obliquitas.

Praeceptum 187: *Supputare prostaphaeresin aequinoctiorum.* Si vel nulla est re vera mutatio obliquitatis eclipticae, vel talis, ut polus eclipticae temporariae libretur in coluro solstitiorum, hoc, inquam, posito, nulla neque prostaphaeresis aequinoctiorum motus est inquirenda. Si autem ponimus, polum dictum circumire in circumferentia circelli secundum unam ex 5 formis, tunc nascitur etiam haec prostaphaeresis motus aequinoctiorum, quae in prima forma exhibetur jam computata ad intersitia 74 annorum, quibus argumentum obliquitatis deus gradibus crescit; sed scrupulosus sic potest exquiri, communiter in omnibus formis: sit initio, in promissa 1) argumentum obliquitatis, 2) obliquitas incorrecta, 3) aggregatum excerpendae correctiunculae. Ab hoc igitur aggregato aufer illius obliqui incorrectae logarithmum, residuo vicissim adde antilogarithmum obliquitatis mediae; quod in summa prodit, quaesitum in canone ut logarithmus, monstrabit prostaphaeresin, quae titulum addendae gerit in primo semicirculo argumenti obliquitatis, subtrahendae in secundo.

Exemplum: 1) ad a. Ch. 883 sit invenienda obliquitas (secundum formam 4). Ar-

gumentum obliquitatis $166^{\circ} 9'$, ejus autlog. 8926 adda semidiametri circuli formae IV. $47^{\circ} 10'$ logarithmo 429035, summa 437961 dat prosthaph. $43^{\circ} 6'$, subtrahendam obliq. mediae $24^{\circ} 17' 40''$; restat abliquitas tanquam per librationem in circuli diametru $23^{\circ} 34' 34''$. Sed quia statuitur non librari, sed circumire in circulo, ejus diametri log. eundem addo log. argumenti 90549, summa 519584 aservanda ad sequentia, sed quae jam ex tab. correctionis exhibet $7''$, ita sit correctae hujus modi obliquitas $23^{\circ} 34' 41''$.

2) Ab aggregato 519584 subtrahat log. $23^{\circ} 34' 32''$ (obl. incorrectae) 91640, restat 427944. Ad hoc residuum adde obliq. mediae autlog. 9273, summa 437217 exhibet $43^{\circ} 27''$, prosthaph. aequin. quesiitam. Et quia argumentum obliquitatis est ex primo semicirculo, sc. $166^{\circ} 9'$, quare haec prosthaphaeresis aequinoctiorum est addenda.

94) p. 525. Praeceptum 188. Tab. Rud. hoc est: »*Quo die cujusque anni ante vel post Christum contingat aequinoctium?*» Supra cap. XXX. in descriptione tabulae subsidiariae motuum Solis didicisti obiter computare diem aequinoctii veri; sed suppositum erat, puncta aequinoctialia sub fixis aequaliter retro reperire, quia praecessio- nis hujus inaequalitas incerta est, certe tanta non est, quantum Copernicus tradidit. Vide Progymn. Tycheonis. Tom. I. Nunc hoc capite, cum ex forma obliquitatis quin- tuplice totplex etiam evascat prosthaphaeresis aequinoctiorum, praeeptum igitur computandi diem et horam aequinoctii tradendum est generale, cujus certitudo aesti- manda est ex ipso dogmate cujusque formae.

Ex tabulis motuum mediorum Solis ad annos datos completos collige motum Solis medium et locum apogaei vel ejus loco anomaliam annuam. Tunc motui medio adde tot mensium, dierum et horarum motum medium, quoad vel circulus fuerit com- pletus, pro aequinoctio verno, vel iamper semicirculus, pro autumnali. Ita constitu- tum erit tempus aequinoctii medii. Tunc per anomaliam Solis vel collectam vel for- mandam per apogaeum et motum medium excerpatur prosthaphaeresis \odot cum suo titulo, per eandem et diurnus et horarius Solis ex subsidiariis. Quodsi nulla ponitur fieri prosthaphaeresis aequinoctiorum, sola aequatio Solis dividatur per diurnum et horarium, ita prodibunt dies, horae et minuta, addenda ad tempus aequinoctii medii, si subtrahenda erat aequatio, subtrahenda, si haec addi deberet, ut habenter tempus aequinoctii veri. Si autem statuitur aliqua prosthaphaeresis aequinoctiorum, quaeratur illa secundum unam ex quinque formis, quae pluerit, omnes enim dubiae sunt. Hae prosthaphaeresi constituta, pensatio fieri debet in motu Solis, ut quod prosta- phaeresis ista demsit, vicissim mutatio motus medii reponat nostro tempore. Cumque pensatio in IV. et V. formis unam habeat epocham (in calce subscriptam), haec quidem semper est subtrahenda, pensatio semper add., prosthaphaeresis ut et aequatio Solis nunc subtr. nunc add. Itaque quatuor ista si fuerint ejusdem tituli, conjungantur in unam summam, sin diverserunt, minora ejusdem tituli a majoribus subtrahantur, residuum insigniatur titulo majoris. Sic tandem vel summae vel residui hujus fiat divisio per diurnum vel horarium Solis et quotiens applicatio ad tempus aequinoctii medii titulo divisi contraria, ut prius.

Exempio esto aequinoctium Hipparchi, anno 147 ante Christum observatum; colligi- mus eo anno ineunte apogaeum in $5^{\circ} 49' 45''$ II, Solis medius in 9. 7. 28. 31. Februa- rius anni communis addit 1. 28. 9. 11. et sunt 11. 5. 37. 42. Dies 24 addunt 23. 39. 20, suntque 11. 29. 17. 2, residuum ad implerionem circuli est motus horarum 17. 26. 24. Hinc ad apogaeum complementum anomaliae numeratur $65^{\circ} 50'$, quod dat aequationem $1^{\circ} 5' 32''$ addendam; invenitur autem eodem anno 147 prosth. aequinoctiorum $10' 36''$ subtrahenda. Vicissim quia annus 147 ante Christum distat ab epocha creationis 3853 annis, per hoc intervallum colligitur pensatio primae formae $11'$ addenda sine epocha. Compositis igitur addendis et subtracto, quod est subtrahendum, residuum est $1^{\circ} 52' 18''$, qui divisus per diurnum \odot $58' 10''$, facit d. 1. h. 1. 22. 20'', subtrahenda tempori aequinoctii medii, ut fiat verum aequinoctium anno 147, corrente die 23. Martii, horis a meridie Uranibur- gice 19. 6. 24, secundum hanc primam formam prosth. aequinoctiorum, differens ab eo, quod sine prosthaphaeresi computamus, minime, nam ut id eis fieret tempore Hipparchi et nostro, pensatio huius formae ut et ceteris sua omnes est adjuncta.

Cauteia. Hoc autem praeepto dies aequinoctiorum, ut eos Ptolemaeus perhibet a se esse observatos, non repraesentantur omnimode. Quicquid igitur hic differant vel modis inter se vel a praecessione aequabili, nihil moveri debemus auctoritate Pto-

Iemaei, qui omnino videtur errasse in numeratione dierum anni Aegyptiaci, seductus forsitan vel a calculo motus Solis Hipparchi vel a calendario et intercalatione Romana. Quam conjecturam firmat locus unus Censorini, qui illo ipso anno, quò Ptolemaeus Lunam ultimo et deinceps (intercalatione Romana extraordinaria jam in Aegyptum nunciata) utrumque aequinoctium observavit, primum mensis Thoth primi Aegyptij refert ad XII. Cal. Aug., debebat autem ad XIII, si tenor idem fuisset servatus intercalationis Julianae qui hodie, neque quicquam annus ille extra ordinem fuisset a pontificibus passus.

Quodsi major est in Ptolemaeo circumspectionis existimatio, quam ut vel a calculo vel ab anno Romano deludi poterit, ad extrema confugiendum erit dicendumque, aequinoctia circa tempora Ptolemaei saltum fecisse, quem proxima secula usque ad Proclum pensaverint.*) Etenim certissimis observationum eclipticarum documentis probo Solis ad ipsas etiam fixas accessum circa minimis inaequalem. Librum hac de re singularem, si Deus voluerit, in publicum edam.

Qua una observatione vel maxime commendatur, ut summopere necessaria, Tychonis nostri cautio, quam ex Origeni libro, jam dudum edito, majoris fidei causa transcribam; verba sunt: *Accuratam (Tycho) Solis motum, observationibus horum temporum satis exquiste respondentem (etsi paucorum tantummodo saeculorum) ostendere voluit, eaque de causa non exponit, quomodo sua temporis aequatio pro calculo motus Solis ad diversa tempora mutetur, subinde monens et inculcans, ut suo exemplo posteris quoque hac in parte aliquid praesent, praesertim cum in corporibus coelestibus non eandem, quam plerique philosophorum in coelo sibi fingunt perpetuitatem, motuum deprehendamus stabilitatem et constantiam.* Hactenus Origenus, quo teste cum haec affirmaverit summus astronomicae contemplationis artifex, est annu aliquis Stoicae sectae philosophus et sacrae nostrae historiae, testanti de cursu Solis inhibito vel retro converso, fidem; pertinaci naturae praesumptione, convellat.

95) p. 528. Tabulae Rudolphinae capite XVII. praecipua exhibuit ad tabulas pertinentia, quibus reductiones annorum variorum ad annos Julianos traduntur. Partem harum tabularum propositum volumine IV. p. 505 ss. Praemisissis variis aeris, quibus uti solent priores astronomi, sic pergit Keplerus.

In his tabulis Tycho primus auctor, quamvis a Rudolpho Caesare eas denominasset, nulla opus esse putavit *αερεππυς* in aera nova Rudolpho figenda, sufficere censuit aeram Christi, receptam et usitatem in toto occidente inque occidentalium regum ditionibus. Hanc igitur aeram numerant istae tabulae bifariam, primum ordine retrogrado a Christo versus initia rerum et ultra, quousque cuique lubnerit, deinde ordine directo a Christo ad nos usque et porro. Suntque bissextiles post Christum quidem omnes pariter pares, ante Christum vero impares, primus et ab eo quartus quisque annus.

Aeras multiplicare cum diversitate numerationum, uti fecerunt Alphonsini et Prutenicarum auctor, non supervacaneum tantum, sed damnosum etiam censi adeoque ne decorum quidem, singulares seras exhibere in opere universali, paucis gratificari nationibus, omnibus ea re satisfacere non posse, quasdam eximere legibus reduciendi sua tempora ad annos Christi Julianos, ceteras in hac necessitate relinquere. Cum autem in aeram quidem Incarnationis Verbi consenscrit plerique Christianorum, in principio tamen anni observando magna exstiterit varietas, omnis ea, quantum lectione consequi potui, ob oculos ponenda fuit, ut tanto signantiori cum notatione calculatoribus hanc indifferenter observationem, ipsas Cal. Jan. in tabulis istis haberi pro prima die anni, utque discerent sibi cavere ab aliorum numerationibus, qui aliud anni caput observant, qua ratione sit, ut interdum unitate a nobis differant in annorum numeratione.

De harum aerarum intervallis deque mensium appellationibus, ordine, quantitate scripsi commentarium peculiarem, in quo omnia, quae in his foliis continentur, historiarum monumentis rationibusque idoneis demonstro et contra ceterorum chrono-

*) Longimont. Theor. Astr. l. I. 83. non tantum errasse hanc dixit observando, sed plane falsae observationem, quod ex Hipparcho computaverat.

logorum ipsiusque adeo Scaligeri auctoritates, sibi diversi a me abeunt, munio; quem alia occasione; si vita superfluerit, lectoribus communicabo: nam materia potissimum chronologica metas hujus operis astronomici excessura visa est.

Hic commentarius non typis expressus est, neque ut videtur inspectis manuscriptis Fulviansibus plene ad fidem perdoctus. Partem illius commentarii praecipuos libris Kepleri chronologicis (vol. IV. p. 128 ss.) partem habent epistolae ad Maestlinum (IV. p. 65 ss.), ad Herwartum et Scaligerum (ib. p. 80 ss. 94 ss.). Quae supersunt ultime hujus editionis volumini adjuugeoda censuimus.

Pergit Keplerus praecepta afferens ad usum tabularum, monet, annos »Julianos« adhiberi non quasi de his numerus annorum deducatur, sed accipiendam esse hanc vocem solum de forma eorum et distributione dierum in menses. Exemplo affert aeram »contactuum« (est. vol. IV. p. 506), Arabum, Olympiadis etc.

De »intercalatione dierum in forma Juliana« haec affert: Venio nunc ad applicationem dierum et mensium et initium facio a Romania. Quod enim intercalationem diei attinet, quatuor nactus est formas annus Julianus, quarum duae primae videntur in synopsi (IV. 507). Primi enim anni 37, qui decurrerunt inde ab institutione calendarii, vitiosum complexi sunt intercalationem ab anno a. Ch. 45. usque ad annum a. Ch. 9. Sequentes 12 anni caruerunt intercalario die ab anno 8. a. Ch. usque ad annum 4. p. Christum.

Praeceptum 63. De his igitur 48 annis regula est ista. Si offeritur annus ex historia Romana, certus inter dictos terminos, nescias, dies mensis usualis in quem diem observationis posterioris (quae etiam in his tabulis valet) retrorsum extentae quadraverit: quare annum in inferiore parte typi (vol. IV. p. 511 Nr. III.), aut si eum non reperis, sume proxime superiore et vide, in quem diem mensis inciderint Calendae usuales. Nam si in primis dies inciderant Calendae, omnes igitur dies recte sunt acti, post sedem quidem bissexiti usque ad notatum annum sequentem; sin autem in secundas, unitas est addenda numero diei expresso; si in tertios, adde duos, si in quartos, adde 3.

Exemplum illustre de materia nostra sit hoc: Quo anno Caesar Octavianus occupavit Aegyptum, anni Aegypti principium observatum est incidisse in III. Cal. Sept. h. e. in 29. Sextilis anni Romani, uti tunc ille agebatur. Queritur, quotus dies futurus fuerit anni secundum formam consecutam correctam? Annus est notus ex historia, transierant anni 15 formae Julianae, currebat 16^{ta}, ante aeram Incarn. 80^{ma}. Invenitur igitur in typo (IV. 511) annus hic ipse 30. ante aeram Incarn. et dies adjacet tertius, in quem incidebant Calendae ejusque mensis post Februarium, bissexiti sedem. Cum ergo Calendae Sept. in 3. Sept. correctum inciderint, 4. Cal. in ultimum Augusti competierunt, ut sic ubique differentia bidui fuerit.

De diebus vero anni signati in typo, qui sedem bissexiti antecedunt, cautio est ista, ut ii accenseantur anno antecedenti; ut si dies exprimatür anno Juliano mensali 16. mense Januario, non est sumendus annus 16, sed 15; et quia is non reperitur, annus igitur proxime superior 13, cuius Calendae omnes a Martii (usque ad Martiam anni 16) in secundas dies cadunt, ut ait differentia unius tantum diei.

Tertia forma anni Juliani coepit cum anno 50. aerae Julianae, qui quintus erat nostrae numerationis ab Incarnatione duravitque usque ad 4 Octobris anni 1582. duratque adhuc passim et in his tabulis, nec eget praecepto.

Quartam in modo intercalandi formam introduxit Gregorius XIII. P. M., cui servit tabella reductionis prima. (vol. IV. p. 510.)

Haec Gregoriana Calendarii veteris Juliani emendatio recepta est in toto fere occidente, in Imperio Romano, in regis Hispaniarum latissimis per orientem et occidentem porrectis provinciis, adeoque transit in nam, ut ne illi quidem, qui veterem formam retinent, hujus notitia carere possint. At non ideo recipienda fuit etiam in calculum harum tabularum, nec epochae motuum solennes illi accommodandae. Non enim scribuntur hic Ephemerides in certos annos, nisi Gregoriana usualis observatio merito obtineret, sed conduntur tabulae universales, non tantum propter futura tempora, sed etiam propter observationes temporis antea. Jam vero de aevo, ut sic dicam, astronomico, pars potissima sub observatione calendarii veteris Juliani effluxit

(receptum enim id fuit statim ex quo editum in omnibus Imperii Romani provinciis, et formae annorum provincialium ex eo paulatim exoleverunt), itaque astronomi post Ptolemaeum, etiam earum gentium, quae Romanum Imperium non agnoverunt, tabulas suas ad hanc calendarii veteris formam accommodarunt. Nec id sine causa factum, est enim forma post Aegyptiacam aequabilissima, est motui Solis ipsa Aegyptiaca conveniunt. Quemadmodum igitur Ptolemeus tabulas suas accommodavit anni formae Aegyptiacae, nihil impeditus more a Romanis rerum dominis introducto, qui fixum tenebant annum Aegyptiacum jam per ducentos fere annos, quemadmodum et mathematici Persici in tabulas suas motuum coelestium inseruerunt formam anni Persici ordinariam, quae quinqueduum illud, Musteraka dictum, infert in fine ultimi mensis Persici Asphandar, nec respexerunt ad usualem locationem ejus quinquedii in fine mensis Aban, quam invenerunt suo tempore, propterea, quod tam illi, quam istis haec sua forma anni cuivis videretur ad calculum accommodator: sic etiam Tycho Braheus, primus harum tabularum nuncupator, tomo I. Progymsasm., edito anno 1602, Julianam veterem anni formam praeter Gregorianam ob simplicitatem et opportunitatem ejus in calculi tractatione elegit. Vidit quippe, si epochas motuum deduceret ab initio anni Gregoriani, jam sibi nihilominus opus fore anno veteri Juliano, ex cujus comparatione demum intelligi datur, quantum quovis seculo detrahi debeat de intercalatione veteris Juliani. Nam etiam penes Clavium, anni Gregoriani computistam, haec ipsa vetus forma Juliana moderatrix est intercalationis Gregorianae et index dierum intercalarium custosque seu commentarius intercalationum peractarum, ex quo numerus exemptiorum dierum quavis aetate depromi debeat. Etsi vero una res praestat intercalatio Gregorianae, quod aequinoctia retinet circa eosdem dies mensium, sit tamen id saltu quodam et reciprocatione per dies, estque res astronomis exoptata magis, usu calendarii Juliani veteris quantitatem observare repeditionis aequinoctiorum aetate qualibet, propterea quod natura ipsa repeditionis hujus observandae ansam statuit in anno sidereo longiore, quodque quantitas anni Juliani pulchro casu media intercedit inter utrumque naturalem annum, tam tropicum repedantem, quam sidereum praepertentem in dies sequentes anni Juliani. Ut non jam demonstrum prolixius, quantae quamque perplexae operae res futura fuerit, multiplicare epochas, studiosos onerare cautionibus, calendaria nationum ceterarum reducere ad formam Gregorianam, per secula diversa variantem, quantoque facilius, operae talis facere compendium additione praecepti unius de reductione vel motuum, qui in Julianis temporibus computati sunt, ad tempora Gregorianae, vel temporum Gregorianorum ad tempora Juliana calculo apta.

Præc. 61. Et praeceptum quidem tabella ipsa quadamtenus complectitur. Oblato enim die mensis Juliani veteris, ad quem sunt computati motus coelestes, si quaeritur, quotus is dies sit futurus anni Gregoriani, siquidem dies fuerit aetate sedem bissexti, quaere in tabula annum incarnationis propositum aut proxime antecedentem, et invenies appositum numerum dierum, quos addes proposito numero Juliano, ita emerget numerus diei Gregorianus, mensis vel ejusdem vel, si quantitas mente major evaserit, ea rejecta mensis acquentia. Si vero dies anni oblata praecesserit sedem bissexti, habeto Januarius et partem Februarii pro appendice anni praecedentis. Exemplis non est opus. Vicissim, si sint computandi motus ad tempora Gregorianae, tantundem illis detrahe, quantum tabella priori casu jussit addere, adscito, si fuerit opus, numero dierum mensis antecedentis: ita tempus erit aptatum ad bene calculum.

Sed scriptoribus Ephemeridum nihil est opus subijcere consilium hoc, ut quot omnino dies erunt eximendi de Juliana forma, totidem dierum motus subtrahant ab epochis, ut eas habeant ad Gregorianam formam in seculo sibi proposito accommodatas. Ego etsi Ephemeridas scripsi stylo Gregoriano et epochas illas in chartis habeo: non censui tamen, varietate epocharum vel ansam praebendam confusioni calculorum, vel librum etiam onerandum.

Vallet autem praeceptum a Februario cujusque anni expressi usque in Februarium anni proxime sequentis in tabella. Verbi causa, a 5. Octobris anni 1582 jubetur addere 10 (puta in provinciis, in quibus emendatio statim recepta fuit). Id igitur fieri

debet in omnibus diebus et mensibus omnibusque annis sequentibus, etiam anno 1600, etiam principio anni 1700, usque ad sedem bissexti Juliani. Nam etiam ad 24. Februarii ejus anni, sen sextum Calendas Martias priores intercalarias adduntur dies 10, ut fiant 34, unde ablati modus mensis Februarii dierum 28, reliquit 6: erit igitur 6. Martii Gregoriani. At eum jam a 24. Februarii anni 1700 inclusive jubetur addere dies non 10 sed 11, adde eos ad 24. Februarii ordinariis, sen VI. Calend. Martias posteriores, sunt 35; ablati 28, modo Februarii communi, restant 7: erit igitur 7. Martii Gregoriani.

Notabis igitur, in hac tabella reductoria more Romano imputari Februario bissextili dies tantum 28, sicut etiam in cyclo hebdomadico, quem addidit Christiani. bis ponitur littera F. At si tabeliam accommodassem ad morem popularem, qui in Februario bissextili numerat usque ad dies 29: verba haec [A 24. Februarii] locum non haberent, sed pro iis ponenda essent ista [A 1. Martii].

De typo anni confusionis, et una anni Romanorum veteris Popiliani. Prinquam abeam a forma temporum nostrae, nonnihil etiam de ea dicendum est forma, quae illam proxime antecessit, quae quidem a forma anni Graecanica antiquissima est deducta. Sed eum non exstent in historiis Romanis documenta sufficientia, ex quibus omnis hujus anni ratio elici et cum hodierno Juliano comparari connectique possit, tanto etiam brevior ero. Cum enim Romani periodum habuerint 24 annorum, in qua pro eo, quod Graeci vetustissimi duodeces intercalare sunt soliti, ipsi intercalarent tantum undecies, semel omisso mense intercalario: haec igitur omisso rationes omnes perturbat. Nullum enim exstat vestigium Consulum certorum, quibus Coss. fuerit omissus intercalarius. Itaque primam atque supra confusionis annum per duos annos altius in historia Romana eximur, in incerto nos versari necesse est de 23 diebus, etiamsi concedat aliquis, regulas periodi 24 annorum stricte fuisse observatas nullamque libertatem diei unius atque alterius extra ordinem sibi usurpasse pontifices.

Quicquid igitur de annis, qui confusionis annum antecesserant, praecipui hoc loco potest, totum anceps et lubricum est, et si multa largiamur, tamen annis 25, qui confusionis annum proxime antecesserant, ad duas redigimur conditiones: ut aut incertam dicamus omissam intercalationem usque ad annum propositum, aut alicubi omissam.

Praec. 65. Haec cum sic habeant, verbis solennibus praeceptum concipere supervacuum erit, exemplo unico eoque nobili contenti crimina, quod sit loco praecepti.

Cicerone et Antonio Coss., quod fuit anno ante Inc. aeram eurrente 63, IX. Cal. Octobris, natus perhibetur C. Octavius, postea Augustus dictus. September, ut vides in typo anni confusionis, habuit dies 29. Ergo nonus a Cal. Oct. attingit 22. Septembris. Quaeritur, quo die anni bodiorni Juliani retro extensi id acciderit: sellicet ut puero auro, quem Jupiter, Cicerone Cos. somniant, cathena aenea de coelo demisit, genesis pangere possit astronomus. Adi typum anni confusionis, qui erat ante aer. Inc. 46^{tes}: cum in eo September Popilianus incipiat a primo Julii tabularum istarum, additis 21 fiet ut 22. Sept. Popilianus inciderat in 22. Julii nostrum. Annum vero 46. inter et 63. intersunt anni 17. Si intercessissent plane 24, quanta erat periodus Romana, probabile fuisset, menses Popilianos eo situ fuisse in mensibus Julianis intra propinquitatem unius diei, quo fuerunt anno confusionis. At quia nescimus, an aliquo anno intermedio, qui deberunt esse 48. 50. 52. 54. 56. 58. 60. 62, fuerit omissus mensis intercalarius, enae igitur nobis offeruntur conditiones, prima, ut fuerit omissus, posterior, ut non fuerit. Si non omissus, igitur a 22. Sept. anni 46. ad 22. Sept. anni 62, decurrerunt anni 16 Romani veteres, qui fuerant Juliani 16 et dies totidem excedentes. Qui ergo anno 46. habitus fuit pro 22. Sept. Popiliano, fuerit 6. Julii Juliani. Hinc ascendamus retro in annum 63. per modulum anni Popiliani. Et quia accessus fit per Februarium, qui anno 62. geminabatur ex analogia anni 46, et conditione posita, inserto scilicet in Februarium Mercedonio dierum vel 22 vel 23: fuit igitur quantitas anni Popiliani dierum 377 vel 378; a 6. Julii vero extensi dies 377 in anno simplici Juliano retrorsum, pertingunt ad 24. vel 23. Junii: una igitur conditionum offert nobis 23. vel 24. Junii. Si vero alicubi per hos annos 17 omissa fuit intercalatio 23 dierum, quae altera fuit expositarum conditionum, a posito termino derivimus

ad 16. vel 17. Julii: et modo nihil interea turbaverint extra ordinem pontifices, festorum arbitri. Certius aliquid affirmare typus noster band poterit. At nec quicquam certius hoc typo quisquam, quod sciam, ex monumentis vetustis collegit bacteus.

Si quia tamen iudicium hic meum requirit, id obiter addam; non est enim id alienum a tabb. a Rudolpho dictis, cum illud eidem Rudolpho Imp. olim roganti exposuerim.

Fertur natus Augustus paulo ante Solis ortum; Octavius enim, pater Augusti, tardius in senatum veniens, qui summo mane coactus erat, ob periculum conjunctionis Catilinae, moram puerperio uxoris excusavit. Atque ei Nigidius ex tempore partus fortunam nati amplissimam praedixit. Praeter banc traditionem confirmata est etiam Augusti ipsius opinio, se sub Capricorni sidere natum. Atqui mense Julio, Sole orituro, Capricornus occasum obtinet: Quomodo ergo, qui sub Capricorno natus, idem ante Solis ortum nasci potuit? Conciliatorem audi Manlium: *Veteres sub eo quemque sidere natum putabant, quod eo nascente Luna obtinebat.* Inter ergo 23. Junii et 18. Julii per dies 25 quare, an Luna potuerit obtinere Capricornum et quibus diebus; invenies 1. et 2. Julii. Non fuit igitur omissus in his annis 17 mensis intercalarius; ad nec quantitas anni, dierum plane 355 cum intercalario, servata esse potest. Desunt enim dies 6, 7 vel 8, seu pontificum arbitrium ordinationi derogaverit, seu male retulerint de anni quantitate auctores, aetate posteriores.

Præc. 66. De conversione temporum Aegyptiacorum in Julianam. Datus dies dati mensis et anni Aegyptiaci vagi a Nabonassaro, ad quem diem ejus anni ante vel post Incarn. quadret, sic addisces. In tabula conversionis temporum *) series invenitur Aegyptiacorum a Nabonassaro, cum die anni Juliani respondentis ad latus. Quære

*) Tabula conversionis temporum in diem summas. (Tab. Rod. p. 32.)

Romanorum Julianorum.					Aegyptiacorum et Persicorum.				
Anni	1. dies	365	Jan. dies 31.	Bis.	Anni	1. dies	365	Menses d. 30	Persici 30
2.	"	730.	Febr. " 59.	60.	2	"	730	" " 60	" 60
3.	"	1095.	Mar. " 90.	91.	3	"	1095	" " 90	" 90
4.	"	1461.	Apr. " 120.	121.	4	"	1460	" " 120	" 120
8.	"	2922.	Maj. " 151.	152.	5	"	1825	" " 150	" 150
12.	"	4383.	Jun. " 181.	182.	6	"	2190	" " 180	" 180
16.	"	5844.	Jul. " 212.	213.	7	"	2555	" " 210	" 210
20.	"	7305.	Aug. " 243.	244.	8	"	2920	" " 240	" 245
24.	"	8766.	Sapt. " 273.	274.	9	"	3285	" " 270	" 275
28.	"	10227.	Oct. " 304.	305.	10	"	3650	" " 300	" 305
32.	"	11688.	Nov. " 334.	335.				" " 330	" 335
36.	"	13149.	Dec. " 365.	366.				" " 360	" 365
40.	"	14610.						" " 365	

Arabicorum Hegiræ.

Anni	dies	Anni	dies	Anni	dies	Menses: dies	Primum Thoth a. Nabon.
1.	354	16.	5670	50	10631	30	1. 960.
2.	709	17.	6024	60	21262	59	4. 1080.
3.	1063	18.	6378	90	31893	89	100. 1204.
4.	1417	19.	6733	120	42524	118	224. 1324.
5.	1772	20.	7087	150	53155	148	228. 1445.
6.	2126	21.	7442	180	63786	177	348. 1452.
7.	2480	22.	7796	210	74417	207	468. 1453.
8.	2835	23.	8150	240	85048	236	592. 1456.
9.	3189	24.	8505	270	95679	266	712. 1460.
10.	3543	25.	8859	300	106310	295	748. 1462. (Reliquæ, quas
11.	3898	26.	9213			325	749. hæc pontific. v.
12.	4252	27.	9568			354	752. vol. IV. p. 3104.)
13.	4607	28.	9922			355	836.
14.	4961	29.	10276				
15.	5315	30.	10631				

ergo numerum Aegypt. annorum, proposito (si non aequalis) proxime majorem, et aufer ab eo propositum currentem, residuos ad respondentem in eadem linea Incarnationis ante Christum adde, vel ab eo post Christum subtrahere; si habetur annus ab Incarnatione retro vel porro, in quo propositus Aegyptius incipit. Eosdem vero residuos annos divide per 4, quotientem (auctum unitate, si quid superaverit) adde numero diei Juliani, invento in eadem linea, ita prodibit sedes primi Thoth. Tercio collige ex columella competenti numerum dierum a principio illius Juliani anni, usque ad inventam sedem 1. Thoth, attendens, communis ille sit annus an bissextilis; idem fac. in anno proposito Aegyptiaco, unus columella itemque propriis, summam ac, dierum collige usque ad propositum, summam utramque coge in unam, quam vicissim ope columellae Julianorum converte in menses Julianos. Ita residuus erit completus dies mensis Juliani sequentis. Quodam summa dierum superaverit modum anni, aufer prius ab ea dies 365, vel in bissextill 366, et pro in numerum annorum Julianorum unitate diminue ante Cb., auge post Chr., cum residuis diebus age ut prius.

Exemplum ante Christum. Quaeritur, anno Nabonassar 425, dies primus Thoth ad quem diem ejus anni Juliani quadret? Numero hae proxima major in Tab. Conversionis Aegypt. et Pers. ad dextram sub titulo Nabonassariorum invenitur 468; unde ablatis 425, residui sunt 43; qui additi ad 281 ante Inc. in eadem linea inventos, conficiunt 324 ante Christum.

Idem residuum per 4 divisum dat 10 cum fractione: ergo pro ea plenus 11 adde ad inventum in eadem linea diem 1. Nov., sit 12. Novembris. Ille quia de omnium primo die anni fuit quassatum, habetur ergo sic sedes ejus in Juliano respondens.

Si vero quassatum fuisset de 27. Mesori currentis, operatio sic fuisset continuanda. Julianus 324. ante Inc. est simplex. Ergo completus October exhibet dies 304, adde, et dies 11 completos de Novembri, sunt 315. Sic completus Aegyptius Epiphi exhibet dies 330, adde completos 26 de Mesori currente, summa 356 jungatur priori, censatur 645. Ab hac aufer primo 365 (quippe cum annus 324. ante Inc. sit simplex), restant dies 280: hoc numero proxime minor 273 adscriptus est Septembris anni simplicis (simplex enim annus est etiam 223 sequens), quibus ablatis, restant dies 7 completi de mense Octobri anni 323. unitate dimissionis, quippe ante Incarn. Ita dies 27. Mesori currentis competet in currentem diem 8. Octobris.

Exemplum post Christum. Quaeritur, anno 1570 dies 27. Chaeae ad quem diem ejus anni Inc. pertineat? Aufer 1570 a proxime majori (sub titulo Nabonassar) 1448, residui sunt 78. Illi, quis tempus est post Christum, subtrahat ab annis Inc. 700 inventis in linea, reliquunt 622, divisi vero item per 4, dant 19 cum fractione. Ergo solidos dies 20 adde ad 1. Martii inventum in linea: prodit sedes diei 1. Thoth, 21. Martii. Annus est simplex. Ergo Febr. et dies 20 completi de Martio, dant 79. Sed et Athyr completus cum completis 26 Chaeae currentis dant 116. Summa ex utroque sit 195. Ille proxime minor 181 dat Junium completum, residui 14 sunt dies completi mensis Julii, et propositus currentis 27. Chaeae in currentem 15. Julii anni 622. Incarn. incidit. De hae die infra in aera Aeternum.

De conversione temporum Persicorum in Julianam barum tubularum et vicissim. Annus Aegyptius vagus desit; Persicus successit, in menses ejus menses illius fere omnes recipiens ex toto, ut in calce tabellae admonco (IV. 511). Hunc Persicum hodieque in usu esse existimo. Pro Aegyptio igitur sufficit praeceptum temporarium, tabula subnixum ad quantitatem unius anni Cynici extensa; pro Persico praeceptum trado generalina.

Praec. 67. Datos annos Jeddagirdis completos mensesque completos cum diebus de currente mense completis, in summam redige dierum (excerpens primo per annorum millenarios, si tot sunt, deinde per centenarios, tertio per denarios, quarto per singulos, quinto per menses) de qua summa semper detrahe 199; summam sic multatam vicissim redige in annos et menses Julianos, attento bissextilli; annis Julianis factis adde semper 632 solidos annos: conficietur summa elapsorum annorum et mensium aerae Incarnationis cum diebus residuis mensis currentis.

Vicissim annis Julianis ab Inc. oblatis demantur 632; residui completi dissolvantur in dies, excerptioe facta primo per centurias quaternariorum, quae continen-

tur in numero Julianorum proposito; secundo per eorundem denarios, tertio per quaternarios ipsos, denique per singulos infra quatuor completos; dierum excerptos numeros cum numero dierum mensis completi et cum numero dierum mensis currentis in unam redige summam, et adde summae dies 199. Ea sic aucta redigatur in tempora Persica, excerptioe annorum in margine facta, per summas dierum proxime minores collecta vel ejus residuis, excerpto etiam mense completo, ut appareant dies de corrente sequenti mense residui.

Exempla. Anno Isdagerdis 814, dies 17. mensis Termā, quis ejus mensis Juliani et anni Incarn. dies est? Completus mensis Chartad colligit dies 90, adda dies 17 currentes mensis currentis, sunt 107. Jam sunt 800 Aegyptiaci vel Persici dant dies 292000, anni 10 dant 3650, anni 8 residui completi dant dies 1095. Omnibus diebus in unam summam confectis et ab ea dato modulo 199 perpetuo, fit summa dierum castigata 296653. Haec vero proxima minor 292200 efficit Julianos 800; residui sunt dies 4453; summa hac proxime minor diar. 4363 efficit 12 Julianos, restant dies 70; qui cum pertinent ad sequentem 13. Julianum simplicem, demtis ergo 59 inventis cum Februario simplici, restat 11. currentis mensis Martii currentis. Ad collectos vero annos 813, ultimo currente, adda perpetuum numerum 652, consurgit Incarn. 1445 currentis.

Vicissim anno Incarn. 1079, dies 23. Februarii, quis dies ejus anni mensisque Isdagerdis? Demtis 632 de Julianis 1079 restant 447, currente ultimo. Sed 400 Juliani dant dies 146100, et 40 dant 14610 et 4 completi dant 1461, et duo insuper completi dant 730. Januarius vero completus dat 31, et de Februario currente 23. Adde et 199, modulum perpetuum, summa ex omnibus diebus confecta fit 163144, de qua 146000 faciunt Persicos annos 400, residui sunt dies 17144. Rursum de his 14600 faciunt Persicos annos 40, residui sunt dies 2544. Sed et de his 2190 faciunt Persicos annos 6, restant dies 364 (354). Denique summa proxime minor ista, 335, adscripta est ad Packman seu Behemen mensem, restat 29 (19). mensis sequentis Asphandis currentis, ultimus sc. dies anni 447.

Notabis, mensium Persicarum nomina valde variis reddi literis, ex alia et alia lingua transcriptis. Nam primum de lingua Persica in Arabicam, postea de Arabica in Latinam transcripta, sic sonant apud Alphonsium in editione Santritteriana: Fordimech, Ardaimech, Cardimech, Zirmech, Mardary, Sarembech, Mahramech, Ebenmech, Ydramech, Dimech, Behmemech, Azfirdamic. Ut omittam manuscriptos meos. Ego vero propius me mansurum speravi apud idem Persicum, si ex Graecis antiquioribus Chrysococco et Isacio Monacho ea in Latinam linguam transcriberem.

De conversione temporum Arabicorum et Turcicorum Hegirae in Julianā, et vicissim. Praeceptum 68. Modus non absimilis priori. Annos Arabicos Hegirae converte in dies, excerptens primo per decuplum annorum collectarum, si tanta fuerit oblata annorum summa, deinde per residuos triacontateridarum integrarum, tertio per annos completos infra 30, quarto per menses Arabicos completos. Omnes quatuor excerptos dierum numeros una cum numero diei currentis in mense corrente collige in unam summam, quam auge denique perpetuo numero dierum 361. Sic auctam converte in annos et menses Julianos Incarnat, ita remanebit in fine numerus dierum mensis Juliani currentis, quorum ultimus cum die Arabico proposito congruit. Annis vero Julianis cum summis dierum excerptis adde completos 620 annos perpetuo: prodibit annus Incarnationalis.

Vicissim diem mensis Juliani in certo Inc. anno (qui epocham Arabicam sequatur) in Calendario Arabico sic assignabis. Ab annis Christi propositis aufer 620 perpetuo, residuis in dies converte; sic etiam menses Julianos completos anni vel simplicis vel bissextilis. Omnibus diebus excerptis subjungo et numerum diei mensis decurrentis et fac omnium summam, de qua vicissim aufer semper dies 361; summam sic multatam converte in tempora Arabica, excerptens per dierum numeros proxime minores, vel summa confecta vel ejus residuis, usque dum restiterit numerus minor quantitate mensis Arabici, qui erit numerus diei de corrente mense Arabico, respondens diei mensis Juliani proposito.

Ut reliquit Leunclavius in Papadette suo historiae Turcaeae notatum in suo diplomatico Sultani Amurathae annum transfigurationis (Hegirae) Mahometis 991, diem 27. Scilicet, id est Dulhadjati. Quaeritur in quem diem ejus anni Juliani is computat.

Anni 900 Arabici dant dies	318930
90 Arabici dant dies	31893
Completus Unikadati dat dies	325
Dies Dulhadjit currens	27
Additio perpetua	561
	Fit summa
Anni 800 Juliani habent	351736
	Restant
Anni 160 Juliani habent	59536
	Restant
Anni 8 Juliani habent	1096
	Restant
Add. perp. 620	1

Finnt anni 1583 completi, mensis completus nullus. Ergo erat dies 1. Januarii anni Inc. 1584 inuentis, quod et Leunciojus interpret indicavit. Id vero Scalgar (Em. Temp. Lib. VII. fol. 720.) negat se posse conuenire. Exponget igitur et corrigat ventriculum Tabb. et praeceptionum suarum, si hoc illae non patiuntur.

Vicissim, anno Incarn. 1576. die 23. Decemb. seu X. Cal. Ianuarius, in quem diem ejus anni Arabici ab Hegira compitit?

Sunt anni Juliani 1575 completi, currabat	1576
Aufer perpetuos 620 bissextillis	
Restant 955	
Anni Juliani : 800 dant dies	292200
Restant 155	
Anni Juliani : 120 dant dies	43830
Restant 35	
Anni Juliani : 32 dant dies	11688
Restant 3 qui dant dies	1095
Completus November bissextillis dat dies	335
Numerus dierum Decembris	23
Fit summa dierum	349171
Aufer perpetuos dies	561
Summa correcta fit	348610
Anni Arabici 900 auferunt	318930
restant	29680
Anni Arabici 60 auferunt	21262
restant	8418
Anni Arabici 23 auferunt	8150
restant	268
Mensis Ramsdham auferit	266
Restant dies mensis Schawal seq.	2
Anni colliguntur 983 completi.	

Ergo propositus 23. Decemb. anni Inc. 1576 est dies 2. mensis Sebeval anni 984 Turcici prophetae. Tunc indiciae sunt factae 8 annorum inter Rudolphum II Rom. Imp. et Amuratem Regem Turcorum. Itaque in libro Martini Crusii, quem Scaliger allegat, oportet omissum esse characterem X. Non enim Calendis anni inuentis 1576, vix dum electo Rudolpho, patre Maximiliano adhuc imperante, sed exstante anno illo, scil. X. Calend. Jan. indiciae fieri poterunt. Hinc corrige Scaligerum (Em. T. Lib. VII. fol. 720.)

De multiplicatione dierum in annis, Aegyptiaco et Armeniaco, fixis, ad dies Julianos. Praeceptum 69. Huic rei servit tabula propria (IV. 411.), quae ipsa praecipi loco est, tantummodo ut memineris, in Armeniaco quidem anno diversitatis esse plane nihil a Juliano (tantum enim dies mensis Armeniaci completi adduntur ad diem mensis Juliani adscriptum, et a summa, si excreverit, ablata mensis illius quantitate, residuus fit dies currens mensis Juliani sequentis), in Aethiopico vero per illud semestra, quod antecedit intercalationem Romanam, disparitatem esse diei annus, sic ut festa illius semestris Aethiopica fixa anno illo, quo imminet intercalatio Romana, cadant in Juliano calendario die uno posterius, quam tribus antecedentibus annis.

De characteribus et feriis annorum et dierum. Materia magis est chronologica et ad computos rejicienda; astronomo oportet proponi tempus certum, ut ad id computet motus. Quia tamen aliqui characteres a motibus Lunae deducuntur, aliqui etiam ab astronomis, praesertim Hebraeis, adhibentur, ad hos facilius consecutandos paucis et de characteribus agam.

Cycli tres solent inseri calendaris: Indictionum, Solis et Lunae seu Aurei numeri. Indictionum circulus cum tribus aeris incipit, ut vides in synopsi (IV. 505.), cum aera Graecorum ab initio mundi, cum annis Antiochenis et cum anno Christi 312 vel 313, pro diverso anni indictionalis initio.

Praec. 70. Annos igitur mundi Graecorum et Antiochenos simpliciter dividimus per 15, residuus est annus indictionis, aut si nihil residuum, indictio numeratur 15.

Ut si quaeratur anno Graecorum 5509 quota indictio, divisione per 15 facta, restant 4, ergo Septembri anni 5509 finit indictio 4.

Praec. 71. De annis vero incarnationis cautio est, ut ad indictionem eliciendam his addatur ternarius, et tunc fiat divisio per 15. Sic caput aerae nostrae cadit indictione 4. additis 3 ad 1 Christi.

De cyclo Solis. *Praec. 72.* Ad hunc inveniendum ad annos Incarn. post Christum adde 9, a summa aufer numeros annorum in cyclis integris,*) remanebit ita cyclos Solis, aut si nihil remanet, cyclos erit 28.

Quodsi fuerint anni tui currentes ante aerae Incarn., tunc non his, sed numero annorum in laterculo cyclorum invento proxime majori adde non 9 sed 10, a summa detrahe ante Christ. currentes; et tunc a residuo ut prius abijce cyclos integros.


Exempla. Anno Inc. 1507 pro cyclo Solis adde 9, a summa 1516 aufer primo 1400, cyclorum sc. 50, inventos in laterculo, restant 116, ab his porro et 112 aufer, quos ibidem invenis, annos sc. cyclorum 4, restat 4, cyclos Solis ejus aequi.

Vicissim anno ante Inc. 3993, ut habes cyclum Solis, quaere in laterculo proxime majorem, invenies autem (accrevit 2 cyphris) 5600, cyclorum sc. 200. Adde 10, quia summa proposita est ante Incarn.; a summa 5610 aufer primo propositos 3993, restant 1617, jam ab hoc residuo ut priori exemplo aufer inventum in laterculo proxime minorem 1400 (cyclorum 50, accessita scil. una cyphra) restant 217, ab hoc aufer 196 (cyclorum 7), restat cyclos Solis 21.

*) Laterculus cyclorum ☉. (Ex tab. Rud. p. 40.)

1.	28	6. 168
2.	56	7. 196
3.	84	8. 224
4.	112	9. 252
5.	140	10. 280

DE TABULIS RUDOLPHINIS.



Keplerus in introductione ad librum primum Epitomes Astronomiae Copernicanae haec de Tabulis astronomicis dicit: . . . "cujusmodi sunt Tabulae Ptolemaei, quas emendarunt ante 400 annos Tabulae Alphonsi et ante 80 Tabulae Copernici, quas Reinholdus exactiores copiosioresque factas appellavit Prutenicas. Omnibus vero antecessorum tabulis, cum erroneae sint, colophorem imponere pollicentur Tabulae Rudolphinae, sic indigetatae a Tycho Brahe affectaeque, quae nunc lucem expectant."

Hanc tabularum praestantiae laudem, quas ipse ad finem perduxit, Keplerus sine arrogantiae crimine pronuntiare potuit, quia semper, cum illarum mentionem faceret, Tychohem dicebat auctorem. Cum vero passim in scriptis suis haec repetit Keplerus, non planissime vera dicit. Observando quidem Braheus plus profecit, quam ullus nunquam astronomorum priorum; ab anno 1576 ad annum 1592, 1594 ad 1596 in insula Hvenna, 1597, 1598 Wandenburgi, 1599 ad 1601 Pragae caelum continue instrumentis illorum temporum subtilissimis perstravit et observata diligenter literis mandavit (cfr. vol. I. p. 190). Peractae autem sunt, dicit in „Astronomiae restauratae Mechanica," hac ratione ibi (in Uraniburgensi arce in insula Hvenna, anno 1576 exstructa et paulatim aedificiis et instrumentis idoneis instructa), 21 annuorum sedulae observationes, quas, primum in magnis voluminibus conscriptas, postea seorsim in singulos libros, pro quolibet nimirum anno, distribui et ad mundum describi curavi. Desiderari ait, nihil aliud in stellis fixis, quam ut earum motus, universalis redditus, omnibus seculis adaptetur, in planetis nihil aliud restare, quam ut accuratae eorum observationes (annorum 25) in novos et competentes canones redactae numeris exponantur, quorum quaedam initia et fundamenta jacta sint.

Braheo occupato observationibus coelestibus et, postquam Pragam ad imperatoriam aulam transferat, distracto anticis occupationibus et oblectamentis, patrum otii erat, ut ea, quae dixit „desiderari," perficeret, forte etiam perhorrescebat calculum nimis implicitum et operosum, et inter eos, quos adjuutores observationum adsciverat, neminem ad hoc negotium aptum deprehendit. Quare Keplerum, cujus ingenium ex „Prodromo" cognoverat, Pragam vocavit, qui se onere illo liberaret, „ad opus Tabularum Rudolphinarum maturandum", ut ipse dicit Keplerus. Pragam venit Keplerus mense Februario 1600, ibique apud Braheum versabatur usque ad mensem Junium, et a medio Octobris ad Oct. anni 1601 Brahe nitebatur familiaritate. Mortuo Braheo (24. Oct.) „observationum relictarum tutelam sibi usurpavit, non obscura jussu imperatoris," ejusdemque (Rudolphi) jussu editionem Tabularum in se suscepit.

Quae remorae editionem hanc retardarint, Keplerus passim in praemissis voluminibus enarrat (cfr. vol. III. t. 2, 518. IV. 111. et supra fol. 25, 38, 45, 49 etc.) et in praefatione ad tabulas pluribus explicat. Initium se fecisse brevi post mortem Tychonis item ipse saepius testatur, prope ad finem perductas esse has tabulas anno 1624 testantur epistolae infra sequentes. Persecutus observationum Braheanarum „chaos“ primum jussu Brahei tentavit, ea quae de planetarum motibus annotata fuerunt, ad Brahei de mundo hypothesin adaptare. Quod quum minus successerit, inter planetas Martem elegit, ut propius cognosceret ejus motuum varietates etque incubuit usque ad annum 1609, quo Martem „captivum nobilissimum Imperatori Rudolpho spectandum exhibuit.“ Interim et reliquos adiit planetas, semper secutus Brahei observationes, eorumque theoriam ad modum Martis stabilivit. Lunae denique inaequalitates plurimum consumeabant temporis easque explicaturus adque certam legem revocaturus iterum deviat a proposito, Lunae theoriam in „Hipparcho“ suo demonstrare nisus; neque vero ad finem rem inceptam perduxit, librum imperfectum relinquens et ea, quae certa ipsi videbantur, propositionibus astronomicis „Epitomes“ vel „praeceptis“ Tabularum immiscens. Interim vero rem inceptam et sibi mandatam, cum ingenio ad hanc speculationem et operam pertractus, tum jussu Imperatoris et investigationibus omnimodis haeredum Brahei interpellationibusque Pistorii, quem ipsi Imperator quasi studiorum inspectorem constituerat, motus, nunquam plane abiecit (cfr. vol. III. 444 et V. 6 s.). Inter manuscripta Pulkoviensia pluries occurrunt tentamina, per varios annos conscripta, ex quibus patet Kepleri studium absolvendarum tabularum, quorum aliquot infra subjuximus. Neque vero tabulas illas tantum; sed ipsas etiam Tychonis observationes, certa lege conformatas, aegre consentientibus haeredibus Tychonis, edendas sibi proposuerat easque quasi ad prelium piratas dedit in epistolis ad Berneggerum datis annis 1627 et 1628. Albertus Curtius (Lucius Barretius, v. s. p. 583) in praefatione ad „Historiam Coelestem“ (ed. anno 1666) refert: poterant certe haec „commentaria“ jam ante annos 60 in publicum efferri, sed principum et librorum fortuna saepe cum publicis remoris permixta est, et repertus erat eo tempore *pulcherrimus color*, prodendas ante omnia Rudolphi tabulas, quae ex his observatis exactatae fuissent; id cum anno demum 1627 factum esset et Lucius Barretius, quem Keplerus Ulmae reversus familiariter convenerat, amico cum hospite alteraretur, publicatis jam tabulis causae nihil esse, cur ii commentarii observationum viris doctis adversus ea, quae Braheus ipse promiserat, diutius negarentur, post varias ambages audire demum debuit, eos libros Keplerum pignoris loco retinere, quoad destinata ab Imperatore stipendia integra repraesentarentur. Sed Keplerum biennio post mors abstulit, neque diu post subita ex aquilone procella Germaniae toti incubuit, ut de sideribus nemini cogitare liberet. Vigilavit tamen etiam tum inter ista-Ferdinandi III. providentia, qui cum intellexisset, quo loco hi commentarii expectari possent, quos Rudolphus Imp. tantis impensis a Tychoe redemerat, non omisit, etiam inter bella eam curam demandare III. et. Exceli. D. Georgio Martinizio, regni Bohemiae supremo cancellario, cujus vigilantia singularique industria effectum, ut hi libri ex latebris eruerentur.

De tempore, quo absolutae sunt Tabulae Rudolphinae et quo prelo paratas operis mandavit Keplerus, sequentes referunt epistolae.

Ambrosius Rhodius Cal. Sept. 1624 scribit: Gratissimum fuit, quod Tabularum Rudolphinarum perfectionem rev. D. Magister Greisla mihi significavit, nec

quidquam deesse amplius, quam ut Imperatoris sumtu videant lumen publicis juris fiant. Ipse Keplerus amico Berneggero nunciat: Tabulas Rudolphinas ex patre Tychone Brahe conceptas totis 22 annis utero gessi formavique, ut pedetentim formatur factus, et nunc ecce me dolores partus opprimunt. Credito, me proprie loqui. Ex hac mentione commode in aliud caput scriptiois devenio. Quid suades? Absente me nequeunt imprimi ex voto meo tabulae, nec erit impressio operae continuae, sed divulsae pro re nata. Aut igitur typographia mihi opus est in Austria, aut domo abundum diutina mora; relinquenda uxor, tres parvuli, filia nubilis; aut si simul adducenda familia, discedimus ab amicis, extinguimus uotitiam, obrepit nostri oblitio, nummationes exinus quam revertemur, sita pereunt aut periclitantur turbis bellicis suppellectilia. Quodsi eam, quis locus est eligendus, vicinus an remotus? vastatus an vastandus? Hae super re statui primo quoque tempore Caesaris exquirere voluntatem. Sed multum in concipienda propositione interest, domi bene deliberasse in utramque partem. — Sed abrupto. Tu vale meque ama. Dat. 10/20. Maii 1624. Lincii.

Berneggerus respondit: De Tabularum Rudolphinarum partu mirifice laetantur, quibus id dixi et quibus talia curae, utque favente Lacina propellam cum odas, una mecum votis calidissimis exoptant. De loco partitionis quod quaeris, Argentinam meam nominarem, nisi mihi et de typographorum nostratium avaritia et de sordibus eorum, qui publice haec studia fovere debebant, optime constaret. Quid enim aut ad felicitatem meam optatus aut ad posteritatis memoriam urbi gloriosius accidere posset? etc. Argent. 12. Julii 1624.

Post annum haec dat Keplerus Berneggero: Clarissime amicissimeque Vir. Cum heri ad D. Grinthal invitatus lateri vestri D.D. Glutbenii adedissem, is, qua est humanitate, ultro me admonuit, ut aliquid ad te literarum sibi traderem perferendum. Accipe igitur, quid pettum in Sueviam venerim, quid et Tubingam afferam. Jam ab anno apud aulam Caesaris institi, uti ad sumtus mihi tabularum, quas absolverim, observationumque Tychonis, quarum ab ejus morte custos fui unicus idoneus, aut sua liberalitate Caesar succurreret, aut reliqua mea Rudolphina assignaret. Et in ista consensum impetravi Caesaris, quia id maini: aliquid igitur pendent Memmingenses et Campidanenses, at Noribergenses, duplum ejus, id est 4000 pendere jussi, recusarunt. Jussus tamen ann. Augustae quantitas permutare in defalcatione ejus, quod proxime decerneretur ab universis, quod equidem brevi fieri necesse est. Augustani aerarii praefecti ut literas Caesaris resignarunt, copias in illis ad Noribergenses desiderarunt, ineuria curialium Viennensium omissas. Ita mihi haerendum est hic, donec Vienna suppleatur defectus; et tandem, ubi quantitatem dederint Augustani, nondum persuasum erit Noribergensibus, sed solum id beneficii, quod in futurum erit mihi cantum.

Interim ego Tubingam in musaeum Maestlini convocavi concilium mathematicorum omnium, qui a 2000 annis claruerunt quique post futuri sunt; facilius his est comparere, adde et consentire, quam praesentibus nobiscumque viventibus. Deliberationis capita maximi momenti sunt fere ista: 1) formam mearum Tabularum exhibeo, 2) motus medii non sunt amplius medii, postquam ex observationibus Regiomontani et Waltheri didici, Saturni praecipue, quin et Jovis et Martis loca omnia per totos eccentricos aut promotiora aut remotiora tunc inisse, quam fert modulus a Ptolemaeo ad Tycheonem decurrens aequabiliter. Itaque aequatione seculari fuerit opus, quae ante plurima secula deprehendi non potest, qualis omnino sit. 3) Interim innixus mediis jam cognitis, tanquam certis et aequatione seculari carentibus, invenio retro

ad initium mundi die quodam idoneo epochas omnes planetarum omnium, quasi in una cruce seu locis quadratis ex centro Solis dispositas, ita ut spes sit, introducta aequatione seculari minima, omnia illa loca in quatuor puncta cardinalia competitura. Eam epocham temporis mundani concilio cum historia sacra. 4) Eclipticae obliquitatem olim eandem, quae hodie est, evinco ex conjunctionibus Lunae et planetarum cum fixis, a veteribus consignatis adque nos conservatis. Itaque Eratosthenis observationem hujus obliquitatis interpretandam, Ptolemaei vero in dubio collocandam existimo. 5) In Luna post omnem apparatus Tychois et meum transigi de eclipsibus non posse puto, nisi introducta insuper aequatione annua, sive in motus Lunae sive in temporis aequationem usitatum. Haec vero sunt, quae per hos dies pauculos Tubingae agere coepi.

Jam tu dispice, cum honestis et necessariis de causis tergiversentur Noribergenses, quamvis admoniti avitae suae gloriae, possint per vestros Argentinenenses mihi subveniri, si nimirum vel ipsi in Noribergensium locum succedere consentiant, a Caesare requisiti, aut Noribergensibus persuadeant per intercessorias, aut si Argentinenenses nomen quidem sustineant apud Caesarem, Noribergenses vero, qui nolunt opinionem Caesari petaci praebere pecuniariae copiae, clam mihi dent aut Argentinenensibus vicissim caveant, aut si quid comminisci potes.

Peto et amplius aliquid. Literas ad Tampachium postae tradidi, petens exemplar Hyperaspistis; nihil respondet. Rogo hujus rei cum admones per literas, si forte meae non pervenerint. Chemlino mihi supplementum Ciliadias sen de usu. Excusa enim est Ciliias me inconsulto et inscio. Si forte exendit ille et si Argentinam allata fuerint exemplaria, mitte unum Tubingam ad Schickardum, qui te cum Lansio salutet jamque mihi operam impendit examinandis meis de genealogia Christi rationibus et cum Rabbiniis suis traditionibus conferendis. Vale. Datae Tubingae 20/30. Junii anno 1625.

Berneggerus respondit: Reddidit mihi Tuas, vir summe, Cutenius noster (bibliothecarius Argentinae et professor historiae in academia Argentinenesi, celeberrimis libris historicis et juridicis. Mort. 1636.).

Etiā sum jam aliorum studiorum, tamen pro veteri meo in divinam mathesin amore mirifico sum gavisus, cum de Tab. Rud. editione, tantopere expetita, serio tandem te cogitare viderem. Ignosce, quaeso, si hominem homo mortalitatis admoneam. Te sero admodum rebus humanis exini, publicum, meum quidem certe votum est. Sed si tamen humanitas aliquid tibi contingat, quaeso, quis absolvendis illis tuis, quae aeternitati destinasti, par erit? Itaque matrona quantum potes et labentis aevi velocitatem velocitate laboris anteverte; quamquam equo alacriter adeo currenti non tam calcareibus, ut video, quam pabulo quodam pecuniario fuerit opus. Id qui suppeditent fere deesse, ingrattissimi seculi opprobrium est. De illis, quos in fine tuarum scripisti, nil omnino sperandum: mercatores isthic rerum potiuntur, quod unum dictum tibi tam sapienti viro sat est. Ilabrebtus venit exactis nundinis nostris, qui, cum sit in aliquot principum aulis gratus et nominis tui cultor maximus, non abs re fuerit, opinor, ejus de impensis illis consilium, si non et auxilium intercessionemque petere.

Ad rectorem gymnasii Frankfurtensis, veterem amicum, nuper scripsi de illis, quae a Tampachio, a Chemlino curari voluisti. Responsum in dies singulos exspecto. Vale vir maxime, a D. Lingelsheimio, tui valde studioso, salve plurimum. Argent. 4. Julii Juliani 1625.

Keplero silenti instat Berneggerus, ut respondeat, inter alia dicens: Obnixte rogo, fac ut sciamus (ego et D. Lingelsheimius) ut vivas, ut valeas et quid rerum trahes. Non abs re metuimus, ne hac temporum hominumque peste divini ingenii tui foetus intercipiantur, cum aeterna infamia postimi seculi et studiorum non solum incuriosi, sed et in eorum perniciem quasi conjurati. Vale seculi nostri Phoenix. 4/14. Jul. 1625.

Keplerus Berneggero: *Chrissime vir.* Quas ad me 4. Julii 1626 misisti, tandem Ulmæ bis diebus accepi, postquam Mütschelinus, Ulmæ abies, Ratisbonam venisset ad uxorem meam. Ni fallor, deposuerat illas Ratisbonæ, cum me Lincii conclusum audisset. Quia igitur tuum et D.D. Lingelsheimi desiderium de meo statu significas, hoc vicissim a me habitote, me Dei præsidio et tutela angelorum obsidionem in 14. septimanas incolumem tolerasse, nec fame afflictum fuisse, etsi de equina nihil gustavi. Ea mihi felicitas contigit inter raros. Cum jam langueretur obsidio, Caesaris exercitibus adventantibus, nisi illud supplicem in aulam, veniam itineris Ulmam et transferendi eo typi petens; qua impetrata, cum uxore, liberis, libris, suppellectilibus omnibus Novembri discessi Lincio et relicta uxore cum 8 liberis in glacie Ratisbonæ, ipse euntem conducto cum typis numeris et operæ Rudolphinarum veni Ulmam; hic jam imprimitur meis sumptibus, sed duplo majoribus, quam Lincii eram opinatus. Faxit Deus ne in medio conatu succumbam! Ingens tamen vulnus inflictum est Austriæ nostræ, ex quo animam agere videtur; itaque ad omnes casus oportet esse attemperata consilia deliberationesque meas. Tu itaque cum fautoribus aliis subijcitis consilia vestra, quoniam, si ita ferat usus, me cum grege sex liberorum recipiam. Editis Rudolphinis dpto mihi locum eas docendi in aliqua frequentia, si potest in Germania, sin minus, etiam in Italia, Gallia, Belgio vel Anglia, dummodo salarium sit idoneum peregrino. Ephe-meridum computatorem spero me Tubingæ inventurum.

Valete. Saluta D. Martuckerum, meum patrum spiritualement, et D. Walsinn, cujus mater, ut moerens audii, nunc iterum est vidua, amissio intra 6 septimanas marito, homine optimo, D. Buchero medico, D.D. Lingelsheimi mea officia. Dabam Ulmæ in aedibus Horstianis d. 29. Jan. anno 1627.
8. Febr.

Quem dicunt Berneggerus et Keplerus Lingelsheimium, historia virorum in re literaria illustrum imbuti laedant; munere fungebatur illo tempore consiliarii Electoris Palatini. Quoad res Lincii gestas, notamus, agrestium tumultum in Austria superiore, partim ob res ad doctrinam sacram pertinentes, partim ob vexationes magistratuum coortum anno 1626 eo usque profectum esse, ut Bavari, qui agrestes oppressori archiducatum invaserant, Lincium se recipere cogerentur. Obsidio Lincii duravit per 14 septimanas et incolar eo usque redacti sunt, ut eamque et fenum carne vescerentur. Obsidio liberata sunt adventu Pappenheimi, qui ad finem Novembris crudelis pugna tumultum extinxit.

Berneggerus Keplero S. P. D. Quod diu optata pluvia siccis arvis idem mihi fuisse literarum tuarum post tantum silentii pertinacis intervallum allatae, cum abtulerint omnes diuturnae sollicitudinis molestias. Haud parum enim verebar, ne tibi communibus Austriæ calamitatibus involuto sequins aliquid acciderit, praesertim cum fama, in majus ut solet omnia extollens, de te ipso quaedam tristitia minaret. Verum uti evasisse periculum gratulor, ita bono publico diutissime superstitem agere voveo et una mecum omnes, qui te tuncque unice aestimant, e quibus D. Lingelsheimus plurima te salute impetit operamque promissimam offert, si qua re juvari a se velit. Et vero juvare si quis alius potest, per illam amicitiam, quae ipsi in Anglia, Gallia, Belgio viris intercedit artissima. Quorum ad locorum aliquem si quod significas aspiras, ipso commendante quod voles non difficulter obtinebis. Praesens ipse vidi, quanta apud Galliarum regis legatos, in Germaniam antehac missos, auctoritate valeat et gratia. Sed et Hugonem Grotium, cum Belgio suo excessisset, in Gallia solo per summum otium studiis jam vacare, inculento regni stipendio conductum, non obstante diversitate religionis.

Ne quid te celebem, cum ex tuis haud obscure conficerem; academicam aliquam cathedram docendae Rudolphinis tuis te non aspernatarum, non omnia secreto cum primariis scholarum nostrorum agere, cum qua ratione palladium hoc academia nostra tibi vindicare queat. Quodsi incolam placeat urbem honorare, non dubito; te gratis-

stium omnibus hospitem futurum; id quod etsi vix spero, vehementer tamen opto ut obtineamus. Est mihi domus ampla satis cum aëre permeante, tum et borto amoenissimo, ex qua hypocausta duo, cubiculum unum, cellam culinamque separatam et, quod caput est, animum ad omnia hospitalitatis officia promptissimum offero, si veneris pactus mercedem, qua nullis mihi pretiosior, alloquium conversationemque tuam quotidianam

Vale virorum *ἀγαθων* et eruditissimum Hebenstreitium, nisi gravē est, ex me perofficiose saluta. D. 23. Febr. 1627.

Keplerus Berneggero S. P. D. Clarissime vir, amicorum oculo.

Litteras tuas, 13. Febr. scriptas, accepi legique summa cum voluptate. Tanta enim sunt humanitate refertae, ut profecto verear, necnbi et mellis sit nihil. De loco apud exteros ecce quantis subsidiis oblati mentionem condis; quid ego non amplissimo viro D. Lingeisbomio, quid non tibi debeo, qui bene mihi concillas et tantum non das epulis accumbere Divum. Est omnino causae plurimum, car bujus ego tanti viri benevolentiam inter thesauros in futuras necessitates reponam. Cui rogo etiam atque etiam officia mea perquam tenuia, scio, cum salute renuncies. Ceterum, si bene memini, non ego scripsi, me jam nunc discessum ex aula meditari, in futuras solummodo necessitates, proposito Caesaris tam minaci, quod ex omnibus ejus dictis factisque elucet, cum non possim diuturnam spondere moram hoc loco, prudentiae partem existimavi, cernens circumspicere, quis mihi locus patere possit. Habeo rationes domesticas, quae me etiam contra spem melioris status arctius alligant Austriae. Discessum inquam ex aula ultro attentare vereor, secessus vero praetextu tentare procerum (Lutetianorum) in me animos, petita biennii absentia, ut tabulas meas viva voce profiteri possim, id in meditatōis habeo. El vero, qui cum hac conditione se confert in academiam aliquam, locus professionis ordinariae non sperandus est, an vero locus ei docendi concedatur extra ordinem, id tu me noveris melius. Si esset aliqua frequentia studiosorum, existimo confugiendum ad altricem astronomias, astrologiam, petitisque temporibus singulorum genethliacis, polliceri non tantum rationem computandi positus siderum, sed etiam explicationem significationum naturalium. Sic enim ex auditoribus privatis quilibet secum ipse solus sciret ea, quae a me publice dictarentur, ad se pertinentia. Sed tamen opus esset aliquo adjumento certo et liberalitate vel principis vel reipublicae.

De habitatione quidem et hospite sic mihi esset Argentinae prospectum tua benevolentia, ut ea sola commoditas me Argentinam allicere debeat, si ceteri sumtus non supra vires meas essent.

. Aliud aliquid est, in quo tuo velim uti consilio, vereor tamen, ne tu rem a te facias alienam. Tabulas excudo meis sumtibus, emtores erunt, ut solent, mathematicorum operum pauci, praesertim his belli tumultibus; semper tamen erunt aliqui etiam in posterum. Exemplaria, quin *ἡ τὸν ἀπολύτῳ* forte melius habiturus fuero, facio 1000. Hactenus Tampacibii fidei credidi talia opera, quae non potui aliter nisi propriis extrudere sumtibus. An vero consultius aestimas, ut ea curem adservari alibi, in proprio conclavi conducto, an vero in alia urbe? At quia nunc in Germania pauca distraherentur exemplaria, an ego vel Ulmae relinquam ad 600, tantum 400 Francfurtum mittens, anne potius Argentinam mittam, ut sint Galliae et Italiae viciniore? Aut si Frankofurti adservanda, quem ergo suades eligere custodem? Rursum: quo pretio vendam, si sint paginae 60 in folio bonae et majoris papyri, seu medianae, ut appellant? Si caro aestimem, minantur aut omniuntur aliqui imitationes Halorum vel Belgarum damnosae; si villi, pilulo plura sum extrusurus

proxima undinis. An ergo Frankofurti considero eum famula, ut ea ipse distraham, ut alia opera edam vel meis, si possum, vel patronorum, vel denique typographorum sumtibus, qui gratiam sibi debere ajunt, si librum mathematicum suscipiam edendum, 30 exemplaria dant pro labore. Sic haetenus sed Liñci salario suffultus procerum, aulicum in augmenti honorarii parte reputavi nec ural sollicite; typographiam aliquam introduxi adjuvique pro viribus, opuscula nonnulla excudi. At nunc perit Austria; si revertar, in aulam concedendum erit.

Habes fasciculum perplexitatum mearum, ex quibus si tuis me consiliis extricaveris, multum nostrae amicitiae debebo. Vale et quod nunc te agere, puto, ex significatione tuarum, strenue rem gère. Ulmae 6. Apr. (ut n.) 1627.

Quae ultimo loco dicit Keplerus, non plane illustrant epistolae Berneggeri, qui anno 1624. Keplero gratias egit „pro sapientissimo fidelissimoque consilio“ et de adversarii eius dicit, „qui iucunde terrorem voluerunt ostentare in longinquo in me telis et missilibus ad nostros aliquot exemplaribus frontispicii libri, cujus auctorem praestandum agere nunc Moguntiae“ etc. Anno 1626 scribit, spectans forte illud „consilium“ Kepleri: adversarius meus, quem hosti, tandem peperit partum, quem diu adeo peperit. In ceteris aequor, quod mihi pridem communicasti, sapientissimum consilium tuum, nam et superiores jubent et amici monent, ut respondeam. Anno 1627 (in literis d. 23. Febr.) pergit: De adversario quae paterno mones, grata sunt et haecenus obsequar, ut mihi temperem a convitiis et verborum acerbitate. Sed ut prorsus responsum emittem, id mihi per meos non amplius est integrum. Hincque varis distractis occupationibus nil meditari potui. A festo paschae, intermissis ad tempus academici laboribus, huc uni rei vacabo. — Haeo forte, quid in re sit, explicabunt inter libros Casparis Scioppii deprehendimus hunc: Classicum belli sacri, sive Heldiae redivivus, „de Christiani Caesaris erga principes ecclesiae rebelles officio“ etc. Ticini 1619. In praefatione refert Scioppius, libello hoc revocare se in memoriam posterum verba Matthiae Heldi, imperialis quondam procancellarii (Caroli V.), qui epistola „scaenoris“ Carolum dehortatur, ne cum haereticis foedus faciat illorumque auxilio utatur. His respondit Berneggerus anno 1620 et 1621 ficto nomine Theodori Berenice libello inscripto: Proslutium tabulae pecuniae Scioppiano belli sacri classico. Quae vero post haec tempora Berneggerus contra Scioppium scripserit, aut hic contra illam, nescimus.

Keplerus Berneggero S. P. D. Clarissime amicissimeque vir. Tabulis Rudolphiinis absolutis, idque meis sumtibus, eum mercatoribus Ulmenis profectus sum Franeofurtum. Hic cum difficultas oriretur de taxa exemplaria, quia enim in societate cum Braheanis, rem detuli ad commissarium librorum Caesareum. Hic, consultis idoneis, diversas reperit sententias. Docti, et quidem Jesuitae, omnibus perpensis statuerunt, exemplaria taxam 5 florenorum, cum sint paginae 63, ut sic pagina veniat pro $4\frac{1}{2}$ erucigerorum. Mercatores vero librorum, „solam mercem intueri“ jussi, taxam dixerunt 2 florenos. Dominus commissarius medium dixit, 3 flor. pecuniae praesentis, ita ut studiosi ipsi per aliquem delegatum, cum quo de opera et vectura conveniant separatim, missis 2 imperialibus habere possint unum exemplar. Taxa dicta est hodie studentibus jam undinis. Mitto igitur exemplar, ut id studiois idoneis possis monstrare et, si me, imò si literas amas, eos instigare (missis etiam literis in Gallias ad idoneos), ut sibi ipsi comparent exemplaria, missis ad Tampachium pecuniis. Sed is non dabit exemplar, nisi pecunia jam numerata. Cum professore mathematicos agi posset, ut id pro lectione significaret et studiosos adhortaretur ad emendum. Possunt per eas tabulas sine opere ephemeridum tabularumque directionum erigi etiam themata et directiones computari compendiosissime per tab. anguli orientis et logarithmos.

Observationum Tychonis excudendarum causa circumspectis occasionibus manendi in Germania superiori, praesertim cum omnes evangelici ex Austria relegentur; metus itaque me habet, ne et ego exulibus accensear, loco gratiae, qua fruebar haecenus. Eundem tamen est Linclum elocatae pecuniae

causa. Interim uxor et liberi haerent Ratisbonae; interim venit hiems. Ita omnes spes in futuras mundinas recidunt.

Munda papyro exemplar Francofurti nondum mittere possum; mittam Ulma. De Gallia imitatura typum confidenter minantur, itaque consultum est, expectare sequentes mundinas interimque curare, ut tunc justus aliquis numerus simul extrudatur. Si tamen interim petentur exemplaria in loca non suspecta, modo de eo constet Tampaebio, pecuniis repraesentatis mittere jussus est. Quodsi aliquis numerus a vestris peteretur studiosis, possent illi breviori via accipere Ulma. Primae pecuniae omnes meae sunt pro sumptibus Impensis; quibus refusa si quid residuum erit, in semisses distribueretur me inter et Braheanos.

Haec breviter. Tu me qua potes adjuves, etiam atque etiam rogo. Vale. Francofurti 2. Oct. (st. n.) 1627.

Berneggerns Keplero S. P. D. Accepi uuper, eximie vir, a Boeckenhofero bibliopola literas tuas, Tabulas vero Rudolphinas nondum accepi, praeventus a D. Habrecht, qui eas videndi cupiditate stimulatus obtinuit ab eodem Boeckenhofero, affine suo, sed brevi mihi reddendas. Ago gratias ingentes pro tam pretioso munere, tam expectato tot annis a doctis omnibus; *arriduo* aliquod vel pretium certe libri remisimus eram, nisi, qui tuus genius est, id acre te laturum opinatus fuisset. D. Habrechtus haud dubio librum emtarit, quamquam ejus appellandi copia mihi semel iterumque quaserenti data nondum fuit, uti hoc ex ipsomet andirem. Suaserim, aliquot exemplaria libri prima quavis occasione huc mittas, nonnisi inter bonos, a quibus metuendae non sint imitationis insidiae, distribuenda, et unum quidem pro D. Habrecht, aliud pro D. Nic. Agerio, aliud item pro D. Val. Esplelio, medicis. Sed et mathematicae academiae nostrae, M. Is. Malleolus, exemplum charta munda petiit, ut aere uno procuram, auditoribus librum se commendaturum pollicitus. Item D. Cluentius petit etiam exemplar charta meliore pro Illustr. Principe suo, cui a consiliis est, Augusto Duce Luneburgensi; pretium ad primum libri conspectum per me remisuros. Quodsi hoc ipsum etiam exemplar tua manu Principi dedicares? D. Lingelhemius (a quo plurimum salve) tuo nomine scribit in Galliam, ego hodie Basileam, nihil intermissuri, quod ad te, quem ob immortalia in rempubl. literariam promerita summopere colimus, adiuvandum pertineat. Plures unce Uimenses causa studiorum hic agunt, quorum parentes a rectore indicati, a famulo moniti, si pretium istorum exemplarium solverint, eorum filii statim hic a me recipient. Nam pecunias in hoc rerum stata transmittere non est consilium. Vale. d. 7/17. Oct. 1627.

Keplerus Berneggero S. P. D. Clarissime vir, amicorum eoryphaei Ulmam tarde admodum reversus, die sc. 30. st. v., tuas inveni literas. Quibus lectis, ut brevis sim, tradendum affini meo Comerello mercatori censui fasciculum 10 exemplarium, inter quae sunt 7 villora, tripls a commissario Caesareo florentis aestimata, tria mundiis, quibus singulis accedunt 40 cruciferi. Figuris ex aere non habeo ad manus, Noriberga submittam cum inscriptionibus manu mea, quas tute mihi literis praescriperis. Pro vectura solve quod legitimum erit, puto ad 30 cruciferos petitum iri, idque detrabe de pretiis; residua aut adserva in meos usus aut per cambium Noribergae praesenta Phil. Ekebrecht mercatori Noribergensi, amico meo. Nam familiam hac hieme Ratisbonae relinquo, dum me in uola expediam, cui slendae nummis opus erit. Statui biennii absentiam ab aula petere, ut Francofurto sim vicinius ad edendas observationes Brahe.

Obsecro ne quis typographorum bibliopolarumve resciscat, esse penes te exemplaria venalis. Nam in spe sum contractus cum Tampaebio, si is paulo quid aequalis obtulerit; eaque, quae sunt inter nos consultata, per hoc tuum

silentium integrâ manere velim; donec prius cum Braheanis hæredibus conveniam. Turbant enim Braheani agitantque suam dedicationem, quæ sero advenit, etiam præfigere. Quibuscum, Deum precor, ut commodè transigam, ne læptias ipsorum propalentur. egoque ab ipsis infortunii, quod ipsi sibi per eas sunt attrahaturi, conciliati insimulor.

In tradendo bibliothecæ vestræ exemplari considera, num opera D.D. Schmidii uti velis, quem Francofurti sum allocutus admodumque benevolam sum expertus. Ausus quin etiam est certo mihi promittere, si, quod Norbergenses requisit a Caesare recusarunt, commodare illi ad meas manus 4000 flor., quod de futuris contributionibus recipiant, id ego in plures dividere possim, representata Argentiniensibus quantantia præfecti aerarii Imper. pro 200 vel 300 thaleris, ipsos mihi non desore.

Ignosce quæso brevitati meae; omnes quos mihi nominasti a me quam officiosissime saluta et vale. Scripsi Ulmæ 9/19. Nov. 1627. proxima occasione discessurus Ratisbonam.

Berneggerus Keplero. S. P. D. Summe vir, nolim putes factam negligentiam meam, ut tardius ad tuas responsum accipias. Causa morbus fuit sane quam periculosus ac mihi prope fatalis, qui me dum ad tuas responsa mēditor, corripuit. Nunc dum prætor spem se fere præter votum (quis enim in hoc tali ævo magnopere vitam expetat?) e morbo erepto prima mihi cura fuit scire, quid tuis Tabulis Rudolphinis agatur. Ipsa Januarii Calendis mercator quidam (Ulmensis, ut puto) mihi transmissæ fasciculus 10 exemplarium petiitque pro vectura 12 bacos, tulit 10. Non fuerunt, ut scribere tui mēmini, diversi, sed ejusdem generis, omnia sc. ex viliori charta; quod quomodo peccatum, nescio, nisi quod suspicor, Norbergenses, qui typos ex ære recte addiderunt, exempla mundiora sibi servasse, alia per fraudem substituisse. Alioquin sane maluissem, ista duo exemplaria, quorum alterum academicæ bibliothecæ per magni rectorem, alterum Duci Luneburgensi per D. Clutenium obtuli, meliori charta constare; quamquam vel sic grata futura non dubito.

Nuper adivi a rectorē et decanis, qui quasi privatum academici consilium constitunt, decretum tibi *avdngor*, Imperiales thaleros sex. D. Clutenius an principis sui voluntatem et iudicium expectaturus sit, ut primum eum conveniam cognoscam. Ceterum exemplaria binis imperialibus redemerunt D. Habrechtus, M. Malleolus, academia Basiliensis, M. Welperus, D. Agerius nam, cujus pretium ait patrem convictoris sui M. Petri Huberi Ulmæ soluturum esse. D. Remus, mathematicus Archiducalis, etiam aliquod expetere dicitur, quamquam id nondum a me poposci. Restant adhuc exemplaria duob. quibus emtores facile reperiam. Quid porro de pecunia cum accepta, tum academica, quam singulis momentis habere potero, statuendum sit, tuam sententiam exspecto. Vale. Argentor. 3/13. Febr. 1628.

Has literas eodem exemplo misi Pragæ, ubi nunc agere te suspicor, ut alteræ saltem ad te veniant. Ex D. J. Schmidio J. C., mathematicum amantissimo et aliquantulum perito, non obscure animadverti, magnam te gratiam apud ipsum initorum fuisse, præmium etiam haud aspernandum habiturum; si tabularum exemplar ei obtulisses, cum Francofurti una essetis. Quæso facias adhuc et typum illum chalcographicum tua manu ei inscriptum huc mittas. Conjugam ego eum libro (cujus adhuc 2 exempl. supersunt, ut dixi) ipseque offeram.

Operi tam nobili et gentium æternitatis habenti debuisses, credo, tuam imaginem ære expressam præfigere, ut te non solum finis, sed etiam in cute nosceret posteritas. Quæso, si quid apud te possum, facito.

Keplerus Berneggero S. P. D. Clarissime Vir. Cum ad vos revertatur legatus vester Fridius, quocum oretenus tibi vacabit loqui de rebus nostris, brevis ero verbis. Exemplaria 10. ta per Comerellium Ulmensem accipias spero. Cum Braheanis conveni; recuderunt hic primum duemionem cum præfatione seu dedicatione sua, a me correctâ, exempla mittam ex mundinis.

* Si quid peculiarum ad te congeritur, id filius meus, qui Tübingae studiosum agit in stipendio Fickleriano, jam dudum totum, quantum quantum est, aviditate hausit inexplibili. Itaque cura velim vacca, quorsum id sit transmittendum, saltem per Fridium epistolium ad me mittas, ut sciam, quantum id sit, atque ego facies tibi rationes explicabo, quibus hoc onere custodiendae pecuniae leveris. Errata nonnulla in praeceptis ultra ea, quae sunt inscripta indici, hactenus mihi detecta sunt ab utilibus, quae cogito subungere appendici unius paginae, de praxi astrologica. In genesi Rudolphi error 11' in loco ☉ properante typo relinquendus fuit in omnibus planetis, nullo tamen effectu in illis, neque nocetur exemplo operandi. Sit hoc emulorum exercitium primum, ut correcto loco ☉ retractent calculum planetarum, quisque sub marte.

Calamitas et *παρολθηται* Sueviae dubium me tenent; Ulmanne mittam imprimendam appendicem, an alio. Vale. Pragae 4. Mart. 1628.

Berneggerus Kepleri S. P. D. Vir summe. Tuas heri recte mihi reddidit Fridius noster, quem si scissem tam diu Pragae haesurum, literae ad te mense, quas 3/13. Febr. et Pragae et Ulman eodem exemplo miseram, citius simul ac certius ad te pervenissent. . . . Academia nostra dedit pro suo exemplari imp. 6, academia Basiliensis 2, Mathecius 2, Welperus item: Operam dabo, ut quae restant exemplaria primo quoque tempore dividendam, aut si id minus fieri potest (omnia enim de publica privataque egestate quercibus undique circumsonant indeque studia, praecipue mathematica, pessum eunt), faxo ut comoda occasione Ulman aut quocunque vules alio referantur. Exspecto ex nundinis et, praefationem Braheansum et quam initio promisi figuram aeneo typo expressam. . . . D. Clutenius responsum a principe suo expectat. Ceterum 12 imperiales Tübingam intra biduum triduumve non transmittam quidem (id enim periculose fecero, milite has oras undique premente), sed per cambium transcribam, occasionem, quam commodissimam Kurnerus Calvensis, perendie domum abiturus, monstravit. Vale. 9/10. Mart. 1628.

„Calamitas“ Sueviae incepit edicto Imperatoris Ferdinandi, quo restitutio coenobiorum imperata est. Quod mandatum ut perficeretur, exercitus dux Wallensteinus Württembergiam invasit initio anni 1628 ejusque cives per illum et sequentem annum tribulis, quasi victis impositis, summa miseria obruit.

Keplerns Berneggero S. P. D. Clarissime vir. Accepi et charitam, a tuo praeceptore domestico, te decumbente, scriptam Ulmanque missam, et binas tuas epistolas, ex qua convaluisti. Deo gratias ago pro amico mihi conservato. Miror te exemplaria invenisse ex papyro omnia villiori. Ego diserte invenio annotata in meo memoriali melioris notae tria. Non divino, quis permutaverit, nisi forte cum mercatore Ulmano Comerello, meo affini, typographus conspiraverit, qui 4 villioris papyri ex pacto adeptus est. Ulma nisi in iter Argentoratense non excesserunt exemplaria. Vide vero ne in hoc sit deceptio, quod, etsi duplo majus pretium solvi pro papyro meliori, differentia tamen non est magna bonitatis.

Si filio meo transmisisti nummos et non amico meo Schickardo, quem ejus inspectorem esse volui, id tu quidem benevole, at ego doleo eoque rogavi D. Fridium, ut quos illi dedi 20 flor. et ipse mitteret non filio, sed Schickardo. Sin admodum retines, retineto etiamnum et filiae meae Susannae virgini, quae in gynaecio Dürinaensi futura est, petenti concedas aut per cambium transmittas. — De Sagänensi mea commoratione ad edendas observationes Tychoonis Brahe nihil habebam solidi, nihil tutum, aut admodum expetibile, quo te exhiberem. . . .

Multa hoc die scribenda sunt, ignosce brevitati et vale utque valeas cura,

modum lectioni statue, satis superque habens in thesauris, et plus quam non tantum eloquaris, sed etiam cogitando percenseas. Pragae 5/15. Apr. 1628.

Berneggerus Keplero. Vir summe! Non statueram ad proximas tuas. Pragae mense Aprili datas, prius respondere, quam de Luneburgensi bonorrio certi quid significare possem; sed nimis longum id fuerit silentium, res lente procedit. Nuper ostendit mihi D. Clutenius a suo principe literas, quibus nondum sibi redditum librum, cum desiderio tamen expectatum, significat; spero, dignum dante, dignum accipiente praemium, et monitorem se D. Clutenius offert. De reliquis exemplaribus D. Remo unum dedi itemque unum J. Lud. Stradae, quaestori reip. nostrae, mathematicum bene gnaro tuorumque praecipue scriptorum admiratori. Vidit apud me tuam Harmonicen, cujus exempla non exstant in bibliopoliis nostris. Fac quacuo scilicet, unde is librum tantopere expectatum sibi comparare possit. Francofurti scio apud Tampachium prostrare tua pleraque, sed de Harmonice, quippe Lincl excusa, dubitamus. Sed et D. Habrechtus remissum pridem exemplar tabularum praeter opinionem (credo quod Francofurti non minoris emi didicisset) nuper repetit. Ita superest adhuc unum exemplar, quod D. Eschichum expectat.

Dedicationis Braheanorum exemplaria ab Hebenstreitro nostro recte accepi et dedi quibus oportuit. De trium illorum exemplarium, quae dixi, pretio 6 sc. imperialibus, scripsit non ita pridem ad filiam in Durlacensi gymnaseo monique, per quem eos mittere vellet ostenderet. Sed nihil dum accepi responsi. Filia 12 imp. accepit ipse, nam de Schickardo prius significatum oportuit. . . . Vale. Argent. d. 15/25. Junii anno 1628.

Berneggerus Keplero S. P. D. Vir excellentissime. Habes hic a filia literas, cui nuper imperiales 8 misi Durlacum, redactos e libri tui distractis exemplaribus omnibus reliquis. Nam priorum pretium filio, ut scis, numeratum est. Eidem filio vel potius ipsius nomine Schickardo misi nuper 20 flor., quos monitu filiae tuae a D. Fridio repeti, qui dicit, se pridem eam pecuniam redditurum fuisse, nisi potasset expectandum chirographum tuum, quo traditae sibi pecuniae fidem tibi fecit. Sed acquievit in apocba mea manuscripta D. 4. Sept. 1628.

Berneggerus Keplero S. P. D. Vir summe. Non dubito, pridem e meis ac tuorum literis cognovisse te de pecunia e Tabulis Rud. redacta rectoque partim ad filium, partim ad filiam curata, nisi quod a D. Clutenio nomine principis Lunenburgici nihil dum accepi; nihil etiam a D. Agerio, qui uos primo rejectit ad convictoris sui patrem Ulmensem, nescio quem, cujus frustrationem ac tergiversationem cum ei significassem orassemque, mihi committeret illam pecuniam filiae tuae mittendam, respondit, prius inquirendum sibi, nam quid Ulmenis ille suo nomine exposuerit, se enim denno eum de solutione appellasse. Ut sit, non est quod de solutione dubites. Etiam D. Clutenius spem honorarii fecit si imper. non minoris, proxima principis sui literis significandi; nam expectare se mandatum certum. Octo hos imperiales interea, dum rescribis, cui dare debeam, accipiam, uti spero. . . . D. Argent. 13/23. Jan. 1629.

Keplerus Berneggero S. P. D. Et prodesse volunt et delectare poetae. Tu quoque Cl. Vir, amice carissime, impenso tuo studio mihi commodandi dici non potest quantum me in hac turbulenta mea solitudine reces. Nimirum et solitudo est, quae me sepositum ab urbibus Imperii angit, cum lente et cum ausu magno commeant literae, et turbae reformationis, me quidem intacto at non aequè neglecto in occulto, exempla tamen et imagines tristes statuunt ob oculos, dum noti, amici, proximi subvertuntur, dum sermonis commercium cum perterrefactis metu intercipitur etc.

Revertor tecum ad pecunias, ut ais, meas. Puto jam Bartschium scripsisse, quo Fridius quiete componatur. Rescribere mel, eos 20 flor. esse devolutos in pastorem quendam Tubingae vicinum, qui soluturus sit residuum, nescio quando. Intellego hinc, meos acceptasse procul dubio solutionem hanc eoque Fridium esse liberum. De reliquo, cujus spem facis, non est cur ante

disponam, quam in tua potestate sit. Quidquid tamen erit, filio meo ad actum magisterii commodum obveniet, hac solum cautione, quam te rogo: ut non sine consensu filiae meae, quae Durlaci est, Tubingam mittas, si forte commodius Tubingam transferre possis recta, quam per Durlachium.

Literas ad filiam (a qua diu est cum accepi) adjunxi his Noribergam deportandas dedique negotium Eckeprechtio meo ibi, ut vel ipse mittat Durlacum, vel in basce ad te spectantes inserat Vale, Doo commendatus. Dabam Sagani postr. Cal. Mart. Greg. anni 1629.

Keplerus Berneggero S. P. D. Clarissime Vir. Maium aliquod videor ambodorari, Eckebrechtus meus, civis Noribergensis, ad quem omnia mea negotia remisit, a 2 mensibus nihil scribit. Ad illum misi literas ad te et filiam meam ante 2 menses, misi ante 3 septimanas Gürlich alteras cum inclusa epistola ad Bartschium, de quo multa quacsivi ex te. Ergo jam anxius sum de omnibus rebus meis, de Linceneibus debitis, de exemplaribus Tabularum, de mappa nautica, quo nomine habet a me 120 flor., de filia, de te, de amicis Ulmensibus. Rogo literas responsorias includas ad Jo. Siberum, magistrum postarum Lipsiensem D. Sagani 19/29. Apr. 1629.

Haec sunt, quae Keplerus cum Berneggero egit de Tabulis Rudolphinis. Quae restant epistolae nec non quaedam, quae hic e praemissis epistolis omittenda censuimus, pertinent partim ad librum mathematicum, quem edere in mente habuit Keplerus, partim ad res domesticas, vitae Kepleri reservanda.

Volumine V. p. 46. diximus, superesse epistolas Kepleri ad W. Schickardum datas, quae maxima ex parte typum Tabularum Rudolphinarum attineant, responsiones vero Schickardi desiderari. Epistolas has praemissis subiungimus, cum ex parte quidem illis lucem quandam afferant. Prima illarum inscripta est:

Clarissimo Viro, D. W. Schickardo, Linguae Sanctae Professore in Academia Tubingensi, D. Amico et hospiti meo charissimo.

S. P. D. Quae hic gerantur, velim vobis omnibus spectatoribus geri, ut animos ad eadem sufferenda praeparetis, si quando et vestrae visitationis tempus accesserit. Si melancholicus vester has tristes rerum imagines animo concepit, abunde illi fuit incitamentorum ad mortem capessendum. Magnum lenitatis argumentum, quod non ustulamur, sed vivere nobis licet, siquidem vivere licet illi, cui vitae tolerandae subsidia denegantur. Nam pupillis, agricolis, et ut audio, in posterum etiam opificibus exire provincia non licebit, nisi cum iactura et bonorum omnium et honestatis intra quidem provincias: nam fama foris premi non poterit. Haec de me meique dicta nolo, nam adhuc mihi frui licet privilegio conditionis aulicae.

Cnriosus aliquis, Famae filius, immaturum sparsit famam de libris meis circumscriptis: quae res etsi me in sollicitudine constituit, sciebam tamen in umbratili piagam desitutam. Scilicet etiamnum obsignata est bibliotheca mea interdiu. Sed haec missa faciamus.

Discessus mercatorum me de collectaneis nonnullis admonuit, quae dudum ad te perscribere meditatus sum: ea hac vice perscribo rogoque, ut respondeas.

1) In illa circuitione Veneris circa gibbam Lunae speciem quaero, cum occiderent planetae conjuncti, quantulo spatio Venus praecesserit Lunae proximum marginem, comparatione ad diametrum corporis Lunae inter cornua ductam? Et anne spectaveris, usque dum occumberent?

2) An acceperis Hyperaspisten et pecuniam Frankofurto? (Scribit contra me Claramontius Romae.)

3) Ubi Beckius? anne recipiat in se sculperet globum Terrae cum 2 planis circularibus? Nam cedo discriptione illa circulorum circa Novam Guineam et Salomonias, quam illi proposueram literis ultimis, maneat integra plana circularia. Tantummodo id observetur, ut per quindenos gradus ducantur meridiani, non per decos; et principium numerationis geminae fiat ab eo, qui per Huennam, hanc ipsam ob rem, transit, numerenturque 14 aut 15 horae ia occasum, 9 vel 10 in ortum.

4) Quid RAMBAM tuus de combustione et contritione vituli aurei? An igne absumi potest aurum? Quaeruat enim de hoc chymistae.

5) Apud D. Besoldum ut et apud Lansium, quibus a me salutem, rogo inquiras de scriptore historico Lusitano, Jo. de Barros; is anno 1506. 13. Jan. annotat ecipsam Solis Cochini viam (ut scribit Kirwizer Jesuita in descriptione cometae 1618 in India viei), quam invenio a. 1507 dicto die: an igitur etiam Hispani annum in 25. Martii innovent? Item circumstantias omnes ecipsae videre velim. Quodsi alicui vobis suppetuat visae ecipsae Solis (etiam illius lunaris descriptionem, cujus praedictione Hispanus eibi portas aperuit oppidi Indici) ex locis remotis, cupio iis javari.

6) An Flaidero (ei salutem) transmissa comedia Iuma, prosa vernacula?

7) Invenio in scheda mea vocem *Connicere*. Quid ea me velit monitum, ex te discam, ipse enim sum oblitus.

Vale, saluta notos et nostros ad vos advenientes votis, ope, consilio juva. Lincii 1626. 15/25. Aprilis. Uxorem tuam seorsim privato et secreto officii genere saluta efficeque, ut, mihi de mea procuratore gratias agat.

T: A.

Jo. Keplerus, Mathematicus

P. S. In summa non Germaniae tantum sed plerumque Europae provinciarum perturbatione mirari noli, si etiam mea consilia editionis tabularum perturbentur et hac usque diata sint. Ego tam sum cupidus editionis, quam Germania pacis, nec minus operas pono in re hac; sed ultra initium nondum processi.

Schickardus fratri Lucae summam harum et priorum Kepieri litterarum refert, d. 20. Jul. scribens: De Kepieri statu pro tempore turbulento. Scribit, quod editio tabularum nihil impediatur intestinis motibus rusticorum. Omnia quidem publicationi necessaria jam ad manum habet et cum anno superiori mecum esset, mensa mea per mensuram usus, significavit, sibi a Caesare sumtus assatum suppeditatos esse, quibus papyrum emerct ac typothetas remuneraretur (nam propriis impensis edere consilium putavit). Hat auch einen gangen Bogen voll Papier droben zu stampfen bestellt und auf der Renowt hinstattsetzen lassen, item neue Schrifften von besondern astronomischen Observationen gessen lassen.) Item ex universali fama pridem hand dubie novisti, quod Jesuitarum instinctu Caesar ejus bibliothecam (in qua multi etiam libri controversae religionis) circumscripsit et obsignavit, mathematicos tamen libros, si fallor, libero potest usurpare. Significavit nuperis literis, quod anne Claramontius Remac aliquid contra se scribat aliud, indigne sc. ferens Tychonis vindicias. Nempe plura ipsi dolet Hyperaspistes, ante annum editus Francofurti, quato mihi, licet etiam tacto p. 170 et 200. Vidistisne librum? Quare, et invenies, quomodo me tractet.

Proxima litterae, filium Ludovicum spectantes, datas sunt Ulmas 16/26. Dec. 1626; quae has sequebantur, haec habent:

S. P. D. Clarissime vir, amice et hospes char.

Etsi jam dudum expecto abe te, Lansio et filio meo responsorias, tamen quia heri demum mihi sunt redditae, quas scripsisti d. VII. Trinitatis, et.

gula compertum mihi, quis quid agat ad te Tubluga abstrahendum, cogit me materia tuarum litterarum respondere, et pereorari, quid in te spei sit. Oblitisti u. tuam operam in sculpturam mappae universalis. Et ego quidem addo Tabulis indicem copiosum locorum ad 600, mappam vero destinavi solius navigationis usibus, eoque non putavi aptiorem posse esse figuram, quam illa est bisectio in duos discos circulares, ut qui minimum distorquent figuras. At tu vinclis ceteris omnibus rationibus. Non tamen persuades de unico solo hemisphaerio. Accipe igitur, quid hae nocte inciderit, qua figura puto praestari usus, quos tu quaeris. Schema quamvis rudissimum loquatur ipsum. Habes una et mensuram papyri meo, liber erit in folio. Rescribe quid videatur et quantus sumtus tam cupi quam sculpturae.

De libris Francofurtensibus recte omnia. Pecuniam si habes, habeto.

Fillum meum urge ad crebro mihi scribendum. Paupertatis opinionem ipsi saluberrimam dedi pro viatico revertenti. Calcaria mea abstulit nec remittit, nec rescribit de commissis negotiis. Vale, brevitati ignosce. Vexat hanc manum ulcus subalare, non id ex officina vestra periculosum, absit, sed tamen ulcus, quod tamen jam depuratur.

13/23. Jan. 1627. Ulmao in Rhodiglin beyen Buchdruckern D. Horstig.

Clar. Dominationis Tuae

Amicus J. Kepler.

Schaeffero, Flaydero, amicis ceteris salutem.

„Mappam“ quam dicit Keplerus, subiunxit Tabulis Rudolphinis, eamque ut nimis extensam nec ullius hinc nostrae aetati usus omnium. Inscripta est: *Nova orbis Terrarum delineatio singulari ratione accommodata meridiano Tabularum Rudolphi Astronomicarum. Ex praescripto Tab. Rud. pag. 33. 34. 35, 36 et praecceptorum LX, LXL. pag. 41, 42; petente typumque emblematis innuente Joanne Keplero Mathematico Caesareo, amico clarissimo, ita disposito suaeque manu exaravit, exculpi denique fide integra curavit Philippus Ekebrecht, Civis Norimbergensis. Sumptus faciente Jo. Keplero sculpsit Norimbergae J. P. Walch. A. 1630.*

Typus Tabulae talis est: aquila biceps corpore suo sustinet planiglobium orbis antiqui, capita aquilae in rostris tenent clipeos, coronis laureis circumdatos (sine dubio, certe in his exemplaribus quae nos innoximas, post annum titulo adscriptum exaratos, cum tum temporis non Leopoldus, sed Ferdinandus Imperator fuerit), quorum alter (sinister) inscriptus est: *Leopoldo Romanorum Imperatori S. A. devotissime D.D.D.*, alter (ad dextram): *Me pressam tenebris revocat Leopoldus in auras*. Reliquum planiglobium in duos semisses dissectum prius tangit ad dextras et sinistras, reliquas mundi partes exhibens. Meridianus primus transit insulam Huennam. Semissi, quae repraesentat septentrionalem partem Americae, haec adscripta sunt:

Usus hujus chartae nauticae. Si ad certam horam innotuit locus Lunae ex observatione applicationis marginum ejus ad aliquam stellam notam; aut ad extremitates Solis vel umbrae Terrae, isque locus per remotiorem parallaxim illius horae (ubi opus est) ex viso in verum fuerit conversus, computetur ex Tab. Rudolphi, qua hora Uraniburgica locum illum verum occupaverit Luna: tunc si pauciores horae et minuta fuerunt in observatione, differentia quaesita inter horas subtrahendas chartae, sin plures, inter addendas, detegit meridianum loci, sub quo versatur observator, seu respondeat pictura litorum, sive discrepet; nam ea hoc modo corrigi tandem poterit. Vicissim si computata est ex Tab. Rudolphi hora Uraniburgica eclipsis Lunae, vel cuiusque loci Lunae veri, ea reducit ad loca reliqua subtrahendo vel

addendo totidem horas, quot inveniuntur ad cuiusque loci meridianum annuatae; sed tunc fida supponitur collocatio locorum. — Cum privilegio Caesareo ad annos XXX.

Denique notandum, aequatorem repraesentari linea recta, divisa in 12 horas ad dextram et sinistram, incipiente a sectione primi meridiani cum aequatore.

Philippus Ekebrecht, mercator Norimbergensis et mathematicarum artium studiosus, quem Keplerus in epistolis ad Berneggerum datis „amicum“ dicit, ad quem omnia sua negotia remisit, natus est, auctore Doppelmayero, 11. Febr. 1594, mortuus 5. Mart. 1667; multum temporis impendit studiis et observationibus astronomicis. Keplerum, refert auctor quem diximus, in itinere Ulmensi 1625 et 1626 Norimbergae ab Ekebrechto hospitio exceptum esse. Testem affert librum, Ekebrechto Kepleri manu inscriptum (4/14. Aug. 1625) quo gratias agit pro liberali et amico hospitio.

Keplerus Schickardo S. P. D. Acceptis tuis literis, Schickardo amicissime, cum vexarer ulceribus, ut sedendū mihi facultas esset impedita vel in equo vel etiam in curru, statueram pedes ad te venire, praesertim ut corpus ad autum frigidam ventilerem. At frustra fui. Vix Blaubyram attigi, cum experientia capta et itineris et virum, cum etiam resolutio nivium metueretur, vidi mihi revertendum. Per literas igitur agam, quae possim. Sculptura, ut video, ad M. Beckium recidit. Is forte jam promovebitur; quaero um ille nihilominus sit praestaturus, quod in se recepturus est? Deinde quaero, num ille ea profunditate et evidentia suos ducat sulcos in lamina, ut ad 600, 800, 1000 vel 1200 exemplaria, prout typorum repetitione opus erit, suffectari sperentur? Quaero tertio, si tua vel mea opera ordinentur insculpenda, quodnam sit futurum ejus *βραβειον*, quae merces? Non quaero ut amicus, hic n. liberalitate opus esset; non ut peregrinus et pene exul, sic n. justius emendicarem ejus operam, sed quaero ut aliquis bibliopola. Nam hinc hominum generi tradenda erunt exemplaria. Cetera quaesita sunt in adjecta papyro. Sed et de papyro quaerendum, ubi ea praeparanda? Singularis n. crassities requiritur, quae nonnulli ab his exspectanda, qui dudum his usibus suppeditare sunt soliti. Item exsculpta lamina quis exempla exprimet? qua mercede? Rogo etiam perconteris ex ipso, num ipsi sit animus, confectis tabulis, computandi Ephemeridas et quibus conditionibus?

In locis mediterraneis non ero curiosus in sculptura. Ille n. deputatus est catalogus prolixus 600 locorum, quem magnō labore concinnavi ex obs. eclipsiom, auctoritate idoneorum, distantia itineraria et tabulis recentissimis ideorum particularium, etiamque mappa universali Jansonii. Scolpantur potissimum litora, ostia et nomina fluviorum, portuum, insularum, sinuum, ut mappa serviat nautis.

Ego, mi Schickarde, versor in maximis curis, quod inciderim ac paene vi pertractus fuerim in hominem asperum, superbum, prodigum et violentum, qui cum difficultate pecuniaria labore, quod deest a me exigat, non precibus, sed minis et callida interpretatione contractus nostri: ut sit mihi metuendum, non primo quoque tempore lites nostrae sint mihi deferendae, quod invidiam peregrino coustat apud ipsos magistratus. Ex qua re sequetur tandem interruptio operis. Utinam vel ipse coram loqui possim Werlino vestro, vel tibi vacaret, multiplicia super hoc negotio cum ipso serere colloquia mihi-que primo quoque tempore consilium ejus rescribere. Opus inchoatum nec mea culpa vel levitate, sed necessariis de causis, magistratum testimonio confirmandis, interruptum, an ille vellet meis numeris typis (quos similitudine rerum geometricarum *εἰρηε* dicere possem, ut numeratione, non contractione et exploratione digitorum, sciat collector, quid arripiendum ad compleudos

loculos) continuare; qua mercede paginam numerorum (in folio ob numerum sexagenarium) in 1000 exemplaria meae papyri, nullo, praeter dno, exemplari promisso ipsi typographo, quantum in septimanam absolvere possit me praesente et haesitationem omnem circa titulos et formas tabularum institutione mea tollere, quae res hic nullam litem parit, nec tempus perit mutationibus. Tum autem, an moram censura sit iniecienda; et quod caput est, quo pretio mensa in ejus vicinia redimatur hoc tempore, quae mihi vetulo sit comoda; an ipse mihi habitationem possit commodare? Si abundat typis numerorum, an consiliis meos typos relinquam ad Dannbim? Haec essent mihi hoc tempore peregrinanda in subsidium adversi casus, ruitantis eminus. Werlinum hominem aequum puto eramque eodem curru ad ipsum advolaturus Decembri, quo huc veni, nisi me turba in ipsa Lincensi obsidione capta et respectus Caesaris Ulmae adstrinxisset, et typographus hujus loci ipseque D. Theodorus, illo promissis, ista benevolentia, ut hic contraferrem permovissent. O utinam nobis essent ereberrimae et maturrimae scribendi occasiones.

Haec vero memineris a me scribi animo euis incenso et metu futurorum saucio, quem vel unum commodum verbum et aequa mentis declaratio mitigat inque spes novas inducit. Itaque praeterquam quod in futurum necessaria mihi est cautio, de cetero famae hominis etiam apud Werlinum pareitum velim. Sit qui est, per mo licet: tantummodo Deus me ejus conversatione quam minimo eum damno liberet oro.

Filio meo rogo dicas, calcaria me accepisse eum literis D. Lantii, eni plurimam salutem. Ratishonam hoc tempore non sunt expedita itinera, certum tamen inde subsidium illi in Baccalaureatum, at non in vestem, qualem ipse amat. Ratio snutuum quae sit futura, velim eam mihi consignatam mittat sine mora et eum tua revisione schedae. Salutem a M. Saxone cum munusculo ex Apiani reliquis, mea intercessione procurato. Vale eum uxore et omnibus favoribus. Ulmae 10. Febr. 1627.

Clar. Dom. Tuae

officiosus amicus J. Keplerus.

Bene observata ☉ ☽ ☿. Mitte eam, mittam et meam proxime. Observavi tempus per 2 fixas in uno verticali, vicino meridiano septentrionali.

Sequens Kepleri epistola nihil habet de editione Rndolphinarum, sed plane Schickardi fortunam spectat et filii Ludovici conditiones.

Keplorus Schiekardo S. P. D. Cl. Vir. Amice charissime. Quas filio meo dedisti, opera sororili mei accepi. Quas ante oetidum misi eum faseleno, recte tibi traditas existimo vel ex hospitio ad Ovem vel durante D. Abbate Bebenhusano. Quibus acceptis, spero te amiei officio functurum in regendo filio meo erogandisque quos misi sumtibus et rationibus ab ipso repetendis ante erogatum, quas ad me mittas.

De fortuna tua inaudivi obscurem nescio quid; competitores tibi fuisse in petendo collegii jure, quod ejusmodi fuerit, ego rerum academiarum imperitus intelligere non potui, num locum in collegio principis petieris, an in collegio facultatis philosophiae. Addebant, duos comparuisse competitores, utrumque eum ejusdem Principis Wirt. commendatitii, tibi que praeatam Rauscherum. Tantum alii; in addis, ab academiis te repulsum. Haesito an eadem de petitione sit hoc accipiendum, an ne, eum esses postpositus alii, augmentum salarii petieris? Quicquid id est, leniter ferendum existimo, nec praecipienda consilia, tres potissimum ob causas. Primum enim hand reor, tribuendum hoc esse contenti tuae vel personae vel dotum, sed necessita-

tibus aliis, ex quibus conlescit inter plures aliquod senatus consultum. Nam professio aut linguarum aut matheſeos tibi conuenit; theologicam non puto to ambire, ut ejus intervotu adopteris in id collegium: nam si to bene uovi, non arident tibi uogotia oi facultati obvenientia in collegio. Jam linguarum professio habetur accessoria, nec puto, unquam cuiquam ejus respectu majus, quam tibi, datum salarium. Plerumque ei professioni incubuerunt aut pecuniosi aut ad alia aspirantes, quibus morarum alias necessariorum haec salaril accessio erat solatio. Senatus igitur difficilli hoc tempore, raris academiarum civibus, accisis proventibus, exemplum in te, quod in legem abeat, non censuit statuendum. Quod vero matheſeos attinet professionem, non tibi hic, si ab ejus petitione depulsus es, contumelia, sed scolis (Maestlini), qui unicus hoc tempore pater habetur totius ordinis academici, ejus inquam votis, non longi ut rentur temporis gratia est facta; qui si penitus animi sonza promat, non do suo vel commodo vel honore, sed de . . . successione satagit. Haec tibi cogitatio poterit esse solatio. Altera causa, quae in te omnem supor accepto ludibrio ortam animi perturbationem penitus opprimat, est ista, quod, siquidem avaritia publici fisci et contentus tuarum artium, apud quos minime oportebat, tibi incommodavit, ut uo temporario quidem subsidio te sublevandum ob mortua censerent, aut si beno meritis apud vos non alia refertur gratia, quam quae materiam excludit aliis, beno do hisdem studiis morendi: jam hoc mali omnis loco est habendum, quod lamentabilis aliqua ruina, quae cum republica privatos etiam feriat, consequatur. Metus itaque doloris maximi sensum tibi adimat punctionis leviculae. Sed declaret id, quod inno, ratio tortia, quam oo potissimum dirigo, uti te deborte a robus tuis hoc tempore novandis temore. Nimirum quo magis mirae sunt rerum tuarum vicissitudines, concursusque et impedimenta mutua momentorum divorſorum in utramque partem, hoc tu attentius in opera divinae providentiae velim respicias, et si qua ajus manifesta in rebus tuis vestigia deprehenderis, iis adoratis, do divino favore magis magisque confirmeris. Meministi quid, cum primum huc appellerem, primis ad te literis obscure innerim: Non mo latero, quis quid tentet, ut te Tubinga abstrabat, nimirum ad ministerium ecclesiasticum, conjunctum cum exercitio gloriosissimo matheſeos. Quicunque sibi potuit imaginari, a to non magni fieri locum Tubingae, dicero aliter non potuit, quam conditionem offerri tibi convenientissimam. Vorum aut tute ipso, quod bariolor rerum ignarus, spe promotionis academicae ductus, occasionem praetermisisti, aut alii hoo do to persuasi deſtiterunt ab urgendis coeptis. Nunc postquam de ministerio ecclesiastico to serio cogitare significas, occasio illa est olapsa, nec rovocari rebus sic stantibus potest, locus enim jam occupatur ab alio. Quid hoc rel? Nimirum certo certius mihi persuasum habeo, aut consecuturum illam functionem fuisse grave aliquod incommodum, quod divina providentia sit a to amollita, aut quod verisimilius, eandem in vicinia cum alia aliqua commodiori permutatum brevi irl. Tu uunc applica exemplam ad locum illum, quem ambisti, academicum. Quid si namque expediat tibi, ut in nullo sis collegio; quid si quid impendeat gravius, collegis omnibus aut tibi saltem tuisque studiis oneri futurum? Imo vero vol maxime in oppositam partem respicias. Quenam est functio, quam jam porro quaeris, Tubinga abituriens? Nibilne ibi malorum? nihil periculi? nullus metus repulsae, si opima? nullano egestas ejus, si incognita? Quid si divinae gratiae tribuendum hoc est, quod artes proſteris omnibus partibus charas, nulli exosas? Quid si hoc turbulentiſſimo tempore subita totius patriae ministerio cala-

mitas ingruat, cui te Deus subducere cogitaverit, cum Tübingae te collocaret? Non est, inquit, recusanda afflictio ministro ecclesiae. At, inquam ego, non etiam est ei quaerenda, qui non est eidem obstrictus officii rationi. Nam hoc statu rerum tuarum videre te velim etiam atque etiam, ne te curae potius domesticae, quam studium sanctitatis ad munus ecclesiasticum capiendum impellat. Sed non didicim hoc latius. Amicus amico hoc uno verbo suggero consilium, ut hoc exacerato rerum statu tuae adhaereas professioni, ut halcyon litorali nido ventis furentibus, nec sponte tua ab ea resiliat, quin potius expectes, si quid vocationes ultroneae afferant novi. Interim si tuo ego loco essem, omni benevolentiae significatione primum victorem petitionis mihi devincirem, deinde ejus intercessione exorata per libellum supplicem significationem senatui, acquiescere me ejus judicio in hac electione; at cum petierim locum illum non honoris studio, sed urgente penuria et arcta re domestica, rogare me, ut, si sic ut hactenus perrexero in adjuvandis et studiis et disciplina juventutis, ipsi mei rationem habeant ad futura (Natalia forte) meque pensione aliqua propter hujus anni caritatem annonae adjuvent etc. Eo modo si blande omnes amplexareris, a quibus tibi existimas incommodatum, et diminueres in his opinionem concepti ex repulsa doloris et duritiam omnem emollires, ut illa in proxima occasione secundiortibus uti possis. Ita sentio. Tu judica. Circumstantias me ignorare vides, et Vale. 10/20. Martii 1627. Ulma.

T. A.

J. Keplerus, Mathematicus.

P. 8. Jam finita epistola tuae mihi sunt redditae de 6. Febr. Simul sororis literae hoc significant, filium meum 3. Martii Rosweldam venisse, 4. ejusdem, abrupto, quod Ulmam instituerat, itinere, recessisse, quasi Tübingam versus. Quare cum tu 6^{to} vesperi scripseris, illum jam Tübingae in suo Martiniano fuisse puto. Legit epistolam de se scriptam ad sororem ejusdem argumenti cum literis ad D. Thumminum. Non sane auctor illi annu deserendi stipendii, sed deterreo a sumptibus, quos impossibile est ut ego ipsi ad satisfactionem suppeditem. Quare tu velim, si quod incommodum ex hac duritie videris oriturum, illum demulceas blande et meliora sperare jubeas, simul invites, ut quoties vel minimum vult impendere, te consulat, videre te, quod non voluntas illi frugalitatis desit, sed judicium in occasionibus.

Quod de Brunnio nihil, causam vides ex his, quae ad te super hoc consilio scripsi. Gravissimum esset mihi mutare locum, omnia ergo tolero, dummodo toleranda. Sed claudendae sunt literae. Est etiam ultima perpendenda causa, quod alterum noveram, hunc propius non inspexi, quo sit ingenio.

Quae in praemissis amico monet Keplerus Schickardum, his explicantur. Superest epistola Schickardi ad fratrem Lucam, in qua eandem movet quaestionem, scribens (19. Febr. 1627): Ego repulsam patior et ab aditu senatus excludor. Non te latet, quibus promissis hactenus vitam hic tolerarim et quomodo mitissima spe melioris aegre vixerim interea. Potes etiam meminisse, quod obitus Viti Mülleri (cfr. I. 188.) meae promotioni viam sternere sit visus. At ecce, quid largitiones et donaria possint: Ranscherus, me nentiquam melius meritis, plura vota tulit, ego vero prorsus inexpectato repulsus sum. Ita totius octennii spem fortiter continuatam una mala hora exstinxit. Unicum desperato mihi consilium restat in fuga, ut ab ingratis Tübingensibus ad ecclesiae ministerium revertar; nisi forte princeps, penes quem est confirmatio, me vindicet, quod nondum desperavi. — Martio 1628 misit Schickardus fratri, tum temporis Stuttgartiae vice praeceptoris filiorum principis fungenti, libellum supplicem de loco in senatu; die 4. Julii nunciat fratri, et *jetzt heutigen Tags gettelt in senatum recipirt worden.*

Die 9/19. Apr. 1627 Keplerus, praemissis querelis de filio suo Ludovico, haec dat Schickardo: S. P. D. Habes hic 4 paginas Tabularum, iungendas illis, quas habet D. Abbas Bebenhusanus D. M. Huzlerus. Obsecro, acrem te gere censore, praesertim in praeceptis, ut clarius loqui et docere dicam, sed et in locis quaecunque tibi occurrunt opponenda. Tabulas Placatorii recentissimas sum secutus, quae spatium inter Belgium et Daniam contrahunt. Ejus Scotia lineam ducit notabilem in Lusitaniae litora. Dum igitur admoveo Scotiam nobis, sequi jussi Lusitaniā, praesertim de Snellii sententia. Dedi operam, ut constrictiones istae in Apennino, Alpibus, Pyrenaeo potissimum occultarentur, quod itinera impedita et flexuosa sint. Moseam extendo, secutus rationes itinerarias, ut et in Hispania adducenda. Ubique vel auctoritates vel rationes secutus mihi videor; fieri tamen potest, ut aberraverim a proposito. Habes autem typos 4 semicirculares colore viridi ex lignea forma quondam Apiani, quam hic mutuo sumsi. Tu insere, prius tamen bene glutinatis et complanatis, et scribe; praestetne radere et rodere cupram, an sculpere, et utrum minoris sumtus? Noribergae rasor est egregius (Graviter). Inse re directe; eura evertendi rasori relinquatur.

Etsi Jansonius in locis a me signatis in catalogo teneri non potest in mappa sua universali, etsi etiam litora Hispaniae etc. sequi debent urbes a me signatas pro suae propinquitatis ratione; tamen jam in novo orbe velim stricte teneri Jansonium, in Canariis et Ascribus intervallum, quod futurum est inter Hispaniam Africamque meam et Peruviam Jansonianam, proportionem ea accenseri, quae nunc visitur apud Jansonium, ut quia ille dat Huennae 36° 45', ego 90° vel h. O. O, omnibus ergo Jansonianis a me non signatis in catalogo neo propinquius addantur 53° 15'. Id hoc argumento, quia fluxus oceanus perpetuus est in occidentem, et plerumque experiantur nautae, se fluxu delatos in occidentem ultra leges suae bussolae. Eo nomine etiam ausim promontorium bonae spei subordinare meridiano Huennae, etsi Jansonius id facit orientalius; id (ceteris incertis et dubiis) praecipue ob id, ut Huennae meridianus quasi naturalis videatur, per latissimas continentium Europae et Africae oras excurrentes. Nam et nordeas se praebebit. Sed plura monebit successus operae. Quod Mosea tanto exenrit in orientem ne movearis: nautis nostris circa litora oceanus plus fidei, Straboni circa mediterranea. Ille vero Caspias portas cum promontorio Caramaniae, quod fretum stringit sinus Persici, sub eundem quasi meridianum referre videtur. In oceano Indico hoc adjicio audaciter, ut Africam illora sequantur caput Bonae Spei (quantum hujus patientur loca Indiae, jam in catalogum inserta. Sed et Sinarum ille nimis prokursus in orientem restringi posset), etiamsi sic illius extrema et Japonia longius divellatur ab occidentali litore Peruvanae ob causas easdem, quas prius tetigi. Hae non valent aut non tantum valent in oceano Indico orientatissimo ob prebitatem insularum. Eoque in arbitrio retineo, si occidentalis facturi sumus caput bonae spei, idque multo, ejus transpositionis potissimam partem impendere litoribus Africae, exinde in orientem extendendis, ut dixi. Gangis etiam fontes respectu ostiorum nimis orientales facere videtur Jansonius, si Straboni fides; et quis illo dilucidius de India scripsit? Itaque Persiam versus septentriones coartari nonnihil haud nocuerit, ut Ganges a fonte magis in orientem fundatur.

Mitto has per filium D. Blossii p. m., quam intempestive exivit fama apud vos (ut ad ipsam perscribitur) sparsa de ipsius puerperio. Deceverat patri comitatum expectare. Quid illa dudum apud vos meruerit, ob quod

ita facilis Tubinga in proscindendo filius honore? Proximas habitabat aedes, quotidianae fere interessere visitationes, dum filia mea virginem, ego patrum ejus invisimus, ut de templo nihil dieam. Sed vale et saluta tuam uxorem.

Tnus J. Keplerus.

Keplerus Schiekardo. S. P. D. Clarissime vir. Jam ante 3 septimanas per virginem D. Blossii p. m. filiam ad te misi 4 Imperiales cum volumine papyraceo ad exemplar tabularum D. Abbati Hitzero integraudum perlinente, adque mappam, de qua ultro monuisti, si velles et otiosus esares, concinnandam, necdum vel a te vel a filio meo quloquam habeo responsi; quare rogo hae occasione quid receperis responde. De mappa non importunus ero. Charas virides, si visum fuerit, per occasionem poteris remittere; scio occupationes tuas. Praesertim de cap. bonae spei remitto audaciam, de nordcap simpliciter renuncio: cum scriberem, non inspexeram Janssonium. Vale et filio meo persuade, tantum ipsam proficere, quanto saepius ad pafentem scribes. Quodsi vires recollegero, quae nunc ob Austriae statum sunt afflictiae, subsidia illi pecuniaria ad epistolarum, quas ad me acribet, numerum admetiar. Semper erit, quod a meis emendationibus remissis discat. Materia sit ex lectionibus, quas audit.

Typographus meus tantum famosum de incendio Kirchmiano, quem exuli pastori petcuti excudit, nunc juit corpore; pergimus tamen in typo. Vale.

5. Mai
Ulmæ 1627.

Cl. D. T.

Officiosus et gratissimus hospes
J. Keplerus.

Keplerus Schiekardo S. P. D. Clarissime vir. Si per diversos importunius te admonui, nulla id alia causa factum, quam ut resciscerem, reddiderint virgo Blossia pecuniam commissam, anthe forsarr oblita fuerit. Nunc ego sat habeo, utinam et tu. Spem mutui praebuimus D. M. Hemmingerus et ego; praestolanda paulisper est illa solutio. Quod vero schedas scribis expensorum, id de superfluo est. Suspendisses schedam cera de pariete, quotiesque filius te interpellasset, assignasset ipse acceptum, te levans opera. De geographico schemate dudum tibi significavi, vacares magis necessariis. Idem repeto totiusque rei penes te relinquo arbitrium. D. D. collegis tuis de facultate philosophica gratias ago magnas de salute mihi impertita deque iis, quae me scire de filio meo voluerunt. Auctor ego filio non fui, ut lauream peteret, miratus potius sum facilitatem; deinde existimavi, eos, qui stipendiis fruantur, incitari beneficio ipso ad contendendum per gradus, et tolerabiliiori forte loco futurum filium laurea obtenta. Ceterum ut sumtus in praeceptorem privatam factam, deliberationis id eget. Hoc habeo pro certo, filium nulla machina posse adigi ad praecepta memoriae mandanda, eoque desperavi de stipendiis usufructu. Jam privati id agunt, ut qui suae curae sunt crediti, praecepta discant; ergo filius pluribus utetur tergiversationibus ad se subducendum ex hora privata, quam ex lectione ordinaria. Haec perpende cumque D. D. fautoribus meis communica, ut iis perpensis dispiciant, an hos sumtus ego, qui certis gradibus ad inopiam proficiscor, consuitius aliter sim collocaturus. Petit filius Sapulae lexicon; haberem, si essem Lincii. Interim amicum desidero, qui aditum illi concedat ad suum exemplar. Petit et Magiri physicam; velim audire physiel vestri iudicium. (Si probat Magiri lectionem, venditur hic 48 cruciferis non ligatus; optinet Tubingae tritum exem-

plar vill comparari.) Nam haec ei regula fixa esto libros legendi, vago alias ingenio, legat ex quibus respondere olli possit ea, quae ex ipso quaerentur. Et tu mihi scribe, quodnam legitimum completionis philosophicae tempus habeatur, deque frenis cogita, quos injicimus stolidae ejus cupiditati honorum, qui fortasse jam de uxore post honores cogitat. Rescivi aliqua ex ejus arcanis.

Mitto paginas absolutas, quibus integretur exemplar D. Abbatis Bebenhusani, tu lege prius de epochis caelestis ad titulos singulorum planetarum easque inter se compara, cumque D. M. Maestlino communica. Pulchra est alternatio in h , p supremis, pulchra et perfecta in q , r infimis. Pulchra et perfecta in c , d , uterque in longitudine media, ille priore, haec posteriore, ille quidem motu medio perfecte, haec motu medio imperfecte, sc. ut motu vero sub Solis loco vero sit, faciens eclipsin Solis totalem cum morula in Aethiopia. Et ecce cur nigra Chusi progenies. Haec ad genealogiam tuam Arabicam adscribe. (h aphellus 0°h , q 0°v . p perihellus 0°z . q 0°z . c 0°z . d 0°z . a 0°v . q 0°z . a 0°z . q 0°v . a 0°z . q 0°z . d in c cum c elliptica, ejus apogaeum 0°h . q 0°z . Extremi h extremus et q iustinus in oppositis. Inde alternanter locis intermediis p z , c z , d z , q z binis binis oppositis vicinis, binis uno omissis conjuncti. Imprimis nota Stellam Novam, in aequinoctio creatoulous autumnali.) Scripsit filius, accepisse to a Principe librum orientalem, scriptum a summo desuper. Cogitavi num Sinensis scriptura esset, teque ex ea sine duce quicquam consecuturum desperavi. Sed fallitur procul dubio filius, non a Principe, sed a Martellero nostro accepisti librum, non Sinensis, sed Arabicae scripturae. Sed desino. Vale tuasque saluta.

Datum Ulmae 28. Mai 1627.
7. Jun.

Cl. Dominationis Tuae Amicus
J. Kepler.

Confer cum his ea, quae Keplerus Crügero scripsit (fol. 29 a.) et annot. 1. ad Epistomen, 9/19. Nov. 1627 haec dedit Keplerus Schickardo Ulma: S. P. D. Clarissime Vir, hospes et amice charissime. Cum exaeto Septembri Francofurtum abirem, filio meo, quem in transitu jusseram me expectare, 13 florenorum summam in schedis, quam deberet diversis, ostendenti, permisi Stuecardio florenos 20, obtestatus eum, ut totam summam tibi traderet, ut eui debeam amplius etiam aliquid. Jam ut eum Estlingae reditum meum expectantem offendi, negavit te domi tum fuisse, seque dixit omnibus, etiam D. Thummio et tibi satisfecisse, documenta omnia literaria in scriniis habere Tubingae. Postquam ad sororem meam veni Rosweldam, didici, illum insuper 3 alios florenos ab ea extorsisse. De his igitur 23 florenis exspecto rationes a filio, abs te vero rescriptum, verene tibi sit satisfactum, quod pervelim etiam per idoneum aliquem a D. D. Thummio expisceris. Figuram ex aere et carmen cum indice tibi a filio meo aequae te D. Abbati Hazerio traditam esse credo. De exemplariibus academicae bibliothecae Maestlino, tibi, prospectum esse vel iri confido. Vale primoque tabellario, qui Ratisbonam adit, literas, quibus filii sint inclusae et literae et rationes, tradas rogo.

Clariss. Domin. Tuae amicus
J. Kepler, Mathematicus.

Nota Schickardi: In schemate tituli Huennae situs est dislocatus, quod parum referret, nisi primum per eam duxisset meridianum. In catalogo locorum Baldach et Bagdad debet esse unum idemque, ibidem mundi medium. Arim, ex Arabum sententia non

in Aethioplum, sed mare Indicum cadere. Ibidem quia Tabingae diff. longitudinis ponit 12 s., non possibile est ut Putzbachii diff. sit 17 s., cum in aptima charta sint sub eodem fere meridiano.

Postscriptum Kepleri: Error in loco \odot 11 minutorum in genesi Rudolphi dilatat se per omnes planetas, nullo tamen in iis effectui. Causa oscitantiae, quod inter operas typographicas jam imminentes subitum consilium incidit Rudolphi geneseos computandae, nec iustum tempus erat revidendi calculi, cum in septimanas singulas 4 paginae essent repraesentandae, me solo correctiones omnes sustinente. Est et alius error in \odot opinor, falsum residuum seu elongatio ablata prosth. ab ang. comm., sed is statim altera facio correctus nec propagatus. Eeqnid tute deprehenderis, ad me perscribo.

Italus quidam Bossius, vir doctissimus, diligenter mecum egit, ut theses D. Maestlini anno 1605, respondentis ni fallor D. Hafenrefferi, disputatas, itemque alias sub Hoefelderis, ubi de luce Terrae deque pluvii in Luna agit, quocunque pretio ipsi comparem. Scribe Ratisbonam num supersint et mitte, si nancisci potes. Utere opera filii mei.

M. Bachmaier, qui scribenti affuit, tibi saltem adscribere jussit.

Stephanus Bossius Mediolanensis Kepleri a Gualtero vehementissime commendatus est (in literis d. Sept. 1627). Exstant literae Bossii ad Keplerum datas (Vindobae d. 6. Maji 1628), quibus aegre ferre se dicit Kepleri silentium, ad 3 vel 4 epistolas non respondisse. Responsa se arduissima expectasse, quia dubitationes quasdam proposuerit, quas Epitome et Tabulae suppeditaverint, quas „acrupula ut eximeret Keplerus“, petit, „Cum haereret aqua mihi cogitanti, ubi nam terrarum delitesceret, opportune superveniit communis amicus, cui literas haec deferendas tradidi, qui de praesentia tua in urbe Pragensi mihi testatus est receptumque a Caesare pronunciat et cetera, quas cum D. Walesthalio transiegi ex animi tui sententia, nunciavit. Gaudeo, quod peregrinationibus tuis fortuna aliquando suam dederit vel proxima data sit, gaudeo iterum tam utilitate tuae quam totius resp. mathematicae causae, quas brevi, uti conficilo, Tythopiearum observationum, Ephemeridum etc. editione complectata ubi palmam supra omnes (vel iuvit Jovellio), qui unquam vel erunt vel fuerunt mathematici, deferet.

Quem dicit Keplerus in calce epistolae suae, Wolfg. Bachmaier (Ulmenensis, nat. c. a. 1600) tota temporis pastoris munere fungebatur in pago Mörunga prope Stuttgartiam et Kepleri adiumento fuit in calculis astronomicis. In epistola (data Aprilis mense 1628) dicit: „de laboris pretio quod petiturus sim, te securum esse fubeo, prius operam confectam exhibiturus tuncque iudicium experturus sum, quam ut superbe de pretio contendam et discipitem.“ Legisse se, dicit, Tabulas Rud. ad petitionem Kepleri et consignasse transmissaeque errata, quae deprehenderit: „abunde cognovi, pergit, in Ephemeridibus confectis easdem esse mutasse certosque computatores singulis non annis, sed placito distansae atque inter alia factum Lonsae locum ab anno 1625 in 1660 continuandum mihi detulisse. Gratior fuisset omnium planetarum in unum atque alterum annum computatio; accipio tamen illam provinciam, solummodo apud te luto, ne operum multitudo obruat, sed officii mei publici (quingulis hebdomadis mihi concludendum) ratio habeatur.“ Concludens refert Bachmaierum „de milite Casareano, qui agrum nostrum haecenus occupaverat. In pago nostro 200 pedes per 2 septimanas aluimus, inter quos tamen tuto versari et officio meo publico defungi mihi licebat, a nullo unquam me verbo laesit.“

Exemplar Tabularum Rud., quod nobis praesto est, inscriptum Kepleri manu „Venerabilis et doctissimo D. M. Bachmaier, quod praeccepta Tabb. istarum recusaverit munusque Ephemerides ex iis computandi, strenue capessat; hoc exemplar d. d. dt. J. Keplerus, Cal. Nov. 1627.“ testatur Bachmaieri studium emendandi librum, cum multis passim insertis correctionibus, tum additis ad tabulas quasdam supplementis.

Ultima eorum, quae superest, epistolarum Kepleri ad Schickardum scripta est Pragae i. Mart. 1628 et haec habet:

S. P. D. Clarissime Vir, hospes et amice charissime. Scripsi Ulma, filium meum accepisse a. me 20 florenos mense Sept., et alios 3 a sorore mense Oct. Illos jussus erat tibi tradere erogandos, si prius tibi ipsi de reliquo, quod tibi debebam, satisfecisset. Cum ex tuo silentio appareat, id

ipsum non fecisse, et si expectare possem, donec ipse ad me scribat; ne tibi tamen fiat injuria, dedi 20 flor. legato Argentiniensium Jo. Ulrico Fridio, quos per cambium tibi repraesentaret Tubingae, ubi primum domum fuerit reversus. Nam ad vos iter non habet. Rogo itaque, filium meum eo indigas, ut rationes expensorum illorum 23 flor. manu sua scriptas tibi exhibeat, quas asservato, mihi non est opus eas transmitti tam in longinquum; acquiesco tuo iudicio. Ceterum de his 20 florenis quod erit residuum, id filio meo non aliter permitti velim, ulsi quoties schedas attulerit sumtum notiorum vel sua manu signatas cum subscripto die, vel ab iis, quibus debet. Ita fiet, ut tu sis tutus a flagitationibus ipsius creditorum. Est aliqua, fateor, molestia in hoc gehere officii; at est illa mutui inter homines. Nihil dicam de iis, quae olim hic Praegae in me suscepit, negotia coterraneorum meorum causa; unum jam tibi propono exemplum. Filius Tampachii, prodigus ut quaquam alius et praeterea fraudulentus, decepit me Ulmae versutis suis, ut illi ultra 100 flor. commodarem, ut sc. illum patri suo tandem domum reducerem. Eo ubi venimus, subito curram deseruit ille eques, et pater ipsius in me omnem bilem evomuit, comminatus se nihil mihi restitutum; restituit tamen, sed oneravit me Ulmam revertentem, ut magna cum invidia cum creditoribus ejus agendum fuerit, ut 19 thaleris 50 florenorum aes diluerem. Exemplaria per D. Resoldum Academiae perque illam Maestlino et tibi tradita spero. Si quid errorum occurrit, velim mihi Pragae significes. Vale. 4. Martii 1628.

Cl. D. T. officiosissimus
Jo. Keplerus.

Alii qui de Tabulis Rudolphinis cum Keplero per literas egerunt sunt hi.

Caspar Odontilus, olim ad manus Kepleri (cfr. vol. III. p. 8, 14) haec dedit Keplero: Menses fere sunt quinque, ex quo tempore G. Kreslinus, unum scribens Calendaria (Norimbergae) et Prognostica, apud Senatum Noribergeum in Tabulas suas astronomicas, noviter a se conditas, sumtum largitionem petiit. Senatus libellum Kreslini supplicem Petro Saxonio, nostrae universitatis mathematico (natus 1591, prof. tunc ab anno 1617 usque ad mortem 1625), M. Dan. Schwentero (Norimb. nat. 1585, prof. Altorfi linguae hebraicae 1608, poeta laureatus, simul mathematicis deditis studiis edidit libros ad geometriam practicam spectantes et post mortem Odontili, ab anno 1628 munere professoris mathematicae fungebatur usque ad diem supremum 19. Jan. 1636) et mihi revivendum transmisit et de eo nostrum requisivit iudicium, num et re astronomiae promovendae esset, impensis sumptibus 4000 florenorum Kreslini petitioni annuere. Nos unanimis vicissim senatus significavimus, fidem ejusmodi tabularum in ephemeridibus, ad aliquam multos annos ante editis, residere, quae ipsis observationibus congruant. Quo minus vero id hactenus factum sit, ita nos merito dubitare de certitudine tabularum Kreslini. Si tamen ipsorum Amplitudines astronomiae uberiori propagationi publice consultum velint, dedimus hoc consilium: in desideratissimas Tabulas Rudolphaeas, a Keplero omnium doctorum calculo celeberrimo mathematico dudum promissas, quae plurium annorum editis ephemeridibus cum ipso coelo consentire probatae essent, impendendos esse sumtus illos maxime necessarios, ubi posteritas non immemor futura sit maxime Norimbergensis senatus liberalitatis, in astronomiae propagationem collatae. Ne dubitet, quantum nobilitatis tuae personae, antea multis praclaris editis monumentis in mathesi notissima ubique locorum, illorum Amplitudinibus, satis superque per nos iusinnata est, quin in sua debita petitione sumtum in suas Rudolphaeas Tabulas conferendum propensiores sit habitura. Feliciter valent Nobilitas Tua et amorem erga me suum, si dignus illi visus fuero, perpetuum conservet. D. Altdorffii d. 24. Aug. v. st. 1623.

Inter epistolas Alberti Curtii (v. s. p. 583.), datas Dilingae Ulmam, haec deprehendimus, quae editionem Tab. Rud. attinent. Die 13. Mai 1627 scribit Cur-

tius: Gratias ago ob auctarium illud primumque gustum nobilis operae, quam tuo munere mihi fuit ex chartis illis initialibus delibare. Non morabor isthic ambitionis, nec iudicis in peregrinis laudibus privato iudice, eruditionis tuae coesecutione securus. — Die 10. Junii: Constitui differre faciens literas, quousque auctarium aliquod de mea opera redhlerem et simul certi aliquid optatumque Vienna nunciarem; tunc ita ausi venit, ut possem venturum. Nam chartas meas typographus moratur, et Vienna mature aliquid aut de meo codicillo expectare vix potes; postquam subditi causam Dux Württembergicus receperit. Itaque alio declinandae sunt rationes et sane ad vicinam academiam aut proxima comitia, quae ajunt inclinare Ratisbonam, occasioneque fors aliquam suggerent, e vicinia cum Ser. Electore Bavariae transigendi, praesertim si editio lutea ejus commentarii, de quo scripseras, maretur, quamque uti omnes vehementer approbant, ita non dispicio, quemadmodum operae apud hos typographicas vel in tanto numerorum penuria vel in tanta operum aliorum frequentia curae ex tuo voto et libri dignitate possint. — Die 25. Junii: Nuper ita usu venit, ut apud Doctorem experientem et qui proximo Vienna venerat mentionem facerem de subsidii pecuniariis. Ait, facillius longe hic in vicinia quam Viennae rem transigi posse, si primum intelligatur ex quaestore Augustano (scilicet bem Reichspräsident ampt per Kungspurg), quinam ex Suevis statibus quotam suam proximae imperiali contributioni non exhibuerint, nam talem quemplam statum et numeratum in lucris ejusmodi creditoris, cum quo e vicino et amico transigi possit, et exorari facillime Vienna posse. Eam rem te cognoscere necesse fuit, priusquam aliquid Vienna nunciatur. D. Pater Zieglerus, Moguntiae Electoris confessorarius, impense optat Rudolphicum exemplum. Collocabitur bene et per eum destinari alterum etiam poterit ad Magnificum Electorem. De pretio ego curator ero.

Die 26. Augusti: Ego et privatim mihi et publico posteritati de Tabulis Rudolphinis vehementer gratulor, et foret hic sano locus excurrendi in laudes expectati operis, nisi mihi tute injiceret manus itemque ac serio juberet edicere, si quae in ea descriptione bono publico observassem. Inseram igitur hoc, quod in tabula aequationum non exhibentur accurate anguli ad Solem, si ex adnotatis distantis computentur, neque vicissim ipsae distantiae in ea anomalia coaequantur. Non recurro hic ad punctum aequatorium, sed ex vulgata propositione (quod sinus laterum sinibus angulorum sint proportionales). Scio etiam, ut intervallum planetarium ad anomaliam eccentrici, ita semieccentricitatem ad angulum prosthaphaereticum, seu differentiam inter coaequantur et eccentrici. Ex ipso theoremate procedentes anguli ad Solem, v. g. in theoria Martis, longe differunt ab iis, qui in tabulis colliguntur. Subiit quidem, si centrum figurae seu orbitae sit mobile et in angulis linea per quaedam quasi *hypocycloides* libretur, constare sibi tabulas posse; sed quid de ejusmodi libratione sentias, malo ex tuo, vir clarissime, iudicio cognoscere, quam porro aliquid in doctam illam operam audere.

Rationes quibus motus Keplerus Ulmam elegerit; ubi typum Tabularum abolveret, ex Hebenstreitli (cf. vol. IV. p. 178.) epistolis eminens apparent: animi senatus Ulmensis benevolam in Keplerum saepius refert Hebenstreitli, item gratiam pro transmissis libris et favorem quorundam civium Ulmensium. Haec movisse videntur Keplerum, ut de sede Ulmam transferenda cogitaret, loco quieto bellis ubique saevientibus, et Hebenstreitli usus sit intercessore.

De Kepleri transitu haec habent Hebenstreitli epistolae, quarum longam seriem libro suo subjunxit Haenschius, omisso vero Kepleri responsa, jam sine dubio deperdit. Scripsit ille d. 11. Maji 1624: Quod tuum attinet propositum, eu typos nostros autotitographico (ut Scaliger indiget) nullum rem exponendos, typos inquam nullum etiam alium in locum asportandos. Si ad vos cum tuis typis, nostrae statuae respondentibus, accedere volueris; quam maturissime certior me facito. Sunt aedes autotitographicae vicinae absque inquilinis, commodae sane futurae tuis operis. Succurret tibi Merklus, jam conector, qui et de museo et cubiculo et de mensa, pro eo atque aequum fuerit tunc postulaveris, tibi commodabit. De pensione incolatus hoc habet, me numerare annuo 40 florenos, verum aedes satis sunt ablectae. Quod facere

votes, ut supra monui, quam celerrime significato. Agam enim tunc statim cum D. Consule Craftio (ubi enim aliquamdiu cum *oikaroi*, nobiscum vivere destinari; magistratos appellandus occurret), cum Mercurio aut cum domino ædium typis vicinarum.

Die 13. Augusti 1625: Binas tuas accepi, alteras ex urbe Norica, alteras a tabellario vestrate. Noricam actionem non successisse tibi doleo; sed dies forsitan meliora dabit. Sarcinulam tuam maturius quidem sportandam curassem, nisi ferrarius faber spem fecisset adjungendi operis, quod tamen, ut modo filius refert, ante octiduum non perficeretur. Ille ergo cetera tua accipies et inter ea cum thecam escariam, tam literas et exemplar libri Ant-Italiæ a Tampachio (Hyperaspisten). Si quid desideraveris, quod nec spero, mone nos; tua curaturos qua par est fide. . . . Vale meque ama, qui cupio et opto perpetuum nostri conjunctionem, modo eommodo istuc tuo fieret. — Die 17. Octobris: Chartarum fasces aliquot advolarunt; nisi debitus numerus venerit, quod jussisti expeditum, nec sine typographo nostro, qui me in rebus inhummodi doctor. De Tacito (nunciavit Hebenstreitins Kepler, accepisse se „48 Tacitos“ filii Kepleri et dedisse bibliopægae suo 6-exemplaria) si quid mandaris, adscribito modo nominam, quos Campidui, Memmingæ alibi veis honoratos: mittam tum. . . . Sed quid de vino, quod apud nos colimati? — De papyro hæc insuper scribit Hebenstreitins: Interæ etiam papyri fasces ad nos devenere, chartæ cum purioris tum de massa P (ut vocas), utriusque generis *folias* (vniugo ballas) binas. Cados in libripendis apotheca aperuimus; singula non incurioso oculo inspeximus, scil. quod mea timiditas *inspecta regina* sibi deesse sensit, etiam typographum nostrum mihi adjunxi, scitum n. *Herzog*. Laudavit is sane utramque formam, præsertim alteram de P, quanquam nec in altera desideravit quicquam, præter laevitatem. Quod hæc nummos attinet apud Burekhardum depositos, etiamsi adesset, qui chartopoei nomine pecuniam sibi annumerari flagitaret, tamen rem distuli, donec formula tua manu 4-signis insignita et definita et, quod glabrieum attinet, solida offerretur apologia. Utrumque factum est, ut discas ex epistola inserta. Neque tamen sic *repi navis* Memmingensi satisfeci, quod tum demum fiet, ubi post inspecta *descripta* utriusque factus, in me quod æquum fuerit facere jusseris. —

In tabulario ordinum Austriacæ superioris (Lincii) complures conservantur Kepleri epistolæ ad „Ordines“ eorumque responsiones, maxima ex parte ad rem pecuniariam pertinentes, partim etiam opera Kepleri spectantes. Ex his sequens Kepleri epistola, in qua opera astronomica et geographica, mandata ipsi ab ordinibus, tangit et labores in Tabulas Rudolphinas consumptos et consumendos recenset, justum suum locum hic habebit.

Ehrwürdige Wolgeborne Herren, Gestrenge, Edle, Gnädige vnd gepietende Herren.

E. Gn. wissen sieh Zweifels ohn noch wol zu erinnern, wasmassen denselben Ich bey neulieber der Löbl. Stände Zusammenkunfft etliche Exemplarien meines Tractats, so Ich in verschiden Jahr von der Oest. Landtlich vnd Maasscu in Druckh verfertigt (cfr. vol. V. p. 497 ss.), gehorsamlich präsentirt, deren vnderthänigen Hoffnung, es wurden die Löbl. Stände ob solcher meiner Arbait, so ich dem Land zum besten mit grosser mühe vnd aignem Vncosteu biss in 250 fl. erzeugt, ein gnädiges Wolgefallen haben: vnd wurden also die drey viertl Jahr, so Ich darmit zugebracht, wol angelegt sein, weil sonderlich Ich dise Arbait auff etlicher der sachen verständiger Herren auss dem Herrn vnd Ritterstand guetachten vnder die Hendo genommen, vnd das werckh demselben gemäss conformirt babe.

Es ist mir aber drauff zur antwort und beschaid worden, das die Löbl. Stände vil lieber sehen, das Ich dergleichen arbait einstellen, vnd die wichtigeren sachen, daranff Ich fürnemblich bestallet aeye, als die Tabulas Rudolphinas vnd die Landmappam zu völligem Werckh richten solte.

Nu hat dise arbeits mit der Messerkunst alberaitt zum Weihennächten ire Endschafft erraicht; ist auch sonderlich vnder anderem dahin angesehen gewest, das Ich dem Druckher mit einer materia populari auffhelfe, vnd Ine hernach zu anderen meinen Werckhen zur Hand haben möge. Ich wäre aueb mit jetzemelter der Löbl. Stände übriger gnädiger Anmahnung meines Theils geborsamlich gern zufriden vnd deren zu geleben begürrig; In massen Ich dan von der Zeit hero mit bindansetzung aller anderer studien vnd meiner aigen zu Prag vnd Preslav anhangenden besöndungssachen nur allein dise zway getriben vnd darinnen Jeder Zeitt sovill als mir müglich aufgerichtet vnd prüstirt.

Die weil Ich aber Handgreifflich spüre, das je eifferiger Ich mir beide, die Tabulas vnd die Mappan, mit einander angelegen sein lasse, je schädlicher Ich mich selbs confundire, verwückbele vnd vmb die Edle Zeitt bringe, vnder dessen kheinem seine gepürnde Rechte geseheben, derowegen vnd so Ich diesen sommer vber das eine mit Ernst treiben vnd drinnen eine demonstration, so weit es der Zeitt halben zubringen, thun will, Ich das andere vnderdessen notwendiglich beiseits setzen müssen werde: Also kan Ich nit vnderlassen, E. Gn. die Wahl vnder beiden werckhen halm zu stellen, vnd zu befürderung dessen, so E. Gn. disen sommer vber am nützlichsten vnd rathsamlichsten zu tractiren halten möebten, folgenden zwalfeltigen geborsamen Bericht zu thun.

Von den Tabulis Rudolpbj. E. Gn. werden selber wissen, oder von andern Mathematicis herichtet sein, das in re literaria die Tabulae astronomicae ein Wolbedächtliches Hauptwerck sein müssen vnd gar nit wie ein Comedi vber nacht anzustellen, oder wie ein poema auff blossen einfüllen bestehe, oder wie ein Commentarius super Aristotelem auss dem Ermel zu schütteln; sondern man sich vil Jabrlang zu besamen, vnd mit observationibus vnd calculationibus zu bemühen babe, will man die rechnung also umfassen, das sie auff vil hundert, ja tausent Jahr binder sich vnd für sich gelten solle. Copernicus hat 27 Jahr zugebracht, ebe er sein opus Revolutionum vnd Tabulas ans Liecht gebracht. An den Tabulis Rudolphi hatt Tycho Brahe alberaitt 38 Jahr, nämlich biss in sein Gruben, vnd zwar jeder Zeit mit Hülf 10, 20, 30 studiosorum gearbaitet. Seine Verrichtung ist dise:

Erstlich hatt Er das werck mit Observationibus (wölche gleichsam vnser Zeug, Stain vnd Holz zum Gepeu sind) vberflüssig versehen; fürs ander die fixas stellas vber ain Tausent aussgerechnet, vnd jedem Stern seinen ort, weil Er denselben Jeder Zeit behelt, anffgezeichnet. Drittens hatt Er an den Planeten, wölche wegen irer vilfaltigen verwirten Bewegung das maiste Kopffbrechen verursachen, auch angefangen vnd bey Son vnd Mond vberhaupt das seinige gethan vnd den Bau an diser Seitt aufgeschlagen.

Die vbrige fünf planeten, nit weniger an Son vnd Mond so vil vnd mehr dan Ich oder Er jemahls gemaint botten, sind mir gebliben.

An der Sonnen, als dem Eckstain vnd grundfeste zu allen Planeten, vnd an dem Planeten Marte hab Ich 9 Jahr gearbaitet, da Ich noch zimliche Hülf von tauglichen studiosis gehabt, biss Ich meine Commentaria de Marte ans Liecht gebracht.

Derjenige gelehrte Mathematicus David Fabricius, der mich vor einem Jahr wegen meines langen Verzugs starkh angezpfitt, vnd je vermaint, Er wolte mit seinen Tabulis fertig sein (cfr. vol. II. 109 ss.), der zeucht diss Jahr die schnauppen wider ein, vnd meldet, das sich bey den Sonnenfinsternissen

noch ein anderer mercklicher defectus finde, der hiss daher noch vuerörtet gebliben; ist gewislich wol an den rechten knopff kommen.

Demnach aber mir die Kay. besoldung nit allain was Kay. Rudolff hoehs. Gedechnuss mir bey der Slesischen Camer vnd Reichspfenningamt Augspurg anweisen, die jetzregierende Kay. Mt. aber confirmiren lassen, sondern auch, was höchstermelte Kay. Mt. mir allhie im Mautaupt jürlich assignirt, ganz vnd gar aussenpleibt, also das man mir auch der schuldigkeit im Mautaupt nit geständig, also vermag Ich warlich khainen täglichen Magistrum oder studiosum, der mir rechnen hülffe, nit zu vuterhalten, vnd ligt nit allain die speculation vnd Invention, sondern auch die deduction vnd calculation der Observationum (ist vnsrer Staimexen vnd Zimmerarbaitt), ferner nit allain die conceipirung des Text, sondern auch die Calculatio Tabularum taediosissima et longissima, ja sogar die abschrift, auch abreissung der figuren auffs Holz, vnd entlich die vilfaltige correctur im druckhen, neben der letzten mir sonstn sehr angenehmen Correctur vnd Verenderung des Texts, alles mir allain ob dem Hals; zugeschwigen die vilfaltige bekümmernuss wegen meines sogar verpleibenden ausstands, dardurch meine Kinder vmb Ir Mütterliches gebracht werden vnd zu dessen Compensation nichts Väterliches zugewarten haben: mit wölchen schwärmütigen gedauken vnd allerhand ansehligen (gar nit aber mit andern sachen, deren Ich vergeblich verdacht werde) mir vil Zeitit hingebet: also das Ich entlich, weil Je in meinem abwesen von hoff khain sollicitator sich meiner annemen will, die Löbl. Stände notwendig vmb Hülff vnd gleichsam vmb die curatel diser Hoffschuld vnderthänig flehentlich ersuechen werde müssen, weil eonderlich sie von Kay. Rudolffo zu befürderung der Tabularum Rudolphi gemaint vnd bergerührt.

Nichts desto weniger vnd wan Ich nur allain disen Sommer auss mit gemnden Leib zu bauss zupleihen hette, wolte Ich in Hoffnung stehen, wegen der Tabularum Rudolphi folgende doppelte demonstration (eine in speculatione, die andere in praxi) zu thun.

Erstlich in speculatione hette Ich ein Epitomen Astronomiae Copernicanae verfasst vnd bey nahe zu end gebracht, also das sollich Werck durch den biesigen Druckher vnd durch Hannsen Krugers von Augspurg Verlag, in meiner gegenwart gar wol ausgefertigt vnd gedruckt werden müechte. In disem Werckh werden die fundamenta Tabularum Rudolphi erklärt. Ein mster des Druckhs hiehey ligend.

Fürs ander, in praxi, wär Ich nünmehr so weit mit den Tabulis fertig, das Ich gar wol ein Ephemerida in annum 1617 drauss rechnen, auch zu contentirung etlicher Herrn vnd Landtentie ein Calendarium vnd Prognosticum, darauf sie sonderlich dringen, beyfüegen khönnte. Zweifel aber, ob es alhie gedruckt werden müechte, sonderlich die Ephemeris.

Bericht von der Landmappa. Dise 3 Jahr her, sonderlich ao. 1614 im herbst hab Ich einen Versuch gethan, vnd so vil befunden, das zum allerforderisten mir eine gemessene schriftliche instruction, was bey Verbesserung der mappa mein flürmeister Zweckh sein solle, von nöthen sein wölle.

Nu seind am Tag Wolfgangi Lozif mappa totius Austriae; mit den Steirischen, Kärntischen, Salzburgischen, Bairischen vnd Böhmiischen Confinen, Gerhardi Mercatoris Stiria vnd Episcopatus Salisburgensis mit den Ob der Enserischen Confinen, Petri Apiani Bavaria, auch mit den Ob der Enserischen Confinen, Augustini Hirsavogels Land ob der Ens, verfasst ao. 1542, gestochen zu Antdorff 1543. In disen mappen finden sich erstlich vil felschungen der

Namen. Darnach ist Lazil Tabula zwar klein, begreift aber vil Oerter, Mercator vnd Apianus haben nur etliche stuckhe vom Land oh der Ens, Hirs-vogel ist zimlich weitläuffig aber vnproportionirlich.

Hier ist nun mein frag, was dan mehrers zu prästirn sein werde, dan die jezzernte prästirt haben? Weitläuffiger vnd grösser, aneh zum Thail proportionirlicher khan die mappa wol gemacht, vnd die Namen corrigirt werden, auch zu hauss, wan Ich schon nit reise, sondern nur die botten vnd bauru, oder jedes orts Inwohner alhie aussfrage, dan also seind die maiste mappen biss dato gemacht worden, hernacher khönte ein solliche corrigirte mappa einem behümpften Kupfferstecher zuegeschickht, oder vilmehr einer alihero erfordert werden.

So aber der Löbl. Stende mainung dise wer, das Ich aller orten selber den angenschein einnehmen, der mappen Ir eigentliche proportz geben, nichts vbergehen, sonderlich die Confinen, vnd was sonstn für antiquiteten oder denckwürdiger sachen anzutreffen, wol anmerken solle, in massen Apianus Bavarium verfasst, da gehört warlich Zeitt, Mühe vnd Vnkosten zue. Apianus hatt mit Bavaria acht Jahr zuegebracht, bey 6000 fl. verzehrt, ist gleichwol nit aller orten in der person gewest.

Vnd hab Ich mich gmalniglich an jedem Ort, da es eine Kirch, Mesner vnd Aigen hatt, einen Tag zu säumen gehabt, biss Ich die Kirch besehen, einen erfahren Inwohner bekommen, Ine vmb die glegenhait, der vmblygenden örter gnugsamlich aussgefragt.

Kainer hat mir nichts vergehens gethan, sondern so lang antwort geben, als er zu trincken gehabt, oder sonstn nit vrwillich oder betanbt worden ist. Darneben hab Ich vberal, so wol in Märckhen vnd Dörffern, da Ich nachfrag gepflogen, als auch auff feldern vnd bergen, da Ich mein absehen gerichtet, oder den Wüssern nachgangen, vnd auff vngewonliche pfade kommen, vil Zuredstellungen vnd drawliche anstösse von vnerfahrenen, groben, argwönischen Bauern erleiden müssen, vnd würde sich dessen vnzweifel vil mehr auff den Grünitzen gefunden haben.

Hieraus leichtlich zuersehen, das Ich ohne einen vertrauten botten, oder dapfern Diener, der schreibens kundig, einen führman zu meinem Caläss, vnd ohne begleitung eines jden orts Amptmans oder Jügers oder gutten hekanten baurns, nichts fruchtbarlichs werde verrichte khönden, darauß E. Gn. den Vberschlag des Vncostens oder Liferung (so mir in meiner bestellung zuegesagt ist), auch was sie sonstn für notwendig ansehen, leichtlich zu machen haben.

Wan dan hey einer sollichen weitläuffighait vnter eins gar leichtlich etwas mehrers dan die blossa mappa zu verrichten sein möchte, als da seind die strittighaiten der grünitzen zwischen den benachhartten Ländern, deren auch H. Strutz seliger vor 15 Jahren mir meldung gethan, item ausstailung des Landes nach den Vösten, Pfarren vnd Landgerichten, Besichtigung der pitze zu defendirung des Landes, vnd was dergleichen, wölliches alles einer vnd der apder auss den H. Ständen oder Nachpauru, das es hierunter gesuecht werde, vermuthen, vnd eintweder seins Thails gern befürdert vnd vleissig verrichtet sähe, oder aber auch verhintern möchte: als hab solliches alles E. Gn. Ich, doch ohne maassgebung, gehorsamlich zu gemüth führen, vnd wessen sie sich hierüber wegen der Liferung vnd Patents, auch försetzung oder Verschickung diss Werckhs, vnd also schliesslich wegen der Wahl vnder

halden meinen werckhen, wölliches disen sommer fürzunehmen, gnädig resolviren werden, in gehorsam erwarten sollen.

E. Gn. mich geb. empfehlend

E. Gn. Vnderthüniger vnd gehorsamer Mathematicus
Johann Kepler, m. p.

An einer Löhl. Landt: des Erzherzogthums Oesterreich ob der Ens Herrn III. Verordnete. Johan Keplers Mathematici gehorsames Anspringen.

Responsio ordium, ipsi adscripta epistolae, haec habet: Praes. d. 9. Mai 616.

Dem Supplicanten wirdt hiemit anbevolhen, er soll alles, was er bisher gearbeitet, zusammenrichten, vnd dem Herrn Verordneten vbergeben, damit sie solches den löb. Stendten vmb derselben Resolution, was er künftig weiter fürnemen soll, fürbringen können.

Den 20. Mai 616.

Magistratum Ulmensem his adiit Keplerus literis:

*Edle, Veste, Hochachtbare, Ehrsame, Fürsichtige vnd Weisse
Grossgünstige Herren.*

E. V. F. W. vnd G. seind meine ringfuegige doch beflissene Dienste jeder Zeitt bevoor, vnd fuege denselben vuerdienstlich zu wissen: Demnach Ich die Exemplaria meines alhie gedruckten Astronopischen Hauptwercks zwar verschiehen Monat Septembri nachter Fränckfort gebracht, selbige auff Irer Kay. Mt. allergnädigsten Befehlich vnder die Kunstliebende vnd Bibliotheken vmb der Posterität willen ausszuthailen, auch in Catalogum setzen vnd von dem Kay. Herrn Commissariö taxiren lassen (wölcher auff Anhörung eines Tbails Gelehrter Kunstverständiger Ledtte; die das gmaine Exemplar auff 5 fl., anderthails der deputirten Buchführer vnd Truckher, wölche es auff 2 fl. allein nach dem Papir vnd Truckherarbaith geschätzt, für sein Person den Tax, Frieden zwischen mir vnd den Interessirten Brabischen Erben zu stifften, vnd sonderlich den vnvermöglichen studiosen zum besten auff 3 fl. lautter vnd Pors Gelts gemässiget): Jedoch aber dissmaß die Exemplaria den anwesenden frembden Buchführern zuvor vnd ehe die edition vnd Tax allerorten genugsam insinuir vnd bekannt gemacht werden konn, noch nit vberlassen noch verkauffen sollen; hierdurch die Gefahr des Nachdruckens ausserhalb des Reichs, vnd der allzuhohen Staigerung in den weitter entlegenen provinzen zu verbüetten:

Demnebens aber Ich von dem hiesigen Druckher verstanden, das sein Instruction vermügo, von jedem Werckh, so Er alhie druckht, eine Anzahl Exemplarien E. E. F. W. vnd Gunsten auff die Hütten, gegen Erstattung des Taxes zu lifern; das Ich hieradff in Erwegung gezogen, wie nit allein Er der Druckher von dem, was alhie gedruckt, keine weder völlige noch saubere Exemplaria auff gutt Papir, sondern allain die aussgeschossene Pögen von dem Zuehussbuch zu dieser praesentation gehaben möge: sondern auch Mir als dem Anthorl vnd Verleger geziemen wölte, E. E. F. W. vnd Gunsten, von wölchen Ich diss Jahr über neben dem Beysitz allerley günstige Befürderung vnd Guethbaten zu verspüren vnd zu geniessen gehabt, mit saubern completen Exemplarien für Dero Bibliothec vnd dieser Hochlöblichen Reichs Statt, als dem Ort des Drucks zu sonderu Ehren, zu versehen: Derohalben Ich mich hierüber mit dem Druckher dahiü verglichen habe, das Ich an seiner statt lifern, seine Exemplarien, so vil deren von E. E. F. W. vnd Gunsten eingenommen worden, zum gewöhnlichen Tax des gemeinen Exemplaris bezahlen,

dieselbe gegen sein Papir auswechseln vnd mit denen Stuckhen, so anderer Orten darzu verfertigt worden, compliren wölle.

Diesem nach praesentir E. E. F. W. vnd Gunsten Ich hiermit vnderdienstlich sechs vüllige Exemplaria auff guttem Papir, hochveissig bittend, E. etc. wölle solliche erstlich als vom Druckher seines Theils vnd Gepür annemen, vnd Ime dem gewöhnlichen Brauch nach den benannten Tax des gmainen Exemplaris dafür erfolgen lassen: Nachmahls bey der von Mir besethtenen verpesserlichen Auswehlung vnd Complirung dieser Exemplarien, mein vnderdenstliche danckparliche Affection gegen dieser Ansehnlichen Republica, zu hohen Gnaden an vnd aufnehmen.

His addit Keplerus: Bitt denstlich Herr Stromaier wolle wa es Ime nur müglich, diss Anpringen noch einmal abschreiben, vnd auff das Steirhaus richten. Für „Auff die Hütten,“ setzen „auff das Steirhaus,“ für „sechs Exemplaria“ setzen „fünff Exemplaria.“ Die halbe Vberschriften würt H. Merkl wissen. Hab ordinantz jetzo vmb 12 Uhr zu praesentirn.

Ad verba »wölle solliche erstlich . . . erfolgen lassene« adscript Keplerus in margine: NB. An sic? An omittam? —

Epistola Kepleri, quae sequitur, data esse videtur ad commissarios caesares Pragae vel Viennae; desunt dies et locus. Scripsisse videtur Keplerus anno 1628, quo Berneggero nupcial, conuenisse sibi cum Braheanis de dedicationis. (v. s. p. 623.)

Edle, Gestrenge, Hochgelehrte, Grössgünstige Herren.

Oh ich wol diser Zeit dieselbige in gegenwärtiger meiner Verrichtung vnd herzuwachsender höchster düffligkeit in vil andere Wege anzusehen vnd vmb Dero Intercession bey Irer Kay. Mt. vmb eillenden Succurs, wa nit mit Gelt, doch mit Anticipations-Mitteln vnd Fürschriften an gewisse Reichstende anzuhalten bette: so lass ich doch diss zuvörderst für dissmahl, vmb Beförderung willen der Hauptsach, zu Göttlicher Vorsehung, dann auch zu E. Gn. vnd Herrl. aigner discretion, haim vnd beyseitz gestellt sein, vnd kehre mich zu demjenigen, was von Irer Kay. Mt. vor 2 1/2 Jahren baiden Herren Doctoribus samptlich commissionsweise aufgetragen vnd anbefohlen worden, dieselben vnderdenstlich berichtende: demnach das Werekh Tabularum Rudolphi nunmehr in etwas Fortgang gebracht, also dass ich leichter alles, so für mein, auch Weibs vnd 6 Kinder Auffenthait gebührig, in die Schanz schlagen, dann von Maturirung des Wercks aussetzen khan vnd solle; dass ich derowegen mit den Braheischen Erben in Böhheim fernere Correspondenz gepflogen vnd die Sach mit Inen auff gute Mittel gebracht, indem wir vns verglichen, dass ermeite Tabulae Irer Kay. Mt. durch zwo vnderschiedliche dedicationes zugeschrieben werden sollen, deren die erste von Inen, die andere von Mir ausgehe, auch ein Theil dem andern sein fürhabende dedication zuvor communicire, dessen Bedenckhen vernemen, vnd güetlich vergleichen sollen. Krafft diss Veranlass haben die Braheische mir Ir Concept des Tituls vnd dedication in duplo zugeschickt, wölches E. Gst. vnd G. Ich hiemit in Originali zugeschiecke, mit der Erklärung, dass es seines Inhalts mir nit zuwider, allein dass Ich Inen die dedication etwas formlicher gestellt vnd zu weitterer Erklärung zuruckgeschickt, den titul aber der Notdurft nach vnd auff ein solcho Form (so hiemit E. G. vnd G. Ich zum vbersehen zugeschiecke) dilatirt, bey deren Ich mir zu bestehen getrane, bester Hoffnung, sie werden diss orts mir, als in ein zwar gmainen Titul, bey dem Ich aber mehr dann sie interessirt, weitter nichts einreden.

Was dann mein dedication anlangt, hab Ich die Erben gleichfals haupt-

sammtenlich erinnert, was Ich drinnen, nämlich fürnemlich excusationem morarum, einzuführen willens. Wann ich dann solche dedication seidhero nach meinem Honor verfasst, als schickte Ich selbiger Abschrift gleichfalls E. Gst. vnd G. zum Vorsehen, vnderdeustlich bittend, die wellen zuzuforderist Irer Commission nachgehen vnd ob nichts drinnen eingebracht, so den Brabischen Erben hillicher Weise auszusetzen, nach Dero beywohnender hoher Verouffst vnd Lieb zor Gerechtigkeit ponderiren, auch so etwas zu wenden wäre, Mich dessen zuvor vnd cho ich weitere Handlung mit den Brabischen pflege, grossgünstig erinnern, auff dass hernach desto weniger Vrsachen vberbleiben, E. Gst. vnd Herrl. mit Iren einer (deren ich mich zwar nit versehe) ferners anzulauffen.

Zumahl aber vnd fürs ander gelangt an E. Gstr. vnd Herrl. als meine einige patronos vnd intercessores hey Irer Kay. Mt. mein vnderdenstliches vnd gantz instendliches Bitten, Die wollen mein Concept, Titul vnd dedication Irer Kay. Mt. selbstens fürweisen vnd was Dero darinnen etwa missfallen möchte, solches aussatreichen vnd mir das concept wieder zueckkommen lassen. Im titul hab ich der Warheit stattgeben, eines Jeden merita geprüessen, wie dann die Welt davon waisset: hab also des vorigen Königs in Dennemareckh vnd einer löbl. (gesampten von Geistlichen vnd Weltlichen Stenden) Landt: in Oest. oh der Ens nit vergessen sollen; in gleichem vermags sonsten die Reichsordnung, dass der Druckber vnd das Ort auf jedem Buch stehe.

Wann aber Ire Kay. Mt. des Königs zu Dennemareckh Meldung vmb deswillen nit leiden möchten, weil sein Sohn (der dem Tycho Brahe die von seines H. Vatern gehabte subeldia entzogen) jetzo Irer Kay. Mt. Feind ist, wöche Consideration zwar, wann die Sach recht zu Gemüth gezogen werden solle, nit leichtlich statfinden würt, angesehen diss dem Sohn vilmehr ein Aufspöpfung ist, dann ein Lob, dass sein Vater Tychonem vnderhalte, Er aber mit seiuer Karghait Ine auss Dennemareckh an Kay. Hoff zu ziehen verwaschet, also das Haus Oesterreich mitt diesem spolio Danico zu gloriren hatt, auch sonsten die Heroes pflegen gegen ihren Feinden sich liberal zu erzeigen, sonderlich wann Inen Gott die Ehr gunnet, denselben mit siegreicher Hand vnd Schwert zu verfolgen. Wie dem allem aber, wann, spreche ich, Irer Kay. Mt. auss mehrern mir vnhekannten Ursachen eines Königs in Dennemareckh Namen zuwider sein wolte, so werden E. Gst. Ine wissen ausszuleschen.

Mit einer Landt. oh der Ens Meldung bin ich mehr sorgfältig. Einmahl stehen die Tabulae Rudolphi in meinem Besoldungsbrieff, von Geistlichen vnd Weltlichen vnderscriben: müeste es aber auch bey Irer Kay. Mt. Allernüchdigstem Willen verpfeihen lassen, vnd anstatt der Meldoog im Titul etwa ein gratitudinis significationem gegen Inen hinten anheucken.

Vlm vnd den Druckber anlangend, die werden müessen mit Irer Kay. Mt. Willen für Gutt nemen, mir ligt nichts daran; allain wann sie mir in Irer Kay. Mt. Namen ein Tausend Gulden gäben, wolte Ich Inen zu Lohn die Meldung auffin Titul gern gunnen.

Was dan die Contenta Dedicationis belangt, da ist nit ohn, ein jeder schreibt gern seinem Humor nach, vnd hette Ich nichts allerhöchst zu erfrenen, wan Ire Mt. vertragen möchten, dass Ich also den Friedenwunsch per comparisonem operis mei öffentlich an Tag gebe; aber auch hie nit mein Wunsch, sondern Irer Mt. Nutns geschehe. Diss allain hitt Ich zum Beschluss auffe allerhöchst, E. G. vnd Herrl. wöllen mich diss, als vmb meiner vnentperlichen Nothdurft vnd Nachrichtung willen, nit vnheantwortet lassen, oder zum wenigsten H. Jeremie Pistorio, mit Vbergebung des vnterstrichenen oder emen-

dirten Concepts, anbefehlen, was Er in dero Namen mir bey jedem Punkten zuschreiben solle.

Magistratus Esslingensi Keplerus tradidit Tabulas absolutas, his ornans minus verbis:

Edle, Ehrenveste, Fürsichtige und Weisse, Grossgünstige Herren.

E. E. W. vnd Gunsten seind mein beflissene Dienste bestes vermögens bevor. Diweil Ich in jetzverschinerer Franckforter Mess mein Astronomisches Hauptwerckb, Tabulae Rudolphi genennet, an wöllichem weillend der weit berühmte Astronomus Tycho Brabe, vnd nach dessen Tod Ich, als darzu bestellter, vil Jahr lang gearbaitet, dermahlen einest nacher Franckfort gebracht, dasselbige auss der Röm. K. Mt. Allerguedigstem Befehle vnter die Kunsterfahne auszuthailen, wölches zu Verhüttung der Buchführer alzuhoher Staigerung zwar wol in Catalogum gesetzt vnd von dem Kay. Commissario aldorten den Tycho Brahischen Erben vnd mir zu guttem taxirt worden, aber den anwesenden Buechführern dissmahlen, ebe vnd dann es den Kunstliebenden selber bekant würt, noch nit vberlassen oder verkanfft worden, in meiner Zuruckhalse aber, als Ich den Weg durch Esslingen genommen, von E. E. W. vnd G. mir eine sonderliche hohe unverdiente Ebr mit köstlichem Wein in das Hofefelderische Wohnhaus vnd ferners eine mir hochnotwendige Ausstaffung auff die vberige Reise mit der Leihung eines Spital-Gauls vnd Jungens, grossgünstig widerfahren, dadurch Ich verursachet worden; nach einer dankbarlichen Erzaigung zu trachten. Alda mir dan zu Gemüth gegangen, das auch E. E. W. vnd Gunsten gutte Künsten, durch wölche die Erkantnuss Götlicher Weisheit vnd Gütte erweittert würt, lieb haben vnd befürdern, auch sich einer gutten Bibliothec beflissen, dalero Ich leichtlich zu erachten gehabt, das ein Par Exemplarien dieses Werckhs diss Orts wol angelegt, nit vnangemen sein, sondern deren Bibliothek alren, auch vermittelt deroeselden desto besser auff die Posteritet zu bringen sein werde. Als hab ich zu meiner Widerkunft nacher Vlm ein sollich Exemplar auff gutt papir zur Bibliothec vnd eins von gmainem papir, wie es künftigt verkaufft werden soll, für E. E. W. vnd Gunsten Statt Kinder, wölche philosophiam studiren (vnder wölchen mir dieser Zeit ein Junger Mauchart bekannt), zu täglichem Gebrauch ausgesondert vnd thue selbige E. E. vnd G. in dankbarlicher, auch sonsten vnderdenstlicher gutter Affection praesentirn; hochfleissig bittend, die wöllen selbige zu grossen Gunsten an vnd aufnehmen, auch mich vnd andere meine mehrere editiones, so noch künftigt zu Anssführung der fundamenten zu jetzigem Werckh gehörig sein werden, mit vnd neben anderen hochblöblichen Stücken vnd Stetten des H. Reichs auff begebende Fälle, zu dero Schutz, Befürderung vnd grossen Gunsten hefoblen sein lassen.

Damit E. E. F. W. vnd Gunsten Ich allen glücklichen Wolstand in gaitlichen vnd weltlichen Saeben von Gott dem Allmechtigen bertzlich wünschen thue.

Datum Vlm den 2. Novembris Anno 1627.

E. E. F. vnd Gunsten

Zu angenehmen müglichen Diensten beflissener
der K. R. Mt. Mathematicus
Johan Kepler.

Supra (p. 616) diximus, specimina praeparationis ad Tab. Rud., priore tempore confirmata, nos exhibituros esse. Tale specimen desumptum ex mss. Pulkov. vol. II. haec habet,

18. Febr. 1616. Quæ in Luna restent emendanda.

1) In transformatione valent tabulae, quibus minutis ante finem annorum completorum (qui finis intelligitur in meridie 1. Jan. anni sequentis) Luna in apogæo fuerit, et ubi tunc apogæum et nodus, Diebus illis et horis adduntur completi dies et horæ de anno currente, de summa auferuntur ex tabella subjuncta dies et horæ et minuta revolutionum integrarum, quarum summa est proxime minor.

2) Transformationi subjuncta est mea manu tabula gemina motus apogæi, nodi et anomaliae mediae pro diebus et horis, et sufficit, ut illa ad 27 dies prorogetur. Ex illa excerpuntur hi motus pro residuis diebus et horis et sic absolvitur motus apogæi et nodi.

3) Cum anomalia quaeritur conequata ex nova tabula æquationum, quæ adjecta est in paginis separatim. Ibi sunt a) anomaliae eccentrici in gradibus integris cum subjunctis æquationibus physicis, b) anomaliae conequatae, c) æquationes totae.

4) Apogæum Lunæ auferitur a loco ☉, tunc in postica involucri tabulae expansæ est tabula distantiae ☉ ab apogæo Lunæ, in qua quæsitæ hæc distantia exhibet scrupula cum titulo.

5) Auferitur locus ☉ vel oppositum ☊ a loco Lunæ, cum residuo excerpitur ex tabula, loco tertio dicta, æquatio tota et multiplicatur in scrupula pro æquatione menstrua.

6) Duplicatur distantia ☉ a ☊ et cum hac ex tabula æquationis menstruae excerpitur variatio cum titulo et scrupula latitudinis et æquatio nodi.

7) Locus nodi æquatus auferitur a loco ☉, cum residuo ex tabula latitudinis, quæ invenitur in Lunaribus Tychonis, excerpitur latitudo et excessus in quadris, multiplicandus in scrupula latitudinis.

8) Ex tabula reductionis ad cæpticam in Lunaribus Tychonis cum distantia ☉ a nodo excerpitur hæc æquatuncula.

Hæc igitur commodius et brevius et perfectius sic possunt disponi.

Prima tabula in tabulis Rudolphi accommodetur ad mediam noctem, subtractis ab omnium annorum fine horis 12. Extendatur autem tabula etiam ad alia tempora, examinato prius motu Tychonico per antiquissimas eclipses. Quaerantur sc. periodi anomaliae ex Prutenicis.

Die in 4. Julianis insunt 24 Sexag. 21.	24	5	13.	33.	34.	33.	35
	21		4.	34.	21.	52.	44
			5.	18.	7.	56.	26. 19

In annis 180 restant 2° 40' 15".	2.	40.	15	sexages
	5.	20	30	duodecies
	40.	3.	45	quinderies
	0.	0.	33. 45	3. 58. 13. 10 trices
				1. 59. 6. 35 quinderies
				5. 57. 19. 45 45ies

Ergo fiat extensio tabulae per annos 180, lineæ sicut non ultra 40 vel 50. Quadriennia vero in annis 80 facient lineas 45, sed præstat omnes 180 annos ordine collocare totidem lineis.

Secunda tabula manet.

Tertia non videtur opus habere; columna æquationum tantum absolvatur cum differentiis ut aliorum planetarum. Potest multiplicari facile, ut eam ad 360.

In quarta duplicanda sunt scrupula proportionalia, vel saltem exerpenda ex sectionum aialbus, ut fiant in uniuersum 60.

In quinto puncto debet fieri excerptio non ex columna totarum aequationum, sed ex columna aequationis physicae, quia haec totus est dimidia, supra vero scrupula diximus duplicaturos. Sed causa genuina est, quia si operamur ut dictum modo quinto, dissimiles aequationes adhibemus in locis a copulis utrinque aequaliter remotis. At tantum discrimen esse in accessu ad copulam et recessu ab ea, vix est credibile. Magis verisimile, aequalom esse utrinque. Id autem obtinemus, si in gradibus, qui sunt proprii anomaliae eccentrici, numeremus gradus distantiae Lunae a Solo.

Sexta tabula confertur ad tertiam. Nam quia jam semel dist. ☉ a ☉ quaesita fuit in numeris anomaliae eccentrici, fiat hoc igitur semper. Sed ne sit opus duplicatione, adscribatur variatio ut ad simplices distantias, sic ut in 45° sit maxima cum signo suo. Accedat etiam excessus latitudinis seu latitudo menstrua, 15 vel 20 scrupulorum.

In septimo puncto prius probetur ex observatione latitudo maxima copularum, itemque quadrarum et excessus hujus supra illam, tunc emendetur tabula.

Accedat huic septimo octavum, reductionis ad eclipticam, sed prius corrigatur.

Hic concludit Keplerus hanc disquisitionem indeque abiit ad Ptolemaei eclipses, illis certa tempora assignare studens sequentibus duobus foliis, hisque ad finem adscriptis: Hinc desunt 100 paginae, quod notavi 1626. 26. Aprilis et ante. Forte id inde est, quia hic inveni duas paginas materiae diversae, latitudinis et tincturae saturitatis eadem, de quibus dubitavi, an in eorum locum aliae alicubi errantes reponendae. Inde usque ad finem manusciporum vol. II. cujus maior pars »Hipparchium« continet, foliis 50 exhibentur »Conjunctiones antiquae Lunae cum fixis, pro constituenda epocha motus Solis medii a fixis ad tempora antiqua Chartae haec sunt scriptae post annum 1617«

Ceterum in eodem volumine II. deprehendimus sequentem disquisitionem, scriptam inter occupationes typographicas Ulmae 14/24. Maii 1627.


Qui sunt in his paginis numeri manus imperitae, uilius habendi sunt momenti, propterea utar papyro vacua ad considerationem tabulae prosthaphaereseos. In illa igitur limes sic libratur, ut, cum ☉ est cum limite, maxima sit ejus inclinatio et fero immobilis. At cum ☉ versatur circa uodos, inclinationis incrementa sunt magna. Ex hac re sequitur illud incommodi, quod prosth. nodorum sit magna, ubi non oportebat. Sed comparatur tabula jamjam imprimeuda. Et ineipiatur consideratio a fundamentis. Cum uodus est cum Sole, maxima debet esse inclinatio limitis. Et ita habet tabula, quia est dist. ☉ a ☉ 0°. Est inclinatio 18' 0'', et in 10 sequentibus gradibus non ultra 16'' deipuit de hac maxima inclinatione limitis. Cum vero ☉ est 90° a ☉, incrementum inclinationis limitis est 19', et in gr. 10. fit 3' 4". Quodsi dispensamus inclinationem 18' ad modulum situm, sic ut ex situ gradus unus 1745 uanciscamur modum inclinationis 0' 19'', etsi huc prosth. uodi fit 3' 34''. Certo, si aliter dispensamus inclinationem, ut variationem, sic ut initio sit quantitatis insensibilis, erit etiam prosth. uodi circa ☉ ☉ quantitatis insensibilis. (In margine: falloris.) Et hoc requirunt eclipses. Nam termini lunarium eclipsium sunt 12° et 17°, quibus hoc pacto compositis prosth. 39½ et 54½. per quos arcus multum deminuitur vel augetur latitudo, sc. per 3' et 6'. Et cum hoc non ferant eclipses, quid molius faciemus, quam ut inclinationem etiam in ☉ ☉ faciamus poco immobilem, libreturque limes in arcu non somidiametri, sed diametri, quod per se est

conclinnans, non subito relegere vestigia ab austro in boream, sed post cunctationem ob moram. Illud solum considera, an tabula lat. menstruae nitatur eodem fundamento. Et videtur quod sic, nam gradus 16 ☉ a ☊, cum est ☉ ☊ ☊, addit 5' latitudini. Sed cave ne aliud videatur, aliud sit. Oportet non ☉ a ☊ mittere, sed ☉ a ☊. Hic igitur in tota suprema linea additur nihil, Luna cum Sole versante. Est igitur etiam haec tabula menstrua mutanda.

Rursum considera, quid obveniat gradui 45? Nimirum ex sinibus 12' 44", ex sagittis (libratione per totam diametrum) tantum 9'. Ut sit, construat tabula de novo per rectangula quadrantis, seu etiam per variationem, quo habet proportionem eandem. Nam si 40' 30" dat 18, eē si 81 dat 36, h. e. si 9 dat 4, quid singulae? Sed forte compendiosius est, uti sinibus. Nam postquam 45° dist. ☉ a ☊ accepit 9', jam reliquis gradibus, pro ratione sinuum ad gradus parces, obveniunt augmenta et decrementa. Ut pro gr. 44 et 46 sumitur sinus gr. 2. Hic ut 100000 ad 90000, sic 3519 ad 3167; est ergo modicus de uno minuto, sc. 19".

Jam videtur prosthaphaeresis incrementum sumtura ut sinus, ut initio dupla, sine pene nulla. Proba' gr. 10; sed, nescio cur in schemate illo posuerim a Solem. Fingendum est planum, quod in locis Solis et opposito secat eclipticam aut ei jungitur. Nam quoties Sol est in limite solitae, plana junguntur, quoties vero Sol est in nodis, plana distant, ut limitis menstrui inclinatio sit 0° 18' 0". Sunt ergo duplices nodi, alteri cum Sole et ejus opposito, inclinationis non constantis, alteri proprie et aequabiliter eccentrici Lunae cum plano menstruo, inclinationis constantis, sed mobiles a Sole retrorsum idque aequabiliter. Et eccentricus continuatus ultra menstruum secat eclipticam locis aliis, semper Soli vicinioribus et ejus opposito, eē versus plagam, qua vicinior vel Sol vel ejus oppositum. Esto Sol cum limite boreo, tunc limes boreus paulatim relinquitur a Sole incipitque planum menstruum, quod Solem antecedit in consequentia signa, ab ecliptica declinare in austrum, et plani semicirculus, Solem antecedens, incipit attolli in boream; desererit Sol bor. limitem per 10°, erit angulus ad Solem inter semicirculos plani menstrui et eclipticae 0. 32". Sic etiam ap. ☉ ☊, sed ante ☉ per 100°, sen post ☉ ☊ per 80°. In plano menstruo est punctum intersectionis aequabili motu, inde incipit eccentricus assurgere in boream (situ non jam moto). Est ergo primo locus Solis infra, eccentricus praeterit Solem supra. Arcus plani menstrui inter 2 intersectiones est 100°. Arcus eclipticae, a ☉ retro extensus ad usque intersectionem ab eccentrico, est longior. Et post ☉ ☊ formatur triangulum, cujus latus jacens de ecliptica est ignotum, latus de plano menstruo elevatum est 80°, latus tertium quaeritur. In schemate α ☉, β sectio diametri $\beta\gamma$ cum plano menstruo, $\alpha\beta$ 80°, $\alpha\gamma$ ecliptica, $\gamma\beta\alpha$ est 5°, $\gamma\alpha\beta$ est 0° 0' 32", si $\alpha\beta$ est 80 et δ rectus, et $\alpha\beta\delta$ 0° 0' 32". Ut ergo $\alpha\delta\beta$ ad $\alpha\beta$, sic $\alpha\beta\delta$ ad $\alpha\delta$. Ita junctis logarithmis $\alpha\beta$ et $\alpha\beta\delta$ fit log.

Fig. 1.



$\alpha\delta$. Et quia scitur jam $\alpha\delta$ et $\alpha\beta$, scilicet etiam $\delta\beta$. Ut vero $\alpha\beta$ ad $\alpha\delta\beta$, sic $\delta\beta$ ad $\delta\alpha\beta$. Unde abstractus $\gamma\alpha\beta$, relinquit $\gamma\alpha\delta$. Habetur ergo $\alpha\delta$ cum suis 2 angulis. Perrexerit jam Sol, relinquens limitem et appropinquans nodo se sequenti. Tunc oppositum ☉ appropinquans nodo ascendenti appropinquaverit ad gr. 10° viciniam. Sit ergo $\alpha\beta = 10^\circ$, et sit $\beta\alpha\gamma = 17' 28''$, ergo log. 10°, qui est 175072, additus ad log. 17' 28'', qui est 528300,

facit 703372

Ergo βs 0. 3' 2" et quia $\beta \gamma s = 5. 17. 32$. tg. βs 238343

465029

Venit $\beta \gamma$ 0. 32. 32. paulo minor quam prius. Parum lucrati sumus.

$\alpha \gamma$: 244006
$\alpha \beta$	— 1531 — 175072
$\alpha \delta$ log.	245537 — 370
$\delta \beta$	1542 — 174702
	11

 $\delta \alpha \beta = 89. 9$ $\gamma \alpha \beta = 0. 0. 32$ $\delta \alpha \gamma = 89. 9. 28$. Venimus ad tangentes.Potius operare per supplementa, ducta perpendiculari βs . $\beta \alpha s$ 0. 0. 32 — 877114 $\beta \alpha$ 1531 βs 878645

. 814257

. 64388

G. 1° 404828

Sc. $31\frac{1}{2}$ — 469216.Est ergo βs 0. 0. $31\frac{1}{2}$ ", hoc sctilog. 0. 054, et hic auferatur ab antil. anguli $\alpha \alpha \beta$, relinquitur log. $\alpha \beta s$, qui profecto insensibilis erit minor recto. Aufer $\alpha \beta \gamma$ ab $\alpha \beta s$, relinquitur $\gamma \beta s$, insensibilis minor quem 85°.Cum pro insensibilitate fiat via intricata, tractetur $\beta \gamma s$ ut planum, et sit $\gamma \beta s = 81° 59' 29''$. $\beta \gamma s = 5° 0' 32''$, $\beta s = 31\frac{1}{2}''$

log. 649665.

 $\beta \gamma s$ log. 248831178865. Venit $\gamma \beta$ 10' 1".Perpende γ . 5. 0. 32, dat $31\frac{1}{2}''$ βs , ergo dat $\beta \gamma$; 5'. 14" dat $31\frac{1}{2}''$ quid 60?


stat differentia per 3 hypotheses. Sit \odot 0° γ , \odot 15° δ , \odot 0° ϵ aequaliter. Ergo \odot a \odot per 45, ergo act. prop. 30' 28", et prosthaph. nodorum 1. 40' add. Ergo verus motus lat. 316°. Ergo excerpo lat. 2. 24. 28, excessum 13. 24, de quo pars proportionalis scrup. 30' 28" est 6' 37". Componitur latitudo 3° 31'. Sic apud Tychonem secundum me est argumentum annum 270, excessus 90, inclinatio limitis 0. 0, prosthaph. 0. 0, menstruum lat. arg. 315 vel 15, lat. 3. 32. Quodsi reciprocatorem nodorum menstruum recipiam dimissa annua, latitudines Tychonis (habemus). Nam \odot a \odot 45, prosthaph. etiam mihi fiet maxima 1° 40'. Sed \odot a \odot 270, a $\gamma \delta$ 90 dabit inclinationem limitis nullam. Ergo \odot a nodo vero erit 43. 20, dans ex tab. lat. simpliciter 3. 25. 44. Minus quam Tychon. Computatis aliquot exemplis, sic concludit Keplerus: Exuatur igitur tandem haec persuasio, quasi mea prosthaphaeresis nodi annua faciat paria eum Tychonica circa nodos in octantibus. Pergamus jam in comparatione emendati praecepti cum Tychonico.

Considera amplius hypothesis. ACB ecliptica et haec signorum consequentia. C Sol et nodus descendens, DCF planum menstruum, ut CD vergat in boream, quia eccentricus CG in boream vergit. Hic excurrit sane \odot

Si relinquamus motum nodi per latitudinis argumentum annum aequalibilem, sed id solum per lunationis revolutionem variemus, quid sequetur? Tunc ubicunque sit nodus, semper ejus prosthaph. est maxima, Luna in octantibus versante, nulla, si illa in copula et quadria. At si illa in ipsos nodos veniat, prosthaph. invenit tantam, quanta sit per argumentum annum. Et quia constantia prosthaph. nodorum per totum mensem paria facit eum hypothesi Tychonis, jam ejus variatio per mensem non faciet paria. Id quidem quaerimus, ut latitudines in \odot , ∞ sint magnae, et obtinemus. Contra alterationem latitudinum minimarum, Luna in nodis versante, octantibus retinemus. An igitur non insigniter mutantur latitudines aliae? Esto \odot in \square . Hic \odot in octante versante, prosthaph. est maxima 1. 40. Et quia tunc argumentum est circiter 45°, certe ibi loci per 1° 40' variatur latitudo per 6', eum tamen in hoc situ prosthaph. per argumentum annum sit nulla. Proba, an talis existat differentia per 3 hypotheses. Sit \odot 0° γ , \odot 15° δ , \odot 0° ϵ aequaliter. Ergo \odot a \odot per 45, ergo act. prop. 30' 28", et prosthaph. nodorum 1. 40' add. Ergo verus motus lat. 316°. Ergo excerpo lat. 2. 24. 28, excessum 13. 24, de quo pars proportionalis scrup. 30' 28" est 6' 37". Componitur latitudo 3° 31'. Sic apud Tychonem secundum me est argumentum annum 270, excessus 90, inclinatio limitis 0. 0, prosthaph. 0. 0, menstruum lat. arg. 315 vel 15, lat. 3. 32. Quodsi reciprocatorem nodorum menstruum recipiam dimissa annua, latitudines Tychonis (habemus). Nam \odot a \odot 45, prosthaph. etiam mihi fiet maxima 1° 40'. Sed \odot a \odot 270, a $\gamma \delta$ 90 dabit inclinationem limitis nullam. Ergo \odot a nodo vero erit 43. 20, dans ex tab. lat. simpliciter 3. 25. 44. Minus quam Tychon. Computatis aliquot exemplis, sic concludit Keplerus: Exuatur igitur tandem haec persuasio, quasi mea prosthaphaeresis nodi annua faciat paria eum Tychonica circa nodos in octantibus. Pergamus jam in comparatione emendati praecepti cum Tychonico.

angulis magnis ACG, BCK. Sed ait Sol H, erit planum menstruum HI, eccentricus IL, ut I sit in eadem longitudine cum C, et hic secat HC in O. Adhuc magnus est angulus HIL, sed apud punctum I, quod jam est proplus ipsi IL. Est enim I locus nodi aequabilis, IO prosthaphaeresis.

Sit rursus Sol in M, planum menstruum QMR, eccentricus NES, ut E, sectio cum plano, rursus sit in eadem longitudine cum C. Rursus hic NS secat eclipticam in P, et est PE prosthaphaeresis et apud punctum P magnus angulus SPM. Magni sunt anguli, sed latitudo non fit magna in ☉, quia argumentum PM est brevius quam EM. Sic CH brevius quam MH. Si autem non transponeretur planum DCF in HIS et QMR, nec eccentricus ex GCK in LOI et NPS, tunc vero fieret magna latitudo etiam Sole ante et post nodum versante: sed tunc intersectio plani menstrui non esset cum Sole, sed cum nodo ordinario; huius non alteraretur latitudo, Luna per nodos in octantibus incedente.



Delineatio anomaliae mediae ad singula minuta aequationis primae.

(Ulmæ 1⁴/28. Maji 1627.) (Fragmentum)

Quia papyrus valet, hic plura tentabo de hypothese latitudinis, continuabo sc. quod infra est abruptum. Scio quod, abjecta nodorum prosthaphaeresi et plano menstruo, vicissim libratione peracto plano solutae super axe per nodos eunte, in ☉ ☿ et in ☐ ☿ nihil peccem; at si ☉ a ☿ per 315, quod tunc peccem in ☉ ☿ ☿ per 10, in ☉ ☿ ☿ per 9¹/₂, in ☐ ☿ ☿ per 3, in limite ☿ a ☿ 135 per 4 excedam in boream, in ☉ ☿ ☿ per 10. Dictum etiam ibi, quod hoc peccatum in ☉ ☿ ☿ initio, quando ☿ est vicinus adhuc Solt, tolli non debeat. Coepi et de remedio dicere. At nunc hic probetur, quid varietatis existat, si inclinatio limitis sit initio et fine tarda. —

Haec sequuntur in manuscripto Tabulae, quae ante praemissa concinnatae, primo, ut videtur, ad Tab. Rud. destinatae fuerant, quibus adscripsit Keplerus: 11. Marti. 1621.

Non ab eo diximus his, quae de Tabulis Rudolphinis praemisimus, adiungere excerpta ex epistola Jeremiae Horroccii ad Crabtraum, quibus ille iudicium fert de his Tabulis earumque consensum cum observationibus probat.

Dia 3. Junii 1637. scribit Horroccius: Tu juxta mecum cum Kepiero cogitas, qui stellas fixas ut mera puncta existimat, nec quicquam, inquit, impedit quin Sol sit fixis major. pag. 498 (335.) Confer haec cum Lausbergio (Uranom. lib. 3. El. 21.), qui existimat, fixarum maximas majores esse non Sole (parum hoc), sed Terrae orbe magno vicinis 20053. At interim fixarum parallaxin ad orbem Terrae facit 7" 22" (Elem. 7.). Semidiametrum autem fixarum apparentem magnitudinis quintae et sextae facit 5" et 2¹/₂", quas tamen magno orbe Terrae vult majores esse; quae sunt parvitas. Erroris causa est, quod in definienda parallaxi (Elem. 7.) distantiam earum facit partium 280000000, quales habet orbis Terrae 10000; sed in definiendis magnitudinibus distantiarum earum facit totidem semidiametrorum Terrae, hoc est totidem partium, quales habet orbis Terrae 1498¹/₂. (Elem. 20.)

Nactus sum tandem mense praeterito Tabulas Rudolphinas, quod absolutissimum opus esse iudico. Sunt quidem (ut sis) satis intricatae, sed neus eas expeditiores praestabit.

Observationes Martis, quas misisti, demonstrant nullas hypotheses, praeter antiquam Keplerianam, veras esse; non meam quidem, quanquam ad illius prope accedat. Observationes Saturni mediocriter utrisque conveniunt, sed mene potius, si minuta 2' aut 3' ait res alicujus momenti. Solus Jupiter mense potius favet, si observata omnia sint accurata; nonnunquam tamen ab utraque dissentit.

Ego hypothesis ejus ut veram amplexus operam dedi ut tabulas ejus corrigerem, idque hoc ordine. Primum supputavi ex tabulis ejus planetarum motus, pro observationibus quas habeo; deinde quaenam esse possit discrepantiae causa scrutatus, quam denique tollere conatus sum, idque hoc successu.

1. Solem quod attinet, ingenio aequinoctiis autumnalibus exacte convenire tabulas; sed in vernalibus Solis locum esse plus minus minutis 4 vero majorem. Causam hujus hanc existimo, quod tum excentricitatem, tum aequalem motum iustis majores fecerit. Medelam hanc adhibeo: anno Christi 1600 completo aequali Solis motui subtraho min. 2. 0, retento motu apogaei, excentricitatem facio 1770.

Erat, inquit, Creatio mundi anno ante Christum 3993. Julii 24. h. 0. 33' 26" Uranoburgi, estque ingeniosa conjectura et non improbabilis; nec quidem refragatur historia. Scaliger facit 3947. Sed Bronghtons acriter contendit, addendos esse annos 60, esset igitur 4007. In historia Regum chronologi differunt annis 18 aut 19. Quidam (ut Buntingius) pauciores habent quam Scaliger, annis 18; quidam (ut Mirandula et Bucholzerus) annis 16, quidam (ut Melancton) annis 12. Potest quidem Kepleri sententia vera esse, solummodo meridianum ego Babylonium potius adhiberem, ubi paradisum fuisse existimant Rauleigibus aliisque, essetque hoc in meridiano Uranoburgico hor. 9. 9'. A. Solis motus tunc erat Σ 1. 30' 0" 0" motusque igitur ejus paulo tardior Kepleriano. Quod et observatis consentit.

Albategnius observavit Solis altitudinem in aestate 77° 34', vera erat 77° 34' 33"; in hyeme 30° 24', vera 30° 24' 53", differentia observata 47° 10', vera 47° 9' 20". Ergo obliquitas 23° 35', vera 23° 34' 40" et altitudo aequinoctialis 53° 59', vera 53° 59' 33". Albategnius habet 54° 0'. Observavit ille aequinoctium autumnale hor. 13. 24'. Sic Lansbergius praecipit. 6. Sed quoniam neglecta erat parallaxis 36" et assumpta aequatoris altitudo nimia minutis secundis 27", erat verum aequinoctium h. 14. 28' apparenter, exacte 14. 41'. Kepleri tabulae habent 15. 28' exacte, ut et mea correctio prior. Qui error est nonnisi secundorum 47' in observata Solis altitudine, sed et hanc differentiam tollit mea correctio horae creationis. Atque de Sole haec tenus. Solummodo optassem in creatione motum verum Solis fuisse in Σ , vel anomaliam excentricitatis gr. 90, ut in media fuisset distantia sua, sicut reliqui planetarum; quod aliunde forsitan obtinebitur.

2. Saturnum quod spectat, observata mea omnia consentiunt, aphelium ejus circa hoc tempus iusto minus esse. Sic corrigo: A. C. 1600 completo ab aequali motu subtraho 0° 4', aphelium addo 2° 0'. In creatione aphelium in Δ 0. 0' 0'. Excentricitas vera est.

3. Jupiter mihi creat molestiam. Observationes nostrae omnes suadent, retentis ceteris, aphelio ejus addendum 3° 0'. Huic consentiant quarta et sexta in thesauro Lansbergii, sed quintae ejus addendum vult solummodo 1° 30'. Observatio Copernici 1520. subtrahendum 2° 0'. Tertia Lansbergii, subtrahendum 33' circiter ab aequali motu. Kepleri observatio Martis et Jovis 1591 (in Lansbergii thesauro p. 170), subtrahendum ab aphelio 1. 0'. Ex quibus omnibus colligi videtur, tum aphelium tum aequalem motum notabiliter celerius fieri quam vult Keplerus. Adeoque in creatione fuisse Jovem in Σ 0. 0' 0'; aphelium Σ 0. 0' 0', quod et commodissimum videtur et observationibus magis consonum. Sed nihil statuo, donec et veterum observationes examinavero.

Observationes suas 1635. Dec. 2. et 17., et 1636. Jan. 25. et Febr. 25. Jovem promotiorem faciunt quam Keplerus minutis 14' vel 15', illa Martii 8. non-

nisi 10'. Correctio mea, quae aphelio addit gr. 3, dat omnibus 12', quod intermedium est.

4. Quod ad Martem spectat, A. C. 1594 completo ab aequali motu subtraho 1' 20", ab aphelio 0 1/2'. Excentricitatem facio 9282 (Keplerus habet 9265). In creatione aphellum Martis esset in V 0. 0' 0"; adeoque in annis 5568 motus aphelli excedit Keplerianum 45° 0' 30".

5. Obliquitatem ab Albategnio ad nos, annis 800, devenisse tantum 4' 10", atque a Ptolemaeo ad Albategnium 16' 40", annis 660, mirum videtur et improbabile. Lansbergius addit 3' Albategnio, quam vere, ipse viderit. Sunt qui in refractionem causam conieciunt, quae quidem in observationibus in ortu Solis factis aliquid praestaret, sed in meridianis minus. Andax ego forte nimis videbor, si coniecero aequinoctialem minutis 9' altiore fuisse quam ipsi putaverint. Hoc autem si dicatur, tum hic medelam adhibebit, tum et mutationem excentricitatis Solaris sanabit; quam ego minime induci possum ut eradam, tam insigniter decrevisse annis a Ptolemaeo ad Albategnium 660, ab Albategnio autem ad nos annis 800 eandem plane mansisse. Ea si conjectura concedatur, erit excentricitas Hipparchi temporibus eadem quae nunc est; obliquitas 23° 42' 20", quod cum Albategnii, Tychois et aliorum omnium observationibus accuratissime consentit, etiam in minutis secundis. Essetque in creatione obliquitas 24° 17' 40" (vide Kepl. Epit. Astron. p. 917 et 337 [272 et 523]) critique obliquitas maxima 25° 14' 10", media 24° 17' 40", minima 23° 21' 10" (quae contingit A. C. 4877), jam vero 1637 esset 23° 30' 15". Motus obliquitatis diurnus 6" exacte, et in creatione f. 30. 0' 0". Si haec variatio obliquitatis per librationem fiat, nulla erit inde prostaphaeresis aequinoctiorum; sed si per motum nodorum Terrae, ut in aliis planetis fit, maxima prostaphaeresis in creatione esset 2. 5' 7", subtrahenda. Atque hinc porro, si concedatur, sequetur Solem fuisse in media distantia in ipsa creatione. Verum de his maturius adhuc considerandum erit.

Existimat Keplerus, irregulares esse inaequalitates in stellarum motibus ob casus physicos incertos librumque pollicetur, quo illud sit demonstraturus. Hoc si verum sit, quid tandem fiet? Certe Jovis motus me quasi inclinant in illam sententiam; nisi dicamus errores in observando admissos esse. Vide Tab. Rudolph. praefat. pag. 7, 34, 118.

Keplerus ait tab. 34, physicam aequationem nimiam esse parte quarta, seu 5' temporis. Annon hoc evenire potest ob maximam Solis prostaphaeresin assumptam nimiam minutia 2', hoc est min. 4' temporis in Luna: vel etiam (quod ego potius putaverim) ob tardiorum Terrae revolutionem circa propriam axem, quae et tantillam in Lunae motu tarditatem inferat?

Ex epistola d. 1. Inlti: De Sole, Saturno, Jove et Marte jam diximus; Lunam proxime aggressus sum, quae mihi maximam facessit molestiam. Eclipsibus a Lansbergio memoratis alias adjunxi 21, ex Alstedii Chronologia, Uraniburgi a Tychoe observatas, vel ad illum saltem meridianum reductas: quibus et tunc etiam addo.

Verum si accurate fuerint illae observatae omnes, impossibile est ut illa temporis aequatione adhuc cognita concilietur, sine aliqua inaequalitate praeter eam, quam Kepleri exhibet hypothesis. Qualem nam quidem satis probabilem excogitavi, quam mox exponam. Interim accurate omnes fuisse observatas, nentiquam existimare possum, sed in nonnullis observatoris indigentia aliquid erratum esse. Quod quamvis ~~expositum~~ videatur et ignorantiae asylum, multa tamen sunt, quae non levem hujus suspicientem inducunt.

Primo quidem, quia in eadem ipsa eclipsi a variis observata nonnunquam semihorae differentiam invenimus, aut etiam majorem.

Vix ullam invenies eclipsin, duobus in locis observatam, quin notabilis reperitur differentia, per differentiam meridianorum non excusabilis.

Secundum hujus rationem existimo, diversorum oculorum iudicium diversum de principio et fine (praesertim totalis obscuracionis) eodem loco. Tertia est, ob refractionem, radiorum Solarium in aëre nostro, quae quidem multo major esse potest in

principio quam in fine eclipses, vel contra. Vide Kepl. Astron. Opt. p. 271 et 279. et Astron. Cop. p. 870. (II. 299. 804. et supra p. 502.)

Præterea quis novit, qua via observatores tempus investigaverint? an per stellas? per quas stellas? et quomodo? num principium et finem utrumque observaverint? an observato altero alterum calculo fidentes nimium inde collegerint? Optarem itaque, ut qui eclipsium scribunt observationes (sed et qui alias), totius processus seriem describerent, quod Keplerus et Tu facitis. Vellem etiam ut tempus item notetur cum cornua stellam aliquam directe respiciunt, Lunæque lude distantiam, cornuum inclinationem, et per quas Lunæ maculas incidit umbra aliaque hujusmodi: quando enim plura accidentia observantur, idque variis modis, consensu mutuo confirmantur.

His præmissis, post dolorem aliquem de observationum invicem dissensu, sperans nihilominus propter hanc incertitudinem observationum fieri posse, ut non sit necesse ad Kepleri intensionem et remissionem motuum coelestium extraordinarium confugere, arithmeticam in coenam advocavi, et retenta hypothesis Kepleriana meoque Solis calculo potiores seligebam, quasque magis fide dignas existimabam, experturus an ad consensum revocari possent. Quod præstiti haecenus, ut ut votis minus sit, spe tamen majus: sed imperfectum adhuc est, multaque adhuc animo indigesta manent.

Saltem unicum, quod ad maturitatem propius accedit, hic insinabo. Inveniam, partem aliquam physicae æquationis temporis posse ipsis Lunæ motibus compensari; verum rationi consentaneum jam videtur, ut tota sic compensaretur, quoniam Luna etiam totum suum motum a Terra recipit, vel, si a Sole aliquam, Sol tamen nunc accedit nunc recedit pro accessu recessuque Terræ. Videtur item rationi congruum, ut Terræ vis attractiva et repulsiva debilius sit in sphæra suo quam in perihelio (quoniam ipsa est a Sole remotior) atque binæ Lunæ excentricitas æstate minor quam in hieme. Haec duo videntur plerisque ex his observationibus, quas ut fide digniores elegeram, convenire (viginti circiter ex illis) et tuarum primæ et ultimæ.

Ut hæc autem recte se habeant, subtrahendum erit ab æquali motu Lunæ 5', ab apogæo gr. 1. 0', et reducendus erit Solis locus (non Lunæ) ad orbem Lunæ, nam hic medius est (vide Rudolph. præf. pag. 99). Denique in æstate facienda est maxima orbis prosthaphæresis minutis 5' minor, hieme totidem major, quam gr. 5. 0' 0'', quæ mediarum distantiarum Terræ convenit. Rationem hujus quantitatis nescio, nec etiam certitudinem. Videntur eclipses aliquæ postulare, ut tum æstate tum hieme minor sit, maxima autem vere et autumno; quod et in æstibus marinis videre est, quæ a Luna dependent; sed prior conjectura videtur potior.

Ex Epistola Jan. 19. 1638. Ubi ego Te post mensem unum aut alterum videro (quod futurum spero), videbis Anti-Lansbergianum meum, supputationes item meas et correctiones Tabularum Kepleri: quæ omnia prolixiora sunt quam ut epistola: ex tempore, ut plurimum, scripta) includerentur; et simul novam meam philosophiam deducendi ovalem motuum figuram ex principiis naturalibus. Interim studiorum meorum summam in restituendis motibus verumque calculum eliciendo hanc accipe.

Solis æqualem motum Keplerianum retineo. Quamvis enim putaverim antehac subtrahenda esse 2', quum tamen hoc sit vix observabile, visum est potius immutatum relinquere, quoniam, utcumque sit, eandem tamen a fixis distantiam habet, quam post Tyebonis observata statuit Keplerus. Excentricitatem facio 1730, adeoque maximam prosthaphæresin 1° 59' (Keplerus habet 2° 4'), idque ob has causas facio. Primum, observavit Tycho excentricitatem 1793, unde prosthaphæresis maxima esset 2° 3' 18". Sed quoniam assensit ille parallaxin Solis in altitudine æquinoctialis I'rauburgi (quo tempore maxima est Solis prosthaphæresis) 2' 30'', quam ego cum Keplero facio tantum 50'', esset propterea prosthaphæresis maxima nonnisi 1° 59' 10''. Et Edwardus Wright invenit etiam minutis secundis 10'' minorem quam Tycho. Secundo, observationes Martis, quas tu mihi misisti, mihi in contrarium suadent, sed confirmant potius. Tertio, observationes quas habeo Veneris, huic id conspirant omnes. Quarta eclipses Lunares huic potius favent. Quinto, Keplerus ex speculationibus suis har-

mensis colligit 1730 (quanquam fateor illas in reliquis planetis non præcise obtinere). Denique Lunae a Terra distantia maxima, secundum Kepleri speculationes (Astron. Cop. p. 481 [327]) aequat præcise excentricitatem Terræ.

A Lunæ apogeo subtrahit 40', sumoque semissem physicae æquationis temporis, quod accurate convenit cum eclipsibus illis omnibus, quibus fidere ausim; raro dissentiens ultra min. 2' vel 3' temporis. Cui nonnisi semissem physicae æquationis assumerem, fateor me nullam habere causam; nisi quod post innumera propemodum inventa, iterata tentamina et supputationes, lassatam patientiam et irritos labores nihil invenio, quod æque ac hoc congruet observatis; adeoque ceteris recensendis, ut erronæis, supersedeo. Hoc saltem reperio quacunque incedam via, sive Tycheonica sive Astronomica utar æquatione, sive commento quovis alio, semper subtrahendum erit ab apogæo quasi 40'. Hoc idem Solaribus eclipsibus, quas examinavi, omnibus satisfacet. Quod ad Kepleri æquationem menstruam spectat, paucas admodum observationes scio, quæ hac indigeant. Quod ad Lunæ locum alicubi quam in eclipsibus spectat, nihil adhuc præstiti. Supputari quidem observationes aliquot, sed errorem valde notabilem in Kepleri Tabulis non reperio.

Saturni aphelio addo 1° 0', æquali motui 2'. Differt quidem hoc a Lansbergii observato 1593, sed experti novimus, quæ fide dignus est ille. Eademque observatio facit nodum boreum in majore longitudine gradibus 4, quam habet Keplerus; quum interim ex observatis nostris potius existimo minuendam esse Keplerianam longitudinem: de hoc autem nihil definio, ut saltem augenda non erit.

Aphelio Jovis addo 2° 15', ab æquali motu aufero 3'. Maxima prostaphæreus excentri major est min. 5½, quam Kepleriana, hoc est una sexagesima parte. Adeoque excentricitas est 4895. Hoc facit Jovis locum Kepleriano promatorem minutis 7' in præterito Decembri et min. 12' aut 13' in Martio. Quæ ab observatis non multum differunt. Aequalis motus Jovis est notabiliter velocior quam apud Keplerum adeoque in creatione fuit sexagen. 4. 30°.

Ab aphelio Martis aufero 10'; maximam prostaphæresin excentrici augeo minutis 2, adeo ut excentricitas sit 9292. Hoc scilicet pro præsentis anno 1637; sed anno 1688 æqualis motus mutandus non est.

Ab æquali motu Veneris subtraham min. 15'. Hoc omnes observationes postulant. Hinc Veneris locus in medio Decembris præteriti sit Kepleriano minor minutis quasi 6, et minutis 5 in principio Januarii.

Vol. XX. mss. Pulkoviensium præcepta et tabulas Rudolphinas magna ex parte manu Kepleri scriptas continet. Ex hoc volumine ea quæ sequuntur desumimus.

Æstimatio tabularum, si in folio majore eae imprimantur.

Olympias complectetur facies	3	Canon æquationum ☉	3
Ascensiones rectæ	5	Epochæ Saturni, aphelii et ☉ cum motu	
Æquatio dierum	3	mensurio, diurno et horario	1
Ergo jungatur ea Olympiadi et per-		Ad singulos sæculi, sæcula et 6000	1
miscetur cum illa, si commode		Æquationum	3
poterit		Latitudinum et stationum	1
Argumenti obliquitatis eclipticæ	1	Jovis	6
Motus argumenti et reductionis et cor-		Martis	6
rectio Orb.	1	Veneris	6
Epochæ ☉, dierum etiam 31 et bora-		Mercurii	6
rum totarum et 12 mensium	1	Heptacosas logarithmorum	8
Canon 6 motuum ☉ ab æquinoctio, apo-		Canon logarithmorum	9
gæi ab æquinoctio et fixarum ab		Tabula anguli	3
æquinotio	1	Mesologarithmorum latitudinis	1

Lunae epochae, apogaei, ☉, cum mens., diurno	1	Subsidiarium ☉, epochae et motus ad 100, et ad secula et ad 6000 . . .	1
Ad singulos seculi, secula, 6000 . . .	1	Diurnorum ☉, et tabella dierum, mensium	2
Canon sexag. motuum ☽, apogaei, ☉, ☽ a ☉ cum horario motuum	1	Subsidiarium ☽, epochae, ap. ☽ et ho. et ad secula et ad 6000 . . .	t
Aequationum, solutae, anomaliae . . .	3	Motus periodorum in annis 100 sing., ap. ☽ anticipanti et ad latus etc. . .	2
menstruae et si potest variationis	2	Cum revol. XVII. et Syzygiis XIII $\frac{1}{2}$ et notatione mensis pro syzygiis . .	t
Reductionis logarithmorum	1	Diurni et horarii ficti et nodi veri . .	1
Aequationis innominis	12	Parallaxium secundarum, horarii lat. eclipt.	1
Latit. ☽ simplicis cum reductione . .	1	Antilogarithmorum	1
Inclinationis, prostaph. nodi et aequationis menstruae	1	Asc. obliq. ang. or. pro 90	45
Typus aurei cum tabula annorum . . .	1	Reductionis tempus ad sexagenas et anni Aegyptii	1
Obtinationis cum tabula annorum . . .	1		152

Sunt igitur paginae 38 numerorum confertissimae, sed possunt abjici 45, 5 et 3. Necdum adsunt fixae et loca, necdum Tyconica. At Prutenicae habent folia 155 numerorum, ubi folia 4 dant paginam, sicut hic facies 4. Est igitur moles eadem, sed mihi dimidio tenuior, quia folii forma. Paginae 70, exempla 1000, ballae 14. Quinae enim absumunt ballas singulas.

Tabula angulorum orientis ob prolixitatem difficultates parit maximas. Si excenderetur ut in Epitoma, cum ortu ☉, 6 paginae singulas columellas facerent: ita aeries 90 dant 540. Jam 4 dant columnam in folio, ita 135 columnae foliariae essent, 68 folia, 34 paginae. Absit.

Sed extrito ortu ☉ et marginibus communibus constitutis, coeunt in 1 columnam typographicam non tantum 2, sed 4 altitudines poli laxae, et 5 arcte. Hoc pacto sunt paginae 17 aut 14. Altitudo folii mei capit 2 signa laxae, sed $2\frac{1}{2}$ arcte. Ita pro 6 fierent 5, paginae 14 vel 11. Adhuc gravamur. Quid si non singulos gradus exprimamus eclipticae, sed ternos, tunc in una columna lineae 64 absumunt 6 signa, et quinae altitudines poli in latum facient 18 columnas, 9 folia, $4\frac{1}{2}$ paginas.

Extritis vero asc. obliquis et manente solo angulo orientis, coeunt in latitudinem faciei altitudines poli 15 laxae et commode, 17 arcte et incommode. Ergo signa 2 occupant facies 6, signa 6, facies 18, paginas $4\frac{1}{2}$. Sed hic longe commodius imus per ternos eclipticae gradus, quam si asc. obliquis inserimus.

Ex praecepto patet, si maxime asc. obliquae imprimerentur, non fore tamen conserendas cum angulo orientis, quia non semper idem gradus, qui dat altitudines nonagesimi, dat etiam asc. obliquam, sed interdum gradus oppositis quaerendus in linea longe alia. Praestat igitur, ablegare computistam aliorum vel ad praeceptum computandi. • •

Canon logarithmorum et antilogarithmorum ad singula scrupula semicirculi.

Quia logarithmi ultimorum duorum graduum hic notationem habent vel nul-
(95°. 96.) lam vel non satis accuratam, quaerantur ii, si opus est, inter an-
(5. 6.) tilogarithmos complementorum; ut 89° 50' log. ex canone est 0, at complementi 0. 10° antilog. in tabella sua exhibetur accuratius 0, 423.

Solcher Spalte, wie hier deren 6 zu sehen, müssen 90 werden, doch die

Seitenspälte nemen algemach ab, also dass da der erste fünff Ziffer gehabt, so hält je der ander nur 4, der dritte, vierte, fünfte, sechste etc. nur 3, vom 17. an bleiben der Ziffer nur zwo, biss zu dem 69; von dem 70. an biss auff den letzten bleibt nur 1, vnd der Spalt würt algemach lührer, dass schier gar nichts in Seitenspalt khompt. Ohne diese Seitenspält wären wir mit 9 Columnen anskommen. Müchten Irer also 11 oder 12 werden, oder 13 columnae. Weil die Incrementa von dem 18. Spalt an abnemen, also können sie vberzwer gesetzt werden, dass der Seitenspalt nur 1 Ziffer dick wird. Gewetzt nu, die hie gesetzten Spälte seien die rechte Bräitte zu einer Columnne: wan Ich aber von dem ersten 4 Ziffern nimm, von dem andern 3, von dem dritten, vierten, fünften, sechsten überall zwo, das seind 15 Ziffern, die geben gerad 2 Spält.

Heptacosias Logarithmorum Logisticorum, et circuli sen-
quadrantis arcuum respondentium.

Mittel Versal	Mittel Antiqua	Garemond Capital	Garemond Antiqua	Garemond Cursiv	Cursiv
------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------

Hic in Garemond antiqua occurrit litera 1 18^{tes}, in Cursiva 8^{tes}, quadruplica pro una forma, sicut 52 et 32; pro 2 formis 104 et 64. Ergo si prioris alphabeti literam numerosissimam omnium acutinem 200, posterioris 100, ceteras literas in harum proportionem, nota fusioribus, expediam titulos columellarum.

Litterae.

A, AR, B Z, a, aa, b x, y, z

Ultimis 9 notis in cursiva non est opus.

Wen ich den vierten Theil dessen auss den zwaien Mitteln vnd widerum den vierten Theil auss dem zwaiten Tertian halte, doch mit Ausslassung der 4 letzten Noten, vnd wären die Mittel auff Tertian-Kegel gegossen, so khönt Ich auff die völlige Titel Columnen gevolgen.

Mittel nit auff Bibel-Kegel, sondern auff sein eignen. Zu der Garemond meines Kegels bedarff Ich khain Spatia vnd Quadrätlein. Aber zu der Bibel vnd Median würt villeicht zu Ausfüllung der Linien etwas von nöthen sein, wann es die Spähne nit thun.

Wie die Spälte in Canone Log. einzutheilen.

A gr.	0 ad 21 inclusive sunt cyphas in logarithmo	6 summa	132
22 — 64	" " " " " "	5 "	215
65 — 81	" " " " " "	4 "	68
82 — 87	" " " " " "	3 "	18
88 — 89	" " " " " "	2 "	4

Summa cypharum 437.

Jam sunt 90 columellae, cuilibet euss duae lineae, quas junctas implent spatium crassitie cyphar; inter eas inseri debet cypha tendens deorsum; sunt ergo cyphae 180 crassities. Sed 3 crassities faciunt 5 corpora, ergo 180 faciunt corpora 300

Summa corporum in areis, exceptis 2 limbis 787

Si haec abire debeat in columnas typographicas 8, venient areae 92 cum 2 lim-
bibus bis

Sed si sint tantum singulae columellae lineae, itaque tantum 90, 75
dantes crassities 45, erunt eas corpora

Summa corporum in areis 8 512

Pars octava 64, telescopicissima

Addantur vero 18 primis columnis sua spatia, quae possunt
adhuc 27 crassities et corpora 45.

In universum igitur 70 corpora metiuntur latitudinem ereae, vel 71.

Des Triterus A zwölfta Columnae. (Tab. p. 11.)

79° 31' 29"	59' 0	1680. 70	23° 36' 0"	61' 4"
h. h		28. 28		
79. 36. 55	59. 1	1652. 44	36. 24	61 0
.	2	.	.	60. 59.
.	3	.	.	.
.
.
84. 46. 6	59. 45	417. 53	28. 54. 0	60. 15

Diese 12te Columna
ist nit sonderlich nötig,
hat auch khain sonder-
ganzen Nutzen. Dan ob
sie wol handsem in metn
Solts a 59' in 61' 1", so
raicht sie doch nit auff
den ganzen diurnum a
57' 3" in 61' 18". Hin-
gegen macht sie ein
Schein, als wolte man

die arcus accurate geben, das doch nit ist. Item so möcht sie ein vnerfahrenen irren, weil
sie nit ist, wie die andern 10.

Weil sie dson auch die Ausrechnung irret, dass von irwegen beide tabulae, log.
sem. vnd Anguli am Schöndruckh anfehen müssen, so verleihe sie ger. Damit hehen
alle drey tabulae am Afterdruckh an und gehen am Schöndruckh aus.

Ruminatio von Ausstahlung der 8 Columnen Canonis. Die 1. helt 7 columnas,
die seind gerechnet zu Nebenspalten, 7 in 6 thut 42. Der 1. Nebenspalt hält 4, der
ander 3, der dritt auch 3, die übrige alle haben 2, vnd nemen ab im 4ten von 91
70, mögen also noch 1 Spalt geben; dergleichen von 70 in 51, also von 51 in 50.
Willeus jetzo in Correctione dabey bewenden lassen. Queritur, wie brakt? 6. 6 = 36,
adde 4, 3, 2, 2, 2, summa 16 addatur, sunt 52 et 2 margines, sunt 56. Et lineae
15 dant cyphas 25; summa 81.

Incipiat ergo columna 2 a gradu 6, et eum decrements cant a 46 in 39 . . . ,
non igitur amplius operae pretium erit, facere laterales columellas, sed superponantur.
Hinc facile ratio hatur summae cum columnis 7. Nam 6 cyphae durant adhuc per
16 columellas, summa 96; 5 cyphae per 43, summa 215; tunc 17 habent 4, summa
68; reliquae 9 habent 3, sed praestat, etiam ipsis relinquere spatium ad 4, summa 36.
Summa summarum 406. Lineae debentur ipsis 85; 425 valent 141½ cyphas, summa
547½ cyphae prn arcis, portio septima 78; adde 2 limbos, erunt 82. et 2 lineae,
summa 85½. Ergo singulis debent impleri 78 circiter. Vide, quomodo hoc fieri
possit. Si secundae columnae dent 10, erunt cyphae 60, lineae 3, quae valent 18½;
summa 78½. Beue habet secunda.

In tertia supersunt 6 cyphrarum 6, summa 36 et 2 lineae, quae valent 11½,
summa 47½, adde quinque 5 cyphrarum, summa 25 et 5 lineae, quae valent 8½, summa
33½, adde ad 47½, habes 81, haec erit 3 cyphis latior modulo praestituto.

In quarta, si sunt 12 gradus, habent 60 cyphas et 13 lineas, quae valent 21½.
Haec fere 4 cyphis erit latior justo. Harum erunt 3; sunt 4, quia singulae paulo
latiores modulo, facile igitur 10 cyphrarum spatia de suo largiuntur. Restant 15 gra-
dus pro octava; si aufero 16 lineas a modulo 81½?

Quae desiderantur in Tabula Rudolphina. Complenda tab. aequationis
menstruae ☉. Praeceptum ortus ☉ absolendum et describendum. Praecep-
tum de computanda longitudine fixae non habet exemplum. Praecepta de la-
titudine fixae deque obliquitate eclipticae et praecesa, aequinoctiorum memi-
nerunt plurium numerorum in fronte canonis. At cautio ad praecceptum de
usu canonis praesupponit, frontes et calces esse simplices.

Calculus eclipticum ☉ a Nabouassar ad Ptolemaeum in mundum ex-
scribatur.

In dies revolutionis ☉ et horas inſere etiam motum nodi, qui jam eſt in averſa facie paginae.

Nota. Heptaeſiadiſ ſexagenaria dextra fit neceſſaria propter parallaxes ☉, quae uſque ad 64 fere continuantur: eur ergo non etiam propter diurnum ☉ 61' 20", et in univerſum propter intercolumnia uſque ad 1° 34," id eſt uſque ad 38' 20" ſiniſtrae? Ergo etiam praecepta coſſica ſunt neceſſaria; ſed primo regulae memorativae, poſtea particulares 10, nam mēmorativae nondum ſufficieunt. Forte praestat occultare coſſam, ut in praecepto de aequatione ☉ menſtrua, et in praecepto de anomalia coaeq. Sed tamen etiam in obliq. eclipticae et anomalia aequinoctiorum fit mentio, et in praecepto de intervallo planetarum.

Cura de Catalogo fixarum.

Reliqua ſunt obliterata, v. c.: An logarithmi ſint imprimendi non ut complementa reſpondeant, ſed continue ad gradus a 0 in 90 in fronte, dein

180 270

ordine ſerupula in ſiniſtro margine a 0 in 30 in ſiniſtra pagina, a 30 in 60 in dextra pagina, ſiniſtro tamen et hic margine. Accederent eaſes et dextri margines ſurgentes in pagina dextra a 0 in 30, in ſiniſtra a 30 in 60. Calceſ a dextris ad ſiniſtros haberent gradus a 90 in 180 et a 270 in 360.

Hoc pacto ſpargeretur canon logarithmorum in tria, ipſi logarithmi adaeſſent omnes, antilogarithmorum pars eſſet in eclipticis tabulis, meſologarithmorum in latitudinaris. Conſidera praecepta obliq. eclipticae. Sic nescio, quis prodiit ſinus.

Praemitte et canoni et heptaeſiadi praeceptum de proportionē datorum laterum, quia allegatur id in praecepto penultimi, ſed tunc corrige praeceptum quaerendi ſtationes, quod praeceptum ſequens appellat ſecundum, erit tertium.

Lateralis meſologarithmorum in planetis.

Uſus anguli orientis in computanda aſc. obliqua ſtellae, cujus dātur latitudo. Ut angulus oriens ad lat., ita compl. ad diff. long. Logarithmum anguli aufer a log. compl., reſiduum adde ad log. latitudinis, hoc eſt meſologarithmum ang. or. adde coſſicae. Sed non expedit meminisse meſologarithmi, ne ejus ſignorum diverſitas confuſionem pariat.

Nota, quod canone meſolog. in tabulis non ſit opus, cum habeamus meſologarithmos naſque ad 6° 54' in ☿. At in ♀ iſis opus erit pro lat. 9° et 10°. Ergo pars meſologarithmorum addatur.

Et poſſet fieri tabula inclinationum et latitudinum communis, naſque ad 10°. In prima columna ſerupula, in fronte gradus, in ſecunda meſologarithmi, in reliquis argumenta latitudinis 5 planetarum.

Cum igitur habeamus jam quinque 90 lineas, eaſe ſunt 450 inclinationes et 450 meſologarithmi, needum ſufficiunt. At in tali tabula haberentur 600 logarithmi totidemque inclinationes exactiores. Nota tamen, enilibet planetae erit adjungenda ſua reductio et ſua eurtatio; ergo ſient 17 columnae praetereaſque argumenta erunt ſerupuloſa. (Praestat forte, reliquere 5 latitudinum tabulas et addere hanc ſextam ſine reductione et eurtatione.) Sed poſſunt omitti ſecunda, cum jam in inclinationibus ſint prima et ſecunda. Poſſumus etiam rotundis uti meſologarithmis. Imo hoc non conſultum, ſufficit in praecepto moneri calculatorem.

In omnibus 5 continuantur argumenta uſque ad 1° 20', tunc deſinit Jovium; amplius in 1° 51' deſinit Martium, et in 2. 32 Saturnum, in 3. 22

Venerium, in 6. 54 Mercuriale. Tuuc in uno folio fiont multae frontes, usque in 9. 32, vel ornatus causa continguntur in 10° 0.

Regula perpetua pro argumento: Ut inclin. limitis ad 90, sic inelin. 1 ad argumentum.

Tabula argumentorum latitudinis et mesologarithmorum.

84257	h	24	♂	♀	♂
	0. 23	2. 58.	0. 31	0. 17	0. 8

Aliud consilium Noribergae 11. Aug. 1625.

Tabularum fiant duae partes, numero foliorum perpetuo, ut tamen dislocari ligando possint. Una pars habeat tabulas planetarum singularium cum praeceptis totalibus initio singularum tabularum interspersis; altera habeat generalia; puta: 1) Heptacosia, 2) canonem logarithmorum solitariorum, 3) tabulam anguli, 4) tab. tangentium, 5) partem mesologarithmorum usque ad 10, pro latitudinibus planetarum, ubi tamen relinquiendi mesologarithmi inclinationis singulis planetis in parte prima. 6) Partem antilogarithmorum pro eclipisibus, sc. scrupulis disci, umbrae, penumbrae, diametrorum visibilibus, limitis, usque ad 1. 36. Ad singulos brevis instructio. 7) Asc. rectas et decl. et angulum eclipticae cum meridiano. 8) Asc. obliquas omnes cum angulo orientis et quantitate diei. 9) Inclin. eclipticae in azimuth. 10) Altitudinem et Asc. ☉ ad horas Pragmae. (His adscriptum: transcripta haec in aliud folium.)

TABULAE RUDOLPHINAE,

Quibus astronomicae scientiae, temporum longinquitate collapsae,
restauratio continetur;

A PHOENICE ILLO ASTRONOMORUM

TYCHONE,

Ex illustri et generosa Braheorum in Regno Daniae familia oriundo equite,

Primum animo concepta et destinata anno Christi MDLXIV; exinde observationibus siderum accuratissimis, post annum praecipue MDLXXII, quo sidus in Cassiopeiae constellatione novum effulsit, serio affectata, variisque operibus, cum mechanicis, tum librariis, impenso patrimonio amplissimo, accedentibus etiam subsidiis Frederici II. Daniae Regis, regali magnificentia dignis, tracta per annos XXV potissimum in insula freti Sundici Huenae et arce Uraniburgo, in hos usus a fundamentis exstructa, tandem traducta in Germaniam inque anam et nomen Rudolphi Imp. anno MDIIC.

Tabulas ipsas, jam et nuncupatas et affectas, sed morte auctoris sui anno
MDCI. desertas, *

Jussu et Stipendiis Fretus Trium Imperatorum

RUDOLPHI, MATTHIAE, FERDINANDI,

assistentibus haeredibus Braheanis, ex fundamentis observationum relictarum, ad exemplum fere partium jam exstructarum, continuis multorum annorum speculationibus et computationibus primum Pragae Bohemorum continuavit, deinde Lincii, superioris Austriae Metropoli, subsidiis etiam III. Provincialium adjutus, perfectit, absolvit adque causarum et calculi perennis formam traduxit

JOANNES KEPLERUS,

Tychoni primum a Rudolpho II. Imp. adjunctus calculi minister,
indeque trium ordine Imperatorum Mathematicus:

Qui idem de speciali mandato Ferdinandi II. Imp. petentibus instantibusque haeredibus opus hoc ad usus praesentium et posteritatis typis numericis propriis, ceteris et praeulo Jonae Santhii, Reip. Ulmanae Typographi, in publicum extulit et typographica operis Ulmae curator affuit.

Cum Privilegiis Imp. et Regum Rerumque publicarum, vivo Tychoni ejusque haeredibus et speciali Imperatorio ipsi Keplero concesso, ad Annos XXX.

Anno MDCXXVII.

D. FERDINANDO II.
ROMANORUM IMPERATORI SEMPER AUGUSTO,
GERMANIAE, HUNGARIAE, BOHEMIAE &c.
REGL.
ARCHIDUCI AUSTRIAE,
DOMINO DOMINO CLEMENTISSIMO.

Augustissime potentissime atque invictissime Imperator.

Cum ante annos 26 parens noster Tycho Brabe morte immatura nobis fuisset ereptus, quanquam nos illius haeredes, numero sex cum matre vidua, eramus afflictissimi: non aequè tamen pro salute nostra, ac pro studiis ab illo relictis, pro libris scilicet observationum coelestium, ab illo per annos 38 congestis, et pro inchoata superque illis fundata Tabularum Astronomicarum structura fuimus solliciti. Cum enim constaret nobis, propensionem ejus in studium astronomicum pro divino afflatu haberi a ceteris omnibus, qui artis aliquam habebant notitiam: non decere nos, ab illo prognatos, arbitrabamur, humiliter ceteris de genitore nostro sentire, non oculis reflexis ab hoc nobis relicto patrimonio, quod ipse maximi fecerat, ad opes vulgo celebratas, quas ille ut caducas et into sordidatas semper contemnerat, limis respicere; non, labores ejus summos et opera, in quae opes non vulgares totamque vitam impenderat, contemnere, negligere et abjicere; non denique publico literatorum desiderio deesse. Sed cum in nobis ad opera illa promovenda nihil esset opis, Imperator Rudolphus II. Celebratissimae memoriae, uti nocte erat ingenio artium omnium amantissimus, ita vota etiam nostra monitionesque respexit, nutantem Tabularum fortunam sustentavit, operi perficiendo curatores dedit et directorem quidem operis a nobis et nostrum omnium loco constituit Franciscum Gansneb dictum Tengnagel, sororinum nostrum; nunc vero, qui intra penates nostri parentis astronomicis ejus operibus annum jam alterum impendebat, Joannem Keplerum ingenio valentem inter antica sua ministeria recepit, stipendium assignavit. Verum Tengnagelinus non multo post inter consiliarios Caesaris adiecit, negotiis politicis legationibusque susceptis ab operis cura fuit abstractus. Keplerum vero, praeterquam quod solus

erat relictus, turbas insuper Imperatoris, per regna et provincias ortae bellaque intestina perniciosissima varie impediverunt. Itaque perfectio operis invitis nobis et meliora nequicquam optantibus de anno in annum protracta fuit. Nunc tandem aliquando, tabulis istis divino Numine ad finem perductis, postquam S^{ae} C^{ae} M^{us} V^{ae} voluntas Clementissima mandatumque, ut ederentur, intercessit: nos Tychonis Brahe haeredes opus hoc Tabularum Rudolphinarum, a parente nostro inchoatum et nuncupatum, ex parentis nostri observationibus (quas Keplerus ad manus suas bona fide recepit) exstructum eoque nomine nostrum S^{ae} C^{ae} M^{us}, qui Rudolphi quondam Imp. (a quo consentiente tabulae nomen suum hauserunt) in regnis et ditionibus Austriae haeres, in Imperio successore fuit, qui et maturationem operis imperatoria munificentia promovit et editionem imperavit, humillima cum veneratione offerimus: utque id felix faustumque sit, et literatis sub M^{us} V^{ae} Imperio aliorumque Magnatum ditionibus degentibus, totique adeo orbi ac posteritati, quo de nihil dubitamus, magnae cedat utilitati, ex corde sincero optamus; simulque nos, quibus hoc unicum a patre nostro superest patrimonium, M^{us} V^{ae} Clementiae et Benignitati, in qua ceterae spes nostrae recumbunt, humillima cum submissione commendamus.

S^{ae} C^{ae} M^{us} V^{ae}

Humillimi ac obsequentissimi

Tychonis Brahe Haeredes Liberi.

AD EUNDFM^{us}

IMP. AUGUSTIUM, DOMINUM.

Ego vero, Caesar sacratissima, dedicatione operis, in quo per annos 26 sudavi, jam M^{us} V^{ae} facta, etsi, veluti qui aliena vehitur navi, in idem necessario litus excensionem facere videor, ad quod puppis appulsi, privatas tamen habeo rationes, quibus motus, etiam mei solius fuisset electio, eundem tamen in portum vela mea fuerim directurus. Praecessores M^{us} V^{ae} sacratissimae memoriae, Rudolphum et Matthiam patronos habui; si ab his mihi demandatorum officii muniorum rationes, quas reddere non potui superstitionibus, reddo Successori, id, opinor, recte fit et ordine. Quid huius non debeo Illi, qui etiam stipendia vetera solvit, quae debebant Antecessores? Quid non Illi, sub cuius Imperio Tabulas istas, inde a Tychonis obitu imperfectas, pertexui, consummavi, perfeci? Quid non Illi, qui proposita mea haeredumque Tychonis de tabulis edendis rata habuit, anctoramento sanxit, qui desiderium suum editionis maturimae, Majestatis in comitatem temperata, percontando demonstravit, qui ut Imperatoria liberalitate numerarentur mihi summa in opus necessarii magnificentissime mandavit?

Nova sunt ista, vertat ad vetustiora primamque curarum et speculationum, quae de meo collatae sunt in tabulas istas, originem ab ipso repetam ovo.

Cum ante annos undetriginta Gratii Styriae, quae tunc Anla Ferdinandum Archiducem populis promittebat Imperatorem, muneris nescio quid offerrem astronomici (cfr. vol. II. § 22.); memini me, plenum fiducia de successu in hac facultate

(tantum poterat unus Mysterii Cosmographici recens tunc inventio!) illud unice abs Ser^{to} V^{ro} petere, uti mihi, observationes siderum fidas quaerenti, manus porrigeret auxiliares. Nondum tunc Tycho suas ad me missabat literas, nondum in Bohemiam ille ascenderat. Nimirum scusum aliquem fati jamjam imminenti prae se ferebant vota mea. Biennium non plenum fuit lapsum, cum Tychonis observationibus (quibus fide et subtilitate aulicae pares) cum Tychone ipso, profectus ad eum in Bohemiam, sum potitus. Votum hoc sub ipsa Ser^{is} V^{rae} gubernationis initia, tanquam sub ejus auspiciis, concepi, spes meas ob Sereuissimos ejus oculos adduxi, quin igitur et eventum scilicet, qui nunc tandem consecutus est, ejusdem conspectui sisterem dedicaremque, cum illum fatales istae morae, plane ad hoc usque tempus, quod Ferdinandum Archiducem ad rerum fastigia collocatum, Imperatoria Majestate coruscantem visurum esset, reservasse videantur?

Scilicet ignorabam, quo consilio fatorum arbiter et Dominus anno 1601 nobis summum artificem eripuisse currumque hunc coellivolum studiorum nostrorum, auriga et moderatore suo viduatum, inhibuisset. Immeritos ego praesides aulicae camerae, immeritos pensionum magistros, limis confixi oculis: per annos 1602, 1603 non nostris illi profectibus, sed operis nostri fatum ipsis impedimento fuit. Injuriam feci fortunae Brabeannorum haerendum, dum eam iucuso, quod nos desererat: majoribus illa succubuit numinibus. Erravi graviter, conjecta in orbitam nostram saxa, jaculante insuper habito, admordens, cum tumultuaretur Hungaria an. 1604, cum exercitus Caesariani e Transsylvania recedentes Austriam affligerent, quietem aulae Imperatoriae turbarent, anno 1605; cum pestis alicum coetum per oppida Bohemiae disperisset, anno 1607; cum Hungari Austriacis juncti exercitum duxissent in Bohemiam, anno 1608; cum turbae, religionis nomine motae, Pragam exterruiscent, anno 1609; cum Principum Imperii quorundam conventus haberetur Pragae, anno 1610; cum miles, Passaviensis dictus, hostiliter invasisset Pragam, anno 1611. Jamque etiam calamitates domesticae culpa libero, amissa tunc conjuge, communium liberorum matre, quorum cura discessum ex aula suadebat; frustra tunc quaesivi; cur decreta Rudolphi Imp. in me munificentissima, quibus Pragae retinebar, nullus consequeretur eventus? cur incassum et sumtus impenderem et tempus, pulsandis jam camerae Silesiacae, jam Imperialis aerarii foribus, interimque rebus humanis exempto patrono Augusto, anno 1612, injustis rursus onerari querellis de impedimento privato fortunam publicam: quippe sic erat in fatis, ut feriarentur operas astronomicae, adhuc e longinquo adventante Patrono suo. Quid igitur causatus sum deinceps, transitum eodem anno in Austriam, saepe quam negotiosum, cum liberis matre orbis, cum suppellectili libraria, sub novo Imperatore Matthia? quid discessum a libris observationum Braheanis? quid profectiones molestas et impendium temporis variandae illi rupturae? quid diuturnam domus orbitatem loco peregrino? Quid enim in remoris istis omnibus erat culpae, quod non universum in se recipiat, tua, Ferdinando Caesar, imminens successio, in quam scilicet differebat studiorum successum occultus astronomicae artis genius. Senserunt, opinor, speculationes ipsae viciniam Styriae, primae suae patriae, senserunt surgentem in ea, sub Ferdinandi spe imminenti, suam etiam fortunam prosperiorem sensuque hoc recreatae, primum atque Ratispona Lincium in comitatu Imperatoris sui reversus anno 1614, primum atque loco quies reddita discessu aulae domusque mihi composita, profecerunt per insequens biennium ad altam totius operis formam: denique iisdem gradibus, quibus Ferdinandus ad

regna et ditiones Austriacas, contenderunt ipsae ad suam perfectionem. Adeoque eum ipsum in annum, quo corona Bohemicae Tuis imposita temporibus, primam ego ex tabulis istis computatam Ephemerida, Pragae evocatus, attali visendumque exhibui et comprobata anno sequenti edidi, typis ad opus idoneis, aere et dictatu meo paratis, quibus iisdem nunc etiam Tabulae ipsae descriptae cum cultoribus artis communicantur.

Ignoscunt facile quercus hederis, uimi procerae vitibus imbecillibus, si istae Harum ad altitudinem admetiuntur suam: non major neque gratior, ne Deo quidem, venit cultus, quam ab homine, fortunas suas omnes ad ipsum referente. Atque ego quoque, comparisonem hanc audacem semel ingressus, ea constantia pergo, quam maximae venerationis opinio firmat. Pacem scilicet publicam tunc destinabas, opinor, populi sub tuo futuro imperio, sed pacem iudicio tuo, quem rerum arbitrum constituit Deus, conformem, pacem incommoda, quae repellenda censebas, carentem; pacem huiusmodi per totum jam decennium dira studiorum contentione defectionibusque et bellis intestinis luctuosissimis exercitus obtinere nondum potuisti. Et mihi quoque ex illo tempore continenter ad suum operis tabularum aspiranti subinde alius ex alio naevus operis detectus est, eluendusque aut excindendus fuit et cleatrix obducenda; vicissim aliud ex alio calculi solcunis compendium, aliud ex alio inventum paichrum lucidit, quod, nisi opere toto ad incudem revocato et transformato, consociari eum eo, committive aut excoli non potuit. Da veniam Caesar fortunae tuae, da conditioni studiorum istorum, quae, pacis ornamenta cum sint, pacem in imperio tuo exspectarunt baccatus. Nec alia fiducia ne nunc quidem in publicum exeunt, quamvis S^{ae} C^{ae} M^{ae} V^{ae} imperiis exolta, quam quod omen pacis jamjamque conficiendae sese gerere atque proferre confidunt. Quam persuasionem etsi nec rebus nec causis firmare queunt, quin eandem harum ignorantem, qua tenebantur hactenus, otiumnum fatentur ludentia, tamen et amant eam persuasionem in se ipsis, M^{ae} V^{ae} studio patriaeque miseratione fascinata, et ut vero conecutanem vel ex hujus ipsius comparationis institutae progressu commonefacta suspectant.

Etenim imperfectiones aliquas, deprehensas in ipso motuum coelestium subjecto, nec arte ulla humana praestabiles superabilesve (praesertim ante saeculorum venturorum experientiam sufficientem) et continent istae Tabulae et fatentur publice; Vestra vero Majestas, quid conditioni rerum mortalium condonare, quae obliqua et intersepta praetorire, ut compendio veniatur ad pacem, quantum severitatis Augusto suo muneri sufficere, quid denique successoribus corrigendum relinquere cogitet: ipsae, desiderio pacis tabescentes; in qua una usus sui laetis efflorescat incrementis, expectant sollicitissimae.

Deus, penes quem est principum populorumque summa potestas, per quem reges imperant, belli duces vincunt, Deus, qui scit instrumentis uti euis, quandoque etiam ignavis consiliorum sui motoris, est ubi et aliud agentibus, qui, extirpatis malis moribus, modum rebus et finem calamitatis solet imponere, Deus inquam iste Deorum, S^{ae} C^{ae} M^{ae} V^{ae} Vitam, Valentiam, Imperium proroget, tueatur, prosperet; Ejusdem Filio Regi Liberisque ceteris ad summa uatis, Vitaeque et Imperii consorti Augustae, totique adeo Domui Austriacae felicitatem omnimodam, qua mea meorumque continetur incoluntas, placeat et propitius largiatur: quem, ut id faxit ratumque velit, humillima prece veneror.

S^{ae} C^{ae} M^{ae} V^{ae} simplex oro, uti cum Tabulis istis Rudolphinis, quae illi offeruntur et dedicantur ab haeredibus Brahei, primi earum

inoccupatoris, meos etiam tot annorum labores in eas absolvendas et perficiendas impensas sereno vultu suscipiat, meoque humillimum clientulum cum meis Caesareo suo patrocinio clementissime dignetur.

Sac. Cas. Mus. Vae

Ad excolenda Mathemata condoctus servulus

Joannes Keplerus.

IN TABULAS RUDOLPHI PRAEFATIO.

Duas habet astrorum scientia partes: prior est de motibus, posterior, de effectibus siderum in natura sublunari, utramque veteres communi vocabulo astrologiam soliti sunt appellare. Cum vero iugens sit inter has partes discrimen causa certitudinis, nominibus etiam distinguere illas posterior usus obtinuit, ut doctrina de motibus astronomia potius nuncuparetur, quod leges motuum sicut immutabiles summaque ratione constant, altera vero pars, in conjecturis occupata, commune quondam astrologiae nomen sibi privatim haberet: quippe quae primum etiam locum in animis hominum, futuri providis, fecerit rerum coelestium contemplationibus. Nam ut in homine, praestantissimo totius universitatis opere, quippe domino omulm et imagine Dei creatoris, ortus principia sunt imbecillia, jocularia et, contracta jam labe, pene pudenda, humor exiguus et sanguis menstruus, locus in parte totius materni corporis villissima, cibus recens edito lac, opus aut somnus aut vagitus; vita sordes; amictus tricae; ex hac tamen veluti officina nobis prodeunt, qui urbes exstruunt, qui portus effodiunt, qui montes resciidunt, qui freta pontibus sternunt; prodeunt Priocelpe, Reges, Monarchae: sic illa coelestis machinae capax disciplina, concepta primum ex imaginatione horribilium Solis et Lunae defectuum, siderumque crinitorum, quas apparitiones tristissimi gentis humanae casus consequebantur; exinde formationis suae primordia ducens perquam tenuia et obscura, persuasionis de astris variisque constellationum figuris et cupiditatis futurorum, primum vim quandam veluti vitalem concepit, qua freta ex cogitationum latebris in lucem apertae professionis erupit palamque inter homines jactari coepit, tum deinde per somnia et iugas praedictionum genethliacarum educata paulatim adolevit, tandemque nucibus, ut ajunt, relictis, virili ausu per consueta meditationum coelestium exercitia multos ad usum vitae machinationesque admirabiles adque providentiam rerum necessariorum transivit, ad morum etiam emendationem, quin imo ad ipsius Dei creatoris cognitionem veluti per gradus aliquos magis atque magis enititur.

Veruntamen, ut in arborum fibris anni, sic in tota diviniissimae artis compositione lineamenta quaedam apparent ortus hujus, ut matrem et nutricem astrologiam abnegare non possit astronomia filia et alumna. Partes ejus praecipuae habentur observationes, hypotheses, mechanica, calculus seu tabulae, quae singulae in praedictiones feruntur. Observare docuit siderum positus cura futuri provida, ortumque Canis metus a Nili exundationibus. Hypotheses constituerunt artifices, ut, observatarum varietatum causas in aperto positas, jam non tantum annona ex astris, sed ipsa etiam astra ex hypothesis praevi-

deri possent essentque signa futurorum prius in mente, quam in mundo. In hunc usum suppeditavit arithmetica calculos et tabulas, bypothesum vim ex-primcentes, mechanica circulos, theorias, seiateria: ut qua parte mens defatigata succumberet, ibi vel manus opitulerentur essetque omnimodo via patens et complauata, quæ in positum siderum præsentem, præteritum vel futurum recta duceret, ut ejus intuitu scilicet nascentum fata pangi posset.

Verum enimvero partes istas artis, acceptas ab infantia sua, sane quam profunda et insipiente, succedens maturior exercitationis ætas suisque sublimior et luculpatas et approbavit omnes, et roboravit consolidavitque, ut porro non possit iis carere philosophia sideralis, Solemque e mundo sublatum eat, qui tabulas astronomicas e philosophia doctorumque pulpitis exulare jusserit.

Nam ut nihil dicam de vitæ quotidianæ necessitatibus deque artium, quæ iis inserviant, principis, ex astronomia et petitis et subinde reparanda perficiendisque, de ebronologia, de festorum supputatione, de agricultura, de medicina, de geographia, de re nautica: metaphysicam ipsam et theologiam intueamur. Si est, quod omnes philosophorum sectæ fatentur, omnes omnium ætatum theologi conelamant, omnes sancti divinitus inspirati effantur: si *coeli se. enarrant gloriam Dei, et opera manuum ejus annunciat firmamentum* (Psal. 19.), quanam id nostri parte deprehendimus evidentius, num oculis corporeis, an elevatione mentis? Oculos quidem nos literati cum iudoctis, quin imo cum bestilis homines communes habemus, quibus etsi admirabilem siderum varietatem et pulebritudinem communiter docti et iudocti contemur, at interiorum operis ornatum, revolutionum coelestium ordinem, constantiam et perpetuitatem nudis oculis non percipimus; mente hic opus est et memoria observationum præteritarum comparationeque præsentium, denique prædictione futurorum positum, ut si ea, quæ quovis tempore observata sunt, arte constituta repræsentemus, ea vero, quæ porro prædiximus, eodem modo viderimus evenire, de supremi motoris immutabili natura deque mundi gubernatione providentiasima, de rebus, inquam, in oculos non statim ineurentibus inque dubium passim vocentis plenissima persuasione confirmemur. Qui hic tabulas astronomicas, memoriæ subsidium, studiosis eripuerit, is oculos hominibus caecos, observationes siderum brutas nihilque dignum homine doceentes præstiterit; is genus humanum longa sæculorum successione maximis artificum laboribus institutum de rebus præstantissimis edoctumque rursum ad ineunabula pristinae redegerit ignorantia.

Sed perstitit eadem astronomiæ distinctorum finium consociatio, quæ primam ei dedit originem, perstitit, inquam, etiam in perfectione artis, restituitque disciplina, jam per sublimia gradiens, juvenam pueritiæ suæ memoriæ, ut divinandi studium, quod primum tabulas dictaverat, eandem etiam successu sæculorum emendandas admoneret. Nam ut ailib jam dicam de Chaldaeorum institutis, longinquitate temporis obsoletis, ut eorum vix tenuis ad nos usque fama perduret: in parapegmatibus certe Graecorum pueritiæ quandam videas imaginem, videas et in anno fixo coelesti Dionysii, qui eum deprehendisset, tempestates annuas neque cum enneakaedeasæteridis vagæ mæandris, neque etiam cum exortibus et occultationibus siderum affixorum constanter ad suos dies reverti, coepit quinque errone suspectare, auræ hic Chaldaeis præbere, ad quos sub regibus Seleueidis coeperant commeari astronomi Graeci; coepit apparitiones errorum et occultationes, ortus occasusque eorum aeronychos cum fixarum et Lunæ apparitionibus ebnjungere et in parapegmatibus annorum transactorum memoriæ causa consignare, mutationes

astris consecutas comparare. Nec exstat his Graecis vetustiorum consignationum memoria, videturque Chaldaeis ipsis, antequam sub Macedonum potestatem redigerentur, in mentem nunquam venisse, posse motuum quinque planetarum praedictionem exactam arte comprehendendi, ut eam methodum ipsi descriptionibus suarum observationum artificiosis per circumstantes fixas adjuvandas censerent. Nam etsi viderunt, singulos eorum certos annorum circuitus observare, varietas tamen in ea re perpetua testari videbatur, leges illas revolutionum cum multa libertate esse conjunctas, ut in aliqua Rep. stata magistratuum interstitia, et penes Romanos consulatus, post decem annos repeti solitus. Hinc adeo nata videtur illa a Cleomede transsumta vox *προαπειρία*, motus arbitrarius, quem proprium nos dicimus; hinc opinio divinitatis in planetis et potestatis in res humanas, hinc illae in astrologia chaldaica veluti magistratuum sortitiones quaedam, quis dominus geniturae, dominus anni, dominus ascendentes? quis cui dici, cui bonae praesit? quot quisque vincat suffragiis? Quae omnia libertatis opinionem sapient in motibus eoque exactae determinationis accessum ad certas fixas negligentiam inducunt.

Has vero planetarum observationes graecae posterior Hipparchus transsumtas et digessit et cum sui temporis experientia comparavit rudimentumque quoddam tabularum edidit, ex quo planetae cujusque periodi temporariae conspici stationumque et retrogradationum tempora laxiori calculo praefiniri possent. Itaque haec veluti adolescentia tabularum haberi potest.

Primus Ptolemaeus fuit, qui coactis in unum cum adjumentis veterum imprimisque Hipparchi, tum sui temporis motibus, tabularum opus ederet integrum, earumque quandam quasi juventutem adultae proceritatis constitueret. Qui etsi passim in Opere Magno cogitationes prodit ad supremam philosophiam pertinentes bujusque ad perfectionem artem astronomicam, ut par erat, expresse refert: idem tamen ille fuit, qui praeter Opus Magnum, de motibus, etiam Quadripartitum de effectibus edidit, qui in utroque opere eundem Syrum alloquitur, qui luter fines Operis Magni non postremum locum assignat genethliacis praedictionibus, quas alterum opus Quadripartitum complectitur, in quo opere plerasque Chaldaeorum vugas videas sub quandam artis formam redactas, ut illa futilissima prius infantia conjecturalis astrologiae sub hoc jam magistro prima veluti literarum elementa discrete incipiat.

Sed incidit philosophia sub Ptolemaei successorumque aetatem in diffilia tempora; cum Graecia serviret Romanis, cum una cum libertate pristinus etiam ille vigor ingeniorum concidisset, et non minus recta ratio superstitionibus, quam ingenuitas servili patientia publice contaminata esset. Quin etiam gens, Christum professam, toto tunc orbe dilatata, quia contemnebatur a philosophis illius temporis, artem vicissim astrologicam paganis accensibat artibus, et quod inquinata peius esset superstitionibus hariolationibusque in Deum injuriolis, interdum etiam damnare in solidum est ausa; ut essent, qui Christianismum ipsum quam artem suam deserere mallerent. Ex alia parte coortae gentes et imperia nova, hinc Hunnorum et Gothorum, inde Arabum, quorum alteri barbari et hebetes, alteri ingeniosi quidem, sed superstitionisissimi. Ab illis igitur ex Europa pulsa et ad hos in Africam devoluta siderum disciplina servitutem servivit turpissimam sub genethliacis, sortilegis, magis, quaeestionariis, sciscitanti cuilibet responsa dantibus velut ex tripode oraculorum loco: quibus hominibus, lucra sola quaerentibus et impietate obstrictis, siderum inspectio tabularumque certitudo et cum aeolo comparatio curae haudquaquam fuit per aliquot saecula.

Donec tandem nono et decimo post Christum seculo et Gothi Francique barbariem, et Saraceni superstitionem paulatim exuere coeperunt, imperiis illi constitutis, hi longe lateque propagatis, tunc et Europae doctrinam divinitatis plenam paulatim repetere, et Arabes pariterque Indae docti ejusdem imperfectionem misereri curamque emendationis suscipere. Sic precedentibus seculis factum tandem est, gliscente Friderici II. Suevi et. Alpbonsi Hispani, Romanorum Imperii cum Saracenis in Palestina, Sicilia, Italia, Hispania commercio, ut artis exercitum et cura ad Christianos occidentis transiret, translatis ex arabica in latinam linguam libris, cum astrologicis plurimis, tum ipso etiam Opere Magno Ptolemaei, quod Arabes Almagestum, quasi το μὲγας appellare consueverunt. Ac cum brevi enitisset Alpbousi bñjus cura plane regia et ad omnem posteritatem commendanda in procuracione tabularum, quas ex eo Alpbonsinas dicimus: ipse tamen Rex in præfatione, nonnullis exemplarum præfixa, sermonis initium a connexionione rerum sublimarium cum motu siderum desinit multamque prae se fert presumptionem de arte genethliaca. Adeo unquam astronomia lactis sui obliviscitur, nec, quanquam adulta, penitus eo potest abstinere.

Tabulas sub Alpbouso emendatas felix literis aetas excepit, in qua ex paucis antiquis plurimae novae per Europam academiae sunt excitatae, quae jam virilem quandam astronomiae constituunt aetatem: deterasae sunt magis magisque a cognitione rerum praestantissimarum superstitiones, revocata disciplina ad finem suum supremum adque suas in vita communi utilitates, ad geographiam et navigatoriam, quae ars ex eo novum orbem aperuit, orientem occidenti exterius junxit unoque imperio utrosque pene totos copulavit. Accessit et interior ex religione cura, corrigendi festum Pascabatis, cujus aberrationes per artis propagationem evidentius in conspectum prolatae fuerunt. Igitur certatim in culturam artis incumbentes Germani, in academis, Viennensi et Pragensi praecipue, Schiudellius, Peurbachius, Regiomontanus breviprehenderunt Alpbonsinarum Tabularum bonitatem et certitudinem fama minorem. Itaque tum ipsi, tum eorum discipuli per Germaniam et Italiam, Waltherus Noribergae, Dominicus Maria Bononiae, observationibus siderum diligentius incumbere easque conscribere vel ad suos vel ad posteritatis usum, monumenta etiam vetusta Ptolemaei, Albategnii, Gebrü, Alpbonsi in lucem asserere, explicationibus adjuvare, emendare omnesque partes doctrinae spbaericae novis tabulis subsidiariis ad faciliorem artis usum apparare. Et quamvis Regiomontanum ingenio parem operi futurum destitisset aetas immaturato fato terminata, successit tamen in curam emendationis Nicolaus Copernicus, canonicus Varmiensis Borussiae, Domini Mariæ discipulus, maximo vir ingenio et, quod in hoc exercitio magni momenti est, animo liber. Qui cum opus revolutionum planetarum, quod emendationem tabularum complectebatur, nova forma maximisque laboribus apparatum, per annos totos 27 detinisset in scrinulis, tandem, jam extremum vitae limen calcans, Noribergensibus edendum transmisit.

Hoc opus etsi tabulas habet, explicationibus demonstrationum additas, nemo tamen est bodie, quod sciam, qui eas in calenlum adhibeat. Successit enim proximis annis Erasmus Reinholdus, vir cum omni doctrinarum genere exultissimus, tum imprimis ad mathematicas artes a natura factus, ob perspicuitatem et facilitatem in rebus abstrusis admirabilem, qui opus hoc tabularum Copernici, jam fato functi, transformandum suscepit, Prutenicasque vel a Copernico Pruteno, vel a Maecenate suo Prussiae Duce et cognominavit

et delecto loci meridiano fecit. Regius enim Mons, cui epochae Prutenicarum sunt accomodatae, non est illud Franciae orientalis, quae Regiomontano patria fuit, sed alterum Borussiae ducatus oppidum in litore maris Baltici. Causas, quas dat Reinholdus bujus in se susceptae occupationis, videre licet apud ipsum; duas certe dissimulare videtur. Cum enim tabulae debeant esse canones *προχειροι*, ad usum expediti, cum Alpbonsinae ceterique tabularum auctores hunc usum manuarum etiam forma libri adjuvissent, tabulis numerorum uno contextu exhibitis, praeceptis vero brevissimis initio praemissis, Copernici contra liber tabulas per textum demonstrationum dispersas habet, quemadmodum et Ptolemaica syntaxis: ita fit, ut textu speculationem, tabulis usum desiderantibus, distrahatur animus ipsumque se opus utilitate sua praecipua privet. Deinde absurdus Copernicus bypothesibus insistebat, quibus offensos lectores Reinholdus credit absteritum iri. Censuit igitur hoc sibi faciendum, ut omissa mentione mirabilium suppositionum, omissis etiam demonstrationibus prolixis et taediosis, tabulas ipsas seorsim daret in libro manuali correctas et supputatas diligentius, ut illae suas observationes fundamentales, quibus a Copernico erant superstructae, repraesentarent exactius. Hoc consilio capto Reinholdus aggressus opus, immanem et insuavem laborem se hausisse significat. Si de fine ejus queris, est ille quidem laudabilis: certa cognitio motuum, anni modus et metae, aequinoctia, solstitia, eclipses, conjunctiones magnae, ut ex earum rerum pollicita decentissima sapientia bonitasque Creatoris eluceceret. At non tamen interim dissimulat auctor praedictionum studium, paucisque verbis, sed praegnantibus, quid arti genethilicae tribuit, innuit: *Eventus in hac inferiori natura, affirmans, astrorum motibus et positu effici aut significari indeque praedici posse*. Quid multis? Ex ea, quae mater bactenus erat, alio mentis intuitu rectius aviam, ex filia matrem feceris, unde nata sit aviae vultum referens neptis, iterum astrologia, ut (quod olim in hac materia scripsi (II. 657.) astronomiam matrem sapientissimam, sed pauperculam, stulta filia astrologia quaestu non ab omnibus aequè probato alat et sustentet. Atque hoc ipsum auctor specie negantis concedere videtur, dum enim divinationes erudito et utili labori tabularum se negat praetulisse et versatum se significat in hoc exercitii genere et partes ei secundas dedisse fatetur.

Veruntamen, ne quis haec eo pertinere putet, quasi virum eruditissimum inter superstitiosos illos Arabas referendum esse censeam, quibus unica lucri, nulla philosophiae cura fuit: adhortor lectores, ut praefationem ejus in Theoriam Peurbachii legant, quam ille anno 1542 purissimo et suavissimo sermonis genere concepit; in ea namque flores halant ex hortis philosophiae penitissimis, admirabiles fragrantiae, quae lectori veluti mentem ipsam eripit, ut quamvis aliquis rerum humanarum *eventus* ex astris pendere neget, at certe astrorum *effectus* aliquos in rebus humanis agnoscere cogatur. Huc referatur folium 187 illius Commentarii in Peurbachium, nec non et fol. 197.

Sed revertatur oratio nostra ad id, unde est digressa, jamque inter viros relatae astronomiae spem etiam assignet maturitatem et consistentem aetatem. Nam quod Reinholdus de Alpbonsinis affirmat, scire artifices, quod eae cum phaenomenis non amplius congruant, idem etiam de his Prutenicis et quae sunt multi, in observationibus exercitatissimi, et hic ipse annus 1625. documento fuit evidentissimo, ut in quo toto stelia Martis longe promotior deprehensa est in coelo, quam calculus Prutenicus praedixerat, crevitque defectus iste mensibus Augusto, Septembri, Octobri usque ad quatuor et quam proxime ad quinque graduum magnitudinem. Nam quod Reinholdus, observa-

tioulbus suffieientibus haudum conscriptis a quoquam, conjecturas ex paucis ductas secutus censuit, in motibus quidem mediis locum esse linæ, at prosthaphaereseou tabulas et retro et porro ad ompem mundi durationem utiliter servituras, utraque in re deceptus esse hoc quidem in exemplo deprehenditur. In Martis enim motu medio minimum aliquid mutandum fuit, omnis vero hujus anni defectus ex prosthaphaereseou Prutenicarum vitis fuit ortus.

Hujusmodi igitur aberrationes Prutenicarum eum inde ex quo illae fuerunt editae viri docti et in siderum observationibus exereitati deprehendissent, quos inter summo suo merito commemorandus est, ut eoryphaeus, Illustrissimus Cattorum Princeps Guilielmus, coortus est denique Tycho Braheus, ex regni Daniae uobilitate praeceps, qui, posthabitis ceteris aequalium studiis; astrouomiae restaurationem ingenti animo complexus, hoc unicum opus sibi delegit, in quo aetatem suam transigeret opesque avitas splendidas, quibus erat suffultus, impenderet; quodque in praeceps gloriae parte censeo, fecit hoc ille animo ab omnibus superstitionibus astrologiis vaeuo inque unum solum flum totius philosophiae supremum, in cognitionem et Dei et sui ipsius erectissimo; quod eum in scriptis et earminibus, quibus delectabatur, tum in quotidianis colloquiis aequalitate constantissima reddidit contestatissimum, astrologorum vero vanitatem, inertiam, ignaviam et sordes plurimum et deridere et detestari est solitus, sic tamen, ut siderum effectus in subluaribus, partem philosophiae praestantissimam, uequaquam negaret, gnarus, *effectus* illos siderum generales ab *eventibus* ipsis in rebus humanis individuis accuratissimo iudicio distinguere. Quod cum uou caperet vulgus hominum, ad miraculosas praedictiones credulum, ad rumpres falsos disseminandos promptum, utraque re vauissimum, uouuuquam virum innocetissimum inepto ejus famae studio sermonibus obliquis et luridae Magnatum object.

Hic igitur est ille primus Tabularum Rudolphinarum uuuueupator, hic mille fixarum ordinator, Solis et Lunae motuum explorator, planetarum omnium per 38 annos et ex his per 20 posteriores continuos observator, diligentia, circumspectione, patientia, constantia omnem fidem humanam exsuperans.

Quid vero ille praeter jam dicta in reliquorum etiam plauetarum singulorum motibus praestiterit, id ex Christiani Severini Longimontani Astronomia Danica, quam ex meo relatu lectorem discere malo. Ille namque cum Tychoe vixit per annos decem continuos, ego vix paucos duorum ultimorum annuorum menses. Anno namque 1600, mense Februario primum ad Tycho-nem veni Benaticam, praesente Longimontano, crebris a Tychone literis e Styria evocatus, occasione ab editione mei Mysterii Cosmographiei suppeditata, pactusque cum illo, mense Junio reversus sum in Styriam, accersitum familiam et supellectilem librariam. Ejusdem anni mense Octobri, eum jam discessisset Longimontanus, Tychoi me cum familia Pragae stiti praesentem, sed inutilem, quippe quartana me in lituere corripuerat detinuitque usque ad solstitium anni sequentis, nec ante deseruit, quam Gratium recurrissem baereditatis causa. Reversus Pragam mense Septembri, duos non amplius menses Tychois conversatione frui potui, eum mors illum die 24. Novembris (Octobris) proximi stylo novo rapuisset.

Quas igitur partes Tabularum Rudolphinarum Tycho perfecit superstes, quae reliquerit adjumenta seu admonitiones ad perficienda quae restabant, id rectissime Longimontanus fuerit testatus, qui et refert illas correctiones Tychois *λογιστικῶς* in planetis omnibus et tanquam sive dignas fundamenti loco adhibuit in tabulis suis computandis. Etsi et in Commentariis Martis aliqua

ego quoque indicavi, et mea de his exstat epistola, anno 1601 Gratio ad Joh. Antonium Meginum, Professorem matheseos in gymnasio Patavino perscripta, quam ille ante hos 12 annos, me inscio, primum edidit Bononiae in suo supplemento Ephemeridum, estque recusum hoc ejus opus cum epistola mea anno 1614 Francofurti. (Cfr. vol. III. p. 37 ss.)

Cum autem Commentaria mea jam dicta de motibus stellae Martis tanquam partem operis tabularum a Tychone Braheo relictæ, primum incepta Benaticae, ediderim post annos a morte Tychonis octo, Maginus, morarum impatiens, ex eo opere computavit tabulas prosthaphaereseon Martis ex fundamentis quidem a me positis, at forma tamen usitata, easque partem fecit supplementi sui; repetivit et tabulas motuum Solis et Lunae ex Tomo I. Progymnasmatum. Millenarium vero fixarum plenum et perfecerat Tycho Braheus, antequam veniret in Bohemiam, et exemplaria manuscripta passim ad bibliothecas Regum et Principum transmisit. Unius Viennam missi lator ipse fui, cum anno 1600. Benatica Bohemiae discedens inque Styriam pergens, Viennam transissem. Ex horum igitur exemplarium uno crediderim Johannem Grueupergerum e Soc. Jesu has mille fixas in suam de fixis editionem Romanam derivasse; nam numeri consentiunt. Easdem mille fixas et Longimontanus in suam Astronomiam Danicam inseruit, unico longitudinis scrupulo differentes.

Ita jam diu est, cum ex hoc astronomiae Braheanae naufragio tabulas exceptas cymbae quisque suo affigit, constatque studiosis astronomiae plurimum testimonio, quatenus harum tabularum partes Tychonis Braheii sint genuinae, quae vicissim meae, aut quibus novam ego formam indiderim. Observationes certe fundamentales praesentis aetatis ubicunque potui ex solo Braheo delegi, ceterorum et meas nonnullas tantum aut consensus causa, aut quia Tychonicae ad dies mihi opportunos non suppetebant, adscivi.

Verum de hisce singulis et dictum est nonnihil in introductione ad meas Ephemerides et plura dicendi locus erit alius. Tabulae enim manuaris debent vacare pondere, quod a prolixis commentis eis accederet. Interim habet lector editam a me anno 1621. Eptomes Astronomiae partem theoreticam, in quo libro et formas hypothesisum particularium (generalis enim, ut in Commentariis Martis demonstravi, communis est et Ptolemaeo et Copernico et Tychon) et methodum computandi ex iis omnes et singulas harum tabularum partes inveniet.

Hic antequam desinam locus quidem me admonet, ut excuseum moras editionis tabularum istarum tam diuturnas; quippe hic vicesimus et quartus est a morte Tychonis Braheii annus, quo ego toto tempore trium Imp. Austriaeorum stipendia merco aulica, quibus accessit posterioribus annis etiam Procerum Archiducatus Austriae Supranisanae stipendium annuum. Verum si tempus dudum amissum aliter pensari nequit, nisi et temporis et operae praesentis impendio, potius igitur praesentia retineamus, elapsa relinquamus in vituperio. Etsi difficultates aulicorum impedimentorum, praesertim bellis intercurrentibus, neque expertis commemorare necesse est, neque ignaris persuadere facile. Quid vero, superatis iis difficultatibus, meditatione sim interim consecutus assidua, quae commoda ex moris, contentioni meditationum interpositis, redundaverint in perfectionem philosophiae coelestis, et libri mei loquentur, quos interca publicis usibus exhibui, et ratio ipsa philosophandi novitasque inventionum totiusque astronomiae translatio inopinabilis a circulis siccitatis ad causas naturales, indagato profundissimas, explicatu et calculatu, primo

meo conatu, difficillimas; haec inquam et similia pro me rationem temporis intelligentibus reddent sufficientissimam.

Fortasse vero haec a me commemorata mora in naturalibus motuum causis erendis aliquibus supervacua, importuna, quin et irrita videbitur. Quibus cogitationibus ego jamdudum et in introductione ad *Ephemeridas* (Vol. II. p. 109 sc.), quo loco respondeo Davidi Fabricio, et in *Epitomes Astronomiae* fol. 5. (120.) capite de causis hypothesin, et fol. 334. (270.) et in libri IV. praefatione, et fol. 622. (392.) considerationes alias idoneas opposui. Etsi sufficere mihi vel sola ista defensio potuit; quod, quae Tycho Braheus in theoria Lunae constituenda primum concepit animo publiceque pronunciavit, *videri causas motuum esse physicas*, quod quidem aliter ei videri non potest, qui soliditatem orbium rejicit, haec ego, inquam, in planetis omnibus ita sese habere conatu non infelici et demonstravi et ad caleulos revocare docui, eaque ratione primi Rudolphinarum auctoris, Magistri mei, suppositiones et effata pro ingenii mei captu et asserui et roboravi.

Sed erunt etiam, qui, his posthabitis admonitionibus, auctoritate me premant ejus, quem supra laudavi Reinholdi astronomi et philosophi, qui *Commentario suo in Peurbachium non duxit insarciendas disputationes physicas*, ut alij fecerunt, quaeritque, *quid insulsius, quam inventa geometrica conjecturis exagitare et perturbare physicorum?* Verum quisquis illa leges, scopum velim respicias, ad quem Reinholdus illa referat. Non litiget enim Ptolemaeo, non cum Aristotele, non secum ipso, qui praefatione postrema in theorias haec utitur oratione: *Fortassis, inquit, haec septem lucida corpora, etiam sine hujusmodi orbibus, quos ars seu potius imbecillitas intellectus nostri sibi condonari petit, divinitus eam vim insitam habent, ut aliud in alia varietate et irregularitate motuum suam conservet legem ac perpetuam harmoniam, nobis tamen sine his tot orbibus, saltem rationabiliter eam, ut sic dicam, harmoniam irregularitatis animo complecti ac cogitando persequi perdifficile fuerit.* Quibus ille, verbis non repellit, sed tacite invitat eum, qui motuum formas et instrumenta naturalia viresque magneticis cognatas tales affert, quae sint non tantum rationabiliores illis tot, tamque vastis orbibus, sed etiam irregularitates apparentes motuum offerant animo et complexu faciles et ad calculum regendum vel ipsis orbibus longe expeditiores. Atque id ego tentavi, etiam Ptolemaei ipsius suum secutus (ne quis patet, auctorem mihi ex antiquis deesse), qui *comminisci jubet hypotheses quantum fieri potest simplicissimas et probabilissimas.*

Quod igitur Reinholdus de physicarum disputationum omissione se excuset, id quorsum pertineat, facile est ei judicare, qui Cremonensem ceterosque commentatores sphaerae legerit. Fecerunt illi auctores magnam physicae metaphysicaeque partem orbis ab astronomis introductos, perinde ac si res esset exploratissima, plurimisque argumentis in opiniones inter se pugnantes conquisitis undique chaos intille et infinitum effecerunt questionum ridicularum; nulla ipsis cura fuit, disputationes istas ad instructionem aut facilitatem calculi dirigere, aut omnino per eas expedire rationes eorum, quae in sideribus apparent, ut quae rationes per se stabant, etiam reclusis disputationibus illis intillibus, etiam de realitate orbium in universum dubitet artifex; quod de Reinholdo jam modo ex propria ipsius confessione constitit ipsaque Ptolemaeus de se passim in Opere Magno reddidit contestatissimum. Hoc nimirum est Reinholdo *inventis geometricis, quae suas demonstrationes habent, exagitare et conturbare praestigiis conjecturarum.* Quomodo etiam

mihî usu venire posset, ut petulans aliquis vanusque artis jactator cœortus, tabulas has, nulla cœlestium apparitionum, quas illae repraesentant, habita ratione, *κατ' ἀπειρον* veras esse neget eversasque putet, si se demonstraturum reeperit, falsa esse principia illa physica, quae jacto. Ego vero etsi principia, quibus innot, apud alia tribunalia me spero defensurum, in hac tamen arte sat habeo, si per ea calculatori definitiones et praecepta necessaria ob oculos posuero evidentius, quam per orbes solidos, eoque nomine et permutationem spolidorum orbium cum causis motuum physicis defensam et eo ipso causam tantarum morarum vunc peroratam existimo.*) Itaque ad vulgatum illud recurrens, *sat cito, si sat bene*, Deum immortalem summis praedico laudibus, qui mortalitatis mcae fluxibilem decursum ad hunc ueque diem mihî prorogavit, quo ultimam tandem manum operi, laudibus ejus humanisque uisibus destinato, gratioso ejus auxilio de difficultatibus omnibus triumphans, impono.

Et de ceritudine quidem calculi testantur observationes praesentium temporum, imprimis Braheanae; de futuris vero temporibus plura praesumere non possumus, quam vel observationes veterum, quibus usus sum, vel ipsa motuum mediæ conditio, novum penitus explorata, concursusque causarum physicarum praestare possunt, cum observationes Regiomontani et Waltheri testentur, omnino de aequationibus secularibus nobis esse cogitandum, ut singulari libello reddam demonstratum suo tempore (v. infra fol. 725. ss.); quae tamen aequationes quales et quanta sint, ante plurimorum seculorum decursum observationesque eorum, qui futuri sunt, a gente humana defuiri nequaquam possunt. Vide quae pulchre in hanc sententiam commentetur Willebrordus Sueilius sub calcem observationum Landgravii et nonnullarum Tychonis. Et habes infra in doctrina eclipsium etiam ex hujus temporis observationibus documenta perspicua, motuum Solis, Lunae et primi mobilis non ad amussim mathematicam aequalium, sed physicas minimas intensiones et remissiones recipientium extra ordinem.

Quicquid tamen utilitatis ex hoc tabularum opere ad studiosos astronomiae, ad philosophos etiam et theologos praesentes, futuros, redierit, id illi meminerint totum ad patronorum meorum supra commemoratorum beneficium esse referendum. Itaque Austriam familiamque Principum, quae ab illius possessione, nude nomen originis habet, ad totius orbis dominatum, Deo successus moderante, conscendit, deique tres ex ea domo Augustissima Imperatores, Rudolphum II, qui Tychonem Braheum e patria Dacia in Germaniam transgressum sub conditionibus splendidissimis et illustri origine dignis in aulam suam vocavit, qui me illi superstiti ministrum, defuncto successorem in parte operis dedit, qui Rudolphinarum nuncupationem, a Braheo superstite propositam, acceptavit ratamque habuit, qui et summas editionibus idoneis mihî vivos destinavit; deinde Matthiam I, qui cum provincis, regnis imperioque Romano etiam curam artis et mei patrocinium a Fratre in se suscepit; denique Ferdinandum II, qui praeter cetera eadem etiam destinatos summas repraesentavit, nova liberalitate auxit, ut tabulae ederentur jussit, omnes inquam gratis et in meruere summis mecum evehat laudibus totique adeo Augustissimae Domui bene precetur.

*) Et ad duos incipit annos, quibus opus dudum absolutum editionem expectavit, quae praeter alias calamitates provinciam, in qua domicilium fixeram, continetibus insensibilis quassantes, tandem etiam bello rusticano, meliorum illæde, pessime disturbata et prodigata fuit; si novis et sumptibus et capillibus et itineribus ea resumenda mihî faceret.

Haec sunt ad verbum, quae Keplerus Tabulis Rudolphinis praemisit; quae sequuntur, quorum ipsas attineant „tabulae“, quas nostrae editioni non integras inserendas censuimus, partim plane omisimus, partim aliis subiungimus Kepleri operibus, partim integras proposuimus et eorum quaedam praecipue eam ob causam, quia manuscriptorum Pulkoviensis ex parte diversam libro typis exscripto formam exhibent, quam ut comparare lector possit cum libro ipso, singulis adiungimus „praeceptis.“ Praemisit solum Keplerus tabulis ipsas declarationem usus, quam capitibus 84 comprehensam (paginae in fello maiori 126) disposuit in „praeceptis“ 209.

Summa horum „praeceptorum“ haec est:

- Caput I. De arithmetica logistica in his tabulis necessaria, et primo de numeratione.
- Caput II. De additione et subtractione numerorum tam simplicium quam logisticorum. (Praec. 1.)
- Caput III. De multiplicatione et divisione logistica usitata pro his tabulis, et de heptacoside, cuius ope suffulti subiebamur illis. Ubi explicatio logarithmorum. (Praec. 2—7.)
- Caput IV. De logarithmorum additionibus et subtractionibus coëcis. (Praec. 8.)
- Caput V. De regula Detri seu proportionum, ope heptacosidis exercenda in numeris logicis, ad veniendam partem proportionalem. (Praec. 9—12.)
- Caput VI. De logisticorum numerorum quadratis, radicibus et medio proportionali, inveniendis per logarithmos. (Praec. 13—15.)
- Caput VII. De usibus heptacosidis aliis. (Praec. 16. 17.)
- Caput VIII. De ordinatione canonis logarithmorum, antilogarithmorum et mesologarithmorum. (Praec. 18—24.)
- Caput IX. In triangulo rectilineo, dato angulo inter latera, data et proportionatione laterum, indagare angulos reliquos. (Praec. 25.)
- Caput X. De tabula anguli. (Praec. 26.)
- Caput XI. De alio peculiari usu canonis logarithmorum, praecipue in stationum punctis indagandis. De antilogarithmorum interpunctione et usu. (Praec. 27—30.)
- Caput XII. De tabula asc. rectorum medii coeli, declinationum et angulorum eclipticae cum meridiano. (Praec. 31. 32.)
- Caput XIII. De amplitudine ortiva, differentia ascensionali ejusque tabulae synopticae usu. (Praec. 33—38.)
- Caput XIV. De tabula anguli orientis seu alt. nonagesimi. (Praec. 39—48.)
- Caput XV. De tabula aequationis dierum. (Praec. 49—54.)
- Caput XVI. De catalogo locorum et de reductione temporis ad meridianum loci. De usu mappae universalis, specialiter accommodatae ad has tabulas, si quis eam perfectam velit adungere libro. (Praec. 55—61.)

- Caput XVII. De synopsi aerarum et tabulis reducendi tempora variarum nationum ad annos et menses Julianos harum tabb. (Praec. 62—75.)
- Caput XVIII. De tabulis epocharum et motuum mediorum. (Praec. 76.)
- Caput XIX. De canonibus sexagenariis. (Praec. 77—81.)
- Caput XX. De tabulis prostbapbaereson. (Praec. 82—88.)
- Caput XXI. De tabulis latitudinariis. (Praec. 89—92.)
- Caput XXII. De prostbapbaeresibus orbis annui. (Praec. 93—99.)
- Caput XXIII. Directorium generale computandi vera loca planetarum quinque per praecepta particularia praemissa. (Praec. 100. 101.)
- Caput XXIV. De passionibus, ut vocant, quinque planetarum. (Praec. 102—111.)
- Caput XXV. De Luna seorsim et primo de anomalia soluta. (Praec. 112.)
- Caput XXVI. De menstrua Lunae anomalia ejusque aequationibus. (Praec. 113—124.)
- Caput XXVII. De tabulis latitudinis Lunae menstruae. (Praec. 125—130.)
- Caput XXVIII. De parallaxibus Lunae. (Praec. 131—133.)
- Caput XXIX. De eclipsibus Solis et Lunae eminus conjectandis. (Praec. 134—138.)
- Caput XXX. De tabulis motuum Solis et Lunae subsidiariis. (Praec. 139—144.)
- Caput XXXI. De requisitis ad computationem eclipsium et tabula lat. Lunae in eclipsibus. (Praec. 145—153.)
- Caput XXXII. Methodus computandi eclipses. (Praec. 154—165.) De locis in Terra, quibus obveniunt phases singulae in eclipsi Solis. (Praec. 166. 167.) De calculo eclipsis Solis ad certum aliquem locum. (Praec. 168—170.) De postrema et menstrua temporis aequatione in eclipsibus. (Praec. 171—177.)
- Caput XXXIII. De conjunctionibus et oppositionibus aliorum planetarum eorumque evolutionibus et restitutionibus in caput. (Praec. 178—185.)
- Caput XXXIV. De obliquitatis eclipticae variatione. (Praec. 186—197.)
- Praecepta 198—209 habent Sportulam genetbliciis missam de Tabularum Rudolphi usu in computationibus astrologicis.

Tabularum Index.

Pars prima, quae communis pluribus stellis, vel etiam aliis aliarum disciplinarum usibus.

- I. Heptacosias logarithmorum logisticorum et quadrantis arcuum respondentium. (fol. 2—11.)
- II. Canon logarithmorum et antilogarithmorum ad singula scrupula semicirculi. (fol. 12—19.)
- III. Tabula anguli, pro prostbapbaeresibus orbis annui. (fol. 20. 21.)
- IV. Pars canonis mesologarithmorum ad 10^6 pro latitudinibus quinque planetarum. (fol. 22.)
- V. Particula canonis antilogarithmorum exactiorum, ad denarios secundorum, pro eclipsibus. (fol. 23.)
- VI. Tabula ascensionum rectarum, declinationum et angularum eclipticae cum meridiano. (fol. 24.)
- VII. Synopsis brevis differentiarum ascensionalium. (fol. 25.)
- VIII. Tabula altitudinis nonagesimi seu anguli orientis, ad singulos gradus alt. poli et terminos eclipticae, pro parallaxibus. (fol. 26—31.)

- IX. Tabulae aequationis temporis triplicis. (fol. 32.)
- X. Catalogus locorum insignium, cum alt. poli et differentia meridianorum. (fol. 33—37.)
- XI. Synopsis aerarum usulium et rationis numerosum tempora apud varios auctores. (fol. 38.)
- XII. Tabulae reducendi tempora variarum nationum ad tempora calendarii Juliani veteris et Gregoriani novi. (fol. 39.)
- XIII. Tabulae ad feriam hebdomadis inveniendam. (fol. 40.)
- Pars secunda, planetas singulos complexa. Solem (fol. 42—47.), Saturnum (fol. 48—53.), Jovem (fol. 54—59.), Martem (fol. 60—65.), Venerem (fol. 66—71.), Mercurium (fol. 72—77.), Lunam (fol. 78—88.)
- Pars tertia. De eclipsibus Solis et Lunae aliisque planetarum congressibus et configurationibus. (fol. 89—102.)
- Pars quarta. De obliquitatis eclipticae, praecessione aequinoctiorum et latitudinis fixarum prosthaphaeresibus. (fol. 103—119.)
- A folio 105 in 119: Catalogus stellarum fixarum 1000, ex accuratis Tychoonis Brahe observationibus et calculo ad annum 1600 completum. Partem folii 119 occupat tabula refractionum triplex (desumpta e Progymn. Tychoonis).

Huic summae eorum, quae continent tabulae Rudolphiinae, in sequentibus addimus ea, quae sine tabulis ipsis intelligi possunt, adjuvantes indicem eorum, quae cum in sex primis voluminibus nostrae editionis ex his tabulis praemisimus, tum sequentibus inserenda censuimus.

Capita praeceptorum I—IX. declarationem habent usus logarithmorum, quare ea addenda censuimus libris de logarithmis, quos continebit vol. VII. Initium capitis VIII. vide supra fol. 567. Caput X. item quaerendum est apud logarithmos vol. VII. et supra fol. 577. Caput XI. v. s. fol. 578 et partem ejus posteriorem vol. VII. Caput XII. v. s. fol. 547—550 et 545, et caput XIII. fol. 546 s.

Caput XIV. De angulo orientis seu altitudine nonagesimi ejusque tabula et usu in quaerendis ascensionibus obliquis, vel etiam punctis eclipticae orientibus.

Haec pars doctrinae sphaericae desideratur in Tabulis Directionum Regiomontani et Reinholdi, cum tamen summe nobis necessaria sit ad doctrinam parallaxium, ut eam ego in Parte Astronomiae Optica ante annos jam 21 tradidi demonstrationibusque roboravi. Copernicus quidem breve hujus tabulae rudimentum in opere Revolutionum exhibuit, quod miror non transumptum a Reinholdo in suas Prutenicas exultantque ut cetera fuisse. Partem igitur Rudolphiinarum non parvam constituit horum angularum tabula, ad omnes gradus alt. poli borei computata, constitueretque triplo majorem, si totam, ut habeo computatam in chartis, exhibuissem. Verum ob tardam hujus anguli mutationem sufficere mihi visum est, per ternos eclipticae gradus incedere, quin etiam, ut papyro parceretur et operis typographicis, in tabula per se prolixa nec propria doctrinae theoriae, scrupula gradibus adhaerentia non representavi singula, sed quina saltem expressi per notas partium assis, quem

morem Ptolemaeus ut plurimum servavit in demonstrationibus. Ergo valet *u* (uncia) 5', *s* (sextans) 10', *q* (quadrans) 15', *t* (triens) 20', *n* (quincunx) 25', *ss* (semisiss) 30', *p* (septunx) 35', *b* (bes) 40', *d* (dodrans) 45', *c* (decunx) 50', *e* (decunx) 55', *as* 60'.

Addidi lucis causa etiam zonarum distinctiones earumque proprietates astronomicas et annotavi media climatum in fronte columellarum, parallelosque eorum in calce ex usurpatione Ptolemaei idque in zona temperata. In zonae torridae semisse sept. terminos arcuum, quibus orientibus nonagesimus in boream vergit, seu in quorum terminorum nonagesimis antecedentibus Sol constitutus fit in meridie verticalis; hos inquam terminos in calce expressi. Vicissim in zona frigida qui arcus perpetuo sunt supra horizontalem terminis suis indicantur in vacuas areas sinistricius insertis. . . . (Quae sequuntur v. s. fol. 516.)

Praec. 39. Excerptio facilis est: datum eclipticae punctum oriens quaeritur in altertro marginum, alt. poli vel in fronte vel in calce promiscue et ex area exscribuntur gradus cum nota appendice.

Praec. 40. Quodsi placet experiri fidem tabulae et angulum hunc accurate computare, primum ex tab. asc. rectarum per datum eclipticae punctum oriens exercepe angulum et declinationem adscriptam, hujus vero antilog. aufer a log. alt. poli, restabit log. anguli subtrahendi ab excerpto, ut remaneat angulus orientis.

Huius praecepto adscripsit Bachmaterus (v. s. p. 656.): Tenor hujus praecepti valet solummodo orientibus signis ascendentibus; orientibus autem descendentibus arcus ille inventus auferendus est a compl. anguli eclipticae excerpti ad 2 rectos et residuum dabit altitudinem seu angulum orientis gradus quaesitum.

Praec. 41. Si detur non ipsum punctum eclipticae oriens, sed ejus asc. obliqua, et nihilominus quaeratur de angulo orientis ignoti puncti, in hoc casu abutere arcu aequatoris dato, ac si esset arcus eclipticae, convertens eum in signa et gradus; quibus in margine tab. asc. rectarum quaesitis, exercepe veluti declinationem et angulum. Huius angulo in primo quidem et quarto arcu aequatoris adde alt. aequatoris, in secundo et tertio adima, compositi vel residui log. adde antilog. excerptae declinationis vel quasi, conficietur antilog. anguli orientis.

Exceptio. Haec praecepta suas patiuntur exceptiones in zona frigida, quas calculator curiosus adhibita sphaera facile suo Marte deprehendet.

Praec. 42. Alia faciliiori via: pro puncto aequatoris oriente sume coelum medianum seu asc. rect. M. C. subtraetis 90° ab asc. obliqua data et oi inter asc. rectas quaesitae adscriptam declinationem angulumque exercepe; ablata vero declinatione sept. ab alt. poli vel addita meridionali, residui vel compositi logarithmo adde log. anguli excerpti, fiet antilog. anguli orientis quaesiti.

Praec. 43. Dato puncto eclipticae oriente, per ejus cum horizonte constitutum angulum indagare ascensionem obliquam. Puncto, quod est ab oriente nonagesimum seu quadrante circuli distans, abutere tanquam puncto aequatoris, conversis signis in tempora lisque quaesitis inter asc. rectas tabulae, exscribe declinationem et arcum eclipticae ex limbis et margine respondentem: quodsi septentrionalis fuerit declinatio, aufer eam ab angulo orientis, si meridiana, adde; a residui vel compositi arcus logarithmo aufer log. alt. aequatoris; restabit log. arcus aequatoris, ortivi quidem, si nonag. est in orientali quadrante, occidui vero, si in occidentali. Ille igitur ortivus, additus ad

excerptum velut eclipticae arcum, conversum prius iterum in tempora, constituit asc. obliquam, iste vero occidens, ablatas, constituit desc. obliquam.

Præc. 44. Aliq. via: Quare ipsius puncti eclipticae orientis declinationem ex tabula eique iunge angulum orientis; compositi logarithmo adde log. declinationis, a summa rejice log. alt. aequatoris, restabit log. diff. ascensionalis, quae de puncti septentrionalis asc. recta auferenda est, ad meridionalem addenda, ut constitutur asc. obl. quaesita.

Præc. 45. Sed et ipsum punctum eclipticae oriens per angulum ejus cum horizonte datum vel sumtum et per asc. obliquam datam inquiri potest.

Pro asc. obl. data sume asc. rectam medii coeli et quare punctum eclipticae, quod cum ea coelum mediat, ejuque declinationem; quae si sept. addatur ad alt. aequatoris, sin meridiana, auferatur. A residui vel compositi logarithmo aufer log. anguli orientis: restabit log. arcus eclipticae, utrius, si punctum coelum medians erat in descendenti semicirculo, occidui, si in ascendente. Ille igitur additus ad punctum coelum medians pertingit ad punctum oricus, iste ablatas ad occidens. Si ablatio fieri non potest, non respondet datus ang. orientis datae asc. obliquae. (Præcepta 46-48. v. s. fol. 546 s.).

Specimen Tabulae anguli orientis vel altitudinis Nonagesimi.

Poli	Zona Torrida.			II. Clima. Zona temperata.			Altitudo.
	1°	2°	28°	23 ^b ss.	24°	29°	
✓ 0.	65. ss.	64. ss. . . . 43. ss.	43.	42. ss.	37. ss.	30.	
3.	65. ss.	64. ss. . . . 43. ss.	43.	42. ss.	37. ss.	27.	
6.	65. p.	64. p. . . . 43. p.	43. u.	42. p.	37. p.	24.	
9.	65. d.	64. d. . . . 43. d.	43. s.	42. d.	37. d.	21.	
12.	65. e.	64. e. . . . 43. e.	43. t.	42. e.	37. e.	18.	
15.	66. s.	65. s. . . . 44. u.	43. p.	43. u.	38.	15.	
18.	66. ss.	65. ss. . . . 44. t.	43. e.	43. t.	38. q.	12.	
.	
.	
.	0. X
3.	68. e.	67. e. . . . 46. n.	45. e.	45. t. . . . 40. s.		27. =	
II 3.	77. d.	76. d. . . . 64. u.	58. ss.	55. . . . 47. p.		27. z	
SS 3.	89. d.	89. u. . . . 66. u.	66. ss.	65. . . . 59. n.		27. x	
3.	77. b.	78. d. . . . 78. e.	78. q.	77. d. . . . 72. t.		27. m	
up 3.	69. e.	70. e. . . . 87. d.	87. q.	86. d. . . . 81. b.		27. n	
.	
.	
30.	67. ss.	68. ss. . . . 89. ss.	90.	89. ss. . . . 81. ss.		0° n	
Poli borei							Altitudo.
	1.	2. . . . 23.	23 ss.	24. . . . 29.			

In calce: Nonagesimus vergit in boream, residuo eclipticae, quod est supra scalam, oriente, in austrum.

Sequentia folia (28-31) similiter exhibent tabulas climatatum III-XI, vel parallelorum IX-XXXXII.

Tabulae Aequationis Temporis.

[illegible]

nulla. Nam hoc modo America pene tota, et omnino qua nota et culta, reputatur mihi occidentalis, excurritque nonnisi remotissimum ejus litus ultra meridianum antipodum in hemisphaerium orientale, quo loco rafa. aut nulla vicinorum inter se limitum commercia. Vicissim nova Guinea, terrae australis forte pars, una cum insulis Salomoniis, cumque Japonia recipiuntur intra limitem hemisphaerii orientalis, usque ad Paxaros fere insulam et omnino quousque notum est aliquid de terra australi. Habitatores itaque continentis, qui tabulis et mappa hac utentur, locationis in ea suae certi extraque periculum erroris sunt, ut qui rarissimū meridianum hinc antipodum nostrorum ultro citroque transeunt.

Præc. 60. Navigantes vero oceanum australem, Sør dictum, seu mare pacificum, meminerint, quoties seu navi seu cogitatione limites hos transiverint, se una transivissae numerationis limites secum adlatse, coque amplecti debere numerationem ejus hemisphaerii, in quod deveniunt. Quod enim ex his tabulis colligitur appariturum in Japonia vel Moluccis die 20. mensis, numeratione aucta, id venientes eo classibus Americanis ex oriente, videbunt die 19. numerationis suae diminutae, si ejus seriem continuare vellent. Et vicissim, si Panamae in America plenilunium est futurum, indicibus his tabulis et mappa 22. Martii, sabbatho ante pascha, navis ex Philippinis ab occidente scil. advolans censebit, eadem nostra mappa manducente, diem plenilunii esse 23. Martii et feriam I, seu Dominicam numerationis suae, inde a Philippinis continuatae. Itaque dimissa numeratione suae patriae aucta, transire debet in numerationem Americae diminutam. Id adeo acquum est, non enim portus navi volanti, proficiscitur obviam, sed navis in portum loco immobilem invehitur.

Præc. 61. Usus autem et mappae et totius adeo operis harum tabb. praeceptus est iste. Quia meridiani in mappa distinguuntur horis, initio gemino ab Uraniburgico facto, observet ergo gubernator celsipem aliquam Lunae, aut distantiam ejus a stella nota, insidiatus ei, cum cornuum acumina sunt in eodem perpendiculari, tunc enim est in nonagesimo gradu ab ortu, carens longitudinis parallaxi. Aut observet congressum Lunae cum planeta, quia hi magis sunt conspiciendi nec indigent instrumento; simul et horam a meridie observationis exacte annotet. Deinde quod observando deprehendit, id etiam computet ex his tabulis, qua hora sit appariturum Uraniburgi. Si plures ipse horas annotavit quam computantur, totidem horis est in oriente, si pauciores, in occidente. Et igitur numeris horarum hujus differentiae, quaesitus in mappa, ostendet meridianum, sub quo facta sit observatio. Quodsi tunc navis portum aliquem obtinet, jam antea locatum in mappa, vel alia vel hac ipsa, fidem inde mappae circa locum talem poterit explorare, mappamque ubi fuerit opus corrigere, praesertim si plures hujusmodi observationes eodem conspiraverint. Etsi enim negari non potest, quin aliqua motibus lunaribus interveniat inaequalitas, ob quam illi regulam respuere videntur, usque ad quadrantes horarum circiter, tamen id, ut ex causis physicis profectum, rarius accidere solet, coque plura hic vota contra unam vel alteram enormitatem valere citra periculum erroris possunt.

Caput XVII. De reductione annorum, mensium et dierum, qui apud alias nationes in usu sunt velfuerunt, ad annos ante et post Christum adque dies, menses et annos Julianos, quibus haec tabulae sunt accommodatae. In hos usus exhibeo primo synopsis aerarum (vel IV. p. 505.), 2) tabulam reductionis et conversionis temporum Gregorianorum, Julianorum, Aegyptiacorum, Persicorum, Arabicorum

(IV. p. 510. et supra fol. 407.). 3) Typum anni confusions et intercalationis vitiösae peractae, itemque cohaesionis annorum solarium fixorum exoticorum, qui quadamtenus formae Julianae respondent, eoque minori opera ad eam reducatur (IV. p. 511.). 4) Tabellam serialem (IV. p. 512.).

Synopses necessitas omnibus est nota. Prima enim calculatori cura esse debet de anno cujusque numerationis, quem vel antiquae historiae, vel diversae provinciae orbis terrarum suppeditant, in quem annum aerae, quam in his tabulis sum secutus, is competat. Ptolemaeus quidem annos deduxit a Nabonnassare, quia observationes antiquiores non exstant; alii aliud spectarunt, plerique conversiones regnorum, aut bonorem regum, sub quibus scripserunt. Sic Vectius Valens astronomus Antiochenus ab Augusti triumpho Actinico, sic mathematici Persidis a caedo Jesdagirdis numerarunt, ex quo reciderunt sub potestatem Saracenorum Arabum, sic Aegyptii ab obitu Alexandri et ortu regni Lagidarum Ptolemaeorum, sic Chaldaei ab initio Seleucidarum, sic Saraceni ab Hegira, secessionem seu fuga Mahometis, qui libertatis ipsi auctor fuit; sic ipsi etiam Alphonsini, quamvis usuaem juxta observarunt, novam tamen aerae Alfonso fixerunt. — (Sequentia v. s. p. 608 ss.; quae illic omisimus, hic supplemus.)

Illud diligenter inculcandum est calculatori, cum in his tabulis anni Juliani nominantur, cognomen hoc non esse accipiendam de aera Julii Caesaris deque annorum numero ab illa deducto, sed de forma solum anni et dispositione seu distributione dierum in menses. Interim anni etiam Juliani dicti sunt anni Christi, post Christum quidem 45 annis diminutiones, ante Christum totidem auctiores, quam si a tempore, quo forma haece anni a Julio Caesare fuit instituta, deducti essent.

Præc. 62. Nunc viam tradam utendi hac synopsi. Si offertur annus numerationis ante nostram incarnationem aerae incipientis (annorum quidem non continue repedantium; de his enim agam seorsim), ut scias, quotas is sit annus incarnationis, quibus utendum est in tabulis istis: siquidem annus propositus non superaverit intervallum numerationis proprium, in synopsi annotatum, aufer completos ab intervallo, ut est positum, residuus erit annus Julianus, in quo currente incepit propositus currens aerae ejusque, dies autem et mensis Julianus, a quibus ille coepit, additus invenitur intervallo in synopsi. At si superaverit propositus annorum numerus intervallum suum (eorum, quae Christum antecedunt), aufer vicissim intervallum, ut est positum, ab ipso dato numero anni currentis, residuus erit annus incarnationis. Jal. p. Chr. currentis, a ejus die et mense, quem synopsi annotat, incepit propositus currens.

Exempla. R. Abraham Chala dicit aerae contractum incidisse in principium anni Judaici 3450. Ut scias, quotas hic sit incarnationis, respice ad aerae Judaicam ejusque intervallum 3761. Quia propositus numerus minor, aufer ejus completos 3449, restat 312 currens ante incarnationem. Ejus igitur anni Nonis Oct., quae sunt annotatae ad 3761, perhibetur incepisse aera contractum.

Vicissim scribit Arzachel Arabum aerae incepisse anno Alexandri 933; quotus is erit Christi? Respice ad aerae Alexandri, ejus intervallum invenitur 312. Cum igitur numerus propositus sit major, aufer 312 a currente 933, restat 621 currens p. Chr. Hujus igitur anni Octobri, quem vides appositum esse ad 312, coepit annus Alexandri 933, et proinde desinit sequenti 622 Christi.

Sic Sigismundus Baro Herberstenius commentarius rerum Moscoviticarum refert ex Annalibus, Demetrium, Joannis Basilii aepotem, duces Moscoviae creatum anno mundi 7006. mense Februario. Aera est Graecorum et numerus superat intervallum; aufer igitur hoc, restat sumus Christi 1497 currentis, ut ipse etiam Baro monet.

De notatione temporis per Olympiadas cautio est peculiaris, ut completarum

numerus quadruplices addasque currentis annum expressum, quam summam Scaliger appellat annos Iphiti.

Ut Phlegon Trallianus, referente Ensebio, 4. anno Olymp. CCII. annotavit eclipsin Solis maximam hora diei 6. Ensebius de ea eclipsi intelligit, quae contigit Salvatore in cruce pendente, festo paschatis; quaeritur, quoto id fuerit anno incarnationis. Erge completas Ol. 201 quadruplica et adde quartum expressum, sit 808 Iphiti currentes. Aufer 776, intervallum in synopsi, restat 32. incarn. Annus erge, quem dicit Phlegon, vel a solstitio huius 32. coepit, vel, quod verisimilius, a bruma antecedente, complexus pascha anni incarn. 32. Et quia passio Christi certe incidit in antecod. 31, hic intelligimus vitium obvenisse Phlegontis textui et numeralem 7 in 8 mutatam. Si vero numeratio ehlata inceperit p. Chr. annique non continue retrocedant (de his enim seorsim itidem agendum), adde ad eos currentes intervallum ex synopsi non currentes, sed completum; ita prodit annus inc., in quo incipit annus oblatas, a mense quidem et die ad intervallum adscripta in synopsi.

Teon comment. in Ptolemaeum refert eclipsin, quae contigit anno Diocletiano 81. Quaeritur, quoto id fuerit anno tabularum istarum. Synopsis exhibet intervallum Diocletianorum 284, ergo completas 283 adde ad currentem 81, prodit 364. inc. currentes. Huius igitur anni d. 29. Aug. coepit 81. Diocletiani.

Sic Leopoli Russiae scriptae sunt litterae de Calend. Armenarum ad Barth. Scultetum Goerticiensem consulem anno Armenarum 1044. Ut scias, quotus incarnationis, respice ad aera Armenorum; haec habet intervallum 552, ergo adde compl. 551. ex synopsi, procreatur inc. 1595, cujus mense Augusto coepit ille 1044. Armenorum.

Praecepta 63—73 leguntur supra fol. 604 sa.

Praec. 74. Feriam prodere diei in aliis annorum fermis et in Arabica. Si quaeritur de feria diei in anno Gregoriano ceterisque, prius ille reducatur ad diem anni Juliani respondentem, tunc huius quaesita feria erit et illius. At singulare est artificium anni Arabici, quod emittendum non erat. Ei servit pars inferior tabulae hebdomadicae, cum ejusdem fronte communi, cumque laterculo periodorum (vide infra). Quod enim nobis in Juliano praestat cyclus Solis brevis annorum 28, hoc Arabibus expedit longior 210 annorum, quae ab ipsa aera Arabica incipit constatque cyclis triacontetericis septem. Sunt igitur in areas inserti primam triaconteteridum singularum anni completi, deinde unus cycli anni singuli currentes, denique menses 12 Arabici.

Pro eo igitur, quod ad numerum annorum Arabicorum nihil additur, ad indagandum cyclum triaconteteridis, vicissim tres fieri debent ingressus in areas hebdomadicae, primus per triaconteteridas completas (abjectis periodis integris) residuas, 2) per currentem cycli triacont. et 3) per mensem currentem, et ex fronte excerpti totidem characteres adjiciendi sunt numero diei mensis Arabici proposito, abjectisque a summa septenariis remanet feria.

Exemplum. Anno Hegirae 926. die 7. mensis Scheval mortuus est Sellmus, Turcarum Sultanus; quoto id fuit feria? A 926 abjice proxime minorem laterculi 840, periodorum scilicet quatuor, restant 86. In hoc residuo sunt duo cycli triacont. sc. anni 60, qui dant ex fronte III, residui 26 dant II, mensis vero Scheval dat VII. Ergo ad diem 7, mensis adde 3, 2 et 7 et abjice vicissim septenarios, residui sunt 5, fuit ergo feria V, quod etiam prodit historia. — Si redegeris 7, Scheval ad diem Julianum, is erit 20. Septemb. anno inc. 1520; si huius feriam quaesiveris, ea erit etiam feria V.

Sic anno primo Hegirae primus Muharram primi mensis quoto feria? Ab anno 1 detrahi potest ex laterculo nihil, triaconteteris est etiam nulla. Ergo cum triaconteteride 0 excipere VII, cum anno 1 excipere V, cum mense Muharram excipere VII, ad diem igitur 1 adde 7, 5, 7 et abjice septenarios, formabitur feria VI estque primus dies aerae Arabicae Hegirae 16. Julii, feria VI. Alta tamen secta Arabum, quam sequuntur Alphonsini, tradit diem 16. Julii, 27. Chaeac, feriam V.

Praec. 75. De cyclo Lunae seu aeneo numero. Ut cyclicis Lunae habentur, indicans novilunia per totum annum, sine tabulis astronomicis (eccc

adversam huic operi signationem temporis) ad annos inc. additur unitas (ut etiam supra, in cyclo Dionysii magno, qui continet cyclos Lunae 28), tunc abjectis per divisionem omnibus cyclis 19 annorum, restat annus cycli.

Vt vero per cyclum Lunae habeatur pascha Christianorum et festa mobilia cetera dominicaeque, quae a trinitate numeratae more antiquo per Germaniam et regna circumjecta creberrime fuerunt adhibitae a maioribus ad tempora signanda, a pentecoste vero more Romano, qui nunc incipit exprimi in calendaris germanicis: ad hanc rem opus esset transscriptione totius calendarii enim aureo numero. Quare et haec antiqua forma calendarii et quae pars ei successit in novo calendario Gregoriano, cyclos epactarum, rejicienda necessario sunt ad computum ecclesiasticum, una cum calendaris, Judaeorum operosissimo, Atheniensium, Macedonum, Syrorum, lunaribus; praesertim cum haec posteriora nos de uno atque altero die plerumque relinquant in incerto; sic ut propius ad diem veniamus computatione ex his tabulis facillima aetatis Lunae, quae diei cuique apud nationes commemoratas nomen imponit, quam ullis cyclis. Adde quod eclipses per dies calendarii graeci signatas Ptolemaeus jam retulit ad Aegyptios. Etsi vero typum aurei numeri exhibeo, non tamen is servit signationi usuali temporum, sed indagandis eclipsibus, ut titulus ipse monet.

Tabella hebdomadica ad feriam diei indagandam per triaconteterida in anno Arabico vago Hegirae.

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	Latereculus summae, an- norum in periodis Ara- bicis tria- conteteridis.
Tri- 90	180 com- 2	conte- 60	150 ple-	teri- 30	120 tae	des 0	210
5	Sephar.	Rahie I. 7	4	1 Ra- hie II.	6 9	Muhar- ram 3.	420 630 840
13	10		12	*	Gjuma- di I. 11	8	1050 1260 1470
Gjuma- di II.	Regeh. 18	15	Sahaben. 20	17 Ramad- han.	14 19	16 Scheval.	1680 1890 2100
21 Dulka- dasi.	26	23 Dulha- jati.	28	25 30. curr.	22 27	24	

„Typus“, quem dixit Keplerus, aurei numeri, inest tabulis fol. 89 initio, par-
tis III, et hanc habet formam:

		dioranas	horarias	in mense anni simplicia
Motus medii ab æquinoctio	☉	0° 59' 8";	0° 2' 28";	1° 0' 33' 18".
" " " "	☿	0. 2. 1;	0. 0. 5;	0. 1. 2 18.
" " " "	♂	0. 4. 59;	0. 0. 12;	0. 2. 34. 37.
" " " "	♂	0. 31. 27;	0. 1. 19;	0. 16. 14. 46.
" " " "	♀	1. 36. 8;	0. 4. 0;	1. 19. 40. 3.
" " " "	♂	4. 5. 32;	0. 10. 14;	4. 6. 51. 50.
" Motus longitudinis	☾	13. 10. 35;	0. 32. 56;	1. 18. 28. 6.

In calce tabularum singularum adscriptum est:

Ante Christum anno 3993. die 24. Julii Uraniburgi h. 0. 33. 26"									
medius	☉	0°	0'	0"	☿, apog.	0°	0'	0"	♄
"	☿	5.	29.	57.	♂, apbel.	28.	24.	6.	☽, nodus asc.
"	♂	7.	3.	21.	"	23.	34.	18.	☽, " 0° 0' 0" ☽,
"	♂	10.	43.	52.	☽, "	15.	0.	0.	☽, " 15. 0. 0. ☿,
"	☽	0.	0.	0.	"	0.	0.	0.	♂, " 0. 0. 0. ♀,
"	♀	0.	0.	0.	♀, "	0.	0.	0.	☽, " 0. 0. 0. ☽,
"	☾	22.	57.	2.	☾, "	0.	0.	0.	☽, " 0. 0. 0. ☽,

In tabula Solis his additum est:

Poleus mundi boreus supra ultimam caudæ Ursæ, austrinus sub Hydro, punctum zodiaci æquinoctiale seu 0° ♀, illud quod anno 1600. numeratum fuit 19° 13' 36" II, inter cornua ☿. Punctum æquinoctiale alterum, seu 0° ☽, quod anno 1600. numeratum est 19° 13' 36" ♀, quo ipssimo in gradu et scr. anno 1604. 9. Oct. seu 29. Sept. fuit ☿ ☽, paulo post ☿, quam statim postridie secutus est ortus sideris novi clarissimi in 17° 43' ♀, lat. 1° 55' bor., signans ita creationis æquinoctium.

Sequens facies tabularum exhibet amotus medius in annis expansæ et collectivæ ab 1 in 100, inde per centenarios in 1000 indeque per milenarios in 12000.

Anno 1 habet: mot. med.	☉	ab æquin.	11° 29' 45' 40", apog. ☉	ab æquin.	0° 1' 2", fixarum ab æquin.	0° 0' 51"	
" "	☿	" "	0. 12. 13. 36., apbelli	ab æquin.	0. 1. 16, nodi	ab æquin.	0. 1. 12.
" "	♂	" "	1. 0. 20. 32.	" "	0. 0. 47.	" "	0. 0. 4.
" "	♂	" "	6. 11. 17. 8.	" "	0. 1. 7.	" "	0. 0. 40.
" "	♀	" "	7. 14. 47. 36.	" "	0. 1. 18.	" "	0. 0. 47.
" "	☽	" "	1. 23. 43. 15.	" "	0. 1. 45.	" "	0. 1. 25.
" "	☾	" "	4. 9. 23. 3. spoguel	" "	1. 10. 39. 52.	" "	19. 19. 43.

Tabularum æquationum facies implent tres, ad singulos gradus a 1° in 180° tribus columellis referentes: 1) Anomaliæ eccentrici, 2) Anomaliæ coæquatæ, 3) Intervalla a Sole, media Telluris a Sole distantia posita = 100000. Canon sexagenarius motuum mediorum Solis, cui Cap. XIX. propria dictum est, exhibet tribus columellis motum ☉ ab æquinoctio seu compositam anomaliæ æquæ et a fixis simplicem, ad annorum sexagenis primam, secundam, tertiam, quartam, item dierum sexagenis eandem cum minutis, secundis, tertiis et quartis. Capituli XX. majorem partem v. s. fol. 563 ss. Reliqua, quæ ad usum tabularum pertinent, hæc sunt: In columellæ sinistimæ cellis numerus superior graduum integrorum est anomalia eccentrici, inferior et scrupulosus, caractere minuto, est pars æquationis physicae. Uterque mente additi invicem constituent anomaliæ mediam. Hæc u. non exprimitur aliter in cella sua, quam per letas suas binas partes. Respondet autem huic anomaliæ eccentrici et huic mediæ sua coæquata in eadem linea, sed in columella media, quæ in ☽ est dextima.

Igitur proposita aliqua anomalia media in gradibus, scrupulis et secundis (pro quolibet signo sumendo 30 gradus), si ea fuerit minor semicirculo seu gradibus 180 (quod in planetis fit semper), quare in primis columellæ mediam proxime minorem, semper mente accessitis in unam summam duobus numeris in eadem cella invicem subordinatis; et coæquatam illi respondentem ex columella secunda exscribe; ipsam vero proxime minorem tabulæ subtrahere

a proposita tibi; excessum multiplica in intercolumnii gradus, quod prodit, adde ad coequatam illam exscriptam: ita conficitur anomaliam coequata, cui apponatur titulus *add. vel subtr.* Si vero proponatur anomaliam media semicirculo major, quod in Luna spectandum est, quando locus ejus verificatur extra copulas: subtrahatur ea a circulo integro, cum residue excerptatur coequata ut prius et haec vicissim subtrahatur a 360° , relinquet coequatam semicirculo majorem, de qua quaerebatur; etsi in praecepto generali, computandi motus planetarum sex, non erit opus coequata semicirculo majore.

In hoc praecepto etsi videtur operari calculator subtractione anomaliam mediae ex tabula ab anomaliam media proposita, ut qua subtractione non est opus in tabulis usitatae; at vicissim levatur additione aequationis, quam imperant usitatae; nec exlevationis studie mutata est forma tabularum, sed quia forma hypotheseos physica id postulavit.

Admonitio de Luna. In tabula anomaliam aequationumque Lunae pars aequationis physica seu inferior et scrupulosus cellarum sinistrarum numerus cum hac sua quantitate lecum habet tantum in interlunio et plenilunio, in ceteris phasibus successive per menses anni augetur, quoadusque in mense pleno quantitatem acquirit exacte duplam ejus, quae in tabula reperitur. Quare usus intercolumnii ratioque coequatam excerpti extra copulas antecessat aut non sufficit. Itaque sola Luna ad sinistram aequationis partis physicae, foris extra cellas appositae, habet differentias seu incrementa hujus aequationis partis physicae in descensu per quadrantem primum superiorem, decrementa per inferiorem.

Praec. 83. Invenire anomaliam eccentrici alicujus planetae per anomaliam mediam. Si anomaliam mediam tibi proposita praecise reperitur in summa duorum numerorum hujus cellae, tunc eorum superior est etiam praecise anomaliam eccentrici, quaesita per mediam propositam. Si vero tua anomaliam media non praecise reperitur in cellarum una, tunc a proposita tibi media subtrahere proxime minorem quam exhibet cella, quae restabunt scrupula prima, ea adice inventis in illa cella gradibus integris anomaliam eccentrici; ad secundam descendere aut etiam de uno scrupulo satagere non est hoc loco pretium sperare.

Praec. 84. At si de anomaliam media non constet initio, sed statim ipsa anomaliam coequata fuerit data, rursum per hanc invenitur anomaliam eccentrici ex tabula aequationum, pene ut prius. Datam enim coequatam quaere in columella secunda; si ea praecise invenitur, tunc ex respondentem cella columellae sinistrae superior numerus erit ipsa anomaliam eccentrici, si vero non praecise invenitur coequata in aliqua linearum columellae secundae, tunc id quod ea proxime minus invenitur in tabula auferendum est a coequata tibi data; quae restiterint scr. prima, sunt apponenda ad gradus integros, scriptos superius in cella sinistra respondente, ut conficiatur justa p. p. eccentrici anomaliam.

Haec tunc valent, si anomaliam ad propositum tempus constitutae semicirculo fuerint minores. At si majores fuerint earumque complementa ad integrum circulum fuerint data, cum his agendum quidem est ut prius, quod vero tunc excerptur, id complementum itidem est anomaliam eccentrici rursumque est a 360° auferendum, ut habeatur ipsa anomaliam eccentrici. Hujus enim usus erit singularis in Luna extra copulas.

Haec anomaliam eccentrici in 6 quidem planetis post tabulas aequationum jam confectas ad calculum loci veri non amplius requiritur, in septimo vero,

Luna, quando locus ejus extra copulas computatur, usus ejus erit necessarius ei, qui ex ipsis fundamentis hypotheseos computare volet.

Præc. 85. De excerptenda aequatione eccentrica ejusque partibus. Etai non indigemus hac ad calculum motus planetarum, si tamen de ea quaeretur, ut cum aliarum tabularum aequationibus comparetur, ea facillime excerptur ad gradus integros anomaliae eccentrici; subtrahæ consequntam ejusque lineæ ab anomalia eccentrici, restabit aequationis pars optica, cui adde partem physicam ex sua cella ejusdem lineæ, componitur aequatio tota. Si yero anomaliae, quarum quaeruntur aequationes, non præcise reperiantur in suis lineis, exquirendae sunt aequationes duarum cellarum proxime datam circumstantium, ex quibus datae anomaliae sua aequatio est admetiendi proportionaliter. In schemate 99. (v. s. fol. 664.) assumpta anomalia eccentrici AB, pars aeq. opticae est angulus CFS, pars physica arca CFS, quae non plane aequipollet angulo CFQ, etsi ei appropinquat, jam major eo, jam minor. Itaque tota aequatio est angulus QFS fere. —

In columellis tertiis tabularum bini in singulis cellis occurrunt numeri simplices, quorum superior, majusculo caractere, exprimit intervallum vel distantiam ipsam planetarum a centro Solis et Solis a Terra, in Luna deest haec columella, quia distantia Lunae a Terra praeterquam ad parallaxes non sit cognitum necessaria et parallaxes Lunae habentur ex ejus tabulis simplicibus et minori opera. Alter ejusque cellae numerus, inferior et minusculo caractere expressus, est logarithmus, h. e. proportio, quam habet id planetæ intervallum ad numerum 100000, qui indicat intervallum seu distantiam Solis a Terra mediocrem. Horum numerorum uterque, tam intervallum quam ejus logarithmus, est accommodatus ad anomalias in eadem linea expressas.

Præc. 86. Itaque si una trium anomaliarum, quae ad excerptendum intervallum vel ejus logarithmum datur, non expresse reperiat in sua cella, numerus etiam intervalli erit inter duos circumstantium cellarum medius, ejusque logarithmus inter duos expressos medius.

Præc. 87. Ut logarithmus intervallorum facili labore accommodetur ad anomaliam mediam, non exacte in cella repertam, appositi sunt ad latus columellae tertiae numeri minusculi, inter binos logarithmos cellarum medii, exprimentes, quantum denis scrupulis primis anomaliae mediae debeatur ad correctionem non ipsius intervalli, ad cuius stant latus, sed ejus logarithmi, ut qui et ipse minusculis numeris expressus est. Hic igitur numerus lateralis, ut parvus, facile mente ducitur in scrupula prima de differentia anomaliae mediae datae et ea proxime minoris ex tabula, ut praecisa a facto figura ultima, constituatur portio, subtrahenda a logarithmo cellae in planetis et Sole superioribus, vel ei addenda in inferioribus, quia series logarithmorum in descensum illuc decrescit, hic crescit.

Hic, quibus Keplerus explicat tabulas aequationum earumque usum, haec addenda sunt. Quam dicit „partem aequationis physicae“, producit multiplicata eccentricitate (e) in „sinum anomalie eccentrici (x) indeque oritur anomalie medio $= x + e \sin x$. „Inter-columellum“ servit ad excerptendas partes proportionales constituturque ratione anomaliae consequntae et mediae, sic ut v. e. pars prop. inter anomaliam mediam $1^{\circ} 1' 5''$ et consequntam $0^{\circ} 58' 56''$ sit $\frac{58,933}{61,083} = 57' 53''$, Hic inter $2^{\circ} 2' 10''$ et $1. 57. 51 = \frac{117,859}{122,166} = 57' 53''$ et c. porro. Forma autem tabularum haec est.

Intermedium cum logarithmo	Asymptota equequiva	Intermedium cum logarithmo	Asymptota equequiva	Intermedium cum logarithmo	Asymptota equequiva	Intermedium cum logarithmo	Asymptota equequiva
1° 0. 1. 5	3570 0° 57' 53"	0° 58. 56	101800 1784	0° 0. 2. 54	9580 0. 54. 33	0. 57. 10	545074
2° 0. 2. 10	3570 0. 57. 53	1. 57. 51	101799 1783	1° 0. 5. 48	9530 0. 54. 34	1. 54. 21	545070
3° 0. 3. 14	3560 0. 57. 54	2. 56. 47	101798 1782	2° 0. 8. 41	9520 0. 54. 33	2. 51. 31	545059
30° 0. 80. 56	3090 0. 58. 10	29. 29. 19	101559 1647	3° 1. 22. 53	8370 0. 55. 11	28. 38. 47	545040
60° 0. 53. 35	1790 0. 59. 56	59. 6. 37	100900 896	60° 2. 28. 83	4950 0. 57. 6	37. 35. 8	545069
90° 1. 4. 59	0 0. 59. 59	88. 58. 7	100000 0	90° 2. 45. 45	190 0. 59. 53	87. 14. 10	545074
178° 0. 2. 10	8630 1. 2. 12	177. 57. 49	98201 1816	180° 0. 0. 0	9760 1. 6. 10	180. 0. 0	545070
179° 0. 1. 5	8630 1. 2. 12	178. 58. 54	98200 1816	0° 0. 0. 0	1005147		166465
180° 0. 0. 0	8630 1. 2. 12	180. 0. 0	98200 1816	1° 0. 5. 34	18130 0. 50. 3	0. 54. 41	50962
0° 0. 0. 0			1005147	2° 0. 11. 7	18130 0. 50. 3	1. 49. 22	166462
1° 0. 1. 5	11260 0. 53. 37	0. 56. 40	1005139 230772	3° 0. 16. 40	18120 0. 50. 3	2. 44. 3	50960
2° 0. 2. 10	11260 0. 53. 37	1. 53. 21	1005114 230769	30° 2. 39. 14	16960 0. 51. 9	27. 26. 37	166458
3° 0. 3. 14	11250 0. 53. 37	2. 50. 1	1005073 230764	60° 4. 35. 50	9690 0. 54. 27	55. 30. 0	50957
30° 1. 27. 49	9840 0. 54. 22	28. 24. 21	997893 230047	90° 5. 18. 30	560 0. 59. 40	84. 41. 3	166446
60° 2. 49. 4	5800 0. 56. 35	57. 12. 35	978073 228041	180° 0. 0. 0	18990		50960
90° 3. 15. 57	320 0. 59. 48	86. 43. 56	951000 225234				166452
180° 0. 0. 0	11580 1. 7. 24	180. 0. 0	896660 219373				49818

Intermedium cum logarithmo	Anomalia consequens	Intermedium cum logarithmo.	Anom. secanti cum consequente parte physica.	Intermedium cum logarithmo	Anomalia consequens	Intermedium cum logarithmo.	Anom. secanti cum consequente parte physica.
46956			0°	72914			0°
46954			1°	72914			1°
75600 +	0. 48. 28	0. 59. 12	0. 12. 35	31588	0. 59. 35	1. 40. 1	0. 24
46951			2°	72914			2°
75607 +	1. 36. 57	1. 59. 11	0. 25. 12	31589	1. 59. 11	0. 40. 1	0. 49
46945			3°	72913			3°
75620	2. 25. 26	2. 58. 46	0. 37. 48	31589 +	2. 58. 46	0. 40. 2	0. 1. 14
...
43864			30°	72847			30°
77949 +	24. 25. 58	29. 48. 12	6. 0. 59	31681 +	29. 48. 12	0. 41. 54	0. 11. 54
...
42881			60°	72664			60°
84674 +	50. 1. 15	59. 39. 30	10. 25. 14	31932	59. 39. 30	0. 59. 34	0. 20. 36
...
38806			90°	72414			90°
94660 +	77. 52. 40	89. 36. 12	12. 1. 57	33277 +	89. 36. 12	0. 59. 59	0. 23. 48
...
30656			180°	71912			180°
118285 +	180. 0. 0	180. 0. 0	1. 33. 57	32972 +	180. 0. 0	1. 0. 50	0. 0. 0

Interm. seq. phys. in 10 an. etc.	Anomalia ecc. cum seque. parte phys.	Intermedium cum logarithmo.	Anom. consequens cum differentia.
26	1°	8660	0. 57. 26
	0. 2. 37	0. 55. 2	0. 57. 26
	2°	8660	0. 57. 26
	0. 5. 14	0. 55. 2	1. 54. 52
	3°	8636	0. 57. 27
	0. 7. 51	0. 55. 2	2. 52. 19

23	30°	7586	0. 57. 45
	1. 14. 59	0. 55. 37	28. 46. 23

13	60°	4464	0. 58. 39
	2. 9. 52	0. 57. 23	57. 51. 30

0	90°	152	0. 59. 55
	2. 29. 57	0. 59. 54	87. 30. 0

26	180°	8830	1. 2. 41
	0. 0. 0	1. 6. 35	180. 0. 0

Facile sexta tabularum motuum et aequationum planetarum refert ea, quae ad latitudinem pertinent. Inscriptae sunt singulae columellae: 1) Argumentum latitudinis (0° — 90°), 2) Inclinatio ad singulos gradus, 3) Mesologarithmus, 4) Reductio, 5) Curtatio.

Ad hanc tabulam praeceptum 89. (Cap. XXI.) haec affert: Argumentum latitudinis formare. Ex tabulis epocharum quaere locum nodi ascendentis, cui descendens nodus praecise ex eodem gradu et minuto opponitur in signo contrapposito diametraliter. Igitur si unius ex 5 planetis vel si Lunae locus quaeritur, aufer ejus locum nodi propioris ab invento loco eccentrico orbitae vel vicissim hunc, si praecesserit, ab illo: residuum erit argumentum latitudinis.

Præc. 90. Quia planetae proprias habent orbitas, ad eclipticam inclinatæ, per quas incedunt, calculus vero tendit ad eclipticum planetae locum verum et ad latitudinem ejus eruendam, hujus rei causa et reducendus est locus orbitae ad eclipticam et curtandum planetae intervallum, et inclinatio orbitae planetae ad eclipticam, quae est quovis eccentrici loco, addiscenda. Est autem ea angulus in centro Solis, formatus a duobus lineis loci planetae ecliptici et loci ejus in orbita. His igitur usibus serviunt tabulae inclinationum 5 planetarum. In his margo sinister descriptus est in 90° argumenti latitudinis, columella tertia exhibet competentem ei reductionem, columella quarta curtationem. In columella prima praecedit ineluctatio, in secunda ejus mesologarithmus rudiori fere et rotundo numero.

Si quis contento mesologarithmo per ipsas inclinationes vult operari, more in veteri astronomia recepto, is subtrahat inclinationem, cum gradibus integris argumenti excerptam, a proxima, et differentiam logistice multiplicet in appendicem scrupulariam argumenti latitudinis, quod prodit addat ad excerptam, ut habeat instam.

Præc. 91. De logarithmo formando intervalli curtati et de curtando intervallo, si quis eo uti vult.

Præc. 92. Locum orbitae ad eclipticam reducere.

Præc. 93. De formando angulo commutationis. Locum Solis verum subscribere loco planetae eccentrico in ecliptica et vel illum ab hoc aufer vel hunc ab illo, semper antecedentem a sequenti, ut restet angulus commutationis. Commutationis anomaliam dixerunt auctores ad distinctionem ab anomalia eccentrici, quod haec in vero orbe planetae inesset, illa extrinsecus adveniret, faciens planetam locum suum eccentricum *παράλλαν*, commutare, ex causa non insita, sed adventitia.

Præc. 94. Proportionem formare intervallorum a Sole.

Præc. 95. Angulum commutationis illum definire, in quo contingit prosthaphaeresis orbis per quamlibet datam proportionem intervallorum maxima.

Præc. 96—99. Excerpte vel computare prosthaphaeresin seu parallaxin orbis per angulum commutationis et proportionem intervallorum. Elongationem, intervallum a Sole, latitudinem indagare.

Caput XX. „Praeceptorum“ in Mes. Polkoviensibus tale est. Cum in praefatione dixerim, abjectos esse a me circulos et orbes eorumque loco introductas causas physicas, nonnulla, quae ad explicationem hujus rei pertinent, descriptioni tabb. aequationum cecui praemittenda. Hypothesium seu suppositionum vox crebra est in astronomia. Quod enim vulgo hominum interque dialecticorum coetus solet usurpari, ut alter alteri dicat: „pone hoc ita esse, quid tum postea? et quid inde sequetur?“ idem mos loquendi transit ad astronomos. Cum enim aliqua motuum planetarum accidentia diligenter et continua observatione deprehenduntur, et constantia in his apparet, tunc incipit animus quaerere, qu-

busnam ex causis hoc sic eveniat, ponitque aliquas certas et capiti computatque faciles leges, explorans, utrum ea, quae observationum testimoniis sunt confirmata, ex iis motuum legibus sequantur?

Est igitur distinguendum diligenter inter ea, quae artis periti observant, et ea, quae ponunt, ut illa observata per haec posita efficiant. Utrumque peritorum artis est, neutrum ad promiscuam vulgi notitiam pertinet; tantoque proclivius est, altera cum alteris confundere. Haec vero si bene fuerint interea distincta, tunc apparebit, quidnam ego ex veteri astronomia retineam, quid abiciam.

Non est hypothesis aut positio ficta, cum tradimus, planetas emenso curriculo in pristina reverti vestigia, sed hoc observatione constat et planetarum collatione cum fixis certis, ad quas illi post certa temporum intervalla revertuntur. Hanc restitutionem, in lato sensu vocis circularem, ego nequaquam abjicio nec convello.

Non est neque hoc fictum, vel a me abjectum, quod habet doctrinâ eideralis, planetas in oppositis coeli locis inaequalibus intervallis a Terra vel a Solis centro in linea recta discedere. Etsi enim distantia non est proprium objectum visus, at sunt argumenta propria, quibus oculorum testimonio dictatis de intervallis reddimur certi; si nimirum et corpus et motus temporum aequalium in uno coeli loco sint ad sensum parva, in opposito magna. Nam quod Fracastorius et ante eum Albategnius Arabs posuerunt, distantiam sideris manere invariata, media vero, sidus inter et visum interposita, deusiora esse ex una plaga, rariora ex contraria, apparentiamque illis majorem, hic minorem reddere, id somnio similis est, quam positioni eruditae. Dato enim, in loco coeli uno majora reddi spectabilia per hanc positionem, quid fiet planetis aliis, quorum motus et corpora eodem in loco coeli spectantur minora? Sed nihil est opus argumentatione, rem ipsam, ut par est, largior, intervallis sidera inaequalibus ire circa Terram, seu, ut cum astronomis loquar, viam siderum esse eccentricam; nunquam hoc ego negandum censui. Rursum nec haec est positio ficta, cum dicimus, centrum eccentrici Lunae spatio annorum $8\frac{1}{2}$ describere parvum circulum circa centrum Terrae. Videmus n. diametrum corporis Lunae et motus diurnos nunc in Cancro esse minimos, post annum in Leone, post in Virgine et sic deinceps, donec exactis annis $8\frac{1}{2}$ ordo revertatur ad Cancrum.

Jam vero, cum artifices quaerent, quibusnam rationibus efficeretur via eccentrica, positionibus diversis sunt usi, ex quibus hoc, quod in re est, efficeretur. Simplicissima fuit eorum opinio, qui punctum aliquod statuerunt in sublimi positoque in eo pede circini perfectum descripserunt circulum circa id punctum. Deinde, cum observatione constet, loca maximorum Lunae intervallorum non manere eadem, sed succedere invicem in consequentia, statuerunt illi, quod erat res ipsa, ut dictum, centrum hujus circuli eccentrici ferri in alio circello concentrico circa Terram. Ut vero intelligeretur, quomodo punctum ferri posset in circulos, posterius plus inducunt positionibus, additis orbibus inaequaliter crassis, quibus deferentium apogaea nomen indiderunt. Alii contra magnum concentricam ordinarunt circa centrum Terrae, in eo circulo affixerunt parvi alienius epicycli centrum, Lunam vero in superficie hujus epicycli circa ejus punctum affixionis volvi dixerunt. Hoc vero posito sequebantur eadem, quae prius. Tycho etiam duplicavit epicyclum in Lunam. Priorem simplicem positionem ego loco suo relinquere potuissem, cum nihil haberet, quo de dubitari possit, observationibus attestantibus, praeter solam perfectionem circuli; nec illam ego plane rejicio, facit enim in Luna

officium ad omnem sensus subtilitatem praebetque se calculo egregie. Quodsi sola Luna fuisset et si non ceterorum planetarum exemplum cum Luna comparatum fuisset, nunquam ne in physica quidem causarum inquisitione rejecta a me fuisset perfecte circuli. Sed quia patuit exemplo planetarum ceterorum, metrum diminutionem esse duplo majorem, quam efficere valet enjusque eccentricitatis mensura, nec ordinari loca planetae toto ambitu in circulo exacto, sed ab utroque latere sese introrsum recipere formamque ellipticam exprimere, hypothesis itaque circuli in planetis ceteris necessario rejicienda fuit, ne vitaretur calculus, neve aliud ex hac positioe sequeretur, quam observationes detegunt. Haec contemplatio consue profecit, ut tandem intelligerem, planetas omnes moveri legibus statera, seu vectis et librae, quibus legibus, si magna sit eccentricitas, elliptica via efficeretur necessitate geometrica, sin parva, proxime circulus. Discrimen quidem ellipsis et circuli non est observabile, nisi in illis planetis, in quibus exquiritur prestaphaeresis orbis anni. Ex eo fit, ut, quamvis Luna satis magnam habeat eccentricitatem, circulo tamen perfecte loco ellipses contenti esse possimus in calculo, cum prostaphaeresion orbis in Lunae motibus usus sit nullus. Attamen, quia causa nulla est, cur forma diversas in Luna statuamus motuum causas a planetis ceteris, et quia transitus etiam Lunae altae per nubem tardior deprehenditur, quam pro altitudinis modulo, ideo etiam in Luna rejecta fuit a me perfectio circuli, quantum ad causas motuum, quam tamen in calculo supra me dixi tolerare potuisse nuncquid.

En ergo causam tibi, cur in tabula aequationum Lunae, etiam primae seu solutae inaequalitatis, gradus anomaliae mediae non inveniuntur prius et rotundi in margine, sicut fit in Prutenicis et in Lunaribus, libro Progymn. Tychonis insertis. Nimirum qui gradus integros anomaliae mediae ponit, in calculum moderatur per circules, ut Ptolemaeus per epicyclum in concentrico, vel ad formam ceterorum planetarum per eccentricum cum puncto aequatorio eccentricitatis duplicis, Tycho per concentricum et duos epicyclos; ego vero rego calculum per causas metuum naturales vectis et librae, quia anomaliam mediam respondentem integris gradibus anomaliae eccentrici, nec est moram Lunae in his computo per augmentum intervalli Lunae a Terra, ut in vecte, cum pondus elongatur ab hypemecelio, difficilius movetur ab eadem virtute et sic lentius sen longiori tempore; ipsum vero augmentum intervalli computo per angulos, quos linea ex centre Terrae cum libra Lunae magnetica facit in centro corporis, tante semper minus, quanto angetur angulus, ut fieri solet in libra, in qua cum pondera sunt inaequalia, movent brachia, ut ea non maneant herizenti parallela, nec ea quiescere sinunt; naque dum angulorum proportio proportioni ponderum ex adverso respondeat.

Sed ut appareat propinquitas numerorum in calculo, per distinctas hypotheses directo, en, tibi tabellam istam; sumto enim hoc, ut aequatio Lunae omnium maxima sit 5° praecise, eligantur jam anomaliae mediae istae Tabellam hanc, quam subjunxit Keplerus in typo tabularum capiti XXV, iuserimus supra fol. 582; ipsum vero cap. XX. in manuscripto a verbis (fol. 582 i. m.) quippe de 2 sic concludit: Quae tam minuta per Lunae observationes impossibile est discernere, cum neque conditiones luminis Lunae, praesertim in marginibus, altero plerumque inconspicuo, exactam praestent de centro conjecturam et inaequalitates aliae, etiam in ipsis cepulis, de quibus hic agimus, multo sint majores, quae nulle ordine, hactenus quidem animadverso, identidem intercurrent. Itaque motus longitudo Lunae nullum hactenus discrimen facere petuit inter

has 4 hypothesium formas, at comparatio Lunae cum planetis ceteris, in quibus meliora habemus ad hanc censuram adminicula, solam unam stabilit causarumque physicarum concinnitas eximie eam illustrat.

Ex his n. 4 formis prima, applicata Martis observationibus, immane quantum peccet in prosthaphaeresibus orbis, quo argumento conctus Ptolemaeus suam illam formam introduxit, ut quantitas eccentricitatis, de qua motus diurni inaequales testabantur, in puncto quidem aequatorio remanent integra, semissis vero ejus solum in centro ipsius orbitae. Atqui cum orbita sic maneat circulus perfectus, demonstravi ego ex observationibus Martis evidentissime, planetam in longitudinibus mediis orbita hac circulari, a Ptolemaeo supposita, excedere et centro appropinquare, forma itineris elliptica, quam exprimunt meae hypotheses physicae; cum Tychonica geminati epicycli, suppositata a Copernico, planetam e contrario ad latera faciat a centro excurrere, majori damno prosthaphaerescon.

Hactenus de prima inaequalitate egimus; sequitur, ut agamus etiam de mensuris inaequalitatibus . . . Jam in manuscripto sequitur Cap. XXVI. usque ad verba: . . . *has inaequalitates effici* (v. s. fol. 584.), datado pergit: Igitur ego post diutinas contemplationes tandem omnem hunc apparatus realium deferentium, realium epicyclorum, realium hypocyclosum, in universum ipsos etiam reales illorum motus menstruos abjeci, nihilque in intervallo Lunae et Terrae, praeterquam quod volunt leges primae inaequalitatis, mutavi per mensem sydiodicum; totum vero hoc genus inaequalitatum menstruarum ex naturalibus inclinationibus et refractionibus, quae sequerentur illuminationem utriusque corporis, Terrae et Lunae silarumque magneticarum in illis, oriri demonstravi. Nihil hic novum, et reale posui (nisi hoc physicum, aut ipsam vim moventem inesse in lumine, aut virtutem motricem in moderandis suis viribus lumine pro regula uti), omnia, quae possunt videri astronomica, ex antecedenti prima aequalitate exque rationibus illuminationis antea praesentia desumal, angulorumque virtutes ex rationibus Lunae examinavi, quibus calculum moderatus sum. Etai negare non debco, vi demonstrationum geometricarum derivari, et transferri apparatus calculi ab angulis illuminatoris, ut a re minus consueti, ad circellum, quem centrum eccentrici Lunae spatio $8\frac{1}{2}$ annorum describit circa Terram, quamvis causa rei non in hoc circulo, ut circulus est, sed in illis angulis illuminatoris proprie resideat; qua ratione incurruntur ceptui astronomorum, qui circulis assneti sunt. Et tamen etiam hic circellus antea praesto est (ut initio dictum), nihil novi oritur.

Capite XXIII. praec. 100. et 101. exemplo longiori docetur ratio expedita computandi Jovis vera planetarum, et cap. XXIV. praec. 102: habitudines inferiorum ad Solem distinguere, praec. 103. proportionem indagare arcuum diurnarum eccentrici ☉ et planetarum. Praecepta 104—111. vide supra foliis 552, 561, 574 et sqq. Manuscripta Polkoviensis praec. 104, quod fol. 574 praesentimus, partem priorem eandem exhibent, quam Tab. Red. typis excusae. Pars vero posterior inde a verbis: *formabitur igitur nobis figura* cap. XI, in maeo, talis est: formabitur figura capitis XI, in qua ex uno puncto in lineam subjectam terminantur lineae quatuor: duae primae sunt analogae intervallis seu distantis ☉ a planeta et a Terra, quarum datur proportio, quae ibi dicitur proportio prima, quaeritur vero angulus, quem illae formant; duae vero posteriores sunt duae arcus diurni planetae et Solis, quorum iterum proportio datur, quae ibi secunda dicitur; dantur et anguli, quos formant prima cum tertia superioris, et secunda cum quarta inferioris, qui major recto quantitate arcus semidiurni ejus, qui erit illic quidem superior, hic vero inferior.

Constitutis igitur angulis, quos faciunt 4 istae cum recta subjecta, in quam terminantur (rectius cum linea visionis planetae) secundum praec. dicti caponis

logarithmorum, subtrahatur angulus primae (quae est prostaph. orbis) ab angulo secundae, residuum erit complem. anguli commutationis requisitae.

Exemplum cum uno superiori.

Sit indagandus angulus commutationis \odot stationarium exhibent, quando is habet compl. an. eccentrici $169^{\circ} 32'$. Praesumatur autem, anomaliam \odot tantam futuram, ut arcus diurnus ei respondens cum arcu diurno \odot constituat proportionem 10405. Erit autem tunc anomalia \odot $53^{\circ} 12'$ ejusque proportio distantiae a Terra 1092. \odot vero a \odot distantiae curtatae 32520. Itaque proportio intervallorum temporaneorum erit 31428.

Quia igitur \odot respectu Solis sit superior, ad ipsum spectabant lineae CA et AD earumque angulus CAD erit major recto quantitate arcus eccentrici semidiurni \odot , qui hoc loco eccentrici est $34^{\circ} e.$, ergo summa duorum reliquorum ad visoriam erit $89^{\circ} 43'$. Ad Solem vero, qui respectu \odot est inferior, spectabant secunda (AE) et quarta (AB), et cum arcus eccentrici Solis diurnus sit per hanc anomaliam $58^{\circ} e.$, erit ergo barum linearum angulus (EAB) $90^{\circ} 29'$, et summa reliquorum $89^{\circ} 31'$. Cum igitur distantiarum proportio pertineat ad primam (CA) et secundam (AE), sitque jam 31428, ejusque, ut logarithmi, arcus sit $46^{\circ} 55'$, positio prima anguli (intervalli \odot cum visoria) debet esse minor. (Haec sequuntur varias positiones anguli C, donec manuscriptum redit ad textum et exhibet C correctum $24^{\circ} 31'$.)

Deinde pergit manuscriptum: Alia faciliori via commutationis anguloa illos addicere, in quibus, stante aequalibet proportionem intervallorum, sunt stationes, idque praeter propter.

Praeceptum 105. Methodo jam tradita construxi tabellam in singulis planetis pro angulo isto, in cujus margine sinistro sunt numeri, indicantes proportionem intervallorum temporum. Itaque per praec. 104 constituta sit haec vera proportio intervallorum ad tempus datum, curtiorem, ubi erit necesse. Haec quaesita inter margines e regione adscriptum exhibebit angulum commutationis quaesitum. Ut quia proportio intervallorum fuit 31428, quaesita haec, 31600 quidem ut minor exhibet $170^{\circ} 5'$, 32000 vero, ut proxime major, dat $169^{\circ} 30'$. Ergo ipsa proposita dabit $170^{\circ} 0' e.$ Non est enim accuratissima iste modus; quippe cum eisdem proportioni intervallorum non exacte competat eadem proportio arcuum ex utroque latere, quod tamen in constructione tabularum brevitatis causa fuit supponendum, sc. distantia et arcus diurnus eccentrici \odot ubique medioioris.

Lunae motus et aequationes concernunt praeccepta sequentia usque ad 133, quae maxime ex parte annotationibus ad Epitomen praemissa sunt (Cap. XXV. fol. 580 ss., Cap. XXVI. fol. 584 ss., Cap. XXVII. fol. 588 s.). Itaque inseruntur tabulae scrupulorum menstruorum eorumque logarithmorum, particulae exsortis et variationis (fol. 82 s.), tabula aequationis luminis, compositae ex aequationibus menstruae portione competente reducta, particula exsorte et variatione Tychonica. (fol. 84. 85.), tabula latitudinis Lunae simplicis una cum reductione loci orbitae \odot ad eclipticam (fol. 86. 87.) et Canon sexagenarius motuum mediorum Lunae (fol. 88.).

In manuscriptis Pulvi: Keplerus sequentia ad cap. XXV. praefatur, quae postea mutato consilio ex parte ad cap. XX. retulit.

Introductio in praecceptum sequens de computando loco Lunae, seu explicatio theoriae Lunae. Etai non cogitavi, partem tabularum facere explicationem hypothesisum, quia jam dudum de hac re egi in Epit. Astr. Cop. et quia, quod amplius dici vel potest vel debet ad instructionem studiosorum, id in aliud opus reservandum videtur: magnis tamen causis tandem victis, hoc institutum circa Lunam tenere non potui.

Primum enim magna est perplexitas in aequatione triplici motus longitudinis bujus sideris, quarum duae solae Ptolemaeo et Copernico trant notae, tertiam Tycho Braheus, tabularum harum primus auctor et nuncupator, invenit et superaddidit. Quodsi hae tres aequationes per causas suas explicentur, ex 5 omnino elementis constare deprehenduntur, quae omnia ad moderandum calculum applicanda exque suis hypothesis deprendenda sunt, ne quis bujus varietatis tam operosae culpam in praecceptiones meas conferat, perinde ac si nulla sit in antecessorum praecceptis difficultas, nulla re ipsa varietas.

Secunda causa longius a sua repetenda est origo. Nota est ex Ptolemaeo

aequipollentia eccentrici et epicycli in concentrico. Ptolemaeus igitur 2 aequationes Lunae sibi notas hypothesebus ipsis discriminaturus, primae illarum, quam Luna communem habet cum planetis, hypothesis destinavit non communem ceteris; primam ac repraesentavit per epicyclum, secundae vero sen menstruae, h. e. a Solis conjunctione incipienti, tribuit eccentricum. Verum hac ratione vitiauit parallaxes et apparentem Lunae diametrum, errore in hac arte nequaquam tolerabili. Hanc igitur errorem detexit Regiomontanus, sustulit Copernicus non infelici conatu, cum eccentricum in epicyclum secundum ingeniosissime vertisset. Sed cum perfectorum circularum opinio penitus inaedisset animo summi artificis, ausus est, omnium planetarum eccentricos in epicyclos convertere, magna cum perturbatione cultorum artis, quibus eccentricus, ut simplicior, imaginatu quoque erat facillior; addo, etiam cum aliquo damno aequationum, quod demonstravi in Comment. Martis. Tycho Brabens illud inprimis curae habuit, ut omnes planetas, Copernicum imitatus, instrueret hypothesebus, inter se quam proxime posset similibus. Cum igitur in planetis ceteris pro prima inaequalitate geminos apud Copernicum invenisset epicyclos, insuper geminandum etiam in Luna primae inaequalitatis epicyclum censuit. Id enim et parallaxes eximie probabant, ut quae artificem, priusquam hoc sequeretur, non leviter torserant. Ita pro prima ista aequatione duos, pro secunda menstrua tertium uactus est epicyclum, pro tertia aequatione, cuius ipse inventor, quartus et quintus erant statuendi. Quare ut minneret metnendam ex tot epicyclorum invicem insertionem perplexitatem, epicyclum illum, qui in Luna penes Copernicum erat secundus, ex orbe concentrico decerptum ad centrum Terrae transtulit effecitque, ut concentricus ille non jam amplius esset concentricus, nisi duobus solis in mense momentis, reliquo toto tempore eccentricus, plus mansuere. Atqui hoc ille facto difficultatem captas non sublevarat, sed auxisse thronibus est visus. Sed neque dum illa semper animo destituta planetariorum theoriarum similitudine hac ratione fuit potius, ut in qua Solis quidem inaequalitati primae dedisset eccentricum, planetarum vero et Lunae primae itidem inaequalitati geminatos epicyclos. Nec dissimulavit haec incommoda, quin aperte fassus, temporariam saltem esse voluit hanc particularium hypotheseum constitutionem. Postquam ego in curam operis perferendi accessi, primum, eccentricos planetis ex Ptolemaeo restitutos eaque re Tychonem in Sole imitandum censi; quod eccentrici capiti faciliores essent, et mihi, aequantis circuli Ptolemaici causas indaganti, odoris velint cujusdam afflatu semitam monstrarent. Ut vero illam a Tychone affectatam planetarum omnium similitudinem obtinere, eccentricum etiam ad Lunae primam inaequalitatem demonstrandam introduxi, cum antecessores omnes hic usurpent epicyclum: et ecce saxum, ad quod pedem offendant, qui mihi ex veteri astronomia calculator advenit, nisi hac introductione sedulo admoneatur.

Tertio causas aequationum etiam lunarium esse naturales ex dimidio, res est, de qua dudum Tychoni superstiti suboreret, quaeque certissimis demonstrationibus a me in lucem est edita, ut quamvis, quodnam sit illud individuum, quod Lunam movet immediate, non adeo sit expeditum philosophis ad oculum demonstrare, nemo tamen, qui geometriam affert, dubitare post causae cognitionem possit, quin aequationum mensurae propriae insint in triangularum arcibus; ad has enim areas tandem reducuntur causae naturales motuum. Cum ergo id, quod est Ptolemaeo aequans, Copernico in planetis, Tychoni in Luna epicyclus secundus, quodque tertius mensurus utrique in Luna, adeoque et quod in eadem Tychoni quartus et quintus, id omne sit in vera astronomia trianguli aequatorii arcu: non censi studiosis artis, ad novitates istas stupentibus, in tot macandris motuum lunarium ad calculos revocandis claudendas hypotheseum fores, per quas lux aliqua illis irradiaret.

Quarto, cum nova haec accedat ad priores inopinata diversitas circa motuum innarium formam, quod, quaecumque veteres semimenstrua statuerunt, illa omnia, causa motuum naturalibus repertis, pateat esse semestralia, effectu plane eodem, male consilium fore calculatori censi, si eum, imbutum imaginatione veteris astronomiae, ad harum tabularum abacum admitterem, ac non statim in ipso vestibulo

praeconcepas opiniones animo expellere jussum novis et huic calculo propria imaginibus instruerem.

Quid quod cum simplicitate suppositionum lunarium, per has novationes constituta, certat mirabilis effectuum ipsorum varietas, ut primo aspectu pene videatur incredibile, ex positis tam paucis sequi tam multa. Itaque in Epitomes Astr. libro IV. p. IV. (301) et a folio 778 (461) per 40 (18) continuas facies multa quidem sunt explicata, at schema naivum exprimentae omnimodae varietati nequaquam sufficit, sed totidem omnino schematibus est opus, quot hic exhibeo.

Sed accedit ceteris causa sexta, ut praecipua, cur hic explicandam censuerim hypotbesin, quod calculus, ut esset minus morosus, ab ingenio hypotbeseos in una parte differt idque quodammodo occultat. Igitur haud cujusque fuerit, calculum hunc cum hypothesi cumque Epitoma comparare verumque ejus fundamentum eruere, nisi quia hac instructione adjuvetur. Ita spero, lectorem ponderatis his meis causis veniam prolixitati largitum et confusio rerum, quas alii libris editionibusque distinguere cognatasque in unum acervum referri pulcherris forsitan fuisset futurum, aestimaturum esse.

Jam proponit Keplerus schemata octo, de quibus supra fol. 580. diximus eaque explicat et in textu sicut in manuscripto sic pergit: Manentibus igitur ceteris literis, ad absolutam anomaliam pertinentibus, jam IM est illuminationis circuli diameter producta, cui ad rectos est STV linea copularum, et TS in Solem tendit, TV in umbrae Terrae locum, Soli oppositum; Id medietates etiam indicant globuli Terrae, superior a Sole illuminata, inferior in umbram versa suae opacitatis. Concipiuntur autem Sol et Terra respectu hujus chartae velut immobiles, ut Sol Terram a superiori loco illuminet.

Jam manuscriptum pergit: Quod igitur attinet theoriam Lunae, orbem sc. ejus circa Terram ordinatum, hoc illa ad unguem est similis planetis ceteris, quantum in sese. Movetur enim circa Terram causis naturalibus, circulum quam proxime perfectum efficientibus; nam quae ex Epit. Astr. fol. 800 (470) contra produci possunt, nullae sunt momenti. Quam ob rem etiam pingitur iter centri Lunae in forma circuli, etiam nulli sunt orbes solidi. Est autem circulus ille eccentricus, centro C (fig. 2.); quod centrum (sc. ejus linea motus CT producta) spatio annorum $8\frac{1}{2}$ sub zodiaco circumit in signorum consequentia, describens hoc motu circumcellum circa Terram, qui in schematibus omnibus est pictus; quales circellos etiam ceterorum planetarum centra eccentricorum, si datur tempus satis longum, describerent circa corpus Solis apud Tychonem. Est igitur linea apsidum (cfr. p. 581.) . . . mediocri intervallo. Erit igitur G longitudo prima, D secunda. Illic est omnis apparatus hypotheseos, quoad longitudinem. Quaecumque igitur de planetis ceteris sunt dicta, ea ratione hujus hypotheseos etiam in Lunam quadrant. Propterea etiam tabula aequationum seu anomaliae conequatae est constructa plane similis ceteris, nisi quod intervallum seu distantia Lunae a Terra non addita est, ut quae non est necessaria ad calculum. Numeratur igitur anomaliam centri in circumferentia ab A versus G, P et D, et anomaliam conequata vel ejus residuum ad complendum circumcellum numeratur in angulo CTS ad centrum Terrae, differens ab ACS angulo TSC. Tempus denique seu mora Lunae in quolibet arcu ut AS dividitur in partes duas, una est sectoris ASC area, altera est trianguli aequatorii TCS area. Cum autem haec mora sit idem; quod anomaliam media, quae est divisa in partes 360, non minus quam ipsa etiam circumferentia, hinc fit, ut pars prior seu sector exprimitur eodem numero, quo ejus arcus seu anomaliam eccentrici, pars vero posterior seu area trianguli in eadem cella est inferiori loco subjecta. Quare sicut area tota utramque partem complexa significat et mensurat moram totam in arcu, sic etiam in tabula summa duorum numerorum, in eadem cella sibi mutuo subordinatorum, exprimit totam anomaliam mediam, respondentem anomaliae conequatae, in eadem linea posita.

Haec igitur sunt illa duo prima aequationis elementa, quantitate plerumque quam proxime eadem, trianguli ejusdem aequatorii alterum TSC angulus, alterum area TSC.

Aliter prima æquatio tota in his schematibus non exprimitur, ac propterea etiam in tabulis non æquationes, sed potius coæquatæ ipsæ vel earum complementa ponuntur. Quodsi daretur certus arcus seu anomalia eccentrici, et cum eo calculator immitteretur in tabulas, ad excerptendam hinc anomaliā mediā, inde coæquatam, ei partes istæ duæ contrariarum obvirescerent affectionum. Nam area quidem addita numero arcus, angulus vero subtractus a numero arcus, constitueret anomalias, illic quidem mediā, hic coæquatam, invicem respondentes. Sed quia in principio datur non anomalia eccentrici, sed anomalia mediā ex tempore, et cum ea sit ingressus excerptiturque sola coæquata, nec exquiritur æquatio ipsa, fit ut hæc affectionum contrarietas non expendatur. Hoc tamen diligenter est notandum insignendumque memoriæ, quippe in sequentibus erit ejus aliquis usus.

Hæc igitur est tam Lunæ quam planetarum ceterorum forma theoriæ, veluti intrinseca et essentialis. Sequitur nunc, ut videamus, quid ei formæ in Luna extrinsecus accidat, quod æquationes causetur reliquas. Nimirum ipsa corporum tam Terræ quam Lunæ illuminatio ipsaque diametri illuminationis Lunæ et circumferentiæ eccentrici intersectionum permutatio vicem præstat motibus Lunæ eccentrici secundarii. De modo causationis nihil est hoc loco dicendum; videatur Epit. lib. IV. f. 383. De mensuris tunc agimus. Primum scito, quod hic ad æquationem secundam mensuram efficiendam lima copularis STV vices alicujus lineæ apsidum sustineat. Ducta enim per C dimetiens, ipsi IM parallela, quæ sit BF, secet STV in O, quod est veluti novam centrum eccentrici, et OT nova eccentricitas, efficiens non quidem utramque partium, ex quibus constat æquatio prima, sed tamen alteram, quæ est arcus SA. Hic etiam est certum veluti apogæum et oppositum perigæum. Diviso enim eccentrico Lunæ per circulum illuminationis Terræ MI in partes duas MBI et MVI, in qua parte reperitur apogæum Lunæ A, illa pars etiam lineam habet apogæi mensuræ, et contraria perigæum. Ergo S Soli apogæi vicem obtinet in linea ST, in figuris 4. et 6. contra apogæum repræsentat V.

Fig. 3.



(Ducatur linea SC.)

Synopsis eorum, quæ in hac explicatione continentur.

Æquationes motuum vel 3. vel anomalias	Soluta seu periodica ATB	Æquatio prima, conjugata in pha- sa exterior. Cujus 2. Angulus TBC. elementa 2	temperante seu se- cunda, seu area TBO, cujus coorde- nata	elementa 2as TBO, cujus coorde- nata	Reductio ad angulum.	Ex his componitur 1. Area ACB. æquatio le- minis 2. Area CTN. mensura, æque vel	per additionem, directam per subtractionem contrariam inter puncta S, R, vel V, R.
Æquationes motuum vel 3. vel anomalias	Soluta seu periodica ATB	Æquatio prima, conjugata in pha- sa exterior. Cujus 2. Angulus TBC. elementa 2	temperante seu se- cunda, seu area TBO, cujus coorde- nata	elementa 2as TBO, cujus coorde- nata	Reductio ad angulum.	Ex his componitur 1. Area ACB. æquatio le- minis 2. Area CTN. mensura, æque vel	per additionem, directam per subtractionem contrariam inter puncta S, R, vel V, R.
Æquationes motuum vel 3. vel anomalias	Soluta seu periodica ATB	Æquatio prima, conjugata in pha- sa exterior. Cujus 2. Angulus TBC. elementa 2	temperante seu se- cunda, seu area TBO, cujus coorde- nata	elementa 2as TBO, cujus coorde- nata	Reductio ad angulum.	Ex his componitur 1. Area ACB. æquatio le- minis 2. Area CTN. mensura, æque vel	per additionem, directam per subtractionem contrariam inter puncta S, R, vel V, R.

Capite XXVIII. Præceptum 132. docet Lunæ parallaxin indagare per tabulas et hanc habet appendicem. In Astronomiæ parte Opticæ tabulam exhibui parallaxium singulorum scrupulorum usque ad 66 in fronte et calce, distributarum ad singulos gradus distantiarum a vertice in margine. Ejus usus succedere potest logarithmis aut aliis computationibus per triangula, si quis illos ut rem novam et lusuetam aversatur. (Chr. vol. II, fol. 330, 434.)

Quando coelo turbido sola Luna instrumentis observari potest, ut ex ejus altitudine tempus eliciatur, priusquam ea usurpetur, corrigenda est additio parallaxeos altitudinis, ut ex via fiat vera. Vel si distantia a vertice alt observata, subtrahitur hæc altitudinis parallaxis ab ea, ut restet et hæc vera.

De cetero calculus eclipsium altitudinis quidem parallaxi hic non indiget, ut in ceteris tabulis.

Praec. 133: Parallaxes longitudinis et latitudinis discernere locumque visibilem per eas determinare, tam centri quam marginum.

Primum sit in promptu parallaxis horizontalis; deinde loci Solis ascensio recta petatur ex sua tabula una cum declinatione, puncto eclipticae culminante et angulo ejus cum meridiano respondentibus. Tunc horae et minuta post meridiem ejusque loci, quae proponuntur, conversa in gradus aequatoris addantur ascensioni rectae Solis, ut constituta sit asc. recta medii coeli. Quodsi tempus aequale sit, id convertendum erit in apparens, quod compendiosissime fit adjectione vel subtractione ab asc. recta medii coeli partium aequationis temporis, quas exhibet tabula. Quodsi sunt ad manus Tabulae Directionis Regionum montani, continuatae a Reinboldo, vel Tabulae Primi Mobilis Magini, defecta ex iis altitudine poli, quae est loco proposito, adjiciantur ad asc. rectam medii coeli tempora 90° ; quae sic conflatur ascensio obliqua horoscopi, exeat graduum orientem. Hic porro immixtus in tabulam suam et quaesitus in marginibus, sub filo datae ait. poli, in fronte et calce quaesitae, ostendet angulum orientis.

Qui vero caret his libris, is recurrat ad caput XIV. horum (v. s. fol. 677 ss.); ibi modos aliquot inveniet indagandi per hic data anguli orientis. Unus eorum sic habet, ut declinationem culminantis, si septentrionalis est, auferas ab alt. poli, si meridionalis, addas, ut habeas distantiam culminantis a vertice. Tunc enim logarithmus (hujus et anguli excerpti) conjunctis, summa ut antilog. exhibebit angulum orientis, per quem deinde etiam punctum ipsum oriens seu nonagesimus ab eo gradu indagandus est. Anguli orientis jam logarithmo ablato ab antilog. distantiae culminantis a vertice, restat antilog. arcus inter nonagesimum et meridianum; qui arcus a meridiano vergit in partes contrarias puncto aequinoctiali velino. Alter modus utitur positione anguli orientis ut notl et altitudine puncti culminantis, quae est ejus a vertice distantiae complementum ad quadrantum.

Est et tertius modus capite XIV. Cognito nonagesimo vel per se vel ex gradu oriente, numeratis in nostro hemisphaerio 90° seu 3 signis retro, compara cum eo locum Lunae verum in ecliptica. Nam si Luna fuerit illo orientalis, parallaxi propendebit in ortum, si occidentalis in occasum. Subtracto igitur altero ab altero, distantiae \odot ab illo logarithmus subseribatur logarithmo anguli orientis, pro longitudinis parallaxi, pro latitudinis vero scribatur antilogarithmus anguli orientis. Utrique demum subordinetur parallaxes totalis in horizonte logarithmus et sic pro longitudine 3 logarithmos in unam redige summam; pro latitudine 2. Hae duae summae, quaesitae inter logarithmos, ostendant parallaxes, illa longitudinis, ista latitudinis, quarum illa addita loco \odot , si orientalis est, a nonagesimo adempta, si occidentalis est, ista addita lat. verae austrinae, adempta boreali, constituunt visibilem \odot locum secundum long. et lat. Nisi forte lat. \odot bor. minor fuerit ipsa parallaxi latitudinis, tunc enim illa auferenda est ab ista restabitque latitudo visa australis loco verae borealis.

Haec itaque pro loco visibili centri \odot . Quodsi opus erit loco visibili marginum, ejus semidiameter apparens addita longitudini centri et latitudini constituit locum marginis, illic orientalis, hic plagae ejus, quam habet latitudo. Subtracta vero a centri longitudine et latitudine majori, constituit locum marginis, illic occidentalis, hic plagae contrariae, quam est visa centri et illius marginis latitudo; si autem latitudo visl centri fuerit minor semidiametro \odot , subtrahitur illa ab hac pro latitudine marginis, qui in plagam tenditur centri quidem latitudinali contrariam, propriae vero eandem.

Exemplum. Anno Christi 1625 d. 30. Jan. vel 9. Febr. vesperi Erbachii, Ulmae, Tubingae et passim in Suevia visa est ♀ quasi in complexu esse ☽ corniculatae, seu, ut alii, quasi haerere in sinistro cornu ☽, et ab eo momento paulatim veluti circumire gibbum Lunae lucidum inferiorem, ex quo intelligi datur, inter occasus ☽ et ♀ conjunctionem fuisse ☽ et ♀ centralem secundum longitudinem visibiliter, ☽ tamen borealiori. Cum autem ☽ eo die occiderit Erbachii h. 4. 53', ♀ h. 6. 47', quippe quae fuit lu 24° 42' X, lat. 0° 53' merid., eligatur ergo hora occasus ♀ 6. 47', quae per Tychoicam temporis aequationem fuit h. 6. 57' nequalis et Uraniburgi h. 7. 9', invenitur ergo locus ejus 24° 35' X in ecliptica assignatus, lat. 0° 31' merid., parallaxis in horizonte totalis 63'. Locus ☽ erat 21° 26' =, asc. r. 323° 50', ☽ locus 25° 55½' X. Invenitur asc. recta medii coeli 65° 35', culminat 7° 24' II, cujus declinatio 21° 37', angulus cum meridiano 80° 30', et quia alt. poli est 48° 30', ablata declinatione erit dist. culminantis a vertice 26° 53'. Calculus prodit ang. or. 63° 31' et distantiam nonag. a meridiano 4° 48', aen a 7° 24' II in consequentia, quia 0° V est in antecedentia: ita cohsistit nonag. 12° 12' II. Parallaxis long. 54° 44', parall. lat. 28° 4'.

Quia ergo ☽ fuit occidentallior nonagesimo, auferenda est parall. long. a loco ejus ad eclipticam redneto 25° 0' 49' X, sic parall. lat. est addenda ad australem veram latitudinem 0° 3' 33'', colligiturque viss lat. 0° 31' 38'' austr. Semidiameter ☽ fuit 16' 10'' et haec addita ad latitudinem efficit lat. marginis austr. 47' 48'' austr. Erat ergo ipsa ♀ hora occasus sui 5' australior margine ☽ inferiori; sed tunc centrum ☽ superaverat locum ♀ motu visibili paulo minus 19' (vel Solis 12' ante occasum, si tempus aequatur meustue), itaque ante occasum ♀ hora dimidia c. jungebantur centra secundum longitudinem, quando margo ☽ australis latitudinem habebat scrupulo uno ant altero minorem, ut sic ♀ a transeunte margine tegi non potuerit. Hora enim occasus ☽, quae fuit h. 4. 53', locus centri ☽ visibilis, eadem methodo computatus, reperitur in 24° 21' X, ♀ in 24° 42' X et sic 21' (vel 19') ultra ☽ et extremitatem cornuum, 5' solis ultra marginem obscurum, et margo ☽ australis eoque et extremum ejus cornu cum lat. 0° 47' visibili australi, cum ♀ haberet lat. 53', sex scrupulis majorem.

Itaque toto tempore inter intrinseque sideris occasus Lunae margo australis superior Venerae fuit transilique super eam. Quod igitur visa est ♀ ipsum ☽ cornu stringere, id fuit a dilatatione luminis Lunae in oculis spectatorum. Argumento est, quod aliis humidioris visu visa fuit in ipsum complexum luminis Lunae velut immersa. Non potest enim haec relatio trahi in argumentum latitudinis, vel Lunae majoris, vel Veneris minoris. Nam si Lunae cornu hora occasus ☽ fuisset australis ipsa Venerae, et si haec causa fuisset, quae speciem praebuerit Veneris in complexu Lunae, nulla ratione potuisset ♀ post ½ h. effugere occultationem omnimodam sub ☽ marginem, cum tamen alii diligenter observant, non fuisse tectam, sed postquam velut ad contactum lucidi cornu venit, postea circumivisse ejus curvitate marginis semper conspicuam. Habet autem haec quoque species circumitionis, quae curvam motus lineam insinuat, causam eandem, non astronomicam eam, sed opticam. Quo plus enim lucis diei superfuisset, hoc minus dilatabatur splendor Lunae, quo profundius vero in noctem ventum, hoc plus amplabatur, ut sic Lunae cornu Venerae, quamvis jam longius digressum, tamen adhuc quasi attingere videretur.

Præmissa duo præcepta (132 et 133) in manuscriptis sic audiunt:

Nro. 132. Crebrius usu venit, ut de nocte per nubila nihil possit instrumentis mathematicis capi, nisi sola Lunae altitudo, ex qua de ipsissimo temporis articulo sit ferendum iudicium. Cum autem detur ex calculo locus ☽ verus, secundum long. et lat., viciissim altitudo instrumentis offertur, non quanta ea ex centro Terrae appareret, sed vitata per parallaxis, quarum altitudinum illam veram, hanc visam appellare solent astronomi. Ut igitur certa sit argumentatio ex altitudine ☽ de tempore noctis, oportet vero loco ☽, ex calculo cognito, veram etiam altitudinem applicare, h. e. parallaxis altitudinis compensare, quod fit hoc modo. Per anomaliam ☽ vel ejus compl. ud semicirculum ex tabulae aequationum anomalie solutae excerpe parallaxis

totalem in horizonte, cujus ex Heptacosiadis sexagesimaria exscribe log. logisticium eique adde log. distantiae \mathcal{D} a vertice ex canone quadrantis, qui idem est log. altitudinis \mathcal{D} observatae; summa, in Heptacos. quaesita, exhibet in columna sexagesimaria parallaxin altitudinis, quam adde (logistice, si opus est) ad alt. visibilem seu observatam, et habebis veram. Contraria ratione tractares distantiam a vertice observatam, ut pateat vera.

Exemplum. Sit parallaxis tota horizonis $53'$, ex anomalia consequuta $136^\circ 30'$. Ejus log. est privativus — 4886. Sit alt. \mathcal{D} $29^\circ 30'$, log. 13880; hinc ablatis 4886 (quod est addere privativum), restat 8994, qui ut positivus in sexagesimaria sinistra quaesitus, ostendit $54' 50''$ parallaxin altitudinis. Vera igitur altitudo erit $30^\circ 24' 50''$.

Nro. 133. Cujus rei conficiendae doctrinam utilissimam tradidit ante annos 21 in Astr. parte Optica, nec ex eo quicquam luvni commodius. Cum igitur plurimum sit hujus parallaxium doctrinae usus in astronomia, cum Reiboldi tabulae parallacticae ad climata diversa, magna Prutenicarum pars, usu sint intricatae et difficiles ob necessitatem partis proportionalis, in tanta obliquarum ascensionum et nonagesimi eclipticae gradus varietate, cum in eclipsis \odot unici scrupuli peccato, quod in Prutenicis parallaxium tabulis facillime committitur, rei summa vertatur, noctem an diem defectus \odot sit praestatorus: hinc adeo consilium cepi, per 90 tabellas omnem nonagesimi varietatem in aperto ponere, ut eo ex Rudolphinis de promptu calculator de reliquo rationem diducendi parallaxes Lunae, secundum praeceptum in Opticis traditum, facilem habeat et expeditam.

Primum igitur per anomaliam Lunae, ut proximo praecepto, parallaxis horizonis totalis excerptur. Deinde cavendum hoc calculatori diligenter, ut cum hactenus locum Lunae collegerit ad tempus aequale ad meridiem Uraniburgicam, jam porro in parallaxibus indagandis sciat sibi redeundum esse ad tempus apparens, accommodatum certo loci meridiano, pro quo parallaxes vult computare. Quare secundum doctrinam primi mobilis per locum \odot verum ex tabula asc. rectarum excerpta est asc. recta \odot eique adjiciendae sunt horae et minuta temporis apparentis, prius per heptacosiaa redactae in partes et scrupula aequatoris, ut sic habeatur asc. recta medii coeli, cui si porro adjiciantur partes $90'$, consurgit asc. obliqua gradus orientis. Tertio, cum alt. poli borealis deligenda est tabula una ex 90 , in qua quaesita asc. obliqua horoscopi ostendet et gradum eclipticae orientem, et angulum, quem ecliptica facit cum horizonte. Haec hactenus ex doctrina primi mobilis fuerunt repetenda. Quarto, cognito gradu oriente, scitur etiam nonagesimus ante illum supra Terram, 3 scilicet signis retro numeratis. v. s. fol. 700.

Praecepta a 134. In 185. referunt calculum eclipticum usque inseriunt tabulas a fol. 89 to 102. Ad nomen aerei nomen (v. a. p. 686.) praec. 134. haec monet:

Si annus propositus currens numeratus fuerit a nato Christo retro, aufer ejus completorum numerum a proxime majori capitum periodi magnae, quae adjuncta est typo aerei numeri, alio porro seu post Christum, ejus numero ipsi adde minimum capitum ante Christum; aut si tam est prolixus, ut superet caput post Christum, aufer ab eo capitum illius completos, a residuo vel uno vel altero abjice tam proxime minorem periodi magnae, quam cyclos decemnovennales integros seu annos 19, 38, 57, 76. Quod restabit minus uno cyclo, est anni propositi aureus numerus currens, si nihil restabit, 19. Cedit autem anno primo periodi Calippicae 76 annorum (vel Judaicae 84) ante vel post meridiem diel 23. Martii novilunium medium horis totidem, quot inveniantur annotatae ad periodum antecedentem substractam. At annorum sequentium aerei possunt aberrare a novilunio mediis horis summum 36 in utrumque latus. Praecipua commoditas aerei numeri consistit in eo, quod idem indicat sedes noviluniorum per omnes anni menses.

Exemplum. Queritur aureus a. 3993 a Chr. Aufer completos 3992 a 6904 (proxime majus insertorum inter typum et cyclum magnum), reliquitur 2912. Hinc

anfer minorem 2860, restant 52, hinc aufer 38, restat 14 anrens. Et quia ad 2860 annotatae sunt h. 4. 11' ante med. noctem, has aufer a 36 horis, restant 32, sed et adde: sunt 40. Ergo novilunia media cadunt inter duo momenta, quorum alterum 40 horis antecedit dies aureo XIV signatos, alterum 32 horis sequitur.

Praec. 135. Cujusque anni mensisque Romani sive ante sive post Christum medium novilunium et pleiunium exacte promere.

Si annus propositus post Christum fuerit, cum anno in margine (tab. Epactarum fol. seq.), qui proposito eurrente proxime minor fuit, exscribe dies, horas et minuta residua ad illius anni finem, qui statuitur in meridie Uranib. 1. Jan. anni sequentis. Deinde subtraho annos epochae exscriptae finientes ab annis completis temporis propositi. Tunc cum millenariis et cum centenariis intervalli exscribe epactam novilunii; idem fac etiam cum annis infra 100, idem cum mense, propositum currentem proxime antecedente, et adde epactas temporis exscripto. Quodsi horae excreverint ultra 24, abijce 24 et pro his unitatem adde dierum numero. Ita acervabitur temporis intervallum, quanto finem mensis ante propositum completi praecedit aliquod novilunium. Hoc intervallum si subtraxeris a summa dierum proxime majori, ex canone syzygiarum excerpta, relinquentur completi dies etc. de currente mense proposito, quibus exactis contingit novilunium medianum. Si vero annus fuerit a. Chr. aera, numerus currentis ipsius auferetur ab epocha proxime majore, unitate diminuta, ut restet intervallum annorum completorum et insuper menses initiales completi de currente proposito.

Praec. 136. Pro copulis accurate deducendis aliis ex aliis, ad cujusque N.L. vel P.L. numerum dierum completorum mensis etc. adde tempora syzygiarum quotlibet ex eanonto, consurgit numerus pro N.L. alio quaesito. Unde, si excreverit in tantum, abjecti dies mensis currentis, in quo erat prius N.L., vel etiam summa dierum in anno simplici vel bissextili, residua erit summa dierum ab initio anni vel mensis sequentis, in quo fit quaesita posterior copula.

At post annos 8 (*octaeteris*) additur ad tempus copulae cognitae d. 1. h. 12. 41' 16", ut consurgat tempus copulae abhinc ceutesimae in mense Juliano eodem revertente vel initio proxime sequentis.

Post annos 76 (periodus Calippi) auferuntur h. 5. 50' 10" pro N.L. 941^{mo} sequente. Post annos 464 adduntur h. 1. 40' 14". Denique post annos 3400 adduntur non plus quam 1' 19", quae est exactissima periodus, reducens N.L. non quidem ad eundem plane locum zodiaci, at eundem in diem et horam anni mensisque Juliani.

Tabula, ad quam praemissa respiciunt praecepta, talis est.

Lunationum seu conjunctionum Solis et Lunae			
Epochae.		Epactae.	
Tempus ante finem anni in margine.		Anni soluti.	Novilunium praecedit finem anni in margine Epactis
Anno ante Ch. desistente, qui pro- ximus incipituro solutis maior est in numeratione retrograda.	4001	1.	10. d. 15. h. 11' 21" 49" 53"
	3001	2.	21. 6. 22. 43. 39. 46.
	2001	3.	2. 8. 50. 2. 18. 48.
	1001	Bist. 4.	14. 0. 1. 24. 8. 41.
	901	5.	24. 15. 12. 45. 58. 34.
	801	6.	5. 17. 40. 4. 37. 36.
	.	7.	16. 8. 51. 26. 27. 29.
	.	B. 8.	28. 0. 2. 48. 17. 22.
	.	9.	9. 2. 30. 6. 56. 24.
	.	10.	19. 17. 41. 28. 46. 17.
Anno p. Ch. desistente, qui pro- ximus incipituro solutis minor est directa.	201	.	.
	101	.	.
	1	.	.
	100	.	.
	200	99.	13. 13. 19. 6. 47. 52.
	.	B. 100.	25. 4. 30. 28. 37. 45.
	.	200.	20. 20. 19. 54. 4. 25.
	.	.	.
	900	.	.
	1000	.	.
Anno p. Ch. desistente, qui proximus incipituro solutis minor est in numeratione directa.	1100	900.	19. 23. 25. 55. 22. 10.
	.	1000.	15. 15. 12. 20. 48. 50.
	.	2000.	1. 17. 40. 38. 26. 30.
	.	3000.	17. 8. 52. 59. 15. 20.
	.	.	.
	1800	.	.
	1900	.	.
	2000	.	.
	2100	12000.	10. 10. 3. 50. 39. 2.
	.	.	.
In mensibus.		Epactae.	
Januarina . . .	1.	11.	15. 57.
Februarina . . .	29.	11.	15. 57.
Martina . . .	30.	22.	31. 54.
Martius . . .	1.	9.	47. 50.
Aprilis . . .	1.	21.	3. 47.
Majus . . .	3.	8.	19. 44.
Junius . . .	3.	19.	35. 41.
Julius . . .	5.	6.	51. 38.
Augustus . . .	6.	18.	7. 35.
September . . .	7.	5.	23. 31.
October . . .	8.	16.	39. 28.
November . . .	9.	3.	55. 25.
December . . .	10.	15.	11. 22.
		Canon Syzygiarum.	
I.	29.	12.	44. 3. 10. 51.
II.	59.	1.	28. 6. 21. 41.
III.	88.	14.	12. 9. 32. 32.
IV.	.	.	.
V.	.	.	.
VI.	.	.	.
VII.	.	.	.
VIII.	.	.	.
IX.	.	.	.
X.	.	.	.
XI.	.	.	.
XII.	.	.	.
XIII.	363.	31.	52. 41. 20. 58.

Tabula subsidiaria motuum Solis (fol. 91.) exhibet loca Solis in apogaeo ad annos currentes 4001, 3001, 2001, 1001, 901, 801 101, 1, 100, 200 3000, nec non motum apogaei ad annos solutos 1—100 et inde per centenarios usque ad 1000 indeque per millenarios ad 12000.

v. c. Anno 1 Ch. Julii d. 1. h. 10. 31' 27" — Locns ☉ apog. 8° 20' 11" II.

" 100 " " d. 2. h. 9. 48. 30. — " ☉ " 10. 2. 54 II.

" 1000 " " d. 16. h. 23. 4. 17. — " ☉ " 5. 43. 38 S.

Sic anno soluto 1. d. 0. h. 6. 15. 58. — Motus apogaei 0. 1. 2

2. d. 0. h. 12. 27. 56. — " " 0. 2. 4 etc.

Folia 92 et 92 habent „Tabulam diurnorum Solis“ sic dispositam.

Dies ante vel post ☉ apogaeum, cum interspersis diametris ☉.	Motus ☉ consequens ab apogaeo fixo, cum diurnis interpositis.	Log. distantiarum ☉ et Terrae, cum log. diurnorum inter- positis.	Nummæ differenti- arum inter diurnos, cum interspersis ho- rariis.
1.	0° 57' 3"	1784.	0.
15' 0"	0. 57. 4.	5042.	2' 23"
2.	1. 54. 7.	1783.	0.
15'	0. 57. 3.	5040.	.
3.	.	.	.
20.	19. 1. 56.	1684.	10.
15'	0. 57. 11.	4819.	2. 23.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
52.	49. 40. 4.	1139.	47.
15. 5.	0. 57. 48.	3728.	2. 25.
.	.	.	.
.	.	.	.
91.	87. 37. 56.	42.	125.
15. 15.	0. 59. 6.	1510.	2. 28.
.	.	.	.
.	.	.	.
183.	180. 23. 15.	1816.	259.
15. 32.	1. 1. 20.	2200.	2. 33.

Ex tabula subsidiaria motuum Lunæ, quæ exhibet longitudinem apogaei Lunæ et nodi asc. ab æquinotio medio ad tempora 4001 a. Ch. ad 2000 p. Ch., nec non „Canonem sexagenarium dierum in quartis revolutionum anomalias“ excerptimus laterculum, in scriptum

Canonion Revolutionum.

Revoluciones integrae.		Apogaei et Lunae ipsius.	Nodi contra signorum Seriem.
I.	d. 27. h. 13. 18' 35"	0. 8. 4. 11.	0. 1. 27. 33.
II.	55. 2. 37. 9.	0. 6. 8. 23.	0. 2. 55. 6.
III.	82. 15. 55. 44.	0. 9. 12. 34.	0. 4. 22. 39.
IV.	110. 5. 14. 18.	0. 12. 16. 46.	0. 5. 50. 12.
V.	137. 18. 32. 53.	0. 15. 20. 57.	0. 7. 17. 45.
VI.	165. 7. 51. 27.	0. 18. 25. 8.	0. 8. 45. 18.
VII.	192. 21. 10. 2.	0. 21. 29. 20.	0. 10. 12. 51.
VIII.	220. 10. 28. 37.	0. 24. 33. 31.	0. 11. 40. 24.
IX.	247. 23. 47. 11.	0. 27. 37. 43.	0. 13. 7. 57.
X.	275. 13. 5. 46.	1. 0. 41. 54.	0. 14. 35. 30.
XI.	303. 2. 24. 20.	1. 3. 46. 6.	0. 16. 3. 3.
XII.	330. 15. 42. 55.	1. 6. 50. 17.	0. 17. 30. 55.
XIII.	358. 5. 1. 29.	1. 9. 54. 29.	0. 18. 58. 8.
XIV.	385. 18. 20. 4.	1. 12. 58. 40.	0. 20. 25. 41.
XV.	413. 7. 38. 38.	1. 16. 2. 52.	0. 21. 53. 14.
XVI.	440. 20. 57. 13.	1. 19. 7. 3.	0. 23. 20. 47.
XVII.	467. 10. 15. 48.	1. 22. 11. 14.	0. 24. 48. 20.

„Canon motuum Innarum in periodicis anomalias integris, per 100 annos expansos perque centenarios et millenarios collectos“, inscriptione hac ipsa patet: ascendit ad annos 12000. Inscriptio singulas columellas ut praemissi laterculi columellas.

„Tabula ficti motus seu elongationis Lunae a loco, in quo ipsa proxime apogaea fuit
Kasperi Opera. VI.

vel erit, velut in mense vacuo, cum horario feto; pro syzygiis luminarium indagandis et pro computandis locis Lunae ad tempus propositum, si addas aequationes menstruas*, duas impiet facies (fol. 96. et 97.), propositis temporibus ab apogaeo a 0 in 13 dies, in capitibus eolumellarum inscriptis et 1—28 in margine. Adscripti sunt horarii fecti lique singulis logarithmi, ex parte „Heptacosiadis logarithmorum“, inscripta „Sexagesima scrupula“, desumti.

Tabulae „latitudinis Lunae in eclipsibus cum reductione loci Lunae ad eclipticam“, „parallaxem et semidiametri Lunae cum horario alius vero in copulis“ et „Canon sexagesarius dierum in restitutionibus integris“ finem faciunt partis III Tabularum. Lunae parallaxis ab apogaeo ad perigaeum crescit a 58' 22" ad 63' 41", semidiameter a 15' ad 16' 22", horarius s 29' 24" ad 38' 28". His adscriptum est: Etsi diameter Lunae demonstrative ex causis archetypicis cunctine admodum est deducta, observationes tamen passim desiderant majorem, forte quia aëris iunaris tanta est stitudo, ut soliditas globi demonstrativa circumcirca per eum uno scrupula vel sesqui augeatur, vel etiam majori, pro diversitate canserum physicarum. Luna etiam verticalis potest apparere dimidio scrupulo major quam in horiscentis.

Termini eclipsium Lunarium			Solarium	
Sole in	Luna apogaea	perigaea	Luna apogaea	perigaea
	10. 46.	12. 0.	15. 58.	17. 12.
	perigaeo } 10. 40.	11. 54.	16. 4.	17. 19.

Accommodati sunt bi termini ad motum Lunae fictum seu primo aequatum, non ad medium nec ad verum omnimode; similiter ad motum nodi arqualet et ad maximam inclinationem iimitis ubique praesuppositam: quia haec in diebus 18 ante et post obviatorem ☉ et ☿ parum mutatur. Praesupponitur etiam semidiameter Lunae demonstrativa, non physice ampliata.

Ex praecceptis ad eclipsium doctrinam pertinentibus (134—177) hoc tantum elegimus. (Praec. 148. v. a. fol. 592, praec. 171. fol. 593.)

Praec. 170. Eclipsis Solis initium, finis, quantitas etc. quomodo sicut computanda ad certum aliquem locum. Primum aut nescitur hora eclipsis aut scitur praeceptis. Si nescitur hora, tunc nihil prius est faciendum, quam ut computetur tempus exactum copulae cum locis ☉, ☿ et ☿ in ecliptica, et depromantur parallaxes ☉ et ☿, cum semidiametris et horariis veris. Si vero praecitur hora praeceptis, tunc ad illam computetur locus Lunae fictus et reducatur ad verum, computentur et loca ☉ et ☿ ad idem momentum. Nam exacta cognitione ipsius verae copulae non simpliciter est opus potestque parci operae, per se satis operosae in ceteris. Depromantur vero etiam hoc casu parallaxes et semidiametri ut prius.

Secundo cum distantia non Solis sed Lunae ipsius a nodo excerpatur ex tabula latitudinis eclip. reductio. Illa vero jam in hac computatione ad certum locum Terrae non est extendenda a loco Solis ut prius, cum de omnimoda eclipsatione Terrae ageretur, sed a loco Lunae versus nodum, ut habeantur locus Lunae reductus ad eclipticam.

Tertio eodem ingressu tabulae excerpatur etiam latitudo cum sua plaga.

Quarto tempus aequale Uraniburgico momenti, ad quod loca sunt computata, convertatur in apparens et reducatur ad meridianum loci; tunc ad hoc exquirantur parallaxes longitudinis et latitudinis; parallaxes autem dico non Lunae simplices, sed diminutas parallaxi Solis, quae dicuntur parallaxes Lunae a Sole. Et cum his parallaxibus locus Lunae verus, ad eclipticam reductus, veraque latitudo ejus convertantur in visibiles. Et subtractione facta loci ☉ a loco Lunae visibili, si hic superaverit, vel hujus, si antecesserit, ab illo, intervalla longitudinis et latitudinis adserventur cum titulis vel antecessionis Lunae vel superationis.

Quinto. Quodsi nulla fuerit longitudinum differentia, jam fere habes momentum obscurationis maximae et calculus eo est perductus, ut ad quantitatis

eclipseos inquisitionem progredi possis; ad initium vero et finem collectionem superest aliquid etiam tunc operari. Repetendus enim erit calculus et ad antecedentem et ad sequentem horam, nisi forte punctis aequinoctialibus aut vicinis gradibus orientibus angulus orientis per bihorium parum mutetur; tunc alterutra saltem repetitione erit opus. At si fuerit aliqua longitudo \odot et \odot visibilis differentia, siquidem Luna antecesserit, adde ad tempus apparens horas summam duas, ad locum verum in ecliptica veros horarios Lunae a Sole duos, sin Luna superaverit, subtrahæ hæc; distantiae vero Lunae a nodo priori adde vel aufer, pro re nata, horarios Lunae veros integros duos latitudinemque de novo, excerpe. Ad tempus sic mutatum repete processum parallaxium Lunae a \odot rursumque per eas veram Lunae longitudinem (respectu quidem Solis, interim immobilis suppositi) et latitudinem reducere ad visibiles et differentiam a loco Solis initio computato exquire, ut prius.

Sexto junctis jam duabus luminarium distantis visibilibus, si modò altera sit antecessoris, altera superationis Lunae (secus enim si esset, utendum esset subtractione), sic emergit motus Lunae a Sole visibilis unius vel duorum horarum. Additis enim latitudinibus visibilibus, si diversarum fuerint plagarum, vel subtracta minore a majore ejusdem plagae, habetur et latitudinis visibilis mutatio ad unam vel duas horas. Quodsi latitudinis mutatio fuerit nulla, ut contingere potest, vel exigua, per horarium visibilem \odot a \odot et praecessionem visibilem \odot facile inquiritur temporis intervallum, quanto posterius contigerit obscuratio maxima, quam est id, ad quod est inventa praecessio Lunae visibilis, et per latitudinem visibilem utrinque eandem computatur atiam quantitas obscurationis maximae, aut si omnihil inaequales, per latitudinem ergo intermediam, proportionaliter tempori antecessoris vel auctam vel diminutam. Denique et locus Solis in ecliptica exactus determinabitur per horarium ejus in tempus ductum et quotientem loco Solis primo computato adiectum.

Sin autem fuerit aliqua latitudinum visibilium inaequalium insignis vel summa vel differentia, ne igitur tunc varietatem banc satis notabilem et in diminuenda luce diei in eclipsibus magnis momenti non parvi, ne hanc inquam transcamus obiter: inquirenda erit tam distantia duorum situum, quam ejus pars seu scrupula residua usque ad obscurationis maximae locum, et distantia in ea centrorum. Rursum igitur cum distantia duorum Lunae situum, tanquam cum unius vel duarum horarum motu visibili Lunae ipsius (non \odot a \odot) et cum ejus parte, quae antecessioni Lunae respondet, indagabitur temporis intervallum ab illo momento, quo Luna antecedere inventa est, ad obscurationem maximam.

Quantitas vero defectus per semidiametros luminarium et distantiam hanc visibilem centrorum invenietur. Excipe cum diameter Solis superat diametrum Lunae, quod fit, illo in perigaeo, hac in apogaeo versante; tunc enim, quando distantia centrorum est minor differentia semidiametrorum, semper circulus manet lucidus, latitudines in medietatibus tanta, quanta est illa differentia semidiametrorum.

Denique per hanc centrorum distantiam visibilem in momento obscurationis maximae et per summam semidiametrorum Solis et Lunae scrupula dimidia durationis quaeruntur, eaque per horarium jam \odot a \odot visibilem, seu in ecliptica seu in via obliqua, convertuntur in tempus atque id additum et ablatum a momento obscurationis maximae, prodit initium et finem deliqui praeterpropter.

Potest autem locus Lunae visibilis ad hæc tria momenta, sic definita,

certitudinis causa rursum computari, et in illo quantitas defectus, in istis initium et finis corrigi, si nonnulli discrepare deprehendantur a prius inventis. Nam parallaxes saepe turbant rectitudinem et aequabilitatem motus Lunae visibilis. Quo loco praecipuus erit usus praec. 29. (*de antilogarithmorum usu*), ut ex inventa ad momentum existimatum initii vel finis distantia eclipsiae luminarium visibili et latitudine etiam visibili, tanquam duobus lateribus circa rectum, inquiratur tertium recto subtensum, quod erit distantia centrorum visibilis; quae si aequat suam semidiametrorum, merum eo momento erit initium vel finis, sin discrepet, momento temporis addendum erit vel subtrahendum et sic repetendus calculus. In maximae vero obscuracionis momento exacto locus Lunae visibilis in eclipctica semper in illam n Sole plagam vergit, ubi latitudo visibilis ejusdem denominationis est minor. Ulterius nullum est remedium generale correccionis plenariae, nisi in crebra repetitione totius calculi circa medium et attentione, qua vice distantia centrorum eliciatur omnium minima.

Exemplum eclipsiae solaris ad certum locum computandae. Erasmus Reinholdus praefatione in Theorias Puthachii ex scriptore turbarum Bohemicarum Polono meminit eclipsis Solis anno 1415. die 6. Junii hora 18, cum sint visae stellae ut noctu et aves subita caligine terrae passim et sublimi in terram deciderint. Cum ergo apponat historicus tempestatem diei, computata ad horam 18. aequalem p. m. Uraniburgicum ex subsidiariis loca sic inveniuntur: \odot $23^{\circ} 50' 28''$ Π , \textcircled{J} $22^{\circ} 54' 28''$ Π , \textcircled{V} $1^{\circ} 9' 0''$ \textcircled{S} , parallaxis \odot $0' 59''$, semidiameter $15' 0''$.

Quia ergo \textcircled{J} non abest integro gradu a \odot , scil. $56'$, pergam recta ad locum ejus visibilem, dimisso momento copulae verae. Nam distantia \textcircled{J} ab apogeeo d. 12 h. 1. dat parallaxin $63' 26''$, semidiameterum $16' 18''$, horarium $37' 55''$. Et quia locus Lunae iste fictus tantum est, quippe adhuc extra copulas, reducam eum ad verum, qui erit $22^{\circ} 50' 59''$ Π , locus \textcircled{V} $1^{\circ} 9' 6''$ \textcircled{S} . Distantia $8^{\circ} 18' 7''$ dat latitudinem $0^{\circ} 45' 51''$ borealem. Reductio $2' 8''$ addenda loco Lunae, ut versus nodum sequentem: ita fiet $22^{\circ} 53' 7''$ Π locus Lunae ad eclipcticam deductus.

Cum ergo computaverimus ad hor. 18. aequalem, \odot in 24° Π dat sequectionem temporis Tychonicam $2' 12''$ subtr. ab apparente, ergo addendam ad aequale, ut fiat h. 18. $2' 12''$. Et propter reductionem ad meridianum Pragensem adduntur $5'$, quia locus orientior. Ita tempus reductum ad meridianum est h. 18. $7' 12''$. Ad hoc igitur tempus exquisitae parallaxes \textcircled{J} a \odot per asc. obliq. $85^{\circ} 2'$ reperiuntur, long. $37' 38''$, lat. $45' 18''$. Ita manet latit. visa hor. $0' 33''$, long. $23^{\circ} 30' 45''$ Π in eclipctica, ut antecedit Luna Solem sc. $19' 43''$ visibiliter.

Addam ergo in secunda computatione tempori horas 2 et loco Lunae eclipctico vero duos horarios veros \textcircled{J} a \odot , id est $1^{\circ} 11' 4''$, ut sit locus Lunae $24^{\circ} 4' 11''$ Π , respectu quidem prioris loci Solis, quasi is in eodem loco interim haeserit. Distantiae vero a nodo $8^{\circ} 18' 7''$ adimo horarios veros duos ab aequinoctio, id est $1^{\circ} 15' 50''$, quia hic posteriori tempore \textcircled{J} est vicinior nodo, erit distantia a nodo $7^{\circ} 2' 17''$, dans latitudinem veram $0^{\circ} 38' 53''$. Cum ergo prius fuerit asc. obliqua orientis gradus $85^{\circ} 2' 15''$, post duas horas fuit $115^{\circ} 2'$, et computatur parallaxis lat. $37' 12''$, long. $32' 34''$ et visus locus \textcircled{J} $24^{\circ} 36' 45''$ Π , siquidem \odot haesisset interea suo loco. Superatio ergo $46' 17''$, quae juncta priori antecessioni dat visibilem motum bihorii $66'$.

Visa latitudo fit $1' 42''$ sept. propemodum eadem, itaque facile obscuracionis maximae momentum habetur. Nam si visibilis horarius $33' 0''$ dat horam unam, antecessiois $19' 45''$ dabunt $35' 51''$.

Fuit igitur medium hora 18. $43' 3''$ apparenti Praegae, et horarius Solis $2' 23''$, multiplicatus in tempus $36'$, dat $0' 56''$, itaque locus eclipsationis exactus est $23^{\circ} 51' 25''$ Π . Rursum si horis 2 mutatur visa latitudo per $1' 9''$, et hora una per $35''$, ergo minutis 36 debentur $21''$. In medio ergo eclipsis est latitudo visa $0' 54''$, qua ablata a summa semidiametr. $31' 18''$, restant scrupula defectus $30' 24''$, cum

diameter Solis habuerit tantum sc. 30. Defectus igitur totalis fuit Prægae, et tenebræ tanto majores, quod centrum Lunæ paulo altius centro Solis transire visum, claritatem aeris vel ætheris super Germaniam fusi (multorum miliarium altitudinem et latitudinem) occupante diametro umbræ) penitus exstinxit.

Summa semidd. 31' 18" et distantia centrorum in medio 0' 54" efficiunt scrupula dimidiæ durationis 31' 17", quibus divisus per 33' horarum visibiles, dimidia duratio fit 56' 54". Itaque quamvis eclipsis totalis erat, quia tamen a nonagesimo multum distabat, ubi parallaxis motum visibilem non multum retardat, et quia Luna velocius, eclipsis non potuit durare horas duas. Incepit igitur Præga h. 17. 46' post merid. antecedentem, desinit hora 19. 40' apparenti.

Comptet, qui habet otium, ad hæc tria momenta, deductisque parallaxibus loca visibilia constituat et distantiam centrorum exquirat, ut tempora et quantitas, si opus erit, corrigantur.

Cap. XXXIII. agit de conjunctionibus et oppositionibus aliorum planetarum, et de *ἡλίου καὶ ἀποκαταστάσει*.

Præc. 178. Conjunctiones medio planetarum sex et Ω et $0^\circ \Upsilon$ singulorum cum Sole sic indigetuntur. Ad tempus propositum colligantur motus medi Solis et eorum unus, et auferatur locus celerioris a loco tardioris, adiectis, si opus est, 12 signis; quod restat intervallum leviori ad ponderosorem (ut astrologi loquuntur), signis in gradus conversis dividatur per 6, ut prodeant scrupula restitutionis unius integræ pauciora quam 60. Cum his scrupulis ex canone sexagenario dierum, qui spectat ad quemque ærionum, excerptantur sexagenae dierum, dies et scrupula, tempus sc. desideratum. Si de oppositione queratur, aut de φ et ψ retrogradorum σ cum \odot , aut de Υ , scrupulis restitutionis integræ adimantur 30', aut si non possunt, addantur, et tunc fiat excerptio.

Præc. 179. Pro σ modis planetarum et Ω inter se mutuo, ut sciatur, quando sequatur quaelibet tempus propositum, quære σ cuiusque cum \odot proxime sequentem seorsim et aufer tempus collectum a celeriori, a tempore pro tardiori, assumto, si opus erit, tempore unius restitutionis integræ \odot ad eum vel ejus ad \odot . Tunc perlustra singulas canonum duorum lineas, attendens, quando aræe utriusque differentiam aequalem ei, quæ modo restabat, inter se faciant et in quotis numerorum membris. Quæ tempora ex aræis excerpta hoc præstant, eorum quodquo est adiciendum tempori suo ad \odot restitutionis proximæ.

Præc. 180. Quantum vero temporis intervallum intercedat inter duas proximas conjunctiones medias eorundem planetarum, sic invenies. Si duorum unus est Sol, tempora restitutionum sunt in aræis, præterquam in canone $\sigma \odot \psi$; in eo enim quararum restit. tempora sunt in aræis condita. Ergo quoties in ceteris descenditur per lineam unam, in lunari canone per 4 lineas est descendendum, ut comparari possint tempora harum restitutionum \odot ad apogæum et Ω . Si vero non est Sol duorum unus, quæro tempora in duorum aliorum canonibus aequalia, restitutionum sc. Solis ad utrumlibet et quæ summa temporis utrobique inventa fuerit eadem, illa definit periodum quaesitam.

Præc. 181. Quando denique fiat apocatastasis plurium inter se mobilium eorumve quadratorum vel oppositorum locorum, etsi operosum est, præstant tamen hi canones adjumenta opportuna. Discrimen initio notatur periodorum causa longitudinis: brevissima est \odot ad Ω , exinde \odot ad $0^\circ \Upsilon$, \odot ad apogæum, \odot ad \odot (hic centrum Terræ spectatur, ceterarum centrum est idem, quod corporis solaris). Earum brevissima ψ a \odot , tunc \odot ad Ω , \odot ad æquinoctium, \odot ad β , \odot ad γ , φ ad \odot , \odot ad σ .

Fac igitur initium a periodo breviori, ejus tempus, quod in suo canone reperitur exactum, quære in canone tardioris et constatue proportionem restitutionum utrinque per marginis numeros tempusque per areas. In quo quam fieri potest minimo tria mobilia quam proxime rursus coëant, quartasve aut oppositiones assequantur. Quodsi fuerit aliqua differentia residua temporum, secundo ingressu pèrge ad sexagecuplorum tempora in numerorum membris posterioribus aequanda exactius. Nam si in hac quoque periodo majori residua fuerit aliqua differentia, illa multiplicata aliquoties cum suis temporibus et restitutionum numeris, tandem excrecet in magnitudinem differentiae periodi minoris, itaque corrigetur, si sit aliquot majoribus adjectis vel ademeris unam minorem, quo pacto periodus constituetur tertia. Si tempus hujus periodis tertiae, quae non multis vicibus contiueatur in aetate mundi, quaesiveris etiam in canone quarti mobilis, quod restitutionem ad ☉ tardiorē habet, associa-bis et illud ad eandem apocatastasin quam proxime. Semper autem disce-pta, si qua emerget, in tardiori facilius toleratur, quippe correctione ejus motus medii tollenda, quam in eeleriori, quippe quae tardius etiam excrecit in aliquam sensibilem magnitudinem.

In Lunae motibus inter se conciliandis laborarunt vèteres; periodo nomen fecerunt *ἡδύκηνος* — evolutio. Igitur differt quarta latitudinis a quarta anomaliae per $5^{\circ} 8' 6\frac{1}{2}''$; haec differentia per omnes cano-nū lineas descensu facto non excrecit ad magnitudinem temporis huius quartae. Ergo reversus ad lineam summam, ex restitu-tione 1 factio 1 seu 60, tunc et differentia fit $5^{\circ} 8' 6\frac{1}{2}''$; itaque secundo ingressu per restit. 20 invenio diff. d. 1. $42' 42''$, quae addita priori facti diff. d. 6. $50' 49''$, aequalem fere tempori unius quartae. Quare correctio sit subtractione unius quartae qd. tardiori nasciturque periodus minima 79 quartarū anomaliae et 80 quartarū latitudinis, cujus tempus est 9 sexag. $4'$; sed anomalicum jam deficit per $2' 30'' 17''$. Hujus igitur periodi socia erit, quae habet 80 anom. et 81 lat., cujus tempus 9 sexag. $41''$. Hic adhuc superat anomaliam per $2' 37'' 50''$. Et quia hic excrevit et ille defectus sunt pene pares, altera periodus siteram corrigit, semel sumtae. Fit ita periodus secunda 159 quart. anom. et 161 quart. lat., cujus tempus 18 sexag. $16''$ etc., in qnb superat anomalicum per $7' 33''$. Cumque tempus sit trienni, in annis 180 jam fit diff. $7' 33''$ et in 1400 annis superat diem. At in motu anomaliae non pos-sumus intra hoc tempus perdere diem, in lat. ne horam quidem, quare pergendum est ad periodum exactionem. . . . Tempora colliguntur $6' 4' 10''$ etc. exceditque ano-malicum per $45''$, per canonem vero Julianorum redacta ad annos dant $61\frac{1}{2}$. (Se-quentia v. s. fol. 532.)

Præc. 182—184. Anticipationem (*προμνησις*) aequinoctiorum, peren-dinationem (*μετεμνησις*), ortus fixarum, et praecessiōem aequinoctiorum, seu quantitatem anni tropici mediam, indagare in quacunque annorum summa assumpta.

Summam annorum divisione per 60 converte in sexagenas primas, sum-mam primarum in secundas etc., cum his sexagenis et annis singulis in mar-gine canonum sexagevariorum quaesitis excerpe tempora sub Julianorum, tropi-corum et sidereorum titulis, quaeque seorsim, factaque additque convenienti excerptiorum per diversos ingressus: si tempus tropicorum subtraxeris a tem-pore Julianorum, restabit *προμνησις*, si Julian. tempus a tempore sidereo-rum — *μετεμνησις*, si denique tropicorum a sidereis — praecessio, quae aequat *προμνησις* et *μετεμνησις* jnnctas. Sed in anticipatione et perendi-natione cura, ut annorum propositorum numerus sit pariter par. (Vide Epit. Astr. fol. 527.)

Præc. 185. De apocalastasi annorum tropicorum et sidereorum, seu de anno magno coelesti.

Ætliquoque vero annorum Julianorum, tropicorum et sidereorum vestigabis methodo superiori. Invenies autem 25411 sidereos aequales 25412 tropicis, Julianorum vero et tropicorum est fere duplo tardior, nec non et Julianorum cum sidereis. Denique omnium trium in idem caput restitutio immanem summam annorum postulat, quam relinquo calculatori quaerendam.

Quem dicit Keplerus *supra* «canonem sexagenarium dierum», complectitur annos 60 et sic se habet.

In annis Julianis.				In annis Tropicis.				In annis Sidereis.			
Ann.	sexag.	d.	min.	sexag.	d.	"	"	sexag.	d.	"	"
1.	0.	6	5. 15.	0.	6	5. 14. 32.	24.	0.	6.	5. 15.	24. 9.
2.	0.	12.	10. 30.	0.	13.	10. 29.	4. 48.	0.	12.	10. 30.	48. 17.
3.	0.	18.	15. 45.	0.	18.	15. 43. 37.	12.	0.	18.	15. 46.	12. 26.
.
.
.
60.	6.	5.	15. 0.	6.	5.	14. 32. 23.	59.	6.	5.	15. 24.	8. 38.

Pars quarta tabularum præter catalogum fixarum, ex Tychois Progymn. desumptum, duas tantum refert tabulas, quas hic subjungimus ad usum præceptorum sequentium et eorum, quae fol. 550, 601 s. præmisimus.

Epochae argumenti obliquitatis et prosthaphaereseos aequinoctiorum forma quintuplici.

I. Ex sâs observationum antiquarum tota.					Anni completi.	II. Archetypa tota ex Ephemer.	III. Mista epochae ex observatione.	IV. Mista circelli diametri ex ob- servat.	V. Mista diametro circelli minoris ex observatione.
Anno Ante Christum	Post Christum	Argumentum tam.	Obliquitatis ecclesiasticae.	Prosthaph. aequinoctio- rum.					
2661	6	0° 0'	23° 53' 16"	0. adde	4000	3. 1° 56'	2° 21' 52"	11° 29' 45"	8° 29' 28"
2587	80	0. 10	53. 5	5. 16	3000	3. 6. 34	2. 28. 18	1. 1. 47	10. 17. 42
2513	154	0. 20	52. 31	10. 28	2000	3. 11. 12	3. 4. 43	2. 3. 48	0. 5. 56
2439	228	1. 0	51. 37	15. 18	1000	3. 15. 50	3. 11. 9	3. 5. 50	1. 24. 10
2365	302	1. 10	50. 25	19. 43	900	3. 16. 17	3. 11. 48	3. 9. 2	1. 28. 59
2291	376	1. 20	48. 52	23. 30	800	3. 16. 45	3. 12. 26	3. 12. 14	2. 3. 48
2217	450	2. 0	47. 6	26. 53	700	3. 17. 13	3. 13. 5	3. 15. 26	2. 8. 38
2143	524	2. 10	45. 10	28. 54	600	3. 17. 41	3. 13. 43	3. 18. 38	2. 13. 27
2069	598	2. 20	43. 4	30. 22	500	3. 18. 9	3. 14. 22	3. 21. 50	2. 18. 17
1995	672	3. 0	23. 40. 55	30. 31	400	3. 18. 36	3. 15. 0	3. 25. 13	2. 23. 6
1921	746	3. 10	38. 46	30. 27	300	3. 19. 4	3. 15. 39	3. 28. 15	2. 27. 56
1847	820	3. 20	36. 39	29. 4	200	3. 19. 32	3. 16. 8	4. 1. 27	3. 2. 45
1773	894	4. 0	34. 42	26. 47	100	3. 20. 0	3. 16. 56	4. 4. 39	3. 7. 34
1699	968	4. 10	32. 55	23. 43	Christi	3. 20. 27	3. 17. 35	4. 7. 51	3. 12. 24
1625	1042	4. 20	31. 23	19. 58	100	3. 20. 55	3. 18. 13	4. 11. 3	3. 17. 13
1551	1116	5. 0	30. 9	15. 32	200	3. 21. 23	3. 18. 52	4. 14. 15	3. 22. 3
1477	1190	5. 10	29. 13	10. 40	300	3. 21. 51	3. 19. 30	4. 17. 28	3. 26. 52
1403	1264	5. 20	28. 30	5. 21	400	3. 22. 19	3. 20. 9	4. 20. 40	4. 1. 41
3993.	1338	6. 0	23. 28. 28	0. sub	500	3. 22. 46	3. 20. 47	4. 23. 52	4. 6. 51
3919.	1255	6. 10	28. 39	5° 21"	600	3. 23. 14	3. 21. 26	4. 27. 4	4. 11. 20
3845.	1181	6. 20	29. 13	10. 40	700	3. 23. 42	3. 22. 5	5. 0. 16	4. 16. 9
3771.	1107	7. 0	30. 9	15. 32	800	3. 24. 10	3. 22. 43	5. 3. 28	4. 20. 59
3697.	1033	7. 10	31. 23	19. 58	900	3. 24. 37	3. 23. 22	5. 6. 40	4. 25. 48
3623.	959	7. 20	32. 55	23. 43	1000	3. 25. 5	3. 24. 0	5. 9. 53	5. 0. 38
3549.	885	8. 0	34. 42	26. 47	1100	3. 25. 33	3. 24. 39	5. 13. 5	5. 5. 27
3475.	811	8. 10	36. 39	29. 4	1200	3. 26. 1	3. 25. 17	5. 16. 17	5. 10. 16
3401.	737	8. 20	38. 46	30. 27	1300	3. 26. 29	3. 25. 56	5. 19. 29	5. 15. 6
3327.	663	9. 0	23. 40. 55	30. 31	1400	3. 26. 56	3. 26. 35	5. 22. 41	5. 19. 55
3253.	589	9. 10	43. 4	30. 22	1500	3. 27. 24	3. 27. 13	5. 25. 53	5. 24. 45
3179.	515	9. 20	45. 10	28. 54	1600	3. 27. 52	3. 27. 52	5. 29. 6	5. 29. 54
3105.	441	10. 0	47. 6	26. 33	1700	3. 28. 20	3. 28. 30	6. 2. 18	6. 4. 23
3031.	367	10. 10	48. 52	23. 30	1800	3. 28. 47	3. 29. 9	6. 5. 30	6. 9. 13
2957.	293	10. 20	50. 23	19. 43	1900	3. 29. 15	3. 29. 47	6. 8. 42	6. 14. 2
2883.	219	11. 0	51. 37	15. 18	2000	3. 29. 43	4. 0. 26	6. 11. 54	6. 18. 51
2809.	145	11. 10	52. 31	10. 28	2100	4. 0. 11	4. 1. 4	6. 15. 6	6. 23. 41
2735.	71	11. 20	53. 5	5. 16					
2661.	2670	12. 0	23. 53. 16	0. 0					
Ante Ch. 4000 5° 28' 58" 40"					Semid. circelli	1. 47. 40	1. 47. 40	0. 47. 10	0. 23. 35
Christi Epochae 11. 29. 14. 40 } Accurate.					Media Obliq.	24. 17. 40	24. 17. 40	24. 17. 40	23. 54. 5
Semidiameter circelli fit 0° 12' 24"					Anno ante Chri- stum	3993. 24.	Julii.		
Obliquitatis media 23. 40. 55"					Argum. 1 3° 1° 58'	1° 21' 55"	0° 0' 0"	8° 29' 48"	Obliquitatis maxima praeceise, ubi media ponitur superioris formae II. et III.
Anno ante Christum 3993. die 24. Julii					Obliq. praecise me- dia, quae superficiei orbis Terrarum sic dividit, ut duas zonas temperatas tantum- dem occupent, quan- tum tres interm. Ubi minima ponitur 22. 30', sedecima circelli.	Obliquitatis minor me- dia, ubi me- dia ponitur inferioris formae II.	Obliquitatis maxima praeceise, ubi media ponitur superioris formae II. et III.	Obliquitatis media praeci- se, ubi maxima po- nitur superi- oris orbis sic dividere ut for. II. me- dia dividit.	

Tabula motus medii argumenti obliquitatis eclipticae, pro forma obliqationis quintuplici.

I.		II.		III.		IV.		V.	
In acri solis.	Motus argumenti.	Pensio motus stellarum. Add.	Motus argumenti.	Motus argumenti.	Motus argumenti.	Pensio motus stellarum. Add.	Motus argumenti.	Pensio motus stellarum. Add.	
4	0° 0' 32' 25"	1	0° 0' 1' 7"	0° 0' 1' 33"	0° 0' 7' 41"	0° 0' 10"	0° 0' 11' 35"	0° 0' 5"	
8	1. 4. 50	2	0. 2. 13	0. 3. 5	0. 15. 22	0. 0. 19	0. 23. 9	0. 0. 10	
12	1. 37. 15	2	0. 5. 20	0. 4. 58	0. 23. 4	0. 0. 29	0. 34. 44	0. 0. 15	
16	2. 9. 40	3	0. 4. 27	0. 6. 10	0. 50. 45	0. 0. 39	0. 46. 18	0. 0. 20	
20	0. 2. 42. 5	4	0. 5. 33	0. 7. 43	0. 38. 26	0. 0. 48	0. 57. 53	0. 0. 25	
24	3. 14. 30	4	0. 6. 40	0. 9. 15	0. 46. 7	0. 0. 58	1. 9. 27	0. 0. 30	
28	3. 48. 55	5	0. 7. 47	0. 10. 48	0. 55. 48	0. 1. 7	1. 21. 2	0. 0. 35	
32	4. 19. 20	6	0. 8. 53	0. 12. 20	1. 1. 30	0. 1. 17	1. 32. 36	0. 0. 40	
36	4. 51. 45	6	0. 10. 0	0. 13. 53	1. 9. 11	0. 1. 27	1. 44. 11	0. 0. 45	
40	0. 5. 24. 10	7	0. 11. 7	0. 15. 25	0. 1. 16. 52	0. 1. 36	0. 1. 55. 45	0. 0. 50	
44	5. 53. 35	7	0. 12. 13	0. 16. 58	1. 24. 33	0. 1. 46	2. 7. 20	0. 0. 55	
48	6. 29. 0	8	0. 13. 20	0. 18. 31	1. 32. 14	0. 1. 55	2. 18. 54	0. 1. 0	
52	7. 1. 24	9	0. 14. 27	0. 20. 4	1. 39. 56	0. 2. 5	2. 30. 29	0. 1. 5	
56	7. 33. 49	9	0. 15. 33	0. 21. 36	1. 47. 37	0. 2. 15	2. 42. 4	0. 1. 10	
60	0. 8. 6. 14	10	0. 16. 40	0. 23. 9	0. 1. 55. 18	0. 2. 24	0. 2. 53. 38	0. 1. 15	
64	8. 38. 39	11	0. 17. 47	0. 24. 41	2. 2. 59	0. 2. 34	3. 5. 13	0. 1. 20	
68	9. 11. 14	11	0. 18. 53	0. 26. 14	2. 10. 40	0. 2. 44	3. 18. 47	0. 1. 25	
72	9. 43. 29	12	0. 20. 0	0. 27. 43	2. 18. 22	0. 2. 53	3. 28. 21	0. 1. 30	
76	10. 15. 54	13	0. 21. 7	0. 29. 19	2. 26. 3	0. 3. 5	3. 39. 56	0. 1. 35	
80	0. 10. 48. 19	13	0. 22. 13	0. 30. 51	0. 2. 33. 44	0. 3. 12	0. 3. 51. 30	0. 1. 40	
84	11. 20. 44	14	0. 23. 20	0. 32. 24	2. 41. 25	0. 3. 22	4. 3. 5	0. 1. 45	
88	11. 53. 9	15	0. 24. 27	0. 33. 56	2. 49. 3	0. 3. 32	4. 14. 39	0. 1. 50	
92	12. 25. 34	15	0. 25. 33	0. 35. 29	2. 58. 47	0. 3. 41	4. 26. 14	0. 1. 55	
96	12. 57. 59	16	0. 26. 40	0. 37. 1	3. 4. 28	0. 3. 51	4. 37. 48	0. 2. 0	
100	0. 13. 30. 24	17	0. 27. 47	0. 38. 34	0. 3. 12. 9	0. 4. 1	0. 4. 49. 23	0. 2. 5	
200	0. 27. 0. 48	34	0. 55. 33	1. 17. 7	6. 24. 17	0. 8. 2	9. 38. 47	0. 4. 10	
300	1. 10. 31. 12	51	1. 23. 20	1. 55. 41	9. 38. 26	0. 12. 4	0. 14. 28. 10	0. 6. 14	
400	1. 24. 1. 36	1. 9	1. 51. 7	2. 34. 14	12. 48. 34	0. 13. 5	0. 19. 17. 33	0. 8. 18	
500	2. 7. 32. 0	1. 26	2. 18. 53	3. 12. 47	16. 0. 43	0. 20. 6	0. 24. 6. 57	10. 24	
600	2. 21. 2. 24	1. 43	2. 46. 40	3. 51. 21	19. 12. 52	0. 24. 8	0. 28. 56. 20	0. 12. 29	
700	3. 4. 32. 48	2. 0	3. 14. 27	4. 29. 55	22. 28. 0	0. 28. 9	1. 3. 45. 43	14. 33	
800	3. 18. 3. 12	2. 17	3. 42. 13	5. 8. 28	25. 37. 9	0. 32. 10	1. 8. 35. 7	0. 16. 58	
900	4. 1. 33. 26	2. 34	4. 10. 0	5. 47. 2	0. 28. 49. 17	0. 38. 12	1. 13. 24. 30	0. 18. 43	
1000	4. 15. 4. 0	2. 51	0. 27. 47	0. 6. 25. 36	1. 2. 1. 26	0. 40. 13	1. 18. 13. 53	0. 20. 48	
2000	9. 0. 8. 0	5. 42	9. 15. 34	12. 51. 12	2. 4. 2. 52	1. 20. 26	3. 3. 27. 46	0. 41. 36	
3000	1. 15. 12. 0	8. 33	13. 53. 21	19. 16. 48	3. 6. 4. 13	2. 0. 59	4. 34. 41. 39	1. 2. 24	
4000	3. 0. 16. 0	11. 24	18. 31. 8	0. 26. 42. 24	4. 8. 5. 44	2. 40. 52	6. 12. 55. 32	1. 23. 12	
5000	10. 15. 20. 0	14. 15	23. 8. 55	1. 2. 8. 0	5. 10. 7. 10	3. 21. 5	8. 1. 9. 25	1. 44. 0	
6000	3. 0. 24. 0	17. 6	0. 27. 46. 42	1. 8. 33. 36	6. 12. 8. 36	4. 1. 18	9. 19. 25. 18	2. 4. 48	
7000	7. 15. 28. 0	19. 57	1. 2. 24. 29	1. 14. 59. 12	7. 14. 10. 2	4. 41. 31	11. 7. 37. 11	2. 25. 36	
8000	0. 0. 32. 0	22. 48	1. 7. 2. 16	1. 21. 24. 48	8. 16. 11. 28	5. 21. 44	0. 25. 51. 4	2. 46. 24	
9000	4. 15. 36. 0	25. 39	1. 11. 40. 3	1. 27. 50. 24	9. 18. 12. 54	6. 1. 57	2. 14. 4. 57	3. 7. 12	
10000	9. 0. 44. 0	28. 30	1. 16. 17. 50	2. 4. 16. 0	10. 20. 14. 20	8. 42. 10	4. 2. 18. 50	2. 28. 0	
11000	1. 15. 44. 0	31. 21	1. 20. 55. 37	2. 10. 41. 36	11. 22. 15. 48	7. 22. 23	5. 20. 32. 43	3. 48. 48	
12000	3. 0. 48. 0	54. 12	1. 25. 33. 24	2. 17. 7. 12	12. 24. 17. 12	8. 2. 36	7. 8. 43. 36	4. 9. 35	

Auto Ch. 4000. Initium.

Auto Ch. 4000.

Auto Ch. 4000.

Sub. 3. 47. 0.

Sub. 1. 57. 5.

Tabella correctionis obliquitatis.

Aggre- gatum.	Corr.	Aggre- gatum.	Corr.	Aggre- gatum.	Corr.	Aggre- gatum.	Corr.	Aggre- gatum.	Corr.	Aggre- gatum.	Corr.
620000	0' 1	196000	0' 12	113000	0' 33	111000	1' 4	384000	1' 45	365000	2' 36
584	2	188	14	138	36	107	8	382	50	363	42
565	5	181	16	134	39	104	12	380	55	362	48
550	4	176	18	130	42	101	16	378	2. 0	360	54
538	5	171	20	127	45	98	20	376	5	358	0
528	6	166	22	124	48	96	24	374	10	357	6
520	7	161	24	121	51	93	28	372	15	355	12
414	8	156	26	119	54	91	32	370	20	352	24
509	9	152	28	116	0. 37	88	36	369	25	349	36
504000	0 10	145000	0. 30	114000	1. 0	887000	40	367000	2' 30	346000	3. 48

Ad præc. 187 (cfr. fol. 601.) hæc invenimus annotata in manuscriptis.

Compendium. Cum perquam exigua diff. prosthaphaeresium obveniat partibus circuli, æqualiter ab extremo et citius ejus puncto remotis, licet igitur etiam sic indagare quæsitus quam proxime.

Logarithmo, qui in præcepto de obliquitate concurrebat ad aggregatum correctionis, adde cosice in forma I: 752704 +, II: 138022 —, III: 138022 —, IV: 55490 —, V: 11861 +. Et nota diligenter, summa cosica quamnam acquirat affectionem ex legibus additionis cosicæ. Nam quod sic conficitur, id mediante sua affectione ostendit in heptacoside prosthaphaeresium quæsitus æquinoctiorum. Nam si affectio positiva fuerit, excerptio fit ex sexaguarum columna, quæ est versus sinistram, si negativa, ex sexaguarum privativorum, quæ est ad dextram.

Ut si in forma IV. sit argumentum obliquitatis 156° 9', habens log. 90549, qui supra (fol. 602.) fuit adhibitus ad aggregatum correctionis, huic adde cosice 55490 —, conficitur 35059 +. Nam quod addehatur, ergo privativum, et qui debitum dissolvit, is minus retinet pecunie, et affectio hujus summae fit positiva, quare quæsitus hic numerus in heptacoside inter logg dat ad sinistram sub sexaguarum 42° 15' prosthaph. æquiu. proxime veram. Correctissima erat prius 43° 6'.

Præceptum. Stellæ fixæ, cujus longitudo ad a. 1600 post Ch. est data, longitudinem ad quodcumque tempus propositum assignare.

Principio nota tempus, nam sit ab epocha Christi numeratum retrorsum vel prorsum. Nam si datur numerus annorum a. Ch., adde ei 1600, si vero p. Ch., subtrahere vel datum a 1600, vel hoc ab illo, si id majus fuerit, ut habeas intervallum temporis. 2. Excerpe cum intervallo ex tabella sua motum fixarum competentem in millenariis, centenariis et singulis infra 100, et adde motus excerptos in unam summam. 3. Hanc summam aufer a longitudine datæ fixæ, quam illa habet anno 1600, si datum tempus antecesserit annum 1600 p. Ch.; sin sequatur, adde. Sic constituitur longitudo fixæ ab æquinoctio æquabiliter repedante. 4. Computa prosth. æquiu. cum sua affectione (+ vel —) siquidem aliqua prosth. locum habet. Nam si nulla est, locus fixæ jam rite constitutus habetur. At in casibus hypothesium præmissarum prosth. æquiu., inventa in primo semicirculo argumenti obliquitatis, erit addenda longitudini modo constitutæ, in secundo semicirculo auferenda, ut habeatur longitudo fixæ composita. 5. Siquidem tunc opereris in secunda et tertia forma obliquitatis, long. fixæ, peracta hac prosthaphaeresi, erit absoluta. At in I. IV. et V. formis ut sic quidem absoluta erit, quin potius recurrendum erit ad tabulam argumenti obliquitatis et cum epocha, quæ datum tempus proxime antecedit, excerptenda rednetio cujusque formæ ad latus argumenti adjuncta cum suo titulo (+, —). Idem faciendum etiam cum differentia inter tempus propositum et usurpatam epocham. Sed quod cum hac differentia excerptur, id addendum est ad reductionem epochæ adjectitiam, subtrahendum a subtractoria. Et tunc, si subtractio fieri non possit, deductio epochæ

subtractoria vicissim subtrahitur ab hoc ultimo excerpto, et relinquetur reductio jam adjectoria.

Quas minutas cautiones calculator circumspectus facile suapte Marte sequetur, si ad seriem respexerit reductionum adjunctarum ad epochas, attentò, numquam crescant illae, an decrescant.

Nota ad quintum membrum hujus præcepti. Cum enim duo omnino habeamus tempora, ad quae nos oportet calculo exprimere æquinoctia, seu momentum adventus Solis in 0° V vel 0° Δ , alterum sub Hipparcho, alterum sub Tycho, epochae vero motum Solis exprimant ista momenta, quatenus ipsa puncta æquinoctialia constitutus numero 3. hujus præcepti: sit jam numero quarto, ut adhibita prosthaphaeresi æquinoctiorum loca æquinoctialia illa transponantur. Quodsi transpositio fieret tam Hipparchi, quam Tychois ætate aequali spatio, facile caveremus, ut nihilominus eadem nobis æquinoctiorum momenta prodirent, additione vel subtractione cuius et ejusdem arcus per omnes epochas. At quia forma 1. 4 et 5 alias æquinoctialium locorum prosthaphaereses exhibent ad tempora Hipparchi, alias Tychois, hic variatio locorum æquinoctialium utriusque temporis intervallo, ut idem tamen maneat intervallum temporis, oportet tantundem variare motus fixarum et apogaeorum medios, ut, quod hae prosthaphaereses dederant vel demerant Hipparcho plus quam Tycho, id illi contraria ratione rursus detrahat vel restituatur. Id autem præstare censui, ut fiat per viam hanc reductionis, quam ut singulis formis novae et propriae adjungantur epochae, propriae motus fixarum celeritates, quia incertum est, an omnino fiant tales prosthaphaereses locorum æquinoctialium, cum ipsum fundamentum, circuitus poli in circulo, per omnes 5 formas sit incertum, imò ipsum primum fundamentum, non prosthaphaeresium tantum, sed omnino formarum omnium, ipsa sc. mutabilitas obliquitatis eclipticae sit incerta. Quod autem in 2. et 3. formis reductio est nulla, id fit ob tarditatem motus argumenti, et sic ob insensibilem differentiam prosthaphaeresis ad nuncquæ tempus.

Praeterea et hoc est monendum, columellas reductionum esse accommodatas ad illas Solis epochas, quae deductae sunt a novilunio creationis medio, quae æquinoctiorum Hipparchi medium utrinque reductum momentum postponent per horas fere. Itaque sic accommodata est columella formae primae, ut retineat locum apogaei creationis in 0° V, et tunc de illa postpositione momenti æquinoctialis Hipparchici emendantur horae paulo plus quam duae per hanc reductionem. Et si vero posterior epochas Solis transponi, ut cum medio aestatis seu motu mediae anomaliae in 0° Δ assequerentur novilunium creationis verum, nihilo secius eadem columella reductionis stare jussa est. Nam cum per transpositionem fundamenti solarium emendetur illa postpositio momenti æquinoctialis Hipparchici, jam accedentes nostrae prosthaphaereses æquinoctiorum formae primae anticipant quidem momentum Hipparchicum per horas amplius quam duas; at id tanti non erat, ut ideo deserendum mihi censerem locum apogaei \odot in creatione in 0° V. At in 4. et 5. formis, in quibus haec concurrit ex professo deseritur, possent columellae reductionum propius accommodari, jam enim sic sunt accommodatae, ut tollant postpositionem Hipparchicam, quod tunc non est opus, sed est de superfluo, ubi verum creationis novilunium sequitur.

6. Haec reductio, sic accommodata anno proposito, addita ad longitudinem fixae compositum vel ab ea subtracta, ut jubet ejus affectus, conficit veram ejus longitudinem secundum illam quidem formam, quae reductionem dederat. —

Præc. 189. v. a. fol. 532. Præc. 190. hoc est:

Recepta et computata prosthaphaeresi æquinoctiorum, qualis fiat deinceps astronomia reliqua. Primum loca siderum aliter sunt definienda. Computatis enim locis singulorum veris, primum quære prosthaphaereses a. 1588 in forma electa, eamque, si titulum sortitur *subtr.*, adde ad locum siderum (excepto Sole), si *add.*, subtrahere. Tunc quære prosth. anni propriam eamque secundum quod titulus exigit adde in primo semicirculo argumenti obliquitatis, subtrahere in secundo.

Præc. 191. Cum Sole agendum est aliter. Primum enim non prosth. a. 1588, sed in formis IV. et V. suus peculiaris arcus, calci pensationis subjectus, est subtrahendus perpetuo. Tunc vero per intervallum anni propositi ab a. 4000 a. Ch. ejusque epocham constituto argumento obliq. cujusque formae, quaerenda est prosthaph. aequin. et addenda vel subtrahenda ut in ceteris. Tertio per idem arg. obl. excerptatur et pensatio in I. IV. et V. addaturque secundum titulum.

Haec ita sunt disposita, ut, quia per motum \odot aequinoctia Tychonis et Hipparchi representari opus est, jam locis horum aequinoctiorum per earum prosthaphaeresin introductam in sphaera fixarum longins ab invicem discedentibus, Solis quidem motus per pensationem alteretur, quantum differentia prosth. postulat, Solis tamen et fixarum a. 1588 sit idem intervallum, quod Tycho stabilivit observationibus. Itaque ad Hipparchi tempora jam divelluntur ab invicem \odot et fixae, minus tamen quam observando consequi potuit Hipparchus; reliquorum temporum ratio nulla fuit habita, etsi discessio sit longius.

Præc. 192. Passim etiam deseruntur carceres motuum \odot , a quibus illos profluisse verisimile est (cfr. præc. 181. fol. 709.); adeo totam astronomiam suae deque fert haec incertae fidei prosthaphaeresis aequinoctiorum in calculum recepta. Qui etiam annus sideris in formis I. IV. et V. tanto dimittitur ab ejus quantitate media, quam exhibet canon, quantus sit quotiens, si per diurnum \odot medium a fixis dividas differentiam pensationum ad initium et finem sideriorum propositorum.

Præc. 193. Jam quod prosth. aequinoctiorum, variatae obliquitatis sphaera, nocuit fixarum longitudini, idem fere variatio obliquitatis ipsa nocet latitudini, ut non manere possit eadem per omnia secula, adeoque etiam limitum planetariorum inclinatio labem eandem sustineat. Nam si ponimus, non mutari obliquitatem eclipticae, nulla igitur neque latitudinum fict mutatio possumusque illi uti ut percunibus, quas Braheus singulis ad annum 1600 assignavit in catalogo. Quamquam suis seu usus ipse, ob quem inquiri solet latitudo stellae alicujus, sic est comparatus, ut variationem ejus, etsi qua esset, penitus dissimulari suadeat; sin autem omnino decretum est calculatori, operam ludere in incertis nec necessariis, age praescribam ei, quod agat, cumulate. Nam duplex est ratio computandi latitudinem: prior supponit, quod polus eclipticae libretur in coluro solitiorum, nullam pariens prosth. aequinoctiorum; ea sic habet. Ad tempus propositum inquire locum long. stellae et obliquitatem eclipticae. Ab hac aufer obliquitatem nostri temporis, siquidem fuerit minor, excessusque log. adde log. longit. stellae ab aequinoctio, summa quacsita inter logarithmos exhibet scrupula latitudini addenda vel ab ea subtrahenda.

Præc. 194. Altera computandi ratio supponit, polum eclipticae circumferri in circello. Hic primum est computanda prosth. latitudinis, non usitata ab ecliptica temporaria, sed tanquam ab ecliptica media seu a via regia. Deinde comparatis invicem prosthaphaeresibus propositi temporis et ad a. 1600, elicitur, quid mutandum sit in lat. anni 1600, ut habeatur anni propositi. Ergo collige argumentum obliquitatis et ad propositum tempus et ad a. 1600, hisque subtractis ab integro circulo residuis nomen da: longitudo nodi eclipticarum ab aequinoctio. Has nodi elongationes aufer a long. stellae, quas competit eidem tempori, ut pateat elongatio a nodo ascendente. Elongationis utriusque logarithmis adde log. semid. circelli, qui proprius est formae obliquitatis usurpatae; summae ut logarithmi dant prosth. latitudinis ad utrumque tempus, indicantes, quid utroque tempore suisset addendum vel subtrahendum, si latitudinem stellae a via regia sciremus.

Praec. 195. *Stellae fixae, cujus est data longitudo et latitudo ad a. 1600, inquirere declinationem et asc. rectam ad quodeunque tempus.* Constitnatur stellae longitudo ad tempus propositum secundam unam ex formis 5 obliquitatis, quae etiam adhibita fuit in loco ☉ absolvendo (praec. 190), deinde cum hae longitudine et cum latitudine anni 1600, perinde ac si esset illa perpetuo invariabilis, quære decl. et asc. rectam; ita conficietur decl. et asc. recta, competens tempori proposito. Etsi enim mutantur fortasse latitudines fixarum ab ecliptica, id tamen fit non motu reali fixarum, sed eclipticae ipsius discessionem a fixis et aequatore, ubi fixae et aequator, respectu quidem hujus mutationis, inter sese non conviunt.

Praec. 196. *De locis planetarum emendandis, quae Ptolemaeus observavit, ut cum calculo harum Tabularum conferri dextre possint et vicissim.* Cum Ptolemaeus id punctum fixarum habeat pro principio Υ , quod ☉ inscindit posidie ejus diei, quo nos ex his Tabulis ad illius tempora computamus verum aequinoctium, omnia ergo planetarum loca diminuit gradu c. uno et 3'; tantum igitur vel detrahe computationi harum Tabularum, vel addit locis, ab illo per fixas observatis, ut hodiernas obs. cum Ptolemaicis in eandem demonstrationem componere rite possis. Non est autem ut metuat calculator, vitium hoc unius gradus redundaturum in eclipses aut alios planetarum motus; est enim peccatum tantummodo numerationis, a posteriori puncto zodiaci inceptae, motuum tenor manet, per hoc quidem peccatum, plane idem, et dictum est alibi, potuisse exerceri astronomiam secundorum mobilium, etsi plane ignorassemus punctum aequinoctii. (V. s. fol. 525.)

Praec. 197. et ultimum astronomicorum exstat supra fol. 540. Praecepta 198–209 astrologiae dicata sunt eaque, jam in publicum emissis Tabulis Rudolphinis, anno 1629 Nagani quasi supplementum Rudolphinarum a Keplero typis mandata. Inscriptum est hoc supplementum:

Spoutula, genetbliaciis missa, de Tabularum Rudolphi usu in computationibus astrologicis, cum modo dirigendi novo, et naturali.

Quia plerique opus hoc Tabularum expetunt propter astrologiam quaeruntque, num etiam genetbliaca themata integra per nostra praeepta possint erigi directionesque expediri, visum est, doctrinam hanc praeeptis tabularum appendicis loco summittere, ut in qua et praeeptorum nonnullorum usus ostenditur et novis praeeptionibus plures tabularum quarundam utilitates explicantur.

Praeeptum 198. *De erectione thematis coelestis. Data sideris longitudine et latitudine, ascensionem ejus rectam et declinationem computare.* Arcum eclipticae propositum resolve in gradus numerationis continuatae ab aequinoctio verno; sic resolutum quaere fol. 24. 25 (supra fol. 242 s.) inter titulos asc. rect., anguli et declinationis. Arcui decl. adde vel aufer ab eo datam latitudinem. Sic formatus erit arcus angulo subtensus. Aggregatis igitur logarithmis anguli et arcus subtensi conflatur log. declinationis verae quaesitae. Deinde decl. sic inventae antilog. aufer ab antilogarithmo arcus subtensi, restabit antilog. portionis, quae auferri debet ab arcu ex margine excerpto sen ad* eum addi; sic constituta erit asc. recta quaesita. (cfr. cap. XIII. fol. 546. et praec. 190.)

Praec. 199. *Data altitudine sideris, cujus est nota longitudo et latitudo, indagare distantiam ejus a meridiano, et hujus, comparatione cum loco Solis, horam.* Usus praeepti creber est in omnibus exercitiis mathematicis. Praecipue Arabes genetbliaci parturientibus adstantes hac observandi temporis

ratione soliti sunt uti, pro eo, quod nos utimur horologiis, quae vel ponderibus vel tensione laminarum incitantur. Et communiter quidem eligitur fixa clara, sed possumus nos jam etiam uti planetis, ut evidentioris observationis, etiam Sole de die, etiam Luna de nocte turbida, cum latent stellae ceterae. Quodsi utimur Sole, sufficere potest modus cap. XII (supra fol. 649.); Lunae loco vero si utimur, tunc est computanda parallaxis altitudinis observatae eique addenda; subducenda vero de distantia a vertice, si haec, non illa, instrumentis erit quaeita. Si vero computatio loci Lunae processit usque ad visibilem, adhibitis sc. parallaxibus long. et lat., tunc in altitudine observata, i. e. visibili, nihil crit mutandum. Sive igitur Luna utimur, sive stella, extra eclipticam collocatis, primum constituenda est asc. recta et declinatio, de reliquo processus insistit triangulo later P polum, Y verticem et S sidus, in quo quacrescendus est angulus VPS, ut quem metitur arcus aequatoris seu distantia sideris a meridiano. Haec sidere cadeute additur ad ejus asc. rectam, surgente auferitur ab ea; sic constituetur asc. recta medii coeli vel jam thematis natalitii. Hoc pacto simul hora addiscitur. Nam si sidus observatum est ipse Sol, statim haec ipsa differentia elicitur tempus indicat; sin autem aliud sidus fuerit, tunc per elicitam differentiam constituta Asc. R. M. C. comparatur cum A. R. Solis et differentia utriusque detegit horas, quae, si A. R. ☉ sequebatur, a meridie sunt numerandae, sin antecedit, ablatae a 12 vel 24 relinquunt horas a media nocte vel meridie antecedente.

Praec. 200. Quomodo veniatur in cognitionem asc. obliquae horoscopi et per eam gradus orientis ceterarumque ordine domorum. Principium erigendi thematis est faciendum ab ista. Habetur autem vel ex asc. recta M. C., vel aut eam. Prior casus est, si tempus fuerit determinatum per observationem altitudinis alienius sideris, aut si horae sint indicatae, currentes a meridie vel media nocte. Si horae sunt pomeridianae, resolutae in tempora aequatoris, addantur ad ☉ A. R., sin a m. n., addantur insuper tempora 180; ita constituta erit A. R. M. C., cui additis 90 temp: et a summa rejectis 360, si excreverit, defuita erit haec asc. obl. horoscopi. His inventis excerpatur punctum eclipticae culminans; quod erit cuspis domus X; excerpantur autem simul etiam angulus et declinatio respondentes.

Praec. 201. Ad inquisitionem horoscopi seu domus I. declinationem puncti culminantis, si fuerit septentrionalis, aufer ab alt. poli, si meridiana, adde. Ita constituetur arcus VC (in triangulo inter V verticem, C culminans et N nonagesimum), prius vero angulus VCN fuit excerptus. Logarithmis vero utriusque junctis, summa ut log. dat arcum VN, cujus antilog. ab antilog. VC ablatus relinquit antilog. arcus NC et hic culminanti puncto adjectus vel demtus detegit nonagesimum seu punctum eclipticae hac vice altissimum, a quo horoscopus distat 3 porro signis.

Jam ut inquiri possent domus ceterae secundum rationalem modum Regiomontani, initio debet inquiri alt. poli, super circulum domus cujusque.

Praec. 202. Ad log. alt. poli super horizontem loci cujusque adde pro domibus XI. et III. log. 60°, pro domibus XII. et II. log. 30°, summa excerpatur arcum; hujus antilog. ablatus ab antilog. alt. poli relinquit antiogarithmum alt. ejusdem poli super circulum domus propositae. Deinde opus est asc. obl. super circulum cujusque domus, quae habetur additis ad A. R. M. C. seu domus X. tricens temporibus pro singulis ordine domibus succedentibus.

Praec. 203. His comparatis elicitur gradus eclipticae coarctans super

cujusque domus circulum. Via inartificiis quidem, at inhaeret soli asc. obliquae et ipsi circulo domus: elevationis poli super circulum domus antilogarithmum proxime inventum adde log. asc. obliquae, quae propria est illi domui; summam serva. Deinde ingredi solum ejusdem elev. poli (in tabula supra fol. 679. descripta) et conjectura facta, qui gradus praeterpropter oriatur, ejus arcus eclipticae log. adde logarithmo anguli eidem adscripti; tunc, si summa constituitur eadem, quam prius asservasti, verus ille erit gradus oriens, sin minus, conjectura est repetenda, quod fit facile, quia anguli tarde mutantur.

De directionibus secundum Regiomontanam. Praec. 204. Deducit hic auctor promissores ad circulum positionis per significatorem ducti. Hoc ut fieri possit, alt. poli super hunc circulum prius inquiri debet, qua constituta facile deinceps et asc. obl. significatoris super hunc circulum invenitur. Datam autem oportet esse declinationem et asc. rectam significatoris et hujus comparatione cum A. R. M. C. et distantiam ejus aequatoriam a meridiano. Tunc fit triangulum inter P. polum, S. significatorem et H. horizontis concursum cum circulis positionis cumque meridiano. Dantur PH, PS et SPH; ex his computatur PSH. Log. PSH adde log. PS, creabitur log. quaesita alt. poli super circulum positionis.

Praec. 205. Significatoris asc. obl. super hunc eum. circulum positionis invenitur per aliquos logarithmos; ad log. PSH adjecto log. declinationis, a summa auferatur antilog. alt. poli super circulum propositum, restabit log. diff. asc., quae addita vel ablata ab asc. recta dat asc. obl. quaesitam.

Praec. 206. Promissoris asc. obl. super circulum positionis significatoris facile inquiritur, si primum indagetur punctum coarctans ipsi super illum circulum seu in illa poli alt., vel alias vel ponendo ipsum; qui quaeritur, et positionem verificando. Si tamen promittens locus est in ipsa ecliptica, ejus singulus orientis ex tabula potest excerpti, et tunc log. anguli orientis addatur logarithmo arcus eclipticae ab aequinoctio, a summa auferatur log. elevationis aequatoris super illum circulum, reliquet logarithmum lateris aequatoris respondentis, quod determinat asc. obliquam jussam. Differentia vero asc. obliquarum significatoris et promissoris super hunc circulum est arcus directionis.

De directionibus secundum Keplerum. Chaldei rationabile putaverunt, promissores deducere ad significatores per gradus aequales eclipticae, alii per diurnos Solis medios, alii per veros, alii per eorum asc. rectas. Ptolemaeus rationabile putavit, promissorem deducere ad consimilem significatoris situm per arcum cujusque diurnorum partes similes, expenso arcu aequatoris, qui cum eorum quolibet decurreret. Regiomontanus rationabile putavit, ut ante dictum, promissorem deducere ad eundem circulum positionis, in quo fuit significator, licet non semper hic ad eandem partem circuli, quam obtinet ille, possit appellere.

Experientiam velle judicem inter hos modos statuere, oscitantium est aut, si monentem etiam sperant, credulorum et imbecillius iudicii hominum. Impossibile n. est, ad tam minuta venire experiundo, etiamsi nexum arectissimum supponamus cursus rerum humanarum cum solis omnium causarum directionibus, nedum si concesseris, causas intercurrere etiam alias. Igitur et Keplerus, autecessorum exemplis se muniens nec attenta experientia rationabile putat, significatores promovere in consequentia signorum versus promissores

per proportionem naturalem diei ad annum; si nimirum pro unoquoque anno adiciatur locis Solis et Lunae diurnus Solis, distans eodem numero dierum a die natali, quo numero annorum distat annus ab anno natali, manentibusque ceteris (puta ait. poli, hora natalitia et locis promissorum radicalibus), novum erigatur thema, ejus medium coeli et ascendens et pars fortunae (siquidem Dis placet ista ceteris) sint loca directionis horum trium significatorum. Rationes, oh quas haec proportio fiat efficax, cur sc. quod fuit die aetatis tricesima, id significet in annum tricesimum, etsi rationes non solent reddere vel rimari astrologi, contenti suis oraculis, promittere tamen videtur philosophia Samica, aut si haec non promet, nulla promet. Est autem notabile, per hoc unicum fundamentum suppositum ultro resutare missionem omnium modorum, quos jam dixi ab antecessoribus adhibitos.

Praec. 207. Dato numero annorum aetatis, assignare loca directionis quatuor significatorum. Notam habeas anomaliam ☉ coaequantur vel ejus residuum ad circulum implendum. Huic proximum motum coaequantur ex tabula diurnorum excerpe cum numero dierum, huic adde vel subtrahere numerum annorum, cum novo, qui sic constituitur, numero dierum excerpe novum coaequantur, qui comparandus est cum prius excerpto, ablato minori a majore. Quodsi ex additione ad dies resultaverit numerus major quam 183, aufer illum a 366, cum residuis diebus excerpe coaequantur alterum et tunc utroque ablato seorsim a maximo tabulae, jungantur residua in unam summam. Rursum si autē apogaeum auferri nequit numerus annorum a numero dierum ex margine excerpto, aufer huic ab illo, cum residuis diebus excerpe coaequantur alterum et ambos conjice in unam summam. Tum demum vel illam differentiam vel hanc summam adde locis radicalibus ☉ et ☌, prodibunt eorum loca directionis. Constituto loco directionis ☉ ejus asc. rectae adde horas natalitias a meridie praecedente numeratas et per eam, quae sic prodit, asc. rectam excerpe punctum culminans; id erit locus directionis M. C. Si perrexeris excerpto angulum et declinationem et operando ut supra, elicies etiam punctum eclipticae ortens, qui est locus directionis horoscopi. Huic loco adde denique distantiam ☌ a ☉ natalitiam, prodibit locus directionis Partis Fortunae, Divae Chaldaicae.


Praec. 208. Electo loco, ad quem dirigendus sit significatorum unus, seu dato loco promissoris vel ejus radii, invenire numerum annorum, quibus is venit in significatorem. Si pars fortunae significatrix est, a loco directionis electo aufer distantiam ☌ a ☉ natalitiam, relinquetur locus directionis horoscopi, in quam sic resolvitur et partis fortunae directio. Si ergo dirigendus est horoscopus ad locum, vel sic elicitum (pro absolvenda directione Partis Fortunae), vel initio electum (pro ipsius horoscopi propria directione), constituatur loci vel elicitus vel oblatus asc. obliqua, cum hac innotescit A. R. M. C., qui quod ostendit punctum culminans, is est locus directionis medii coeli, in quam sic resolvitur directio horoscopi et partis fortunae. Si rursum dirigendum est M. C. ad locum vel sic elicitum pro prioribus directionibus absolvendis, vel per se electum pro propria: ab hujus loci Asc. R. aufer tempora aequat. horarum natalitiarum, residua erit Asc. R. loci directionis Solis. Et in hanc ultimo exeunt etiam antecedentes. Sic propemodum et Luna, si dirigenda est ad locum promissoris electum; aufer ab eo loco distantiam Lunae a Sole natalitiam, restabit et sic locus directionis Solis, in quam hoc modo etiam Lunae directio resolvitur. Tandem igitur, si dirigendus erit ☉ ad locum aliquem eclipticae, dinumera (in quacunque Ephemeride cum


motu \odot Tychonico) intervallum dierum, quibus \odot e loco natalitio movetur ad locum promissoris, et quot erunt intermedii dies, totidem annos pronuntiatio. Si \odot non utroque in meridie loca illa praecise obtinet, expende differentias et eam, quae existit in meridie natalitio, aufer ab ea, quae in meridie directionis, cum residua iudaga horas appendices, pro binis singulos addens menses; sic indagatum erit tempus directionis, non \odot tantum ad suum locum promissoris electum, sed etiam ceterorum significatorum ad illa loca, ex quibus ultimo locus hic directionis \odot erat elicitus.

Præc. 209. *Dato numero annorum alicujus accidentis electoque ejus et promissore et significatore, qui sit vel Horoscopus vel Medium Coeli vel Pars Fortunae, corrigere tempus natalitatis et sic, locum significatoris.* Pone, quae ponunt astrologi, fides sit penes opinionem ejusque de quolibet accidente. Igitur per datum numerum annorum exquirere locum directionis \odot ejusque asc. rectam. Deinde per electum locum directionis Partis Fortunae constitui locum directionis horoscopi, per hunc loci directionis M. C. A. R., a qua aufer loci directionis \odot Asc. rectam prius constitutam, relinquuntur tempora aequatoria, quae in horas conversa dant correctum tempus natalitium. Eadem tempora addita ad asc. rectam loci \odot natalitii dant A. R. M. C. radialis et per hanc ipsum M. C. correctum, et per processum superiorem etiam horoscopus correctum, ut et Partem Fortunae, quam tradunt astrologi. —


Haec hactenus in gratiam gentis astrologicae, ne mater vetula (qua similitudine sum usus in praefatione ad lectorem) se destitutam et despectam a filia ingrata et superba queratur.

FINIS.





**DE OBSERVATIONIBUS
REGIONMONTANI ET WALTHERI.**



CONSIDERATIO OBSERVATIONUM REGIOMONTANI ET WALTHERI.

Circa finem praefationis in Tabulas Rudolphinae (supra fol. 674) monet Keplerus, observationes Waltheri et Regiomontani testari, de aequationibus secularibus nobis esse cogitandum, quod singulari libello redditurus sit demonstratum suo tempore. Hic libellus non quidem absolutus est, sed inchoatum nos deprehendimus inter manuscripta Pulkoviensia illoque quasi appendice ad ea, quae in praemis de Tabulis Rudolphinis excerpimus, volumen hoc sextum concludere censuimus.

Inscripsit hanc disquisitionem „Considerationes observationum“, secutus librum, quem edidit Willebrordus Snellius Lugduni Batavorum anno 1618 inscriptum: *Coeli et siderum in eo errantium observationes Hassiacae, Illustrissimi Principis Wilhelmi, Hassiae Landgravii, auspiciis quondam institutae. Et specilegium biennale ex observationibus Bohemicis V. N. Tychonis Brahe. Quibus accesserunt Joannis Regiomontani et Bernhardi Waltheri observationes Noribergicae.*

Praemittit Keplerus „considerationibus“ sua verba Snellii (Regiomontani vel Waltheri) eaque nos eum secuti typis exprimi curavimus minoribus. Incipit Keplerus ab observationibus Saturni, anno 1461 habitis.

1461. d. 2. Decembris in initio noctis vidit Jo. de Montereio Romae Martem et Saturnum, qui secundum longitudinem zodiaci censebantur conjuncti ex numeris almanach, quod tamen visui non apparuit. Tunc enim consideranti mihi duae stellae fixae, quae sunt in capite ζ , eum stella Marte aestimabantur in una linea recta. Utraque autem harum stellarum fixarum in fine 27° ζ deprehendebatur, si vera est modernorum de motu octavae sphaerae positio. Saturnus autem tunc habebat 29° ζ , quemadmodum calculus edocebat. Distantia autem inter η et ζ aequabat eam, quae inter duas stellas dictas est, distantiam, quae quidem 2° fere complectitur. Si itaque locus harum duarum stellarum fixarum bene comprehensus fuit itemque locus η gemino iudicio, oportuit ζ esse in fine 27° ζ , qui tamen per numerationem in fine 29° , quemadmodum η , reperiri debuit. Ecce error in 2° . Dio 5. Dec. visu videbantur conjuncti, sed nubes impedimento fuit. Verum in principio noctis 6. Dec. aspiciens vidi ζ jam praeterivisse η per $1\frac{1}{2}^{\circ}$, distantia enim inter eos erat fere sesquialtera ad distantiam, quae inter duas stellas capitis ζ est. Luna tunc aspectui videbatur cum duabus stellis, quae in cauda ζ sunt, constituere triangulum aequilaterum.

Locus δ $1^{\circ} 11\frac{1}{2}'$ ~~long.~~ lat. $1^{\circ} 15'$ austr., δ lat. c. $0. 27'$ austr., diff. $0. 48'$ decurtat intervallum $1^{\circ} 35'$, ut longitudinis diff. relinquatur $1^{\circ} 22'$. δ ergo refertur per hanc observationem in $29^{\circ} 49\frac{1}{2}'$ \odot . Et quia δ d. 1. Dec. visus in linea cornuum \odot , computatur non ultra $11'$ plus habere (nam in Martialibus probatum est, pro 2. Dec. legendum 1. Dec.) quare etiam δ locus p. p. hic ipse erit $29^{\circ} 50'$ \odot aut minimum $29. 38$ \odot . Ego vero compute locum δ $29^{\circ} 14\frac{1}{2}'$ \odot , deficit ergo calculus hoc loco in δ per $23\frac{1}{2}'$ aut $35'$. Die 14. Dec. computatur \odot in $0. 44$ ∞ , statim conjungenda δ , lat. 1. 44. austr., superans lat. δ $1\frac{1}{2}'$. Ausp. pro diebus 8 ser. 53, δ 14. Dec. in $29. 51$ \odot . Ecce consensum duarum observationum.

Observatio B. Waltheri d. 17. Sept. 1475 h. 2-3 post medium noctis. Inter δ et δ $0. 52'$, conjunctio d. 18. Sept. Computo vero lat. δ $1^{\circ} 8'$, long. 5. $38\frac{1}{2}'$ \odot d. 23, mediando inter magnos errores radii invenio per 15 plus quam computo, ex quo non fido argumento calculi in δ hic defectus augetur. Quare etiam δ in $5^{\circ} 38\frac{1}{2}'$ \odot vel exiguo anterior, aut infida conjectura in $5^{\circ} 54'$ vel exiguo anterior constitisset. Atqui computo nihil ultra $4^{\circ} 42'$ \odot lat. c. $0. 24'$ sept. Hoc igitur loco \odot est ratione eccentrici in 29° \odot , reperitur insignis defectus calculi c. $0. 57'$, aut infida conjectura plane $1^{\circ} 12'$. Diff. lat. est $0. 44'$ e. satis propinqua observationi pridianae.

Anno 1476. 25. Mart. h. 2. noctis vidi δ prope primam Cancri, videbatur implicitatem nebulosam, trabendo lineam a quarta Cancri in quintam ejusdem, non comprehendebam δ in eadem linea, sed fuerat in medio occidentalis ab hac linea, ut videbam, ad latitudinem duorum digitorum transversalium; discordat cum tabulis. Item δ fuerat in eodem arcu cum quarta et prima Cancri, fueratque medius eorum, tantum distans ab una quantum ab alia, sicut visu deprehendi.

Differentia longitudinis primae et quartae $1^{\circ} 22'$, et quia δ spectatus est exacte medius, praesepe vero in $0. 0$ \odot , δ igitur venit in $0. 41$ \odot . Sic cum sit lat. praesepti $1^{\circ} 14'$ bor., aselli $0. 4$ austr., diff. lat. 1. 18, dim. $39'$ ablatum a $1^{\circ} 14'$, reliquit δ latitudinem per hanc acatipationem aequalum distantiae $0. 35'$ bor., quam computo $0. 43\frac{1}{2}'$ e. Quartae et quintae sen Asellerum loca sunt $0. 11'$ \odot , lat. $3^{\circ} 8'$ b. et 1. 22 \odot , lat. $0. 4'$ a. Diff. lat. $3^{\circ} 12'$ habet diff. long. $1^{\circ} 11'$ adhaerentem. δ vero jam metus est lat. $0. 35'$, computatam $0. 43'$, ut differat ab austrino $0. 39$ vel $0. 42\frac{1}{2}'$. Hinc igitur differentiae in linea ipsa stellarum debetur diff. long. $14\frac{1}{2}'$ vel $18\frac{1}{2}'$, et locus 1. $7\frac{1}{2}'$ \odot vel 1. $3\frac{1}{2}'$. At δ dicitur ab hoc loco lineae in occid. distitisse. Recte! inventus n. est in $0. 41$ \odot et per lat. computatum in $0. 49'$ per priorem lineam. Affirmat quidem observator hanc discessionem 2 digitis, qui sunt 5 vel 6', ut hic veniret δ locus $1^{\circ} 2'$ \odot vel $0. 58$ e.; at haec aestimatio discessionis fixae a coeco puncto lineae est fallax. Estque per hanc observationem locus δ satis fidus $0. 49$ \odot , cum ego nihil ultra $0. 6$ \odot computem, defectu calculi (e. 6 \odot eccentrici ratione) $48'$.

1476. 13. Oct. ante ortum Solis medium inter δ et octavam \odot sin. 1. 30, sin 2. 10 \times 2. (v. infra fol. 745.) Dist. δ et cordis \odot $1^{\circ} 35'$ est parva, quare non multum fallit. 14. Nov. 1. $13\frac{1}{2}'$; hic inventus est stationem peregrinae 17. 18. 20. Nov. Cum igitur cor \odot fuerit in $22. 30$ \odot , lat. $0. 26'$, δ lat. computatur 1. 10. bor., diff. lat. $0. 44'$. De distantia $1^{\circ} 13'$ videntur longitudini $0. 58\frac{1}{2}'$, ut fuerit visus in $21^{\circ} 32'$ \odot . Atqui compute non plus quam $20. 46\frac{1}{2}'$ \odot , continuatur igitur etiam in 15° \odot defectus calculi.

Anno 1477. 5. Sept. de mane quasi h. 3. post medium noctis vidi δ et δ distantes (sicut visu apparuit) ad modum palmi, habentes eandem latitudinem, ita quod eodem die procul dubio conjungebantur punctualiter, fueratque Saturnus Marte orien-

tallor spatio praedicto. Latitudinem enim eorum fere praecise eandem inde supposui, quia, considerando arcum transitus \odot ante et post transeundum, similiter polum ejusdem arcus, videbatur haec distantia fere longitudinis tantum, neque difficile inspectu, solum fuerat cognoscere in tam modica eorum distantia. O quanto affectu eorum vidissem conventum, quia verisimili conjectura unus eclipsabat alterum; rarissimus autem eventus ille.

Apparet, inceptam esse observationem aliquam, quae quaecumque fuerit, a typographo est praeterita. Nam quae sequitur observatio instantis \odot β \odot , ea pertinet ad 9. Oct., cum distabant planetae latitudinis ejusdem ad modum palmi, \odot occidentaliore. Quod enim haec observatio pertinet ad 9. Oct., patet ex seq. 15. Oct., cum mane inter b. 4. et 5. fuit dist. \odot et β $2^{\circ} 47'$. Nam cum hoc situ diurnus \odot sit 36 , β 6 , superatio 30 , diebus igitur 6 superatur β 3° , de quibus $2^{\circ} 47'$ sunt 15. Oct. in ortum, ergo residui $13'$ d. 9. Oct. in occasum. Atqui hic plane est modus palmi. Cum igitur computem 9. Oct. locum \odot 1. 50 MP , lat. 1. 27. b., oportet β fuisse in $2^{\circ} 3'$ MP , latitudinis non multo alia. Si tamen d. 15. Oct. pila fides est meditationi inter errores radil, \odot tunc per cor et eandem \odot inventus est $25'$ ulterius quam per calculum. Sed et per solitarium cor \odot deficeret calculus $10'$. Itaque β 9. Oct. tanto fuisset ulterior, sc. vel in 2. $13'$ MP , vel in 2. 28 MP . Atqui computo β non ultra 1. $23\frac{1}{2}$ b., lat. 1. 24 b. Hic lat. egregie consentit, longitudinis calculus in loco ecc. 27° \odot deficit ut hactenus vel 0. 40, vel 0. 50, vel $1^{\circ} 5'$.

1478. 19. Apr. post ortum Solis medicum. Inter β et octavam \odot $5^{\circ} 47'$, β et sextam \odot $3^{\circ} 3'$.

β a corde \odot (lat. 0. 26 b.) $5^{\circ} 47'$, a cervice (lat. $8^{\circ} 47'$ b.) $9^{\circ} 5'$. Erantque in 22. 33 et 22. 15 \odot . Computatur vero lat. β $1^{\circ} 48'$, hinc vindicatur differentiae latitudinum 5. 37 et 6. 21, et sic β in 28. 10 \odot vel 28. 36, medium 28. 23 \odot ; sed radius excessu peccat, et plus in majore. Computo vero 27. 18, tanto minus, ut non totum a radio peccari possit. Adhuc igitur deficit calculus in loco ecc. 3. MP .

1478. 24. Sept. 40' ante ortum Solis vidi Lunam circa β , quasi conjunctos; distabat Luna medicum ad septentrionem, ita ut inter circumferentiam ejus et β videretur mediare spatium unius palmae.

Computo long. \odot visam in $12^{\circ} 15'$ MP , lat. centri visam $2^{\circ} 18\frac{1}{2}'$ bor., marginis igitur austr. $2^{\circ} 2\frac{1}{2}'$ b., β vero lat. $1^{\circ} 45'$ b., ut intersit $17\frac{1}{2}'$, quae est quantitas semid. \odot seu sesquipalmi, quod satis congruit. At long. β computatur $11^{\circ} 32'$ MP , itaque deficit calculus per $43'$, in loco eccentrico 9° MP .

1479. 30. Oct. fuit \odot et β et \odot secundum longitudinem, β vero fuerat septentrionalior quasi ad 1° , \odot fuerat propinquissimus 6° MP .

Sexta MP erat hoc tempore in $27^{\circ} 34'$ MP , lat. $1^{\circ} 25'$ b., \odot locus propinquissimus illi. Cum vero non additum sit, praecesserintne \odot an secutus sit fixam, ex analogia dierum seqq. observationisque habitae d. 16. per radium colligitur, vere praecessisse \odot ut calculus vult. Sat igitur fidus cum sit locus \odot in 27. $28\frac{1}{2}$ MP , computo tamen locum β non ultra $26^{\circ} 50'$ MP , cum locus eccentricus sit $22\frac{1}{3}$ MP , deficiente calculo per $38'$.

Anno 1481. 22. Oct. ante ortum Solis fere 1 h. vidi β et \odot distantes, sicut visu judicavi, non ultra diametrum Lunae, quam distantiam tantum judicavi ex parte longitudinis; videbantur enim eandem habere latitudinem fueratque β orientior.

Computo lat. $2^{\circ} 18'$, long. $18^{\circ} 8'$ MP , qui locus serviet \odot , praesertim si ex seqq. patebit, quantum sit addendum calculo. Ergo seq. 15. Nov. h. 1. ante ort. \odot observata est. Illustris \odot et \odot et Spicae MP , sed eo die sola

inter β et δ erat. Censuit enim δ modico orientaliorem β . γ occidentaliorem Spica, cujus orientalitatis vel occidentalitatis adeo parvae lubrica est aestimatio in signo obliquissime ascendente. Distantia exhibet β a δ $1^{\circ} 20'$, potissimum in latitudinem, a Spica $6^{\circ} 30'$, a γ $4^{\circ} 39'$. Hinc triplici via habetur locus β , mediante ejus latitudine, quam computo $2^{\circ} 22'$ b. Cum enim Spica sit in $1^{\circ} 59'$ austr., et sic diff. lat. $4^{\circ} 21'$, quare de dist. $6^{\circ} 30'$ per radium capta longitudini imputatur $4^{\circ} 50'$, quod adjectum ad locum Spicae $16^{\circ} 35'$ $\underline{\hspace{1cm}}$, reponit β in $21^{\circ} 25'$ $\underline{\hspace{1cm}}$, al non nimium dixit radior. Per δ sic: Computo locum ejus $21^{\circ} 7\frac{1}{2}'$ $\underline{\hspace{1cm}}$, lat. 1. 8 sept. Quodsi et huic ex distantia sua a Spica aestimam, mediantibus latitudinibus prodibit locus δ nunquam observatus $20^{\circ} 56'$ $\underline{\hspace{1cm}}$, nihil ultra. Itaque δ locus computatus parum fallit et β paulo ante hunc locum fuisse fertur, de quo tamen me faciant dubitare cum distantiae reliquae, tum etiam quae post quadriduum sunt observata. Consensus enim δ e. $10'$ ante β collocatur hoc momento. Diff. lat. β et δ $1^{\circ} 19'$ admodum propinqua observationi, quae distantiam dat $1^{\circ} 20'$. Donique per γ sic: Dist. γ a Spica per radium $4^{\circ} 6'$; sed cum vitium insit huic distantiae, ut ex lat. patet, ad illam annotatam partem recensendum nobis est, quae dicit γ occidentaliorem fuisse Spica, ergo ante $16^{\circ} 35'$ $\underline{\hspace{1cm}}$. Cum igitur lat. utrique planetae pene eadem fuerit, dist. β et γ 4. 38 vel correctior ex 19. Nov. 4. 50 addita loco Spicae, affert $21^{\circ} 13'$ $\underline{\hspace{1cm}}$ vel $21^{\circ} 25'$ $\underline{\hspace{1cm}}$, ante quem locum β fuit. At computo $20^{\circ} 45\frac{1}{2}'$ $\underline{\hspace{1cm}}$. Si ergo fulamus distantiae a Spica et a γ correctae, hic quoque $40'$ desunt in calculo; denique si distantiae a γ ejusque a Spica aestimatae, deerit calculo non multo minus. Locus eccentricus est 17° $\underline{\hspace{1cm}}$.

Die 19. Nov. secuta est δ β γ . γ distare invenitur a β $0^{\circ} 46'$, occidentalis et australior eo. Sane invenitur lat. γ $2^{\circ} 14$ bor. et sic $6'$ minor quam β . Et cum diurnus γ sit $1^{\circ} 7'$, diurnus β 6, erit superatio diurna $1^{\circ} 1'$, quare ante quadriduum arguitur fuisse $4^{\circ} 50'$.

Eat autem simul observata dist. β a Spica $6^{\circ} 52'$, de qua per diff. lat. $4^{\circ} 21'$ vindicator longitudini $5^{\circ} 19'$, quod ante quadriduum est inventum $4^{\circ} 50'$, consensu non malo. β igitur in $21^{\circ} 54'$ $\underline{\hspace{1cm}}$, aut si radius dixit nimium, forte pauculis minutis anterior. Et quia radius bene concordat duobus distinctis diebus, hinc confirmamur de defectu calculi. Durat hic consensus etiam 25. Nov. Nam in obj. γ explicatum est, quomodo locus β ad hanc diem ex Spica prodeat $22^{\circ} 25'$ $\underline{\hspace{1cm}}$; nec multum discedunt suffragia δ et γ . Hoc vero est per 1° plus, quam d. 15. Nov., quantus sane motus diebus 10 competit.

Anno 1482. 12. Jani altera media hora ante ortum \odot Luna eclipsabat β , tempore enim illo non videbatur, ante autem et post eclipsin habitudines infra scriptas notavi. Item cum Luna fuerat in nitima quadratura aut circa, utique deficiebat ex parte occidentis. Et quando primo intuebatur, videlicet e. $2\frac{1}{2}$ horas ante ortum \odot , fuerat β orientalis et apparuit meridionalis Luna, distans per 2 Lunas. Postea intervenirent nubes, quod principium cernere non potui. Judicavi autem pro certo, quod Luna cornu australi apprehensura fuerat β . Post quod autem revidebam β , distabat in diametro ad 2 digitos vel citra a cornu septentrionali, et tum vice versa apparere reincepit, transivere jam medium coeli. Eo vero tempore, quod medium hujus eclipsis judicavi, accepi altitudinem Lunae, fero in linea meridiana existentis, et reperi 32° .

Ergo culminante 6° M, sic ut \odot transierit meridianum ante 3 horas quadrantes, hora sc. 6. matutina, computo locum \odot visibilem seu parallaxi affectum $25^{\circ} 36\frac{1}{2}'$ $\underline{\hspace{1cm}}$, cum lat. centri $2^{\circ} 19\frac{1}{2}'$ sept., limbi vero septentr.

2° 35'. Si hinc auferantur 2 digiti, locus ☉, a cujus regione stetit ☿ emergens, habuit lat. visam 2° 30 $\frac{1}{3}$ ' sept. Si etiam a loco centri ☉ auferatur minus aliquid semidiametro ☉, quia ☿ versus cornu superius emerit, restabit Saturno plus quam 25° 21' ☿. Sed ne quis dicat, me nimis sero computasse, superaverit igitur ☉ meridianum non 3. sed 1. quadrante, ut sit minus in loco ☉ per 10. Adhuc igitur ☿ debuit esse ultra 25° 11' ☿. Atqui computo liliu in 24° 31' ☿, lat. 2° 35' b. Et sic etiam hoc eccentrici loco, qui est 19° ☿, deficit calculus 40', latitudine mediocriter consecutiente observatis; et melius ante dimidiam horam, ut jam modo, ubi ponagesimus altior, parallaxis latitudinis ☉ minor eoque etiam visa latitudo ☉ major.

Anno 1481. 21. Nov. de mane vidi ♃ et ☿, et fuerat ♃ notabiliter orientatior ☿. Lichtembergius, famosus astrologus Waltheri tempore, nescio an adjunctus a Walthero, reponit ipsum ☿ articulum in noctis ejus principium, ascendente quippe Canero die 20. Nov. locum prodit 22° 42' ♍, ☿ septentrionaliore. Ephemeris quidem hujus anni, computata ex tabulis Alphonsinis, ad tempus praescriptum prodit locum ♃ proxime eundem intra 4', ☿ vero 5 superationibus diurnis Jovis promovet ulterius. Nullum ergo dubium est, quin locum ☿ desumerit Lichtembergius ex cursu ♃ in Ephemeride. Nam ex coelo ipso desumere difficillimum erat, cum planetae vix semisse signi Soli antecederent, nec lis jam super horizonem conspectis ulla praeterea aldera cerneretur imminente Sole. Atqui computo locum ♃ mane d. 21. Nov. 23° 48' ♍, lat. 0. 45 b., ☿: 22° 50' ♍, lat. 1° 58 $\frac{1}{2}$ ' b., diff. 58', initio noctis 55', quae discrepant in motibus ☿ et ♃ junctis, de quibus si ♃ tribus excessum e. 15', restabit ☿ defectus e. 40' ut bacterus. Locus eccentricus est 21 $\frac{1}{8}$ ' ♍.

Anno 1503. 15. Oct. h. 4. p. med. noctis fuerat ☿ ☿ et ☿ secundum longitudinem, sicut oculo judicavi; sed ☿ septentrionalior ultra gradum.

Et ut de loco ☿ certi essemus, praecedenti 13. Oct.: „armillis rectificatis per Aldebaran super 2° 45' ♐ posita, ☿ deprensus est in 17° 50' ☿, lat. sept. 1. 0, tunc et ☿ 17° 0' ☿,“ quibus locis addo ☿ 42', sit igitur ejus locus 17° 46 $\frac{1}{2}$ ' ☿ secundum Waltherum, ego vero computo locum ☿ 17° 53' ☿, lat. 1° 2' b. Cum igitur per 6 $\frac{1}{2}$ ' plus computem, quam dicunt armillae, debebat ☿ per calculum inveniri et ipse aut in 17° 46 $\frac{1}{2}$ ' ☿ secundum armillas, aut in 17° 53' secundum meum calculum ☿. At computo 17° 0 $\frac{1}{2}$ ' ☿, lat. 0. 27' b., deficit ergo meus calculus per 46' vel 52 $\frac{1}{2}$ ' vel (si armillae nonnihil in ☿ excesserunt, ut apparet ex vicinia stationis) saltem e. 43'. Praecedentes hanc Saturni observationes, Sept. mensis habitae per armillas, sunt vitiosae, ut et Jovis.

Anno 1503. 11. Dec. p. meridiem armillis rectificatis ut supra, in M. C. existente 8° ♊, inventus est ☿ in 15° 30' ♊, lat. 0. 18 merid.

Haec observatio praefertur praecedentibus ab auctore et commendatur de fide ut fundamentalis. Ergo Tychoni esset in 15° 34 $\frac{1}{2}$ ' ☿, at computo 14° 51 $\frac{1}{2}$ ' ☿, lat. 0. 23' m. circiter, nondum sc. locato nodo. Deficiant igitur et hic calculo 43'.

Hoc die notabatur ☿ ☿ et ☿ retrogradorum in Ephemeride, cujus falsitatem dicit ad oculum manifestam fuisse. Vera ☿ sequebatur e. 24. Dec.; sed ☿ a 14. in 29. Dec. non fuit observatus.

Anno 1504. Januario exstant observationes aliquot per armillas, quas omitto,

ut in re contestatissima, solam σ cum ventre Π praeterire nolui ob evidentiam, de qua sic scribit observator:

Anno 1504. A tertia die usque in 6. Febr. non potui videre 8. Π : ex eo indicavi eam eclipsatam a \hbar stationario. 8. Febr. post meridiem, armillis per Aldebaran $2^{\circ} 45'$ Π δ $4^{\circ} 53'$ \odot cum lat. sept. $3^{\circ} 42'$. Medium coeli 9° Π , $4^{\circ} 48'$ \odot , cum lat. sept. $0^{\circ} 18'$. Medium coeli 5° Π , \hbar $11^{\circ} 18'$ \odot , cum lat. merid. $0^{\circ} 2'$. M. C. 11° Π , et apparuit etiam 8. Π distans a \hbar versus orientem ad modum 4 digitorum quasi in eadem latitudine diligentissime.

Digiti 4 sunt c. $10-11'$ et \hbar eo die relatus fuit per Aldebaran in $11^{\circ} 18'$ \odot , id est mihi $11^{\circ} 22\frac{1}{2}'$ \odot ; fixa igitur fuisset in $11^{\circ} 33\frac{1}{2}'$ \odot bono consensu rerum, nisi et armillae et aestimatio 4 dig. peccaverint aequaliter, quod ex eo sit verisimile, quia postridie \hbar ponitur in $11^{\circ} 8'$ \odot , motus vero diurnus non potest hac habitudine major esse $3'$. Fuisset igitur 8. Febr. potius $11^{\circ} 11'$ \odot scribendum, mihi $11^{\circ} 15\frac{1}{2}'$ et dist. a fixa $18'$, quae sunt scmid. \odot vel digiti 6. Computo 8. Febr. $10^{\circ} 29'$ \odot , per $53\frac{1}{2}'$ vel $46\frac{1}{2}'$ minus justo; lat. 0. $15'$ m.

Etsi igitur in minimis manet aliqua ambiguitas, at de potiori parte, ut de $43'$, argumentum habemus invictum, hoc loco desicere calculum.

2. Martii post meridiem armillis per Aldebaran $2^{\circ} 45'$ Π , \hbar $10^{\circ} 45'$ \odot . Medium coeli 2° Π , δ $9^{\circ} 0'$ \odot . 3. Martii de mane post ortum \odot per motum \odot , super $22^{\circ} 6'$ \times positum, reperi δ $6^{\circ} 15'$ \odot , dum M. C. fuerat 17° δ . Eodem die rectis armillis per Aldebaran $2^{\circ} 45'$ Π , $4^{\circ} 5^{\circ}$ \odot . M. C. 2° \odot , \hbar $10^{\circ} 45'$ \odot , δ $9^{\circ} 15'$ \odot .

Circa stationem inter 3. et 11. Mart. vespere fuit σ \hbar δ . Per nostram fixae correctionem $4\frac{1}{2}'$ scr. ulterius, δ illie $1^{\circ} 30'$ antea, hic $1^{\circ} 0'$ ulterius. Itaque oportet fuisse locum σ d. 8. Mart. h. 1. p. m. in $10^{\circ} 51'$ correcte. At computo \hbar in $10^{\circ} 5'$ \odot , et sic $46'$ minus, ut hactenus. Ad fixam veru in ventre Π reversus esse scribitur 28. et 29. Mart., illic quidem occidentalior et septentrionalior ea ad spatium 2—3 digitorum, sic tamen, quod distantia magis fuerit ex parte latitudinis, hic vero adhuc propinquior, quasi σ longitudinis eodem instanti fuerit. Aliis noctibus spectatum \hbar orientaliore eadem stella.

Computo \hbar d. 29. Mart. h. 7. in $10^{\circ} 46'$ \odot , cum fixa esset in $11^{\circ} 34'$ \odot , et sic deficio $48'$; lat. austr. computo $6'$ minorem latitudine fixae.

Accedat denique ultima observatio σ magnae \mathcal{U} , \hbar , propter quam Waltherus tantum operae sumsisse videtur per integrum semestre, quippe in qua etiam finit. Die enim 24. Maji a. 1504 vespere collocantur ambo conjuncti in 16° \odot per Cor Leonis in $22^{\circ} 42'$ \odot ; esset igitur Tychoni in $16^{\circ} 11\frac{1}{2}'$ \odot . Die sequenti collocantur in $16^{\circ} 10'$ et $16^{\circ} 13'$. Computo \hbar in $15^{\circ} 37\frac{1}{2}'$ \odot , cui si addam c. $43'$, hactenus desiderata, consurgit $16^{\circ} 20\frac{1}{2}'$ \odot . Et vero etiam in Jovis observationibus dictum, computari locum ejus $16^{\circ} 35'$ \odot , sed abundare calculum in eccentrico per $18\frac{1}{2}'$, quibus detractis prodit computatus verior $16^{\circ} 19'$ \odot , proxime junctus Saturni loco, ut sic deficient armillae per 6 vel $7'$, quod cum alias nullius est momenti, confitente hoc ipso Walthero, tum praecipue circa occasum planetarum heliacum ob impedimenta multa, observationi objecta, mirari nequaquam debemus.

Et hic dissensus calculi in \mathcal{U} et \hbar , excurrens ad integrum gradum, est remora illa, quae me, plurima perplexitate circumventum, per solidos quinque menses in observationibus Waltherianis exercuit tandemque ad nova consilia

circa motuum mediorum speculationem adegit, deprehensa manifesta inaequalitate motuum seculari. (Absolvi hucusque 18. Junii 1624.)

Anno tamen 1514. d. 24. Febr. mane h. 5. Copernicus vidit Saturni stellam in linea recta cum secunda et tertia frontis Scorpionis. Cum igitur stellae fuerint eo anno in $25^{\circ} 45' M$, lat. $1^{\circ} 54'$ australis, et $26^{\circ} 11' M$, lat. $5^{\circ} 22'$ austr., differentes in latitudine per $3^{\circ} 28'$, in longitudine per $0^{\circ} 26'$, \S vero ibi loci latitudinem habeat $2^{\circ} 19'$ bor., differens a superiori in latitudine per $4^{\circ} 13'$, competet igitur ei differentia longitudinis $31\frac{1}{2}'$ eritque \S in $25^{\circ} 13\frac{1}{2}' M$, cum ego computem $24^{\circ} 56\frac{1}{2}' M$, solis $17'$ minus. Quae propinquitas observationis et calculi suspecta mihi est, cum anno 1482 et 1484 differentia fuerit $40'$ in eodem signo. Perpende igitur, lineam satis esse longam ($7\frac{1}{2}^{\circ}$) et facile errari circa aestimationem exactae incidentiae. —

Quid sit praestitum in epochis Saturni collocandis. Observationes \S in Ptolemaeo exstant non plures quam quinque. Una est Chaldaeorum a. 82. die 2. Xanthici vesperi, quod ex fide Ptolemaei interpretis fuit ante Chr. anno 229. d. 1. Mart. Tunc \S sub australi humero Υ visus est 2 digitos. Reliquae quatuor ipsius Ptolemaei sunt, tres quidem *ἀπορρογῶν*, quas Ptolemaeus per circumstantias non describit, solummodo earum loca exprimit, calculo prius deducta ad ipsa momenta oppositionis cum medio loco \odot , qui provenisse sibi ait in $1^{\circ} 13'$ Υ , $9^{\circ} 40'$ Υ , $14^{\circ} 14'$ Υ ; unam extra situm acronychum in $9^{\circ} 15'$ Υ , quando \odot est observata dimidio gradus ultra, i. e. in $9^{\circ} 45'$ Υ : observatus est \S ad claram Hyadam, sed lubricae sunt circumstantiae.

Quatuor igitur Ptolemaeis Saturni locis per $1^{\circ} 3'$ promotis in numeratione signorum zodiaci et comparatis locis \odot veris, differentia vero inter visum locum \S et \odot verum nonis partibus (dictante hoc orbium proportionem) verus \odot extensis a locis \S visis, loca eccentrica \S in ecliptica mihi provenerunt: $2^{\circ} 28'$ Υ , $10^{\circ} 43'$ Υ , $15^{\circ} 10'$ Υ . Valet iste processus in \S propter orbis amplitudinem, ejus est orbis \odot pars s. nona. Nam si differentia inter medium et verum locum \odot fuisset plane totalis $2^{\circ} 3\frac{1}{2}'$, pars nona ejus fuisset $14'$, pars decima $12'$. Non potuit igitur magnus committi error per hanc distributionem, secundum orbis proportionem crassa Minerva sumtam.

Per base igitur tria loca eccentrici et per adhibitam dimensionem eccentricitatis, quo hodie ex accuratissimis observationibus 30 continuorum annorum stabilitur, et retentis intervallis observationum Ptolemaeis (ut ad quae constituimus loca \S eccentrica, elicientes ea ex locis, quae Ptolemaeus et pro eccentricis et pro visis nobis commendavit, quippe in ipsis oppositionibus cum medio \odot) tentari varias positiones aphelii \S et deprehendi, quod posito eo in $23^{\circ} M$, motus medius ad tempora Ptolemaei sic possit mutari, ut \S ad praescripta momenta temporis ratione loci eccentrici possit venire in $2^{\circ} 18' 30'' \Upsilon$, $10^{\circ} 43' 0'' \Upsilon$, $15^{\circ} 19' 40'' \Upsilon$, deficiens in prima c. $10'$, excedens in tertia tantundem ab eo, quod erat mihi propositum assequi, fidem observationum et deductionum Ptolemaei eoento. Nec dabatur licentia propius rem adducendi ad consensum, nisi vellem mutare summationes exstructas ex observationibus Tychonis, quae sunt majoris fidei.

Cur sic se res haberet in tribus acronychiis, quarta etiam extra situm acronychium concilianda venit, quam referebam ad $10^{\circ} 18'$ Υ , quia Ptolemaeus dixit $9^{\circ} 15'$ Υ . Veruntamen et Ptolemaeam hie sollicitudinem sequi placuit, qui \odot adhibuit in certificando hoc \S loco. Scribit enim, \S stellam

a centro ☉ post tergum relictam fuisse semisse unius gradus quam proxime. Computavi ergo locum ☉ ex tabulis Tychoonis et Rudolphinis epochis, et inveni locum copularem seu fictum $9^{\circ} 16' 54''$, verum $10^{\circ} 58' 4''$. Sed cum esset hora Alexandriae 8. p. m. et ☉ versus horizontem occidentum, coeasura ac hora eadem, parallaxis etiam eam projiciebat in antecedentia. Ablata igitur longitudinis parallaxi, restabat locus centri ☉ visus $9^{\circ} 57' 12''$. Et quia h id ☉ centrum sequebatur dimidio gradu, quare in $10^{\circ} 27'$ esse debuit, ex observatione vero ad Hyada in $10^{\circ} 18'$; medium utriusque est $10^{\circ} 22\frac{1}{2}'$, quantum etiam computandum censui et ob hanc solam observationem, ut confirmationem, ceteris aliquid remittendum.

Leviter igitur immutato motu medio, quo modo etiam antiquae Chaldaicae observationi conducere vidi, computavi jam omnia 5 loca; prodire:

1. $36'$ ☉, $10^{\circ} 38'$ ☌, $15^{\circ} 10'$ ☌, $10^{\circ} 22'$ ☉, $8^{\circ} 56' 23''$ ♀, pro
2. $16'$ ☉, $10. 43'$ ☌, $15. 17'$ ☌, $10. 18'$ ☉, $8. 41' 0''$ ♀
vel $10. 27'$ ex ☉.

Nam h Chaldaeus observavit vesperti 2 digitis, l. e. 5' sub australi humero ♀, et Ptolemaeus refert stellam in $9^{\circ} 30'$ ♀. At quia Ptolemaeus annum tropicum se inter et Chaldaicum statuit valde longum, consequitur, ut sicut post Hipparchum, qui observavit aequinoctia ceteris saeculis consentientia, addendum est calculo motus ☉ medio Ptolemaeo, sic ante Hipparchum eidem motui ☉ medio sit adimendum aliquid, ut quem numeravit ipse $6^{\circ} 10'$ ☌ ab aequinoctio tardo, is vere sit $5^{\circ} 39'$ ☌ c. ab aequinoctio, celeritatis consuetae, secundum quem motum praecessioneis aphellum h Chaldaeo observatori obvium $15^{\circ} 7' 26''$ ♀, locus Spicae $22^{\circ} 21' 21''$ ♀, quem praecedit austrinus humerus $13^{\circ} 40' 30''$, ut locus sinistri humeri Chaldaeo obvium $8^{\circ} 41'$ ♀, non $9^{\circ} 30'$. Cum ergo computamus locum h ultra locum humeri, sideribus occidentibus, h supra stellam fuisset spectatus; atqui cum ait spectatus infra, si hujus verbi vestigia premimus per circumstantias motus diurni, h omnino praecesserit locum sinistri humeri nonnihil, igitur ante $8^{\circ} 41'$ ♀ fuerit. Igitur in prima desunt mihi $20'$ ad votum meum implendum, in secunda 5, in tertia 7, in quarta nihil, in quinta supersunt plus quam 15.

Hoc processu sum id consecutus, ut in dissensu Chaldaicae et Ptolemaearum observationum starem in medio, dissensum pene aequaliter spargens in excessum et defectum maximum, interimque tenens observationem de quatuor Ptolemaicis fideissimam. At cum ex his epochis computarem postea Waltherianas et Regiomontani observationes exque his appareret clarissime, h motus indigere aequatione seculari, eoque frustra nos medium affectare inter longe distantes, si inter eo pugnent, nec in unam certis vicinis observationibus confirmatam commensurationem se cogi patiantur; cum etiam appareret, omnes quatuor Ptolemaicas in gratiam unius Chaldaicae detruas esse in partes defectus, Chaldaicae relictum excessum: visum est, Chaldaicam permittere aequationi seculari, eaque missa, Ptolemaicas inter se conciliare sic, ut dissensum spargatur in excessum et defectum. Id factum promotione aphelli in 25° ♀ et augmentatione motus medii. Atque haec tertia demum epocharum restitutio illata est in tabulas, ex quibus si computentur loci quatuor Ptolemaica, adhuc in prima deficiamus per $9' 37''$, in secunda excedimus per $9' 41''$, in tertia excedimus per $3' 36''$, in quarta deficiamus per $0' 42''$. Conciliet eas propius, qui id potest, salva commensuratione orbium, per Tyconicas certissimas inventa.

Tenendum autem est hoc: sic esse diductos motus medios, ac si tempore

Ptolemaei et tempore Tychonis nulla fuerit aequatio secularis, quod incertum est, praesertim de Ptolemaeo seculo. Nam quod Tychonicum attinet, video ex oppositionibus acronychis per totam triacontaeteridæ periodum jam sentiscere effectum aequationis secularis. Id autem fieri solet non in aequatione maxima, tunc cum quantitas consistit, insensibili existente varietate, sed in aequatione prope nulla, tunc enim desuente adjectoria, incipiente subtractoria, vel e contrario, quantum potest maxima sentitur. Ergo videmur nostro seculo nullam habere ζ secularem aequationem. Id si sic etiam habet cum seculo, Ptolemaei, recte diducti erant motus ζ medii, ac proinde Chaldaicum seculum indigebit aequatione subtractoria c. 27', quia ex correctis epochis computo 9° 6' Π c., debebam ex indicio fixae computare 8° 39' Π .

Quantum ad motum nodorum attinet, Ptolemaeus nuda traditione contentus, illud solum dicit, nodum in 3° \odot esse, h. e. limitem in 3° ω : puto non ullo illum alio uixum argumento praeterquam eo, quod ζ Soli oppositum observavit in 2° ω , et latitudinem ejus boream nunquam alias deprehendit majorem, sc. 3° praeterpropter, quantum definit Saturni maximam in libro de latitudinibus, quae sane hodie quoque potest fieri 2° 48' in boream et 2° 50' in austrum. At quia latitudo circa limites in magno arcus intervallo sensibilibiter non mutatur, incerta vobis ista relinquitur locatio nodi ad tempora Ptolemaei intra gradus complusculos.

Chaldaica quidem observatio ζ in 9° Π exhibet 5' (tantum enim faciunt digiti 2) infra humerum sinistrum Π , cujus est hodie latitudo 2° 50' bor. nec olim alia multo potuit esse, quamvis luxationem eclipticae concesseris. Locus enim fixae in Π est in quadrato earum fixarum, in quibus luxatio ista sentitur hodie, si obliquitatem Ptolemaeo suam reliqueris. Ergo ζ minorem habuit latitudinem borealem quam 2° 50', majorem quam 2° 45', quia haec scrupula 5 distantiae non recta in meridiem porrecta erant, sed multum in oceanum, vi voels *traxerit*, cum situ ζ occiduo comparatae. Si ergo habuit latitudinem 2° 48', is ipso modulus est hodiernae latitudinis maximae boreae; limes igitur potius in 9° Π esset, h. e. Ptolemaei seculo in 13° Π . Sed si Ptolemaeum de latitudine maxima ζ interpretemur ex hodierna experientia, ut ille 3° dixerit pro 2° 48', atque ita etiam ejus observatio acronychis in 2° ω non majorem habuerit latitudinem quam 2° 48', consuevimus lude, ut utrique observantium ζ fuerit limiti vicinus; quare arcum a 9° Π in 3° ω , sc. 24°, per medium divisio, et 12° adjectis ad 9° Π , veniet limes tempore medio in 21° Π , tempore igitur Ptolemaei in 23° Π , 10° auterius, quam ipse tradidit. Omne quidem ejus observationum tempus ζ in descendente semicirculo habet, nec poterat is contrarii ascendentis testimonio sufficiri. Nulla igitur religione duor, quin limitem Ptolemaei seculo tot gradibus in antecedentia reducam, praesertim cum huc varietas latitudinis proveniat non major 2°.

Haec locatio limitis liberrima plurimum acquirit verisimilitudinis ex eo, quod jam motu medio ex Ptolemaei et Tychonis epochis, sic ordinatis, constituto, et ad luitia rerum derivato, nodus quam proxime punctum aequinoctiale γ venit, quemadmodum etiam plerique alii motus in cardinalia puncta incident et Saturni ipsius motus medius solis 5° 30' ultra aequinoctium autumnale. Quod cum ego animadvertissem, nec impediri ab observationibus, aliqua libertate uti, sicut dictum est, omnino induli huic speculationi circa nodum ζ eumque in communi rerum initio in 0° γ retuli. At in motu medio ζ non permisi mihi libertatem hanc, addendi sc. 5° 30' ad motum medium

56 seculorum, quia hac ratione Ptolemaeo obvenirent $1^{\circ} 25'$ c. et quia jam certum est, aequationem requiriri secularem, qua interveniente facile hi $5^{\circ} 30'$ delcuntur, si sc. Ptolemaei seculo secularem aequationem $1^{\circ} 25'$ adjectoriam statuerimus.

Multo vero minus mihi licere volui in transferendo et torquendo loco aphelli, quod sub initia rerum in finem \odot recidit, quamvis analogia pulcherrima suadeat, id in 0° \triangle detrahre. Nam huic ego analogiae si indulgerem, obveneret Ptolemaeo locus aphelli $3^{\circ} \nearrow$, 8° nterior, quam permittit ejus observatorum fides, si modo ea libbate est conservanda. Consueti forte et huc locationi aequatio motus aphelli secularis, si qua est.

Analogia, quam dixi, haec esset, a complurimis notuum confirmata.

h	in peribello et ys	aphellum cum ys
h	in peribello et ys	aphellum cum ys
h	in long. med. desc. et limite boreo	aphellum cum ys
h	in long. med. desc. et solst. hiberno	aphellum cum ys autumn.
h	in long. med. asc. et limite boreo	aphellum cum ys
h	in long. med. asc. et limite boreo	aphellum cum ys
h	in long. med. asc. et ys	aphellum cum limite boreo.
h	in \square h altissimi	h aph. in \triangle h ys in V
h	in \square h bimillimi	h aph. in \triangle h ys in \triangle
h	altissimi cum bimillimo	h aph. in V h ys in V
h	in \square h , h , h ys	h aph. in \triangle h ys in V
h	omisso h	h aph. in \triangle h ys in V
h	omissa h	h aph. in \triangle h ys in \triangle
h	omisso h	h apog. in \triangle h ys in \triangle

Consideratio observationum Regiomontani et Waltheri in Jove.

Anno 1462. In mane 20. Martii b. 11. noctis completa Luna videbatur tanquam in una linea recta cum duabus stellis Scorpionis 12. et 13. In mane 21. Martii consideravi Lunam in meridiano, habentem altitudinem 23° . Jupiter habebat altitudinem $24\frac{1}{2}^{\circ}$, qui tunc in meridiano putabatur. Cor m tunc habebat altitudinem $17^{\circ} 15'$. Luna autem cum Jove et stella septima \nearrow putabatur in una linea recta.

Ex Lunae situ allegato convincimur, meridiem allegatae dici non insectum esse, sed praececessisse. Hoc igitur mane observata est \odot Romae vel Viterbii in meridiano alta 23° , h $24^{\circ} 30'$, qui et tunc, inquit observator, in meridiano putabatur; \odot autem cum h et stella 7. \nearrow putabatur in una recta linea.

Cum igitur Luna ad momentum suae culminationis hiveniatur in $2^{\circ} 27'$ \nearrow , nullam vero diversitatem aspectus in longitudinem faciat, quia nonagesimus ab ortu et culminans in 0° \nearrow coincidunt, valet igitur hic locus Lunae verus. Vicissim omnis Lunae parallaxis abit in latum, et ys est in $27^{\circ} \nearrow$, ergo \odot latitudo austr. vera $0^{\circ} 31'$, aucta parallaxi lat. $0.55'$, dat visam lat. $1^{\circ} 26'$, quam cum obliquitate eclipticae composita dat $24^{\circ} 56'$, et haec ablata ab alt. aequatoris Romana $47^{\circ} 58'$, relinquit $23^{\circ} 2'$, quantum Lunae altitudinem prodit observator.

Sic cum nodus h descendens fuerit circa 5° \nearrow , et locus h eccentricus per $13\frac{1}{2}$ ante nodum hunc, ejus ergo declinatio erat $18\frac{1}{2}$ sept., nec major latitudo, quae composita cum visa lat. \odot $1^{\circ} 26'$ accumulatur l. $44\frac{1}{2}$ differentiam altitudinum, ut h fuerit altior $24^{\circ} 46\frac{1}{2}'$ in ipso meridiano, pro quo habet observatio $24^{\circ} 30'$ crasse, sc. expressam voce „dimidii“, procul

dubio paulo extra meridianum, aut omissus est quadrans unus gradus vitio astrolabii.

Denique latitudo fixae γ est $3^{\circ} 50'$ austr., long. $2^{\circ} 42'$ γ ad tempus propositum. Hinc latitudinis siderum, quae in una recta, differentiae istae: γ , δ : $1. 44\frac{1}{2}'$, δ , fixae: $12. 24$, γ , fixae: $4. 8\frac{1}{2}'$. Sed longitudinis inter δ et fixam differentia est $0. 15$. Quodsi $2. 24$ dat $0. 15$, ergo $4. 8\frac{1}{2}'$ dabit 27 . Itaque si exacte cum centro δ et fixa fuit γ in eadem recta, locus ejus observatus est $2^{\circ} 15'$ γ . At computo eum in $2^{\circ} 21\frac{3}{4}'$ γ ; satis exacte. Nam haec rectae per corpus δ imaginata tradnetio non patitur subtilitatem tantam censurae, qua $7'$ excessus vel defectus agnoscantur.

Anno 1468. d. 26. Apr. in principio noctis δ videbatur parum transgressus rectam lineam, in qua fuerunt γ et cauda Urssae minoris.

Stella α . 1600 ponitur in $3^{\circ} 23'$ δ , ergo hoc anno in $1^{\circ} 30'$ δ . Consentit hoc loco calculus δ observatis, qui prodit ejus locum $29^{\circ} 25\frac{1}{2}'$ Π , lat. $1^{\circ} 15'$ bor., γ vero ratione eccentrici fuit paulo ultra limitem boreum, itaque ejus latitudo computatur $1^{\circ} 32\frac{1}{2}'$ bor., Mars igitur erat meridionalior Jove solis $17\frac{1}{2}'$. Itaque facile agnosci potuit vel minima transgressio. Et quia linea versus δ vergebat in antecedentia, quare δ in ipsa δ secundum longitudinem jam transgressus erat. Computo locum γ $29^{\circ} 24\frac{3}{4}'$ Π exactissime.

Anno 1468. die penultima Aprilis Jupiter, Mars et quaedam stella fixa decima Π videbantur quasi in una recta linea cum capite Π antecedente septentrionali, stella fixa profundior in solis loco quam Mars et Mars profundior quam Jupiter. Distantia inter γ et δ videbatur quasi sequentia ad distantiam inter Martem et stellam fixam. Mars valde parum recessit a rectitudine versus septentrionem.

Hic locus Martis datur gemina via. Primum enim diurnus hoc situ est 37 : Ergo δ ex calculo diei 26. venit in $1^{\circ} 22\frac{1}{2}'$ δ . Deinde ex 2 fixis: capite Π in $12^{\circ} 49'$ δ , genu Π in $2^{\circ} 31'$ δ . Nam in Martialibus observationibus probavi, si Mars praecise in linea fuisset, locum ejus eum lat. $1^{\circ} 15'$, quae die 26. fuit, futurum fuisse $1^{\circ} 17\frac{1}{2}'$ δ . Fuit autem paulo altior hac linea, quantum sc. et latitudo post triduum fuit auctior.

Jam etiam locus γ habetur: erat enim etiam γ in linea fixarum. Sed hic prius explicanda sunt verba observatoris, ne ea se ipsa destruant. Non est hic sensus, quasi linea ducta per 2 stellas fuerit etiam ducta per γ , priusquam veniret ad δ . Nam si sic intelligeremus, fieret Jupiter orientior Marte, cum tamen uterque directus sit et Mars Jovem adhuc triduo antea transiverit. Neque vox „profundior“ capienda est de latitudine australiori, nam fixa fuit utroque planeta septentrionalior, sed neque denotat situm profundiorum respectu horizontis occidui, in quo sunt spectati planetae, quasi profundior fuerit dictus, qui occidentalior. Nam si stella fixa nequaquam fuit profundior, sed altior. Verus ergo sensus vocis profundior est iste, quod fixa fuerit promotior in orientem et in pluribus numerationis gradibus, sic etiam Mars Jove promotior. Ex quo sequitur, lineam per fixas non adeo praecise transisse per planetas, ut qui juxta invicem stabant et quasi pro uno habebantur sidere in hac imaginatione lineae. Alias, si lineam ipsi planetae direxissent, non duabus insuper fixis, sed una sola fuisset opus. Et de Marte quidem fatetur observator, ipsum fuisse septentrionaliorem hae linea valde parum, de Jove vero subsumere possumus, ergo ipsum deflexisse multum a linea; siquidem id opus fuerit subsumere. Primum ponatur, fuisse exacte in linea: si ergo differentia latitudinum $7^{\circ} 51'$ dat diff. longitudinum stellarum

10°. 18', ea in proportione diff. lat. fixae et Υ 0. 39' dabit diff. long. 0. 52' —; ita provelet locus Υ 1° 39' ☉. Atqui triduo promovetur Υ hoc situ nihil ultra 33', quare nondum attigerat jam primum punctum ☉, patet igitur, Υ fuisse multo septentrionaliores. Accersantur igitur reliqua verba observationis et exquiratur distantia δ a stella, a qua cum differat in longitudine 1. 8 $\frac{1}{2}$ ', in latitudine 54' e., absuit igitur 1° 27'. Hujus vero aequalitertia est 1. 56', tanta dicitur fulvae distantia Jovis et Maris, quae per diff. latitudinum 15' dat longitudinem 1. 26'; quae si a loco Martis 1. 22 $\frac{1}{2}$ ' auferatur, restat Υ long. 29° 56 $\frac{1}{2}$ ' II, quanta et per diurnum ex calculato ad 26. Apr. prodit. Sed apparet interim ex hoc exemplo, quanta sint attentione tractandae observationes istae.

Anno 1471. Strigoni 15. Martii stella Υ videbatur inter duas Virginis, quarum lucidior est circa medietatem alae sinistrae Virginis, alia obscurior circa oculum ejus versus Leonem. Apparebat autem distantia Υ a stella secunda obscuriori esse quasi duae quintae totius interapedinis stellarum; verum stella Υ valde parum recessit ab hac recta linea, quae est inter stellas fixas versus occasum.

Magna cum perplexitate diu conflictatus sum, quatenam essent hae duae stellae. Nec invenio alias, quae cum lat. Υ 1° 48 $\frac{1}{2}$ ' b. secundum tenorem observationis conveniant, praeter secundam alae sinistrae et quartam ejusdem alae praecedentem. Loca ad tempus positum 2° 44' ☉, lat. 2° 50' b. et 27° 25' IIp, lat. 1° 25' bor. Diff. long. 5° 19', lat. 1° 25'. Et quia linea plurimum in longum porrigitur, sequenti tamen parto in septentrionem, eadem igitur sunt partes in boream, quae et in occidentem, et Υ occidentalis linea visus, fuit etiam septentrionalior. Non licet igitur argumentari per latitudinem ejus, sed arripienda determinatio intervallo, longitudinis enim differentiae duo quintae sunt 2° 8', quae ei ad locum obscurioris 27° 25' IIp adjeceris, locus Υ elicitur 29° 33' IIp. Computo vero 29° 16', idque 15. Mart. p. m. b. 8. At si computarem ad ejusdem diei autemcanum, nulla enim apparet distinctio, computarem plus, quia Υ est retrogradus, puta e. 29° 22' IIp. Reliquum crassa aestimatio distantiarum proportionis sustinet, ut nihil hinc de calculi certitudine ratiocinari possimus.

Omitto distantiam Υ ☉ observatam 9. Aug. hujus anni 1471 per radium, ut infidam.

1478. 21. Febr. Conjunctio Υ ☉, dist. 1° 59'. Pridie distantia 2° 6', postridie 2. 19, quod confirmat, conjunctionem fuisse ante 21. Febr. Computo igitur ad h. 5. (hora sc. occasus ☉) utrumque planetam exactissime in 25° 0' Υ , lat. Υ 1° 2 $\frac{1}{2}$ ' austr., ☉ 0. 58 $\frac{1}{2}$ ' bor., diff. igitur 2° 1', quanta et dist. est inventa fere. Cum vero motus bidui ☉ sit 2° 16', Υ 23', superatio igitur 1° 53'. Sed pridie, indice dist. 2° 6', superatio longitudinalis (posita eadem lat. ☉) erat 40', postridie 1° 26', quae satis propinquam ipsi 1° 53' summam consuevit. Ergo secundum observationem ad nostrum momentum superatio debuit esse e. 18, quae vere est nihil. Et si ☉ vere fuit in 25° Υ , Υ per hanc oba. redigitur in 24° 42' Υ . Et quidem valde prope hoc alludit ejus distantia a 2 stellis non nominatis per radium capta, sed cornua Υ fuisse arguunt circumstantiae. Erant enim illae locis hisce: 26° 39' Υ , lat. 8° 29' b., et 0° 22' δ , lat. 9° 57' b., a quibus Υ invenius est distare 9° 41' et 12° 26'. Adhibita vero latitudine Υ 1° 2 $\frac{1}{2}$ ' austr., relinquuntur longitudinis differentia illic 1° 45', hic 5° 51'. Per illam igitur Υ venit in 24° 53' Υ , per hanc in 24° 31' Υ ; medium horum est 24° 42' Υ . Neque tamen aequum est, hic mediare, ubi culpa discordantiae non ex aequo tribui potest utrique distan-

tiae. Nam in occidentali cornu levissima diminutio de latitudine Υ deteret ista $22'$. Si enim ea sit $1^{\circ} 0'$ austr., jam ceteris manentibus Υ redigetur per hanc distantiam in $24^{\circ} 41'$ Υ vel $24^{\circ} 26\frac{1}{2}'$ Υ , et jam meditatione facta proveniet locus in $24^{\circ} 33'$ Υ . Et hic locus est verisimilior, quia \odot per distantias suas redigitur in $24^{\circ} 57'$ Υ . Calculus igitur Υ hoc loco eccentrici $3^{\circ} \text{ } \delta$ abundaret e. $27'$, nisi radius in utroque planeta nonnulla peccet excessu, ut ita calculus in Υ minus quam $27'$, in \odot nihil excedat, quod verisimilissimum est.

Anno 1478. 22. Aug. h. 3. post mediam noctis fuerant in una linea Υ et duo oculi δ , et erat Υ occidentalis, distans per medietatem distantiae, qua duo oculi distant, ab oculo occidentali; sic visual apparuit.

Loca fixarum erant $1^{\circ} 9'$ Π , lat. $2^{\circ} 36\frac{1}{2}'$ anstr., et $2^{\circ} 38\frac{1}{2}'$ Π , lat. $5^{\circ} 31'$ anstr. Primum periclitabimur latitudinem. Nam diff. latitudinum est $2^{\circ} 54\frac{1}{2}'$, ejus semissis $1^{\circ} 27\frac{1}{4}'$ ablatus a $2^{\circ} 36\frac{1}{2}'$, relinquit observatam Υ latitudinem $1^{\circ} 9'$ anstr., si exacta fuisset aestimatio distantiae semissis. Computo vero calculo sat fido lat. $1^{\circ} 1\frac{1}{2}'$ austr. Cum igitur diff. longitudinum stellarum sit $1^{\circ} 19\frac{1}{2}'$, quam sequitur ad $2^{\circ} 54\frac{1}{2}'$ lat., ad paulo plus igitur semisse illius sequetur paulo plus semisse hujus, sc. $43\frac{1}{2}'$, atque sic Υ per accuratam lineae hujus rectitudinem redigitur in $0^{\circ} 25\frac{1}{2}'$ Π . At computo $0^{\circ} 39\frac{1}{2}'$ Π , calculus rursus excedit $14'$, loco eccentrico in $19^{\circ} \text{ } \delta$.

30. Sept. fuerat Υ iterum in una linea cum duobus oculis δ , videlicet in eodem loco, in quo 22. Aug. eadem hora.

Intervalla non definiuntur, sed propior nodo factus $3\frac{1}{2}^{\circ}$, dimiuit lat. anstr. minntis totidem. Quare observatio ista referet ipsam in $0^{\circ} 24'$ Π . At computo $0. 42\frac{1}{2}'$ Π , rursus in $23^{\circ} \text{ } \delta$ eccentrici; calculus excedit per $18'$, si exacta aestimatio rectae.

Anno 1484. 21. Nov. de mane vidi Υ et $\text{ } \delta$, et fuerat Υ notabiliter orientalis $\text{ } \delta$.

Computo locum $\text{ } \delta$ $22^{\circ} 50'$ $\text{ } \Pi$, lat. $1^{\circ} 58\frac{1}{2}'$ b. Cui si addam usitatum defectum $40'$, erit locus emendatus $23^{\circ} 30'$ $\text{ } \Pi$, et Υ igitur in $23^{\circ} 38'$ $\text{ } \Pi$ e. Atqui computo $23^{\circ} 48'$, lat. $0^{\circ} 45'$ b. Nihilum igitur habet longitudo per $15'$ e.

Anno 1488. 16. Jan. h. 5. 30' p. m. inter Υ et $\text{ } \delta$ $1^{\circ} 26'$, inter limbum Lunae occidentalem et utrumque horum eadem distantia $11^{\circ} 16'$, et fuerat Mercurius septentrionalior Jove. 17. Jan. inter Υ et $\text{ } \delta$, sed $\text{ } \delta$ orientalis et septentrionalior, $1^{\circ} 44\frac{1}{2}'$.

Hanc observationem repraesentat calculus mens proxime. Nam ad h. $5\frac{1}{2}$ aequalem Uranib. computo locum centri \odot verum $5^{\circ} 42\frac{1}{2}'$ $\text{ } \delta$; parallaxi visionis transpositum $5^{\circ} 4\frac{1}{2}'$ $\text{ } \delta$; ergo limbi occid. $4^{\circ} 49\frac{1}{2}'$ $\text{ } \delta$, lat. centri veram $2^{\circ} 34\frac{3}{4}'$ b., visam $1^{\circ} 56\frac{1}{2}'$ b. Jovis igitur latitudo computatur $0^{\circ} 53'$ austr., hinc diff. latitudinum $2^{\circ} 49'$, quae de distantia $11^{\circ} 16'$ vindicat longitudini $10^{\circ} 58'$. Signatur hinc locus Υ per limbum \odot occid. $23^{\circ} 51\frac{1}{2}'$ $\text{ } \text{---}$, at computo $24^{\circ} 2'$ $\text{ } \text{---}$, \odot vero longitudinem computo $23^{\circ} 40'$ $\text{ } \text{---}$, lat. $0^{\circ} 31\frac{1}{2}'$ b., diff. lat. \odot \odot $1^{\circ} 25'$, quae de distantia $11^{\circ} 16'$ vindicat in longum $11^{\circ} 10\frac{1}{2}'$, itaque ostenderetur $23^{\circ} 38\frac{1}{2}'$ $\text{ } \text{---}$ fere eadem. Denique differentiae longitudinum Υ $\text{ } \delta$ $13'$ et latitudinum $1^{\circ} 24\frac{1}{2}'$ conficiunt distantiam $1^{\circ} 25'$. Locus eccentricus est $28^{\circ} \text{ } \text{---}$. Confirmationis est loco, quod sequenti die 17. Jan. $\text{ } \delta$ annotatur jam orientalis Jovo fuisse et septentrionalior. Distantia $1^{\circ} 44\frac{1}{2}'$.

Cum autem hoc anno Waltherus incepit observare planetas per armillas, posito loco \odot ex observatione in zodiaci justo gradu, habet in Υ ex-

periri certitudinem tirocinii hujus. Observatus est enim 7. et 8. Oct. in $18^{\circ} 20'$ ♄, posito loco ☉ d. 8. Oct. in $24^{\circ} 31'$ ♄, lat. visa est habere 1° in meridie. Sequenti vero 9. Dec. annotat locum ♄ in $17^{\circ} 45'$ ♄, lat. merid. $1^{\circ} 45'$. Atqui in diebus 62, initio facto post oppositionem usque in ☐, nunquam fit, ut ♄ $4^{\circ} 25'$ conficiat. Igitur altrolitque manifestum est vitium. Sic cum sit ♄ c. limitem austr., oportet ut circa oppositionem aut post, sc. Octobri mense, latitudo spectata sit major, quam c. quadraturam, cujus contrarium habet observatio, illie quidem $1^{\circ} 0'$, hic $1^{\circ} 45'$. Ergo computo ego illic quidem $14^{\circ} 24'$ ♄, lat. $1^{\circ} 32'$ austr., hic $16^{\circ} 14'$ ♄, lat. $1^{\circ} 17'$ austr. Non sicut ergo fide dignas armillas hoc tempore.

Anno 1497. 15. Febr. de mane h. 4. p. med. noctis distabat Mars a Jove per diametrum Lunae, sed haec distantia pro medietate ex parte latitudinis, Mars vero occidentalior Jove et meridionalior, fuit secundum almanach conjunctio praeterisset, quae adhuc futura erat.

Erat pridie natalis Philippi Melanchthonis. Imminabat ☿ ♄ ♂, nam distabant diametro ☉, ♂ occidentalior et meridionalior. Computo loca sic:

$$\text{♄} : 12^{\circ} 38\frac{3}{4}' \text{ ♄, lat. } 0^{\circ} 43' \text{ b.}$$

$$\text{♄} : 12. 14\frac{1}{2}' \text{ ♄, lat. } 0. 32\frac{1}{8}' \text{ b.}$$

Diff. long. $24'$ et lat. $11'$ dant transversam $28'$, quod est fere diameter ☉. Confirmatur igitur calculus alterutrius planetae per alterum, nisi is aequalia utrobique peccet.

Anno 1503. 8. Sept. de mane h. 4. p. med. noctis vidi ♄ apud stellam, quae est octava ☐ in latere dextro antecedentis, fuerat quasi eidem conjunctus secundum longitudinem, ut si aream imaginaveris per polum zodiaci et stellam, tangeret limbum Jovis occidentalem, latitudinem vero habebat ab ea versus boream ad modum 2 digitorum transversalium. Praedicta autem stella a Ptolemaeo ponitur in septentrionem $2^{\circ} 40'$ ab ecliptica, quae tamen per armillas observata nullam videtur quasi habere latitudinem.

11. Sept. hora ut supra reperi ♄ in fine 12° ☉, latitudinem habentem sept. $0^{\circ} 15'$ fere.

Erat locus stellae in $11^{\circ} 34'$ ☉, lat. 0. $13'$ austr. ♄ igitur fuit visus in $11^{\circ} 37'$ ☉ c., cum lat. 0. $8\frac{1}{2}'$ austr. Computo vero ego $11^{\circ} 55'$ ☉, lat. 0. $5\frac{1}{2}'$ austr. Certum hinc est, excedere calculum istum $18'$ in loco ♄ eccentrico.

Confirmationis causa consideretur observatio habita d. 29. Apr. anni seq. 1504 vesperi; tunc enim ♄ scribitur reversus ad eandem fixam secundum longitudinem, sed jam ad $\frac{1}{8}^{\circ}$ septentrionalior stella. Hic ego computo $11^{\circ} 52'$ ☉, lat. 0. $23'$ b. Locus est exacte idem, qui supra 8. Sept., attento quod planeta tunc superaverat conjunctionem exiguo. Latitudines etiam compositae faciunt $36\frac{1}{2}'$, quod est paulo majus uno gradus semisse. Certum igitur est, quod in 11° ☉ calculus noster abundet $18'$.

Confirmatur idem etiam ab armillis. Die enim 11. Sept. 1503 observatus est c. finem 12° ☉, et d. 16. in $12^{\circ} 15'$ ☉ per Aldebaran scilicet. Sed additur admonitio, adjicienda esse $10'$, quae observator in loco Aldebaran neglexerat; mihi vero sunt ea $14\frac{1}{2}'$, itaque planeta in $12^{\circ} 30'$ ☉ fere, unde si auferas motum dierum 8, sc. $56'$ c., restant pro 8. Sept., plane $11^{\circ} 34'$. Sic etiam d. 29. Apr. per cor ♄ in $22^{\circ} 42'$ ♄ positum repertus est esse in $11^{\circ} 20'$ ☉, nostris vero rationibus adjicienda sunt fixae $13'$; ea igitur etiam hinc loco ♄ adjecta dant $11^{\circ} 33'$ ☉ ipsissimum locum stellae ventris (II).

Sed consideremus etiam σ Ψ δ directorem, quae observata scribitur d. 6. Oct. h. 2. ante ortum \odot . Primum locus Ψ expendatur per se, ut est observatus vicinis diebus per armillas. Posito igitur Aldebaran in $2^{\circ} 35' \Pi$, d. 28. Sept. Ψ censitus fuit in $13^{\circ} 45' \odot$, cui adde ex sententia auctoris $10'$ et alia 5 ex Tychonis rationibus, ut sit locus observatus $14^{\circ} 0' \odot$. Adde motum octiduum hoc loco, prodit $14^{\circ} 24' \odot$ pro 6. Oct. Sequentium dierum 13, 23. observationes circa Ψ manifeste sunt vitiose impressae, quod patet ex collatione sequentium.

Martis loca ad easdem dies ex observatione armillaria sunt ista. Ad 28. Sept. $10^{\circ} 55' \odot$ correcte ex sententia observatoris, ad 13. Oct. $17^{\circ} 0' \odot$. Unde si auferas $2^{\circ} 40'$ pro diebus 7, restabunt dic 6. Oct. $14^{\circ} 20' \odot$, locus conjunctionis pene idem cum loco ex Ψ observatione deducto. Medium utriusque est $14^{\circ} 24' \odot$.

Sed nos jam locum Ψ certiores ex calculo et observatione diei 8. Sept. constituemus. Colligo enim $14^{\circ} 23\frac{1}{2}' \odot$ correcto calculo, posito se. loco eccentrico etiam hoc die $18\frac{1}{2}'$ minori. Martis vero locum computo $14^{\circ} 34\frac{1}{2}' \odot$, et scio, quod in hoc planeta paulo quid plus justo computem. Nam d. 28. Sept. (de quo vide confirmationem in observatione δ) computo in $11^{\circ} 6' \odot$, d. 1. Oct. in $12^{\circ} 25' \odot$, motum tridui $1^{\circ} 19'$, cum his diebus spectatus sit aequaliter abesse a stella in ventre Π , quae erat in $11^{\circ} 54' \odot$, quare motu tridui in aequalia secto, et semisse $39\frac{1}{2}'$ addito vel ablato, referretur δ ab his observationibus in $10^{\circ} 54\frac{1}{2}' \odot$ et $12^{\circ} 13\frac{1}{2}' \odot$, utrobique per $11\frac{1}{2}'$ anterior, quam computo; id quod etiam 28. Sept. per armillas confirmatur, quibus secundum nostra principia δ refertur in $10^{\circ} 59'$, quod proximo idem est cum $10^{\circ} 55'$. Si ergo per $11\frac{1}{2}'$ plus justo computo in δ , auferantur ea a loco computato $14^{\circ} 34\frac{1}{2}' \odot$, restabit locus conjunctionis $14^{\circ} 23' \odot$, plane ut per correctionem loci Ψ calculati.

Alia conjunctio Ψ et δ retrogradorum est facta 19. Jan. 1504, quando δ per cor Ω , in $22^{\circ} 33' \Omega$ positum, inventus est in $6^{\circ} 10' \odot$, i. e. partim ex admonitione observatoris, partim ex meo calculo fixarum in $6^{\circ} 31\frac{1}{2}' \odot$. Ψ vero observatus est $15'$ promotior. Computo δ in $6^{\circ} 18' \odot$, Ψ in $6^{\circ} 50' \odot$, diff. $32'$. Haec tanta differentia est argumento, abundare hic etiam in calculo Ψ aliquot minuta. Nam detractis de loco eccentrico $18\frac{1}{2}'$, quae supra hic abundare deprehendimus, prodibit visus locus Ψ $6^{\circ} 34\frac{1}{2}' \odot$, superans computatum Martis per $16\frac{1}{2}'$ secundum observationem. Et sic locus δ hac vice recte computaretur; esset vero vitium in observatis hoc die ipsa locis utriusque, idque aequale, quod certe excusabile est propter magnam δ latitudinem; malim tamen dicere, Martem observatum anterius, cum in plerisque circumstantiis Martis observationibus abundet calculus, non deficiat. Fortasse pro $6^{\circ} 10'$ scribendum fuerat $6^{\circ} 0'$. Nam post horas 36 proditur locus $5^{\circ} 45' \odot$, cum sane sesquidiurnus hoc loco sit $15'$, non $25'$. Satis constat etiam tunc, calculum in loco Ψ eccentrico hic abundare a $18\frac{1}{2}'$.

Tertia σ Ψ retrogradi cum δ directo spectata est 9. Febr. 1504. Posito enim Aldebaran super $2^{\circ} 45' \Pi$, reputatus est interque planeta in $4. 53 \odot$, quod esset secundum rationem Tychonis $4^{\circ} 57\frac{1}{2}' \odot$. Computo locum δ quidem $5^{\circ} 1\frac{1}{2}' \odot$, lat. $3^{\circ} 24\frac{1}{2}'$ b. Ψ vero $5^{\circ} 22\frac{1}{2}' \odot$, sed diminuto loco eccentrico secundum superiora in $5^{\circ} 1' \odot$. Hic confirmatur excessus in Ψ . Etai diebus 8. et 6. Febr. observationes exstant in minimis erroneae, attamen error est parvus: hanc vero, quae fuit matutina diei 9, confirmat vespertina ejusdem, ubi δ in $5^{\circ} 0' \odot$, Ψ in $4^{\circ} 50' \odot$. Martis calculus hic pene coincideret.

Succedit nunc illa σ Ψ cum ventre Π d. 29. Apr., confirmans eundem excessum calculi, de quo supra.

Denique consideremus etiam observatam σ Ψ , d. 24. Maj. 1504, quando per armillas Corde Σ in $22^{\circ} 42'$ φ posito, planetae sunt inventi in $16^{\circ} \odot$, quod est secundum Tychonem in $16^{\circ} 11\frac{1}{2}' \odot$, lat. Ψ $20'$ b., Ψ $5'$ b. Computo locum Ψ $16^{\circ} 35' \odot$, sed diminutione loci eccentrici hactenus comprobata, compnto $16^{\circ} 19'$. Confirmatur igitur etiam hic per armillas mediocriter haec diminutio. Sed et per locum ipsum Ψ ; computo enim hunc $15^{\circ} 37\frac{1}{2}' \odot$ et scio ex plurimis observationibus hujus seculi Waltheriani, quod deficit calculus hoc tempore c. $43'$, quae addita dant locum Ψ $16^{\circ} 20\frac{1}{2}' \odot$. Lat. Ψ sept. colligitur major Saturnia, ut observatum.

Consideratio harum observationum in Ψ . Anno 1462 in Σ c. 7 plus, 1468 in Π datur aliquanto +; 1471 in Π deficerem 17 —, si non esset crassa observatio; 1478 in $3^{\circ} \delta$ abundarem 27 +, si radius verus; 1478 in $19^{\circ} \delta$ c. $14'$ + per fixas; 1478 in $23^{\circ} \delta$ c. $18'$ + per fixas; 1484 in Π c. $15'$ + per fixas; 1488 in $28^{\circ} \approx$ c. $10'$ + per \odot et δ ; 1497 in δ ant asequor ant in δ aequaliter pecco. 1503, 1504 in \odot c. $18'$ + certo.

In omnibus igitur excedo, nec datur exceptio per tertiam, ob crassam et dubiam observationem; daretur nonnulla per 1497, si accurata esset aestimatio et si certissimus ad hunc annum calculus δ . Etsi potest et hic concedi excessus calculi circiter 10. Nam indice latitudine differentia longitudinis debuit esse 12, cum inveniam 24. Concludi posse videtur, illo seculo abundasse calculum motus medii, licet non totis 40 annis aequaliter.

Ad hujus rei evidentiam pertinet, ut perpendas primo, eccentricitatem ex hodiernis observationibus extractam recte habere; deinde ut concedas, commutationem ejus esse perpetuam, quippe cum ejus causae sint radicatae in ipsis planetarum globis perennibus. Tertio perpende, si excessus in \odot 1503 causa esset in pravo situ aphelii, debere id esse longo alio loco, quam in \approx . Nam si defectus iste vel in ipso aphelio contingeret, transpositione $3\frac{1}{2}$ graduum opus esset. Circa longitudinem vero mediam infra 18 non transigitur. Concluditur igitur, hunc excessum $18\frac{1}{2}'$ in \odot case ex abundantia motus medii, quae si ultra 6 annos durat, oportet ut sentiat etiam in opposito Π , δ , \approx : et ita est. Anno 1497 quidem incerte, at a. 1484 evidenter et 1488; a. 1496 nihil observatum, sed a. 1462 mediocriter. Sed etiam huiusmodi locis 1468 et 1478 fere.

Hactenus igitur computavimus ex epochis a $7^{\circ} 3' \Sigma$ et $23^{\circ} 34' \odot$ defluentibus, in quarum constitutione 4 Ptolemaicas observationes solas observavimus, studentes illas iutra omnem possibilem propinquitatem exprimere, nec potuit hoc fieri propius, quam intra propinquitatem $8'$ vel $9'$ ultro citroque. Has autem epochas secuti primum ab observatione Dionysii dissensimus per $21'$ vel $31\frac{1}{2}'$. Deinde sprevimus testimonium Albategnii circa apogaeum Ψ , quod ille dixerat 8° praecedere locum ei a Ptolemaeo assignatum. Tertio ipsa etiam tarditas hujus aphelii motus, imo retrogradatio ejus sub fixis, est insolens nec usitata planetis ceteris. Quodsi Albategnium sequamur circa aphelium, id omnino ex fonte $0^{\circ} \odot$ in creatione derivandum fuerit quam proxime.

Et quia ex quatuor observationibus Ψ Ptolemaicis nulla magis fidem meretur, quam ea, quam exornat σ cum \odot , lu Lunae vero loco definiendo Ptolemaeus ex propriis verbis arguitur erroris non contemnendi, adhibito igitur

tur aphelio ex $0^{\circ} \odot$ et observatione ista correcta, si de novo constituatur epocha motus medi in creatione, illa his necessitatibus innexa uitro appropinquat ipsi $0^{\circ} \odot$, sc. usque in $4^{\circ} 43' \odot$, recedit ab ea, quam observationes tres reliquae Ptolemaicae conformauerant.

Cum igitur observationes Ptolemaei cum aliae, tum praecipue etiam Jovis sint gravatae variis suspicionibus, et creationis epocha verisimilis in $0^{\circ} \odot$, tentata ea fuit et loca 5 antiqua hinc computata, quae saepe intra 2° et $2\frac{1}{2}^{\circ}$ non assequuntur illos, quos Ptolemaeus prodidit, ad Tychois principia correctus. At quia per observationes Waltheri, per has ipsas paginas summo labore et vindictas ab erroribus typi instrumentorumque et computatas, certissimi reddimur, maxime quidem in h , nec multo minus evidenter in u , quin etiam in s , motuum mediorum esse aliquam inaequalitatem secularem, quae ab aphelio uequaquam pendet, quid igitur impediverit, huic inaequalitati seculari transcribere defectus illos calculi tempore Ptolemaei $1\frac{1}{2}^{\circ}$, 2° , $2\frac{1}{2}^{\circ}$, et tempore Dionysii $1\frac{1}{2}^{\circ}$, illaque insuper habitis, arripere vclut sacram anchoram communem illum fontem motuum omnium, puncta cardinalia? Nam qui hoc fecerit, is admonitionem transmittere possit ad posteros, quid tempore Dionysii addendum, quid tempore Ptolemaei (sicut hoc ipsum ego facio in aequinoctiis ad tempora Ptolemaei), iubens etiam ceterorum sequentium seculorum excessus vel defectus (qui quidem per totos eccentricos conspiciantur) annotare, tandemque eos, qui victuri sunt, ex pluribus idoneis defectibus et excessibus circularem et ordinatam restitutionem, qualis procul dubio est, investigare numerisque explicare: quin etiam, si aliter fieri nequeat, mutata motus celeritate, ipsum etiam hoc nostrum seculum in excessu vel defectu collocare.

Hoc ipsum ego diu multumque meditaturs cum omnino facere in Rudolpbina statuissem, retinuit me tamen illa ipsa consideratio, quod utcumque de fonte motuum in punctis cardinalibus sis certissimus, de nostro tamen, b. e. Tychoico seculo incertum habeas, sitne id ponendum in mediocritate, ut cogitabam, an potius in aliquo vel excessu vel defectu, b. e. cum aliqua prostha-phueresi seculari: quodsi hoc, jam hoc etiam incertius erit, quanta ea debeat esse. In hac cogitatione dum pedem figo, accesserunt considerationes aliae, semper plus esse in novatione invidiae, quam in uegligentia; fremituros artifices, si desertis Ptolemaei observationibus, quanquam non limitatissimis, observationibus tamen, ratinculas sequeretur controversas in constitutione epochae; si praeter omnium seculorum consuetudinem repudiato sensu (observationibus) ad rationem, quae sine sensu coeca est (ad epochas creationis), me reciperem. Subiit et illud, magno cum detrimento existimationis laborum meorum conjunctum iri, si viderint astronomi, Ptolemaicas observationes uim reclamare meae audaciae in arripiendo motuum omnium fonte; sic enim futurum, ut ubi tres superiores, invitis Ptolemaei observationibus, ad puncta cardinalia penitus a me alligari viderint, tot motus Solis et inferiorum aequissimo Ptolemaeo jam alligatos ex hac communibus velut carceribus cursum rursus emittant, rem sc. ipsam contemnant, et de fraude adhibita suspectam habeant; et propinquitatem fontium, quae nihilominus est spectabilis, casui transcribant, b. e. consensui necessario ex diversis motuum principis, non procurato de industria.

Quod igitur commodo discentium veritatisque saltem eminus ostendenda fiat, conclusum esto: vincat Ptolemaeus in constituendis epochis et vincat suo periculo, respondeat nimirum ipse Dionysio, respondeat suis ipse nonnullis observatis, respondeat Albategnio de situ aphelii; respondeat cum ipse, tum omnes astronomi, quotquot ad hanc usque diem vixerunt, respondeant, inquam,

Regiomontano et Walthero, cur motus aequales non sint omnibus seculis aequales; respondeant denique metaphysicis universi astronomi meo loco, cur cum plerique motus, salvis omnium seculorum observatis, quantum satis est, redacti sint ad carceres punctorum cardinalium, cum etiam superiorum omnes aut incident aut pauculis gradibus superent *), cur non igitur sine exceptione omnes penitus incident? Audiant tamen interim, dum quid respondeant meditentur, mussantem Keplerum hocque dicentem: omnes incidere, sed quo minus id appareat, secularem aequationem nondum cognitam impedire.

Tractatio observationum Martialium Regiomontani et Waltheri.

Anno 1461 δ bis est observatus ad fixas Ita in die 2. Dec. visus est in linea coruum δ , ergo per lat. ejus computatam $1^{\circ} 15'$ anstr. locus ejus caderet in $27^{\circ} 5\frac{1}{2}'$ δ . At computo $28^{\circ} 4'$ δ , excessu $58\frac{1}{2}'$, locus ecc. $24^{\circ} 12'$ \equiv . Sequente 24. Dec. visus est secundum longitudinem jungi lucidiori in cauda δ , quam Regiomontanus ex Alphonsinis computavit in $14^{\circ} 29'$ \equiv , sed ex locatione Tychonis et calculo Rudolphino invenitur ad tempus hoc in $14^{\circ} 17'$ \equiv ; at computo $15^{\circ} 23'$ \equiv . Haec inter se consentiunt. Ergo hoc loco Rudolphius calculus c. $1^{\circ} 6'$ deficit. Locus eccentricus in $8^{\circ} 10'$ ∇ .

Sequuntur aliquot observationes Martis matutinae sequenti anno 1462. habitae, sed mensibus Sept. et Oct. Ut igitur constet, quomodo numeret Regiomontanus tempus $\nu\chi\rho\mu\epsilon\iota\sigma$, respice ad 20. Martii. De eo sic loquitur R.: „In mane 20. Mart. h. 11. noctis completa Luna videbatur tanquam in una linea recta cum duabus stellis Scorpionis 12 et 13“; fuit ergo \odot c. 7° \nearrow . Sequitur immediate: „In mane 21. Martii \odot , Υ et stella 7. \nearrow putabantur in una linea recta.“ Ergo in 2° δ , ubi per calculum etiam Υ invenitur. Inter vero 7. \nearrow et 2° δ spatium est duorum diurnorum motuum \odot . Prior ergo consignatio est politica, diem inchoans a media nocte, posterior Aegyptiaca, diem cum borologio Italico inchoans ab ortu Solis. Illa de nocte, quae praecedit 20. Martii, est intelligenda, haec de nocte, quae sequitur 21. Martii, sicut videre est ex calculo \odot ad antelucanum diel 22. et in Ephemeride anni 1500, qui ejusdem est cycli. Haec varietas magnam parit perplexitatem, et crediderim, in 21. Mart. vitium esse typographicum pro 22. Martii (Martem quidem per se hoc vitium non attinet; at in Υ expediet detectum haberi). Nam Regiomontanus ipse videtur accuratior fuisse in consignatione temporis; ecce curae hujus exemplum proxime sequens: „in nocte quae sequitur 11. Junii“; sic paulo ante: „initio noctis 12. Jan.“ — Rursum d. 21. Oct. oportet esse vitium typographicum pro 20. Oct., quod non potest conferri in morem numerandi diem ab ortu, cum ejus contrarium accedat. Nam commemorat \oslash \odot Lunae cum sexta \mathbb{M} , quae in fine \mathbb{M} erat. Etenim et calculus Lunae et ephemeris supra dicta a. 1500 arguunt, hunc Lunae locum competere antelucano diei 20. a media nocte, non 21. Oct. Au bene habeat haec restitutio, sic discernemus. Die 26. Sept. antelucano visa est \odot et cum ea δ proxime jungi viui stellae Leonis de quarta magnitudine, septentrio-

*) Nota marginalis. Nam motus nodi Υ ultro sub initium rerum ad 0° \mathbb{S} recedit, siquidem inter t° \mathbb{S} , quem Ptolemaei affirmata nuda, sed ex observationibus procul dubio possibilibus confirmata, statuerunt, interque b° \mathbb{S} , quem observatio Dionysii 400 annis antea, et observatio Aristotelis 500 consensu pulchro subijciunt, inter hos, inquam, duos vicinissimos, si recte medium aliquid ad tempora intermedia licet statuere.

minor stella ad sequidiametrum \odot . Cum autem locus eccentricus sit in Π , ubi \odot \odot , erit \odot propinqua eclipticae, quare et stella, ut nequeat esse alia quam ea, quam in axilla sinistra collocat canon Brahe. Fuit igitur haec a. 1462 in $28^{\circ} 51'$ \odot , lat. $0^{\circ} 8'$ b. Huic loco \odot si adjiciamus $28^{\circ} 17'$, quantum proficit \odot anno 1462 a 26. Sept. in 20. Oct., post 3 apocatastases attingimus $27^{\circ} 8'$ Π . Et ecce sextam Π in $27^{\circ} 18'$ Π eodem anno. Emendavimus igitur d. 20. Oct. per Luam, consentiente motu \odot , et certi reddimur, Regiomontanum numerare a media nocte, quamvis numerum horarum alleget ab occasu deductum more Italico, ubi tunc erat. Hinc jam sumus certi, quod d. 26. Sept. antelucano tam \odot quam \odot fuerint circa $28^{\circ} 51'$ \odot . Sed a. 1605 \odot a 15. Sept. in 26. promovet 6. 50, quae ablata ab hoc loco $28^{\circ} 51'$ \odot relinquunt \odot d. 15. Sept. antelucano in $22. 1$ \odot c. Videamus etiam de hac die observationem et calculum.

Anno 1462. die 15. Sept. in mane h. 10. noctis Mars videbatur inter septimam et octavam Leonis, tanquam in linea recta cum eis. Distabat autem ab octava, sc. Corde Leonis, versus septentrionem secundum quantitatem diametri Solis fere.

Fuit autem Cor Leonis tunc in $22^{\circ} 19\frac{1}{2}'$ \odot , sed septima in $20^{\circ} 22\frac{1}{2}'$ \odot , differens in latitudine $4^{\circ} 26'$, cui longitudinis discrimen $1^{\circ} 57'$ respondet. Computatur vero et lat. \odot $1^{\circ} 16'$ sept., differens a lat. Cordis per $50'$, non vero nuda diametro \odot . Quodsi $4^{\circ} 26'$ faciant $1^{\circ} 57'$, in eadem proportionem $50'$ facient 22, quibus \odot , si in linea stellarum fuit, cum hac latitudine fit occidentalis Corde, ut sic redigatur in $21^{\circ} 57\frac{1}{2}'$ \odot .

Atqui computo ego ad diem sequentem \odot in $22^{\circ} 38\frac{1}{2}'$ \odot ; hinc ablato diurno $38'$, relinquitur ad 15. Sept. mane \odot in $22^{\circ} 1'$ \odot proxime. Consentit igitur hoc loco calculus observationi proxime, aut superat $4'$. Locus eccentricus est $29^{\circ} 48'$ \odot .

Amplius, d. 16. Oct. \odot fuit ante 24^{am} Leonis, quae per $12^{\circ} 20'$ est ultra, ergo in $11^{\circ} 11'$ Π , cum lat. b. $1^{\circ} 40'$; die vero 17. jam sesquialtero illius praeventionis superaverat eandem stellam. Si diurnum \odot $37'$ in $5'$ dividas, provenit quinta pars $7\frac{1}{2}'$ et duae quintae 15. Fuit ergo \odot d. 16. Oct. in $10^{\circ} 56'$ Π , visus itaque diebus 20 promoveri per $12^{\circ} 52'$. Atqui anno 1605 in situ consimili est promotio $12^{\circ} 16'$, satis propinqua illi. Nec dubitandum de stella; scribitur enim, \odot visus stella meridionalior, et est quidem stella in lat. $1^{\circ} 40'$ b., at Martis lat. computo 1. 26, diff. 0. 14. Hoc apertum et quod ei accedit in longum Regiomontanus aestimavit aequale 4 diam. \odot . Ipse quidem calculus ad 16. Oct. h. $5\frac{1}{2}$ prodit locum \odot $10^{\circ} 39'$ Π , praecessisset ergo stellam per $32'$ et postridie secutus illam esset per 7. Ex long. vero $32'$ et lat. $14'$ conflatur distantia 35 pridiana. At ex long. 7 et lat. 14 fit dist. 16 postridiana, quare postridie minus dimidio distitisset. Agnosceamus igitur hoc die defectum calculi c. 17'. Locus ecc. est 13. 14 \odot . At nullum esse hunc defectum facile patet ex \odot post quadriduum 19. Sept., nisi calculus eundem errorem erret in utroque planeta. Multo vero magis id patet ex 26. Sept., quando conjuncti planetae cum axilla Leonis.

Anno 1464. d. 11. Dec. in mane h. 3. a Solis occasu computata, stella Martis videbatur in una linea recta cum duabus stellis Virginis, 22. scilicet et 23. Erat autem Mars septentrionalior ipsa vicesima tertia. Nam distantia inter Martem et dictam 23. apparebat subquadrupla distantiae duarum praedictarum stellarum fixarum. Mars secundum computum habebat $26^{\circ} 57'$ \odot , lat. 0. 40. sept. ascendentem, 22. Π habet in longitudine $26^{\circ} 20'$ \odot , in latitudine sept. $7^{\circ} 30'$, 23. in longitudine habet $27^{\circ} 0'$ \odot , in latitudine autem $2^{\circ} 40'$ sept. Mars discrepat in latitudine a computo per $3'$.

Haec observatio prius emendanda et adjuvanda est ex ipsis observatoris verbis. Ipse enim, cum ex calculo Alphonsino locum δ computasset $26^{\circ} 27' \text{ } \underline{\text{C}}$, lat. $0. 40. \text{bor.}$, ex eo credidit et prodidit, stellas illas esse 22. et 23. numero, quia illarum loca prodebantur a calculo $26^{\circ} 20' \text{ } \underline{\text{C}}$ lat. $7^{\circ} 30' \text{ et } 27^{\circ} 0' \text{ } \underline{\text{C}}$, lat. $2^{\circ} 40'$. Credidit igitur Alphonsino consensui in longitudine, non potuit dissimulare dissensum in latitudine valde magnum, sc. 3° . Ego vero vicissim, cum certum habeam, latitudinum rationes esse exploratiores, nec posse latitudinem Martis hoc eccentrici loco et habitu ejus ad \odot esse majorem quam $1^{\circ} 14' \text{ b.}$, ex eo redarguo errorem Regiomontani in una fixarum, et dico, quod fuerit non 22. et 23, sed 23. et 25, seu una in symmate, altera in pede australi, quarum diff. lat. cum sit $2. 18$, hujus quidem pars quarta $34\frac{1}{2}$, ut aestimabatur, adjecta latitudini pedis $0^{\circ} 31'$, prodit lat. δ $1. 5\frac{1}{2}$, quae sane indice calculo sat fido fuit $1. 14$, ut minimum peccaverit visus aestimando. Per hanc vero latitudinem δ veram et per has 2 stellas, si δ exacto in linea fuit, refertur ille ad dictum tempus in $28^{\circ} 42\frac{1}{2}' \text{ } \underline{\text{C}}$. Atqui calculus meus a Ptolemaeo deductus refert illum in $28^{\circ} 29' \text{ } \underline{\text{C}}$, propinquitate tanta, ut in aestimatione circa identitatem lineae satis longae tantum potuerit falli Regiomontanus. (Locus eccentricus $27^{\circ} 9\frac{1}{2}' \text{ } \text{III.}$)

Sequitur in Regiomontano opportuna comprimis observatio, si cultior esset.

Anno 1465. d. 19. Jnnii circa principium noctis Mars videbatur quasi in linea recta cum 1. et 2. z , erat enim paulo borealior ab illa linea, intervallum autem ejus et secundae videbatur aequaliterum ad intervallum primae et secundae. Mars tunc in computo habebat 6°z .

Stellae sunt cuspis sagittae et proxima in arcu vel manu. Earum distantia Tycho mensus est a postrema trium in corpore M , quae non multo aliam habet latitudinem, $19^{\circ} 37'$ et $22^{\circ} 58'$. Igitur a. 1465 obtinent longitudes istas: $23^{\circ} 35' \text{ } \text{z}$ et $26^{\circ} 56' \text{ } \text{z}$. Jam distantia δ a posteriore fuit aestimata sesquialtera distantiae fixarum. Per tantam quidem distantiam promovetur δ usque in mediam fere aream quadrilateri Sagittarii, quae fixae fuissent opportuniore ad definiendum locum planetae. Sed esto: distantia fixarum in longum est $3^{\circ} 21'$; hujus pars dimidia $1^{\circ} 40\frac{1}{2}'$. Ergo distantia sesquialtera esset $5^{\circ} 1\frac{1}{2}'$. Per illam collocatur δ in $1^{\circ} 57\frac{1}{2}' \text{ } \text{z}$. Latitudines fixis ego assignavi in libro de Stella istas utcumque: 6. 54, 6. 24 a., differentia est 0. 30, sesquialtera 0. 45; ergo δ latitudinem habet minorem quam $5^{\circ} 39' \text{ a.}$ Atqui calculus meus definit locum δ $2^{\circ} 18' \text{ } \text{z}$, lat. $4^{\circ} 44' \text{ austr.}$, si tamen eoque fidere possumus huic aestimationi crassae. Et meminueris, differentiam hic ratione situs in eccentrico et habitus ad Solem fieri maximam. Eccentricus locus δ est $5^{\circ} 25' \text{ } \text{z}$.

Anno 1468. 26. Apr. annotata exstat visa σ II δ , cum calculus prodit locum δ eccentricum quidem $24^{\circ} 22\frac{1}{2}' \text{ } \odot$, visum vero $29^{\circ} 25\frac{1}{2}' \text{ } \text{II}$. Id quam prope verum veniat, non ex II ratiocinabimur; est enim et ejus motus examinandus, sed ex observatione post triduum. Nam d. 29. Apr. δ et cum eo II visi sunt in recta, quae per caput II antecedentis descendit in ejus genu boreale et ultra. Motus quidem fixarum est $1^{\circ} 52'$, stellae ergo in $12^{\circ} 49' \text{ } \odot$ et in $2^{\circ} 31' \text{ } \odot$, diff. $10^{\circ} 18'$. Latitudines sunt $10^{\circ} 2' \text{ b.}$ et $2^{\circ} 11' \text{ b.}$, diff. $7^{\circ} 51'$. Martis vero lat. est $1^{\circ} 15' \text{ c. b.}$, diff. $0^{\circ} 56'$. Cum ergo diff. lat. $7^{\circ} 51'$ habeat longitudinis $10^{\circ} 18'$, altera latitudinis $0^{\circ} 56'$ efficiet longitudinis $1^{\circ} 13\frac{1}{2}'$, ut δ fuerit in $1^{\circ} 17\frac{1}{2}' \text{ } \odot$. Est vero hoc

Martis situ et habitu ad ☉ dierum trium motus 1. 53, ut a. 1596: quibus ablatis relinquetur ad 26. Apr. 29. 24 $\frac{1}{2}$ II, quantum et compnto.

Anno 1471. 26. Jul. mane b. 8. visus est δ in linea per oculos γ , eum ojs latitudo computetur 0° 54 $\frac{1}{2}$ ' austr. Quia ergo stellarum loca erant 1° 3' II et 2° 22' II, eum lat. 2. 37. austr. et 5. 31 a., erit locus δ in hac linea 0. 14 II. Hunc vero locum lineae hujus scribitur δ superasse ad orientem per quartam diametri ☉, id est 8': itaque spectatus fuit in 0° 22' II. Et confirmata est haec observatio per aliam circumstantiam, cum dicitur, ejus ab oculo boreo distantiam aequasse distantiam oculi austrui a sibi vicina. Plane inquam haec ipsa latitudo arguitur, quam computo; longitudo minor quam oculi borei. Atqui calculus exhibet δ long. in eccentrico 18° 55 $\frac{3}{4}$ ' γ , visam vero 0° 31 $\frac{1}{2}$ ' II, excedens ut in β et κ .

Haec cum hactenus deprehendantur inter se consentientia, quamquam magno cum labore et sollicita circumspectione fuerint investiganda, nescio tamen, qui fiat, quod ultima Regiomontani observatio, quam habuit 7. Mart. 1474, non exiguo intervallo discedat a ceterarum consensu. δ enim scribitur visus orientior Asino boreo per diametrum Lunae et quidem iturus fuerat sub eum, nisi jam inciperet dirigi. Stella fuit in 0° 8' ϕ cum lat. 3° 8' b.; adde diametrum Lunae, constituetur ergo Mars in 0° 42' ϕ ; atqui computo ego 1. 19 $\frac{1}{2}$ ϕ . Exceedo multum. Latitudo quidem provenit 8. 24 b. decrescens; hoc plane est id, quod dixit, visum esse quasi sub Aellum iturum, ut qui lat. 8° 8' habeat. Nullum mihi patet effugium; dies nullam sustinet culpam, quia δ e. stationem est, nihil sensibile proficiens in motu intra malos dies; stella certa est, nec ulla hujus latitudinis in vicinia; aestimator etiam fidus, qui profecto non censuisset unius diametri Lunae spatium aliquod, quod 3 vel 4 aequaret: nisi confugere velimus ad typographum, ut ipso pro „3 diametros ☉“ legerit „per diametrum Lunae“. De hoc igitur eccentrico loco expectabimus judicium observationum sequentium. Locus eccentricus erat 28° 22' ϕ .

Desinunt hic observationes Regiomontani relictæ Noriborgae, cum Regiomontanus a Sixto IV. Romæ evocatus emendationis calendarii causa, anno 1476. 8. Jul. mortuus est in xenodochio Romae.

Sequuntur Observationes Bernhardi Waltheri

Noribergae habitæ.

Nihil mirum, si Waltherus inter initia radio suo nondum uti citra errorem potuit. Nam distantiae ad 17. Sept. a. 1475 examinatas prodigiosam dant δ latitudinem. Itaque tutius est attendere ad lineas per stellas binas, quoties planeta in illas incidisse annotatur. Sed tamen propter σ η δ d. 18. Sept. examinabimus observata vicinae diei 23. Sept., quando δ ante cor ϕ 14° 39'; post caput II sequentis 24° 31' stetiisse annotatur, indicibus transversali 210, fusto 824 et 495.*) Erat autem cor ϕ in 22° 31' ϕ , ergo

*) Joannes Schoenerus, qui collegit observationes Regiomontani et Waltheri, de „uso radii astronomici“ ejusque constructione haec praemisit: fiat baculus seu fustis 6 vel plurimum cubitorum, eum divides in partes aequales quotlibet; deinde fiant brachia sive pinnacidia diversarum quantitatam, quae sint perforata in medio, ut fustis intrare possit et ut faciant angulos rectos cum eo, ita tamen, quod circa eum hinc inde traduci queant absque impedimento. Applica fusti unum de pinnacidia, quod convenientius apparabit distantias stellarum considerandarum. Quo facto traduc pinnacidium hinc inde in baculo, donec ambae stellae ab A (altero termino fusti oculo applicato) per acuminis clavicularum (terminos pinnacidii) videantur. Numerus partium pinnacidii (v. c. in 210 partes aequales partibus singulis fusti divisi), sic in fuste quiescentis, sinum primum insinuat, numerus autem in fuste ab oculo ad utraque lineam adducio pinnacidii sinum secundum denotabit.

Usus radii hoc exemplo explicat Schoenerus: Anno Christi 1475. 17. Oct. obser-

♂ per cor ♀ reponitur in 7. 52 ♀. Nam lat. ♂, paulo major lat. cordis, non ultra 1' decurrit hanc distantiam. Sed caput II in 15° 57' ☉ et distantia 24. 31 per differentiam latitudinum dimiuita in 23° 55' compendio inartificiali, reponeret ♂ in 9° 52' ♀; differentia ex errore radii proveniens est 1° 59'. Si igitur medietas, referetur ♂ proterpropter in 8. 52½ ♀. In 5 vero diebus hoc situ ♂ promovetur per 2° 58', fuisset igitur d. 18. Sept. in 5° 54' ♀, et computo ego ad dictum tempus 5° 38½ ♀. At ulli hinc arguo; video ipsas etiam distantias fixarum, quae passim sunt interspersae, non respondere observationibus Tychonis certissimis. Igitur citra paucula minuta locus ♂ est certus et mediocriter aptus ad arguendum locum ♀. Locus coecentricus 3° 24' ☉.

Anno 1476 ad d. 24. Jan. est annotatum, apparuisse in eadem circumferentia quartam et sextam Virginis una cum Marte; „quasi medius inter fixas videbatur, quasi per 3 dies morari in eodem loco.“ Atqui calculus meus exhibet in huius diei meridie ♂ coecentricum locum in 0° 33' ♀, visum in 22° 36½ ♀ ♀ et d. 26. in 22. 32 ♀. Ut igitur instituitur comparatio legitima calculi cum observatione, nota primo, quod non accurate definitum sit, aequaliter distillasse Martem ab utraque fixarum, utitur enim observator voce „quasi medius.“ Supposita igitur linea fixarum, relinquunt nobis libertas, per computatam latitudinem definendi propinquitatem planetae ad unam vel alteram fixarum. Latitudines quidem fixarum sunt: praecedentia 6° 10' b., sequentis 1° 25' b., medium esset 3° 47½ b., computo vero 2° 54'; patet igitur, quod Mars fuerit sequenti prior. Cumque differat a latitudine sequentis per 1° 29', differet igitur ab ea in longitudine 2. 17. Erat autem illa hoc anno in 27° 30' ♀, ergo ♂ referretur in 25° 18' ♀. Tantam vero differentiam procul dubio non debemus expectare a nostro calculo. Quare erratum erit in numeranda fixa in capite, quae procul dubio non fuit quarta, sed prima numero; differt a sexta in longum per 11. 32, in latum per 4. 41. Ergo cum ♂ in latum differat a sequenti per 1. 29, arguitur differentia longitudinis ab eadem 3. 39; ita per hanc ♂ venit in 23° 51' ♀. At si magis adhaeremus assertioni „quasi medius“, medium certe fixarum est 21° 44' ♀, sed sic linea per latitudinem ♂ certe non manet recta. Calculus tenet medium. Discussio dubio de stella, et verba observatoris satis assequor. Fallit n. hic aestimatio et lineae et distantiarum, quae sunt admodum laxae; est igitur nullus momenti.

Sequentis Februarii diebus 19. 20. p. m. h. 4. noctis diligens fuit observator, vel quia ♂ in opposito ☉ vel quia inelidit in lineam ex cauda ♀ descendente per caput ♀, quod tamen non annotavit. Sed apparet, quod dixi, ex mechanica distantiarum ab his ipsis fixis applicatione. Nam d. 19. ponit inter ♂ et caput ♀ 0. 36' (nam pro prima ♀ legendum esse secundam, latitudinis Martis arguit), inter illum et caudam ♀ 8° 40'. Est sane differentia longitudinum stellarum 2° 30', latitudinum 7° 41', hinc earum distantia in circulo magno 8° 5' p. p.; cui si addideris 0. 36', conficeretur distantia Martis et caudae ♀ 8° 41'. Ergo cum fixa sit in 16° 47' ♀, lat. 4° 37',

vixit venerabilis senex B. Walther distantiam ♂ et ♀ et reperit sinum primum 210, sinum secundum 807 partium. Per hos sinos ita procede: 807 partes fusti, id est sinus secundus dat partes 210 planisidii, id est sinum primum, quid dabant partes tabulae gnomonicae (in „Quadrato geometrico“ Purbachii), scilicet $12007 \frac{210 \cdot 1200}{807} = 312 \frac{216}{807}$ quibus respondet ex tabula 14° 35' fere.

♂ perexiguo superaverit hanc lineam, ut latitudinem computatam $4^{\circ} 8'$ obtinere possit, distans a corde Ω e. $8^{\circ} 40'$. Die vero 20. inter ♂ et 22. Ω distantia $11^{\circ} 34'$, inter ♂ et caudam Ω $8^{\circ} 34'$, inter ♂ et 23. $6^{\circ} 19'$. Hinc locus vel $18^{\circ} 20'$ Π , vel 16. 53, vel 16. 13, adhibita lat. bor. 4. 8. Inter has verisimilis est ultima, consentiens cum antecedenti. Atqui computo ego ad 19. Febr. h. 9. $16^{\circ} 41'$ Π ; itaque, si hic radio fidendum esset, satis prope veniret calculus meus. At infidam observationem dissensus arguit, et stellae plus in latum quam in longum distant, quod per se infidam facit longitudinem.

Hic autem facienda est mentio aliorum duorum impedimentorum, quae difficultatem auxerint tractandi has observationes. Prius hoc est, quod Schonerus, qui has observationes edidit, praeceptum praescribat computandi distantiam in gradibus et minutis ex fuste et transversali, quod compendiosum quidem est pro distantis minoribus, fallax vero in majusculis. Nam si ex fuste sit sinus totus, tunc ex transversali non sit sinus seu tangens (quod ipse praesupponit, dum transversalem transformatam in alios numeros remittit ad tabulam gnomonicam Purbaehii), sed ex dimidio transversalis seu ex altero brachio ejus sit tangens. (Ipse non tangentem, sed sinum primum appellat, quia tangentis vox novitia est, Regiomontano foecundus numerus dicta; proportio vero fustis ad semitransversalem est ea, quae sinus secundi [sen complementi] ad sinum primum; haec illi causa nuncupationis hujus.)

Alterum impedimentum nascitur ex ambiguitate notationis temporum. Nam qui dicit 19. Febr. hora 2. noctis post meridiem, in dubio relinquit lectorem, falsane sit scriptura „post meridiem“, cum esset scripturus post mediam noctem, ut illa vox ordinis „secunda“ referatur ad principium numerandi horas a media nocte secundum horologium dimidium, quo alias tititur Waltherus; anne illud „post meridiem“ referatur immediate ad numerum diei expressum, non vero „secunda“ ad horarum principium ab occasu Solis, ut in horologio Norimbergico? Etsi vero invenias voces alicubi ex cecitantis permutatas, ut a. 1478 Aprili mense saepius „post ortum Solis“ pro „post occasum Solis“, etsi etiam in sequentibus Waltherus plerumque diem inchoat a media nocte, hoc tamen anno a 12. Feb. usque in 12. Apr. eeneo designari noctem, quae sequitur diem annotatam, et ordinem horarum a principio noctis ineipere. Causae mihi sic statuendi sunt istae: quod video die 5. Febr. proxime antecedenti expressum esse mediam noctis, quando Mars adhuc erat orientalis, statimque 12. Febr., jam instante permutatione ex orientali in occidentalem, incipit meridiei mentio, nec mutatur usque in Aprilem, ut quo tempore etiam commodius ante mediam noctem cerni planeta potnit. Et quidem (quo minus dubites) d. 12. Febr. inferitur vox „post meridiem“ statim post mentionem diei et tunc demum sequitur „hora 2. noctis“, quod minus habet dubitationis. Est etiam in hoc emphasis, quod non nominat „horam noctis“, genitivo casu, quando numerat a nocte media, hic vero semper horam noctis dicit, innuens, se ab ejus principio numerare et sic post meridiem diem expressae.

Sed consideremus etiam ultimam observationem hoc anno habitam, circa stationem secundam. Die 12. Apr. h. 8. p. m. gemina via proditit eadem distantia ♂ a corde Ω $12^{\circ} 44\frac{1}{2}'$; computatur autem lat. ♂ $2^{\circ} 20'$ b., quae cum lat. cordis composita imputat longitudini $12^{\circ} 36\frac{1}{2}'$. Itaque ♂ esset visus in $5^{\circ} 7\frac{1}{2}'$ Π . At computo ego $4^{\circ} 55\frac{1}{2}'$ Π ; rursum igitur hic calculus meus deficit, siquidem fides radio et observationi ab una sola stella. Locus eccentricus $6^{\circ} 15'$ $\underline{\text{m.}}$.

Anno 1477 rursum observator attentus fuit ad ♂ ♄ et ♂ testaturque

sum desiderium in ea contemplanda; viderat n. planetas ejusdem esse latitudinis, eoque corporalem futuram conjunctionem. Sed fatalis incuria hunc quoque locum percussit. Dies enim 5. Sept. annotatur, quae vere fuit 9. Oct. Credo aliam observationem d. 5. Sept. habitam, sed typographum, omisiss aliquot lineis, quibus illa comprehendebatur, saltn facto ad hanc devenisse. Quod autem observatio competat in d. 9. Oct., probatur ex sequenti. Nam cum δ in priori latitudine palmo praecessisset η , quae sunt c. 12', d. 15. Oct. inventus est superasse η 2° 47', quibus si addas illa 12', conficitur summa fero 3° exsuperationis δ . Jam vero diurni planetarum hoc situ et habitu ad Solem sunt isti: η 6', δ 36', quare δ superatio diurna 30', quae sexies repetita conficit 3°. Sex igitur diebus anto 15. Oct., i. e. 9. Oct. prima consideratio est facta. Computo eccentricum 3° 10 $\frac{1}{3}$ ' Ω , visum 1° 50' Π .

Explorabimus vero ad 15. Oct., quomodo calculus cum observatione consentiat. Motus fixarum in annis 123 $\frac{1}{4}$ est 1° 44 $\frac{1}{4}$ ', itaque cor Ω est in 22° 32 $\frac{1}{4}$ ' Ω , a quo distabat δ 13° 4', in longum por 13° 1 $\frac{1}{2}$ ', ergo δ in 5° 34' Π . Cauda Ω in 14° 18 $\frac{1}{4}$ ' Π , lat. 12° 18', a qua distabat δ 14° 24'. Hic si uterer compendio inartificiali brevi, prodiret diff. long. 8° 13'; sed accurate erit 8° 24 $\frac{1}{2}$ ', ergo δ in 6° 4' Π , differens a priori 30'; distantiae enim majnsculae per radium captae, ut apparet, sunt breves. Satis tamen tuto collocatur δ in medio 5° 49' Π . Et computo ego 5° 24 $\frac{1}{3}$ ' Π . Locus eccentricus est 5° 51' Ω .

Anno 1478. 16. Mart. vidi h. 2. p. medium noctis de mane Martem cum stella, quae est media trium Virginis in ala sinistra, videlicet sexta. Habebant quasi latitudinem eandem, latitudine autem fuerat Mars meridionalior ultra medietatem pedis.

Atqui confer annum 1557, quia post annos 79 fit apocatastasis, apparebit, Martem a Nov. 1477 usque in Nov. 1479 in 28' Π , h. e. cum sexta Π esse non potuisse. Et quomodo δ in vicina Spicae seq. 19. Maj. stare potuisset, si Martio mense fuisset in fine Π , cum sit retrogradus? Et tamen mensis est certus, annus etiam certus, praecedunt enim de Februario mense observationes aliae, sequuntur planetis suis convenientes. Calculus igitur examinatus refert δ in 27° 23' Ω cum lat. 2° 35'. Ex quo patet, Waltherum haesisse in australi trium syrmatis, quam sequitur versas austrum pes australis, ut sit quodammodo media trium quartae magnitudinis, sicut sexta Π est media trium in ala. Haec igitur stella hoc anno fuit in 27° 6 $\frac{1}{2}$ ' Ω , lat. b. 2° 57'; scribitur autem, Martem fuisse australiorem ultra medietatem pedis, quod satis convenit cum 22'. Abundat igitur hoc loco calculus 16 $\frac{1}{2}$ ', cum sit locus eccentricus 13° 20' Ω .

Sequente 19. Maji videtur δ incidisse in lineam ex Spica in cingulum Π . Ponitur enim inter stellas quidem 14° 56', at inter δ et Spicam 4° 52', inter δ et decimam Π 9° 56', et sic minus in paribus junctis quam in toto, vitio utique radii; quare non tuto pronunciamus de mera incidentia in lineam. Stellae erant in 4° 10 $\frac{1}{2}$ ' Ω , lat. 8° 41' bor. et 16° 13 $\frac{1}{2}$ ' Ω , lat. 1. 59. austr. Computo eccentricum locum δ 14° 50' Π , visum 12. 12 Ω . Et siquidem δ praecise distiterit a Spica 4° 52', diff. lat. δ et Spicae 2° 5' adhibita, dabit diff. long. 4° 24' et δ in 12° 7 $\frac{1}{2}$ ' Ω , proxime ut computatur ex calculo priori. At per decimam Π multum abest δ , nec ultra 9. 10 Ω pervenit. Dubitabat sane observator de hac stella, sic scribens, „illam quam pro decima putas“. Est igitur alia in ala sinistra, septima numero apud Tychonem, quae hoc anno fuit in 2. 50 $\frac{1}{2}$ ' Ω , lat. 2. 50 b., maga. tertiae. Nec abludit intervallum siderum, quod est in coelo 14° 29'.

Per hanc igitur, si fides distantiae 9. 56, venit δ in $12^{\circ} 23\frac{1}{2}'$ ☐. Relinquit igitur haec dies nos in suspense; mediando inter $12. 7\frac{1}{2}'$ et $12. 23\frac{1}{2}'$ esset $12. 15\frac{1}{2}'$ ☐.

Anno 1479. d. 30. Oct. annotatur σ δ ξ , Marte uno gradu meridionaliore et propinquissimo sextae Π , quae hoc anno fuit in $27. 34 \Pi$, lat. 1. 20 b. Cum vero etiam Martis latitudo computetur $1^{\circ} 23' b.$, oportuit aliquam fuisse diff. longitudinum, quae in quam plagam fuerit, ex sequentibus discernemus. Die 7. Nov. scribitur, Martem conjunctum fuisse septimae Virginis secundum longitudinem, meridionaliorem illa uno gradu.

Ea in observatione proxime antecedenti fuit adhibita eratque hoc anno in $2^{\circ} 52'$ ☐, lat. 2. 50 b., ut fuerit paulo major differentia latitudinum quam 1° . Jam Martis locus computatur d. 30. Oct. $27^{\circ} 28\frac{1}{2}' \Pi$, d. 7. Nov. $2^{\circ} 51'$ ☐, promotio ex 8 diurnis ($36\frac{1}{2}'$). Ergo d. 30. Oct. fuisset in $27^{\circ} 59' \Pi$ et sic secutus esset sextam Π minus uno diurno et pridie subtercurrisset illi, quod an sit, scitu utile erit in consideratione loci ξ . Sed ad 16. Nov. exstat observatio distantiae δ a septima Π per radium, ubi transversalis 80, fustis 925 dant dist. 4. 57. parvam, tantoque minus fidam, quae per diff. lat. 1. 25. c. imputat longitudini 4. 37. Quomodo in diebus 9 promoveretur per 4. 37, si in diebus 8 proxime antecedentibus ivisset per 4. 52? Certe ego computo 7. 46 ☐. Sat certi sumus, pro 8. Nov. scriptum esse 7. Nov. Diebus igitur 9 cum promoveretur per 5. 28, aufer hoc a $2. 52$ ☐, restat die 30. Oct. $27^{\circ} 24' \Pi$. Computo locum eccentricum 1. 21 Π , visum $27. 28\frac{1}{2} \Pi$.

1481. 15. Nov. mane hora 6, prima sc. ante ortum ☉, stabant in vicinia Spicae tres planetae, δ , ζ et ξ . Mars a Spica visus est per radium abesse $5^{\circ} 18'$, fixa in $16^{\circ} 35'$ ☐, lat. $1^{\circ} 59' a.$ δ lat. computatur 1. 3. b. Diff. lat. 3. 2; de hac differentia imputat longitudinis diff. 4. 21, fuerit itaque δ in $20. 56$ ☐. Sed facile minimus excessus distantiae sic transversae mutat notabile quid in longitudine. Computo locum eccentricum $27^{\circ} 56' \Pi$, visum in $21. 7\frac{1}{2}$ ☐. Sequenti quadriduo aucta fuit haec distantia per 2. 42. (dictum $40\frac{1}{2}$), diff. igitur longitudinis 2. 42. Sane fit hoc eccentrici loco et habitu ad Solem.

At ξ distabat $2^{\circ} 20'$, quod per diff. lat. 1. 19 dat in longum $1^{\circ} 56'$, unde locus ξ referretur in $23. 50$ ☐. Aufer hinc superationem quadriduanam 2. 7, veniet igitur d. 15. δ $11'$ ante ξ . — Ad 25. Nov. cum prodeat locus δ tripliciter ex ζ 27. 39 ☐, ex Spica 27. 46, ex ξ 27. 28, computo ego 27. 37 ☐, cum sit locus eccentricus $2\frac{1}{2}$ ☐.

1484. d. 28. Nov. hora fere tertia noctis post meridiem Luna eclipsabat Martem. Computo locum ☉ ad h. 7. $19\frac{1}{2}$ et sic $\frac{1}{2} h.$ posterius vere in $26. 3 \Upsilon$, lat. $1^{\circ} 31' b.$, sed visibiliter in $26^{\circ} 1\frac{1}{2}' \Upsilon$, lat. $0. 48\frac{1}{2} b.$ δ igitur non longe abesse debet, sed collocato centro ☉ ad horam praescriptam in $25^{\circ} 52' \Upsilon$, δ versari debet inter ejus margines, occidentalem in $25^{\circ} 35' \Upsilon$ et orientalem in $26. 9. \Upsilon$. At computo locum eccentricum quidem $25^{\circ} 50' \Upsilon$, visum vero $25. 34\frac{1}{2} \Upsilon$, lat. $0. 26\frac{1}{3} b.$

Anno 1486. 20. Aug. h. 3. mane δ censebatur in linea ex oculo γ austrino in cornu sept. seu pedem Heniochi.

Computatur lat. δ 0. 56 a. Cum ergo stellae fuerint in $2^{\circ} 36' \Pi$, lat. $5^{\circ} 31' a.$ et in $15^{\circ} 23' \Pi$, lat. $5^{\circ} 20' b.$, diff. long. $12^{\circ} 47'$, lat. $10^{\circ} 51'$, δ vero distiterit ab oculo $4^{\circ} 35'$, sequitur portio de diff. longitudinis 5. 24, ut sie fuerit in $8^{\circ} 0' \Pi$. At computo eccentricum quidem $23^{\circ} 36' \Upsilon$, visum $8^{\circ} 4' \Pi$.

Distantias per radium captas, quae sunt appositae, omitto ut vitiosas;

fixis n. dant $17^{\circ} 34'$, quae non est major $16^{\circ} 43'$. Cumque δ ad oculum fuerit in linea, oportuit intervallum fixarum aequari ab intervallis δ ab una et altera junctis, at illa perperam faciunt summam $17^{\circ} 6'$.

Anno 1486. 7. Sept. fuerat Mars inter duo cornua Tauri hora quarta de mane post medium noctis, distans a cornu meridionali per duas Lunas, et erant in una linea haec tres stellae.

Stellae erant in $15^{\circ} 23' \Pi$, 5. 20 b., et $17^{\circ} 36' \Pi$, $2^{\circ} 14' a.$, diff. long. 2. 13, lat. 7. 34. Martis vero latitudo computatur 0. 39 a., differt igitur a cornu australi per 1. 35, quae sunt non duae, sed tres Lunae. Ergo long. diff. a cornu australi retrosum est 0. 28', ut fuerit δ in $17. 8 \Pi$. At computo in eccentrico $4^{\circ} 0\frac{1}{2}' \delta$, visum in $17. 14\frac{1}{2} \Pi$.

Anno 1488. 13. Sept. h. 4. post medium noctis notavi Martem circa stellam 11. Π , et distabat versus septentrionem non plane per unam Lunam.

Stella erat in $11^{\circ} 21\frac{1}{2}' \odot$, lat. 0. 14 a. Computo locum δ $11^{\circ} 21' \odot$, lat. 0. 30 b. Diff. lat. $44'$, quod est plus quam diameter \odot . Nam si vel per 2° promoveam \odot , sc. a 17° in $19^{\circ} \delta$, non ultra $4'$ detercentur de hac latitudine, cum eccentricus δ sit in $1^{\circ} 21' \Pi$.

3. Oct. de mane fuerant in una linea Mars et duo capita Π . Distabat Mars a sequenti capite versus orientem fere in duplo distantiae duorum capitum.

Stellae erant in $13^{\circ} 6\frac{1}{2}' \odot$, $10^{\circ} 2' b.$ et $16^{\circ} 8\frac{1}{2}' \odot$, 6. 38. b., diff. lat. 3. 24 habet differentiam long. 3. 2. δ latitudo computatur $57' b.$, differt igitur a meridionali per $5^{\circ} 41'$, trahit igitur diff. long. $5^{\circ} 4'$. Ita δ crit in $21^{\circ} 12\frac{1}{2}' \odot$; computo eccentricum in $11^{\circ} 38\frac{1}{2}' \Pi$, visum in $21. 39\frac{1}{2} \odot$. δ dicitur a merid. capite abfuisse fere duplo distantiae capitis, et sane $5^{\circ} 41'$ et $5^{\circ} 4'$ sunt minora duplo harum 3. 24 et 3. 2.

Anno 1490. 18. Sept. vidi δ circa implicitatem Cancrī nebulosam, fueratque modicum occidentalis et meridionalior. Item die sequente 19. Sept. factus fuerat orientalis fere aut modico plus quam praecedenti die fuerat occidentalis, habens latitudinem ab ea valde parvam, ad modum palmi aestimando. Consideratio haec facta est de mane hora 4. post medium noctis. 21. Sept. h. 3. post medium noctis de mane δ distabat a 5. Cancrī per diametrum Lunae, trahendo lineam a quarta in quintam, distabat aestimando ad medium palmi propinquior quintae quam quartae, orientalis existens ab hac linea.

Ex observatis dierum 18. et 19. apparet, Martem circa meridiem diei 18. aut 2 vel 3 horis post fuisse conjunctum nebulosae in \odot , quam Praesepe appellamus, sed exiguo meridionaliorem transiisse. Stella fuit in $0. 12\frac{1}{2} \odot$, lat. $1^{\circ} 14' b.$ Computo eccentricum locum $25^{\circ} 41\frac{1}{2}' \Pi$, visum $0. 15\frac{1}{2} \odot$ in meridie, lat. computatur 1. 7. b., quae est quinta c. parte de diametro \odot minor latitudine stellae. Sequente 21. Sept. mane distantia δ ab aello quasi diam. \odot . Triduo igitur minus h. 12 promovit c. 1. 20, dictum $32'$, quod congruit antecedentibus.

Anno 1491. 23. Mart. de mane inter secundam et tertiam post medium noctis Mars in una linea cum octava et sexta Leonis. Habuit vero ab octava $\frac{2}{3}$ totius intercapedinis octavae et sextae.

Stellae in $22^{\circ} 26' \odot$, lat. $8^{\circ} 47' b.$ et $22^{\circ} 44' \odot$, lat. 0. 26 b. Lat. diff. 8. 21, hujus pars quinta $1^{\circ} 40'$. Censuit observator igitur, δ habere latitudinem $3^{\circ} 46' b.$, long. $22^{\circ} 37' \odot$. Computo eccentricum 14. 41 Π , visum 22. 31 \odot , lat. 3. 35. b.

Anno 1492. 26. Sept. de mane quasi h. 5. post medium noctis fuerat Mars fere in eadem linea cum sexta et septima \odot , et australior a septima, ita quod septima fuerat aestimando praecise media inter sextam et Martem, trahendo autem lineam per sextam et septimam, fuerat Mars occidentalis ab hac linea, quasi ad spatium digiti

minutorum admissos, quod fatetur ipse observator, armillas intra 10' nihil determinare.

Durat haec superatio observationis per Nov. et Dec., ubi ad 2^o pervenit. Sed cum 4. Nov. sit nihil ultra 38', et 28. Nov. nihil ultra 1^o 40', die tamen 16. Nov. intermedio apparet 2^o 23'. Nam h. 9½ post ejus diei meridiem δ refertur in 24^o 30' \odot , lat. 2^o 15' b. At quin 23^o 30' sit legendum nullus dubito, ut superatio sit 1. 23, consona antecedenti minori et sequenti majori. Calculum addit et calculus meus, computo enim 23^o 59' \odot , usitato excessu super ephemeridem his diebus, lat. 2^o 21½' b. Ecce locus 25^o 13' Π .

Seq. Dec. 14. h. 6. p. m. observatus est δ in 18^o 20' \odot , excessu super locum ephemeridicum meridiem sequentis 2^o 14', qui munitur aliquot dierum consensu. Et 3. Jan. mane h. 3. p. m. n. lu 10^o 45' \odot (vel 10^o 55', ut post 12. Febr. anni seq. corrigendum monet observator), excedens ut modo. Consequens igitur est, ut 24. Dec. vesp. fuerit in 14^o 25' vel 14^o 35' \odot c. Atqui computo ego ad hoc momentum, quo δ Υ fuisse puto, ecce locum 13^o 7' \odot , visum 14^o 38' \odot . Adhuc igitur excedit calculus, sed minus.

Anno 1504. 19. Jan. de mane armillis rectificatis per Cor Leonis, medio coeli existente 10^o \triangle , reperi Martem 6^o 10' \triangle , latitudinae non accepta.

Correcite 6^o 10' vel 6^o 20', imo 6. 31½ \odot secundum Tychohem, cum motu retrogradu paulum esset supergressus Υ . Computo locum ecce. 24^o 44' \odot , visum 6^o 17½' \odot . Fuit δ Υ retrogradorum, Υ per 15' promotiore. Sane huic computo 6. 50 \odot , cui adimendus est excessus calculi, ut restet 6. 34½ \odot . Ab hoc ablati 15', restant 6. 20. Puto igitur legendum non 6. 10, sed 6. 0 \odot , ut sit mihi 6. 21; nam post sesquidiem ponitur in 5^o 45', cum motus sesquidiurnus sit 15'.

Diebus 6. 7. 8. 9. Febr. erat δ Υ retrogradi et δ directi, utriusque stationi viciat et variant observationes in pauculis minutis, ut in ambiguo relinquamus de ipsa die. Sed tamen probabilis 9. Febr., quem confirmat observatio pomeridiana. Referuntur planetae in 4^o 53' \odot , id est Tychohi in 4. 57½, lat. inter 3. 42 et 3. 25. Sed 3. 42 die 8. scriptum puto pro 3. 24. per transpositionem. Computo locum ecce. d. 6. Febr. h. 4. lu 2^o 48' \odot , visum in 4. 56 \odot , die 9. ecce. 4. 17 \odot visum 5^o 1½ \odot , lat. 3. 24½ b. Ita Martis calculus hic minime excederet, si modo tanta fides determinationi loci planetarum observatori est.

Die 3. Mart. vesp. h. 6½: δ in 9. 15 \odot per Aldebaran positam in 2. 46 Π , per 1^o 30' ante η , et 11. Mart. h. eundem aut paulo serius in 11^o 48' \odot , lat. 1. 27 b. per 1. 0. ultra η . Ergo δ facta est 8. Mart. e. h. 2. p. m., quando δ in 10. 47 \odot . Computavi ad m. n. seq., h. 10½, serius, quando consentaneum est, observandum fuisse in 10^o 57' \odot (fixa in 11. 1½), computavi inquam 11^o 10' \odot , ecce. 16^o 51 \odot . Excedo itaque per 8½. (Si fides armillae, abundo per 13.)

Sed adjungamus et ultimam observationem in libro Waltheri. Diligens is fuit et satis felix cum armillis suis, longo neu sc. exercitator factus. Non deest tamen vitia, puto typographica, quorum aliqua supra tacta; sed his adde 23. Apr., ubi δ in 1^o 20' \odot , cum seq. 24. Apr. sit demum in 0. 35', quem locum firmiter consensu dierum sequentium; adde et 18. Maji, nam pro 15^o 28' \odot censuerim legendum 13^o 28', ut sit idem excessus super locum ephemeridiae, qui fuit d. 23. seq.; adde denique 29. Maji, ubi excidisse videtur digitus scriptumque est 19. 5 \odot pro 19. 25, teste seq. 30. Maji et

diurno ephemeridis. Ergo 30. Maj. p. m. h. 9. 14' scribitur δ observatus in $20^{\circ} 0'$ Ω , i. e. in $20. 4\frac{1}{2}^{\circ}$ lat. $1 10'$ b. Computo $20^{\circ} 11\frac{1}{2}'$ Ω , lat. $1. 19\frac{1}{2}'$ b., locum eccentricum $23^{\circ} 13'$ Π . Hic finis observationum Waltheri.

Quod attinet primam Regiomontani, si diligenter pensitemus verba, certl reddemur, Regiomontanum in consignatione diei hallucinatum esse et scripsisse d. 2. Dec., quae erat 1. Dec. Aut decepit se ipsum, cum sic scriberet: Die 2. Dec. in initio noctis vidit Jo. de Monteregio Romae Martem et Saturnum. Nuper Romam venerat, nam d. 22. Jun. praecedente adhuc erat in Mellico Austriae. Cum igitur horologia Romana incipiant cum occasu Solis, fieri potest, ut Regiomontanus noctem praecedentem accensuerit diei sequenti 2. Dec. Vesperi cubitum iturus, typum rudem fecisse videtur situs siderum, mane vero surgens, cum jam curreret 2. Dec., descriptionem, quod apparet ex eo, quia utitur verbis praeteriti temporis: *Vidit etc. Martem et Saturnum, qui secundum longitudinem zodiaci censebantur conjuncti ex numeris almanach, quod tamen visui non apparuit. Tunc enim consideranti mihi duae stellae fixae, quae sunt in capite ζ , cum stella Martis aestimabantur in una linea recta etc.* Sed praecipuum argumentum hujus hallucinationis continetur verbis sequentibus, cum ait: *Distantia autem inter δ et ζ aequabat eam, quae inter duas stellas dictas est, distantiam, quae quidem 2° fere complectitur.* Sane reperit Tycho differentiam latitudinum $2^{\circ} 22'$, longitudinum non ultra $13'$. Sed argumentum in sequentibus ego pertexam. Ipse enim cum suam argumentationem de errore 2° conclusisset, subnectit novum paragraphum: *Die 5. Dec. adverte oculos, tunc enim visu videbantur conjuncti.* Habebat adhuc in animo diem 2, a quo triduum numerat usque ad plenam conjunctionem, sciebat enim Saturni quidem motum tridui esse c. $18'$, Martis vero $2^{\circ} 21'$ c., eoque superationem fore paulo ultra 2° , quantam ex collatione ad fixas aestimaverat eorum distantiam. Nam latitudo δ australis erat, Martis itidem australis, nec multo major quam Saturni; quare distantia planetarum pene tota imputatur longitudini. Sit enim distantia tanta, quanta fixarum, sc. $2^{\circ} 22'$, et differant planetae in latitudine 1° : diff. long. remanebit $2^{\circ} 9'$, quam vidit confectum ζ in triduo. Haec igitur per-scripta cum essent d. 2. Dec., sequentibus diebus observator adjunxit ista: *Aspezi hoc die (5.), sed nubes impedimento fuere. Verum in principio noctis 6. Dec. aspiciens, vidi Martem jam praeteriisse Saturnum per gradum et dimidium, distantia enim inter eos erat fere subaequaltera ad distantiam, quae inter duas stellas capitis ζ sunt.* Et sane bes de $2^{\circ} 22'$ cat $1^{\circ} 34'$. Tanta si fuit distantia planetarum differentium in latitudine per 1° , fuit igitur diff. long. $1^{\circ} 12'$, itaque si exacta fuit comparatio distantiarum, deprehenditur δ inter utramque considerationem superasse motum δ per $3^{\circ} 21'$ et sic promotus esse longius, quantum sc. δ est promotus. Haec jam comparemus cum intervallo dierum. Nam si similis est observatio principio utriusque diei, quatrividuum solum Intercessit et superatio diurna δ fit $50'$ et sic motus diurnus $56'$, quod nimium est. Sin autem die 2. Dec. intelligenda est nox praecedens, die vero 6. Dec. nox sequens, 5 dies intercederent et superatio diurna δ fit $40'$ et sic diurnus ipse $46'$. Et ecce in omnibus hypothesibus diurnus hoc situ et habitu ad \odot est tantus, sc. $47'$ fere; nam ad vespeream 6. Dec. computo $1^{\circ} 11\frac{1}{2}'$ ζ . Quis dubitet, quin prima observatio sit facta vespere, quae sequitur diem 1. Decembris? Ne vero de die 6. nocte seq. etiam dubitatio esset, ecce characterem irrefutabilem: *Luna*

tunc aspectus videbatur cum duobus stellis, quae in cauda δ sunt, constituisse triangulum aequilaterum. Praecedentem sane ex duabus caudae collocat Regiomontanus ipse in $14^{\circ} 29'$, pauculis minutis ultra quam Rudolphinus calculus. Luna igitur c. 17° est visa. Et ecce post duos cyclos, a. 1499, nocte quae sequitur diem 6. Dec. Luna iterum ibidem. Sed ne cyclus fallat propter bisextos novem solos interceptos, perpende, si 10 essent intercepti, Lunam visam futuram fuisse ultra hunc locum. Itaque consular calculi Lunae, qui a. 1461 p. m. 6. Dec. currentis sistit Lunam in $16^{\circ} 8'$ motu copulari; per aequationes menstruas ulterius, quia Luna crescit, accedens ad apogaeum et \square . Vicissim parallaxis in occasum non est magna, quia Luna satis alta in signo longarum descensionum; et si unam horam adjeceris tempori, habebis Lunam ulterius.

Igitur d. 1. Dec. locum δ ego computo $27^{\circ} 17'$, non ultra $11\frac{1}{2}'$ ultra locum, qui in linea cornuum fuit. At quis ab hac aestimatione Regiomontani lineae rectae, in qua triplo major erat distantia δ a proxima, quam fixarum inter se, quis inquam hic tantam visus subtilitatem exigit, ut ex eo iudicium facere velit, excedatne meus calculus an coincidat? Sufficit igitur, non refutari calculum ab observatione Regiomontani.

Quod attinet alteram observationem, quae habita esse perhibetur d. 24. Dec., duo diversa nobis patent effugia, quorum alterutrum est absolute necessarium. Nam quia per Lunam certi facti sumus, planetam d. 6. Dec. p. m. in principio noctis spectatum esse $1\frac{1}{2}^{\circ}$ a γ , per commensurationem vero orbium hoc habemus, nonnisi ante 5 dies et sic in principio noctis, quae sequitur 1. Dec., potuisse esse $2\frac{1}{3}^{\circ}$ ante γ , quando spectatus est in $27^{\circ} 17'$ δ ; consequens igitur est et eidem commensurationi orbium conveniens, ut vespere, quae sequitur d. 24. Dec., nequaquam possit esse conjunctus secundum longitudinem nec uni nec alteri in cauda δ , sed loco intermedio. Distant enim hae fixae plus quam 2 diurnis δ . Aut igitur praecedenti 23. Dec. ant sequenti 25. adscribenda erit observatio; non vero sequenti, nam etsi calculus meus exactissime in loco fixae sequentis sistit planetam, sc. in $16^{\circ} 4'$, etiamque calculus loci δ Alphonsinus, qui accommodatur a Regiomontano huius diei, omnino repraesentat diem 25; at haec fixa non est lucidior, nec verisimilis est, observatorem in die aberraturum fuisse, maxime propter magnam sollemnitem diem 25. Dec., quae est Christi Natalitius.

Ergo utamur altero effugio et retenta fixa priori dicamus, observatorem eo numerandi more usum, quo prius etiam 2. Dec., initium sc. diei 24. Dec. statuisse in occasu antecedenti. Ablato igitur diurno $42'$ a $15^{\circ} 28'$ loco, quem calculus meus monstrat ad diei 24. noctis seq. initium, restat $14^{\circ} 41'$ pro principio noctis, quae antecedit diem 24. Dec., cum fixa praecedens et lucidior fuerit in $14^{\circ} 29'$. Si igitur exacta sit huius conjunctionis aestimatio, excedo rursum ut prius per $12'$.

Conspectus omnium.

1. $28^{\circ} \delta$	1474. 7. Mart.	Agnito vitio typographico pro 3, per Assequor, alias excedo σ cum Asello etc.	per $37\frac{1}{2}$.
2. 1. $\eta\eta$	1476. 24. Jan.	Sublato vitio c. unam fixam et di-	missa rectitudine lineae omnimoda c. 40.
3. 1. $\eta\eta$	1479. 30. Oct.	Sublato vitio c. diem, si fides radio in distantia parva per lat.	Excedo $2\frac{1}{2}$.

4. 16° \cap	1476. 19/20. Febr.	Agno vito c. stellam propinquissimam et testimonio radii inter falsa	Assequor, per alias radii excedo vario.
5. 15. —	1491. 23. Mart.	Sat fida aestimatio rectae in latum	Excedo per 6.
6. 23. —	1504. 30. Maj.	Si fides armillae	" " 11 $\frac{1}{2}$.
7. 28. —	1481. 15. Nov.	Adhibita latitudine. Si fides radii in distantie parva	Excedo per 11 $\frac{1}{2}$.
8. 29. —	1464. 11. Dec.	Sublato dubio c. unam fixam, si exacta aestimatio rectae et distantiae a fixa	Deficio per 13.
9. 6. Δ	1476. 12. Apr.	Adhibita latitudine constanti dist radii ab una fixa per 2 transversales	" " 12.
10. 11. —	1493. 27. Mart.	Sat fida aestimatione praecessiois et retrocessionis \odot fixae ejusdem lat.	Excedo per 8 $\frac{1}{2}$.
11. 13. —	1478. 16. Mart.	Sublato vito circa stellam per conjunctionem cum ea	" " 16 $\frac{1}{2}$.
12. 3. \cap	1497. 15. Febr.	Per \odot 24, cujus locus incertus	
13. 15. —	1478. 19. Maj.	Sublato vito c. stellam et mediante inter errores radii	Deficio per 3 $\frac{1}{2}$.
14. 5. Σ	1465. 19. Jan.	Si exacta aestimatio distantiae	Excedo per 15 $\frac{1}{2}$.
15. 24. \equiv	1461. 1. Dec.	Sublato dubio c. diem. Si exacta aestimatio rectae lineae	" " 11 $\frac{1}{2}$.
16. 8. \times	1461. 28. Dec.	Sublato dubio c. diem, si exacta aestimatio \odot fixae platicae	Excedo per 12.
17. 19. \vee	1471. 26. Jul.	Adhibita latitudine, si exacta aestimatio superationis hinc per fixas	" " 9.
18. 24. —	1486. 20. Aug.	Adhibita latitudine, si exacta aestimatio rectae	" " 4.
19. 4. σ	1486. 7. Sept.	Sublato vito aestimationis per Lunae, si exacta aestimatio rectae per latitudinem	Excedo per 6.
20. 26. —	1484. 28. Nov.	Per \odot 2 cum δ , si fides horae et loco 2	Assequor aut forte aliquid deficio.
21. 1. \sqcap	1488. 18. Sept.	Sublato vito circa stellam, adhibita latitudine et correctae aestimatione dist. per \odot hanc	Assequor.
22. 1. \sqcap	1503. 30. Sept.	Discussio dubio de stellis, si bona aestimatio (notatio dierum) processum et successum	Excedo per 24.
23. 9. —	1503. 13. Oct.	Si fides armillae et per eas distantiae a Palladio	" " 13 vel 3.
24. 12. —	1488. 3. Oct.	Si fide aestimatio merae rectae tam longae, Marte extra stellas, per latitudinem	" " 27.
25. 25. —	1503. 16. Nov.	Detectio vito scriptoris, siquidem fides armillae	Excedo per 29 vel 19.
26. 26. —	1490. 18. Sept.	Sat fida aestimatione processiois et successiois Praeseptis, exigua lat.	" " 3.
27. 3. \odot	1475. 18. Sept.	Si fides meditationi inter magnos errores radii et deductioni	Deficio per 15 $\frac{1}{2}$.
28. 13. —	1503. 14. Dec.	Per armillas sat fido consensu multorum dierum	Excedo per 13 vel 3.
29. 20. —	1493. 26. Sept.	Sat fida aestimatione	" " 3.
30. 24. —	1468. 26. Apr.	Si exacta aestimatio rectae, per dist. latitudinum fixae et planetae	Assequor.

31. 25. ☽	1504. 19. Jan.	Per armillas	Excedo per 3 vel deficio per 10.
32. 30. —	1462. 15. Sept.	Adhibita latitudine pro aestimata distantia, et exacta aestimatione rectae	Excedo vel deficio per 6. Hic error scriptoris in latitudine.
33. 4. ☽	1504. 9. Feb.	Per armillas	Excedo per $3\frac{1}{2}$.
34. 6. —	1477. 15. Oct.	Si fida aestimatio inter errores radii, aut si fidus in contextu, per latitudinem	Deficio per 25 vel per 10. Hic etiam paulo ante error in maslo.
35. 13. —	1462. 16. Oct.	Si fida aestimatio praeventiois et postventionis fixae	Deficio per 17.
36. 17. —	1504. 8. Mart.	Si fidae armillae	Excedo per 13.

Meditatio super computatis observationibus Regiomontani et Waltheri in Marte.

Loca 36 sunt computata, e quibus 14 deprehensae sunt continere vitium, graphiceum quidem duae (1 et 25), in numero dierum tres (3, 15, 16), saltem in diversa numeratione principii diei, 7 in falsa fixa (2, 4, 8, 11, 13, 21, 22), 1 in aestimatione intervalli (33), et per diametros Lunae una (19), in aestimatione rectae praecisae per fixas duae de prioribus. Ex his observationibus 7 constant radio fallaci (3, 4, 7, 9, 13, 27, 34), ad 10 concurrunt aestimatio distantiae per se lubrica (sc. ad 1, 8, 14, 15, 17, 21, 22, 26, 29, 35), 11 constant aestimatione rectae per 2 fixas (2, 5, 8, 14, 17, 18, 19, 24, 29, 30, 32), 7 sunt habitae per armillas aut fidas (6, 23, 25, 28, 31, 33, 36), una per σ ☽ (20), 8 per σ cum una fixa (1, 10, 11, 16, 21, 22, 26, 35), 1 per σ cum Π solitario (12).

Cum autem plerumque parvum sit discrimen inter observationem et computationem, posset id plane contemni in his, quae per radium quaeque per aestimationem vel rectae vel distantiae etiamque quae per armillas sunt peractae. Solae, quae per σ planetae cum Luna aut cum fixarum una sunt habitae, plus videntur mereri fidel in arguendo discrimine calculi et observationis. Illae igitur sunt nobis considerandae amplius, adjuvantis rectarum aliquibus, quae in latitudinem abeunt et ubi planeta parum abfuit a fixarum una. Igitur in 17. 18. 19, ubi observatus est δ ad cornua et oculos γ per rectas, excedo per 9, 4, 6, δ in eccentrico erat in fine Υ et initio δ . Sed in 21. 22. planeta diversis annis eodem in loco eccentrici stans, in principio se. Π , visus est cum eadem stella in ventre Π , et tamen una vice assequor, altera excedo per 24. Hoc regulari nihil sapit. Anni fuere 1488, 1503, idem mensis Septembris. Fixam utroque tempore diversimode scriptam latitudo prodit, quatenam fuerit. Confirmat calculum et 26, quae vidit δ cum Praesepe vicina eodem mense Septembris, sed a. 1490, cum esset ratione eccentrici in fine Π , quod assequor. Ex adverso confirmare videtur excessum calculi in 1. idem Asellus, cum quo visus est planeta 1474 Martio, ubi calculus excedit per 87. At confirmatio haec est nulla. Nam non excederet calculus pene duplo, quantum nupiam alibi, et praeterea alius mensis est, alius eccentrici locus, finis λ , circa quem locum calculus observationes, ut vides in 35, 36, 2—5, plerumque assequitur, aut etiam deficit multum in contrarium, si nullum admittas in observatione vitium esse factum, id quod ab omni regula abhorret. Recte ergo videor agnovisse in 1. sphalma typographicum, quo stabilito assequor observatum. Adhuc igitur excessus in 22. stat solus, contra quem testantur 20, 21, 23, circa loca eccentrici circum-

stantia, ut, quid hunc ventri Π acciderit, nesciam, an ille hoc anno 1503. 30. Sept. fuerit loco motus. In 29, 32, 35 situs planetæ ad Leonis cor, cervicem et pectus, assequor. In 8, 10, 11 excessus et defectus alternant suntque parvi circa syrma et pedem Π . In 16. c. caudam γ non multum excedo pro latitudine stellæ. Nihil igitur restat, quod nos admodum tor-
queat, nisi solus et unicus ille locus numero 22, anno sc. 1503. 30. Sept. Ejus igitur causa computavi δ loca etiam ad

	26. Augusti.	16. Sept.	22. Sept.	28. Sept.	1. Oct.
Et inventi	23° 55' Π	8. 21 $\frac{1}{2}$ ' \odot	8. 17' \odot	11. 6' \odot	12. 25' \odot
Cum observator prodit	23. 58	5. 15	8. 5	10. 45	
Sed per suam correctionem	24. 8	5. 25	8. 15	10. 55	
At per meam in fixa	24. 7	5. 29	8. 19	10. 59	
Differentia ergo	12 —	7 $\frac{2}{3}$ —	2 —	7 +	

Nam observator monet ad 16. Sept., se in his observationibus posuisse fixam in oculo γ super 2. 35 Π , cum tamen propter motum temporis intermedi, ex quo locum ejus investigaverat, debuerit addere 10', quæ etiamnum vult addi omnibus locis observatis. Ego vero ad hoc tempus invenio locum fixæ ex epocha Tychonis et motu fixarum in 2. 49. Cum igitur observator satis constanter prodant eandem remotionem Martis ab Aldebaran, per diurnos legitimos augescens (nam nullius momenti censendi sunt defectus et excessus extremi, facientes in summa non plus quam 18 $\frac{1}{2}$ '), duorum alterum erit: aut Mars die 30. Sept. cum ventre Π non fuit, sed 29. Sept., aut venter Π loco motus est et remotior factus ab Aldebaran, quod procul dubio verum non est. Ergo falsum diem dixit Waltherus.

Sed exstat hujus hallucinationis documentum non obcurum in ipso auctore. Cum enim absolvisset narrationem de 28. Sept., transit statim ad 1. Oct., dicens, eo die planetam tanto orientiorem fuisse octava Π , quante d. 29. Sept. ea fuerit occidentalis, cum tamen nihil præmisit de die 29. Sept. Ergo, inquit, die 30. fuit eorum conjunctio. Sequeretur, si bene elatus fuisset, 29. Septembris. At quid si citandus fuerit 28. Septembris? Tunc enim et observatum est, non 29. Septembris, et observatione et calculo testibus visus est in 10. 59 vel 11. 6 \odot , præcedens ventrem secundum Tychonis numeros per 35' vel 28'. Jam 1. Oct. calculo teste fuit in 12° 25' \odot , æquens per 49', quod est paulo plus quam illud. Et quis a memoria Waltheri quantitatis in cœlo absentis visæ et erasæ aestimatae scrupula exiget, dum eam jam præteritam nadius cum ea, quæ jam erat præsens et oculis subjecta, comparat? Sed pone, præciue fuisse æqualia interstitia, referretur ergo venter per hanc observationem d. 28. Sept. et 1. Oct. in 11° 38' Π , proxime locum, quem el Tycho assignavit. At si hæc æqualitas de 29. Sept. et 1. Oct. esset intelligenda, venter poneretur in 11° 50' vel finem 12° \odot , quod est incredibile.

Accedat igitur ceteris 14 erroribus scriptoris in Marte, luce meridiana clarioribus, accedat inquam hic quoque 15. in die, quod ex præterito citatus sit 29. pro 28. Quo admissio stat calculus δ , nec habet quicquam, quo circa annos abhinc 120 et 170 erroris arguatur.

Addam vero etiam unum argumentum ex σ Π 6. Oct. 1503. Cum enim computem locum Π 14° 43' \odot per 18' plus justo, ut fere fuerit in 14° 23 $\frac{2}{3}$ ' \odot , visus est Marti junctus secundum longitudinem, cum tamen computem locum δ 14° 34 $\frac{1}{2}$ ' \odot , 11' plus justo, quod solum, non vero 24 confirmatur a 28. Sept., 1 Oct.; vide obs. Π . Quin imo etiam 15. Oct., 16. Nov., 19. Jan., 9. Febr., 8. Martii vide excessum confirmari.

Quid sit praestitum in collocatione epocharum Martis.

Cum existent observationes Martis a veteribus habitae non plures quam quinque: una Dionysii anno a. Chr. 272. d. 18. Jan. mane, ut Ptolemaeus ait Hipparchum interpretatum esse, reliquae quatuor ipsius Ptolemaei ex annis Chr. 130, 135, 139, quarum tres in situ Martis acronycho, quarta tertiae proxima intra triduum, confirmata etiam conjunctione cum Luna: primum deprehendi, applicatis commensurationibus orbium hodiernis, non posse teneri omnes tres acronychas ad anguem, uti sunt in Ptolemaeo numeris expressae, quantamcunque libertatem usurpes locandi aphellum et accommodandi motum medium. Secunda mea cura fuit deliberare, num aequalitas excessus in una defectusque in altera, quae plurimum ab invicem discedant, sit apprehendenda, anne mordicus arripienda una, quae ceteris certior videatur? Dum prins illud tento, deprehendi, duas illas socias ex anno 139, quarum posterior cum Luna conjunctam exhibet planetam, has igitur et inter se consentire et statim ex una parte, defecturum sc. in his calculum. Hoc observato consultis est visum, calculum ad has duas adducere quam proxime, sic tamen, ut et tertiae excedenti, ex anno sc. 130, parum aliquid indulgeatur, quo et ipsa modico a calculo exprimatur. Quartam vero ex a. 135. tanquam unicam passus sum evagari ad totam fere magnitudinem ex excessu et defectu maximis compositam. Id ita factum est partim etiam in gratiam Dionysianae antiquae, ut calculus etiam illi, quantum fieri posset probabiliter, appropinquaret; de qua jam plura.

Tertio namque, utramcunque viam ex dictis ingrederer, apparuit, per epochas a Ptolemaeis observationibus dependentes et per motus admensas ad temporis intervallum inter Tychonis certissimas observationes et Ptolemaicas dictas, non posse teneri Dionysianam observationem, quia potius calculum nostrum transcendere ejus locum spatie satis magno, ut quod Mars visibilis motu confecturus sit intra triduum. Hac de re querela exstat etiam in fine libri mei, Commentaria de motu stellae Martis inscripti. (Vol. III. fol. 481 sa.)

Hoc super negotio magna fuit orta cogitationum mearum perturbatio, consiliorum varietas. Cum enim viderem, hanc observationem iam denum ac praebituram calculo, per observationes Ptolemaicas sese verum ascendenti, si ex 18. Jan. in 15. ejus diem transponatur, coepi dubitare de fide tam Ptolemaei quam Hipparchi (cui ille acceptam fert ordinationem observationum veterum) in applicando die mensis Aegyptii ad diem 25. mensis Capricornionis Dionysiani, suspicatus, fieri potuisse propter varias annorum formas ex antiquo, non satis forte cognitas Hipparcho recentiori, ut Hipparchus tridecum aberraverit. Confirmabar in hac opinione conjecturis aliis, quod sc. viderem, ex observationum Dionysianarum (quae sunt omnino 7; una sc. in Marte, una in Jove, quinque in Mercurio), ex harum inquam diebus in mense pleoraeque quidem esse denominatos ab illius gradus numero, ad quem graduum locus Solis medius, a Ptolemaeo computatus, proxime accedit, et tamen alicubi numerus hosce dici in mense et gradus Solis in signo multum ab invicem discedere. Et illud quidem redolebat methodum anni solaris tropici, qui a paraepigmatate, quod addi solebat, denominatur, hoc vero, cum ab anno lunari excusari nequireret, unde igitur accidisset, conjici nequaquam poterat. Indulsi tamen aliquamdiu opinioni de anno lunari, praesertim circa hanc Martis observationem. Vidi enim, si pro 18. Jan. 15. sumeretur, illum omnino esse Lunam 25. ejus mensis, cujus *dyogyma* in Capricornum incidere et sic hoc

sensu esse 25. *Ἀδύνατος*. Hac itaque ratione conciliabam hanc Dionysii observationem conjunctionis Martis cum fixa, ut ad Ptolemaeus quatuor se associaret, eamque ob rem minimum aliquid mutavi in epochis, ut illam in 16. Jan. relictam exacte tuerer.

At vicissim haec ausa rursum e manibus mihi sunt excussa, dum reputo, haud paulo leviorcm hanc ignominiam Iuri Ptolemaeo et Hipparcho artificibus (quod in rationibus calendarii Dionysiani triduo, alibi plus aberrasse insimulantur), quam si quis diceret, illos observationibus Dionysianis (ut quarum dies ob anni formam usu desitam essent in obscuro) dies assignasse, ad commodum suum accommodatos. Reputabam et illud, Dionysium, qui tam sedulus fuit in observandis siderum exortibus planetarumque ad fixas applicationibus, procul dubio non praeterisse Lunam, quin potius hujus sideris habitudines consimiles consignatas ad posterum transmississe. Hoc vero si datur, h. e. si Lunae phases observationibus ceterorum a Dionysio fuerunt interspersae adque dies mensium zodiacalium adscriptae, jam omnium dierum certitudo in clarissimo lumine versata esset nec latere Hipparchum amplius potuisset.

Adde observationes Mercurii, quae et ipsae talem errorem Hipparchi circa certum ejus diem in anno Aegypto proderent; quaelibet enim tot gradibus hoc solo nomine discedet a regula calculandi, quot diebus erratum fuerit in consignatione diei. Atqui si adhibeamus commensurationes orbium Mercurii hodiernas, exprimemus nostro calculo observationes illas Dionysianas satis prope, nec tantum ab iis aberramus, quantum Hipparchus in numeratione diei a gradu Solis debuisset aberrare, si nostra illa suspicio locum haberet de anno lunari.

Dimisso igitur anno lunari reditum est ad solarem tropicum, ubi me et haec incescit suspicio: cum locus Solis et numerus diei, ille a Ptolemaeo computatus ex tabulis post Christum constructis, iste a Dionysio quadringenis annis antea, plerumque conspirent, an igitur Ptolemaeus, arrepto numero, a quo Dionysius diem mensis zodiacalis denominavit, quasi is numerus locum Solis in signo indicaret, per suam loci Solis computationem elieuerit diem certum anni Aegyptii. Quodsi hoc ille fecisset, verebar ne Dionysius quinto saeculo superius solaris itineris computum habuerit alium, eaque de causa Ptolemaeus de mente Dionysii aberraverit in prodenda die mensis Aegyptii. Hic ut in hortis Alcinoi *ὄρχη ἐπ' ὄρχησιν ἡρασκεῖ μέλος δ' ἐπὶ μέλῳ*, sic mihi labor alius ex alio natus. Compulsus enim sum adire libros Scaligeri de Emendatione Temporum et in iis locum illum, ubi agit de anno coelesti Dionysiano deque paraepematis graecarum nationum. Ao cum habeat auctor ille in more positum, continuo orationis filo miscere propria judicia cum iis, quae ex idoneis affert auctoribus, nec disertis ubique verbis inter proprias opinioni-nes et antiquorum traditiones distinguere: ne igitur ab ipso deciperer, adendum et Geminus ipse fuit, auctor Scaligeri locupletissimus. At ne sic quidem eximebatur mihi suspicio; nam Geminus et ipse posterior Hipparcho fuit Christique temporibus proximus. Ita labor hic omnis fuit inanis.

Interim altitavit, et primaevae epochas exquirere, ut scirem, quam prope cardines illae versarentur, deprehensumque, si motus a nobis per vestigia Ptolemaeorum observationum supra descripta progredierentur aequaliter ad initia rerum, ad diem nempe signatam certissimis Solis et Lunae motibus eorumque cardinalibus epochis, incidere motum Martis medium in $10^{\circ} 32' \odot$, apellium in $12^{\circ} 48' \zeta$; verum igitur locum δ in $2^{\circ} 7' \odot$; et apellium

quidam nulla observationum religione vetabar (quin potius ab observatione Dionysiana in 15. Jan. relata invitabar) a 15^o ☿ dedecere, tanquam a puncto cardinalium medio eoque verisimili: at motui medio manum admoovere, ut epocha ejus ad 0^o ♀ locaretur, non enim ausus, sed neque vero motui, qui propior erat puncto cardinali. Nam si duos abundantes gradus initio rerum detraham, detrahetur tempore Ptolemaei circiter dimidium, atque 25' in oppositione cum Sole jam ultra gradum excurreret. Tantum vero errorem observationes Ptolemaei facile redarguunt. Et tamen cum viderem, desiderare et Dionysianam observationem (diei suae relictam), ut attollatur epocha versus initium ☿, non neglexi etiam per illam propagare motus ad initia rerum, sprotis Ptolemaicis. Retento igitur aphelli motu, ut cujus mutatio minus turbat, et applicata observatione Dionysiana, epocha initialis motus medii Martis in 3^o 45' ☿ venit. Id vero ubi Chr. Severini Longomontanus, vir in hac arte clarissimus, resciverit, non equidem poterit non summopere gaudere. Is enim et ipse, neglectis observationibus Ptolemaei, tanquam astrolabio infido peractis, epochas suas ad hanc Dionysianam observationem (tanquam fidei plus meritam, ob ocularem aspectum conjunctionis eum fixa) accommodavit, ignarus, se, quod in Solis apogaeo magna gratulatione deprehendit, apogaeum ejus in 0^o ♀ incidere, idem quam proxime et in motu medio Martis praestitisse, si modo diem creationis, quam ego propono, quippe ab epochis Solis et Lunae signatam, attentiore mentis oculo lustraverit.

Ego vero, etsi hanc observationem Dionysianam a meis habebam partibus, eaque non admodum iniqua epocha motus Martis medii cardinem ipsisimum 0^o ☿ penitus assequi posset, non tamen tantam mihi summi licentiam, propterea quod seirem, 11 gradibus in rerum initio (et sic 3^o circa saeculum Ptolemaei) deestis, concurrente et aphelli luxatione, posse in oppositionibus cum Sole, quae Ptolemaeo fuerunt observatae, differentiam existere 10 graduum, quam calcei exorbitationem observationes Ptolemaei facile redarguebant.

Interim vero et hoc annotavi, si ad initia rerum collocarem locum Martis eccentricum verum (non medium) in 0^o ☿, tunc calculum incessurum medium inter observationes Ptolemaei ab hac et Dionysii ab illa parte. Ne huic quidem conclinnitati quidquam, quod vergeret in praedictum Ptolemaei, censui indulgendum esse. Primum enim, si verum motum ☿ potius quam medium respecerem, jam eadem mihi lex esset observanda in Sole, Luna, Venere, Mercurio. At in Sole depulsus fui a vero motu et compulsus ad medium rationibus idoneis et metu observationum obtestantium. Et quamvis in Luna verum motum elegerim, at Luna secundarius est planeta, factumque id est propter rem aliam, quae in punctis ceteris spectari non potest, puta propter phasin seu novilunium exactum; nec erat arbitrii mei haec electio, quin extorserunt mihi in Sole medium, in Luna verum locum circumstantiae tam observationum, quam initii naturalis dierum et divinitus revelati septimanarum. Sed esto, placeat alieni verus Martis locus, quem sub initia rerum in punctum cardinale referat, mihi neque verus neque medius tanti erat, ut ejus locandi gratia Ptolemaicas observationes violandas indulgendumque Dionysianae censerem, quod fecit Longomontanus. Etenim instituta comparatione verisimilissimum pro utroque observatore pugnantium, Dionysius (praeterquam quod fixa adjuvabatur) omnibus reliquis rationibus victus est. Dionysius enim unicam observationem suppeditat, Ptolemaeus quatuor; ille tiro fuit, iste peritus artifex; ille inter antiquos est, astronomiae minus gnarus, iste vixit erudito saeculo; ille inter primos inventores censetur, hic magistros habuit; ille loquitur popu-

hariter, iste accurate. Nam et instrumentis usus est et diligentiam adhibuit, cum ille radi Minerva quid sibi videretur consignavit: $\epsilon\delta\kappa\alpha\iota$, inquit, $\pi\rho\omicron\varsigma\tau\epsilon\theta\alpha\iota\epsilon\mu\epsilon\lambda\iota$. Adde, quod circa veram diem observationis Dionysianae dubitavimus, circa tempora Ptolemaica dubitare non possumus, quoties ille, ut in Marte, Lunam adhibuit.

In proximo consilio abhinc retro retentum fuit aphellum, ubi id erat per antecedentia constitutum. Sequitur igitur aliud consilium, susceptum in favorem Dionysii, in Ptolemaeum paulo iniquius. Subiit enim animum explorare, num usurpata libertate locandi aphell per duas observationes, unam Dionysii, suae diei relictam, alteram Ptolemaei, per Lunae applicationem confirmatam, possit una confieri hypothesis, utcumque illa dissentiret a duabus reliquis acronychis Ptolemaei. Verum apparuit, nisi totis 30 gradibus detractis de loco aphelli, hactenus constituti, obtineri propositum non posse. At quia tanta mutatio cum triga acronychiarum Ptolemaei pugnat hostilissime, manum de tabula subduxi, dimisi tandem hoc vulnus dissensus a Dionysio velut incurabile.

Restat ut effectum calculi sic confirmati, ut est initio dictum, ponam ob oculos conique locis a Ptolemaeo proditis conferam, ut appareat, verumne sit, quod in huius euleudi fundamentorum descriptione dixi, per eum tres Ptolemaicas representari satis exacte. Martis visa loca Ptolemaeus habet:

$21^{\circ} 0' \Pi$, $28^{\circ} 50' \Omega$, $2^{\circ} 34' \nearrow$, $1^{\circ} 36' \nearrow$,

id est secundum meam praecessionem: $22. 3 \Pi$, $29. 53 \Omega$, $3. 37. \nearrow$, $2. 39 \nearrow$.

Computabam prius: $21. 46 \Pi$, $0. 10 \Omega$, $3. 41 \nearrow$, $2. 39 \nearrow$, existente epocha aphelli $12.48 \nearrow$.

Sed epocha aphelli in $15^{\circ} \nearrow$ locata, sic: $22. 11 \Pi$, $0. 46 \Omega$, $3. 24 \nearrow$, $2. 41 \nearrow$, cum Lunae centrum visibiliter reperitur in $0. 10 \nearrow$

pro eo, quod Ptolemaeus dicit in $0. 0 \nearrow$

ex sua praecessione. (Ptolemaeus dicit \nearrow per $1^{\circ} 36'$ fuisse ultra Lunam.) Ego invenio Martem ultra Lunam $2^{\circ} 34'$, satis accurate.

Quod nodum attinet, primum in Comm. Martis ad sola Ptolemaei verba attendi, affirmantis, limitem \nearrow boreum esse $\pi\epsilon\tau\iota\tau\alpha\ \tau\epsilon\lambda\epsilon\upsilon\tau\alpha\iota\alpha\ \tau\omicron\upsilon\ \kappa\alpha\tau\iota\omega\upsilon$. Et si igitur ipse in calculo limitem confert exacte in apogaeum, sc. in $25^{\circ} \odot$, magis tamen ego attendi ad verba jam scripta, posuique in $29^{\circ} \odot$. Jam vero, postquam differentiam praecessionis aequinoctiorum meae a Ptolemaica stabilivissem $1^{\circ} 3'$, etiam haec epocha in principium Ω promoveri debuit. Cum autem Ptolemaeus observationem alleget expressae nullam, suspicatus aliquamdiu sum, ipsum, confusum observationi Dionysianae, perinde ac si Mars in illa diceretur texissae fixam, inde nodi locum derivasse. At postea me colligens vidi, si adhiberem inclinationem, quantam inveni hodie ex observationibus Tychois, et si latitudinem frontis Scorpii, quantam Ptolemaeus ponit, sc. $1^{\circ} 20'$, Marti transcriberem, nodum tempore Dionysii recisurum in $5^{\circ} \Pi$, limitem in $5^{\circ} \Omega$, Ptolemaeo igitur ulterius. Reversus igitur ad Ptolemaicas observationes et placita, qui latitudinem maximam boream definit $4^{\circ} 20'$, australem $7^{\circ} 0'$, sic sum ratiocinatus: oportere ut Ptolemaeus eas latitudines observaverit in sitibus acronychis. Instratis igitur omnibus oppositionibus \odot et \odot , quae poterant incidere in annos illos, quibus reliquae Ptolemaicae observationes comprehenduntur, apparuit, de boreali quidem latitudine maxima statuendum illi fuisse ex annis 130, 133, 135, quibus incidebant oppositiones in $21^{\circ} \Pi$, $25^{\circ} \odot$, $29^{\circ} \nearrow$, de australi vero ex anno 141, quo anno fuit oppositio in $15^{\circ} \nearrow$. Nam ceterae oppositiones acronychiae circumstantes

discedant longius a nodo australi. Valde autem erat verisimile, Ptolemaeum in 25° ☉ observasse tantam latitudinem, quantum desinit maximam borealem. Sed tamen et hoc perpendendum fuit, potuisse illam aliquid ex observatione dnam circumstantium colligere, sc. earum ipsarum, quas adhibuit ad investigationem apogaeum, etsi quid in earum latitudine observaverit, literis non mandavit. Cum enim illae removeantur aequalibus intervallis a 25° ☉, siquidem Ptolemaeus latitudinem utrobique observando invenit eandem, dicere potuit, limitem esse in medio; si vero paulo majorem illam in 25° ☉, jam limitem concludere potuit esse ulterius, sc. *περι τα ταλάντια του ηακκρον*. Et inventi, si triente gradus major latitudo deprehensa fuerit in 25° ☉ quam in 21° ♀, jam de nodo in fine ☉ certum esse potuisse. Munivi autem me etiam contra insidias diversitatis intervallorum Solis et Terrae, Solisque et Martis in 21° ♀ et 25° ☉, et si Ptolemaei (de ejus observationibus agimus) hypotheses considerationem hanc non requirunt. Inveni autem, non multum hic turbare intervalla.

Cum igitur appareret omnino, suppetiisse Ptolemaeo observationes ad hanc nodi locationem commodas, non videbatur in dubium vocandum ejus affirmatum de limite in fine ☉, h. e. mihi (per meam praecessionem) in principio ☉. Hoc igitur statuto, jam Dionysio nodus in 26° ♀ veniebat et Martis latitudo ad 15. Jan. (haec enim dies mihi adhuc haerebat in animo) computabatur c. $1^{\circ} 8'$, ut sive eadem fuerit olim obliquitas eclipticae, quo hodie, Mars visus fuerit propter fixam stare et sic ad illam agglutinnatus esse, sive obliquitas et fixae latitudo olim majores, Mars igitur meridionalior eadem transiverit. Quorum utrum velis ferunt verba observatoris.

Etsi vero Mars d. 18. Jan. nodo appropinquat, diminnens latitudinem, ut fiat minor quam $1^{\circ} 8'$, manet tamen adhuc borealior stella secundum hodiernum abacum, sc. $1^{\circ} 7'$ b. Itaque multum acquirit fidei haec observatio, quocumque die incidit. Cum autem hoc pacto nodus in rerum principio valde prope medium signi Piscium veniret, operam dedi, ut calculus id medium teneret exquisitus.

Postquam haec in Marte tentassem, dimisso eo transivi ad Jovem et Saturnum. In hoc vero deprehendi ex manifestissimis Waltherianarum observationum indicis, motus medios diversis seculis non ad minimas usque minutiis esse constantes, sed cum non ultra 120 et 160 annos a Regiomontano et Walthero absimus, calculum tamen per observationum Ptolemaicarum vestigia ad nos usque deductum aequaliter relinquere post se Saturnum ad Waltheri seculum spatium satis notabili $35'$, $40'$, $45'$, $50'$, idque constanter per totum eccentrici circuitum, ne quis existimet, in apogaei vitioso loco causam residere. Tale vero quippiam etiam in Jove etiamque in Marte ad illud Waltheri seculum contigisse apparet, idque in partes contrarias, ne quis rursus hoc falsis fixarum locis possit attribueret.

Detecta hae inexpectata omnibusque mathematicis incognita inaequalitate, jam recordatus ego difficultatum, quas adiassem in locandis epochis Martis, dissidique quod se obtulit ex seculo Dionysii et modicae discessionis epocharum *Xenotiarum* a punctis cardinalibus, jam mirari et fatigari desti, certissime persuasus, epochas omnino omnes in crestone in punctis cardinalibus fuisse locatas exque his veluti careeribus tum planetas ipsos, tum eorum aphelia nodosque in sua quolibet spatia excurrisse; quod vero reperitur dissidium observationum quolibet seculo ab aequalitate horum cnsuum in calculo observata, id post plurium seculorum insufficientem experientiam aliqua

aequationes seculari, quae suam habeat ordinatam restitutionem (similem ei, quam in apogaei eccentricitatisque Solis, inque aequinoctiorum obliquitatisque eclipticae variationibus commentum sunt antecessores), pensandum esse. Interim vero utendum additionibus et subtractionibus empiricis extra ordinem legesque perpetuorum motuum, eulibet aeulo, Dionysii scilicet et Ptolemaei et Waltheri (plura enim non sunt), accommodatis, ut eas additiones vel subtractiones hac ratione retineantur in memoria posteritatisque transmittantur, quae suas quoque observationes adiungat tandemque adjuncta ab his, quae nos ei transmittimus, hanc quoque secularem restitutionem, quae procul dubie circularis est, in lucem eruet.

Hoc igitur spectans coepi duplicare epochas, insertis interlineatibus, quas motum quidem medium a $0^{\circ} \gamma$, aphelium vero idem a $0^{\circ} \gamma$, et nodum similiter a $0^{\circ} \gamma$ demitterent. Ex his epochis si computetur Dionysiana observatio, tantundem praevernit locum a Dionysio indicatum, quantum, qui ex Ptolemaeis computatur, eundem post se relinquit, suae dei relictum. Ergo hoc Dionysii aeulo $2^{\circ} 6'$ essent addendi, latitudo etiam δ sit $20'$ maior, quod stante latitudine fixa Ptolemaica $1^{\circ} 20'$ ab observatione redargui non potest, ut ita de nodi cardinali epocha difficultas sit nulla. Ptolemaicam vero α δ \odot 10 fore gradibus hic calculus praeverit, ergo Ptolemaei aeulo $3^{\circ} 55'$ essent addendi, si recte locatum est aphelium initiale in $0^{\circ} \gamma$, quod iidem de causa, quibus supra repudiatum fuit ultimum consilium, periculosum factu videtur, nisi ipsum etiam aphelium inaequali motu transponere velit.

Consideratio observationum Regiomontani et Waltheri circa Venerem.

Principio notandum, cum loca Veneris sub fixis pendeant a locis Solis sub fixis, sic ut error in Sole redundet in Venerem, causam tamen nullam esse, cur de locis \odot sub fixis dubitem.

Anno enim 1460. 27. Dec. „Luna in oppositione vera laminarium“ deficiens ad fixas est observata, et prodit calculus meus Solis praecisissime eundem situm Lunae ad fixas, qui observatus est. Et incipiunt observationes Veneris statim sequenti anno 1461. 14. Dec. vesp. visa est statim futura α \S \odot . In die non est error facile statuendus. Die enim 6. recte numeravit, indice Luna, die quoque 17. sequenti proxime, indice eclipsi \odot de loco \odot , quem prodit $5^{\circ} 24'$ \S , cum ego d. 14. Dec. inveniam $2^{\circ} 7'$ \S . Dato igitur loco \S , habebitur etiam locus \odot . At d. 6. Dec. compute locum \S $29^{\circ} 14'$ \S , sed cum compute locum δ certius in $1^{\circ} 11\frac{1}{2}'$ \S , et cum \S tunc fuerit observatus $1^{\circ} 34'$ antecedere δ , certior igitur fuit locus \S observatus $29^{\circ} 37\frac{1}{2}'$ \S . Hinc adde pro diebus 8 hoc situ et habitudine $53'$, erit \S vel in $0^{\circ} 7'$ \S vel in $0.30\frac{1}{2}$ \S , et \odot ante hunc locum. Videbantur, inquit observator, mihi \odot et \S conjuncti secundum longitudinem sodiaci, aut statim conjungendi, accedente Veneri ad Saturnum. Tunc \odot habebat de \S $1^{\circ} 51'$ fere per numeros Alphonsi, \S vero $0^{\circ} 24'$ \S . Sequentia errorem habent, cum ait, ecce differentiam in $15'$, et videtur legendum $1^{\circ} 27'$. De latitudine dicit, fuisse utrumque meridionalem, \odot tamen meridionaliores Saturno quantitate Solis geminati secundum aestimationem, h. e. 1° , quod et numerus ponebat Alphonsinus.

Computo igitur 0. 44 \S , lat. 1. 44 austr., cum ex \S locis indicatis visa sit vel ante $0^{\circ} 7'$ \S vel ante $0^{\circ} 31'$ \S . Itaque ei verus est cal-

eius circa Saturnum vel Martem, excedit circa Venerem, at si versus circa Venerem, deficit circa Saturnum et Martem, cum tamen circa Martem excedere demonstratus sit aut coincidere. Probabiliter abundat c. 18 vel 28; Saturno deficiente circa 23, Mars coincidet vel per 13 excedit.

Latitudinis differentiam invenio c. $1\frac{1}{2}$, nam lat. ♄ austr. non potest esse major $0^{\circ} 30'$, potius minor. Locus eccentricus in 11° ♄ postulat retroagi, at gradus unus ademptus loco ♄ eccentrico, refert illam in $0^{\circ} 21'$.

Post dies 27, anno sc. 1462. 10. Jan., cum recessuisset apparitionem Mercurii, transit eratione continua ad Venerem: et etiam post initium noctis videbatur Venus conjuncta stellae fixae, quae est in principio aquae Aquarii et est 28, erat tamen Venus orientatior hac stella $45'$ ad aestimationem, statimque transit ad 11. Jan. locumque ☉ $0^{\circ} 41'$; et invenio quidem 10. Jan. ☉ in $29^{\circ} 42'$ ♄, nullum igitur est dubium in die. At de stella dubium oritur, est sane prima fusionis in abaco 23. numero, at latitudinem habet $4^{\circ} 9'$ bor., cum ♄ lat. sit $1^{\circ} 24'$. Quae potuit igitur esse conjunctionis hujus seu superationis ♄ aestimatio in intervallo $5\frac{1}{2}$ latitudinis?

Praeterea stella haec est anno 1600 in $3^{\circ} 52'$ ♄ et anno nostro in $1^{\circ} 55'$ ♄, quem locum si ♄ superasset solis $45'$, non ultra $2^{\circ} 40'$ ♄ pervenisset, cum ego computem $4^{\circ} 3'$ ♄, per $1^{\circ} 23'$ ulterius, quod multum superat excessum proximum. Vicissim vero ab illis haec 23. pingitur in urna, quibus sequens (24.) sit prima fusionis, et haec jam est australis 0. 19'. Verum et circa hanc difficultas oritur. Collocatur enim in $6^{\circ} 4'$ ♄ et anno nostro in $4^{\circ} 7'$ ♄. Si hunc locum ♄ ad ortum superasset $45'$, ♄ ergo esset in $4^{\circ} 52'$ ♄ visa, et calculus deficeret $49'$, qui ante 27 dies inventus est excedere, quod in tam brevi intervallo fieri simul nequit. Aut igitur legendum pro $45'$ sic: 4. 5', aut pro orientatior legendum: occidentatior. Illis calculus proxime assequeretur observatum, hic excederet $41'$, quod idem etiam 14. Dec. facere deprehensus est. Adhuc igitur cupit retroagi, sive per stellam nominatam multum, sive per correctionem et stellae et plagae parum.

Eodem anno 1462. Sept. observata est ♂ ♄ ♄ circa Cor Leonis diebus 19, 26 et 27. Martis locus hoc tempore ex calculo habetur satis accurate, ut proba ad 15. Sept. antecedentem. Igitur 19. Sept. h. noctis 11. ♄, Cor ♄, ♂ videbantur in una recta, ♄ quidem meridionalior, ♂ autem septentrionalior Corde ♄. Dist. ♂ a Corde ♄ ad distantiam ♄ ab eodem apparuit sesquiquarta.

Prius periclitabimur consensum in latitudine, quam in ♄ computo 0. 25' austr., in ♂ 1. 18 $\frac{1}{2}$ bor. ante triduum, Cordis vero est 0. 26 bor. Calculus igitur dat intervallo proxime paria, sc. ♄ et Cordis $0^{\circ} 51'$, Cordis et ♂ 0. 52 $\frac{1}{2}$. Cor igitur proditur distantia Martis sensibiliter antior? An quia dilatatio radiorum Veneris minuit speciem intervalli? Nam de latitudinum rationibus nihil est, cur dubitem. Praesertim in Marte latitudo major non fuit, vel observatione teste, quae d. 15. volebat excessum latitudinis ♂ supra Cordis ♄ non majorem diametro Solis fere, quam tamen calculus exhibet $50'$. Cum igitur locum ♂ computem ad d. 15. in $22^{\circ} 1'$ ♄, quadridui motus hoc situ et habitudinis ad ☉ addit 2. 29. Est igitur locus ♂ in $24^{\circ} 30'$ ♄, superans locum Cordis ♄ (quod est in $22^{\circ} 19\frac{1}{2}'$ ♄) per $2^{\circ} 10\frac{1}{2}'$. Venus igitur paulo minori intervallo fuit ante Cor ♄, siquidem in una recta fuit, sc. in $20^{\circ} 16'$ ♄. At computo illam in $20^{\circ} 44'$ ♄, rursum igitur excedit calculus c. 28. Aut si ♂ excedit $3\frac{1}{2}'$, excessus calculi ♄ erit $24\frac{1}{2}'$, et ♄ in $20. 19\frac{1}{2}$ ♄. Planeta ratione eccentrici est in 8° ☐, angulus ad ♄ 74° , rursum igitur minui

postulat locus eccentricus, ut angulo ad Venerem majori major sit prosthaphaerensis ablative.

Die 26. Sept. in mane, hora 11. noctis ♀ et ♂ et stella una Leonis de quarta, sic puto, magnitudine, videbantur quasi in una recta linea, interque septentrionalior respectu hujus stellae, nam limbus Veneris orientalis tangere videbatur lineam rectam, quae transibat per ♂ et stellam dictam. Distantia autem ♀ a stella praedicta videbatur sesquialtera ad diametrum Veneris.

Adde motum dierum 7, sc. 4^o 18' ad locum ♂, promovebitur is in 28^o 48' ♀, lat. 1. 21. b. Stella vero erat in 28^o 51' ♀, lat. 0. 8' b. Sic igitur et ♀ proxime hanc lineam fuisset. Non est tamen ne hic quidem locus sine dubio. Nam compute lat. ♀ 0. 39 bor., superavit igitur latitudinem stellae per 31'. At hoc quomodo aequat sesquialterum diametri Veneris, nisi Regiomontanus vitiosissimam habuerit aciem oculorum, cui se Venus tantum dilataverit? Deinde si Venus limbo suo horizontali strinxit lineam, erat igitur 10' ante fixam. Nam si 31 est sequi, 10 est semis et sic erit in 28^o 41' ♀, cum ego computem 28. 36. Quomodo subito calculus ex excedenti factus est deficiens? Anno potius pro orientali legendum est occidentali, ut sit ♀ in 29^o 1' ♀? tunc calculus adhuc amplius deficeret. An igitur dies vitiosa, ut fuerit haec potius 27. Sept.? Tunc computarem anno 29^o 42' ♀ rursusque excederet calculus, sed nimio, sc. 1^o 1', aut si etiam vocem orientali mutarem, adhuc 41' excederet. Locus in 18^o II hac duplici medicina adhuc postulat retroagi, ut augeatur commutationis angulus ejusque duo membra, alterum ad Venerem minus quadrante, alterum prosthaph. ablative.

Sed fortasse plura nos docebit d. 27. Sept. Tunc enim 3 sidera videbantur in triangulo aequilatero, ♀ enim recessit a stella praedicta versus orientem. Rursum magna difficultas. Differentia latitudinum ♂ ♀ major non est, quam 0. 39'; quodsi die 26. exsistente fuissent conjuncti, superatio diurna ♂ ♀ major esse non posset quam 30', et potius minor fuit, si retineatur lectio orientali. Nihil igitur ultra 49 planetae potuerunt distare. At ♂ a fixa certo distabat plus quam 1^o 13', quanta est differentia latitudinis Martis et fixae. Quare siquidem Mars superaverat fixam, aut tota ratio latitudinum est falsa, aut aequilatera figura non fuit, sed bene acquicrura, basi ♂ ♀ minori. Nam si plane fuisset aequilatera, Mars proxime stellae locum longitudinis aut etiam ante illum caderet, quia latitudo Veneris multum superat latitudinem fixae. Eato acquicrurum et aucto latitudines ♂ 1^o 21', ♀ 0. 42', ut sint differentiae latitudinum a stella 1^o 13' et 0. 34'. Quanta erunt crura, ut fiant aequalia, Marte in 29^o 25' ♀ collocato ex suo calculo, et quorsum recidet ♀? Scilicet crura erunt 1^o 20½' et ♀ in 0. 4' III. Ergo d. 26. esset in 28^o 51' ♀, ut sic vere prius et calculus deficiat et occidentali legendum sit.

Denique si ne nunc quidem probabile est, calculum tam cito deficere, qui modo bis excesserat, transferatur etiam ista observatio de 27. in 28. Sept., tunc Mars erit in 0. 2' III, lat. 1^o 22' b., quare distabit a stella 1^o 43'; distet tantum et Venus, latitudine ad hanc diem 0. 45, differentia ejus a stella 37', tunc ipsa veniet in 0. 27' III et sic pridie fuisset in 29^o 20' ♀, quando calculus dicit 29^o 42' et sic plus justo, ut prius etiam; sed hujus figurae basis ♀ ♂ erit non major quam 45½', itaque acquicrura, non aequilatera, etiam hic est figura. — Ratio medicinae est eadem, quae prius.

Sequitur ad d. 20. Oct. observatio Veneris, in qua erratum in die; ponitur enim 21. Oct. At ☿ observata simul et conjuncta planetae in 28^o III

arguit fuisse 30. Oct. Tunc ♀ nondum consecuta fuerat sextam Π P, sed distabat ab ea versus occidentem secundum quantitatem aequalem semidia-
metro Lunae. Erat sexta Π P in $27^{\circ} 19'$ Π P cum lat. $1^{\circ} 25'$ b. At vero
computatur lat. $1^{\circ} 30'$ b., long. ♀ $26. 45\frac{1}{2}$ Π P. Cumque distiterit ♀ ab
hac stella in occidentem quantitate diametri ☉, calculus ergo noster hoc
loco proxime coeincdit.

Sequitur ad 25. Oct. observatio ♂ ♀ cum septima Π P: Venus meridio-
nialis ipsa stella in duabus diametris solaribus secundum aestimationem.
Est intervallum VI. et VII. $5^{\circ} 19'$, cui adde $34'$ distantiae proximae ♀ a VI.
in occidentem, summa $5^{\circ} 53'$ faceret diurnum $1^{\circ} 11'$ non absurdum; cal-
culus sane vult majorem. Itaque etiam hic proxime coeincidit calculus. Com-
puto enim ♀ in $2. 47$ Ξ , lat. $1. 40$, cum sit stella in $2. 38$ Ξ , lat. $2. 60$
et sic $1. 10$ borealior quam ♀. Hoc vero dixit observator 2 diametros ☉.
Locus eccentricus sextae Π P rursus poterit per hanc observationem nonnulli
retroagi.

Anno 1478. 21. Febr. vespere observata est ♂ ♀, Venere jam e. $18'$
orientaliore et $1^{\circ} 59'$ septentrionaliore, ut in ♀ observationibus est explicatum.
Computo lat. ♀ $0. 58\frac{1}{2}$ b. et ♀ $1. 2\frac{1}{2}$ austr., et sic diff. lat. $2^{\circ} 1'$. Amplius
computo ♀ in $25. 0$ Υ et ♀ ibidem exacte. A quo vero planeta stet de-
fectus calculi, quod ♀ non est $18'$ occidentior, hinc Hoes aliquatenus col-
ligere: observata est enim distare, ut in ♀ supplevi textum, ab occidentali
cornu Υ $7^{\circ} 43'$ per radium, ab orientali $10^{\circ} 32'$. Stellae erant in $26^{\circ} 39'$ Υ ,
 $0. 29$ Υ , lat. $8^{\circ} 29'$ b. et $9^{\circ} 57'$ b., unde subtracta latitudine Veneris
 $0. 58\frac{1}{2}$ b. per differentias latitudinum differentiae longitudinum eduntur $1^{\circ} 48'$
et $5^{\circ} 32'$, et ♀ in $24^{\circ} 51'$ Υ vel $24^{\circ} 50'$ Υ . Ergo si fides est hoc loco
radice, abundat calculus noster $10'$. Et ♀ ratione eccentrici in 5° ☉, angulo
ad ipsam 70° seu minore 90° , retroagi debet, ut prosthaphaeresis addenda
fiat minor. At si radius peccavit excessu, facile crimen hoc calenti evanescit.

Sequenti 11. Aug. hora quasi tertia post medium noctis de mane vidi Venerem
quasi medium inter duas stellas Π et fuerat ♀ fere in una linea cum ipsis, modicum
tamen distans ad occidentem, et videbatur in modico plus distare a meridionali, quam
a septentrionali. (Necdum penitus in linea, sed postridie eadem hora eodem intervallo
ultra lineam.)

12. Aug. hora ut supra vidi iterum ♀ et tantum facta fuerat orientalis a linea
recta per has duas stellas protracta, quantum die praecedenti apparuit occidentior.

Apparet ex latitudine, fuisse stellas in ventre et poplite, quae hoc tem-
pore erant in $11^{\circ} 12'$ ☉, $0. 14'$ austr. et $11^{\circ} 29'$ ☉, $5^{\circ} 41'$ austr., ergo
medius punctus est $2^{\circ} 57\frac{1}{2}$ austr., long. $11^{\circ} 20\frac{1}{2}$ ☉. Cum autem Venus
sit in elongatione maxima, diurnus ejus est aequalis diurno ☉ aut paulo
minor; ergo ab hoc loco abfuit dimidio diurno, sc. $29'$, atque sic in $10^{\circ} 51\frac{1}{2}$ ☉.
Computo igitur $10^{\circ} 48'$ ☉, lat. $3^{\circ} 19'$ a., et sic plus distantem non a meri-
dionali, sed a septentrionali. Locus eccentricus est 8° Υ ; si cum retraham
deorsum, prosthaphaeresis subtrahenda fiet exiguo minor et sic Venus exiguo
ultra $10^{\circ} 48'$ ☉ computabitur, ut et observata est.

Sequitur observatio ad 21. Sept. distantiae Veneris a Corde α , cum eandem
haberet latitudinem. Sed cum observator dicat, „se accepisse grosso modo,“
ego invenio insuper etiam vitium in numero transversalia typographicum, procul
dubio quia, cum alias non soleat terminari nisi in cyphram, hic tamen termi-
natur in 9. Nominem igitur turbet haec observatio.

Anno 1481. 15. Nov. ante ortum Solis h. 1. observata est ♀ distare a

Spica $4^{\circ} 6'$, occidentalior Hia, a ζ $4^{\circ} 39'$, a σ $4. 29$ per radium. Computo vero lat. ζ $2. 32\frac{1}{2}$ borealem, quae cum lat. Spicae $1. 59$ australi composita, dat diff. lat. $4. 31\frac{1}{2}$, qua major esse debuit distantia, cum ζ dicatur occidentalior fuisse. Vitiosa igitur est haec distantia et deficiens. Exploremus distantiam ζ et σ , nam hujus latitudo computatur $1^{\circ} 3'$, diff. $1^{\circ} 29\frac{1}{2}'$, quae de dist. $4. 29$ vindicat longitudini $4^{\circ} 13\frac{1}{2}'$, quae de loco σ computato $20^{\circ} 56'$ ablata relinquit $16^{\circ} 42\frac{1}{2}'$, aut quia observatio Marti dat plus, etiam hic ζ plus nanciscitur, sc. $16^{\circ} 54'$.

Denique per distantiam a ζ eundem explorabimus. Computatur n. lat. ζ $2^{\circ} 22' b.$, sed ζ lat. est $2^{\circ} 32\frac{1}{2}'$, diff. $0. 10\frac{1}{2}$ de distantia ζ $4^{\circ} 39'$ vindicat longitudini nihil minus. A loco igitur Saturni Venus prodiit in ejus observationibus tripliciter, sc. vel $21^{\circ} 25'$, vel ante $21^{\circ} 8'$, vel ante $20^{\circ} 36'$; aufero $4^{\circ} 39'$, restabit Veneri vel $16^{\circ} 46'$, vel ante $16^{\circ} 29'$. Et computo $16^{\circ} 29'$, qui sane locus est paulo occidentalior Spica. Locus eccentricus est 28° , qui si retroagatur, prostaphaeresis minimo aliquo crescet, et Venus parum admodum retrahetur in antecedentia.

Post dies 4 secuta est σ ζ . Nam d. 19. Nov. matutina h. 1. ζ a ζ distitit in occidentem et austrum $0^{\circ} 46'$. Cum autem latitudinem ejus inveniam proxime minorem latitudine Saturni, sc. $2^{\circ} 14'$ borealem, quod observationi consonat, omnis haec distantia $46'$ abibit in occasum. Habetur autem locus ζ ex fixa $21^{\circ} 54'$, quare locus ζ erit $21^{\circ} 8'$ aut forte anterior, si etiam ζ anterior.

Observata est ζ etiam ad Spicam, a qua distabat $6^{\circ} 22'$; et eum ejus latitudo invenitur $2^{\circ} 14'$, ut sit diff. lat. $4^{\circ} 13'$, erit longitudinum differentia $4^{\circ} 47'$ et sic locus ζ $21^{\circ} 22'$ per Spicam, ubi radius procul dubio paucillum peccavit excessu; tunc enim in tanta obliquitate distantiae facile multum nocetur longitudini. Verior itaque est ille prior. Computo pro eo $20^{\circ} 57\frac{1}{2}'$ deficitque calculus $10'$ aut forte nihil. Locus eccentricus ζ est 5° .

Consensus causa comparetur et σ , qui distitisse dicitur a Spica $7^{\circ} 40'$, in longum igitur $7^{\circ} 3'$, ut fuerit sic in $23^{\circ} 38'$. Idem a ζ $2^{\circ} 46'$, de quibus cum in latum eant $1^{\circ} 11'$, in longum igitur $2^{\circ} 32'$, ita ζ ex σ in $21^{\circ} 6'$, ibidem ubi et prius ex ζ . Nec distantia σ a ζ ultra $12'$ ab hoc consensu abit, proditur enim $2^{\circ} 22'$, dans in longum $1^{\circ} 56'$; ita veniret in $23^{\circ} 50'$ per locum ζ constitutum.

Post alios 6 dies, 25. Nov. h. 6. fuit σ ζ ζ , Venero tamen $20'$ orientaliore quam erat ζ , quod patet ex distantia utriusque a ζ , etiamque septentrionaliore; distabat enim a ζ $1^{\circ} 32'$. Sed locus σ habetur tripliciter: 1) ex calculo $27^{\circ} 37'$, lat. $0. 59$ bor., 2) ex distantia a Spica $11^{\circ} 34'$, de qua differentia latitudinum $2^{\circ} 56'$ vindicat longitudini $11^{\circ} 11\frac{1}{2}'$, itaque σ esset in $27^{\circ} 46\frac{1}{2}'$, proxime ut calculatus est; 3) ex loco ζ et distantia ab eo $5^{\circ} 14\frac{1}{2}'$, de qua differentia latitudinum $1^{\circ} 25'$ vindicat longitudini $5^{\circ} 3'$. Sive ergo locum ζ deduxeris ab illo, qui computatus est ad 15. Nov. in $21^{\circ} 25'$, addito motu 10 dierum, ut jam sit $22^{\circ} 25'$, sive niti velis et hujus distantia a Spica $7^{\circ} 16'$, de qua differentia latitudinum $4^{\circ} 21'$ vindicat longitudini $5^{\circ} 50'$, ut sit $22^{\circ} 25'$ ut prius, prodibit locus σ ex ζ $27^{\circ} 28'$. Ita distantiae transversae faciunt, ut discedant ab invicem loca σ per $18'$ et calculus ejus teneat medium.

Jam progrediamur ad constituendum locum ζ per σ . Id fit etiam bifa-

riam: aut addendo $20'$ ad locum \odot , ita \odot haberet $27^{\circ} 57' \frac{1}{2}$, aut $9'$ plus minusve; aut per distantiam a \odot et computatam Veneris latitudinem $2^{\circ} 23' b$. Nam differentia latitudinum $1^{\circ} 26'$ de distantia $1^{\circ} 32'$ vindicat longitudini $0.34'$, quod $14'$ superat id, quod dederunt distantiae a \odot . Sed ut saepe dixi, iustum hoc est usgotium ex tam parvis distantiis, in latum exporrectia, velle de longitudine iudicare, quare omittatur hic modus. Comparentur potius duo alii ex distantis a Spica et a \odot . Et simplicior est ille a \odot , quia planetae habent eandem latitudinem. Quare ad locum \odot supra iaventum $22^{\circ} 25' \frac{1}{2}$ adde distantiam $5^{\circ} 34'$, provenit $27^{\circ} 59' \frac{1}{2}$ ut prius fere. A Spica vero cum distiterit \odot $12^{\circ} 26'$, de quo differentia latitudinum $4^{\circ} 22'$ vindicat longitudini $11^{\circ} 39'$, ita \odot veniret per Spicam in $28^{\circ} 14' \frac{1}{2}$, cujus excessus parvuli culpam rursus gerit transversa distantia. Computo vero locum \odot $28^{\circ} 0' \frac{1}{2}$, cum locus eccentricus sit $14\frac{1}{2}' \odot$.

Anno 1486. d. 20. Sept. de mane h. 5. post medium noctis fuerat \odot orientatior Corde Leonis per unam Lunam, latitudo apparebat fere eadem. 21. Sept. facta fuerat Venus orientatior eadem stella per tres Lunas.

Erat Cor \odot in $22^{\circ} 40' \odot$, lat. 0.26 . Veneris latitudo computatur in sept. c. 4—6'. Itaque distantia aestimata non omnis abiit in longitudinem. Nam differentia latitudinum $20'$ de distantia $33'$ vindicat longitudini $26'$. Sic locus \odot esset $23^{\circ} 6' \odot$; computo $23.4 \odot$.

Post quadriduum 24. Sept. fuerat \odot ac \odot inter 10. et 11. h. ante meridiem, fuerat \odot septentrionalior a limbo Lunae per semidiametrum Lunae. (Diametro ergo ab ejus centro.)

Computo ad h. $10\frac{1}{2}$ aequalem Uraniburgi verum locum \odot $27^{\circ} 30\frac{1}{4}' \odot$, lat. $0.16\frac{1}{2}'$ sept. Ad eandem vero horam $10\frac{1}{2}$ apparentem Norbergae fuit \odot in ipso nonagesimo, carens parallaxi longitudinis, sed parallaxi latitudinis $37\frac{3}{4}'$, itaque visa lat. centri \odot $0.21\frac{1}{4}'$ merid.

Veneris vero locum ad hoc tempus computo in $27^{\circ} 54' \odot$, lat. $0.21 b$. Dist. \odot a centro in sept. $42'$, quod est paulo plus diametro \odot . Et si vero \odot per $23'$ plus habet in orientem, non censeo tamen idoneum hoc excedentis documentum, quia inter h. 10. et 11. nihil est definitum, praesertim cum ante quadriduum calculus cum observatione coincideret. Haec est causa, cur aequationem etiam temporis omiserim.

Anno 1489 coepit Waltherus artificem agere in astronomia. Nam posthabitis tabulis motuum ipse altitudines \odot in meridie exquisivit, et ex his locum \odot computavit. Deinde ad locum \odot inventum applicavit in armillis dioptram, eam direxit versus \odot , at ejus radius per dioptras caderet; sic firmato organo per aliam dioptram quaesivit \odot de die et sic dioptra ostendit locum \odot in zodiaco; post occasum \odot promota dioptra Veneris, quantum postulavit interstitium horarum lapsarum, inque \odot directo et firmato instrumento, per dioptram aliam inspexit fixarum aliquam, ut Cor \odot , et sic didicit ejus locum in zodiaco. Hoc pacto d. 1. Apr. h. 5. 20. locum \odot ex altitudine meridiei antecedentis constituit $20^{\circ} 50' \odot$, quem Braheas et ego solis 8 vel 9 scrupulis promotiorem indicamus. Per eum constituit locum \odot $27^{\circ} 45' \odot$, id est correcto loco \odot $27^{\circ} 54' \odot$. Sed cum \odot appropinquaret occasui essetque per refractionem altior et sic promotor versus ortum, locus igitur \odot non a vero loco \odot , qui erat in $20^{\circ} 59' \odot$, sed ab alio promotori tanto spatio in orientem recesserat. Erat igitur et ipsa ultra $27^{\circ} 54' \odot$. Et compute illam in $28^{\circ} 6' \odot$ consensu optimo.

Veruntamen cor \odot per locum \odot ab observatore constitutum sine hac

nostra correctione inventum est in $22^{\circ} 45'$ ♎, quod sane et Tycho nicus et meus calculus collocant in $22^{\circ} 42'$ ♎. Debebat autem ad modum loci ♄ habere minus justo, si hoc genus observandi per armillas citra omnem erroris aleam posset administrari.

Anno 1490. 12. Dec. annotatur, Venerem ex Solis observatione meridiana inventam esse in $14^{\circ} 45'$ ♎, 13. Dec. h. eadem in $15^{\circ} 45'$ ♎. Hic annotat observator: *angulus refractionis in ortu mutavit locum Solis in $8\frac{1}{2}$ gradibus, quia lenta declinationis mutatio.* Hunc igitur locum præteriturus eram, reputans, quod certus locus ☉ in principio ♋ nequeat colligi ex ejus altitudine meridiana pñra, nedum si ea vitietur per refractionem. Sed recolligi me. Nam quis observatori dixisset, quantum vitiet locum ☉ refractione, si de vero ☉ loco non constitisset aliunde, nimirum ex continua per hos annos observatione altitudinum Solis meridianarum? Ergo hæc particula: *Ex Solis observatione meridiana sic est intelligenda: Venus coelum medians observata est ad ☉ in occasum vergeantem, et per locum ☉, constitutum observationibus ejus meridianis continuis, deprehensa est in hoc gradu etc.* Et quidem et illud confirmat certitudinem hujus observationis Veneris, quod statim h. 5. post occasum sc. Solis Aldebaran per ♄ observata est in $2^{\circ} 35'$ ♏, quae Tycho ni et mihi fuit. non ultra $2^{\circ} 38\frac{1}{2}'$ ♏. Etsi minima non sunt exigenda ab hac observatione vel hoc indicio; quod diurnum ☉ facit $1^{\circ} 0'$, qui vere fuit $1^{\circ} 10'$. Ergo computo ego locum Veneris ad 13. Dec. b. 3. in $15^{\circ} 50'$ ♎, paulo ulteriorem, sicut etiam fixa est paulo ulterior, et ☉ apparens fuit per refractionem in occasu ultra verum, consensu incredibili.

Anno 1491. 17. Jan. Sol ex observatione meridiana $6^{\circ} 30'$ ♏, Venus $23^{\circ} 15'$ ✕ reperta usq. perpendiculari.

Sol erat occasui vicinus et per refractionem apparebat promotior, quam erat re vera. Nec enim cavetur usu perpendiculari, ut opinatus est Waltherus, ne refractione Solis in ipsam etiam Venerem redundet. Computo locum ☉ $6^{\circ} 39\frac{1}{2}'$ ♏, ♄ $23^{\circ} 35\frac{1}{2}'$, quod esset per assumptionem loci ☉ Waltheriani in $23^{\circ} 26'$, residua igitur $10'$ vel ex refractione sunt vel ex discrepantia mei calculi.

14. Febr. b. 4. post meridiem, loco Solis ex observatione meridiana super $4^{\circ} 50'$ ✕ posito, reperi ♄ in $15^{\circ} 34'$ ♏. Hora 7. post meridiem ex loco ♄ (Aldebaran) $2^{\circ} 30'$ ♏ usu novi perpendiculari, sed addeudo motum ♄ in 2 horis, quae fluxere ab observatione ad ☉ et ♄ habita, erit locus Aldebaran $2^{\circ} 35'$ ♏, sicut prius assepius. Latitudo Veneris sept. $4^{\circ} 45'$.

Computo locum ☉ $4^{\circ} 55' 40''$ ♏, ♄ $16^{\circ} 10' 40''$ ♏, lat. 4. 41 bor. Hoc esset per assumptionem loci ☉ Waltheriani in $16^{\circ} 5'$ ♏, adhuc $31'$ ultra, quam dicit observator. Tantum vero refractionem in longitudinem effecisse, non facile concedi potest, nisi fuerit eo die insolita ejus quantitas. Et meminimus, utroque die Aldebaran per locum Veneris referri in $2^{\circ} 35'$ ♏, quod non ultra $3'$ est infra verum. Sciendum ergo, si hoc loco commutationis angulus augetur solis $36'$, tolli dissidium hoc.

Anno 1494. 19. Sept. fuerat ♄ conjuncta octavæ Leonis, de mane h. 5. post medium noctis, fuerat ♄ occidentalis minus 3 digitis, vel quasi ad sextam partem gradus unius, meridionalior vero 4 digitis vel ad modum palmi.

Erat stella in $22^{\circ} 47'$ ♎, lat. 0. $26'$ bor. et lat. ♄ computatur 0. 2. b. circiter. Itaque quod ille censuit 4 digitos seu palmum, id erant $23'$, duo potius palmi. De hoc ♄, sunt $17'$, quod ille aestimavit $10'$. Sed nolatis $17'$

de $22^{\circ} 47' \varnothing$, residuus est locus $22^{\circ} 30' \varnothing$. Et computo \varnothing in $22^{\circ} 27\frac{1}{2}' \varnothing$, locum eccentricum $13^{\circ} 22' \Pi$, locum \odot $4^{\circ} 47\frac{1}{3}' \approx$.

Post unam apocatastasin 8 annorum, anno sc. 1502, die eadem 19. Sept. rursum post medium noctis de mane fuerat \varnothing conjuncta Cordi \varnothing per semidiametrum Innæ. Longitudinem judicavi eandem, trahendo enim lineam per \varnothing , γ et \varnothing , videbatur distantia tantum latitudinis fore; fuerat enim quasi una linea cum septima Leonis, puta \varnothing et Cor \varnothing .

Itaque Venus meridionaliter corde nonnihil superaverat Cor, sed hora inter ortum \varnothing et \odot non est definita. Cum igitur Cor fuerit in $22^{\circ} 54\frac{1}{2}' \varnothing$, computo locum \varnothing in $22^{\circ} 54\frac{3}{4}' \varnothing$ h. 5. matutina, lat. e. O. $8' b.$, differentem a lat. Cordis \varnothing per $18'$, quod est semidiameter \odot .

Anno 1503. 10. Dec. post meridiem, dum in medio coeli fuerat $0^{\circ} \times$; armillis rectificatis per Aldebaran in $2^{\circ} 45' \Pi$, reperi \varnothing $2^{\circ} 0' \approx$, hoc est $2^{\circ} 4\frac{1}{2}' \approx$, lat. O. 15. b. Sed refractione sustulit illam in altum, ut utrumque esset nimum. Invenio $2^{\circ} 3' \approx$ et Venerem e. nodum, loco eccentrici in $11^{\circ} 58' \Pi$.

Sequente 11. Dec. iterum in $2^{\circ} 0' \approx$, i. e. in $2^{\circ} 4\frac{1}{2}' \approx$ est visa, lat. O. $22'$ hor., hisdem refractionum causa vitata, quando invenio illam in $2^{\circ} 16' \approx$ et aequali modulo incrementi cum observatione septentrionaliore.

Sic et 12. Dec., Sole in $0^{\circ} \approx$ posito, reperta est per armillas in $2^{\circ} 15' \approx$. At cum \odot ex rationibus nostris esset post occasum in $29^{\circ} 51' \nearrow$, Venus potius fuisset in $2^{\circ} 5' \approx$ per Solem, si \odot non promotor in occasum fuisset visus ob refractionem. Sed quod annotavit observator, Venerem retinuisse eundem locum fere usque ad occasum, id videtur impugnare refractionem, debebat enim illa promovere Venerem in occasum. Non vero impugnatur, sed confirmatur potius refractionem. Nam per Solem nimio visa est promotor ob Solis refractionem; jam nocte incepta Venus occasura per stellas fuit examinata, quando jam non stellæ, sed ipsa refractionem patiebatur, quippe vicina occasui. Cum igitur motum horarium habuerit pene insensibilem, non mirum, quod eodem zodiaci loco apparuit quo etiam prius, cum esset in medio coeli, quippe utrinque optice promota, illic quidem per Solem in $0^{\circ} \approx$ positum ob refractionem, hic per suam ipsius refractionem. Computo $2^{\circ} 25\frac{1}{2}' \approx$, promotum uno die per $9'$.

Anno 1504. d. 19. Jan. mane h. 6. posito Corde \varnothing super $22^{\circ} 33' \varnothing$, inventa est \varnothing in $17^{\circ} 15' \approx$, si nullus est error in descriptione; lat. $7^{\circ} 0'$ hor. Sed quia Cor \varnothing secundum rationes Tychonis fuit in $22^{\circ} 54\frac{1}{2}' \varnothing$, ejus defectus partem observator ipse corrigi jubet sequente 12. Febr., ergo Venus verius spectata fuit in $17^{\circ} 36\frac{1}{4}' \approx$. Et quia orientem planetam refractione attollit versus præcedentia inque septentrionem, testatur ergo observatio de loco ulteriore et latitudine sept. minore. Et computo ego $18^{\circ} 12' \approx$, lat. $7^{\circ} 26' b.$ Suaderet autem hæc observatio, si penitus sana esset, locum eccentricum Veneris nonnihil promoveri. In latitudine oportet esse vitium observationis.

Post dies 5. mane d. 24. Jan. per idem Cor \varnothing observata est \varnothing in $16^{\circ} 30' \approx$, i. e. in $16^{\circ} 51\frac{1}{2}' \approx$ et ultra fuit ob refractionem; lat. $7^{\circ} 15'$ hor. Computo ego $17^{\circ} 6' \approx$ et lat. $7^{\circ} 26' b.$ stationariam. Post alios 3 dies, 27. Jan. mane per idem Cor observata est \varnothing in $16^{\circ} 20' \approx$, i. e. $16^{\circ} 41\frac{1}{2}' \approx$ et ultra ob refractionem; lat. $7^{\circ} 5'$ sept.; et computo ego $17^{\circ} 4' \approx$ lat. $7^{\circ} 4\frac{1}{2}'$ sept. Itaque aut hæc ratio observandi latitudinem, aut mea hypothesis his diebus constanter aberrat. Puto autem causam in magna esse latitudine, quæ etiam longitudinem vitaverit.

Sequente 20. Febr. de mane ante Solis ortum, armillis rectificatis per Cor Leonis, in $22^{\circ} 40' \varnothing$ posita (debebat autem secundum Tychonem in $22^{\circ} 54\frac{1}{2}' \varnothing$),

♀ 26° 40' ♄, lat. sept. 4° 20', medium coeli 25° ♍. Sed 1 h. post ortum Solis posito gradu Solis super 10° 15' ♄, videbatur ♀ 27° 10' ♄, cum lat. sept. 4° 10'. Sed radii propter praesentiam Solis non satis fortes, sed possibile est, radios refractos circa horizontem illam differentiam generasse.

Haec non corrigamus. Nam prima observatio vere testabatur de 26° 54½' ♄ sine refractione, quao sit alicujus momenti, quia ♀ erat satis alta. Etel armillae directae per Cor ♄, quod vergens in occasum propter refractionem apparuit promotius, quam per veritatem, quo nomine Venus fuit nonnihil promotior ultra 26° 54½' ♄. Posterior observatio est facta per ☉, cui si proprium assignes locum, Venus spectata dicitur in 27° 22' ♄. Sed quia Sol post horam unam nondum est liber ab omni refractione, in ortu vero apparet alior et in antecedentia, quare etiam Venus per locum Solis refractum spectata fuit ante 27° 22' ♄. Ecce ut concurrerint effectus refractionum orientalis et occidentalis, et una cum promotione Veneris vera in horis tribus dimidii gradus discrimen effecerint, quod observatorem in admirationem traxit. Recte itaque factum, quod illud discrimen excusavit per refractionem. Colligo ego ex calculo ad h. 6. matutinam locum ♀ in 27° 1' ♄, lat. 4° 31' sept., adhuc denario scrupulorum auctiorem, quam habet armillaris observatio, quemadmodum ex priori mense.

Martio d. 3. mane post ortum Solis e. h. 7½' posito Sole in 22° 6' ♄, visa est ♀ in 6° 15' ♄. Sed quia Sol verius in 22. 17 ♄ fuit, quare etiam ♀ in 6. 26 ♄ refertur. Si vero reflectio aliquid nocuit Soli, veniet observatus locus anterior. Computo ad hanc horam 6. 39 ♄, lat. 2° 58' sept.

Die 11. Martii, hora una maturius, posito Sole in 0° 3' ♄. Venus visa est in 13° 45' ♄. Atqui Sol erat in 0° 16' ♄, ergo ♀ in 13° 58' ♄ et anterior forte ob refractionem. Lat. 2° 15' sept., cum ego computem 13° 54' ♄, lat. 2° 1½' sept., denario minus quam in observatione, cum superius tantundem plus haberem. Itaque dubium est nullum, quin hoc sit ex vitio instrumenti, de quo testatur auctor ipse ad 12. Dec. antecedentem. Testimonium jam statim perhibebit ipsa observatio.

Postridie enim, posito Sole in 1° 1' ♄, visa est ♀ in 14° 45' ♄; sed Sol in 1° 16' ♄ erat poneudus, ergo ♀ in 15° 0' ♄ et forte anterior ob refractionem, cum lat. sept. 2° 15', eademque et pridie. At non manet invariabilis latitudo hoc situ planetae. Computo igitur 14° 50' ♄, lat. 1° 54½' sept.

Post alios dies. 5. 17. Martii, posito Sole in 5° 55' ♄, visa est ♀ in 19° 30' ♄. Sed si Sol sit in 6° 11½' ♄, etiam ♀ veniet in 19° 46½' ♄ et per Solis refractionem anterior. Lat. sept. 1° 38'. Computo 19° 41½' ♄, lat. 1° 20½'.

Postridie, Sole super 6° 53' ♄ posito, Venus aestimata est tenere 20° 15' ♄ lat. 1° 30' sept. Sed Sole in 7° 10½' ♄ posito, Venus habebit 20° 32½' ♄. Computo 20° 40' ♄, lat. 1° 12' sept.

Sequente 19. Mart. Sole in 7° 55' ♄, Venus visa in 21° 23' ♄, cum lat. 1. 23 sept., ubi vides, motum non bene proportionari. Nam ab 11. in 12. Mart. diurnus est 60', per sequentes dies 5 est 57', tunc 45' et jam ultimus 62', quod argumento est, ab armillis non scrupulos minimos exigendos. Computo ego 21° 39½' ♄, nam mihi ♀ est 13½' ulterior, lat. 1° 7½'.

Denique 27. Martii posito Sole in 15° 50' ♄, observata est Venus in 29° 40' ♄; sed quia mihi Sol est in 16° 0' ♄, quare et observatio testabitur de 29° 50' ♄. Computo 29° 51' ♄.

Haec ultima est observatio Waltheri circa Venerem.

Consideratio observationum Waltheri in Mercurio.

Anno 1481. 22. Oct. ante ortum Solis fere ad eandem horam vidit ζ et φ distantes, sicut visui judicavi, non ultra diametrum Lunae, quam distantiam tantum indicavi ex parte longitudinis, videbantur enim eandem latitudinem habere fereque Mercurius orientior.

Computatur locus ζ in $18^{\circ} 8'$ \sphericalangle , lat. $2^{\circ} 18'$. Sed certum est, cum ex observationibus antecedentium annorum, tum ex proxime sequenti Novembri non semel, addendum esse huic loco ζ $30'$ vel $40'$, ut sic locus ζ referatur inter $19^{\circ} 12'$ \sphericalangle et $19^{\circ} 22'$ \sphericalangle , lat. $2^{\circ} 12'$ hor. circiter. At computo ad h. 6. eccentricum $25^{\circ} \odot$, visum per curtationem $19^{\circ} 3'$ \sphericalangle , lat. $2^{\circ} 18'$ bor. et h. 7. promotiorem. Quodsi retrahatur locus eccentricus, minor erit prosthaphaeresis subtrahenda, quare ζ promotior. At potuit aestimatio distantiae diametri \odot nonnihil fallere, ut factum non semel. Post dies 12, puta 8. Nov. h. dimidia ante ortum Solis distantia inter ζ et φ fuit $14^{\circ} 40'$. Adde ad locum ζ priorem motum dierum 12, ut sit $19^{\circ} 27'$ \sphericalangle computatus, lat. $2^{\circ} 20'$ bor., adde etiam, ut in antecedentibus et sequentibus $30'$ vel $40'$, quibus calculus deficit, ut sit $19^{\circ} 57'$ vel $20^{\circ} 7'$ \sphericalangle . Hinc extende, quod de distantia competit longitudinis, $14^{\circ} 39'$, si modo fides radio in tam magna, veniet φ in $4^{\circ} 36'$ \mathcal{M} vel $4^{\circ} 46'$ \mathcal{M} . At computo $5^{\circ} 2'$ \mathcal{M} , lat. $1^{\circ} 37'$ bor. Quasi hic radius non attigisset instum, aut quasi locus eccentricus, qui est in $23^{\circ} \Pi$, retrogradus sit, ut prosthaphaeresis ablative fiat major, quod tamen sequentibus non confirmatur.

Anno 1482. 11. Oct. modicum ante ortum Solis vidi φ apud \mathcal{D} , fueratque φ australior ad quantitatem diametri Lunae, aut ultra, sed longitudo fere eadem.

Computo ad h. 18. $30'$ aeq. Uranib. locum \odot verum ad eclipticam rednctum $8^{\circ} 37' 45''$ \sphericalangle , lat. $3^{\circ} 17' 36''$ hor., parallaxin, oriente 13° \sphericalangle sub alt. poli $49\frac{1}{2}^{\circ}$, longitudinale $54^{\circ} 48'$, latitudinis $27^{\circ} 0''$, locum igitur visum \odot $9^{\circ} 32\frac{1}{2}'$ \sphericalangle , lat. visam $2^{\circ} 50\frac{3}{4}'$ bor. Mercurii vero locum eccentricum quidem computo $7^{\circ} \mathcal{Q}$, prope limitem horum, visum vero per curtationem, ut par est, $9^{\circ} 27'$ \sphericalangle , lat. $2^{\circ} 4'$ hor., qui consensus cum observatione supra votum est. Quod enim dixit observator diametrum \odot aut ultra, in differentia latitudinis id invenitur $46\frac{1}{2}'$ inter centra, quod est sesquidiametri \odot , inter marginem proximum $31'$, quod est plane diameter \odot .

Anno 1484. 16. Jan. φ ortus est h. 1. $37'$ ante Solem. Hunc locum initio non censi computandum, quod vel unicum temporis minutum desideratum trientem gradus in loco φ mutet, ponderibus vero et totis horologiorum nunquam circa minutus est fidendum; ut non dicam, quod alio loco horizontis ortus φ , alio \odot , nec indicator eorum altitudo supra libramentum aquae; ut taceam subitam refractionis mutationem, quippe Sole appropinquante. Visa est aliquando Vénus per horae quadrantem haerere in contactu horizontis. Sed tamen, quia locus eccentricus est in $5^{\circ} \mathcal{M}$, quo loco φ nunquam est observatus a Tycho, computavi et visum locum in $11^{\circ} 18'$ \mathcal{Z} , lat. 0. $19'$ sept. Ortus igitur est regulariter h. 1. $23'$ ante Solem, et Waltherus favisse videtur calculo Alphonsino, qui refert φ in $7\frac{1}{2}^{\circ} \mathcal{Z}$. Forte erravit, confectos existimans 35 denticulos de 56 rotas horariae, residuos 21, cum essent confecti 21, residui 35.

Anno 1485. 8. Jan., cum esset φ ratione eccentrici in $21^{\circ} \mathcal{M}$, observator ejus conspectui invidiatus est frustra.

Sequente Augusto, cum incederet motu eccentrico per \mathcal{D} , Π et \odot ,

visus scribitur, at non observatus ad fixas. Similiter a. 1486, eodem mense, eodem loco cœcentrici.

Anno 1488. 16. Jan. ☿ et per ♃ et per ☉ observatus in $23^{\circ} 40'$ --- e. refertur, latitudine $31\frac{1}{2}'$ bor. Et tautam etiam computo utramque. Vide ♃ observationes. Locus eœcentricus est $25^{\circ} 8'$.

Anno 1491. ☿ observatus est per armillas et Aldebaran in $2^{\circ} 35'$ Π collocata, ad dies sex mensibus Augusto et Sept. h. 1. ante ortum Solis. Nam 26. Aug. visus est in $23^{\circ} 10'$ ☿, et si addas quod deest loco fixæ, in $23^{\circ} 14'$ ☿, cum ego computem $23^{\circ} 13'$ ☿. Latitudo est observata nulla. Mihi est meridiana $1-2'$, quia locus eœcentricus $11^{\circ} 8'$. Die 30. Aug. visus est in $27^{\circ} 10'$ ☿, i. e. corr. $14'$, cum lat. sept., quæ capi non potuit, quanquam major fuisse pronuntiatur $\frac{1}{2}^{\circ}$. Computo $27^{\circ} 19'$ ☿, lat. 0. $53\frac{1}{2}'$ sept. aut paulo quid minus. Die 31. Aug. visus est in $28^{\circ} 3'$ ☿, sed analogia diurnorum suadet legendum $28^{\circ} 30'$, i. e. $28^{\circ} 34'$ ☿, cum lat. sept. $53'$. Computo vero $28^{\circ} 38'$ ☿, lat. $1^{\circ} 4\frac{1}{2}'$ sept. aut minus. Die 2. Sept. visus est in $1^{\circ} 13'$ Π , i. e. $1^{\circ} 17'$ Π , lat. 1. $15'$; computo $1^{\circ} 30\frac{1}{2}'$ Π , lat. $1^{\circ} 22'$ aut minus. Die 3. Sept. visus in $8^{\circ} 5'$, i. e. $3^{\circ} 9'$ Π , lat. $1^{\circ} 20'$ sept. Computo $3^{\circ} 3'$ Π , lat. $1^{\circ} 29\frac{1}{2}'$ sept. aut minus paulo. Die 9. Sept. visus in $13^{\circ} 23'$ vel $27'$ Π , lat. $1^{\circ} 50'$ sept. Computo vero $18^{\circ} 21'$ Π , lat. $1^{\circ} 50\frac{1}{2}'$ sept. (Monuit Tycho, manu sua, hanc unam ex tribus esse a Copernico traussumptis.) Hic quia ☿ properavit ad ☉, locus ejus eœcentricus promoveri deberet, ut propius assequeretur calculus observationem, si hæc circa minima fide digna esset. Ad scito, ipsius distantiam, cum sit in limite, esse curtandam, quod hac vice neglectum. Tunc fiet elongatio c. $7'$ brevior et veniet ☿ in $13^{\circ} 28'$ Π .

Anno 1502. 20. Oct. quasi $1\frac{1}{2}$ hor. ante ortum Solis vidi ☿ usu ultra gradum distantem ab horizonte.

Oriebatur Noribergæ $19\frac{3}{4}^{\circ}$ --- , ergo ☿ fuisset c. hunc gradum, quippe latitudinem habens septentrionalium, cum tamen referatur ab Alphonsino calculo in $22\frac{1}{2}^{\circ}$ --- ; ego vero computo $26^{\circ} 32\frac{1}{2}'$ --- : fuisset igitur vix unam boram ante ortum Solis. Est sane scriptura infida et indiscreta „quasi $1\frac{1}{2}$ hor.“, sc. post litteram i simile est signum unitatis, deinde comma, tum denum $\frac{1}{2}$ signum semissis. Fortasse legendum: „quasi 1 v. $\frac{1}{2}$ hor.“

Anno 1504. 9. Jan. bora matutina ☿ per Cor ☿ in $22^{\circ} 30'$ ☿ positum, ut diebus antecedentibus, inventus est in $3^{\circ} 15'$ ☿, lat. sept. 0. $45'$. Sed ad sequentem 12. Febr. annotatum invenitur: omnes præcedentes observationes ab 11. Sept. 1503 per Cor Leonis factæ deficient in 10 minutis. Et sane, si auferamus a loco Cordis a. 1600, sc. 24.17° ☿, motum annorum 97, sc. $1^{\circ} 22\frac{1}{2}'$, restat locus $22^{\circ} 54\frac{1}{2}'$ ☿ per locum Solis, sc. Tychonicum et meum. Ita ☿ esset visus in $3^{\circ} 36\frac{1}{2}'$ ☿, computo c. $3^{\circ} 38'$ adhibita curtatione, lat. 0. $50'$ s. (Manu Tychonis annotatum inveni, hanc alteram observationem a Copernico esse traussumptam.). Locus eœ. 25°--- .

Sequente 10. Jan. scribitur eodem modo observatus in $4^{\circ} 0'$ ☿, i. e. $4^{\circ} 21\frac{1}{2}'$ ☿, lat. iterum 0. $45'$ sept., etiam certum est, latitudinem hac latitudine planetæ non consistere invariabilem. Computo $4^{\circ} 47'$ ☿, lat. 0. $40'$ sept.


Post 2 menses d. 11. Martii visus fertur in $17^{\circ} 30'$ Υ , idque per Aldebaran, in $2^{\circ} 45'$ Π positam, quæ per meas rationes est in $2^{\circ} 49\frac{1}{2}'$ Π . Ergo ☿ in $17^{\circ} 34\frac{1}{4}'$ Υ , lat. 1. $51'$. Computo $17^{\circ} 39'$ Υ , sed per curtationem $17^{\circ} 34'$ Υ , lat. $1^{\circ} 26'$. Hæc in latitudine differentia durat per 3 sequentes observationes videturque ex armillarum vitio esse.

Sequente 17. Mart. visus scribitur ut prius in $25^{\circ} 30' \Upsilon$, i. e. $25^{\circ} 34\frac{1}{2}' \Upsilon$ lat. sept. 2. 53. Computo per curtationem $25^{\circ} 36' \Upsilon$, lat. $2^{\circ} 29'$ sept.

Postridie ut prius refertur in $26^{\circ} 30' \Upsilon$, i. e. $26. 34\frac{1}{2}'$, lat. sept. 3° . Computo curtata distantia, quippe in limite boreo, $26^{\circ} 35' \Upsilon$, lat. $2^{\circ} 38\frac{1}{2}'$. Monuit Tychonis manus, hanc esse tertiam observationem, qua sit usus Copernicus.

Denique 24. Mart., cum esset ζ motu eccentrico in $7\frac{1}{2}^{\circ} \Pi$, ubi est long. media, et aequatio maxima 24° fere, visus fertur in $0^{\circ} 5' \zeta$, si bona est scriptura, lat. $3^{\circ} 30'$ sept.; esset in $0^{\circ} 9\frac{1}{2}' \zeta$, et computo ad h. 6. 42' in $0. 28\frac{1}{2}' \zeta$ per curtationem, lat. $3^{\circ} 4\frac{1}{2}'$ sept. Si promoveatur in eccentrico, calculus propius scriptam observationem veniet, nisi tamen pro $0^{\circ} 5'$ legendum sit $0^{\circ} 25'$, quod in hoc exemplari usu venit non raro.

Omnibus Waltheri observationibus expensis apparet, nunquam illum in eccentrico ante $11^{\circ} \zeta$, nunquam ultra $25^{\circ} \sim$ esse observatum, in $5^{\circ} \Pi$ visum quidem, at non cum stellis; in fine hujus signi in eccentrico ne videri quidem potuisse.



ERRATA.

Vol. II.	pag.	419	lin.	4	ab infra pro 368 lege 364.
" III.	"	351	"	4	ab infra Maldivarum.
" "	"	453	"	9	a supra lege involutam.
" IV.	"	127	"	5	ab infra lege Berneggerum.
" "	"	14	"	10	a supra lege Ethet.
" "	"	73	"	15	a supra lege 39 pro 42.
" "	"	227	"	21	ab infra lege II pro III.
" VI.	"	245	col.	elt.	lege alt. poli 40 ^a 18'
" "	"	532	linas	16	a supra dele verba: Hic adscripsit computaverat.

131,091



